



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines


Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>







R.H.







нов. изд. 2-е.  
ав

ЗЕМЛЕВѢДѢНІЕ

А З І И

КАРЛА РИТТЕРА.

ГЕОГРАФІЯ СТРАНЪ

ВХОДЯЩИХЪ ВЪ СОСТАВЪ АЗІАТСКОЙ РОССІИ  
ИЛИ ПОГРАНИЧНЫХЪ СЪ НЕЮ.

ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ; ОЗЕРО БАЙКАЛЬ И ПРИБАЙКАЛЬСКІЯ  
СТРАНЫ, ЗАБАЙКАЛЬЕ И СТЕПЬ ГОБИ.

НОВѢЙШІЯ СВѢДѢНІЯ ОБЪ ЭТИХЪ СТРАНАХЪ (1832—1893 г.),  
СЛУЖАЩІЯ ПОСЛѢДУЮЩИМИ ВЫПУСКАМИ КЪ РУССКОМУ ТЕМУ  
РИТТЕРА, ИЗДАННОМУ ПОДЪ ПРИВЕДЕННЫМЪ ЗАГЛАВІЕМЪ ВЪ  
1879 ГОДУ.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

1894.



**ЗЕМЛЕВѢДѢНІЕ**

**А            З            І            И**

**КАРЛА РИТТЕРА.**

---

**ГЕОГРАФІЯ СТРАНЪ**

**ВХОДЯЩИХЪ ВЪ СОСТАВЪ АЗІАТСКОЙ РОССІИ  
ИЛИ ПОГРАНИЧНЫХЪ СЪ НЕЮ.**

**ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ: ОЗЕРО БАЙКАЛЪ И ПРИБАЙКАЛЬСКІЯ  
СТРАНЫ, ЗАБАЙКАЛЬЕ И СТЕПЬ ГОБИ.**

---

**НОВѢЙШІЯ СВѢДѢНІЯ ОБЪ ЭТИХЪ СТРАНАХЪ (1832—1893 г.),  
СЛУЖАЩІЯ ПОСЛѢДУЮЩИМИ ВЫПУСКАМИ КЪ РУССКОМУ ТЕМУ  
РИТТЕРА, ИЗДАННОМУ ПОДЪ ПРИВЕДЕННЫМЪ ЗАГЛАВІЕМЪ ВЪ  
1879 ГОДУ.**


---

**С.-ПЕТЕРБУРГЪ.**

---

**1894.**





---

Типография В. БЕЗОВА и К°. (Вас. Остр., 8 л. № 45).

## **ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.**

**Саянское нагорье въ предѣлахъ Иркутской губерніи до юго-западной оконечности озера Байкала, къ югу отъ Большаго Сибирскаго тракта.**

---

**СОСТАВИЛИ**

**по порученію Императорскаго Русскаго Географическаго Общества:**

**П. П. Семеновъ, И. Д. Черскій и Г. Г. ф. Петцъ.**

---



# ОГЛАВЛЕНІЕ 1-ой части.

	Страницы.
Предисловіе . . . . .	I—XI

## I.

**Новѣйшія изслѣдованія въ Саянскомъ нагорьѣ между долиною р. Оки, юго-западной оконечностью оз. Байкала и Большимъ Сибирскимъ трактомъ.**

1) Долина р. Оки отъ верховьевъ до с. Зиминскаго . . . . .	8—39
2) Долина р. Иркута и сопровождающія ее горы . . . . .	39—163
а) Теченіе Иркута до Хангинскаго караула . . . . .	39
б) Отъ Хангинскаго караула до высшаго пункта Мунку-Сардыка . . . . .	46
в) Отъ Хангинскаго караула до Тункинской кот- ловины . . . . .	59
г) Тункинская котловина, ея населеніе и окру- жающія ее горы . . . . .	68
д) Путешествіе Полякова изъ Тунки черезъ Саянъ въ систему р. Дзиды . . . . .	89
е) Еловскій отрогъ и Торская котловина долины Иркута . . . . .	97
ж) Поѣздка Чекановскаго по рч. Средней Тибельти въ Саянскій хребетъ . . . . .	108
з) Отъ деревни Тибельти до входа р. Иркута въ ущелье; долины р.р. Быстрыхъ . . . . .	116
и) Ущелье р. Иркута . . . . .	130
к) Нижнее теченіе р. Иркута и Смоленская волость. . . . .	146
<i>Примѣчаніе.</i> Минеральные источники Няловой пустыни въ связи съ геологическимъ строеніемъ Ны- ловскаго хребта по новѣйшимъ изслѣдова- ніямъ Обручева . . . . .	156

	Страницы.
3) Горная страна между р.р. Иркутомъ и Бѣлой . . .	163—287
а) Южный склонъ Тункинскихъ альповъ отъ верховьевъ р. Тунки до рч. Саганъ-угуна . . .	164
б) Переваль черезъ Тункинскіе альпы по рч. Саганъ-угунъ въ долину р. Китоа . . . . .	172
в) Переваль съ долины р. Китоа на верховья р. Малой Бѣлой . . . . .	179
г) Отъ верховьевъ р. Малой Бѣлой до р. Осны (Онотъ) . . . . .	186
д) Путь верхъ по р. Оснѣ до лѣтнаго улуса сойотовъ . . . . .	190
е) Пребываніе у сойотовъ. . . . .	203
ж) Восхожденіе на Мунку-саганъ-хардыкъ и переваль на р. Саганъ-харъ системы Китоа . . .	213
з) Долина р. Саганъ-хара и путешествіе по р. Китою до Большаго Хонголда . . . . .	222
и) Долина Арб-Хонголда и дорога къ оз. Ильчиръ . . . . .	228
к) Ильчирская котловина и ея окрестности . . .	237
л) Отъ оз. Ильчира до Алиберовскаго рудника . . .	248
м) Вотугольскій голецъ и Алиберовскій графитовый рудникъ . . . . .	257
н) Отъ оз. Ильчира до Ниловой пустыни по долинѣ р. Ихэ-угуна и другія дороги, соединяющія оз. Ильчиръ съ Иркутомъ. . . . .	278
4) Свѣдѣнія о р. Китоѣ въ частяхъ его, лежащихъ внѣ описанныхъ маршрутовъ, и общее обозрѣніе теченія этой рѣки . . . . .	287—309
а) Теченіе р. Китоа отъ верховьевъ до устья рч. Халмагана . . . . .	288
б) Теченіе р. Китоа отъ рч. Халмагана до устья въ р. Ангару . . . . .	295
5) Теченіе р. Бѣлой и система ея притоковъ. . . . .	309—362
а) Верхняя часть р. Бѣлой до устья р. Урикъ . . .	310
б) Отъ устья р. Урикъ до устья Малой Бѣлой . . .	322
в) Теченіе р. Малой Бѣлой и Онота, иначе Осны. . .	325
г) Теченіе Большой Бѣлой отъ Малой до устья въ р. Ангару . . . . .	337
д) Населеніе бассейна р. Бѣлой, его размѣщеніе	

	Страницы
и экономическій бытъ. Аларское инородческое вѣдомство и русская волость Бѣльская . . .	343
6) Полоса плоской возвышенности, прилегающая къ сѣверо-восточному склону описанной части горной страны. Большой Сибирскій трактъ . . . . .	362—466
а) Орографія и строеніе площади . . . . .	363
б) Климатъ, почва и флора разсматриваемаго плоскогорья. . . . .	367
в) Статистическо-экономическій обзоръ населенія разсматриваемаго плоскогорья. Волость Зиминская, Балаганское инородческое вѣдомство, волости Заларинская и Черемховская Балаганскаго округа, волости Мальтинская, Тельминская и Суховская Иркутскаго округа. Дополнительныя свѣдѣнія о волости Смоленской. . .	403
<i>Прилѣчаніе 1-ое.</i> Села Тунка и Шимки, Туранскій и Хангинскій караулы и ихъ окрестности по свѣдѣніямъ, собраннымъ Дубровымъ . . .	467
<i>Прилѣчаніе 2-ое.</i> Дополнительныя свѣдѣнія о Тункинской волости и Тункинскомъ инородческомъ вѣдомствѣ . . . . .	484
<i>Прилѣчаніе 3-е.</i> Спосоѣ астрономическихъ пунктовъ, высотъ и метеорологическихъ наблюденій въ Саянскомъ пограничномъ районѣ по послѣднимъ вычисленіямъ Шмидта, геодезиста Саянской экспедиціи . . . . .	505
<i>Прилѣчаніе 4-ое.</i> Нижнеудинская пещера, ея окрестности и фауна. . . . .	520
<i>Прилѣчаніе 5-ое.</i> Большой Сибирскій трактъ отъ ст. Зиминской до западной границы Иркутской губ. . . . .	540
<i>Прилѣчаніе 6-ое.</i> Статистическо-экономическій обзоръ сельскаго населенія Нижнеудинскаго округа, обитающаго вдоль Большаго Сибирскаго тракта. Волости: Алзайская, Тулуновская, Куйтунская и Кимильтейская и инородческое вѣдомство: Нижнеудинская земляца. Городъ Нижнеудинскъ. . . . .	557
<i>Прилѣчаніе 7-ое.</i> Саянское нагорье между верховьями рѣкъ Оки и Бирюсы . . . . .	591
Алфавитный указатель географическихъ именъ . . . .	595



## ПРЕДИСЛОВІЕ.

---

Въ 1879 г. былъ изданъ Императорскимъ Русскимъ Географическимъ Обществомъ, подъ моею редакціею, томъ русскаго перевода Риттеровой Азіи, заключающій въ себѣ свѣдѣнія объ около-байкальской окраинѣ Азіатскаго нагорья, а именно объ озерѣ Байкалѣ и Прибайкальскихъ горахъ, о Забайкальѣ съ бассейнами Селенги, Шилки и Аргуни и о степи Гоби. Томъ этотъ, законченный Риттеромъ въ 1832 г., былъ основанъ на свѣдѣніяхъ, существовавшихъ до того времени въ европейской географической литературѣ и обработанныхъ по методу Риттера, сопоставляющему въ географическомъ порядкѣ и вполнѣ исчерпывающему всѣ доступные ему матерьялы. Недоступными же для великаго географа остались только немногіе русскіе матерьялы, или совсѣмъ въ его время еще необнародованные или напечатанные въ неизвѣстныхъ Риттеру, да и вообще мало извѣстныхъ русскихъ изданіяхъ.

Съ 1832 года географическая наука въ Россіи сдѣлала немновѣрные успѣхи и, если изданныя Обществомъ въ 1877 году подъ моею редакціею дополненія къ тому Риттера, заключающему въ себѣ описаніе Алтайско-Саянской горной системы, были уже гораздо обширнѣе самаго текста Риттера, то къ 1894 г. изслѣдованія русскихъ географовъ и путешественниковъ объ Окологбайкальѣ представили такой об-



ширный матерьялъ, что сопоставить въ географическомъ порядкѣ и исчерпать его по методу Риттера оказалось не возможнымъ въ одной части и пришлось разработать этотъ матерьялъ въ трехъ частяхъ.

Въ виду такого богатства нашей географической литературы за болѣе чемъ 60 лѣтній періодъ 1832—1893 годовъ и въ виду крайней ея разбросанности, болѣею частью въ поврежденных или малодоступныхъ изданіяхъ, изъ коихъ многія послѣ Иркутскаго пожара 1876 года сдѣлались даже библиографическою рѣдкостью, я уже девять лѣтъ тому назадъ пришелъ къ убѣжденію въ своевременности подведенія, если можно такъ выразиться, географическихъ итоговъ къ замѣчательно плодотворной дѣятельности русскихъ изслѣдователей Околобайкаля.

Одному то изъ этихъ изслѣдователей, посвятившему наибольшее число лѣтъ географическому и геологическому изученію странъ околобайкальскихъ, талантливому И. Д. Черскому, поручилъ я разработку новѣйшихъ свѣдѣній объ этихъ странахъ по методу Риттера и программѣ, составленной по моему съ Черскимъ соглашенію. Въ теченіи пяти лѣтъ Черскій посвящалъ всѣ свои досуги живо интересовавшему его труду, сдавая мнѣ по частямъ свою рукопись, пока въ началѣ 1891 г. его командировка въ сѣверо-восточную Сибирь Академію Наукъ не прервала его занятій.

Принявъ на себя съ 1891 г. окончательную редакцію неоконченнаго Черскимъ труда, я однакоже скоро вынужденъ былъ остановиться, въ виду того, что съ одной стороны нашелъ въ прекрасномъ трудѣ Черскаго нѣкоторыя существенныя, имъ же самимъ указанныя пробѣлы, которые онъ имѣлъ въ виду пополнить только при окончательной редакціи, а съ другой стороны трудъ Черскаго имѣлъ тотъ существенный недостатокъ, что при необыкновенной полнотѣ географическаго и геологическаго описанія страны, онъ не давалъ достаточнаго понятія о томъ, гдѣ обитаетъ и что дѣлаетъ въ

этой странѣ его населеніе, какое вліяніе оно оказало на природу страны и какъ оно подъ нерѣдко подавляющимъ вліяніемъ силъ этой природы приспособляется; прилаживается въ своей экономической жизни къ окружающимъ его естественнымъ условіямъ.

Послѣдній изъ указанныхъ недостатковъ не зависѣлъ отъ Черскаго: до 1890 г. въ нашей географической литературѣ еще не было достаточныхъ данныхъ для того, чтобы отвѣтить на намѣченные нами вопросы. Путешественники и изслѣдователи страны проникали въ глубины ея долинъ, на мало доступные склоны и вершины его нагорій, сообщали даже кое какія свѣдѣнія и наблюденія о бытѣ блуждающихъ на этихъ нагорьяхъ кочевыхъ и полукочевыхъ аборигеновъ страны, болѣе или менѣе поражавшихъ изслѣдователей своими этнографическими особенностями, но не обращали почти никакого вниманія на людныя русскія селенія, въ которыхъ останавливались попутно только на самое короткое время или для приготовленія къ труднымъ путешествіямъ въ мало доступныя части края, или для еще болѣе краткаго отдыха на возвратномъ пути послѣ тяжкихъ и утомительныхъ переездовъ. При такихъ условіяхъ каждая русская сибирская деревня казалась путешественникамъ похожею одна на другую, и особенности сельскаго быта жителей (изученіе которыхъ требуетъ не только большаго вниманія, но и тщательныхъ опросовъ по заранѣ обдуманному плану) не могли быть не только основательно изучены, но даже сколько нибудь удовлетворительно подмѣчены. Въ виду отсутствія такихъ данныхъ и того, что недостатокъ ихъ вызвалъ съ 1887 г. систематическія работы по ихъ собиранію въ Иркутской губерніи, подъ просвѣщеннымъ руководствомъ генераль-губернатора Восточной Сибири, графа А. П. Игнатъева, я отложилъ все изданіе до возвращенія Черскаго.

Но въ 1892 г. Черскаго уже не стало. Достойный и талантливый труженикъ нашелъ свою смерть въ дебряхъ по-

лярной Сибири. Въ то же время съ 1890 по 1892 г. русская географическая литература окончательнo обогатилась превосходнымъ трудомъ, представляющимъ результатъ систематическаго и отлично организованнаго и выполненнаго изслѣдованія о землепользованіи и хозяйственномъ бытѣ селскаго населенія Иркутской губерніи (см. ниже). Поручивъ вновь избранному мною сотруднику молодому геологу Г. Г. ф. Петцу пополненіе нѣкоторыхъ пробѣловъ, замѣченныхъ мною въ трудѣ Черскаго, а также отчасти и окончаніе этого труда, я принялъ на себя лично, кромѣ общей редакціи и составленія нѣкоторыхъ дополненій, включеніе въ приготовленный мною, совмѣстно съ Г. Г. ф. Петцомъ, къ изданію трудъ, всѣхъ данныхъ и преимущественно статистико-экономическихъ о русскомъ и объ осѣдломъ и полuosѣдломъ инородческомъ населеніи края. Такимъ образомъ трудъ, представленный мнѣ Черскимъ почти удвоился и составилъ тѣ три части, о коихъ было говорено выше и къ печатанію которыхъ я приступилъ въ 1893 г. при дѣятельной помощи Г. Г. ф. Петца.

Первая изъ упомянутыхъ частей, нынѣ оконченная печатаніемъ, заключаетъ въ себѣ описаніе восточной оконечности Саянской горной системы въ предѣлахъ Иркутской губерніи съ его предгорьемъ и подгорьемъ до Большаго Сибирскаго тракта. Хотя мы и вынуждены были издать эту часть какъ дополненіе къ Байкало-даурскому тому русскаго перевода Риттеровой Азіи, въ виду того, чтобы первая и вторая наши части исчерпывали вполнѣ всѣ свѣдѣнія, имѣющіяся въ нашей географической литературѣ объ Иркутской губерніи, но собственно часть эта служить болѣе дополненіемъ къ III тому русскаго изданія Риттеровой Азіи, гдѣ знаменитый географъ описываетъ и эту самую восточную оконечность Саянской системы по имѣвшимся въ его время весьма скуднымъ даннымъ. Дополненія же наши къ III тому, изданные нами въ 1877 году, мы довели только до р. Би-

риси, т. е. до границы Иркутской губерніи, имѣя въ виду рассмотреть всю восточную оконечность Саянской горной системы уже въ связи съ томою русскаго изданія Риттеровой Азіи, относящимся до Около-байкаля. Въ силу этого, эта первая часть и заключаетъ въ себѣ описаніе всей южной половины Иркутской губерніи, т. е. лежащей къ югу отъ Большаго Сибирскаго тракта.

Вторая часть уже будетъ служить непосредственнымъ дополненіемъ § 51 и отчасти 53-го Риттеровой Азіи, а именно она будетъ заключать въ себѣ описаніе по новѣйшимъ источникамъ самого озера Байкала, его с.-з.-аго побережья, прилежащихъ въ этому побережью Байкальскихъ горъ, теченія Ангарты въ предѣлахъ Иркутской губерніи, водораздѣла Ангартскихъ и Ленскихъ водъ и верхняго теченія Лены въ предѣлахъ Верхотурскаго округа Иркутской губерніи; однимъ словомъ, исчерпаетъ всѣ имѣющіяся въ географической литературѣ свѣдѣнія о той половинѣ Иркутской губерніи, которая лежитъ сѣвернѣе Большаго Сибирскаго тракта. Эта вторая часть уже печатается.

Третью часть мы предназначаемъ разработкѣ всѣхъ имѣющихся въ научной литературѣ свѣдѣній о ю.-в.-омъ прибрежьи Байкала и всей Забайкальской области, а также и степи Гоби. Такимъ образомъ этотъ томъ будетъ служить дополненіемъ къ §§ 52, 53, 54, 55, 56, 57 Риттеровой Азіи, и, если матеріалъ этихъ дополненій окажется слишкомъ обширнымъ, то Забайкальская область и Гоби будутъ рассмотрѣны въ двухъ частяхъ, III и IV. При такомъ планѣ изданія мы значительно расширяемъ самыя географическія рамки Риттера труда, но за то удовлетворяемъ практическому спросу, представляя читателю въ издаваемыхъ частяхъ полное описаніе Иркутской губерніи и Забайкальской области въ ихъ нынѣшнихъ административныхъ предѣлахъ.

Весьма обильныя данныя, послужившія основаніемъ пред-

лежащаго обширнаго труда, раздѣляются по времени своего происхожденія на четыре періода:

1) Первый періодъ, предшествовавшій еще развитію дѣятельности Императорскаго Русскаго Географическаго Общества, не смотря на свою продолжительность (1830—1850), представляется наиболѣе скуднымъ по географическимъ свѣдѣніямъ объ Окологбайкальѣ. Къ нему однакоже относятся: а) капитальное ботанико-географическое изслѣдованіе всего Окологбайкаля, произведенное съ 1829 по 1836 г. жившимъ въ то время въ Иркутскѣ ботаникомъ Турчаниновымъ, при помощи молодаго ботаника Кирилова, впослѣдствіи сопутствовавшаго Карелину въ его путешествіяхъ по Киргизскимъ степямъ и Джунгаріи, и рано умершаго талантливаго казака Кузнецова. Изслѣдованія эти послужили основаніемъ обстоятельному и можно сказать классическому труду Турчанинова *Flora baicalensi-dahurica*, выходившему въ свѣтъ въ *Bulletin de la Société Impériale des naturalistes de Moscou* въ теченіи 15 лѣтъ съ 1842 по 1856 г. включительно; б) труды нѣкоторыхъ горныхъ инженеровъ занимавшихся геологическими изслѣдованіями и горными развѣдками въ разныхъ частяхъ Окологбайкаля, а именно Ковригина (1836), Козицкаго (1844—1845) и Гофмана (1845). Статьи ихъ, проливающія первый, хотя и далеко недостаточный свѣтъ на геологическое строеніе Окологбайкаля, помѣщены въ *Горномъ Журналѣ* и *Beiträge z. Kenntniss des russ. Reiches*; в) путешествіе иностранца Д-ра Эрмана, совершенное еще въ 1829, но обнародованное въ 1843, подъ заглавіемъ *Reise um die Erde*, впрочемъ гораздо менѣе подвинувшее впередъ наши познанія объ Окологбайкальѣ чѣмъ упомянутыя выше работы русскихъ ученыхъ за этотъ же періодъ времени.

2) Второй періодъ (1851—1868) обусловливается уже постепеннымъ развитіемъ дѣятельности возникшаго въ 1846 году Императорскаго Русскаго Географическаго Общества, а также дѣятельностью генераль-губернатора Восточной Си-

бирин, графа Н. Н. Муравьева-Амурского, который въ своихъ настойчивыхъ заботахъ о познаніи вѣреннаго ему края и странъ вошедшихъ впослѣдствіи въ составъ его сѣумѣлъ привлечь многія свѣжія силы къ изученію края и даже вызвалъ основаніе въ Иркутскѣ въ 1851 году особаго Отдѣла Императорскаго Русскаго Географическаго Общества. Къ этому во всякомъ случаѣ замѣчательному для исторіи развитія края періоду относятся: а) труды большой сибирской экспедиціи Русскаго Географическаго Общества, въ составѣ которой въ 1855—1858 годахъ дѣйствовали въ Околобайкальѣ: Начальникъ экспедиціи астрономъ Шварцъ, топографъ Крыжинъ и натуралистъ Радде. Труды Шварца и Крыжина обнародованы въ Трудахъ Сибирской Экспедиціи, изданныхъ Географическимъ Обществомъ въ 1864 году и нашли свое лучшее выраженіе въ картѣ Восточной Сибири, изданной Обществомъ въ 1861 году. Труды Радде изложены имъ въ *Berg und Helmersen, Beiträge z. Kenntniss d. Russ. Reiches*, 1863, XXIII, 6) работы снаряженной Главнымъ Штабомъ геодезической экспедиціи подполковника Ахте, предназначенной собственно для геодезическаго изслѣдованія Амурской области, но направленной первоначально, а именно въ 1850—51 годахъ ген.-губ. Муравьевымъ на съемки въ Прибайкальѣ; в) труды снаряженной Сибирскимъ Отдѣломъ Общества экспедиціи на Амуръ, Маака, захватившаго своими изслѣдованіями и часть Забайкалья. (Труды эти обнародованы въ сочиненіи Маака, вышедшемъ въ 1859 году подъ заглавіемъ: Путешествіе по Амуру); г) труды горныхъ инженеровъ, командированныхъ Муравьевымъ для геологическихъ изслѣдованій и горныхъ развѣдокъ, а именно Меглицкаго (1851—56), Бакшевича (1853), Версилова (1856). Труды эти разбросаны въ Горномъ Журналѣ, *Verhandlungen der Kaiserlich-russischen Mineralogischen Gesellschaft* и въ изданіяхъ Сибирскаго Отдѣла; д) труды нѣкоторыхъ отдѣльныхъ членовъ Сибирскаго Отдѣла какъ напримеръ Кропоткина и Полякова. Труды эти разбросаны

также въ Запискахъ Сибирскаго Отдѣла и въ періодическихъ изданіяхъ Географическаго Общества. Вообще работы втораго періода особенно подвинули впередъ картографическое и чисто географическое знаніе края.

3) Третій періодъ (1869 — 1885) представляется еще болѣе плодотворнымъ для географическаго изученія Окологбайкалія. Въ этомъ періодѣ Имп. Русское Геогр. Общество осуществило весьма трудное по своимъ результатамъ для географіи страны предпріятіе, а именно тригонометрическую нивелировку черезъ всю Сибирь до Байкала, продолженную затѣмъ и далѣе до Восточнаго Океана <sup>1)</sup>, Сибирскій отдѣлъ общества привлекъ къ самому обстоятельному геологическому, зоогеографическому и этнографическому изслѣдованію края цѣлую группу молодыхъ дѣятелей географической науки, между которыми особенно выдаются геологи Чекановскій (работавшій съ 1867 по 1876 г.), Черскій (работавшій съ 1871 по 1892 г.), и зоологи Дыбовскій и Годлевскій, оказавшіе большія услуги наукѣ: первые два обстоятельнымъ изслѣдованіемъ геологическаго строенія края, а послѣдніе два изученіемъ водъ Байкала и въ особенности его водной фауны. Въ ряду же поѣздокъ и изслѣдованій Окологбайкалія съ этнографическою цѣлью въ этомъ періодѣ особенно выдаются труды члена Сибирскаго отдѣла Ровинскаго. Работы всѣхъ этихъ ученыхъ изложены въ цѣломъ рядѣ статей, разбросанныхъ въ періодическихъ изданіяхъ Сибирскаго Отдѣла, а отчасти въ рукописныхъ замѣткахъ Черскаго, впервые исчерпанныхъ въ настоящемъ изданіи. Вообще работы третьяго періода значительно подвинули впередъ геологическое и вообще физико-географическое знаніе края.

---

<sup>1)</sup> Результаты этой нивелировки обнародованы заглавіемъ: „Результаты Сибирской нивелировки, произведенной въ 1875 — 1876 г. отъ станицы Звѣриноголовской до оз. Байкала“. Зап. И. Р. Геогр. Общ. Т. XV, № 1.

4) Четвертый періодъ (1885 — 94) оказался не менѣе плодотворнымъ для изученія Околобайкаля чѣмъ предшедшій. Въ этомъ періодѣ просвѣщенные начальники края (Генераль-Губернаторы Анучинъ, Гр. П. П. Игнатьевъ и Горемыкинъ) обратили особенное вниманіе на изслѣдованія, имѣющія непосредственное отношеніе къ вопросамъ объ улучшеніи экономическаго благосостоянія края. Чисто географическою была только экспедиція, снаряженная въ 1887 и 1891 годахъ при содѣйствіи Сибирскаго отдѣла для изслѣдованій въ Саянскомъ хребтѣ, да и та преслѣдовала отчасти и практическія цѣли, а именно изслѣдованіе переваловъ и установленіе путей изъ русскихъ предѣловъ въ Монголію. Саянская экспедиція состояла подъ руководствомъ подполк. Бобыря, изъ геолога Ячевскаго, ботаника Прейна, а къ ней при поддержкѣ Импер. Русскаго Геогр. Общества присоединился еще и геологъ Макаровъ. Изъ с. Култукъ на берегу Байкала экспедиція прошла по сѣверному склону Саяна до верховьевъ Уды и пересѣкла хребетъ въ трехъ пунктахъ: 1) По дорогѣ изъ Хангинскаго караула въ Хангинскій курень (Переваль Обо-сарамъ), при чемъ экспедиція прошла кругомъ оз. Коссогола; 2) черезъ Восточный переваль изъ долины Тиссы въ долину Тенгиза и 3) черезъ переваль Мустагъ-дабанъ; возвратилась же экспедиція изъ Окинскаго караула по долинѣ Урика и Бѣлой въ Черемховскую станцію Большаго Сибирскаго тракта, а оттуда уже въ Иркутскъ.

Независимо отъ того, состоящій при Ген.-Губер. Вост. Сибири, горн. инж. Обручевъ, также въ теченіи разсма-триваемаго періода, оказалъ большія услуги географической наукѣ своими прекрасными работами. Но самую капитальною работою этого періода было предпринятое въ 1887 году, подъ руководствомъ Генераль-Губернатора, въ обширныхъ размѣрахъ и оконченное къ 1890 г. для Иркутской губерніи изслѣдованіе о землепользованіи и хозяйственномъ бытѣ сельскаго населенія какъ русскаго такъ и инородческаго. При этомъ



ислѣдователи, принадлежащіе къ составу рабочихъ комиссій, производили свои изслѣдованія путемъ объѣзда всѣхъ населенныхъ пунктовъ губерніи и опроса сельскаго населенія о всѣхъ условіяхъ его хозяйственнаго быта по программамъ и вопросамъ, заранѣе обдуманнѣмъ и опредѣленнымъ, отвѣты на которые разрабатывались участниками изслѣдованія систематически и по предмету, что и составило обширный трудъ, появившійся въ печати въ 1890—92 г., въ видѣ одного тома таблицъ и 7 выпусковъ текста. Такимъ образомъ самая капиталная заслуга четвертаго періода заключается въ изслѣдованій хозяйственнаго быта и экономическаго положенія населенія края.

Пріурочивая многочисленныя данныя, заключающіяся въ упомянутомъ образцовомъ трудѣ къ мѣстностямъ, такъ обстоятельно описаннымъ въ обширномъ трудѣ, составленномъ Черскимъ и нами дополненнымъ, мы получаемъ полную картину современнаго состоянія нашихъ знаній описываемой нами страны, а именно Иркутской губерніи въ 1-ой и 2-ой частяхъ; къ сожалѣнію такого же превосходнаго матеріала для Забайкалья не существуетъ, но мы постараемся пополнить этотъ пробѣлъ конечно болѣе краткими, новѣйшими свѣдѣніями, собираемыми для насъ на мѣстахъ по благосклонному распоряженію Амурскаго Генералъ-Губернатора Духовскаго.

Поспѣшая окончаніемъ нашего изданія, мы имѣли въ виду прежде всего удовлетворить возрастающій интересъ всей образованной Россіи къ Сибири, возбужденный въ особенности столь плодотворнымъ для края посѣщеніемъ ея Государемъ Наслѣдникомъ и рѣшеніемъ Правительства провести черезъ всю Сибирь великій желѣзный путь, который будетъ служить жизненною артеріею для всего населенія необъятнаго края. Отъ души желаемъ, чтобы наше изданіе, исчерпывающее по возможности всѣ существующіе научные географическіе матеріалы о тѣхъ частяхъ Сибири, которыя въ ней описаны, замѣнило бы для желающихъ ознакомиться съ страной, а въ

особенности для путешественниковъ или мѣстныхъ изслѣдователей, желающихъ предпринять новыя въ ней изслѣдованія, совершенно недоступную и едва ли могущую быть собранною частнымъ человѣкомъ бібліотеку официальныхъ, періодическихъ и другихъ изданій, въ которыхъ разбросаны самыя важныя свѣдѣнія о странѣ, и, указавъ на пробѣлы нашихъ знаній, послужило бы исходною точкою новыхъ изслѣдованій о Сибири.

Если наша книга принесетъ ея читателямъ существенную пользу въ этомъ направленіи, то Императорское Русское Географическое Общество будетъ считать цѣль своего изданія вполне достигнутою.

*П. Семеновъ.*

---



# I.

## НОВѢЙШІЯ ИЗСЛѢДОВАНІЯ ВЪ САЯНСКОМЪ НАГОРЬѢ МЕЖДУ ДОЛИНОЮ Р. ОКИ, ЮГО-ЗАПАДНОЙ ОКОНЕЧ- НОСТЮ ОЗ. БАЙКАЛА И БОЛЬШИМЪ СИБИРСКИМЪ ТРАКТОМЪ.

Такъ какъ часть нагорья, лежащая между верховьями Енисея <sup>1)</sup> и юго-западною оконечностью озера Байкала (т. е. между 117 и 121°25' восточной долготы отъ 1-го меридіана) сдѣлалась болѣе извѣстною лишь начиная съ 1829 г. и всего болѣе посѣщалась въ началѣ второй половины нашего столѣтія, то поэтому, придерживаясь принятаго въ описаніи порядка по-двигаться постепенно съ запада на востокъ, мы займемся этою частью горъ прежде, нежели приступить къ изложенію результатовъ позднѣйшихъ изслѣдованій Байкала и прилежащихъ къ нему мѣстностей. Названный отрѣзокъ нагорья имѣетъ весьма важное значеніе еще и въ томъ отношеніи, что изученіе его, какъ мы увидимъ ниже, бросаетъ свѣтъ, какъ на связь

---

<sup>1)</sup> Дополненія къ Т. III. Земл. Аз. Ритт., стр. 641—662.

Байкальскихъ горъ съ Саянскими, слѣдовательно и съ Алтаемъ, такъ равно и на отношеніе всѣхъ ихъ къ таеъ называвшейся сѣверной или Байкальской Дауриі, заставляя соотвѣтственно измѣнить прежнія воззрѣнія на этотъ вопросъ.

Матеріалами нашего обозрѣнія будутъ служить: во-первыхъ маршруты, окаймляющіе интересующую насъ мѣстность съ запада, сѣверо-запада и сѣверо-востока до р. Ангары, т. е. по теченію р. Оки до Зиминской почтовой станціи ( $53^{\circ}53'$  с. ш.), которая располагается уже на плоскогоріи, примыкающемъ къ этимъ горамъ, а затѣмъ, отъ Зиминской станціи до г. Иркутска; во-вторыхъ, маршруты, ограничивающіе его съ юга, именно: по системѣ р. Иркуты, приблизительно по  $51^{\circ}45'$  с. ш.; въ третьихъ, пути, углубляющіеся въ эту крайне дикую альпійскую мѣстность и отчасти пересѣкающіе её какъ въ поперечномъ, такъ въ продольномъ и діагональномъ направленіяхъ, а именно: по системамъ рр. Битоя и Бѣлой, и наконецъ обстоятельныя изслѣдованія флоры этого нагорья извѣстнымъ ботаникомъ Турчаниновымъ, а отчасти и Прейномъ.

Высшій пунктъ этой мѣстности, — Мунку-Сардыкъ ( $11.234'$  н. ур. ок.), служитъ лучшею исходною точкою для общаго ея обозрѣнія. Увѣчанная вѣчнымъ снѣгомъ вершина этого горнаго массива находится уже въ предѣлахъ Монгольской территоріи и располагается около сѣвернаго берега озера Косогола, приблизительно подъ  $51^{\circ}40'$  с. ш. и  $1^{\circ}07'$  в. д., обнаруживая къ западу ясную связь съ знакомою намъ уже частью Саяна (Эргикъ-Таргакъ-Тайга), образуящую водораздѣлъ между верховьями Енисея и системою лѣвыхъ притоковъ р. Ангары или Верхней Тунгуски точно также, какъ самъ Мунку-Сардыкъ отдѣляетъ воды послѣдней отъ притоковъ верхняго теченія р. Селенги, впадающей въ оз. Байкаль. Выступъ Мунку-Сардыка къ с. въ русскіе предѣлы, питающій на своихъ склонахъ истоки рр. Иркуты и Оки, извѣстенъ подъ именемъ Нуху-дабана.

Альпійская зона этого Нуху-дабана до самой снѣжной линіи хорошо изслѣдована была въ ботаническомъ отношеніи Турчаниновымъ. Турчаниновъ посѣтилъ склоны Нуху-дабана въ 1830 г., пробираясь съ верховьевъ Иркутка на верховья р. Оки. Ботаническіе результаты всѣхъ его многолѣтнихъ изслѣдованій, какъ въ разсматриваемой нами здѣсь части Саянскаго хребта, такъ и въ Прибайкальѣ и Забайкальской области, изложены въ его *Flora baicalensi-dahurica*, печатавшейся въ теченіи 15 лѣтъ, начиная съ 1842 по 1856 г. въ *Bulletin de la Soc. Imp. des naturalistes de Moscou*. Извлекая изъ этого прекраснаго сочиненія всѣ данныя, касающіяся растительности Нуху-дабана, мы получаемъ полное представленіе объ интересной высоко-альпійской флорѣ, образующей роскошные альпійскіе луга этой мѣстности за предѣлами лѣсной растительности до предѣловъ вѣчныхъ снѣговъ. Нѣкоторые изъ представителей альпійской зоны Нуху-дабана принадлежать къ растеніямъ, распространеннымъ въ арктической зонѣ какъ Старога, такъ и Новаго Свѣта, а въ умѣренной зонѣ появляющимся только на высокіхъ альпахъ. Сюда относятся: *Ranunculus hyperboreus* Rottb., *Papaver alpinum* L., *Draba Wahlenbergii* Hartm., *Eutrema Edwardsii* R. Br., *Alsine verna* Bartl., *Alsine biflora* L., *Saxifraga flagellaris* W., *Valeriana capitata* Pall., *Erigeron uniflorus* L., *Pedicularis verticillata* L., *Salix reticulata* L., *Avena subspicata* Clairv.

Другіе принадлежать къ растеніямъ, появляющимся на высокіхъ альпахъ Сибири изъ арктической зоны Старога Свѣта, т. е. съ с.-з. и с. Сюда принадлежатъ: *Braya rosea* Bge., *Pinguicula alpina* L., *Gentiana frigida* Haenk. var. *algida* Pall., *Eritrichium villosum* A. DC., *Gymnandra Pallasii* Cham., *Salix herbacea* L. и *Allosorus Stelleri* Rupr.

Третьи общи высокимъ альпамъ Сибири съ арктическою зоною Восточной Сибири и Новаго Свѣта, т. е. пришли бы съ с. и с.-в. Сюда относятся: *Cardamine lenensis* Andr., *Stellaria longipes* Goldie., *Potentilla biflora* W., *Gentiana*

*prostrata* Haenk., *Polemonium pulchellum* Bge., *Tofieldia coccinea* Rich.

Четвертые принадлежать преимущественно альпійской зонѣ Саянско-Алтайской горной системы, при чемъ однако-же нѣкоторыя изъ этихъ растений появляются и въ альпійской зонѣ другихъ высшихъ азіатскихъ хребтовъ, какъ напр. въ обоихъ Алатау, на Тянь-шанѣ и даже иногда на Кавказѣ, а съ другой стороны иногда и на Становомъ хребтѣ. Къ этой категоріи относятся: *Ranunculus natans* C. A. Mey., *Isopyrum grandiflorum* Fisch., *Macropodium nivale* R. Br., *Draba ochroleuca* Bge., *Draba dasycarpa* C. A. Mey., *Holargidium Kuznezowi* Turcz., *Arenaria formosa* Fisch., *Astragalus phacaeformis* Bge., *Oxytropis filiformis* DC., *Potentilla gelida* C. A. Mey. (попадаетъ и на Кавказѣ), *Saxifraga melaleuca* Fisch., *Aster flaccidus* Bge., *Taraxacum glabrum* DC., *Osmothamnus (Azalea) pallidus* DC., *Rhododendron chrysanthum* Pall. (попадаетъ въ Становомъ хребтѣ и Камчатскихъ альпахъ до Беринговыхъ острововъ), *Rh. dahuricum* L., *Gentiana falcata* Turcz., *G. azurea* Bge., *Pedicularis compacta* Steph., *Juniperus pseudosabina* Fisch. et Mey., *Elyna sibirica* Turcz.

Наконецъ къ пятой категоріи, т. е. къ мѣстнымъ альпійскимъ растениямъ около-байкальской флоры относятся: *Draba mongolica* Turcz., *Braya versicolor* Turcz., *Hutchinsia asplenifolia* Turcz., *Stellaria umbellata* Turcz., *Chrysosplenium petatum* Turcz., *Cnidium multicaule* Led., *Saussurea squarrosa* Turcz. (вѣроятно мѣстное альпійское видоизмѣненіе сибирской *salicifoliae* DC.), *Rhododendron parvifolium* Ad., *Dracosephalum fragile* Turcz., *Platanthera oligantha* Turcz.

Возвращаясь къ орографическому строенію Саянскаго хребта по обѣимъ сторонамъ альпійской группы Мунку-Сардыка и Нуху-дабана, мы замѣчаемъ, что на востокъ отъ этого кулиминаціоннаго пункта, хотя альпійское сложеніе мгновенно прекращается, тѣмъ не менѣе хребетъ, какъ непосредственное продолженіе тойже орографической единицы,

гается въ восточномъ направленіи къ югозападной оконечности Байкала, переходя въ юго-восточный берегъ его долины. Въ различныхъ своихъ частяхъ на этомъ протяженіи извѣстный вѣрдоко подь различными названіями (общее названіе Урянклинскій хребетъ, т. е. южный, отъ бурятскаго слова *уриан*, ему присвоено лишь жителями средней части р. Иркутъ) хребетъ этотъ признанъ всѣми позднѣйшими путешественниками непосредственнымъ продолженіемъ Саяна (Бропоткинъ, Поляковъ, Ровинскій, Чекановскій, Черскій).

Въ разстояніи около сорока верстъ къ сѣверу отъ него располагается другая, параллельная ему, высокая (до 8.000') живописная альпійская цѣпь, понижающаяся въ свою очередь къ востоку, но теряющая альпійское сложеніе лишь около 121° з. д.; пересѣкаясь въ 22 верстахъ отъ Байкала ущелистою долиною р. Иркутъ, цѣпь эта извѣстна въ своей западной (альпійской) части подь названіемъ Тункинскихъ альповъ или гольцовъ (Хойшинскій хребетъ у жителей по Иркуту, отъ слова *хойми*, т. е. сѣверъ) и сливается непосредственно съ горами, образующими сѣверо-западный берегъ Байкальской долины. Наконецъ третья параллельная цѣпь, точно также альпійская, мѣстами превышающая даже Тункинскую, поддерживается вообще 52° с. ш.; это такъ называемыя Китойскіе альпы, достигающія около 10.000' н. ок. Къ востоку, гдѣ она понижается и снабжена тупыми и поросшими гѣсомъ вершинами, цѣпь эта пересѣкается нижними теченіями рр. Китоя и Иркутъ, а далѣе, въ самомъ низкомъ ея мѣстѣ, и долиною р. Ангарты, на востокъ отъ которой она является уже въ видѣ такъ называемаго Онотскаго гребта. Кромѣ трехъ названныхъ параллельныхъ цѣпей нѣтъ, какъ мы увидимъ ниже, указанія на существованіе еще четвертой, болѣе сѣверной короткой цѣпи, расположенной между 52°20' и 52°42' с. ш. и теряющейся въ нижней части теченія р. Китоя, не достигая р. Ангарты, при чемъ, быть можетъ, что къ сѣверному ея подножію примы-



каетъ еще пятая, самая низкая цѣпь горъ, играющая уже роль предгорья интересующей насъ мѣстности.

Что же касается западнаго продолженія перечисленныхъ цѣпей и отношенія ихъ къ Саяну тамъ, гдѣ онъ, подъ названіемъ Эргикъ-Таргакъ-Тайга, отличается вообще сѣверо-западнымъ направленіемъ, то долина р. Оки, омывая его сѣверо-восточное подножіе почти до  $117^{\circ}$  в. д., откуда она поворачиваетъ уже къ сѣверо-востоку, пролегаетъ по мѣсту соединенія болѣе сѣверныхъ цѣпей съ Саяномъ, пересѣкая развѣ одну изъ самыхъ передовыхъ, между тѣмъ какъ Тункинскіе альпы отдѣляются отъ него почти на меридіанѣ Мунку-Сардыка, нѣсколько южнѣе смежныхъ съ Окою верховьевъ р. Иркутъа. Эта послѣдняя рѣка, питаемая однимъ изъ своихъ верховьевъ (Черный или Ильчирный Иркутъ) также въ промежуткѣ между Тункинскими и Китойскими альпами, протекаетъ сначала вообще на юго-востокъ и входитъ въ широкую долину, расположенную между Саяномъ и Тункинскими альпами, принимая восточное направленіе къ Байкалу, но, въ разстояніи 22 верстъ отъ его юго-западной оконечности, поворачиваетъ по ущелистой долинѣ къ сѣверо-востоку, пересѣкаетъ двѣ упомянутыя выше цѣпи и изливается въ Ангару съ лѣвой стороны около г. Иркутска ( $52^{\circ}16'20''$  с. ш. и  $121^{\circ}55'58''$  в. д.). Весьма близко отъ озера Ильчира, дающаго начало Черному Иркуту, располагаются и верховья р. Китой, верхняя половина котораго, протекающая между Тункинскими и Китойскими альпами, слѣдуетъ почти восточному направленію, тогда какъ нижняя часть его поворачиваетъ къ сѣверо-востоку, впадая въ Ангару приблизительно подъ  $52^{\circ}30'$  с. ш. Наконецъ на сѣверъ отъ  $52^{\circ}$  широты и почти съ  $118$  меридіана начинается система р. Бѣлой, омывающей интересующую насъ мѣстность съ сѣверной стороны, отдѣляя ее отъ плоскогорья. Верховья этой рѣки извѣстны до сихъ поръ лишь по распросамъ и должны располагаться приблизительно подъ  $52^{\circ}30'$  с. ш. и  $118^{\circ}$  в. д., вблизи отъ

источниковъ одного изъ правыхъ притоковъ верхняго теченія р. Оки (Сорока), откуда Бѣлая постепенно и дугобразно поворачиваетъ къ сѣверо-востоку, послѣ чего, начиная съ  $118^{\circ}50'$  (приблизительно), придерживается уже восточнаго направленія и  $52^{\circ}50'$  с. ш. до впаденія въ Ангарту съ лѣвой же стороны. Рѣка Бѣлая отличается сравнительно весьма длинными двумя правыми притоками, система которыхъ беретъ начало на сѣверномъ склонѣ Китойскихъ альповъ; они пересѣкаются вообще въ діагональномъ направленіи (съ с. з. на с. в.) цѣпи, лежація сѣвернѣе послѣднихъ. Верхній изъ этихъ притоковъ—р. Урикъ, образуется (считая съ з. на в.) изъ Шигны, Ханшина, Хорка (берущаго начало около одного изъ правыхъ притоковъ Чернаго Иркута) и Даялка; нижній—р. Онотъ, несправедливо уступаетъ названіе своему болѣе короткому правому притоку, именуемому Малою Бѣлою; верхнее теченіе Онота, начиная съ его верховьевъ на мышемъ пунктѣ Китойскихъ альповъ (Мунку-Саганъ-Хардикъ или Оспинскій голецъ около 10.000') извѣстно подъ названіемъ р. Оспы.

Такимъ образомъ рѣки, орошающія изучаемый нами отрѣзокъ нагорья, представляютъ ту особенность, что главные изъ нихъ берутъ начало въ весьма близкомъ другъ отъ друга разстояніи, какъ бы изъ одного центра, отъ котораго онѣ расходятся сначала почти лучевидно (къ с. и с.-з. Бѣлая, сѣвернѣе Хорокъ, къ югу Иркутъ, къ востоку Китой, а къ з. Ока), послѣ чего, за исключеніемъ р. Оки, всѣ онѣ принимаютъ вообще параллельное направленіе къ востоку, гдѣ, наконецъ, низовья ихъ опять нѣсколько сближаются другъ съ другомъ, вслѣдствіе чего вся мѣстность, въ границахъ теченій рр. Бѣлой и Иркута, приближается по очертанію къ эллипсу, замыкаемому съ запада верхнимъ теченіемъ р. Оки, а съ востока Ангарию.

Ближайшее разсмотрѣніе мѣстности мы начнемъ съ долины

р. Оки, прослѣдивъ ее постепенно отъ верховьевъ до выхода ея изъ горъ на плоскую возвышенность.

### **I. Долина р. Оки отъ верховьевъ до села Зиминскаго.**

Вся эта часть теченія Оки пройдена Кропоткинымъ <sup>1)</sup>, тогда какъ верхнюю часть, отъ верховьевъ до Окинскаго пограничнаго караула (52°41'45" с. ш. и 117°14' в. д.) изучали кромѣ того Турчаниновъ (см. выше), Крыжинъ <sup>2)</sup>, Радде <sup>3)</sup> и Ровинскій <sup>4)</sup>, отъ которыхъ мы и заимствуемъ нижеслѣдующія свѣдѣнія.

Верховье р. Оки располагается приблизительно подъ 51°54' с. ш. и 118°9' в. д. на высотѣ 6.400' надъ уровнемъ океана <sup>5)</sup>. Это небольшое озеро, около 1½ верстъ длины и ½ версты ширины, называемое Окинскимъ или Охой-норъ и лежащее въ болотистой долині; съ южной стороны долина эта отдѣляется узкимъ, невысокимъ (216' надъ озеромъ, цифра средняя изъ опредѣленій Штубендорфа и Радде), болотистымъ и поросшимъ малорослою лиственницею (*Larix Ledebouri* Endl.) водораздѣломъ, за которымъ, на той-же высотѣ какъ и Окинское, располагается другое озеро (Сусерь-норъ) такихъ же размѣровъ, но принадлежащее уже системѣ р. Иркуты, отводящаго его воды въ противоположную сторону. Омываемые источники лежатъ

---

<sup>1)</sup> Кропоткинъ, Записки Сибирскаго Отдѣла И. Р. Географич. Общества. Т. IX и X. 1865 г.

<sup>2)</sup> Крыжинъ, Труды Сибирской экспедиціи И. Р. Географич. Общества. Математич. Отдѣлъ. 1864 г.

<sup>3)</sup> Радде, *Beiträge zur Kenntniss des Russischen Reiches etc.* v. Baer und Helmersen. В. XXIII. 1861.

<sup>4)</sup> Ровинскій, Извѣстія Сибирск. Отдѣла И. Р. Географич. Общества. Т. I, № 4—5. 1871 г.

<sup>5)</sup> Высоты взяты изъ Сборника высотъ П. Кропоткина: Записки И. Р. Географич. Общ. Т. III, (по Общей Географіи). 1873 г.

недалеко отъ сѣвернаго подножія гольца Нуху-дабана (7.270'), играющаго роль одного изъ звеньевъ, связывающихъ Тункинскія альпы съ Саяномъ (см. ниже).

Изъ озера Ока вытекаетъ по весьма узкой бороздкѣ, вблизи которой въ изобиліи произрастаетъ такъ называемый верблюжій хвостъ (*Caragana jubata* Poig.). Характерный этотъ кустарникъ соими длинными, прямыми, покрытыми сѣрою листвою и превышающими ее длиною крѣпкими иглами, и торчащими кверху стволами, которые напоминаютъ своею формою верблюжьи хвосты, придаетъ хотя и своеобразный, но довольно унылый видъ долини. Впрочемъ долина эта имѣетъ вполне альпійскую флору и хорошую горную траву, которою пользуются усталыя юнны путешественниковъ послѣ труднаго перехода съ долины Иркутъ черезъ Нуху-дабанъ. Вблизи находится и юрта, построенная около устья Верхняго Ишунъ (5.920'), въ которой путешественникъ спасается отъ дождей и нерѣдкихъ здѣсь бурь. Верхній Ишунъ представляетъ собою первый, сравнительно довольно многоводный и длинный (до 20 верстъ), правый притокъ Оки, берущій начало на южномъ склонѣ горы Илтѣй-дабанъ (у Радде неправильно Ультуй), принадлежащей уже Китайской цѣпи гольцовъ. Ниже впаденія этой рѣчки Ока расширяется уже до 2 саж., протекая въ болотистой долини среди большихъ и довольно толстыхъ (до 2 ф. въ іюнѣ м-цѣ) площадей льда (такъ называемые накин или наледы), тающаго лишь въ половинѣ августа. Путь (тропа) пролегаетъ по правому берегу рѣки и, избѣгая болотъ, ведетъ по мѣстности, частью поросшей мхомъ и малорослою еще лиственницею, частью по каменистымъ буграмъ, пересѣкая многіе притоки Оки, какъ-то: Средній и Нижній Ишунъ, дагѣ Шулү-курда, ниже которой съ лѣвой стороны въ Оку впадаетъ длинная (болѣе 30 верстъ) и многоводная рѣчка Жехой, берущая начало изъ ледника сѣвернаго склона Мунку-Сардыка (см. ниже); вмѣстѣ съ знакомымъ намъ уже Верхнимъ Ишуномъ, Жехой составляетъ главнѣйшія артеріи,

питающія верховья Оки. Ниже Шулу-Курга, начиная съ которой мѣстность дѣлается уже менѣе мрачною, путешественникъ пересѣкаетъ еще рѣчки: Ихѣ-горхонъ, Талую, Харѣ или Харъ (иногда Харотъ) и наконецъ Гарганъ, вблизи котораго построены на Окѣ Норинъ-Хоройскій караулъ, иначе называемый Гарганъ, на весьма правильномъ овальномъ возвышеніи, поднимающемся на 150' надъ гладкимъ дномъ долины и состоящимъ изъ гальки и гравія. Высота мѣста оказывается 5.050' надъ океаномъ. Не смотря на то, что караулъ этотъ отстоитъ лишь всего въ 35 верстахъ отъ Окинскаго озера, ширина Оки достигаетъ здѣсь уже около 60 саж. (Кропоткинъ), и въ высокую воду черезъ нее не бываетъ бродовъ. Долина рѣки въ свою очередь расширяется здѣсь до 2 и 2½ верстъ, послѣ чего, въ 4-хъ верстахъ ниже караула рѣка вступаетъ въ ущелье (Кропоткинъ), соответствующее западному продолженію упомянутаго выше Ильтэй-дабана, т. е. Китайскихъ альпъ <sup>1)</sup>, пересѣкаемыхъ здѣсь Окою на мѣстѣ соединенія ихъ съ Саяномъ. Окрестности караула и сосѣднія долины изобилуютъ травой и обитаемы Бурятами — скотоводами; въ числѣ древесной растительности произрастаетъ здѣсь и бѣлая береза (*Betula alba* L.), появляющаяся впервые еще въ 15 верстахъ выше караула, на высотѣ 5.500' н. ок.

Постройки караула въ 1859-г. Радде нашелъ обветшалыми и угрожающими паденіемъ. Въмѣсто прежнихъ 20 человекъ въ это время посылались на такіе посты только по 4 казака, обязанность которыхъ ограничивалась почти однимъ лишь обмѣномъ такъ называемыхъ *смыловыхъ досчечекъ*. Формальность эта состоитъ въ томъ, что каждый постъ имѣетъ деревянную досчечку въ 2½ вершка длины и 1 верш. ширины, окрашенную въ красный цвѣтъ и снабженную монгольскими или маньчжурскими надписями. Досчечка эта рас-

---

<sup>1)</sup> Черскій. Рукописныя замѣтки о Сибири.

наблюдается на двѣ части, изъ которыхъ одна хранится въ русскомъ караулѣ, а другая въ ближайшемъ къ нему монгольскомъ. Въ первыхъ числахъ іюня двое изъ казаковъ съ каждымъ изъ нашихъ карауловъ отправляются въ сосѣдній монгольскій постъ, захвативъ съ собою хранимую ими часть стѣновой досечки, служащую имъ въ этомъ случаѣ и паспортомъ. Монголы встрѣчаютъ ихъ съ другою половиною досечки, которая сейчасъ-же прикладывается къ привезенной изъ-за границы. Если при этомъ неровности раскола досечки хорошо соотвѣтствуютъ другъ другу, то это служитъ по мнѣнію монголовъ доказательствомъ сохраняющихся хорошихъ отношеній между сосѣдними державами; сложенною такимъ образомъ досечкою они прикасаются сначала ко лбу, а затѣмъ къ лѣвому плечу, говоря: *цананъ-хане атанабей*, что значитъ: охрани насъ Бѣлый Царь. Послѣ такихъ обрядностей сложенная досечка укладывается на приличное мѣсто, тогда какъ казаки, отведенные въ особую юрту, пируютъ и потѣшаются въ теченіе трехъ дней, на что со стороны монголовъ дается три барана. На третій день монголы передаютъ казакамъ уже ту половину досечки, которая до пріѣзда послѣднихъ сохранялась на монгольской территоріи, оставляя себѣ привезенную съ русского караула, послѣ чего казаки собираются въ обратный путь. Такой-же обмѣнъ досечекъ, но уже по инициативѣ монгольской пограничной стражи, производится на русскихъ караулахъ въ первыхъ числахъ сентября, причемъ пріѣхавшимъ монголамъ предлагается приличное угощеніе; вмѣстѣ съ тѣмъ обмѣниваются нередко и привозимые ими нѣкоторые товары. Вообще отношенія двухъ пограничныхъ народовъ отличается теперь дружелюбіемъ, устранившимъ и многія практиковавшіяся прежде формальности и строгости при переходѣ границы на непродолжительное время, тогда какъ въ отношеніи къ Урянхайцамъ и Дархатамъ монголы принимаютъ иногда такіа строгія мѣры, что изъ табуна, перешедшаго за границу, удержи-

вается ими третья часть, и лишь остальные двѣ трети возвращаются ихъ владѣльцамъ <sup>1)</sup>.

О геогностическомъ строеніи описаннаго отрѣзка долины р. Оки находимъ краткія свѣдѣнія у Кропоткина <sup>2)</sup>. На этомъ пути онъ встрѣчалъ сначала сіенитъ и гранитъ, а ниже известняки какъ метаморфизованные, такъ и сохранившіе отчасти свой первоначальный видъ. Паденіе пластовъ болѣею частью по направленію теченія Оки. Ниже верхняго Ишуна Кропоткинъ упоминаетъ о мощныхъ накопленіяхъ валуновъ, гальки и конгломератовъ, возвышающихся до 100' надъ современнымъ уровнемъ рѣки, — обстоятельство, свидѣтельствующее о высокомъ стояніи ея водъ въ прежнее время. Известняки образуютъ собою и упомянутое выше ущелистое суженіе долины ниже караула. Судя по залеганію наносовъ въ Норинъ-Хоройскомъ расширеніи, можно полагать, что тамъ было нѣкогда значительное альпійское озеро.

Около караула, съ лѣвой стороны, впадаетъ въ Оку рч. Норинъ-харе, отъ которой постъ получилъ одно изъ своихъ названій, а нѣсколько ниже, съ той-же стороны, располагается устье рч. Букусунъ, или Буксунъ, весьма многоводной и длинной (слишкомъ 50 верстъ), образующейся изъ 44-хъ источниковъ. Она беретъ начало въ гольцѣ Мунгульдабанъ и служитъ однимъ изъ лучшихъ скотопрогонныхъ путей черезъ Эргікъ-Таргакъ (т. е. Саянъ); на плоской и широкой вершинѣ Мунгульдабана располагаются два озера, носящія тоже названіе. Нѣсколько западнѣе верховьевъ Букусуна располагается ключъ Мунгуль, притокъ р. Дибн, впадающей въ Оку около 80 верстъ ниже Букусуна (см. ниже); на этомъ ключѣ разрабатывались прежде золотоносныя россыпи, принадлежавшія иркутскому купцу Шагаеву. Штубендорфъ, посѣщавшій рч. Букусунъ (см. Радде, стр. 69),

---

<sup>1)</sup> Радде, I. с. pag. 135.

<sup>2)</sup> Кропоткинъ, I. с. pag. 38—39.

стрѣчалъ по ней: сѣрый плотный известнякъ съ бѣлымъ известковымъ шпатомъ, красный известнякъ, а выше по теченію—діоритъ. По Букусуну прошелъ въ 1873 г. и Роинскій, слѣдуя на верховья Енисея (дополненія къ III-му тому, стр. 649 и слѣд.). Ниже устья Букусунъ, въ 9 верстахъ отъ караула, располагается устье рч. Каштакъ, праваго притока Оки, по которому пролегаетъ самая удобная дорога къ Алиберовскому графитовому руднику и Ботуголѣ, въ горахъ, лежащихъ на востокъ отъ Оки, сѣвернѣе Китойскихъ альповъ (см. ниже) или на ихъ сѣверномъ склонѣ. Довольно широкая долина Каштака простирается около сѣвернаго склона отрога, слѣдующаго на западъ къ Окѣ, и стѣсняющаго долину послѣдней съ правой стороны; на южнѣе же склонѣ того-же отрога беретъ начало упомянутый выше Гарганъ. Нѣсколько суженный около устья, Каштакъ уланъ въ низовьяхъ представителями прекрасной южно-сибирской флоры, какъ напримѣръ: *Anemone narcissiflora* L., *Iris asiaticus* L., *Delphinium cheilanthum* Fisch. и аконитами (*A. lycostomum* L., *A. barbatum* Patr., *A. Gmelini* Rch.) и т. п.; между тѣмъ берега здѣсь уже исчезаютъ. Великолѣнные луга и хорошіе, хотя почти не эксплуатирующіеся сѣнокосы тянутся еще и по средней части длины долины, но далѣе растительность становится бѣднѣе, а путешествіе затрудняется болотами, а затѣмъ и каменистостью почвы, поросшей оленьимъ мохомъ и черными или сѣрыми лишаями. Начало свое рѣчка беретъ изъ озера, небѣднаго рыбою, расположеннаго нѣсколько западнѣе группы озеръ, извѣстныхъ подъ названіемъ Газыра-Аманъ (см. ниже), вблизи которыхъ путь ведетъ къ упомянутому выше руднику.

Такъ какъ путешественники, слѣдовавшіе внизъ по Окѣ, обыкновенно заѣзжали на этотъ графитовый пріискъ и отсюда, какъ напр. Кропоткинъ, выѣзжали болѣе близкимъ путемъ къ этой рѣкѣ, ниже по ея теченію, то поэтому небольшая часть долины Оки, въ промежуткѣ между Каштакомъ и устьемъ



р. Сороки (версть съ 30), остается извѣстною лишь по съемкѣ. Сорока, впадающая въ Оку, съ правой стороны, собираетъ свои воды съ водораздѣла между Окою и верховьями р. Бѣлой; съ лѣвой стороны, въ  $2\frac{1}{2}$  верстахъ отъ устья, она принимаетъ рч. Тустуку, по которой Кропоткинъ спускался, возвращаясь съ пріиска на Оку. Съ высоты 7171' н. ок. путешественникъ перешелъ съ большимъ трудомъ въ долину Тустука по склону, засыпанному обломками хлоритоваго сланца, пласты котораго падаютъ отвѣсно къ этой долинѣ; но дорога, затруднительная въ верховьяхъ рѣчки, дѣлается довольно удобною ниже по ея теченію, гдѣ её часто посѣщаютъ промышленники вслѣдствіе обилія изюбровъ (*Cervus elaphus*), сернь и бѣлки. Хлоритовый сланецъ продолжается версть на 15 внизъ по Тустуку, текущему очень медленно по весьма пологой плоскости; долина его расширяется до  $1\frac{1}{2}$  версты и болѣе и только вблизи впаденія ея въ Сороку спирается горами.

Вмѣстѣ съ вступленіемъ въ долину р. Оки путешественнику сейчасъ же бросается появленіе бѣлой березы, отсутствующей по Тустуку и по низовьямъ Сороки, вслѣдъ за устьемъ которой обнажаются разрушающіеся граниты, распавшіеся на громадныя глыбы въ нѣсколько десятковъ кубич. метровъ, лежащія на болотистыхъ прибрежіяхъ Оки, поросшихъ листовницей. Но, пройдя версть 10, Кропоткинъ вошелъ въ область известняковъ, развитыхъ почти до самаго Окинскаго караула (см. ниже); сѣрые, крутые утесы, превращающіеся мѣстами въ розсыпи, вершины горъ, украшенныя башневидными скалами въ готическомъ стилѣ, придаютъ особый колоритъ мѣстности. Но скоро скаты горъ становятся положе, теченіе рѣчки менѣе быстро, берега становятся ровными и покрыты наносами и на берегахъ этихъ, почти вслѣдъ за исчезновеніемъ гранитовъ, появляется бурятское населеніе. Далѣе за рч. Ха-ра-гу-жиръ, въ долинѣ которой находятся обнаженія коричневаго глинистаго сланца, на поверхность еще разъ выходятъ граниты, вмѣстѣ съ чѣмъ исчезаютъ и бурятскія юрты, чтобы

онять появиться затѣмъ среди пологихъ холмовъ известняка, выступающаго и по берегамъ трехъ значительныхъ лѣвыхъ притоковъ Оки, текущихъ съ Саяна. Притоки эти: Дибби, берущая начало недалеко отъ упомянутаго выше Мунгуль-дзана, Тесса или Тисса, многочисленные истоки которой отдѣляются главнымъ гребнемъ Эргикъ-Таргакъ-Тайга отъ истоковъ Бейкема (одной изъ главныхъ вѣтвей верхняго Енисея) и Сенца, по которой Крыжинъ переходилъ на систему верховьевъ р. Енисея <sup>1)</sup>. Противъ устья Тиссы, она въ послѣдній разъ пробивается сквозь граниты и затѣмъ тихо течетъ въ руслѣ среди наносовъ, выполняющихъ ея долину; ниже устья Сенцы между горами показывается площадь до 10 верстъ въ длину и 5 верстъ въ ширину. На ней расположенъ Окинскій караулъ (52°41'45" с. ш. и 117°14' в. д.) на высотѣ 3.860' н. ок.

Постъ этотъ точно также состоитъ нынѣ изъ ветхой казармы, окруженной развалившимся частоколомъ, амбара и часовни. Кромѣ обязательнаго русскаго населенія, состоящаго изъ 4-хъ казаковъ, здѣсь есть еще и двѣ семьи поселившіяся нѣсколько десятковъ лѣтъ тому назадъ. Свободное и удобное земледѣльство, возможность торговать съ бурятами, вымѣнивая мясо и скотъ на привозные русскіе товары, были причиною того, что здѣсь нѣкогда осталось жить нѣсколько казаковъ, и теперь потомки ихъ, хотя и не находятъ прежнихъ выгодъ, остаются здѣсь жить уже по привычкѣ. Климатъ здѣсь уже слишкомъ неблагопріятенъ для хлѣбопашества, а потому хлѣбъ привозится сюда обыкновенно съ средней части теченія Иркутъ, называемой Тункинскимъ краемъ, отъ расположеннаго въ селѣ Тунки, бывшей пограничной крѣпости (см. ниже). Крѣпость высокаго положенія надъ уровнемъ океана (3860') здѣсь играютъ, быть можетъ, самую важную роль неблагопріятныя земледѣлю мѣстныя условія: съ высокихъ горъ, виднѣю-

<sup>1)</sup> Крыжинъ, Труды Сиб. Экспед. I. с.

щихся на с. и с.-в. отъ караула, — гольцовъ, покрытыхъ снѣгомъ даже въ первой половинѣ іюня, почти постоянно дуютъ порывистые с.-с.-в. вѣтры до того холодные, что въ первыхъ числахъ іюня по вечерамъ приходится надѣвать шубы; кромѣ того въ горахъ этихъ постоянно скопляются тучи, разражающіяся тамъ снѣгомъ даже въ іюнѣ, проносясь надъ карауломъ съ крупнымъ дождемъ. За то окрестности поста, какъ равно и низовья ближайшихъ долинъ (Тиссы, Сенцы и Джунбулака), представляютъ хорошія условія для скотоводства и кочевой жизни, вслѣдствіе чего здѣсь насчитываютъ до 300 дунѣ бурятъ, (изъ которыхъ болѣе зажиточные содержатъ до 50 — 60 головъ рогатаго скота), тогда какъ верхнія части тѣхъ же долинъ посѣщаются звѣроловами Карагасами. Къ тому же найдены Кропоткинымъ памятники, свидѣтельствующіе, что здѣсь было населеніе и въ очень отдаленныя времена. Слѣды эти состоятъ какъ въ древнихъ надписяхъ на утесахъ, такъ и въ остаткахъ построекъ. Надписи замѣчены на известковомъ утесѣ, известномъ подъ названіемъ Монгольжйна, лежащемъ на пути отъ караула къ долинѣ рч. Джунбулакъ, впадающей въ Оку съ лѣвой стороны, въ 4-хъ верстахъ ниже поста (см. ниже); онѣ сдѣланы красною краскою и имѣютъ видъ ряда отвѣсно стоящихъ, миндалевидныхъ фигуръ, обращенныхъ острымъ концомъ книзу, съ точкою въ серединѣ и поперечною, горизонтальною чертою въ верхней трети миндалина. Ломоносовъ <sup>1)</sup>, изслѣдовавшій краску этихъ надписей, глубоко проникшую въ известнякъ, пришелъ къ заключенію, что желѣзная соль должна была смѣшиваться въ этомъ случаѣ съ какимъ либо жирнымъ веществомъ. Что же касается построекъ, то они состоятъ изъ кучъ булыжника, расположенныхъ по окружности правильнаго круга или овала на луговой равнинѣ Оки, и, по мнѣнію открывшаго ихъ

---

<sup>1)</sup> Ломоносовъ, Зап. Сиб. Отд. И. Р. Геогр. Общ. Т. IX и X. стр. 599.

Бропоткина, представляют собою остатки каких-то низких, конических сооружений, сложенных из камня; внутри их образовался уже слой чернозема, и все заросло травой, но камни носят на себѣ явные слѣды копоты, насѣвшей отъ огня. Объ этихъ постройкахъ носится преданіе, очень распространенное въ Сибири среди русскаго населенія, что гдѣ-то жила здѣсь «чудь» и проживала до того времени, пока мѣсть не стала появляться здѣсь въ горахъ бѣлая береза, не существовавшая здѣсь прежде; чудь сочла это за дурной признакъ и удалилась. Между тѣмъ само названіе плеса (Монгольшинъ) указываетъ, по мнѣнію Черскаго <sup>1)</sup>, на то, что Окинскіе бураты приписываютъ надписи эти (а по всей вѣроятности и постройки) владычествовавшимъ здѣсь прежде Монголамъ, какъ это дѣлаютъ байкальскіе бураты относительно мѣстами нерѣдкихъ тамъ каменныхъ сооружений; постройки эти вообще имѣютъ видъ невысокихъ стѣнъ и валовъ какъ круглой, такъ и четырехугольной формы, типъ, къ которому, быть можетъ, отнесутся современемъ и Окинскія постройки. Такія же кучи камней найдены впослѣдствіи Ровинскимъ на правомъ берегу р. Оки, на первой террасѣ отъ р. Сенцы (Синцы), а также на второй и четвертой; кучи эти расположены кругами въ 1 сажень въ діаметрѣ и негдѣ, едва возвышались надъ поверхностью земли; раскопка показала подъ ними нетронутую землю <sup>2)</sup>.

Турчаниновъ не спускался по Окѣ ниже Окинскаго ка-раула, но зато верхняя часть долины Оки до этого пункта исследована имъ въ ботаническомъ отношеніи весьма обстоя-тельно. Флора Окинской долины представляетъ весьма суще-ственные различія съ одной стороны съ южно-сибирскою фло-рою окрестностей Иркутска, а съ другой съ альпійскою флорою

<sup>1)</sup> Черскій, Рукописныя Записки о Сибири.

<sup>2)</sup> Ровинскій, Изв. Сиб. Отд. И. Р. Геогр. Общ. Т. I, № 4 — 5. 1871 г.

Нуху-дабана. Есть конечно въ флорѣ верхне-окинской долины растенія и альпійской зоны, спускающіяся въ особенности вдоль теченія рѣчекъ, текущихъ съ Нуху-дабана и другихъ гольцовъ. Сюда относятся напримѣръ: *Draba frigida* Saut., *Valeriana capitata* Pall., *Erigeron uniflorus* L., *Allosorus Stelleri* Rupr. Но еще болѣе такихъ растеній, которыя будучи распространены въ сибирскихъ равнинахъ, поднимаются и въ высокія долины Саянскаго хребта. Сюда принадлежать напримѣръ: *Anemone narcissiflora* L., крестоцвѣтное растение — *Dontostemon integrifolius* Led., *Viola pinnata* L., *Spiraea chamaedrifolia* L. (этотъ видъ также водится и въ Европейской Россіи), *Potentilla multifida* L. var. *tenella* Turcz., *P. sericea* L., *Sedum hybridum* L., *Senecio campestris* DC. (водится и въ Европейской Россіи), *Orobanche amorphila* C. A. Mey., *Platanthera viridis* Lindl. (водится и въ Европейской Россіи).

Есть въ флорѣ Окинской долины виды полярной зоны всего сѣвернаго полушарія, какъ напр. *Potentilla nivea* L., есть и виды, принадлежащія полярной зонѣ Старога Свѣта, напримѣръ *Alsine biflora* Wahl. var. *occulta* Turcz., *Alsine stricta* Wahl., есть и общіе полярной зонѣ Сибири и Америки, какъ напримѣръ *Stellaria longipes* Goldie., *Potentilla pensylvanica* L. Но всего болѣе горныхъ, субальпійскихъ видовъ, преимущественно Алтайско-Саянской горной системы какъ напр. *Cerastium lithospermifolium* Fisch., *Astragalus laguroides* Pall., *Trifolium eximium* Steph., *Cotoneaster uniflora* Bge., *Ribes fragrans* Pall., *Saussurea pygmaea* Spr., *Swertia obtusa* Led., *Thesium refractum* C. A. Mey., *Salix Ledebouriana* Trautv. Наконецъ въ Окинской долинѣ есть и нѣсколько растеній, до сихъ поръ найденныхъ только въ субальпійской зонѣ байкало-даурской флоры, напримѣръ *Nasturtium densiflorum* Turcz., *Silene dasphylla* Turcz. (вѣроятно только мѣстное видоизмѣненіе *S. graminifoliae* Oth.), *Oxytropis filiformis* DC., *Umbilicus malacophyllus* DC., *Hansenia mongolica* Turcz., *Aster chrysocomoides* Turcz.

Всего менѣе свѣдѣній имѣлось до послѣдняго времени объ

интересной долины Тессы или Тиссы, посвященной впервые въ 1834 году молодымъ казакомъ Кузнецовымъ, котораго Турчанновъ послалъ въ Саянскій хребетъ для сбора растений, а въ 1836 г. еще и ботаникомъ Кириловымъ. Такъ какъ на изданной Императорскимъ Русскимъ Географическимъ обществомъ картѣ астронома Шварца бассейнъ рѣкъ Тиссы и Сенцы изображены весьма обстоятельно, то очевидно, что они были сняты сибирскою экспедиціею и что слѣдовательно на Тиссѣ былъ и топографъ Географическаго Общества, Крыжинъ. Верховья Тиссы лежатъ въ котловинѣ, окруженной гольцами или бѣлками (альпами). Ниже лежащаго въ этой котловинѣ горнаго озера, питаемаго главнымъ верховьемъ Тиссы, рѣка принимаетъ съ обѣихъ сторонъ нѣсколько горныхъ ручьевъ, текущихъ со сѣверныхъ гольцовъ. На одномъ (первомъ отъ озера и лѣвомъ) изъ этихъ притоковъ находился Тиссинскій дозоръ—строеніе, вѣроятно находящееся нынѣ въ развалинахъ. Обиліе притоковъ Тиссы вѣроятно облегчили ей возможность вытекать изъ котловины на сліяніе съ Окою. Судя по собраннымъ Кузнецовымъ и Кириловымъ растениямъ, флора окружающихъ котловину горъ носитъ альпійскій и отчасти субальпійскій характеръ, а самое Тиссинское озеро кажется намъ расположеннымъ на болѣе абсолютной высотѣ чѣмъ Окинское.

Изъ растений, собранныхъ по р. Тиссѣ и притоку ея Дагань-голу, одни принадлежатъ полярнымъ формамъ Стараго и Новаго Свѣта, какъ напр. *Draba Wahlenbergii* Hartm., *Saxifraga nivalis* L., *S. flagellaris* W., *Erigeron uniflorus* L., *Melandryum apetalum* Led., *Salix glauca* L., *Luzula spicata* DC., *Lycopodium selago* L.; другія—къ полярнымъ формамъ южнаго Стараго Свѣта: *Alsine verna* Bartl., *Epilobium alpinum* L., *Carex alpina* Sw. (var. *melanoccephala* Turcz.); третьи—къ альпійскимъ и субальпійскимъ растениямъ Алтайско-Саянской системы, какъ напр.: *Draba dasycarpa* C. A. Mey., *Parrya microcarpa* Led., *Cerastium lithospermifolium* Fisch., *Trifolium minimum* Steph., *Saxifraga muscoides* DC., *Aster chrysocomoides*

*Turcz.*, *Taraxacum glabrum* DC., *Campanula pilosa* Pall., *Carex obtusata* Liljebl. Наконецъ четвертыя — къ мѣстнымъ альпійскимъ растеніямъ около-байкальскихъ горъ, какъ напр.: *Delphinium cheilanthum* Fisch., *Silene chamarensis* Turcz., *Melandrium brachypetalum* Horn., *Saussurea congesta* Turcz., *Statice sibirica* Ledeb.

Распространеніе высоко-альпійской флоры по Тиссѣ и притоку ея Цаганъ-голу нашло себѣ полное объясненіе въ новѣйшихъ изслѣдованіяхъ Саянскаго хребта въ 1887 году экспедиціею подполковника Н. П. Бобыря, въ которой принимало участіе Императорское Русское Географическое Общество и Восточно-Сибирскій его отдѣлъ. Геологъ экспедиціи Ячевскій <sup>1)</sup> изъ долины Тиссы по притоку ея Цаганъ-голу переходилъ Саянскій хребетъ черезъ такъ называемый Восточный переваль, имѣющій 6960' н. ок., на вершину р. Тенгиза, праваго притока рѣки Шижикта, системы Енисея. Весьма обстоятельныя свѣдѣнія сообщаетъ Ячевскій объ одномъ изъ ледниковъ, принадлежащемъ бассейну р. Тиссы и спускающемуся къ низовьямъ Цаганъ-гола. Рѣка эта впадаетъ въ Тиссу съ правой стороны, немного ниже большаго Тиссинскаго озера. Ячевскій, въ сопровожденіи другаго члена экспедиціи Прейна, изъ долины Тиссы перешелъ въ долину Цаганъ-гола черезъ высокій мысъ, спирающій устье Цаганъ-гола въ Тиссу и заставляющій первую протекать на протяженіи 6 верстъ по узкому ущелью. Наивысшая точка тропы, по которой слѣдовали путешественники, поднимается надъ уровнемъ Тиссинскаго озера на 650'. Обернувшись назадъ, они увидѣли въ разстояніи 40—50 верстъ къ с.-з. высокій голецъ (альпъ), восточная сторона котораго была покрыта громаднѣмъ ледянымъ полемъ. Бурятскій проводникъ назвалъ

---

<sup>1)</sup> Ячевскій, Изв. Спб. Отд. И. Р. Геогр. Общ. Т. XIX, № 1, стр. 4, 9—14.

его Хара-Хардыкъ и сообщилъ, что онъ лежитъ между верховьями Тиссы и Сенцы, ближе къ послѣдней. Голецъ этотъ открылся передъ взоромъ путешественниковъ только на одну минуту; его сейчасъ же закрыли густыя облака; Ячевскій успѣлъ замѣтить только, что ледяное поле этого гольца не мѣтѣ ледяного поля сѣвернаго склона Мунку-сардыка. Съ того же гребня, на которомъ находились путешественники, они видѣли по направленію своего пути, т. е. на ю., другой голецъ, также съ мощными ледяными покровами; поднимаясь далѣе по Цаганъ-голу они видѣли съ праваго притока этой рѣки Гуджертай-гола тоже обширное ледяное поле.

Но до этихъ обширныхъ ледниковъ путешественники не добрались, а обследовали только самый нижній изъ ледниковъ, питающихъ воды Цаганъ-гола. Голецъ, съ котораго спускается этотъ ледникъ, Ячевскій назвалъ гольцомъ Миддендорфа; самый ледникъ получилъ имя того же знаменитаго изслѣдователя Сибири.

Изъ долины Тиссы видны только верхушки гребня гольца Миддендорфа, заключеннаго между правымъ берегомъ Тиссы и лѣвымъ Цаганъ-гола. Гребень этотъ начинается верстахъ въ 10 отъ слиянія Тиссы съ Цаганъ-голомъ и обрывается на крутомъ скатомъ къ долинѣ Цаганъ-гола. Видимая длина гребня отъ в. на з. версты двѣ, послѣ чего видъ на него закрывается на з. загроможденіемъ сосѣднихъ съ нимъ горъ. Въ общемъ голецъ Миддендорфа имѣетъ весьма рѣзкія очертанія особливо на восточной своей сторонѣ, которая выше западной. Отъ середины гольца по направленію къ з. широкою полосой залегаетъ фирновое поле, въ нижней части замкнутое контурами горъ перваго плана. На восточной сторонѣ гольца на крутой покатости, обращенной къ с.-в., находится второе ледяное поле значительно меньшихъ размѣровъ; съ первымъ полемъ оно не соединяется, довольно широко въ верхней своей части, а въ нижней переходитъ



въ тонкую ледяную струю. Отъ гольца Миддендорфа идутъ, повидимому, двѣ пади: одна изъ нихъ, узкое и глубокое ущелье, отъ восточной окраины гольца спускается въ Цаганъ-голу, другая отъ срединнаго ледянаго поля впадаетъ вѣроятно непосредственно въ Тиссу. Впрочемъ проводникъ путешественниковъ не могъ сообщить имъ объ этомъ положительныхъ свѣдѣній.

Въ сопровожденіи этого проводника-бурята Ячевскій и Прейнъ 24 іюля 1887 г. предприняли восхожденіе на самый ледникъ отъ устья Цаганъ-гола. Поднимались они по тому упомянутому выше ущелью, которое открывается въ долину Цаганъ-гола. Путешественники, дойдя до ледника, спускающагося въ это ущелье, имѣли намѣреніе подняться по нему, а потомъ, переваливъ черезъ гребень, спуститься на большой ледникъ. Но имъ удалась только первая половина предпріятія, и они осмотрѣли только ледникъ восточной части, сдѣлавъ его глазомѣрную съемку и барометрическую нивелировку.

Отъ Цаганъ-гола путешественники на лошадяхъ могли проѣхать только 200 саж., а далѣе уже шли пѣшкомъ по крутому скату праваго берега. Пройдя по этому скату 560 саж., они спустились на дно ущелья тамъ, гдѣ сливаются два ручья, стекающіе съ гольца Миддендорфа. Отъ сліянія ручьевъ поднимались по мысу, раздѣляющему оба ручья. Подъемъ очень крутой (отъ 40 до 50°), но кажется довольно пологимъ вслѣдствіе одного изъ тѣхъ оптическихъ обмановъ, которымъ подвергается постоянно наблюдатель въ горныхъ мѣстностяхъ, обладающихъ необыкновенно прозрачнымъ воздухомъ.

Слѣдовали по срединѣ сказаннаго довольно широкаго мыса на протяженіи 940 саж., далѣе по крутому подъему въ 90 саж. длины взошли на скалистый гребень, имѣющій, всего только менѣе 1 метра ширины; по гребню прошли 100 саж., а затѣмъ, спустившись по крутому спуску на протяженіи 50 саж., достигли ледяной струи. Это было на вы-

отъ 8000' н. ок. и около 2100' надъ уровнемъ Цаганъ-гола. Ледяная струя проходить здѣсь среди узкаго ущелья, стѣны котораго съ правой стороны поднимаются вертикально отъ 3 до 5 и даже болѣе метровъ и состоятъ изъ твердаго темно-сѣраго, иногда почти чернаго и весьма растресканнаго, метаморфическаго кремнисто-глинистаго сланца. На лѣвой сторонѣ крутизна нѣсколько менѣе, но все-таки достигаетъ 60°, и коренная порода въ значительной мѣрѣ покрыта осыпью.

Въ томъ мѣстѣ, гдѣ путешественники вышли на ледникъ, ширина ледяной струи 33 ф.; выше ледникъ суживается и на разстояніи 25 до 30 саж. не превосходитъ 3 метровъ шир., но выше опять расширяется и наконецъ переходитъ въ разнообразное фирновое поле, имѣющее весьма крутое паденіе. Длина этого фирноваго поля 250 до 300 метровъ, ширина въ верхней части 150 до 180 метровъ; съ лѣвой стороны вверхъ по теченію, параллельно главному полю, идетъ колоса фирна, сливающаяся съ главнымъ полемъ въ томъ мѣстѣ, гдѣ оно значительно суживается. Ниже того пункта, въ которомъ путешественники вышли на ледникъ, ледяная струя до крутаго поворота ледника вправо сохраняетъ около 10 метровъ ширины. Уклонъ ледника весьма значительный: на мѣстѣ, куда Ячевскій вышелъ на него, уклонъ этотъ 30°, но выше и ниже онъ еще больше. Полной толщины льда опредѣлить не удалось. На правой сторонѣ ледника ледъ въ двухъ мѣстахъ неплотно прилегаетъ къ горной породѣ; это происходитъ отъ того, что сланецъ, образующій этотъ берегъ, сильно нагревается лучами солнца, что способствуетъ таенію льда. Въ двухъ этихъ мѣстахъ между льдомъ и горной породой Ячевскій опредѣлилъ толщину льда отъ 2 до 5 метровъ, но при этомъ онъ конечно не достигалъ дна ледника. Поверхность льда довольно ровная, но у праваго берега нѣсколько выпуклая. Наружный слой состоитъ изъ крупнозернистой массы, но ниже слѣдуетъ сплошной прозрачный ледъ. Крупные обломки скалъ видѣлись

на льду только въ самомъ узкомъ мѣстѣ ледника, вся же поверхность его покрыта тонкимъ щебнемъ и пылью, придающимъ поверхности ледника грязно-сѣрый цвѣтъ.

О движеніи ледника Ячевскій не могъ вывести вѣрнаго заключенія, но полагаетъ, что движеніе это весьма слабо. Для того чтобы будущіе изслѣдователи могли придти къ какому-нибудь вѣрному по этому предмету заключенію, Ячевскій уложилъ поперегъ ледника 17 довольно большихъ камней. Нижній конецъ ледника Миддендорфа опускается до 7800' н. ов., т. е. на 2200' ниже чѣмъ на южномъ склонѣ Саяна.

Долины двухъ нижнихъ и значительныхъ притоковъ Оки, а именно Сенцы и Джунбулака, были посѣщены Кропоткинскимъ, который, поднявшись вверхъ по долинѣ Джунбулака (лѣв. притокъ Оки), перешелъ оттуда въ долину Сенцы и по ней вернулся въ Окинскій караулъ. Главный изъ двухъ рукавовъ устья Джунбулака, черезъ который бурятами перекинута мостъ, не шире 7—8 саж. и несется съ значительною быстротою въ Оку, не представляя впрочемъ ни каскадовъ, ни уступовъ; между тѣмъ второй, меньшій и высыхающій лѣтомъ рукавъ (до 28 ф. ширины въ наибольшую воду), низвергается водопадомъ въ 70—80 ф. высоты съ отвѣсной стѣны, состоящей изъ мощной толщи лавы. Водопадъ этотъ, бушующій весною, постоянно отступаетъ отъ Оки и въ настоящее время онъ промылъ себѣ оврагъ до 50 саж. длины, осмотръ котораго убѣждаетъ въ томъ, что прежде высота водопада около 10 ф. превышала современную его высоту. Объ этомъ именно водопадѣ, какъ равно и о существующихъ здѣсь недалеко другихъ, меньшихъ (напр. въ ручьѣ около  $\frac{3}{4}$  версты отъ Джунбулака, высотой до 15 ф.), сообщались въ 1864 г. въ газетѣ «Сѣверная Почта» (№ 103) свѣдѣнія, преувеличивавшія высоту ихъ паденія до 100 саженой.

Верста на 12 отъ устья, долина Джунбулака отличается замѣчательно прямолинейнымъ направленіемъ, врѣзываясь

въ почти отвѣсные склоны горъ, состоящихъ здѣсь изъ известняковъ, гранитовъ, гнейсовъ, а далѣе опять изъ крупнокристаллическаго известняка почти оранжеваго цвѣта, какъ въ верховьяхъ р. Иркутъ (см. ниже). Наносное дно долины покрыто прекрасными лугами съ разбросанными по нимъ бугорками; изъ подъ наноса выдаются бугры, состоящіе изъ лавы, потокъ которой образуетъ здѣсь подпочву; растущая на такихъ буграхъ лиственница помогаетъ накопленію плодороднаго чернозема на грунтѣ разлагающейся лавы; вѣли, между тѣмъ, виднѣются гольцы Саяна съ уцѣлѣвшими на нихъ еще полянами снѣга. Относительно этой части течения Джунбулака Кротокинъ дѣлаетъ небезынтересное предположеніе, могущее служить вопросомъ для будущихъ геологическихъ изслѣдованій этой долины. Онъ говоритъ, что на 12-й верстѣ отъ устья долина Джунбулака отдѣляется низкимъ, болотистымъ и узкимъ (до 6 верстъ) уваломъ съ сосѣдней къ югу р. Сенцы; судя по направленію этого увала и самого Джунбулака, который выше дѣлаетъ поворотъ на с.-з., можно думать, заключаетъ путешественникъ, что нѣкогда онъ впадалъ въ Сенцу и только въ послѣдствіи измѣнилъ свое русло, чтобы сдѣлаться самостоятельнымъ притокомъ Оки. Ближайшее ознакомленіе съ этою мѣстностью должно въ свою очередь имѣть въ виду и роль, какую долженъ былъ играть въ развитіи и преобразованіи этихъ долинъ лавовый потокъ, выполняющій дно современнаго Джунбулака, но не встрѣченный по р. Сенцѣ; вотъ почему, по замѣчанію Черскаго <sup>1)</sup>, будущимъ изслѣдователямъ можно еще поставить вопросъ, именно: не протекала ли прежде вода р. Сенцы по нынѣшнему нижнему теченію Джунбулака, бывшаго ея лѣвымъ притокомъ, и не застала ли её излившійся въ верховьяхъ послѣдняго потокъ воды уклониться къ югу и промыть себѣ новое, самостоя-

<sup>1)</sup> Черскій, Рукописныя замѣтки.

тельное русло, взаѣнъ прежняго, прегражденнаго и выполненнаго массою изверженной породы?

Выше того мѣста, гдѣ Джунбулакъ поворачиваетъ къ с.-з., долина его является уже въ видѣ сравнительно узкаго и дикаго ущелья, дно котораго все-таки выполнено лавою, тогда какъ почти отвѣсныя стѣны долины состоятъ изъ сѣроватыхъ и желтоватыхъ известняковъ, куски которыхъ, упавшіе съ сосѣднихъ высотъ, въ изобиліи покрываютъ лаву. Между ними оказались также разбросанными и громадные валуны желтоватаго гранита, поразившіе путешественника размѣрами, достигающими иногда  $2\frac{1}{2}$  саж. длины,  $1\frac{1}{2}$  саж. высоты и около 1 саж. толщины, и сохранившими острыя ребра, не взирая на то, что ближайшее коренное мѣсторожденіе этой породы встрѣчено имъ лишь въ 7—8 верстахъ выше по теченію, къ тому же съ весьма интересными особенностями такихъ выступовъ. Особенности эти состоятъ въ томъ, что вершины гранитныхъ горъ имѣютъ здѣсь чрезвычайно округленную форму и являются какъ бы гладко отполированными; но къ сожалѣнію взобраться на эти крутыя стѣны для поисковъ ледниковыхъ шрамовъ не было никакой возможности, а предпринять восхожденіе съ другой стороны требовало затраты времени, которымъ не могъ пользоваться въ достаточной степени путешественникъ. Такъ какъ однако ему удалось наблюдать достаточно ясное ледниковое изборожденіе при переѣздѣ съ верховьевъ Иркутка на Оку, именно на гольцѣ Нуху-дабанѣ (см. ниже), и этимъ доказать непризнававшееся до тѣхъ поръ распространеніе такъ называемаго ледниковаго періода на восточную Сибирь, то и явленіе округленности и изглаженности гранитныхъ вершинъ въ долинѣ Джунбулака Кропоткинъ приписываетъ дѣйствію древнихъ ледниковъ, имѣвшихъ прежде болѣе значительное распространеніе въ Саянѣ. Пройденная часть долины рѣчки отличается такою же прямолинейностью, какъ и нижняя, но крайняя дикость природы придаетъ ей совершенно другой характеръ, затрудняя

мѣстѣ съ тѣмъ и путешествіе; такъ продолжается до по-  
сѣднѣго поворота долины, гдѣ рѣчка принимаетъ ручей Бу-  
сакъ, мчащійся каскадами съ сосѣднихъ горъ, ворочая  
болшія глыбы гранитовъ, гнейсовъ и кристаллическихъ слан-  
цевъ. Непосредственно выше устья Бусака, на высотѣ 4970'  
н. ок., располагается сѣмменное озеро (Бусакъ-нуръ),  
изъ котораго вытекаетъ видимая часть Джунбулака, такъ  
какъ выше озера рѣчка дѣлается уже незамѣтною, проби-  
ваясь подъ лавовою корою. Длина озера достигаетъ  $1\frac{3}{4}$ ,  
а ширина болѣе 1 версты; недалеко отъ его береговъ не  
могли достать дна шестами отъ 6 до 9 метровъ длины.  
Долина поворачиваетъ здѣсь къ югу и потому даетъ дос-  
тупъ холоднымъ вѣтрамъ, дующимъ съ части Саяна, из-  
вѣстной здѣсь подъ именемъ хребта Шанъ, и потому  
она изобилуетъ болотами, оленьимъ мхомъ и брусникою.  
До озера Хара-нуръ <sup>1)</sup>, изъ котораго беретъ начало  
Джунбулакъ, оставалось лишь 15 верстъ и затѣмъ еще  
5 верстъ по рч. Шанъ, до водораздѣльной линіи Саяна,  
по Кропоткинъ направился отсюда вверхъ по долинѣ Хи-  
кушки, притока Джунбулака, чтобы осмотрѣть чашевидное  
углубленіе въ горѣ, о которомъ ему сообщали въ Окинскомъ  
караулѣ. Хикушка отличается такимъ же подземнымъ тече-  
ніемъ, какъ и часть Джунбулака выше Бусакъ-нура; горы,  
покрытыя снѣгомъ, не тающимъ все лѣто въ нѣкоторыхъ бо-  
родкахъ, состоятъ преимущественно изъ известняковъ, а дно  
долины изъ лавы, продолжающейся и на широкую площадку  
(въ 5 верстахъ выше устья), гдѣ съ двухъ противополож-  
ныхъ сторонъ сходятся два ручья, образующіе Хикушку:  
одинъ съ з.-с.-з., а другой съ ю.-ю.-в. (в.-ю.-в.?); русла обоихъ  
идутъ лавою. Кропоткинъ направился вверхъ по второму  
изъ названныхъ верховьевъ, и вскорѣ передъ нимъ, на вы-

---

<sup>1)</sup> Озеро это точно также окружено лавою, видимою и на Шанѣ,  
но не встрѣчающейся на южномъ склонѣ этой части Саяна.

сотъ 6200' н. ок., обрисовалась гора, выдающаяся изъ дна долины въ видѣ срѣзаннаго конуса, поросшаго на с.-в.-в.-мъ склонѣ небольшою рощею изъ лиственницъ, а на остальныхъ покрытаго мохомъ и снѣгомъ. Высота горы достигаетъ 404' надъ дномъ долины, діаметръ ея основанія равняется 450 саж., увеличиваясь мѣстами до 610 саж.; поднявшись на ея вершину, путешественникъ увидѣлъ правильное воронкообразное углубленіе до 57 саж. въ діаметрѣ и 19—24 саж. глубины, причемъ на днѣ воронки есть небольшое, уже засорившееся отверстіе, такъ что вода, образующаяся отъ таянія снѣга, не успѣваетъ уходить въ нее, скопляясь на днѣ въ видѣ озерка <sup>1)</sup>. Къ сѣверу отъ этой горы, въ сосѣдней долинкѣ, возвышается другая такая же, но меньше, также съ углубленіемъ, въ которомъ скопляется вода; что же касается высоты горъ, окружающихъ долину, въ которой расположены эти конусы, то она достигаетъ 7200' абс. выс. Осмотръ мѣстности показалъ, что конусы эти располагаются на мощной (до 200') толщѣ вообще плотной лавы, выполняющей дно долинъ, тогда какъ въ обнаженныхъ частяхъ конусовъ виднѣются только куски «шлаковъ», пузыристой и пѣнистой очень легкой лавы и «осколковъ» шоколаднаго цвѣта натековъ (lapilli). На этомъ основаніи путешественникъ считаетъ конусы эти насыпными кратерами, хотя расположеніе ихъ на пластѣ плотной лавы, продолжающейся и далѣе до водораздѣла между системою Джунбулака и Харадуссою (лѣвый притокъ р. Сенцы, см. ниже), гдѣ обнажаются уже граниты, приводитъ его къ заключенію, что лава, выполнившая описанныя долины, излилась по расщелинамъ; образовавшимся на только-что упомянутомъ водораздѣлѣ, тогда какъ изверженіе, которому обязаны происхожденіемъ эти

---

<sup>1)</sup> Проѣзжая мимо этого мѣста, суревѣрные бураты всегда творятъ молитву, повторяя несмѣтное число разъ извѣстное: „ом-ма-ни-бад-ме-хомъ“; на вершину горы не поднимаются и около нея не ночуютъ.

кратеры, имѣло мѣсто уже въ послѣдствіи, послѣ изліанія лавоваго потока.

Мнѣніе это въ послѣдствіи оспаривалось Черскимъ въ его критическомъ обзорѣ всѣхъ извѣстныхъ мѣстъ изліанія лавы въ вулканической области южной части Восточной Сибири. Онъ замѣчаетъ, что при обсужденіи явленій, описанныхъ въ верховьяхъ Хикушки, не принимался во вниманіе размывъ и разрушеніе породы, продолжавшіеся съ третичной эпохи, къ которой до сихъ поръ только и можно отнести изліаніе этихъ лавъ, и потому мы не находимъ данныхъ, которыми могли бы устранить предположеніе, что и «кратеры» Хикушки, точно также какъ мнимые кратеры въ долинѣ Иркутъ, представляютъ собою ничто иное, какъ холмовидные кратеры верхнихъ (и потому пузыристыхъ и пѣнистыхъ) частей того же потока лавы, на которомъ располагаются эти конусы съ столь обыкновенными въ нихъ провалами, а взгляды на приложенные къ статьѣ Черскаго <sup>1)</sup> рисунки показываютъ, что вершины холмовъ не выходятъ за уровень террасовидныхъ уступовъ береговыхъ горъ тѣхъ же долинъ, замѣчаемыхъ около «большаго кратера», на лѣвой сторонѣ рисунка, а около малаго, гдѣ уступъ этотъ всего яснѣе, по правой сторонѣ; уступы же эти къ сожалѣнію не подвергались изслѣдованію, между тѣмъ какъ съ ихъ именно уровня начинался размывъ верхнихъ частей лавоваго потока. Поэтому выраженіе путешественника: «кратеръ насыпанъ по видимому исключительно изъ шлаковъ» и т. д., Черскій рассматриваетъ только какъ результатъ его воззрѣнія на происхожденіе холма, а не какъ слѣдствіе изученія лежащихъ тамъ обнаженій поперечнаго разрѣза и отсутствующихъ дѣйствительно-насыпныхъ матеріаловъ, такъ какъ «шлаки» и осколки — *lapilli* — могутъ представлять собою

<sup>1)</sup> Черскій, Изв. Сиб. Отд. И. Р. Геогр. Общ. Т. XIII. № 1 и 2-й, стр. 103.



куски той же пузыристой лавы, какъ это оказалось и въ случаѣ, описывавшемся въ долинѣ Иркутъ.

Долина Харадуссы, въ которую перевалилъ Кропоткинъ, проложена сначала въ гранитахъ и сіенитахъ, за которыми слѣдуютъ гнейсы съ гранитомъ, а далѣе известняки. Въ 10 верстахъ ниже верховьевъ (вѣрнѣе, мѣста перевала) она суживается, образуя ущелье, стѣны котораго состоятъ изъ сіенита, а теченіе рѣчки дѣлается до того быстрымъ, что она состоитъ здѣсь какъ бы изъ сплошной пѣны, прыгающей черезъ громадныя валуны. Тропинка, пробитая звѣроловами, лѣпится по склонамъ горъ, перебираясь черезъ сотни ручьевъ, образующихъ глубокія грязи, и извивается между крупными валунами, переходя съ одного берега рѣчки на другой, что сопряжено съ долгими поисками удобнаго спуска, такъ какъ по берегамъ Харадуссы лежалъ еще ледъ. Наконецъ, послѣ десятка верстъ такой дороги, путешественникъ выбрался изъ темнаго ущелья рѣчки въ широкую долину Сеяцы, усѣянную рыбными озерами и питающую не бѣдную флору, представляя въ общемъ рѣзкій контрастъ съ мрачными и дикими пейзажами Харадуссы и Джунбулака. Перейдя затѣмъ верстахъ въ 6-ти отъ устья опять на Джунбулакъ, Кропоткинъ возвратился въ Окинскій караулъ, чтобы продолжать путешествіе внизъ по Окѣ.

Оказывается, что лава, излившаяся въ системѣ Джунбулака, протекла и въ долину р. Оки, распространяясь по ней внизъ отъ крутаго ея поворота къ сѣверо-востоку, т. е. верстъ на 25 внизъ отъ караула, вслѣдствіе чего длину этого потока Кропоткинъ оцѣниваетъ въ 60 верстъ, ширину отъ  $\frac{1}{2}$  до  $1\frac{1}{2}$  версты, а толщину отъ 200' до 42'; современная оконечность потока въ долинѣ Оки имѣетъ языковидную, расчлененую форму и поросла листовичнымъ лѣсомъ; въ потокъ этотъ врѣзывается и сама Ока, а также и ключъ Сайлокъ. Выбитый лошадьми и скотомъ жѣпкій грунтъ прибрежныхъ луговъ долины Оки, прижавшейся ниже ка

раула къ горамъ лѣваго берега, не даетъ нынѣ расти высокой травѣ, и потому живущіе здѣсь буряты принуждены косить въ боковыхъ долинахъ, отгораживая свои сѣнокосы; а прежде, говорятъ, трава была здѣсь такъ высока, что могла скрывать лошадей. Окрестные холмы усѣяны осиною, хвойными деревьями и березою; вообще долина эта версть 30 ниже караула гораздо теплѣе окрестностей послѣдняго, такъ какъ она закрыта отъ холодныхъ вѣтровъ крутыми горами, высоко поднимающимися на ея лѣвомъ берегу. Преобладающею породою являются тѣже известняки, перемежаясь съ гранитами.

Въ 25 верстахъ ниже караула виднѣлось впереди продолженіе широкой долины, а съ лѣвой стороны, въ известнякахъ, показалось узкое ущелье, принятое путешественникомъ за ложе какого-нибудь изъ притоковъ. Въ дѣйствительности же оказывается, что въ ущелье это вступаетъ сама Ока, круто поворачивая на сѣверъ и пересѣкая хребетъ, преграждавшій ей путь, тогда какъ по упомянутой широкой долинѣ протекаетъ рч. Илэ, направляющаяся здѣсь на встрѣчу главной рѣкѣ. По этому правому притоку необходимо было продолжать путешествіе, такъ какъ Ока, войдя въ ущелье, дѣлается непроходимою даже въ лодкѣ, благодаря многочисленнымъ порогамъ и быстринамъ, на которыхъ вода не замерзаетъ даже зимою. Одинъ изъ казаковъ говорилъ впрочемъ, что, осматривая эту часть рѣки зимою, ему показалось, что проѣздъ по ней въ лодкѣ не будетъ труднѣе, чѣмъ по ущелистой части Иркуты, остающейся до сихъ поръ несудоходною (см. ниже), но буряты отъ предложенія Кропоткина предпринять плаваніе внизъ по Окѣ, отказались безусловно, вслѣдствіе чего путешественникъ долженъ былъ отправиться верхомъ хребтами, проходя большую часть пути въ отдаленіи отъ Оки. Вскорѣ и рч. Илэ, отварачиваетъ къ сѣверу, а тропинка пошла по Малой Илэ круто подымаясь въ гору, чтобы перейти бассейнъ Урдѹ-Оки, правой вѣтви Оки. Перевалъ оказался не высокимъ (5650') и до верхняго

предѣла древесной растительности оставалось еще нѣсколько сотъ футовъ, хотя на первомъ торчали уже только низкіе кедры, располагаясь на покрывающей гору мшистой оболочкѣ. Флора, встрѣчаемая, по свидѣтельству Турчанинова, на верховьяхъ рѣки Илэ, имѣетъ характеръ субальпійской зоны Алтайско-Саянской горной системы. Къ этой зонѣ принадлежатъ напримѣръ встрѣчаемыя здѣсь растенія: *Primula longiscapa* Led., *Pr. sibirica* Jacq., и *Scrophularia incisa* Weinm. Отсюда открывается видъ на обширную горную область: къ западу виднѣлись высокіе гольцы, сопровождающіе среднее теченіе Оки; вправо же, т. е. къ востоку, гольцы замѣчаются лишь въ отдаленіи и, по мнѣнію Черскаго <sup>1)</sup>, должны принадлежать не къ Китайскимъ альпамъ, какъ это предполагалось, а по всей вѣроятности цѣпи, лежащей сѣвернѣе ихъ. Впереди, на днѣ узкаго ущелья, подъ ледяными накипами, сочился горный ручеекъ Утой-желга; стѣны его длинной долины поднимаются почти отвѣсно, а дно покрыто обломками гранитовъ и кристаллическихъ сланцевъ; но «вслѣдъ за гнейсами, а слѣдовательно сланцами» опять выступаютъ известняки, имѣющіе здѣсь очевидно значительное распространеніе. Всю эту перемежаемость известняковъ съ гнейсами, гранитами и другими кристаллическими породами и сланцами Черскій относитъ къ древнѣйшей изъ развитыхъ здѣсь формацій, причисляя её къ такъ называемому лаврентьевскому возрасту <sup>2)</sup>.

Утой-желга впадаетъ въ Айнокъ, притекающій съ юго-запада; оставивъ вправо долину Дабани-желга, по которой идетъ тропинка въ систему р. Бѣлой, въ Аларскую степную управу (путь крайне интересный, пересекающій интересующую насъ мѣстность въ діагональномъ направленіи, но до сихъ поръ никѣмъ еще неизслѣдованный). Кро-

---

<sup>1)</sup> Черскій, Рукописныя замѣтки.

<sup>2)</sup> Черскій, Отчеты его о Байкалѣ и Забайкалѣ см. ниже.

поткинъ отправился внизъ по Айноку, ревущему въ ущельѣ, пробитомъ въ такихъ же сѣрыхъ известнякахъ, какъ около Обинскаго караула, и, подвигаясь по этой расширившейся въ послѣдствіи долины, поросшей однообразными и значительно выгорѣвшими, хвойными лѣсами, полуобугленные стволы которыхъ возвышаются въ видѣ мачтъ, лишенныхъ рей, онъ достигъ русла Урдѣ-Оки (3420' н. ок.) и пересѣкъ его, приблизительно въ 70 — 80 верстахъ отъ верховьевъ и въ 40 отъ устья, называемаго «Гурбанъ-Бельчиръ», — вѣрнѣе должно быть Гурбунъ-бельчиръ, такъ какъ *гурбунъ* на бурятскомъ языкѣ означаетъ три, а *бельчиръ* — развѣтвленіе, развѣтвленіе, стрѣлка, а въ этомъ именно мѣстѣ средняя или собственно-Ока сходитъ съ одной стороны съ Урдѣ-Окою, а съ другой (съ лѣвой) съ Хойта Окою, протекающею съ запада, образуя такимъ образомъ тройное развѣтвленіе, т. е. гурбунъ-бельчиръ. На Урдѣ-Окѣ (53° 24' с. ш., 118° 18' в. д.) путешественникъ встрѣтилъ шиповникъ въ цвѣту (*Rosa Gmelini* Bge, 11-го іюня ст. ст.), душистый тополь (*Populus suaveolens* Fisch.), острецъ, *Achillea millefolium* L. и красную смородину (*Ribes rubrum* L.); бѣлая береза составляла уже половину всѣхъ особей въ лѣсахъ. Въ рѣсахъ или обнаженіяхъ попадались граниты, известняки и глинистые сланцы. Отсюда бурятскія охотничьи владѣнія простираются еще къ западу до Хойта-Оки, тогда какъ дѣла начинается уже область карагасовъ, хотя буряты позволяютъ имъ охотиться и въ своихъ предѣлахъ; за то прежде, когда границы между обоими племенами не были строго размежеваны, происходили иногда даже страшныя стычки, не говоря уже объ отнятіи ружья и добычи отъ охотящагося въ чужой области. Покинувъ Урдѣ, путешественникъ направился къ с.-в. и с., по долины рч. Унакшинъ, подымаясь вверхъ по ней цѣлый день, среди дикой тайги, къ перевалу на верховья рч. Далдармы, по которой предполагалось выѣхать на Оку; древесная растительность (кедров-

ниѣ) окончилась на высотѣ 6540', тогда какъ высота гольца на перевалѣ оказалась равною 6870' н. ок.. Съ этой высоты, гдѣ страшный вѣтеръ требовалъ даже усилія, чтобы устоять на ногахъ, угрожая ежеминутно сорвать палатку и планшеть <sup>1)</sup>, во всѣ стороны виднѣлись горы, преимущественно гольцы; наибольшіе изъ нихъ рисовались на востокѣ; впереди, на сѣверѣ, тянулась какъ бы альпійская цѣпь гольцовъ. Но самые высокіе гольцы принадлежали повидимому цѣпи Эргикъ-Таргакъ-Тайга, направляющейся, на сколько можно судить съ отдаленія, съ ю.-ю.-в. на с.-с.-в.; линія этихъ гольцовъ прекращается и замѣтно понижается на з.-с.-з. отъ гольца, въ верховьяхъ рч. Унакшинъ.

Отсюда начинается крутой спускъ въ долину Далдармы по камнямъ, поросшимъ мхомъ, между которыми лошади постоянно проваливаются. Стѣны узкой долины этого ручья состоятъ преимущественно изъ известняковъ, образующихъ живописные и оригинальные по очертанію утесы. Всѣ подобные утесы служатъ, какъ извѣстно, предметомъ поклоненія у бурятъ, и проводники Кропоткина нѣсколько разъ останавливались въ виду ихъ для приношенія жертвъ: варили чай, *саламатъ* (мука, прокипиченая въ маслѣ), затѣмъ воткнули березку и, привязавъ къ ней клочекъ лошадиной гривы, подошли къ ней съ саламатомъ и брызгали масломъ во всѣ стороны; поклонившись затѣмъ три раза на востокъ, они кланялись на 8 сторонъ, повторяя *ом-ма-ни-бад-ме-хомъ*, и еще 5 разъ брызнули масломъ въ огонь и на три стороны, послѣ чего, повторивши ту же процедуру съ чаемъ, выпили и съѣли все приготовленное. Относительно Далдармы путешественникъ замѣчаетъ также, что послѣ случившагося тамъ страшнаго пожара лѣса, состоявшаго прежде исключительно изъ хвой-

---

<sup>1)</sup> Путешественникъ все время дѣлалъ съѣмку, которая, къ крайнему сожалѣнію, сгорѣла вмѣстѣ съ Музеемъ Сибирскаго Отдѣла Географич. Общества въ Иркутскѣ прежде поступленія въ печать, и потому цѣнный матеріалъ этотъ слѣдуетъ считать потеряннымъ для науки.

ныхъ деревьевъ, въ настоящее время на ихъ мѣстѣ вырастаютъ главнымъ образомъ береза въ видѣ кустарниковъ и молодыхъ деревьевъ.

Утромъ 14-го іюня, слѣдуя внизъ все по той-же долинѣ, путешественникъ вышелъ къ р. Оѣ, противъ устья рѣчекъ, извѣстныхъ подъ названіемъ Билюнѣкъ ( $53^{\circ}30'$  с. ш. и  $118^{\circ}30'$  в. д.). Высота уровня Оѣ оказалась здѣсь равною 1985'; ширина рѣки достигаетъ около 100 сажень, при ширинѣ долины около  $1\frac{1}{2}$  верстъ; бродовъ черезъ нее уже нѣтъ, и потому необходимо было сдѣлать плотъ, чтобы переправиться на ея лѣвый берегъ. Отсюда Оѣ можетъ считаться уже сплавною рѣкою, и промышленники плаваютъ съ этого мѣста въ ботахъ или на плотахъ до деревни Корноты (см. ниже); травяная растительность гораздо разнообразнѣе: появляется даже земляника и клубника; за право охоты въ этихъ мѣстахъ, изобилующихъ дичью, происходятъ между Окинскими и Корнотскими жителями горячіе споры, а иногда и драки.

Нѣсколько ниже по теченію, путешественнику необходимо было еще разъ удалиться въ сторону отъ рѣки и по рч. Янгуншэ и Ихэ-голу снова перевалить черезъ одинъ изъ побочныхъ отроговъ горъ, не выходящій за предѣлы вертикальнаго распространенія древесной растительности, такъ какъ рѣка на протяженіи нѣсколькихъ верстъ стѣсняется здѣсь утесистыми берегами, и только 16-го іюня, по устью рч. Тыгылтэй, онъ вышелъ опять въ долину Оѣ ( $53^{\circ}41'$  с. ш.,  $119^{\circ}$  в. д. и 1810' н. ок.), чтобы не разставаться уже съ нею. Въ этомъ мѣстѣ располагается высокій утесъ, гдѣ, какъ гласитъ бурятское преданіе, нѣкогда былъ привязанъ племякъ изюбра (*Cervus elaphus*). Никто не смѣлъ стрѣлять въ него, и, когда одинъ изъ промышленниковъ рѣшился племянецъ сдѣлать по немъ выстрѣлъ, свалившійся съ утеса племякъ оказался каменнымъ. Съ тѣхъ поръ всѣ почитаютъ это мѣсто, молятся, проѣзжая мимо утеса, и никто въ это

время не долженъ ни кричать, ни говорить громко. Стоить только кому нибудь вскрикнуть, тогда неминуемо ненастье: дождь съ грозою, или пурга, если дѣло происходитъ зимою. Повѣрье это раздѣляется и русскимъ населеніемъ, ѣздящимъ по этой рѣкѣ. Около этого утеса проводники Кропоткина продѣлали ту-же процедуру жертвоприношенія, какую они совершали на Далдармѣ.

Устье Тыгылтѣя является характеристическою чертою для р. Оки. Здѣсь оканчивается суженіе ея долины (такъ называемыя въ Сибири «щеки»), горы отходятъ въ стороны и, какъ сама рѣка, такъ и ея долина, являются съ совершенно другимъ уже характеромъ нежели выше. Тутъ впервые путешественникъ увидѣлъ сосновые лѣса, хотя отдѣльныя особи сосны начали уже попадаться и въ долинѣ Далдармы, на высотѣ около 2365'. Сама рѣка достигаетъ 135 саж. ширины, протекая довольно плавно и тихо; горъ уже не видно; вдали синѣютъ нѣсколько холмовъ, а на правомъ берегу располагается небольшое, уединенное возвышеніе—Бударикъ, которому буряты точно также поклоняются и проѣзжаютъ мимо него втихомолку. Проѣзжая по роскошному побережью, гдѣ сочная трава поднимается на аршинъ и болѣе, нельзя не сожалѣть, что эти весьма удобныя для хлѣбопашца мѣста, распространяющіяся на Окѣ верстѣ на 40—50 вверхъ по ея теченію, до сихъ поръ никѣмъ еще не заняты.

Наконецъ, 17-го іюня вечеромъ, уже въ разстояніи 250 верстѣ отъ Окинскаго караула, путешественникъ увидѣлъ первые *зимники*, т. е. зимнія жилища, а затѣмъ достигъ и *мѣтниковъ* бурятской ясачной деревни Корноты, расположенной на берегу Оки. Деревня отличается своеобразнымъ видомъ; въ противоположность разсѣяннмъ постройкамъ бурятскаго улуса, вы видите здѣсь рядъ правильно построенныхъ юртъ, высокихъ и прочныхъ, 8-ми или 4-угольныхъ, покрытыхъ дерномъ. Весь бытъ Корнотскихъ бурятъ представляетъ переходную ступень въ осѣдлому русскому населенію. Они за сѣ-

много хлѣба и продають его въ Окинскій караулъ русскимъ и бурятамъ; зимники находятся всего лишь въ разстояніи 8-ми верстъ отъ лѣтниковъ, въ которые они переселяются къ тому же лишь на время полевыхъ работъ. Зимники устроены сравнительно съ еще большимъ комфортомъ: удобныя юрты вкругомъ огорожены, а у нѣкоторыхъ возлѣ юртъ построены еще дома съ русскими печами. Въ лѣтней юртѣ одного изъ болѣе богатыхъ бурятъ,—шуленги, Кропоткинъ нашелъ деревянный полъ кругомъ очага, гдѣ съ лѣвой (мужской) стороны поставлены были диванъ, столъ и груда сундуковъ съ положенными на нихъ перинами, подушками и съ развѣшанной одеждою, платками и т. п., тогда какъ на правой (женской) сторонѣ помѣщается домашняя утварь, въ числѣ которой находился и самоваръ—вещь, крайне рѣдкая напр. у Тункинскихъ (по Иркуту) или прибайкальскихъ бурятъ. Передняя половина снабженной высокою дверью юрты отгорожена ситцевыми занавѣсами, за которыми спятъ дѣти и дѣвушки. Женщины надѣваютъ сверхъ цвѣтной рубашки юпки родъ длинной поддевки съ двумя рядами пуговицъ, голову обвязываютъ платкомъ, подъ которымъ надѣвается родъ низкой кички, такъ что въ костюмѣ этомъ нельзя не видѣть смѣси бурятскаго съ русскимъ. Мужчины носятъ русскую одежду. Въ пищѣ въ свою очередь произошли измѣненія: употребляя также много молока и приготовляемаго изъ него опьяняющаго напитка (*тарасунъ*), корнотцы, какъ и всѣ буряты, почти вполне замѣнили кирпичный чай байховымъ; въ содержаніи посуды и приготовленіи пищи точно также замѣтно гораздо болѣе опрятности нежели у бурятъ. Даже типъ корнотцевъ успѣлъ значительно измѣниться: хотя ширина скулъ осталась повидимому неприкосновенною, у многихъ дѣтей можно уже встрѣтить бѣлокурые волосы; глаза у всѣхъ открыты и прямы; во всей фигурѣ болѣе сдержанности, лицо подвижное и выраженіе умнѣе чѣмъ у бурятъ, а движенія менѣе неуклюжи.



Отъ Корнотъ до Зиминской почтовой станціи, расположенной на московскомъ трактѣ, при впаденіи р. Зимы въ Оку ( $53^{\circ} 53'$ , на высотѣ уровня Оки въ 1508,5' н. ок.), остается всего лишь 40 верстъ пути по постепенно расширяющейся долинѣ этой рѣки, причемъ около обширнаго села Зиминскаго (съ 2-мя церквями, многими лавками и двухэтажными домами) начинаются уже немалыя безлѣсныя пространства этой части плоской возвышенности.

Такимъ образомъ, если принять высоту верховьевъ р. Оки, выводя среднюю изъ всѣхъ имѣющихся наблюдений въ 6400', какъ это дѣлаетъ Кропоткинъ, а высоту Окинскаго караула, отстоящаго отъ верховьевъ на 150 верстъ, въ 3860', то величина паденія воды въ руслѣ на этомъ протяженіи будетъ равняться 17 футамъ на каждую версту, тогда какъ паденіе на пространствѣ остальныхъ 320 верстъ, т. е. отъ Окинскаго караула до Зиминской станціи (1508' н. ок.) оказывается равнымъ только 7,5 футамъ на версту; что же касается средняго паденія по всей длинѣ этой части рѣки (470 верстъ), то оно равняется всего лишь 10,4 футамъ на каждую версту. Цыфры эти довольно значительно отличаются отъ показанныхъ у Шварца <sup>1)</sup>, пользовавшагося меньшимъ числомъ наблюдений; во всякомъ случаѣ не надо забывать, что вычисления эти основаны на цыфрахъ, полученныхъ изъ барометрическихъ наблюдений, и только высота уровня Оки около Зиминскаго селенія выведена изъ только-что обнаруженныхъ результатовъ инструментальной нивелировки Сибирскаго почтоваго тракта, связавшей уровень Байкала съ океаномъ <sup>2)</sup>.

Но возвратимся теперь къ знакомому уже намъ водораздѣлу между верховьями р.р. Оки и Иркуты, чтобы, направляясь оттуда внизъ по долинѣ послѣдней изъ названныхъ рѣкъ вообще къ востоку и знакомясь съ сопровождаю-

<sup>1)</sup> Шварцъ, Труды Сибирск. Экспедиціи I. с.

<sup>2)</sup> Зап. И. Р. Геогр. Общ. по Общей географіи, 1885 г. Т. XV. № 1-й.

щими её горными цѣпами, составить возможно полное понятіе о южной границѣ интересующаго насъ отрѣзка нагорья, точно также, какъ долина Оки ознакомила насъ съ его западною окраиною.

## 2) Долина р. Иркута и сопровождающія ее горы.

Литература долины р. Иркута несравненно богаче литературы Оки, и потому свѣдѣнія наши о ней являются безспорно болѣе обширными и разносторонними, хотя полнотѣ ихъ мѣшаетъ значительно большая, мѣстами даже громадная (до 40 верстъ) ширина этой долины, отдѣляющая сопровождающія её труднодоступныя цѣпи горъ, болѣе правильное изслѣдованіе которыхъ производилось до сихъ поръ лишь по длинѣ теченія и въ восточной части горъ, тогда какъ остальная часть послѣднихъ пересѣкалась и вообще описывалась лишь по нѣсколькимъ значительно удаленнымъ другъ отъ друга притокамъ Иркута.

Яковлевъ (1810 г., обнаружено впрочемъ только въ 1874 г. у Чекановскаго), Эрманъ (1829, обнаружено въ 1843), Турчаниновъ и Кириловъ (1828—1836) Меглицкій (1851—56), Бакшевичъ (1856), Версильовъ (1857), Радде (1861), Крыжинъ и Шварцъ (1864), Кропоткинъ (1867), Поляковъ (1868), Чекановскій (1870 и 1874 г.), Ровинскій (1871), Черскій (1873, 1875 и 1880 г.г.), Бобырь, Ячевскій, Прейнъ и Макеровъ (1887) и нѣкоторые другіе, стоятъ въ спискѣ изслѣдователей или картографовъ системы Иркута. Трудами ихъ мы и воспользуемся при нижеслѣдующемъ описаніи, придерживаясь для каждой отдѣльной части главнымъ образомъ новѣйшихъ путешественниковъ.

### а) Теченіе Иркута до Хангинскаго караула.

Выше было уже сказано о томъ, что по сосѣдству Окинскаго озера, отдѣлившись отъ него лишь невысокимъ водораз-

дѣломъ, располагается на той-же высотѣ (слѣдовательно около 6400') озеро Сусерь-норъ, изъ котораго вытекаетъ одинъ изъ довольно многоводныхъ правыхъ притоковъ лѣваго верховья Иркутъ (Чернаго Иркутъ), берущаго начало въ промежуткѣ между Тункинскими и Китойскими альпами. Рыбное озеро это достигаетъ около  $1\frac{1}{2}$  верстѣ въ длину и  $\frac{1}{2}$  версты въ ширину, располагаясь съ с.-з.-ой стороны гольца Нуху-дабана. Истокъ озера, длиною не менѣе 10 верстѣ и называемый иногда Среднимъ Иркутомъ, опоясываетъ массивъ того же гольца съ сѣвера, тогда какъ Черный Иркутъ, слѣдуя вообще почти меридіанальному направленію къ югу, образуетъ восточную границу Нуху-дабана, отрѣзаннаго съ южной стороны отъ Мунку-Сардыка теченіемъ праваго верховья интересующей насъ рѣки, известнаго подъ названіемъ Бѣлаго Иркутъ.

Тропа пересѣкаетъ сначала два правыхъ притока Средняго Иркутъ (т. е. истока Сусерь-нора): это ключи Ондалигорхонъ (можетъ быть Ондалинь или Андалинь, что означаетъ ледяную накипь или наледь) и Бырхы горхонъ (*бархы* или *бырхы* означаетъ страшный), отстоящіе другъ отъ друга въ 3 верстахъ, причемъ послѣдній беретъ начало изъ нѣсколькихъ маленькихъ озеръ, лежащихъ на горахъ около сѣверной части Нуху-дабана. Затѣмъ, подымаясь все выше и выше и пересѣкая незначительный ручей Айникъ, по которому слѣдуетъ трудный путь на упомянутые выше пріиски Шагаева въ системѣ р. Оки, путешественникъ достигаетъ гольца Нуху-дабана (иначе Нуку или Нухунъ-дабанъ, у Меглицкаго ошибочно Мунко-дабанъ)<sup>1)</sup>, приближаясь вмѣстѣ съ тѣмъ и къ ущелистой долинѣ, на которой мѣтится пѣнистый Бѣлый Иркутъ; отсюда открывается и очарователь-

---

<sup>1)</sup> *Нухунъ* означаетъ дыра или пещера. Названіе гольца произошло отъ громадной дыры въ видѣ воротъ, образовавшейся въ известковомъ утесѣ.

ный видъ на сложный и живописный гребень Мунку-Сар-  
лика съ его остроконечными вершинами и ледникомъ. Общю  
сѣдиною двухъ ручейковъ, изъ которыхъ одинъ изливается  
въ Черный, а другой въ Бѣлый Иркутъ, массивъ Нуху-дабана  
раздѣляется на двѣ главныя части, хотя вообще въ гольцѣ  
этомъ различаются три округленные, гребневидныя вершины,  
превышающія вертикальныя предѣлы произростанія древесной  
растительности. Высота одной изъ упомянутыхъ главныхъ  
частей гольца опредѣлена въ 6738', а второй въ 7291'; между  
ними, на высотѣ 6669', построена русская часовня, одина-  
ково чтимая и проѣзжающими здѣсь бурятами, которые со-  
вершаютъ жертвоприношенія, состоящія не только изъ мѣдныхъ  
монетъ, но нерѣдко изъ кремней, лоскутковъ, даже и пуговицъ,  
между тѣмъ какъ промышленникъ, довольный успѣхомъ своихъ  
похожденій, оставляетъ здѣсь иногда и пару бѣличьихъ  
журокъ. На границѣ древесной растительности являются  
какъ лиственница, такъ и кедръ, на южномъ же склонѣ  
полюща, какъ въ мѣстности хорошо закрытой отъ холодныхъ  
вѣтровъ, произрастаютъ даже такіе представители флоры, какъ  
герань, аконитъ и т. п., причемъ и бѣлая береза въ такихъ  
мѣстахъ подымается до высоты 6258' (Радде).

Вслѣдствіе того понятно, что здѣшняя флора, хотя и  
имѣетъ горный характеръ, но представляется менѣе субаль-  
пійскою чѣмъ флора горныхъ скатовъ лежащаго ниже по  
Иркуту Хангинскаго или Мондинскаго расширенія. Боль-  
шинство указываемыхъ здѣсь Турчаниновымъ растений при-  
надлежитъ къ горной флорѣ Алтайско-Саянской системы, какъ  
напримѣръ: *Aconitum barbatum* Patr., *Dontostemon integrifo-*  
*lius* C. A. Mey., *Silene graminifolia* Oth. var *Jenissea* Steph.,  
*Astragalus multicaulis* Led., *A. adsurgens* Pall., *Artemisia*  
*frigida* W., *Tanacetum sibiricum* L., *Serratula centauroides* L.,  
*Gentiana decumbens* L. Только немногія изъ здѣшнихъ рас-  
тений принадлежатъ къ флорѣ Европейско-русской равнины,  
какъ напр. болотная *Pedicularis palustris* L. и солонцовая

*Kochia prostrata* Schr., а другія къ флорѣ арктической зоны Старого и Нового свѣта, переходящей и на сибирскіе гольцы, какъ напр. *Melandryum apetalum* Fenzl. и *Potentilla nivea* L. Наконецъ здѣсь попадаются и мѣстные субальпійскія растенія Саяна: *Aconitum biflorum* Fisch., *Parnassia ovata* Led. и *Corisperma Redowskii* Fisch.

По изслѣдованіямъ Кропоткина <sup>1)</sup>, юго-восточная часть гольца состоитъ изъ известняковъ желтоватыхъ и сѣрыхъ (кристаллическихъ); порода эта образуетъ верхній покровъ, залегающій на кристаллическихъ сланцахъ (преимущественно діоритовыхъ), которыми въ свою очередь покрывается гранитъ; названныя породы и образуютъ собою поочередно три упомянутыя выше вершины, расположенныя на вообще довольно гладкой поверхности гольца. Самою интересною изъ этихъ вершинъ оказалась расположенная на сѣверѣ отъ тропинки; состоя изъ гранита, она отличается куполовидною формою и возвышается надъ вообще плоскою поверхностью гольца, устланною большими острореберными глыбами. Несмотря на вывѣтрѣлое состояніе, гладкая поверхность купола носить весьма ясныя слѣды бывшихъ на ней параллельныхъ шрамовъ въ нѣсколько миллиметровъ ширины и отъ 5 до 10 дециметровъ въ длину. Кропоткинъ, признавъ эти шрамы результатомъ изборожденія, сдѣлалъ открытіе первыхъ слѣдовъ древнихъ ледниковъ въ Восточной Сибири, относя къ ихъ дѣйствию и упомянутыя выше изглаженныя скалы на Джунбулакѣ.

Змѣвѣвидно извивающаяся тропинка ведетъ съ вершины Нуху-дабана къ той мысовидной части основанія гольца, которая вдается между сліяніемъ обоихъ верховьевъ Иркуты (приблизительно 51°45' с. ш. и 118°24' в. д. при высотѣ въ 4800'), послѣ чего слѣдуетъ бродъ черезъ Бѣлый Иркутъ, о которомъ Кропоткинъ замѣчаетъ, что у слабонервныхъ должна закружиться голова, когда лошадь вступаетъ

---

<sup>1)</sup> Кропоткинъ, 1. с. pag. 33.

и этот горный поток и ее сносить съ каждымъ шагомъ  
и ниже и ниже по теченію, а глазъ не можетъ слѣдить  
за быстротою мчащейся молочнобѣлой воды, приносимой  
въ-за 15 верстъ изъ двухъ источниковъ, лежащихъ на сѣ-  
верномъ склонѣ Мунку-Сардыка <sup>1)</sup>). Отсюда дорога слѣдуетъ  
на правому берегу Иркута, вообще на ю.-в., сначала по  
лѣсамъ, опускающимся къ рѣкѣ отъ Мунку-Сардыка  
и поросшимъ мѣстами бальзамическимъ топодемъ, затѣмъ  
пересѣкаетъ ключъ Харлыкъ, на устьѣ котораго ледъ  
(накпль) сохраняется до августа м-ца (25 іюня стар. стиля  
Радде нашелъ толщину этого льда равную еще 2½ фут.).  
Прибрежіе рѣки расширяется, порослая весьма густымъ и  
гнѣздящимся тѣнистымъ еловымъ лѣсомъ; для сокращенія  
пути провѣзжаютъ далѣе иногда по одному изъ острововъ  
Иркуты, разбивающагося здѣсь на протоки, пересѣкаютъ  
нѣсколько низовья двухъ правыхъ притоковъ рѣки, именно  
Бугуту и Аршанъ, и по весьма удобной для разѣ-  
здовъ, расширившейся долинкѣ, заселенной бурятами, тропа  
приводитъ къ броду на лѣвый берегъ Иркуты, на которомъ  
располагается Хангинскій караулъ, отстоящій въ 20  
верстахъ отъ слиянія верховьевъ Иркуты. Относительно гео-  
логическаго строенія этого отрѣзка рѣки слѣдуетъ замѣ-  
тить, что, согласно наблюденіямъ Кропоткина (1. с.), а  
также и Меглицкаго <sup>2)</sup>, на протяженіи первыхъ 10 верстъ  
преобладаютъ кристаллическіе известняки, мѣстами блѣдно-  
розоватаго цвѣта (около Бѣлаго Иркуты), мѣстами же сѣ-  
рые и бѣлые, а далѣе развиты мощныя толщи (около 25 саж.  
по Кропоткину) довольно рыхлаго конгломерата съ цемен-  
томъ изъ красной глины. Конгломератъ этотъ залегаетъ съ  
одной стороны на гнейсахъ и слюдяныхъ сланцахъ, а съ

<sup>1)</sup> Радде, 1. с. pag. 81.

<sup>2)</sup> Меглицкій, Verhandl. d. Mineral. Ges. zu St. Petersburg. Jahrg.  
1850—51 und 1856, а также Горн. Журн. 1855 г. № 4.

сѣверной на гранитахъ, кристаллическихъ сланцахъ и сѣрыхъ известнякахъ, пласты которыхъ около Хангинска падаютъ на ю.-з., какъ это наблюдалось Чекановскимъ (см. ниже).

Хангинскій караулъ (иначе Мѣнды) располагается подъ  $51^{\circ} 41'$  с. ш. и  $118^{\circ} 41'$  в. д. на высотѣ 4060' н. ок. Онъ построенъ на луговой площадкѣ въ расширеніи долины Иркута достигающемъ нѣсколькихъ верстъ въ длину при нѣсколькой меньшей ширинѣ. Съ сѣверной стороны расширенія возвышаются Тункинскіе альпы, образуя голыя, широкія и нѣсколько заостряющіяся кверху площадки склона по направлению къ каждому изъ своихъ альпійскихъ пиковъ, тогда какъ предгорье ихъ замѣтными кое-гдѣ террасами опускается къ лѣвому берегу Иркута, суживая долину ниже Караула. На нижнемъ изъ уступовъ склона располагается небольшое озерко, извѣстное подъ названіемъ Хара-норъ къ которому осенью перекочевываетъ часть здѣшнихъ (Мондинскихъ) бурятъ; этотъ же склонъ перерѣзывается долиною рч. Монду (Бурукъ? у Чекановскаго <sup>1)</sup>), выходящей лѣвомъ ближе къ устью, лежащему около самаго Караула. Южная сторона Хангинскаго или Мондинскаго расширенія, т. е. съ праваго берега Иркута, ограничивается восточнымъ продолженіемъ Саяна, представляющимъ здѣсь рѣзкій контрастъ какъ съ противуположнымъ ему зазубреннымъ Тункинскими альпами, такъ съ величавымъ и живописнымъ Мунку-Сардыкомъ, съ которымъ эта часть Саяна сливается здѣсь непосредственно, составляя прямое (восточное) продолженіе оси, на которой высится пики этого кульминаціоннаго пункта. Понизившись мгновенно до высоты подножія Мунку-Сардыка (5650' н. ок.) съ которымъ (т. е. подножіемъ) онъ имѣетъ общее окру-

---

<sup>1)</sup> Чекановскій, Зап. Сиб. Отд. И. Р. Геогр. Общ. Т. XI. 1874 г. стр. 366.

енное и какъ бы изглаженное очертаніе <sup>1)</sup>, Саянъ въ этомъ мѣстѣ покрытъ сплошнымъ лѣсомъ и носить названіе Нозоръ, отъ котораго произошло, по мнѣнію Радде, русское Дозоръ; изъ него беретъ начало долина р. Хангъ, иначе Обд-голь или Обд-горхонъ (у Радде неправильно Обой-горхонъ), протекающей сначала на востокъ и затѣмъ на с.-в., послѣ чего она изливается въ Иркутъ съ правой стороны, насупротивъ устья Монду или Булука. Близостью всѣхъ этихъ горъ объясняются и неблагоприятныя климатическія условія Хангинскаго расширенія, въ которомъ 1-го іюня Радде засталъ еще снѣгъ, выпавшій до 1 ф. толщины.

При такихъ климатическихъ условіяхъ весьма естественно, что горные склоны, по которымъ стекаетъ рѣчка Монду поросли преимущественно растеніями субальпійской зоны. Большинство растеній, найденныхъ здѣсь Турчаниновымъ — субальпійскія Алтайско-Саянской флоры. Сюда относятся изъ крестоцвѣтныхъ: *Draba ochroleuca* Bge. и *Hutchinsia alba* Bge.; изъ гвоздичныхъ: *Stellaria petraea* Bge.; изъ бобовыхъ: *Oxytropis deflexa* DC., *O. muricata* DC.; изъ зонтичныхъ: *Peucedanum saginatum* Led., изъ сложно-цвѣтныхъ: *Artemisia commutata* Bess. (водится и на склонахъ Кавказа), *A. laciniata* W., *Saussurea pygmaea* Spr; изъ чаше цвѣтныхъ: *Gentiana azurea* Bge., *Veronica liliata* Fisch., *Pedicularis myriophylla* Pall., *P. abrotanifolia* Bieb., *P. uliginosa* Bge.; изъ ситовниковыхъ: *Carex melanantha* C. A. Mey. Но есть въ здѣшней флорѣ и растенія, свойственныя Европейско-русской равнинѣ, напримеръ *Artemisia dracunculus* L., *Gymnadenia conopsea* R. Br., или растенія, свойственныя Сибири и переходящія только въ ю.-в. часть Европейской Россіи, какъ напр. *Artemisia glauca* Pall., *A. rupestris* L., или исключительно свойственныя Сибири напр. *Echinops Gmelini* Led. Есть и растенія арктической

<sup>1)</sup> Чекановскій, I. с.



зоны Старого и Нового свѣта, переходящія на сибирскія альпы, напр. *Eutrema Edwardsii* R. Br., *Artemisia borealis* Pall. *Pedicularis versicolor* Wahl. Наконецъ одно растеніе, свойственное арктической зонѣ Нового Свѣта и переходящее только въ восточную часть арктической зоны Старого Свѣта это *Stellaria longipes* Goldie., и немного растеній, принадлежащихъ къ мѣстной около-байкальской альпійской флорѣ, какъ напримѣръ: *Oxytropis nitens* Turcz., *O. leucotricha* Turcz. *Gentiana pulmonaria* Turcz., *G. striata* Pall. и *Dracoscephalum fragile* Turcz.

в) Отъ Хангинскаго караула до высшаго пункта Мунку-Сардыка.

Путь къ Мунку-Сардыку ведетъ изъ Хангинскаго караула; а такъ какъ высшая точка этого гольца можетъ быть достигнута только съ его южнаго склона, поэтому путешественникамъ необходимо предварительно перевалитъ черезъ упомянутую понизившуюся часть Саяна (Нозоръ) и достигнуть долины озера Косогола, откуда уже предпринимается восхожденіе, не всегда увѣнчивающееся успѣхомъ что доказывается уже тѣмъ обстоятельствомъ, что изъ числа четырехъ такихъ попытокъ (Штубендорфъ, Меглицкій, Чекановскій и Радде) только одинъ Радде могъ достигнуть высшей точки гольца и его вѣчнаго снѣга, тогда какъ другимъ мѣшали какъ неблагоприятныя физическія, такъ и климатическія условія (снѣгъ, облачность и усталость).

Переpravившись на правый берегъ Иркуты, путешественники направляются болѣе прямымъ путемъ къ верховьямъ Обо-гола, оставляя извилистое теченіе его съ лѣвой (западной) стороны и слѣдуя сначала мимо выступовъ конгломерата, обнаженнаго старыми руслами Иркуты. Подъемъ этотъ, длиною до 10 верстъ, ведетъ поперегъ двухъ вообще продольныхъ отроговъ, изъ которыхъ низшія носятъ названіе Обо-саранъ у Радде, вѣрнѣе, кажется Обо-сарамъ, такъ

Какъ слово *saram* у бурятъ означаетъ болѣе или менѣе котловинообразное расширеніе горной долины, а такое въ дѣйствительности находится сейчасъ же за этимъ отрогомъ, и въ немъ беретъ начало ручеекъ того же имени. Сѣверный склонъ этого отрога поросъ лиственничнымъ лѣсомъ, между которымъ встрѣчается еще бѣлая береза и тополь, въ долинѣ же (Обо-сарама) казаки караула заготавливаютъ сѣно. Отсюда дорога ухудшается, мѣстами вслѣдствіе болотистыхъ пространствъ, но главнымъ образомъ потому, что на подъемѣ на слѣдующій отрогъ (собственно Нозоръ) почва покрыта глыбами и валунами различныхъ размѣровъ, вообще многоугольными, отчасти лежащими на поверхности, отчасти же выдающимися изъ подъ растительнаго покрова; въ числѣ ихъ Чекановскимъ найдены различныя видоизмѣненія известняка, гнейса и слюдянаго сланца. Затѣмъ тропа пересекаетъ широкую и плоскую долину верховьевъ Обо-гола или Ханги и достигаетъ высшей части Саяна въ томъ мѣстѣ, гдѣ сооруженъ пограничный маякъ № 16, состоящій собственно изъ двухъ кучъ камней, одной на русской, а другой на монгольской сторонѣ границы. Наружность этой части хребта весьма своеобразна. На первый взглядъ, какъ описываетъ Чекановскій, <sup>1)</sup> она имѣетъ видъ равнины, не болѣе какъ волнистой и нѣсколько покатой къ юго-западу, гдѣ въ отдаленіи бѣлѣетъ зеркальная поверхность оз. Косогола. При некоторомъ вниманіи неровности этой мѣстности принимаютъ однако видъ возвышенныхъ округленныхъ валовъ, группирующихся въ два ряда, по одному съ каждой стороны равнины, превращая её въ широкую долину. Это долина Косогольской Ханги (въ противоположность Иркутской, т. е. Обо-голу) съ поверхностію до того ровною, что поражаетъ взоръ сходствомъ съ произведеніемъ рукъ человѣческихъ. Скоро однако отыскиваются предметы, обличающіе дѣйствительность: это немного-

<sup>1)</sup> Чекановскій, I. с. pag. 370—380.

численные холмы, разбѣянные по этой поверхности и отличающіеся весьма характерными особенностями. Склонъ каждого изъ холмовъ, обращенный къ соотвѣстственному скату долины, крутой и обыкновенно сглаженный, тогда какъ противулежащій ему — пологій; верхняя поверхность ихъ, возвышающаяся иногда до нѣсколькихъ сажень надъ уровнемъ основанія, покрыта «грудой несвязнаго камня»; въ поперечномъ разрѣзѣ холмы эти имѣютъ форму прямоугольнаго треугольника, гипотенуза котораго приходится на стѣрону покатости склона долины. Холмы эти Чекановскій считаетъ результатомъ сглаживающаго дѣйствія двигавшагося здѣсь древняго ледника, остатокъ котораго является, быть можетъ, въ видѣ вѣчнаго снѣга на вершинѣ Мунку-Сардыка, причемъ замѣчаетъ, что плоскоокругленный и какъ бы сглаженный характеръ поверхности свойственъ всему склону Саяна къ долинѣ Косогола, распространяясь черезъ подножіе Мунку-Сардыка и на западъ, вплоть до гольцовъ, которые въ видѣ дикой ущелистой и высокой цѣпи Хангай, приходятъ съ юга и окаймляя Косогольскую долину съ запада, соединяются къ сѣверу съ Мунку-Сардыкомъ. Ледниковыхъ шрамовъ, какъ на Нуху-дабанѣ, здѣсь впрочемъ не найдено, но они могли частью исчезнуть отъ вывѣтриванія, частью же покрыты быть можетъ, позднѣйшими наносными отложеніями.

Породу, изъ которой состоитъ маякъ № 16, Меглицкій считалъ глинистымъ сланцемъ, Чекановскій же относитъ ея къ слюдяно-известковымъ сланцамъ, что гораздо лучше согласуется съ общимъ характеромъ этой древнѣйшей толщи въ составѣ которой настоящіе глинистые сланцы до сихъ поръ здѣсь еще не найдены.

Отсюда начинается уже система водъ, впадающихъ въ сѣверную часть озера Косогола, съ которымъ мы ознакомимся ближе при описаніи новѣйшихъ открытій въ области р. Селенги; теперь же съ рѣчками этими намъ необходимо встрѣтиться потому, что онѣ лежатъ на пути къ вершинѣ

Мунку-Сардыка, питающего большую часть ихъ своимъ снѣ-  
гомъ. И такъ отъ маяка тропы ведутъ внизъ по направле-  
нію къ озеру Косоголу, пересѣкаетъ рч. Саганъ-Хаиръ,  
весьма быстрый правый притокъ Хангй, а затѣмъ и второй  
ея притокъ, извѣстный подъ названіемъ Хуху-молоссу,  
берущій начало въ отрогѣ южнаго склона Мунку-Сардыка,  
называемомъ Янгйтъ или Янгйтъ-ула (тоже Канге,  
можетъ быть Хангѣ? у Радде), и около впаденія Хуху въ  
Хангу переходить на лѣвый берегъ послѣдней, не повидавъ  
котораго, путешественникъ достигаетъ уровня Косогола, ле-  
жащаго на высотѣ 5425' н. ок. <sup>1)</sup>. Все это пространство  
покрыто густою растительностью, съ характеромъ альпій-  
скихъ луговъ въ верховьяхъ рѣкъ, а ниже въ видѣ степной  
флоры; въ долинахъ побочныхъ рѣкъ сплошныя про-  
странства покрыты видами Carex; мѣстами долины явля-  
ются торфянистыми; около лѣваго склона долины Хуху-мо-  
лоссу, въ двухъ верстахъ отъ устья, находится маленькое  
солончаковое (гуджиристое) озеро. Составъ почвы измѣнился  
здесь въ томъ отношеніи, что между Саганъ-Хаиромъ и  
Хуху-молоссу появилась базальтовая лава, обнажающаяся и  
на лѣвомъ берегу Хангй около брода, а также въ горѣ на  
правомъ берегу ея устья, называемой Кухэ-й-Булдубъ.  
Начиная съ Хангй, по направленію къ западу, съ приле-  
жащаго склона Мунку-Сардыка изливаются еще слѣдующія  
рѣчки: 1) р. Саганъ-Хужйръ, обнажающая лаву въ нѣ-  
сколькихъ верстахъ выше устья, 2) рч. Той, въ низовьяхъ  
которой выступаетъ гранито-сіенитовая порода, далѣе 3) рч.  
Урта или Таратуй, въ плоской долинѣ которой разсѣяны  
гуси лавы, среди которой замѣчаются мѣстами выступы  
гнейсовидной породы, въ которыхъ, какъ равно и въ кускахъ  
карца, разбросанныхъ по подъему на правый берегъ Урты,  
Чжановскій подозрѣваетъ не коренные выходы, а эрраты. За-

<sup>1)</sup> Цифра средняя изъ наблюденій Радде, Крыжина и Потанина.

тѣмъ слѣдуетъ 4) рч. Борохапсѹлъ, протекающая въ низовьяхъ по кристаллическому известняку бѣлаго, желтаго и сѣраго цвѣта. Известнякъ этотъ смѣняется далѣе слюдяно-известковымъ сланцемъ, сперва перемежающимся съ нимъ, а затѣмъ играющимъ роль самостоятельной породы, танущейся черезъ прилежащую часть отрога Янгитъ непрерывно до 5) рч. Урюмъ-Хаиръ, устье которой, какъ равно и слѣдующей за ней 6) рч. Жерголанты, располагаются на визменности, обнажающей мѣстами лаву (напр. на лѣв. берегу Урюмъ-Хаира), тогда какъ верховья Урюмъ-Хаира питаются непосредственно южнымъ изъ глетчеровъ Мунку-Сардыка, вершина котораго достигается восхожденіемъ по этой именно долинѣ. Отсюда видно, что средняя часть отрога Янгитъ представляетъ плоскую вершину, превышающую на нѣсколько сотъ футовъ окружающія её долины и снабженную нѣсколькими террасами, вслѣдствіе чего Чекановскій называетъ её типичною столовою горою <sup>1)</sup>). Слѣдуя вверхъ по долинѣ Урюмъ-Хаира, гдѣ опять появляются известняки и сланцы, развитые на протяженіи около трехъ верстъ, до мѣста сліянія правой и лѣвой вѣтви этой рѣчки, можно видѣть, что прилежащій склонъ Янгита состоитъ точно также изъ сланцевъ, но порода эта покрывается здѣсь лавою, въ которую врѣзались террасы этой горы (гребни сланцевъ, пересекающіе русло лѣваго Урюмъ-Хаира, простираются на в.-с.-в. <sup>2)</sup>). По замѣчанію Чекановскаго, отъ котораго мы заим-

---

<sup>1)</sup> По сѣверной сторонѣ этой горы пролегаетъ дорога къ Дархатамъ и Дархатскому Дананну (Радде I. с. pag. 94), спускающаяся отсюда въ долину ключа Янгитъ-дабанъ-горхонъ, впадающаго въ Урюмъ-Хаиръ.

<sup>2)</sup> Относительно простиранія пластовъ у Меглицкаго находимъ (Горн. Журн. 1855. № 4, стр. 45), что простираніе это, почти сѣверное въ Манку-Сардыкѣ, переходитъ постепенно въ восточное, а около Хангинска Чекановскій опредѣляетъ простираніе это уже юго-восточнымъ; изгибъ пластовъ оказывается поэтому дугообразнымъ по простиранію.

ствовали эти свѣдѣнія <sup>1)</sup>, мощность лавоваго потока, слагающаго верхнюю часть горы Янгитъ-ула, не оставляетъ сомнѣнія, что лава этой мѣстности, затѣмъ праваго берега Урюмъ-Хаира, горы Кухэй-Булдукъ, лѣваго берега Ханги и Саганъ-Хужира составляютъ части одного и того же потока, расчлененнаго и разобщеннаго впоследствии долинами размыва, глубившимися до залегающихъ подъ лавою известняка и сланцевъ.

Восхождение на Мунку-Сардыкъ продолжается вверхъ по теченію праваго Урюмъ-Хаира, послѣ чего поднимаются на склонъ праваго берега его долины и слѣдуютъ по гребню, разобщающему названную вѣтвь Урюмъ-Хаира отъ упомянутой выше рч. Жерголанты. Снѣжная вьюга, захватившая Чекавскаго совсѣмъ неожиданно, заставила его поспѣшно извернуться къ Косоколу, не достигнувъ даже низшей границы вѣчнаго снѣга, и погону мы послѣдуемъ теперь за лѣде, восхождение котораго, какъ сказано выше, увѣнчалось полнымъ успѣхомъ.

Естественный этотъ дошелъ до праваго Урюмъ-Хаира нѣсколько другою дорогою, черезъ отрогъ Янгитъ и спустился на сѣверный склонъ, его столовой горы, на Дархатскую дорогу. Янгитъ располагается еще въ предѣлахъ древесной растительности, и потому рѣдкія лиственницы покрываютъ его восточный склонъ, достигая  $\frac{3}{4}$  ф. въ толщину; кромѣ того здѣсь наблюдаются тундровая береза (серникъ у сибиряковъ, — *Betula pana*), альпійская таволга (*Spigaea alpina* Pall.), мелколистный рододендронъ (*Rh. parvifolium* Ad.), ревень (*Rheum compactum* L.), нѣсколько видовъ альпійскихъ генціанъ (*G. pulmonaria* Turcz., *G. falcata* Turcz., *G. tenella* Pall., *G. altaica* Pall., *G. prostrata* Haenk., *G. humilis* Stev., *G. frigida* Haenk.) и т. п. Отсюда Радде спустился въ долину рч. Янгитъ-дабанъ-горхонъ и

<sup>1)</sup> Чекавскій, 1. с. pag. 380.

съ высоты 6709' <sup>1)</sup> началъ восхожденіе, пересѣкая три ключа, принадлежащихъ системѣ Урюмъ-Хаира (Урумъ-Харе у Радде); въ обломкахъ попадались на пути известнякъ и гранитъ. Перейдя третій изъ этихъ ключей (правый Урюмъ-Хаиръ по Чекановскому) и находясь уже выше границы вертикальнаго распространенія древесной растительности, достигающей здѣсь 7022', путешественникъ направился по упомянутому скалистому гребню (между Урюмъ-Хаиромъ и Жерголантою), шагая по обломкамъ гранита, чистаго полезаго шпата, сіенита, кварца, хлоритоваго и другихъ сланцевъ. На высотѣ 10296' остался предѣлъ произрастанія явно-цвѣтныхъ растеній (*Phanogamae*), а 86 футами выше (10382') расположена южная оконечность вѣчнаго снѣга (южный ледникъ), имѣвшаго здѣсь всего лишь  $\frac{1}{2}$  — 1 ф. толщины (12 іюля ст. стила 1859 г.). Изъ подъ льда высачивается здѣсь много воды, образующей источникъ Урюмъ-Хаира; температура ея оказалась равною  $+0,3^{\circ}$  R. Монголы неохотно поднимаются выше этого предѣла; они смачиваютъ этою, по ихъ мнѣнію священной, водою лобъ и виски и, творя молитву, брызгаютъ водою на четыре стороны. Оставивъ суевѣрныхъ бурятъ около этой воды, и подвязавъ подковки, Радде, вмѣстѣ съ сопровождавшимъ его казакомъ, отправился самъ къ вершинѣ, направляясь по снѣгу къ западному, высшему пику. Сначала рыхлый снѣгъ скоро смѣняется крѣпкимъ ледянымъ покровомъ, площадь котораго достигаетъ, повидимому, 8—9 квадратныхъ верстъ. По этой поверхности, отличающейся вообще синеватымъ, а мѣстами блѣдно-мясокраснымъ цвѣтомъ, что за виситъ, быть можетъ, отъ скопленій нѣкоторыхъ микро-организмовъ, Радде находилъ разсыянными не мало представителей чешуекрылыхъ, даже двукрылыхъ и перепончатокры-

---

<sup>1)</sup> Цифра, уменьшенная пропорціонально съ Сборникомъ высотъ Кропоткина I. с.

ить насѣкомыхъ, занесенныхъ сюда бурей и погибшихъ или погибающихъ еще на этой ледяной поверхности, представляющей кромѣ того довольно интересное, но въ подробности необъясненное до сихъ поръ явленіе параллельной, ювольно густой и узкой полосатости, направляющейся съ с. на ю. и независящей отъ видимыхъ щелей. Полосатость эта похожа на тѣнь, бросаемую стволиками молодыхъ деревьевъ и всего лучше замѣтна съ нѣкотораго отдаленія, тогда какъ близи она почти исчезаетъ. Въ одномъ лишь мѣстѣ всей этой площади изъ подъ льда выдается гранитная глыба (на высотѣ 10943'), вслѣдъ за которою наклонъ ледяного поля увеличился до того, что лишь съ трудомъ можно было продолжать восхождение; къ тому же въ одну изъ щелей, открытыхъ сверху тонкимъ льдомъ, провалился казакъ къ счастью лишь одною ногою. Обстоятельство это позволило части ознакомиться съ толщиною льда: въ щель эту опузилась палка длиною въ 1 сажень, вмѣстѣ съ рукою опускавшаго ее человѣка и тѣмъ не менѣе дно не могло быть еще достигнуто. Преобладающее направленіе щелей меридіональное, гораздо меньшее ихъ число направляется съ в. на з. Последнимъ направленіемъ, т. е. съ востока на западъ, отличается и узкій (до 1 ф.) скалистый гребень гольца, образующій сѣверную границу ледяного поля, возмывшаяся до 11104' н. ок. Съ него открылся видъ на сѣверную часть высшей поверхности Мунку-Сардыка, обогрѣвать которую съ высоты этого узкаго гребня можетъ прочтемъ лишь человѣкъ несклонный къ головокруженію, — то того крутой и высокій склонъ отвѣляетъ зрителя отъ раскинушагося передъ нимъ горнаго пейзажа. Оказалось, что на сѣверной сторонѣ гольца располагается еще болѣе обширное ледяное поле, площадь котораго Радде оцѣниваетъ приблизительно въ 16 — 18 кв. верстъ; около сѣверной оконечности ледника виднѣется небольшое, покрытое льдомъ, круглое озеро — Жехой (или Ехой), иначе Ехой-



екинъ-норъ, ограниченное съ сѣвера и востока зубчатою скалистою стѣною; изъ этого озера, какъ сказано выше, беретъ начало знакомый уже намъ, соименный (лѣвый) притокъ верховьевъ р. Оки.

До высшей точки Мунку-Сардыка оставалось еще до 130'. Оставивъ усталаго казака на гребнѣ, Радде сталъ восходить на весьма крутой восточный склонъ пика, по грудамъ нагроможденныхъ глыбъ гранита, и поднялся такимъ образомъ до высоты 11174', т. е. на 70' выше гребня, (температура воздуха равнялась + 1° R.), послѣ чего начался хотя и пологій подъемъ, но покрытый снѣгомъ, на столько однако рыхлымъ, что путешественникъ сталъ проваливаться въ немъ, — обстоятельство, убѣдившее его въ невозможности добраться до абсолютно высшей точки, удаленной отъ него всего лишь на 150 шаговъ и возвышающейся не болѣе какъ на 60' надъ точкою, съ которой онъ долженъ былъ начать обратный путь къ Косогоду <sup>1)</sup>). Изъ вышеприведеннаго изслѣдованія очевидно, что вѣчный снѣгъ Мунку-Сардыка нельзя еще считать настоящимъ ледникомъ: на немъ не видно ни боковыхъ, ни срединныхъ, ни даже конечныхъ моренъ, ни вообще какихъ либо доказательствъ движенія этой ледяной массы, вслѣдствіе чего Чекановскій, на основаніи описанія Радде, относитъ его къ глетчерамъ втораго разряда.

Относительно происхожденія названія Мунку-Сардыка, Радде передаетъ легенду о нѣкомъ богатырѣ, называвшемся Мунку и погибшемъ на этомъ гольцѣ во время поисковъ волшебной царевны, проживающей среди этихъ пиковъ и сидящей за золотымъ столомъ съ золотою же чашею; другіе считаютъ этого Мунку погибшимъ здѣсь сойетскимъ

---

<sup>1)</sup> Возвращаясь къ гребню, гдѣ оставался казакъ, Радде нашелъ среди россыпи скалъ засохшій экземпляръ Эверсманова суслика въ спящей позѣ; это очевидно заблудившійся индивидуумъ съ Косогольской долины.

промышленникомъ; всего же вѣроятнѣе, названіе Мунку-Сардыкъ производится отъ слова *мунку*, т. е. вѣчный и *сардыкъ* или *хардыкъ*, т. е. голецъ; съ этимъ согласуется и названіе вышлага пика Кнйтойскихъ альновъ, изслѣдованнаго Черскимъ, — Мунку-саганъ-хардыкъ (т. е. вѣчно бѣлый голецъ см. ниже), къ тому же тотъ же Мунку-Сардыкъ называется иногда конголами Мунку-зассу, что означаетъ вѣчный свѣтъ.

Въ новѣйшее время Мунку-Сардыкъ былъ посѣщенъ экспедиціею подполковника Бобыря <sup>1)</sup>. Участники экспедиціи Н. П. Бобырь, ботаникъ Прейнъ и геологъ Ячевскій принимали восхожденіе на Мунку-Сардыкъ съ южной его стороны 3 іюля 1887 г., въ сопровожденіи двухъ русскихъ и трехъ уранхайцевъ. Въ 8½ час. утра тронулись отъ устья Урюмъ-Хаира и до часу пополудни поднимались по гребню, шущему сначала между Урюмъ-Хаиромъ и Жерголантой, (Жаргаланта у Бобыря), а затѣмъ между двумя сухими, пырокими россыпами, идущими отъ Мунку-Сардыка, изъ которыхъ одна спускается въ Жерголанту, а другая въ Урюмъ-Хаиръ. День былъ пасмурный, почти постоянно шелъ дождь, тучы были покрыты туманомъ и только изрѣдка горизонтъ прояснялся на столько, что можно было отличать очертаніе горъ на разстояніи 2 и 3 верстъ. Такъ какъ Бобырь и Ячевскій производили топографическую съѣмку, то путешественники подвигались медленно. Въ часъ пополудни они достигли предѣловъ растительности. Оставивъ здѣсь лошадей, путешественники слѣдовали вдоль крутаго и остраго гребня, между вершинами сухихъ осыпей, превращающихся весьма быстро въ глубокія ущелья, и въ 3½ час. пополудни достигли южной окраины ледянаго поля. На ледникъ путешественники пробыли до 6½ час. вечера, къ 7 час. 45 мин. вечера вернулись къ своимъ лошадямъ, а къ 10 час.

<sup>1)</sup> Экспедиція эта поднималась какъ и Радде съ южной стороны Мунку-Сардыка, т. е. со стороны озера Босогола, но по другому пути: она шла прямо съ юга, между тѣмъ какъ Радде слѣдовалъ съ ю.-в.

10 мин. добрались и до юрта при устьѣ Урюмъ-Хайра совершенно промокшіе.

Топографическая съемка сопровождалась и барометрическою нивелировкой; по льду экспедиція прошла 840 шаговъ. Ледяное поле на первый взглядъ кажется эллиптическимъ пространствомъ, удлиненнымъ съ з. на в., но такая видимая форма представляетъ оптический обманъ, обусловленный довольно сильнымъ уклономъ ледника, а въ дѣйствительности ширина южной его оконечности 295 саж., а длина съ ю. на с. отъ  $1\frac{1}{4}$  до  $1\frac{1}{2}$  версты; нѣкоторая неопредѣленность въ показаніи о длинѣ ледника объясняется тѣмъ, что экспедиція не могла съ точностью опредѣлить сѣверной его границы; во всякомъ случаѣ площадь, занимаемая ледникомъ, не превосходитъ  $1\frac{1}{2}$  кв. версты. Уклонъ ледника, на разстояніи первыхъ ста сажень подъема въ направленіи къ с.-з. составляетъ около  $6^{\circ}$ , а выше достигаетъ  $17^{\circ}$ . При началѣ подъема снѣгъ былъ рыхлый, такъ что ноги путешественниковъ погружались въ него выше коленъ, но послѣ 10 метровъ снѣгъ былъ уже на столько крѣпокъ, что при помощи подковокъ, привязанныхъ къ подошвамъ, по нему можно было двигаться свободно, до тѣхъ поръ пока крутизна подъема не сдѣлала то невозможнымъ. Снѣгъ на поверхности крупнозернистый (крупчатый); діаметръ зеренъ отъ 1 до 2 мм. Поверхность льда была усыяна мелкими отверстіями отъ 5 до 30 мм. въ діаметрѣ, представляющими какъ бы устья стаканчиковъ, глубина которыхъ не превосходитъ 15 сантим. Стаканчики эти, повидимому, весьма слабо наклонены къ с. на днѣ ихъ видна желтая пыль. Снѣгъ казался покрытымъ сѣрой пылью; на западной сторонѣ онъ мѣстами на нѣкоторую глубину (1 до 3 мил.) окрашенъ былъ въ яркій вишнево-красный цвѣтъ. На льду замѣтны были двѣ системы довольно тонкихъ полосъ: одна изъ нихъ, простирающаяся съ ю. къ с. есть, повидимому, произведеніе воды, стекающей съ ледника. На западной сторонѣ эти полосы, уклоняющіяся

отъ меридіональной линіи то въ ту, то въ другую сторону, достигаютъ 1 и даже 2 метр. глубины, при ширинѣ отъ 0,3 до 0,5 метр. и можетъ быть представляютъ уже настоящія трещины во льду. Другая система болѣе тонкихъ полосокъ имѣетъ направленіе отъ з. къ в. и очень слабо выгнута къ югу. Между этими тонкими линіями попадаются и еще слабо замѣтныя линіи, пересѣкающіяся по всѣмъ направленіямъ и производящія впечатлѣніе трещинъ. Толщину льда опредѣлить было невозможно.

Съ западной своей стороны ледяное поле окаймляется узкимъ гранитнымъ гребнемъ, но въ сѣверной части ледника гребень этотъ прекращается, и границу ледника образуетъ на протяженіи 300 саж. снѣжная сѣдловина, но далѣе снова появляется гранитный гребень, имѣющій направленіе отъ з. къ в., а затѣмъ полукругомъ поворачиваетъ къ ю. и наконецъ даже нѣсколько къ ю.-з.

По южной границѣ ледяного поля, начиная отъ южной части западнаго гребня, простирается морена ледника. Въ юрней своей части она представляетъ рѣдкое нагроможденіе строреберныхъ глыбъ. Въ 70 саж. ниже нагроможденіе глыбъ становится болѣе скученнымъ и продолжается такимъ на протяженіи около 8 саж., а затѣмъ опять становится болѣе рѣдкимъ. Наибольшая ширина морены до 25 метровъ, а наименьшая въ наиболѣе скученной ея части 8 метр. Средняя величина гранитныхъ глыбъ  $\frac{3}{4}$  метр. въ діаметрѣ, но нѣкоторыя изъ нихъ превышаютъ 2 метра. На западномъ краѣ ясны слѣды ледниковой шлифовки наблюдаются на высотѣ отъ 8 — 10 метр. надъ уровнемъ ближайшаго края сѣла. Все ледяное поле не выходитъ изъ предѣловъ замкнутой котловины и не спускается въ узкія и крутыя ложбины или ручейковъ, служащихъ стоками ледника. Для того чтобы ледъ могъ выходить въ эти ложбины, ледяное поле должно было повыситься по крайней мѣрѣ на 2 метра. Стоки ледника находятся на двухъ противоположныхъ его краяхъ: одинъ въ

ю.-в. его углу образуетъ одно изъ верховьевъ Урюмъ-Хаяра, другой въ ю.-з. углу болѣе новаго происхожденія образовался черезъ прорывъ узкаго гранитнаго гребня; онъ не носитъ еще никакого названія и тоже отвѣсно падаетъ въ ущелье, выходящее въ Жерголанту.

Экспедиція нашла несомнѣнные признаки, что ледникъ Мунку-Сардыга опускался въ прежнія времена гораздо ниже чѣмъ нынѣ. Тотъ гребень, по которому поднимались путешественники, состоитъ изъ острыхъ еще глыбъ тѣхъ-же разновидностей гранита, которыя образуютъ западную границу ледниковой окраины. Глыбы эти слагаются въ призмы, углы которыхъ достигаютъ до 30 и 40°; среди глыбъ встрѣчаются и прекрасно отшлифованныя. Повидимому такое же сложеніе имѣетъ и гребень на лѣвой сторонѣ главнаго стока леданаго поля. Моренныя отложенія съ вполне ясно выраженными ихъ характерными признаками продолжаются почти до границы древесной растительности, но имѣются данныя, что ледникъ спускался и ниже границы древесной растительности. Все это указываетъ на то, что и ледникъ и снѣжная линія на Мунку-Сардыкѣ постепенно отступаетъ, а въ связи съ этимъ является и постепенное съезживание или медленное высыханіе лежащаго у подножія Мунку-Сардыка на южной китайской его сторонѣ озера Косогола.

Экспедиція Бобыря доказала, что Мунку-Сардыкъ совсѣмъ не представляетъ такой недоступности, какую ему приписывали степныя племена, обитающія у подножія Саянскихъ горъ. Мунку-Сардыкъ и весь гребень Саянскаго хребта прекрасно виденъ отъ устья р. Хоренъ, сѣверной оконечности озера Косогола. Въ этомъ мѣстѣ хребетъ представляетъ рядъ отдѣльныхъ альповъ, нагроможденныхъ на горной цѣпи имѣющей болѣе 6000' абс. выс. Мунку-Сардыкъ при абсолютной высотѣ 11.500 ф. есть самый высокій изъ этихъ альповъ или гольцовъ. Западнѣе его видно съ Косогола еще пять снѣжныхъ вершинъ: три очень близко стоящихъ къ Мунку-

Сардыку и двѣ стоящихъ далѣе къ западу особнякомъ. Всѣ эти гольцы имѣютъ своеобразныя очертанія, въ особенности второй и третій отъ Мунку-Сардыка. Цвѣтъ ихъ кажется буровато-темнымъ, но въ глубокихъ ущельяхъ и чашеобразныхъ углубленіяхъ видны бѣлыя пятна вѣчныхъ снѣговъ (фирновъ). Западный изъ этихъ двухъ гольцовъ (т. е. третій отъ Мунку-Сардыка) представляется грубо-, неправильно-мординоватымъ и вѣроятно состоитъ изъ изогнутыхъ пластовъ пѣйса. Восточный (т. е. второй) не имѣетъ глубокихъ, длинныхъ рывинъ, но производитъ впечатлѣніе безпорядочно нагроможденныхъ каменныхъ глыбъ и, повидимому, состоитъ болѣе изъ гранита, чѣмъ изъ гнейса. Въ высотѣ своей эти гольцы нѣкогда уступаютъ Мунку-Сардыку. Съ сѣверной стороны, изъ этой долины Иркутъ, Мунку-Сардыкъ совсѣмъ не виденъ; надъ на него открывается только съ перевала Нуху-Дабанъ. Сѣверный склонъ Мунку-Сардыка необыкновенно крутъ, вслѣдствіе чего и взобраться на Мунку-Сардыкъ съ этой стороны нѣвозможно. Текущія съ его сѣвернаго склона рѣки Бутуте, Жокей-хаиръ, Хайремъ, Хайрлинъ падаютъ водопадами и несутъ громадныя глыбы горныхъ породъ; мелкой гальки въ нихъ почти нѣтъ.

#### в) Отъ Хангинскаго Караула до Тункинской котловины.

Возвратившись къ Хангинскому Караулу, направимся теперь внизъ по долинѣ Иркутъ по направленію къ тѣмъ называемой Тункинской котловинѣ.

Упомянутое выше суженіе долины Иркутъ <sup>1)</sup> ниже Хангинска образуется невысокими лѣсистыми отрогами прилегающихъ горъ и, такъ сказать, начинается двумя, отчасти

<sup>1)</sup> Нѣсколько выше упомянутой далѣе Ханги въ Иркутъ впадаетъ съ сѣверной стороны рѣ. Эрханъ, берущая начало у подошвы сѣвернаго склона Мунку-Сардыка, а ниже—Ханги-Хазарху и Алху (Чокановскій).

обособленными горами, изъ которыхъ одна, — на правомъ берегу Иркута, располагается около устья р. Ханги, а другая почти такая же (до 300' высоты надъ Иркутомъ) и снабженная террасами, отрѣзана отъ отроговъ лѣваго берега рѣки долиною знакомаго уже намъ Булука. По лѣвому берегу Иркута проходитъ и дорожка, ведущая въ Туранскій караулъ и Тунгу, пересекая стѣсняющіе долину отроги предгорья Тункинскихъ альповъ и удаляясь вообще дугообразно отъ Иркута.

Сначала переходятъ два ключа, извѣстные подъ названіемъ Верхняго и Нижняго Хокюръ-горхонъ (*Хоюръ* или *Хоуръ* означаетъ два, а *горхонъ* — ключъ) изъ нихъ на Верхнемъ Чекановскимъ найдены валуны желтоватаго и бурожелтаго пестраго грасса, содержащаго въ изобиліи куски и осколки мелко пузыристой, пензювидной лавы чернаго цвѣта, тогда какъ долина Нижняго-Хокюръ-горхона состоитъ изъ неслоистаго отложенія съ валунами и острореберными глыбами (остряками) кристаллическихъ породъ, стоящаго въ связи съ упомянутыми выше конгломератами около Хангинскаго караула и распространяющагося далѣе внизъ по долинѣ, смѣняясь мѣстами розсыпями, какъ напримѣръ, пройдя озерко Хара-нуръ въ долинѣ ручья Шулунъ-Сапшаша (или Шелунъ Сатлаша), гдѣ въ градахъ такихъ остряковъ, расположенныхъ рядами, Кропоткинъ <sup>1)</sup> подозрѣвалъ ледниковыя морены, тогда какъ Чекановскій склоняется разсматривать ихъ какъ результаты позднѣйшаго преобразованія ледниковыхъ наносовъ перемежавшимися руслами горнаго потока, — объясненіе гораздо болѣе правдоподобное, тѣмъ болѣе, что даже ледниковое происхожденіе этихъ неслоистыхъ наносовъ, какъ равно и конгломератовъ окрестностей Хангинска <sup>2)</sup>, положи

<sup>1)</sup> Кропоткинъ, 1. с. pag 29.

<sup>2)</sup> Черскій, Изв. Сиб. Отд. И. Р. Геогр. Общ. Т. XII. № 4 и 1881.

тельно еще недоказана, какъ это видно изъ критическаго разбора мнѣній по этому предмету, помѣщеннаго въ статью Черскаго о слѣдахъ древнихъ ледниковъ въ восточной Сибири. Далѣе тропа достигаетъ узкой и глубокой, ущелистой долины Хара-желгой (Черная долина), ближе къ верховьямъ которой Чекановскій наблюдалъ глыбы гранита и гнейса, лежащія въ дресвѣ отъ разрушенія тѣхъ же породъ, тогда какъ, спускаясь внизъ по этой рѣчкѣ, замѣчалась перемежаемость гнейса съ кристаллическимъ известнякомъ. Последняя изъ названныхъ породъ обнажается и въ склонѣ слѣдующей затѣмъ горы Хара-дабанъ, достигающей 4100' н. ок., вслѣдъ за которою дорога пересѣкаетъ сначала три безымянныя правые притока рч. Борохтуй, а затѣмъ спускается въ самую рѣку, поворачивая внизъ по ея теченію, и, образовавъ по ней три брода, подымается на высоту лѣваго берега этой долины, проходя мимо группы Борохтуйскихъ озеръ. Мѣстность, на которой располагаются эти небольшія озера, отличается неровною поверхностью: на ней, по изслѣдованіямъ Чекановскаго, замѣчаются скопленія холмовъ различныхъ размѣровъ и удлиненныхъ валовъ, то округленныхъ, то съ острыми гребнями, нередко крутыхъ и разобщенныхъ столь же неправильными углубленіями почвы, состоящей изъ упомянутаго выше напоса съ глыбами и валунами. Нѣкоторыя изъ такихъ окруженныхъ углубленій, похожихъ на провалы, заполнены водами и образуютъ нынѣ названныя озера, не имѣющія стока. Отсюда дорога начинаетъ уже приближаться къ долинѣ Иркутки; направляясь по возвышенности (до 100' надъ Иркуткой), устланной острореберными глыбами гнейсо-гранита, гнейса и переходовъ его къ слюдяному сланцу, она достигаетъ рч. Нуръ-Кутулъ. Около ея впаденія въ Иркутку, въ мѣстности, называемой Нурай-Хулъ («хвостъ или конецъ розсыпи» по Чекановскому), оканчивается наносное отложение съ глыбами и валунами. Основаніе покинутой воз-



вышенности состоитъ изъ кристаллическаго известняка, развитаго и нѣсколько ниже по Иркуту. Наконецъ, за Нурь-Кутуломъ остается еще одинъ отрогъ, — гора Кутулъ, примыкающая къ Иркуту крутымъ, почти отвѣснымъ склономъ, по краю котораго проложена дорожка <sup>1)</sup>, ведущая къ низменности, населенной Туранскими бурятами <sup>2)</sup>; около улуса переѣзжаютъ на правый берегъ Иркута, гдѣ, на продолженіи той-же равнины, располагается Туранскій караулъ (51°37' с. ш. 119°21' в. д.) на высотѣ 2900' н. ок.

Равнина эта снабжена какъ лугами и пахатной землею, такъ и лѣсами, тянущимися вдоль праваго берега Иркута; буряты, какъ равно и живущіе здѣсь 11 дворовъ казаковъ (въ 1878 г. ихъ было 72 д. об. п., въ томъ числѣ м. п. 35, изъ нихъ въ рабочемъ возрастѣ 17) занимаются хлѣбопашествомъ, нерѣдко страдающимъ отъ раннихъ морозовъ; гречиха поэтому, а также и пшеница даютъ плохіе сборы. Земель этимъ казакамъ отведено 340 дес., засѣваютъ они десятины 40, а на прекрасныхъ пастбищахъ держатъ до 60 лошадей, 75 штукъ крупнаго рогатаго скота и 90 мелкаго скота <sup>3)</sup>. Въ Туранскомъ караулѣ находится кромѣ того складъ хлѣба для Хангинскаго и Окинскаго карауловъ. Здѣшняя флора все еще имѣетъ горный характеръ. Только одна изъ здѣшнихъ ивъ (*Salix phylicifolia* L.) встрѣчается и въ Петербургской флорѣ. Изъ растеній, спускающихся и въ Сибирскую равнину, встрѣчаются здѣсь *Aconitum ambiguum* Reich. и *A. Kusnetzowi* Rch., изъ горныхъ растеній Алтайско-Саянской системы: *Caragana jubata* Poir., *Artemisia laciniata* W., *A. macrobotrys* Led., *Saussurea foliosa* Led., *Salix Kochiana* Trautv

<sup>1)</sup> Въ горѣ этой обнажена весьма нетипическая, сланцеватая порода зеленого цвѣта, которую Чекановскій относитъ къ полевошпатовымъ.

<sup>2)</sup> Склонъ состоитъ сначала изъ лавы, а въ нѣсколькихъ верстахъ ниже выступаетъ кристаллическій известнякъ (Чекановскій).

<sup>3)</sup> Матер. по изслѣд. хоз. быта сельс. насел. Иркутск. губ. 1891. Т. стр. 154 — 156.

Наконецъ въ мѣстнымъ саянскимъ горнымъ типамъ принадлежатъ *Saussurea denticulata* Led. и *Salix chlorostachysa* Turcz.

Близъ Туранскаго караула, но нѣсколько ниже его, находится въ Иркутъ значительный лѣвый притокъ его, известный подъ названіемъ Ихэ-угунъ (Еке, или Ике-угунъ; иже означаетъ большая а *уунъ*—вода); верховья его располагаются въ Тункинскихъ альпахъ гораздо западнѣе, почти на меридіанѣ Хангинскаго караула (118°41' в. д.), откуда широкая долина его углубляется въ склонъ альповъ сначала діагонально (на в.-з.-в.), а затѣмъ продольно (на в.), послѣ чего, уже въ небольшомъ разстояніи отъ Иркутъ, она суживается почти до значенія ущелья и поворачиваетъ направо къ устью (51°38' с. ш. и 119°23' в. д.). Съ долиною этою, такъ равно и съ нѣкоторыми другими лѣвыми притоками Иркутъ, мы ознакомимся впоследствии изъ путешествія Черского по Тункинскимъ и Китайскимъ альпамъ, теперь же, следуя за Радде и Кропоткинымъ, мы заглянемъ только въ суженное и живописное низовье этой многоводной рѣчки, которая расположена, такъ называемая Нилова пустынь, основанная известнымъ преосвященнымъ Ниломъ около вытекающаго тамъ горячаго источника. Для этого необходимо пройти небезопасный (въ большую воду невозможный) бродъ на лѣвый берегъ Иркутъ, послѣ чего дорога ведетъ въ долину Ихэ-угуна, пролегая по лѣсистой мѣстности, обильно поросшей также весьма высокими верблюжьимъ хвостомъ (*Caragana jubata* Poir.), являющимся здѣсь на восточной границѣ своего распространенія по Иркуту.

Горячій источникъ, температура котораго, по опредѣленію различныхъ путешественниковъ (Меглицкій, Шварцъ, Радде, Кропоткинъ, Черскій), измѣняется отъ 39° до 42,5°, известенъ былъ буратамъ съ весьма отдаленныхъ временъ. Особенною цѣлебностію отъ глазныхъ болѣзней славились у нихъ холодный минеральный ключъ, находящійся

на томъ же правомъ берегу Ихэ-угуна, въ 70 саженьяхъ отъ горячаго, и къ нему, даже въ настоящее время, они прѣзжаютъ изъ далекихъ мѣстностей, чтобы запастись водокъ источника. Что же касается русскихъ, то сначала развѣ только нѣкоторые изъ звѣрепромышленниковъ знали о существованіи горячаго ключа, и только, впоследствии, уже въ 30-хъ годахъ текущаго столѣтія, провѣдалъ какъ-то о нихъ тункинскій пограничный приставъ Черепановъ <sup>1)</sup> и довелъ объ этомъ до свѣдѣнія тогдашняго генераль-губернатора Восточной Сибири, Руперта, по распоряженію котораго, въ 1840 г., воды эти были подвергнуты химическому анализу аптекаремъ Калау и инспекторомъ иркутской врачебной управы Сорочинскимъ. Горячая вода ключа оказалась совершенно безцвѣтною и имѣющею слабый сѣрный запахъ и едва замѣтный соляной вкусъ; на поверхности камней она образуетъ бѣлый осадокъ, а на днѣ выдѣляетъ кремневую кислоту. Въ фунтѣ этой воды, при давленіи воздуха отъ 29 дюйм. 2 линіи до 29 дюйм. 9 линій и при температурѣ отъ 29 до 31,5° найдено: кремнекислоты 0,38, углекислаго натра 0,85, солянокислаго натра 1,28, сѣрнокислаго 3,54 и сѣрнокислой извести 0,40 грановъ. Врачи признали источникъ полезнымъ при ревматическихъ, накожныхъ и другихъ болѣзняхъ и съ тѣхъ поръ, сдѣлавшись общеизвѣстными, воды эти стали привлекать къ себѣ многихъ, причемъ въ томъ же 1840 г. для кую мѣстность эту расчистили и приступили къ нѣкоторымъ постройкамъ, и, кажется, первою изъ русскихъ, получившимъ облегченіе отъ болѣзни, была жена самого Руперта, страдавшая сведеніемъ руки. Наконецъ въ 1845 г. посѣтилъ эту мѣстность Иркутскій преосвященный Нилъ совместно съ Рупертомъ и выразилъ желаніе учредить здѣсь пустынь, воздвигнуть церковь во имя преподобнаго Нила Столбинскаго.

---

<sup>1)</sup> Н. Поповъ, Николаевская пустынь. Зап. Сиб. Отд. И. Р. Географ. общ. 1884 г. Кн. VII. Смѣсь, стр. 53.

которая и началась строиться въ 1848 г. на собранныя на то средства, на лѣвомъ берегу рѣки, насупротивъ горячаго ключа; въ 1851 г. на лѣвомъ же берегу рѣки заложенъ новый домъ для архіерея ( $51^{\circ}41'$  с. ш.  $119^{\circ}21'$  в. д.  $2641'$  н. ок.) и утвержденъ штатъ для пустыни, возложившій на нее и миссіонерскія цѣли, а впослѣдствіи, на правомъ берегу, около самаго источника, устроены кваргалы для проѣзжающихъ, кухня и ванна, соединенная съ лѣвымъ берегомъ посредствомъ моста. Въ такомъ видѣ пустынь находится и въ настоящее время, но неудобство переѣзда по горамъ и горнымъ рѣчкамъ, нѣкоторыя затрудненія въ содержаніи и отсутствіе медика удерживаетъ многихъ отъ пользованія ея водами, заставляя предпочитать Туркинскіе (на Байкалѣ) и Забайкальскіе источники, вслѣдствіе чего число посѣтителей здѣсь всегда незначительно. Относительно строенія почвы, живописная долина эта обнаруживаетъ сначала сланцы (неправильно считавшіеся глинистыми), затѣмъ гранитъ, изъ котораго вытекаетъ горячій ключъ, и гнейсъ, а выше по рѣкѣ, около устья Хонголдоя (лѣвый притокъ), обнажается кристаллическій известнякъ, пласты котораго падаютъ на с.-в. съ наклономъ въ  $45^{\circ}$  (Кропоткинъ). Въ гранитномъ плесѣ праваго берега рѣки, на высотѣ около 50—60' надъ уровнемъ Ихэ-угуна, находится небольшая пещерка до 3 саж. длины, около 2 саж. ширины и столько-же высоты, около которой, какъ равно и въ нѣкоторыхъ другихъ мѣстахъ, имѣются скамейки.

Изъ пустыни дорога опять переходитъ на правый берегъ Иркуты, слѣдуя поперекъ валообразныхъ наносныхъ возвышеній, направляющихся отъ предгорья Саяна къ Иркуту и понижающихся внизъ по теченію рѣки. На пути этомъ переѣзжаютъ низовья двухъ горныхъ потоковъ, извѣстныхъ подъ названіемъ Зангисановъ и непроходимыхъ въ большую реку; въ руслѣ ихъ кромѣ валуновъ и гальки другихъ кристаллическихъ породъ попадаются объемистые куски лавы,

изъ менѣе пузыристыхъ разностей которой приготавлиють, по свидѣтельству Черскаго, жернова (см. ниже), а 10 верстъ восточнѣе путешественникъ достигаетъ значительной равнины (до 8 верстъ шириною), въ началѣ которой расположено селеніе Шимкѣй (иначе Шинкѣй), въ 20 верстахъ отъ Туранскаго караула, на высотѣ 2600'. На этомъ протяженіи роскошный лѣсъ, преимущественно лиственничный, мѣстами-же и въ видѣ почти чистаго березняка, скрываетъ видъ на Саянъ, обнаруживающійся только въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, какъ напр. въ верховьяхъ Зангисановъ (гдѣ замѣчается нѣсколько вершинъ, изъ которыхъ восточныя округлены, а западныя нѣсколько заострены), а затѣмъ и около Шимковъ, гдѣ голыя вершины имѣють видъ столовыхъ горъ. Шимковское селеніе состояло въ 1889 году изъ 60 дворовъ, въ которыхъ жило 62 семейства (58 казачьяго и 4 крестьянъ старожиловъ). Численность всего населенія Шимки простиралась до 346 об. п. (193 м. п.). Въ пользованіи ихъ до 1.080 дес., изъ которыхъ они засѣвали 360 десятинъ, а на покосахъ и пастбищахъ содержали до 210 лошадей, 230 штукъ крупнаго рогатаго скота и болѣе 400 мелкаго <sup>1)</sup>).

На той-же равнинѣ, въ нѣсколькихъ верстахъ за Шимками, въ мѣстности, называемой Кырѣнъ, находится бурятская кумирня (Дацанъ), построенная по типу трехъ-этажныхъ китайскихъ башень, съ галлереею около втораго этажа и съ пристройкою въ видѣ подъѣзда; только углы крышъ не вздернуты и не загибаются къ верху, какъ это нормально для такого рода архитектуры, причемъ около главной кумирни, по обыкновенію, помѣщается еще нѣсколько малыхъ. Дацанъ отличается небольшими размѣрами и въ немъ не видно той роскоши, которая поражаетъ посѣтителей напр. въ забайкальскихъ кумирняхъ; бурханы (боги) не велики и

<sup>1)</sup> Матер. по изслѣд. хоз. быта сельс. насел. Иркутск. губ. 1891, Т. I, стр. 154—156.

изъ вообще не много. Кропоткинъ, посѣтившій этотъ дацанъ, сообщаетъ, что на среднемъ мѣстѣ въ немъ помѣщается главный бурханъ (Майдуръ или Майдеръ) въ стоячемъ положеніи; въ правой рукѣ его находится длинный желтый свѣтокъ, въ лѣвой большой цвѣтокъ съ зеленью; одна изъ заднихъ рукъ держитъ другой такой-же цвѣтокъ. Рядомъ съ этимъ бурханомъ помѣщается другой (Шакьямуні) и какой-то памятникъ въ родѣ обелиска, а съ лѣвой стороны третій бурханъ въ шапкѣ, напоминающей мидійскую, и злой богъ, попирающій человѣчество. Остальные образа нарисованы на полотнѣ: одинъ изъ нихъ изображаетъ красную маску, съ расположенными кругомъ ея черепами; другой—трехъ боговъ, изъ которыхъ одинъ на львѣ или тигрѣ, второй на теленкѣ, третій на быкѣ топчутъ человѣчество, — занятіе, которому предаются многіе изъ избранныхъ здѣсь бурхановъ. На потолокъ развѣшаны цвѣтныя ленты, наконецъ кресло для *ширетуя* (настоятеля) дополняетъ убранство. Въ верхнемъ этажѣ между прочимъ находится изображеніе Цаганъ-Убукгунъ, — единственнаго изъ всѣхъ буддійскихъ образовъ съ бородою, къ тому же съ длинною и бѣлою; около него стоятъ два чело-вѣка, надъ которыми свѣтитъ по солнцу: надъ однимъ бѣлое, надъ другимъ красное. Ширетуйъ объяснялъ Кропоткину, что Цаганъ-Убукгунъ есть только весьма уважаемый и богоугодный старикъ, но не святой; боги же полюбили его за то, что на заданный ими вопросъ: куда онъ странствуетъ, не взирая на столь преклонный возрастъ, — Цаганъ-Убукгунъ отвѣчалъ: искать Бога.

Всѣ эти образа привозятся изъ Китая, вслѣдствіе чего и нѣкоторые боги изображаются въ китайскихъ башмакахъ. Въ ограды Дацана расположено нѣсколько большихъ юртъ и домовъ, въ которыхъ помѣщаются ширетуй и прочее духовенство (ламы); тамъ же находится большая куча хвороста (обо), съ воткнутымъ въ нее длиннымъ шестомъ, оканчивающимся птицею. Ширетуй, какъ говорятъ, прослылъ здѣсь хо-

рошимъ врачемъ, даже среди русской части народонаселенія; врачеваніемъ же, какъ извѣстно, занимаются и многіе ламы.

Около Дацана, получившаго свое названіе отъ рч. Кыренъ (прав. притокъ Иркута), и за нимъ тянется таже степная равнина, въ началѣ которой расположено с. Шимки; степь здѣсь до того обильно заселена сусликами (*Sperophilus Eversmanni*, евражка, *зумури* у бурятъ), что въ любой моментъ можно сотни ихъ видѣть, сидящими около своихъ ямокъ, выпрямившись и уподобляясь колышкамъ, вбитымъ въ землю; собака, пущенная на нихъ, бросается и скачетъ, до того быстро мѣняя направленіе, что начинаетъ затѣмъ почти кружиться по мѣрѣ того, какъ избранный цѣлью сусликъ исчезаетъ, а сбоку и въ сторонѣ появляются десятки другихъ, столь-же быстро прячущихся въ норки; оригинальное зрѣлище это оканчивается совершеннымъ изнеможеніемъ метавшейся собаки, и она иногда останавливается или ложится, потупя взоръ и апатично вглядываясь въ траву <sup>1)</sup>).

г) Тункинская котловина, ея населеніе и окружающія ея горы.

Отъ устья Кырена равнина продолжается еще слишкомъ 30 верстъ къ востоку, внизъ по крайне извилистому теченію Иркута, обнаруживающаго здѣсь многія старыя русла: ее, т. е. равнину эту, расширяющуюся по правому берегу рѣки до 13 верстъ, можно назвать уже юго-западною и южною частью Тункинской котловины, сѣверная часть которой скрывается здѣсь еще за невысокимъ и плоскимъ отрогомъ предгорья альповъ, густо поросшимъ хвойнымъ лѣсомъ. Отрогъ этотъ, извѣстный въ литературѣ подъ именемъ Тункинскаго, начинается нѣсколько западнѣе меридіана устья Кырена, гдѣ съ запада его омываетъ S-об-

---

<sup>1)</sup> Черскій, Рукописныя замѣтки о Сибири.

разное теченіе р. Ингорги (иначе Янгорга), лѣваго притока Иркута, къ которому отрогъ этотъ подступаетъ съ лѣвой стороны своею широкою (до 15 верстъ) южною оконечностью, обнажающею сыпучій или слоистый песокъ насупротивъ устьевъ саянскихъ рѣчекъ: Хорбятки, а далѣе и Жемчуга. На меридіанѣ устьевъ этихъ многоводныхъ рѣчекъ располагается восточный и сѣверо-восточный склоны Тункинскаго отрога, обращенные къ сѣверной части Тункинской котловины, которая, въ свою очередь, достигаетъ до 20 верстъ ширины, считая съ юга (отъ лѣваго берега Иркута) къ сѣверу (къ Тункинскимъ альпамъ) и около 18 верстъ длины (съ з. на в.), отъ Тункинскаго отрога къ другому, болѣе высокому, замыкающему всю котловину съ востока и извѣстному подъ названіемъ Еловскаго отрога. Такимъ образомъ Тункинская котловина достигаетъ до 35 верстъ ширины, принимаетъ западный контуръ ея дугообразно изгибается вокругъ Тункинскаго отрога. Кромѣ названныхъ выше рѣчекъ (Хорбятка и Жемчугъ), она орошается въ южной части еще Бѣлгорхономъ (Шаманскій ручей, бѣ—шаманъ), Уланъ-горхономъ (уланъ—красный или красивый), Халегорхономъ (тало-стрѣла) и Зактуемъ—правыми притоками Иркута, берущими начало въ Саянѣ, между тѣмъ какъ густая гидрографическая сѣть сѣверной части котловины принадлежитъ главнымъ образомъ р. Тункѣ, берущей начало въ Тункинскихъ альпахъ, въ сѣверо-западномъ углу котловины, почти на меридіанѣ Кырена, и пересекающей котловину вообще диагонально съ с.-з. на ю.-в. Рѣчка эта, длиною до 35 верстъ, отличается присутствіемъ однихъ лишь лѣвыхъ притоковъ, какъ-то, считая съ запада на востокъ: Верхній и Нижній Хандагайтуй, Барунъ-Бугутый, затѣмъ Тѣлта, Зунъ-Бугутый и Хынъ-гергѣ (вѣрнѣе правый рукавъ этой рѣчки), сливающиеся въ одинъ притокъ; далѣе Шерѣдуй (правый рукавъ Хынъ-гергѣ) съ своимъ лѣвымъ притокомъ рч. Талою и рч. Хайремъ, берущая начало



изъ альповъ въ сѣверо-западномъ углу котловины и высыхающая въ низменности; точно также Хурей-Хобдкъ (*Хурей* или *Хурай* означаютъ сухой), верховья котораго располагаются хотя и въ альпахъ, но средняя часть прорѣзываетъ собою уже западный склонъ Еловскаго отрога, въ которомъ берутъ начало еще Хобдкъ, самый нижній изъ горныхъ притоковъ Тунки, а также Ахаликъ, самостоятельный лѣвый притокъ Иркуты, изливающийся всего лишь 1½ верстами ниже Тунки. Замѣтимъ здѣсь-же, что упомянутая выше р. Хынъ-гергѣ (иначе Кынь-горга или Кынь-горгѣ, что означаетъ родъ барабана, употребляемаго ламами при богослуженіи), названная такъ вслѣдствіе шума съ которымъ ея быстрыя воды мчатся по каменистому руслу въ предѣлахъ альповъ, весьма оригинальна въ томъ отношеніи, что вскорѣ (около 2 верстъ) послѣ выхода ея на равнину дна котловины, въ разстояніи до 10 и болѣе верстъ отъ устья, она раздваивается и изливается въ Тунку въ видѣ двухъ рѣчекъ, удаленныхъ другъ отъ друга на 6 верстъ, именно, въ видѣ лѣваго притока Зунъ-Бугутыя съ одной и въ видѣ Шерхолуя съ другой стороны, какъ это видно на геогностической картѣ этой мѣстности, составленной Черскимъ въ 1875 г. <sup>1)</sup> На лѣвомъ берегу р. Тунки (отчасти и на правомъ), около ея устья располагается обширное село Тунка (бывшая крѣпость), растянувшаяся до Ахалика; положеніе ея опредѣлено въ 51°45' с. ш., 120°13' в. д.; высота мѣста 2400' н. о.

Тункинское селеніе состояло въ 1889 году изъ 476 двор., не считая еще находящихся вблизи его 35 займокъ (отдѣльных хуторовъ), и заключаетъ въ себѣ вмѣстѣ съ займками населеніе до 2920 д. об. л. (1432 м. п.), изъ коихъ козаковъ было 1534, и крестьянъ 1233. Земель въ ихъ владѣніи было до 6600 десятинъ, изъ коихъ пашнями было занято

---

<sup>1)</sup> Черскій, Еловскій отрогъ какъ связь между Тункинскими альпами и Саяномъ. Изв. Сиб. Отд. И. Р. Геогр. Общ. Т. VI, № 4.

до 4000 десятинъ. Жители Тунки содержали до 2200 лошадей, свыше 2500 головъ рогатаго скота и еще мелкаго скота 3700 головъ <sup>1)</sup>).

Низкія суглинистыя и глинистыя части равнины, отчасти луговыя, отчасти съ небольшими перелѣсками, вверхъ по р. Тункѣ нерѣдко въ высшей степени болотисты, образуя топи, или непроходимыя или доступныя лишь въ очень сухое лѣто, причемъ такія мѣста (напр. въ с.-з.-ной части котловины) изобилуютъ озерами, какъ временными (послѣ таянія снѣга), такъ постоянными, изъ числа которыхъ много найдется заростающихъ и большое количество вполне уже заросшихъ; при проѣздѣ черезъ такія, сверху подсохшія мѣста, вниманіе путешественника обращаетъ на себя глухой звукъ, издаваемый каждымъ шагомъ лошади, ступающей какъ бы поверхъ пустаго пространства («пустой земля» объяснялъ бурить, провожавшій Черскаго). Среди суглинистыхъ равнинъ, во многихъ мѣстахъ котловины разбѣяны какъ уединенныя, такъ и скученныя въ группы, песчаные бугры до 1 сажени высоты, какъ напр. въ сѣверной части котловины: на западѣ отъ теченія р. Тунки, въ окрестностяхъ самого села (напр. Хорликъ) и восточнѣе устья рч. Ахаликъ, гдѣ, по направленію къ прилежащему склону Еловскаго отрога, бугры эти сливаются въ мощное отложеніе озернаго песчанаго наноса (Брасный Яръ), въ которомъ Черскій находилъ кости мамонта, носорога, лошади, ископаемаго зубра (*Bos priscus*) и серны <sup>2)</sup>; кромѣ того найденъ одинъ экземпляръ раковины *Succinea*; что же касается южной части котловины, то песчаные бугры эти, носящіе характеръ неразмытыхъ остатковъ прежде болѣе или менѣе сплошнаго и обширнаго песчанаго покрова, извѣстны въ низовьяхъ р. Жемчугъ и въ восточномъ отрѣзкѣ этой части.

<sup>1)</sup> Матер. по изсл. хоз. быта сельскаго насел. Иркутск. губ. 1891, т. I, стр. 154—156.

<sup>2)</sup> Черскій, Еловскій отрогъ I. с. рад. 175.

Тункинскіе песчаные холмы обратили на себя особенное вниманіе путешественниковъ и приобрѣли интересъ, до сихъ поръ еще далеко неисчерпанный, съ того времени, когда въ 1868 г. Поляковъ <sup>1)</sup> открылъ въ нихъ каменные и глиняныя издѣлія, указывающія на обитаемость котловины еще въ доисторическій (неолитическій) періодъ; кромѣ того въ нихъ находили черепа человѣка и металлическія издѣлія; изслѣдованіемъ холмовъ и добычею изъ нихъ древностей занимались еще Ровинскій <sup>2)</sup>, Чебановскій (I. с.) и Черскій (I. с.). По описанію послѣдняго изъ названныхъ авторовъ, высшія части поверхности этихъ холмовъ, коль скоро они не повреждены дѣйствовавшими на нихъ позднѣйшими агентами, представляютъ всегда два растительныхъ (черноземныхъ) слоя, отдѣленные песчанистымъ или суглинисто-песчанымъ пластомъ до 3—4 футовъ толщины, причемъ верхняя поверхность песчаного отложенія, лежащаго непосредственно подъ нижнимъ растительнымъ слоемъ, всегда отличается красноватымъ оттѣнкомъ, подъ которымъ начинается уже, такъ сказать, коренная, самая древняя часть песчаной толщи. Относительно распредѣленія въ этихъ слояхъ различныхъ остатковъ, Черскій приходитъ къ тому заключенію, что металлическія издѣлія принадлежатъ какъ верхнему растительному слою, такъ лежащему подъ нимъ пропластку песка; глиняныя издѣлія и кости находимыхъ здѣсь животныхъ (см. ниже) распространены отъ верхняго чернозема до слоевъ, лежащихъ непосредственно подъ нижнимъ растительнымъ пропласткомъ; наконецъ, каменные издѣлія встрѣчаются подъ нижнимъ черноземомъ, гдѣ имъ и найденъ былъ обломокъ нефритоваго топорика. Впрочемъ большая часть всѣхъ издѣлій найдена уже въ вырытомъ состояніи, въ прорѣзывающихъ эти холмы

---

<sup>1)</sup> Поляковъ, Отчетъ Сиб. Отд. И. Р. Геогр. Общ. 1868 г. стр. 140—143.

<sup>2)</sup> Ровинскій, Изв. Сиб. Отд. И. Р. Геогр. Общ. Т. I, № 4 и 5.

кожицахъ, выдутыхъ вѣтрами. Изъ каменныхъ орудій находились здѣсь преимущественно великолѣпно отдѣланные стрѣлки, обыкновенно миниатюрныхъ размѣровъ и ножики. По весьма удачной классификаціи Полякова, формы этихъ орудій приводятся главнымъ образомъ къ тремъ преобладающимъ типамъ: равнобедренный треугольникъ съ основаніемъ, иногда дугообразно вогнутымъ, эллипсисъ или овалъ, къ чему слѣдуетъ прибавить еще миндалевидныя и ланцетовидныя формы, и призма съ тремя или четырьмя гранями. Края орудій частью гладкіе, обыкновенно-же весьма красиво зазубренные, мелковыемчатые; величина отъ 12 миллиметровъ до 50. Рисунки нѣкоторыхъ изъ нихъ можно видѣть въ указанной статьѣ Черскаго. Матеріалъ, служившій для фабрикаціи этихъ издѣлій, какъ то: яшма, аморфные цвѣтные кварцы, ферросидеритъ и нефритъ, за исключеніемъ употреблявшагося также молочнаго кварца, полевошпатowychъ породъ и железно-сланцева сланца (*Eisenglimmer-schiefer*), по замѣчанію Черскаго, покажѣтъ нельзя еще назвать мѣстнымъ (изъ Тункинской долины) и указываетъ, повидимому, на сношенія жителей описываемыхъ холмовъ съ Забайкальемъ (яшма), съ сѣвернымъ склономъ Китайскихъ альповъ (нефритъ, см. выше) и съ низовьями Иркутъ, слѣдовательно и съ Ангарию (ферросидеритъ), гдѣ именно изобилуютъ названные минералы, хотя громадное количество осколковъ и малыхъ кусковъ (пулеусовъ), находимыхъ въ тѣхъ же песчаныхъ буграхъ, не позволяютъ сомнѣваться въ томъ, что орудія приготовлялись уже на мѣстѣ, т. е. на тѣхъ же холмахъ. Обломки глиняныхъ горшковъ и вообще посуды поражаютъ крупнозернистымъ сложеніемъ матеріала, такъ какъ въ глинѣ этой попадаются иногда кусочки и камешки до 8 миллиметровъ въ діаметрѣ. Черскій замѣчаетъ впрочемъ, что и современные глиняныя корчаги Тункинцевъ не могли бы быть отличны въ кускахъ отъ находимыхъ въ песчаныхъ холмахъ, съ тою лишь разницею, что такую грубую посуду нынѣшніе Тун-

кинцы не украшают никакими узорами, тогда какъ жители бугровъ считали и эти издѣлія достойными усидчиваго труда по эстетической ихъ отдѣлкѣ, состоящей въ рядахъ ямочекъ и другихъ симметрично расположенныхъ узорахъ.

Находившіяся кости, по опредѣленію Черскаго, принадлежатъ: человѣку, домашней собакѣ, соболю, бѣлкѣ, бурундуку (*Tamias striatus*), пищухѣ (*Lagomys*), сѣверному оленю, серну, кабаргѣ (*Moschus moschiferus*), домашнему барану, домашнему быку, лошади, птицамъ и рыбамъ, слѣдовательно фаунѣ, остатки которой могутъ быть найдены и въ настоящее время около любой бурятской юрты; къ тому же всѣ эти кости отличаются гораздо болѣе свѣжею наружностью, нежели напр. упомянутыя выше кости изъ Краснаго яра. То же относится и къ найденнымъ здѣсь черепамъ человѣка, видимому ничѣмъ неотличимаго отъ типа современныхъ бурятъ. Многіе изъ такихъ череповъ были находимы Ровинскимъ Поляковымъ, но уже въ вырытомъ состояніи на лѣвомъ берегу Ахалика, на глубинѣ болѣе аршина, Черскому удалось вырыть скелетъ, нижнія конечности котораго и тазовыя кости обнажились и удалены были уже раньше. Судя по позвоночному столбу, скелетъ былъ въ лежащемъ положеніи, а головою обращенъ былъ на востокъ; по всей вѣроятности это была могила и то не глубокой древности; при скелетѣ не найдено никакихъ издѣлій и вещей, которыми столь богаты могилы неолитическаго человѣка въ восточной Сибири (см. ниже). Что же касается находимыхъ на тѣхъ же холмахъ металлическихъ издѣлій, то они состоятъ обыкновенно въ обломкахъ котловъ, чашъ и ножей, въ гвоздяхъ, кузнечныхъ шлакахъ, кромѣ того здѣсь нашли еще нѣсколько кольчугъ. Къ нѣкоторой части этого періода, обнимающаго безъ сомнѣнія и время первыхъ нашихъ завоеваній въ Сибири, относится скелетъ вырытый и описанный Поляковымъ <sup>1)</sup>. На немъ сохранили

---

<sup>1)</sup> Поляковъ, I. с. pag. 139.

остатки парчевой ткани, въ которую очевидно былъ одѣтъ покойникъ; въ головахъ его находились различныя религіозныя принадлежности, какъ то: мѣдная тарелка, совершенно такой же формы, какую представляютъ тарелки, находимыя въ такъ называемыхъ чудскихъ курганахъ забайкальскаго края; въ тарелкѣ лежали бусы, сдѣланныя изъ стекла и расколовшіяся отъ времени на мельчайшія части. На лбу покойника или около висковъ, лежало нѣчто въ родѣ вѣнца, сшитаго изъ трипокъ. Гробы какъ видно не были въ употребленіи, такъ какъ все тѣло, поверхъ парчи, было обвито берестою, весьма хорошо сохранившеюся.

Кромѣ этихъ песчаныхъ холмовъ въ сѣверной части котловины, на востокъ отъ меридіана рч. Хынъ-гергѣ, между нею и Лобоконъ замѣчаются другіе, достигающіе до 20 саж. высоты и располагающіеся двумя рядами вообще съ ю.-з. на с.-в., въ поворачивающихся къ югу, отчасти и на з.-с.-з. Холмы эти состоятъ изъ лавы, измѣняющейся отъ мелкопузыристой и гребчатой до плотной, въ которой мѣстами можно видѣть кѣмъ горизонтальные слои, принимающіе ближе къ своей верхней поверхности пузыристое строеніе. Слоистость эта, зависящая отъ періодичности изліянія лавовыхъ потоковъ, была новѣйшихъ изслѣдователей (Чекановскій, Черскій) и томъ, что нынѣ обособленные холмы эти произошли отъ жива и расчлененія прежде сплошнаго и непрерывнаго лавоваго покрова, остатки котораго обнаруживаются изъ подъ холмами кромѣ того и далѣе къ юго-западу, даже въ близкихъ окрестностяхъ села (по Ахалику и около старой церкви), а болѣе подробныя изслѣдованія Черскаго показали, что и весь западный склонъ Еловскаго отрога, т. е. склонъ, обращенный къ Туинской котловинѣ, состоитъ изъ той-же лавы, покрытой наносною почвою. Поэтому мнѣніе нѣкоторыхъ изъ старыхъ путешественниковъ (Меглицкій и Кропоткинъ), считавшихъ кратеромъ небольшой лавовый холмикъ съ обращеннымъ на немъ проваломъ (*Газы кыр-урѣ* у бурятъ)

въ деревни Талой (въ системѣ рч. Шерхолуй) <sup>1)</sup>, является уже устарѣлымъ. Кропоткинъ спускался по узкому и очень крутому проходу около предполагавшагося кратера въ пещерку, расширившуюся книзу до 15 шаговъ въ длину и 10 въ ширину, при 3 саженьяхъ высоты; въ узкомъ отверстіи онъ встрѣтилъ еще ледъ, а въ расширеніи сочилась вода неимѣвшая никакого особеннаго вкуса, ни запаха; стѣны пещерки состояли изъ пузыристой лавы съ известковыми на ней натеками.

Вблизи нѣкоторыхъ изъ такихъ лавовыхъ холмовъ, изъ которыхъ самыми значительными являются Тальская вершина (Харгуни-толгдй) и Хайремскій холмъ, вытекаютъ источники, не рѣдко съ сѣрнистымъ запахомъ, считающиеся у бурятъ, какъ равно и у русскаго населенія, цѣлебными, потому около нихъ приносятся обыкновенно жертвы. Такими ключами считаются: источникъ недалеко отъ старой Тунгусской церкви; Коймарскій, около соименной миссіонерской церкви верстъ съ 12 на с.-з. отъ Тунки, около рч. Шерхолуй или Шерохолуй (вѣтвь Хынъ-гергѣ); ключъ около Тальской вершины и, наконецъ, Халуй-угунъ или Аршанъ («Теплая вода») около подножія альповъ, между упоминавшимися выше рѣчками Зунъ-Бугутый и Толта. Всѣ они, хотя и отличаются низкой температурой, тѣмъ не менѣе нѣкоторые изъ нихъ зимою не замерзаютъ. Такъ напр. 20-го января 1873 г. Черскій видѣлъ дѣйствующую водяную мельницу на рч. Талой (изъ ключа около «Тальской вершины»), покрытой лишь мѣстами рѣшетчатою плёнкою льда, въ отверстія котораго въ множествѣ ныряли водяные воробьи (*Cynclus*). Тоже относится и къ Халуй-угуну, замѣчательному еще въ томъ отношеніи, что около него почва состоитъ изъ такъ называемыхъ прѣсноводнаго известняка и известковаго туфа, пористаго

---

<sup>1)</sup> Меглицкій и Кропоткинъ, Горн. Журн. и Зап. Сиб. Отд. II. I. Геогр. Общ. (I. с.).

летнего, слоистаго, мѣстами въ изломѣ похожаго на годичныя кольца разрѣза древесныхъ стволовъ. Известнякъ этотъ, по изслѣдованіямъ Черскаго <sup>1)</sup>, обнажается тамъ изъ юды поросшей лѣсомъ поверхности на пространствахъ около 1 квадр. версты. Не смотря на общую горизонтальность слоевъ этой породы, обнаруживающуюся въ пещѣ и провалахъ, поверхность известняка опускается къ своей южной окраинѣ рядомъ уступовъ до 3 ф. высоты, окруженныхъ невысокими, почти отвѣсными или круто наклоненными стѣнками въ видѣ валиковъ, направляющихся по дугобразнымъ, пересекающимся линіямъ, вслѣдствіе чего значительная часть мѣстности раздѣлена на небольшіе сегменты, придающие ей весьма оригинальный видъ, въ особенности потому, что валики эти образуются крутостоящими, скорлупчатыми и соотвѣственно изогнутыми слоями пористаго известняка, придающими всему явленію характеръ искусственнаго сооруженія. Мѣстность эта сдѣлалась извѣстною еще съ 1809 г., когда послѣ открытія ея Бергомъ и Цитовичемъ, по порученію Иркутскаго губернатора Трескина, она была многократно изслѣдована командированнымъ туда инженеръ-поручикомъ Чертовымъ <sup>2)</sup>. Чертовъ дѣйствительно призналъ вышесказанные выше валики «древними развалинами неизвѣстнаго города», строившагося лѣпною работою, полагая, что часть уцѣлѣла часть «амфитеатра гражданской архитектуры», развалинутаго въ честь протекающаго тутъ же минеральнаго источника. Черскій <sup>3)</sup>, отъ котораго мы заимствовали эти свѣдѣнія, объясняетъ все это лишь оттоженіями древнихъ извѣстныхъ ключей, накопившихъ около своихъ выходовъ или менѣе коническіе осадки туфа; отъ разрушенія

<sup>1)</sup> Черскій, 1. с. pag. 179—180.

<sup>2)</sup> Чертовъ, Зап. Сиб. Отд. И. Р. Геогр. Общ. Т. I, смѣсь стр. 13.

<sup>3)</sup> Черскій, Что такое «древнія развалины, найденныя въ окрѣпости Тунки въ 1809 г.»? Изв. Сиб. Отд. И. Р. Геогр. Т. 7. № 4 и 5, стр. 155.



условія, ведущія роковымъ образомъ къ такимъ послѣдствіямъ Крестьяне, какъ замѣчаетъ Черскій <sup>1)</sup>, искони вѣровали до сихъ поръ, какъ извѣстно, вѣруютъ въ различныхъ до мовыхъ, лѣшихъ, водяныхъ и во все чудесное, по этому не удивительно, что, поселившись съ бурятами и хорошо ознакомившись съ ними, они приходятъ къ убѣжденію что между ихъ вѣрованіями *de facto* существуютъ лишь небольшія различія. («Народъ-то онъ не крещеный, — тварь такъ она тварь и есть», говорятъ они о бурятахъ, — «а такъ все какъ и у насъ, да еще куда какъ обходительнѣе съ бѣдными съ своимъ братомъ, да и съ нашимъ русскимъ, а потому, что ихня вѣра крѣпче нашей»). При такихъ условіяхъ простолюдинъ этотъ принимаетъ почти безъусловно всѣ бурятскія названія духовъ и мелкихъ боговъ: все дѣло тутъ собственно и состоитъ въ названіяхъ, такъ какъ *хандай* есть тотъ-же лѣшій *угутъ* — тотъ-же водяной, а грозная и дикая природа мѣстности даетъ слишкомъ много непонятныхъ и страшныхъ явленій, слишкомъ много печальныхъ приключеній во время необходимыхъ путешествій, охоты, промысловъ и т. п., что бы не свалить все это на могущество и немилость сора мѣрно сильныхъ и грозныхъ здѣсь духовъ. Для расположенія этихъ духовъ въ свою пользу и вообще для охраненія отъ ихъ невыгодныхъ для человѣчества продѣлокъ, русскіе крестьянннъ, поставленный лицомъ къ лицу съ этою грозною природою, находятъ у бурятъ цѣлый рядъ средствъ, за торья, какъ за новыя, своеобразныя и приспособленныя мѣстнымъ условіямъ, къ тому-же нерѣдко весьма эффектинъ и всегда удобопонятныя (напр. угощеніе табакомъ, водкою хлѣбомъ, деньгами и т. п.), онъ можетъ только чувствовать къ своимъ учителямъ нѣкоторую долю благодарности. О заучиваетъ эти рецепты («такое ужъ братское [т. е. бур

<sup>1)</sup> Черскій, Изв. Сиб. Отд. И. Р. Геогр. Общ. Т. XII № 4 стр. 62.

кое] мѣсто, говорятъ они, безъ этого тутъ нельзя»), пере-  
иживаетъ ихъ со своими традиціонными и усваиваетъ ихъ  
точно также, какъ одинъ изъ знакомыхъ Черскому бурят-  
скихъ шамановъ усвоилъ себѣ привычку крестить (по рус-  
скому обычаю) ротъ во время акта зѣванія, прибѣгая къ  
той, чисто практической для него, охранительной мѣрѣ даже  
при совершеніи имъ шаманскаго богослуженія. Такимъ обра-  
зомъ и произошла эта оригинальная смѣсь воззрѣній и вѣ-  
рованій, совмѣстившая въ себѣ идолопоклонническія жертвы  
и молитвою христіанина, — шаманство съ крестнымъ знаме-  
нѣмъ! Къ тому-же, не однѣ лишь воззрѣнія, но и бурятская  
привычка, успѣла уже проникнуть въ нѣкоторую часть русскаго  
населенія, черезъ посредство ясачныхъ, быстро обнаружи-  
лась въ складѣ лица, что, по свидѣтельству Крopotкина <sup>1)</sup>,  
въ особенности замѣтно на казакахъ, поселенныхъ здѣсь съ  
1709 года.

Указанія выше условія плодородныхъ почвъ, можно  
сказать, гарантируютъ успѣхъ ежегодныхъ посѣвовъ, если  
только не случится засуха или-же не испортитъ хлѣбъ по-  
павшійся время отъ времени особенный родъ саранчи  
(«кобыла»). Поэтому, не взирая даже на далеко несовер-  
шенный способъ воздѣлыванія пашни и сравнительно не-  
большой въ сложности посѣвъ, среднее теченіе Иркутъ снаб-  
жаетъ хлѣбомъ не только многихъ бурятъ, но и нѣкоторые  
крестьяне, расположенныя въ началѣ низовьевъ рѣки, а также  
недалеко юго-западной оконечности оз. Байкала, и, если бы  
походству не мѣшала ущелистая часть теченія Иркутъ, то,  
въ лучшемъ хозяйствѣ, нѣкоторый излишекъ могъ бы удобно  
вывозиться и въ г. Иркутскъ. Сильные поляки, во мно-  
гихъ поселявшіеся въ Тункѣ (въ 60-хъ и 70-хъ годахъ),  
сказали, что тамъ весьма успѣшно могутъ произрастать  
и различныя овощи лучшихъ породъ, сѣмена которыхъ,

<sup>1)</sup> Крopotкинъ, I. с. pag. 15.

какъ равно и лучшихъ сортовъ табаку, даваго въ свою очередь хорошій сборъ, выписывались ими изъ Варшавы. Удобныя мѣста для скотоводства позволяютъ, въ свою очередь, заводить немало какъ рогатаго, такъ и другаго скота, а если прибавить ко всему сказанному, что черезъ Тунку протекаютъ какъ скотопрогонныя, такъ отчасти и торговые пути въ Монголію (къ Косоголу), въ Забайкалье (по р. Жемчугу см. ниже) и даже въ Минусинскій округъ и къ Алтаю, то будущность Тункинцевъ (хотя и отдаленная) кажется вполне обеспеченною.

Всѣхъ осѣдлыхъ селеній въ Тункинской котловинѣ 5. Кромѣ уже упомянутыхъ—Туранскаго, Шимковскаго и Тункинскаго есть еще въ котловинѣ 2 селенія. Изъ нихъ 1) Талое расположено въ десяти верстахъ къ с.-з. отъ Тунки на небольшомъ притоцѣ р. Тунки, и состоитъ всего только изъ 15 дворовъ и около 70 жит. крестьянъ старожиловъ (35 м. п.) Въ ихъ владѣніи состоитъ 150 дес. земли, въ томъ числѣ 110 дес. пашни. Содержать они до 60 лошадей, 75 штукъ крупнаго рогатаго скота и до 90 штукъ мелкаго скота. 2) Ахаликъ къ с. в. отъ Тунки на рч. Ахаликъ. Селеніе это съ записками состояло въ 1889 г. изъ 66 дворовъ. Въ нихъ живутъ 38 об. п. (до 200 м. п.) крестьянъ старожиловъ. Въ ихъ владѣніи болѣе 1300 дес., въ т. числѣ 740 дес. пашни. Содержать они болѣе 400 лош., 260 шт. крупнаго рогатаго скота и 670 мелкаго.

Всѣ эти селенія, вмѣстѣ съ 3 селеніями Торской котловины и находящимся уже за водораздѣломъ Иркутска и Байкала, на берегу самаго Байкала селеніемъ Култукъ, о которомъ мы будемъ говорить ниже, образуютъ въ административномъ отношеніи одну русскую Тункинскую волость; ибо съ нею расположены кочующіе на своихъ земляхъ бурятъ управленіе которыми сосредоточено какъ увидимъ ниже Торской или Тункинской степной Думѣ, расположенной правомъ берегу Иркутска уже въ Торской котловинѣ (см. ниже). Все русское населеніе Тункинской волости разн

щается слѣдовательно въ 9 семеніяхъ и 38 займкахъ, заключающихъ въ себѣ 806 дворовъ и болѣе 4500 жит., въ томъ числѣ крестьянъ 2345 (1196 м. п.) и казаковъ 2160 (1095 м. п.). Въ числѣ крестьянъ всего только 18 ссыльно-поселенцевъ, остальные крестьяне — старожилы. Земли во владѣніи всего русскаго населенія волости до 12 тыс. десятинъ, изъ которыхъ они держатъ подъ пашнею половину, а именно 6 тыс. десятинъ, т. е. по 6 десятинъ на cadaго взрослого работника или по  $2\frac{3}{4}$  дес. пашни на душу м. п., что достаточно указываетъ на то, что русское населеніе Тункинской волости чисто земледѣльческое. Благодаря обилію луговъ и пастбищъ, домашнихъ животныхъ русское населеніе Тункинской волости держитъ много. Количество взрослыхъ лошадей у нихъ до 3500, т. е. болѣе  $4\frac{1}{2}$  на дворъ, крупнаго рогатаго скота до 4000, т. е. около 5 на дворъ, и мелкаго скота еще 5600 штукъ. Безлошадныхъ хозяйствъ всего только 7 %.

Въ Тункинскомъ инородческомъ вѣдомствѣ числится бурятъ до 11.700 д. об. п. (6050 м. п.), размѣщающихся въ 2350 дворахъ. Во владѣніи ихъ состоитъ до 38.400 дес. земли, изъ коихъ подъ пашнями 11.300 дес., значительно болѣе 2 дес. на душу м. п. или  $3\frac{3}{4}$  дес. на cadaго взрослого работника, что уже прямо показываетъ, что осѣвшее въ Тункинской и Торской котловинахъ и сдѣлавшееся здѣсь поддѣльнымъ и отчасти земледѣльческое бурятское населеніе все-таки занимается болѣе скотоводствомъ чѣмъ земледѣліемъ. И дѣйствительно, Тункинскіе буряты содержатъ до 12.500 взрослыхъ лошадей, т. е. болѣе 5 на хозяйство, болѣе 21.500 крупнаго рогатаго скота, т. е. болѣе 9 на хозяйство, и сверхъ того свыше 13 тыс. штукъ мелкаго.

Вообще говоря, Тункинская и Торская котловина представляетъ весьма хорошую колонизаціонную площадь, равно удобную для земледѣлія, такъ и для скотоводства. На то достаточно указываетъ флора котловинъ, которая въ сыроватыхъ

и тѣнистыхъ мѣстахъ заключаетъ въ себѣ болѣе европейско-русскихъ видовъ чѣмъ азіатскихъ. Къ такимъ видамъ относятся напримѣръ: *Thalictrum pinus* L., *Arabis hirsuta* L., *Valeriana officinalis* L., *Crepis praemorsa* Less., *Pyrola secunda* L., *Moneses grandiflora* Salisb., *Epipogium Gmelini* Rich., *Goodyera repens* R. Br., *Acorus calamus* L., *Typha latifolia* L., *Carex panicea* L. Къ этимъ растеніямъ на болѣе сухихъ скатахъ присоединяются еще нѣкоторыя сибирскія растенія (напр. *Saussurea discolor* DC. а также обще-полярныя, какъ напримѣръ *Saussurea alpina* DC., но въ особенности растенія алтайско-саянскаго подгорья, какъ напримѣръ: *Thalictrum petaloideum* L., *Berberis sibirica* Pall., *Sysimbrium humile* C. A. Mey., *Neottia kamtschatica* Spr., *Selaginella borealis* Beauv., и только немногія—свойственныя только здѣшней подгорной флорѣ, какъ напр. *Carex Redowskiana* C. A. Mey. Замѣчательно, что тамъ, гдѣ котловина суживается, какъ напримѣръ при поворотѣ Иркутъ на сѣверъ, гдѣ ее уже стѣсняютъ близко подходящія горы, тамъ флора носитъ болѣе субальпійскій характеръ; такъ на скатахъ около дер. Тибилты встрѣчаются уже растенія субальпійскаго типа, какъ напримѣръ арктическія формы: *Alsine stricta* Wahl., *Potentilla nivea* L. и *Carex capitata* L., или субальпійскія растенія алтайско-саянскаго нагорья, какъ напр. *Dontostemon integrifolium* C. A. Mey. или мѣстныя растенія субальпійской зоны какъ напримѣръ *Rhododendrum parvifolium* A. DC.

На сколько хороша и удобна равнина (или дно) интересующей насъ котловины, на столько красиво она декорирована по окраинамъ, въ особенности съ сѣверной стороны гдѣ цѣль Тункинскихъ альповъ (гольцы, Хойшинскій хребетъ или просто Хойши) рисуется въ полномъ своемъ блескѣ, увѣнчанная пирамидальными, коническими, и частью призматическими вершинами и выходящая на цѣлукъ третью своей относительной высоты за предѣлы вертикальнаго распространенія древесной растительности. Крутой склонъ

цѣпи опускается къ равнинѣ безъ всякихъ предгорій, пере-  
бѣдямъ многочисленными долинами горныхъ потоковъ, верх-  
няя части которыхъ расширяются болѣе или менѣе котло-  
винообразно среди упомянутыхъ выше пиковъ, разбѣообщаю-  
щихъ ихъ другъ отъ друга, тогда какъ въ промежуткахъ  
между нижними частями долинъ располагаются неподверг-  
нувшись размыву части поверхности крутаго склона, принявшія  
видъ треугольных площадокъ, обращенныхъ вершиною кверху,  
въ каждомъ изъ гребней или пиковъ, расположенныхъ между  
расширенными верхними частями двухъ сосѣднихъ долинъ.  
Этихъ придаются весьма своеобразная наружность описанному  
склону альповъ, достигающихъ здѣсь по всей вѣроятности болѣе  
8000' н. ок., такъ какъ высота одной изъ болѣе низкихъ  
и вершинъ, измѣренная Черскимъ (Хурей-Хобокскій  
голецъ), оказалась равною болѣе 5420' надъ Тункою,  
тѣловательно болѣе 7650' н. ок. (см. ниже).

Поверхностное обозрѣніе этихъ живописныхъ вершинъ  
способно расположить путешественника къ признанію гене-  
тической самостоятельности за каждымъ изъ пиковъ; подъ  
вѣдѣніемъ, вѣроятно, впечатлѣніемъ, нѣкоторые писатели <sup>1)</sup> по-  
лагали, что вершины Тункинскихъ альповъ, видѣнные ими впро-  
чемъ только съ отдаленія, состоятъ изъ изверженныхъ породъ,  
и кристаллическіе сланцы занимаютъ только склонъ цѣпи.  
Болѣе внимательный осмотръ альповъ даже съ того же отда-  
ленія обнаруживаетъ однако, что многія изъ кажущихся пи-  
ковъ, при взглядѣ на нихъ сбоку, являются крышевидными,  
перпендикулярными къ цѣпи гребнями, отдѣляющими расширенны  
части верховьевъ поперечныхъ же долинъ, и что между этими  
гребнями и отдѣльными, уединенными пиками замѣчается  
тѣмъ рядъ переходовъ, заставляющихъ полагать, что болѣе  
или менѣе обособленные нынѣ вершины альповъ обязаны  
своимъ происхожденіемъ расчлененію поперечныхъ гребней

<sup>1)</sup> Мезиндкій, I. с.

вѣтвями долинъ, играющими уже роль продольныхъ относительно направленія главной цѣпи; такія-же особенности конфигураціи высшихъ частей альповъ указываютъ прямо на то, что вершины ихъ и вся вообще зазубренность, есть слѣдствіе разрушенія и сноса породъ, выполнявшихъ промежутки между отдѣльными нынѣ пиками и зазубринами. И дѣйствительно, ближайшее изслѣдованіе этого склона Тункинскихъ альповъ и долинъ перечисленныхъ выше рѣчекъ <sup>1)</sup> обнаружилъ, что цѣпь эта вмѣстѣ съ ея пиками образуется перемежаемостью тѣхъ же, главнымъ образомъ слоистыхъ кристаллическихъ породъ, какіе развиты какъ въ верховьяхъ Иркуты такъ и по р. Окѣ, при чемъ немаловажную роль играютъ здѣсь известняки, интересные въ томъ отношеніи, что представляютъ цѣлый рядъ весьма постепенныхъ переходовъ въ полевошпатовыя породы, воспринимая зерна полевыхъ шпатовъ, кварца, пироксена, слюды и роговой обманки. Пласты этихъ породъ, не смотря на восточное направленіе цѣпи простираются вообще съ з.-с.-з. и в.-ю.-в. пересѣкая такимъ образомъ долину Иркуты діагонально, и падаютъ на ю.-ю.-з. Лавовое не найдено въ этой части альповъ ни въ видѣ коренныхъ выступовъ, ни даже въ видѣ галекъ, выносимыхъ горными потоками такъ, что цѣпь эта образовала собою сѣверную границу здѣшнихъ вулканическихъ породъ, на что указалъ уже бергшворенъ Яковлевъ (1810 г.) <sup>2)</sup>, говоря, что горы болѣе отдаленныя (т. е. Тункинскіе альпы) состоятъ изъ гнейса, а «предъидущія къ нимъ сопки составляютъ вулканическія невысокія горы», при чемъ онъ упоминаетъ о нѣсколькихъ имъ здѣсь нѣсколькихъ «кратерахъ», подразумѣвая подъ этимъ именемъ очевидно только провалы.

Рѣзкую противоположность Тункинскимъ альпамъ представляетъ Саянъ, ограничивающій интересующую насъ

<sup>1)</sup> Черскій 1. с., см. также ниже въ описаніи Тункинскихъ и Тонкинскихъ альповъ.

<sup>2)</sup> Чекановскій, 1. с.

котловину съ юга. По словамъ Полякова (1. с.), съ которымъ  
ясны и другіе путешественники, онъ является не столько  
густымъ, сколько массивнымъ, сплюснутымъ, растянутымъ  
и ширину; его вершины не рѣзко выступаютъ изъ массы  
хребта: образуя пологіе скаты, онъ вѣжутся погруженными  
и предгорье, которое, состоя изъ притупленныхъ, пологихъ,  
и покрытыхъ лѣсомъ горныхъ формъ, постепенно, сказать  
можно, террасою склоняется къ долину Иркутъ. Хребетъ  
потъ изъ Тункинской котловины посѣщался тремя путе-  
шественниками, изъ которыхъ Кропоткинъ (1. с.) и Черскій <sup>1)</sup>  
исматривали только низовья р. Жемчугъ, а Поляковъ (1. с.),  
приблизившись къ этой рѣкѣ, повернулъ къ юго-востоку, къ  
р. Хайремъ и, перейдя на ея правый берегъ, пересѣкъ всю  
ширину Саяна и спустился въ систему р. Селенги.

Путь изъ Тунки къ р. Жемчугъ ведетъ по прекрас-  
нымъ и сочнымъ лугамъ праваго берега Иркутъ и около  
таежнѣй, засѣянныхъ ячменемъ и ярицей, гдѣ путешествен-  
никъ встрѣчаетъ цѣлыя ряды бурятскихъ улусовъ, изъ кото-  
рыхъ Нурайскій (у Полякова Нуройскій) населенъ обу-  
жившимися Сойотами, живущими здѣсь въ нуждѣ и нера-  
венствѣ. Долина Жемчуга здѣсь красиво поросла видами ивы,  
тополя и березы съ густымъ подлѣскомъ спиреи (*Spiraea*  
*flexuosa* Fisch.) и розы (*Rosa sinatomea* L. и *R. Gmelini*  
Poe., причемъ особенное вниманіе обращаетъ на себя мно-  
жество піоновъ (*Paeonia anomala* L.), а также *Ranunculus*  
*longicaulis* C. A. Mey. и *Hedysarum inundatum* Turcz.).  
Совершенно другой характеръ принимаетъ эта рѣка  
и томъ мѣстѣ, гдѣ ея долина углубляется уже въ привле-  
кающій склонъ Саяна. По свидѣтельству Черскаго, мѣстность  
принимаетъ тамъ съ каждымъ шагомъ все болѣе угрюмую  
наружность; рѣка является уже въ видѣ горнаго потока (до  
12 саж. ширины), каменистаго и быстрого, вслѣдствіе чего

<sup>1)</sup> Черскій, Еловскій отрогъ 1. с.



многочисленные броды черезъ неё дѣлаются не безъопасными а въ дождливое время даже невозможными, долина же и склоны поростають густыми, мѣстами едва проходимыми хвойными лѣсами, въ чащѣ которыхъ проложена дорожка служащая между прочимъ и скотопрогоннымъ путемъ. По ней иркутскіе мясники прогоняють скотъ, купленный имъ въ системѣ рѣки Джиды, что впрочемъ сопряжено съ немалыми затрудненіями, такъ какъ быки теряются иногда въ густыхъ лѣсахъ долины и дѣлаются жертвою волковъ и медвѣдей (Черскому удалось найти пять штукъ заблудившихся такимъ образомъ быковъ и возвратитъ ихъ хозяевамъ). Въ всемъ протяженіи посѣщеннаго Черскимъ лѣваго берега долины этой рѣки, въ предѣлахъ Саяна (около 3-хъ верстъ въ утесахъ обнажались известково-пироксеновые (известково-байкалитовые) сланцы, перемежающіеся съ пластами сіенитогнейса, переходящаго мѣстами въ гранитъ, жилы которыхъ наблюдаются иногда и самостоятельно; нѣсколько выше теченію Кропоткинъ встрѣтилъ кристаллическій известнякъ. Въ составъ этого склона Саяна входятъ слѣдовательно тѣже породы, которыя слагають собою и Тункинскіе альпы, все же интереснѣе является то обстоятельство, что, по изслѣдованіямъ Черскаго, пласты этихъ породъ сохраняють здѣсь вмѣстѣ съ тѣмъ и тоже простираніе (з.-с.-з.), какъ въ альпахъ, слѣдовательно діагональное къ направленію обшарпывающей ихъ долины Иркутъ, причемъ, на что указалъ уже и Кропоткинъ, пласты наклоняются не въ сторону Тункинской долины, т. е. не согласно съ видимымъ склономъ Саяна, а напротивъ, падаютъ на ю.-ю.-з., слѣдовательно въ глубь массы самаго хребта.

Верхнее теченіе Жемчуга до сихъ поръ еще нигдѣ не изслѣдовано, не взирая на проложенную по немъ дорожку ведущую черезъ Ургудейскій караулъ (см. ниже) въ систему р. Джиды и вообще въ Забайкалье. Изъ распросныхъ свѣдѣній, нанесенныхъ и на карту Шварца, видно, что дна

линии Жемчуга должна превосходить 40 верстъ, а верховья ея располагаются къ юго-западу отъ устья, недалеко отъ истоковъ рч. Хорбатыки, о которой упоминалось выше, дорога же направляется на ю.-ю.-в., по одному изъ правыхъ притоковъ рѣчки, оставляя почти всю верхнюю половину длины течения Жемчуга на западъ.

а) Путешествіе Полякова изъ Тунки черезъ Саянъ въ систему р. Джиды.

Съ высшими точками Саяна на меридіанѣ Тункинской долины знакомить насъ только упомянутое выше путешествіе Полякова изъ Тунки въ систему р. Селенги, съ частью которой, относящеюся къ интересующему насъ хребту, мы ознакомимся въ настоящее время, оставляя другую часть маршрута до соотвѣтственнаго параграфа нашего изложенія.

Рч. Хайремъ (у Полякова Харемъ), какъ видно на картѣ Черскаго <sup>1)</sup>, составляетъ правый притокъ праваго изъ трехъ рукавовъ Жемчуга, которыми послѣдній изливается въ Иркутъ. Ненастная погода не позволила Полякову ѣхать вверхъ по долинѣ этой небезопасной рѣчки и потому онъ предпочелъ повернуть на правый берегъ Хайрема и слѣдовать по дорожкѣ, извѣстной подъ названіемъ «по Бухату», ведущей къ той-же цѣли, т. е. къ Ургудейскому (вѣрнѣе Ургудзійскому) караулу и далѣе на Джиду. Проводникъ Полякова (тункинскій казакъ) невѣрно перевелъ ему значеніе дороги по Бухату, говоря, что это значитъ «по грязямъ». Слѣдствія, собранныя по этому предмету Черскимъ <sup>2)</sup>, обнаруживаютъ связь названія дороги съ бурятскимъ преданіемъ о священномъ быкѣ, называемомъ ими *Буха-ноинз* (*буха* — порозъ, *ноинз* — высокопоставленная личность, чиновникъ),

<sup>1)</sup> Черскій, Еловскій отрогъ I. с.

<sup>2)</sup> Черскій, Рукописныя замѣтки о Сибири.

тогда какъ грязь переводится какъ *шабаръ*. Буряты рассказываютъ, что Буха-нойнъ спустился въ Тункинскую долину черезъ Саянъ, именно по этой дорогѣ, которая вслѣдъ за тѣмъ поросла полосой кедровника; сердитый онъ долго бродилъ по котловинѣ: дѣятельность его священныхъ почек породила систему рѣкъ и озеръ долины, а отъ ударовъ могучихъ копытъ и роговъ возникли пески и песчаные холмы; на одномъ изъ лавовыхъ бугровъ, недалеко отъ Хоймадской миссіонерской церкви, онъ отдыхалъ и лежалъ, вслѣдствіе чего на немъ осталось до сихъ поръ замѣтное плоское углубленіе, а холму присвоено названіе Буха-нойнъ хыптыхѣ (постель, мѣсто сна). Отсюда быкъ перешелъ черезъ Еловскій отрогъ къ востoku, въ Торскую котловину, съ которою мы ознакомимся ниже, и окаменѣлъ нѣсколько восточнѣе выхода рч. Саганъ-угунъ изъ альповъ; утесъ, въ который онъ обратился, называется Саганъ-шулунъ (бѣлый камень) и считается однимъ изъ священнѣйшихъ мѣстъ долины Иркуты, упоминаемыхъ и во время шаманства. Прибайкальскіе буряты (онгурѣнскіе), какъ полагаетъ Черскій<sup>1)</sup>, связываютъ съ этимъ утесомъ, знакомымъ имъ лишь по рассказамъ забайкальскихъ соотечественниковъ, названіе «*Мундурганъ*», относящееся, какъ говорятъ, собственно лишь къ высочайшимъ пикамъ, прибавляя къ нему еще слово *хухэй* («Мундурганъ-хухэй»), что означаетъ Хухэйскій или Кукойскій мундурганъ, — а Саганъ-шулунъ располагается именно въ районѣ бурятъ Хухэйскаго (у русскихъ Кукойскаго) улуса, высота же его въ сущности незначительная, преувеличена соотвѣтственно высокаго священнаго значенія этого блага утеса. Тункинцы, между тѣмъ, вовсе не употребляютъ названія Мундурганъ и не примѣняютъ его даже къ Мунку-Сардыку.

Долина Хайрема въ томъ мѣстѣ, гдѣ вступилъ въ нее Поляковъ, сжата пологими холмами, а по мѣрѣ углубленія

<sup>1)</sup> Черскій, Изв. Сиб. Отд. Геогр. Общ. Т. XII. № 4—5, стр. 65.

и нее, луга начали исчезать и лѣса сплочивались въ густыя и сплошныя чащи преобладающихъ хвойныхъ деревьевъ точно какъ, какъ степные виды травъ смѣнились лѣсными, какъ напр. *Epilobium angustifolium* L., *Geranium albiflorum* Led., *Trollius asiaticus* L., *Thalictrum elatum* Jacq. и *Th. baicalense* Turcz. и т. п. Покинувъ Хайремъ и повернувъ къ юго-востоку, путешественникъ на высотѣ 3090' (т. 905' надъ Тункою) встрѣчалъ еще субъальпійскій характеръ растительности, но далѣе и выше лѣса рѣдѣли, а почва оголялась; начали попадаться вершины съ песчаной почвою, поросшею сосною, а затѣмъ росыпи, крутые скаты, кедровники и грязи. Ни одинъ источникъ не встрѣчался здѣсь на пути, и только ряды оставленныхъ на время ловушекъ, ямы, выкопанныя звѣропромышленниками, и загороди, сложенные изъ неотесанныхъ деревьевъ и изъ хвороста, свидѣтельствуютъ о томъ, что эта область ищется человекомъ. Спусти два часа ѣзды Поляковъ достигъ гребня одного изъ уступовъ Саяна, называемаго Хирбой-ниургунъ (51° 34' с. ш., 120° 6' в. д.), гдѣ барометръ показалъ 5540' абс. выс. Изъ древесныхъ породъ остался здѣсь одинъ только кедръ въ видѣ сплошнаго лѣса; иглы толстымъ покровомъ задернули почву, облѣпили стволы и вѣтви кедровъ, разстилаясь и по камнямъ въ такомъ количествѣ, что лишь немногія явноцвѣтныя растенія могутъ оспаривать у нихъ область существованія. Кромѣ низкорослой березы (*Betula fruticosa* Pall.) въ толстый покровъ игелей впускаютъ еще свои корни красивый *Rhododendron chrysanthum* Pall. (голециный багульникъ), а въ розсыпяхъ и около лужъ растутъ *Saxifraga cernua* L., *Sax. sibirica* L., *Sax. bronchialis* L., *Gentiana aquatica* L., *G. humilis* Stev., *d. squarrosa* Led. и *Dracoscephalum altaense* Hilt. По замѣчанію Полякова гребень Хирбой-ниургунъ представляетъ вообще нѣчто въ родѣ окраины террасы, растаявшей передъ хребтами, образующими высшія части Саяна. На пути къ ближайшему изъ высшихъ хребтовъ нѣтъ ни глубокихъ долинъ, ни сколько нибудь рѣзко выдающихся возвышенностей;

дальше мѣстность возвышается и достигаетъ 5900' высоты, около вершины хребта Сагънъ-шолотай (или С. шулутай), начиная съ которой древесная растительность исчезаетъ и дорога подымается все выше и выше по безлѣснымъ, довольно крутымъ скатамъ, усыпаннымъ мелкимъ щебневиднымъ камнемъ, а изрѣдка и крупными розсынями. Затѣмъ, спустившись нѣсколько верстъ, Поляковъ достигъ вершины гольца Бухай-хардыкъ ( $51^{\circ} 28'$  с. ш.,  $120^{\circ} 10'$  в. д.), достигающаго 6120' высоты и очевидно связаннаго съ мифомъ Буха-ноинъ, въ чемъ убѣждаетъ уже самое названіе этой вершины. Каменистая, щебневатая почва застилается здѣсь сплошнымъ ковромъ зелени, состоящей изъ мелкихъ кустарниковъ *Empetrum nigrum* L. и *Dryas octopetala* Rich., между которыми пробиваются мѣстами виды *Carex*, *Saxifraga*, а также *Juniperus nana* W.

Обширная горная область раскинулась передъ глазами путешественника. Вершины нерѣдко выдавались изъ общей горной массы; онѣ имѣли гладкую, закругленную поверхность и продолговатое или овальное очертаніе, разобщаясь гладкими и широкими долинами; здѣсь же встрѣчена и первая на этомъ пути довольно глубокая долина рѣчки Сухарьтѣ съ пологими скатами. Дальше дорожка пролегаетъ по другой безлѣсной долинонѣ, ведущей къ Большому Ургудайскому гольцу кое-гдѣ около вершинъ, въ небольшихъ горныхъ долинахъ бѣлѣли нарастающіе снѣга (накипи или накипи отъ ключей), кромѣ того бросались въ глаза небольшія горныя озера и грязи въ долинахъ, а также отсутствіе значительныхъ розсыпей, что впрочемъ зависитъ во многихъ мѣстахъ отъ покрытія ихъ толстымъ слоемъ растительной почвы. Сѣверный олень стадами бродитъ по этой угрюмой и пустынной мѣстности, пользуясь находящимися здѣсь солонцами и отсутствіемъ назойливыхъ насѣкомыхъ; за оленемъ заходятъ сюда и хищники, въ особенности характерный для этихъ гор альпійскій волкъ, относимый предположительно въ виду *Canis*

alpinus, но никѣмъ еще не изслѣдованный по мѣстнымъ экземплярамъ и тѣмъ болѣе интересный, что остатки особеннаго вида собаки, описанной Черскимъ изъ Нижнеудинской пещеры<sup>1)</sup>, позволяютъ задать вопросъ, не принадлежать ли онѣ именно этой восточно-сибирской альпійской собакѣ, которая, въ такомъ случаѣ рѣзко отличалась бы отъ Забайкальской и Алтайской. Здѣсь же вьютъ гнѣзда пугалицы (*Chalcidius*) и сибирскій видъ бекаса (*Scolopax stenura*), весьма оригинальный въ томъ отношеніи, что, взвиваясь стрѣлою вверхъ и ритмически спускаясь оттуда книзу, онъ издаетъ громкій, продолжительный и дрожащій звукъ, напоминающій шумъ ракеты, послѣ чего разряжается сложнымъ, но прерывистымъ шиканьемъ, — явленіе, пріятно оживляющее картину сибирскаго лѣтняго вечера. Поляковъ достигъ заповѣдника Ургудѣйскаго гольца, — Ехѣ-Ургудѣй-хѣйта-хардыка (51° 25' с. ш., 120° 9' в. д.), съ вершины котораго, поднимающейся 6170' высоты, открывается еще болѣе характеристическій видъ на окрестности, нежели съ Бухай-хардыка. Округленные формы многочисленныхъ вершинъ, однообразный порядокъ, въ которомъ онѣ располагаются по всѣмъ направленіямъ, придаетъ волнистую наружность всей этой горной площади, среди которой изрѣдка замѣчаются и болѣе выдающіяся, нѣсколько конусообразныя вершины, какъ напр. одна къ юго-востоку отъ Ургудѣйскаго гольца, извѣстная подъ названіемъ «Хорошенькой мѣдной наковальни». Здѣсь же располагается и глубокая, ущелистая, узкая долина р. Ургудѣй съ расположеннымъ въ ней соименнымъ каменнымъ, но чтобы достигнуть его нужно еще описать зигзагомъ до 5 верстъ длины, по южному, очень крутому склону Ургудѣйскаго гольца, ограничивающему здѣсь названную долину.

<sup>1)</sup> *Canis Nischneudensis* Tsch. Изв. Сиб. Отд. И. Р. Геогр. Общ. Т. X. № 1 и 2-й.

Ургудэй беретъ начало верстахъ въ 5 или 6-ти къ западу отъ караула (на картѣ Шварца ошибочно въ слишкомъ 20-ти) въ видѣ трехъ быстрыхъ потоковъ, вытекающихъ изъ утесистыхъ и крутыхъ долинъ, причемъ русло его загромождено большими камнями, по которымъ пѣна и шумитъ его воды. Далѣе къ нему прибавляются многочисленныя притоки, вслѣдствіе чего около караула рѣчка имѣетъ уже нѣсколько саженой ширины, а глубина достигаетъ мѣстами такихъ размѣровъ, что иногда она становится непроходимой для лошади. Вообще долина отличается весьма дикимъ характеромъ; окружающія ее горы во многихъ мѣстахъ даже нависаютъ громадными утесами, разрѣзанными нерѣдко узкими расщелинами. Лѣса высоко забѣгаютъ по скатамъ долины, располагаясь въ причудливыхъ группахъ среди скалъ или покрывая долины сплошными рощами, состоящими преимущественно изъ кедра съ рѣдкою лишь примѣсю лиственницы, но они не достигаютъ все-таки самыхъ высокихъ частей горъ, и потому высшія части перспективъ вездѣ увѣнчаны гольцами; изъ мелкихъ древесныхъ породъ по берегамъ рѣчекъ преобладаютъ ивы и низкорослая береза, а по розсыпямъ *Juniperus sabina* L., *Berberis sibirica* Pall. изрѣдка верблюжьей хвостъ (*Caragana jubata* Poir.). Ургудэй составляетъ собою лѣвый притокъ р. Зонъ-мѣринъ, изливающейся въ Иркутъ съ правой стороны, верстѣ слишкомъ 30 ниже Жемчуга (см. ниже); на немъ построены соименныя т. е. Ургудэйскій караулъ (51° 22' с. ш., 120° 10' в. д.) на высотѣ 5110' н. ок. Караулъ этотъ, называвшійся секретнымъ, но потерявшій нынѣ свое значеніе, какъ не пограничный, имѣлъ цѣлью слѣдить за движеніемъ и перемѣнамъ бурятъ съ р. Джиды въ Тунку («Закаменскіе буряты» и въ выраженію Тункинцевъ) и обратно и осматривать билеты въ такой проѣздъ. Онъ состоитъ изъ одного домика съ единственнымъ окномъ въ квадратный футъ величиною и изъ одной деревянной юрты; сюда назначаются ежегодно четыре

каза, изъ которыхъ прїѣзжаютъ и живутъ въ караулѣ обыкновенно лишь два, привозя съ собою провіантъ на цѣлый мѣсяцъ. На долю одного изъ нихъ падаютъ заботы по домашнему хозяйству, другой-же (или поочередно) занимается обыкновенно охотою, нерѣдко весьма успѣшною по богатству дичи (кабаны, лоси, серны, бѣлки и благородные олени, козодые рога которыхъ цѣнятся, какъ извѣстно, весьма дорого). Проѣздъ бурятъ составляетъ для нихъ удовольствіе, такъ какъ, кромѣ прїятности поговорить съ этими болтливыми путешественниками, они получаютъ отъ нихъ обыкновенно маленькую дружелюбную дань въ видѣ масла, сметаны, соли и молока. Служебныя ихъ обязанности ограничиваются еще иногда развѣ воспрещеніемъ переѣзда и задержаніемъ бурятки-джидинки, бѣгущей отъ варварскаго обращенія съ юмъ мужа-тункинца или-же бурятки, уходящей по той-же причинѣ изъ Джида въ Тунку, т. е. свою родину. Казаки провозятъ сюда нерѣдко истощенныхъ лошадей для возстановленія силъ на сочной травѣ окрестностей караула, гдѣ они формѣ того заготавливаютъ значительный запасъ сѣна и сбываютъ его съ пользою скотопромышленникамъ, идущимъ со скотомъ въ Иркутскъ. Къ видамъ растеній, характеризующихъ эту область, относятся *Rheum compactum* L. (ревень), *Paraverbena officinalis* L., *Geranium pratense* L., *Ger. Wlassovianum* Fisch., *Aconitum barbatum* Patr., *Ac. Gmelini* Rch., *Ranunculus acris* L., *R. pulchellus* C. A. Mey., *Campanula cervicaria* L., *Camp. glomerata* L., *Pedicularis myriophylla* Pall., *Ped. striata* Pall., *Saxifraga cernua* L. и т. п. Одинъ изъ казаковъ засѣвалъ здѣсь однажды ячмень въ небольшомъ количествѣ, но онъ не могъ вынести раннихъ заморозковъ; кромѣ неблагоприятныхъ климатическихъ условій вообще, въ долианѣ Гурудая бывають почти ежедневные дожди съ частыми грозами; 26-го іюля въ 7 часовъ утра Поляковъ наблюдалъ  $+8,5^{\circ}$ , въ 2 ч. пополудни  $+15^{\circ}$ , а на слѣдующій день въ 6 ч. утра  $+4^{\circ}$  R.



Оставивъ Ургудѣйскій караулъ, до котораго отъ Тунки считаютъ 55 верстъ, Поляковъ направился далѣе въ югу, и переѣхавъ рч. Ургудѣй, вступилъ въ узкую и каменистую долину Утѹ-желга (Утѹ-жолга), по которой на протяженіи болѣе пяти верстъ дорожка подымалась все въ гору, пока не достигла горы, извѣстной подъ названіемъ Шулу-ургошинъ-дабанъ ( $51^{\circ} 19'$  с. ш.,  $120^{\circ} 10'$  в. д.). Высота этого перевала оказалась равною 6260'; съ нею начинается спускъ къ Зонъ-Мурину, отстоящему еще верстахъ въ 13 отъ названной высшей точки, съ которой дорога вступаетъ въ долину рч. Шулу-ургошинъ, слѣдуя внизъ по теченію послѣдней среди обильно произрастающаго здѣсь верблюжьяго хвоста.

Зонъ-Муринъ, при сліянніи съ нимъ Шулу-ургошина ( $51^{\circ} 17'$  с. ш.,  $120^{\circ} 7'$  в. д.), располагается на высотѣ 4810' и является здѣсь уже быстрою и довольно многоводною рѣкою, такъ какъ верховья его удалены отъ этого мѣста не менѣе какъ на 40 верстъ къ з.-ю.-з., на протяженіи которыхъ онъ успѣлъ воспринять не малое число притоковъ. Отсюда дорожка слѣдуетъ верстъ съ пять внизъ по теченію рѣки, болотистая долина которой густо порастаетъ лиственницею, послѣ чего переходитъ на ея правый берегъ и направляется вверхъ по рч. Кудуй. Характеръ мѣстности здѣсь уже значительно измѣняется: относительная высота, а также и скалистость горъ замѣтно уменьшается; въ долинахъ чаще появляются мокрые луга; въ составъ лѣсовъ входятъ даже сосна съ березою. Изъ долины Кудуя, который въ среднемъ теченіи ( $51^{\circ} 15'$  с. ш.,  $120^{\circ} 10'$  в. д.) достигаетъ около 4780' высоты, Поляковъ перевалилъ черезъ гору Кудуй-дабанъ (5904' абс. высоты) и спустился въ долину рч. Тухултай принадлежащей уже системѣ р. Джиды, слѣдовательно Се-ленги, вмѣстѣ съ которою мы рассмотримъ и остальную часть маршрута этого путешественника; здѣсь-же замѣтимъ только что на этомъ перевалѣ въ послѣдній разъ наблюдался чистый

иловникъ и *Dryas octopetala* Rich.; а дагѣ съ уменьшеніемъ  
лѣсовъ вообще появились уже и суслики, столь характерны  
для степныхъ долинъ Забайкалья, хотя высота этихъ степ-  
ныхъ долинъ, другими словами высота южнаго подножія Саяна,  
иногда вообще превышаетъ высоту сѣвернаго его основанія,  
то придаетъ ему въ общемъ своеобразный характеръ и  
ографическую роль окраиннаго хребта лежащаго за  
нимъ къ югу высокаго плоскогорья, какимъ является въ  
сущности область, занятая системами рр. Селенги и верхняго  
теченія Витима. Къ сожалѣнію, однако, путь этотъ, пред-  
ставляющій много обнаженій и утесовъ, до сихъ поръ не  
былъ еще изслѣдованъ въ геологическомъ отношеніи.

е) Еловскій отрогъ и Торская котловина долины Иркута.

При описаніи Тункинской котловины мы говорили уже,  
то съ восточной стороны она ограничивается отрогомъ горъ,  
вѣстнымъ въ литературѣ подъ названіемъ Еловскаго  
хребта, отъ имени протекающей среди него рч. Еловки,  
тогда какъ у мѣстныхъ жителей онъ не имѣетъ одного об-  
щаго названія и нерѣдко именуется Бычьей горой, въ  
особенности у обитателей Торской котловины (на востокъ отъ  
отрога), отъ которыхъ эта гора всего ближе. Начиная отъ  
южнаго подножія Тункинскихъ альповъ, между рч. Хайремъ  
и системою правыхъ притоковъ р. Саганъ-Угунъ (см. ниже),  
широкою до 20 верстъ ширины, Еловскій отрогъ, подробно  
изслѣдованный Черскимъ (I. с.), придерживается направленія  
с ю.-ю.-в. до мѣста пересѣченія его съ Иркутомъ (20 верстъ  
отъ альповъ), протекающимъ здѣсь на в.-с.-в. къ Торской  
котловинѣ. Отрогъ суживается въ этомъ мѣстѣ до 11 верстъ  
и, начиная съ праваго берега Иркута, принимаетъ юго-за-  
падное направленіе, послѣ чего, въ 4—5 верстахъ южнѣе,  
соединяется съ сѣвернымъ склономъ Саянскаго хребта, ограни-

чиваясь съ востока широкою долиною нивовъ въ знакомой уже намъ отчасти р. Зонъ-Мурина, а съ запада общею долиною нижняго теченія рѣчекъ Кукүрика и Затуя. Иркутъ такимъ образомъ раздѣляетъ Еловскій отрогъ на двѣ части: сѣверную или Тункинскую и южную или Саянскую. Округленныя вершины отрога обусловливаютъ волнистую линію его продольнаго разрѣза, и потому наружность его рѣзко отличается отъ смѣлыхъ контуровъ Тункинскихъ альповъ, совпадая съ конфигураціею Саяна; незначительный же гипсометрическій уровень этихъ вершинъ, покрытыхъ нерѣдко даже строительнымъ лѣсомъ, ставитъ его на второстепенное мѣсто въ ряду сосѣднихъ высотъ. Начиная съ сѣверной, самой высокой своей части (до 5000' абс. высоты), отрогъ вообще понижается къ Иркуту, а затѣмъ опять повышается къ Саяну; что же касается его поперечныхъ разрѣзовъ, то они не одинаковы въ различныхъ частяхъ отрога, а въ средней трети его длины вообще понижаются съ востока на западъ. Отдѣляя собою Тункинскую котловину отъ Торской и служа водораздѣломъ между орошающими ихъ водами, Еловскій отрогъ даетъ кромѣ того начало и нѣсколькимъ самостоятельнымъ притокамъ Иркута. Самые значительные изъ нихъ принадлежатъ къ числу лѣвыхъ притоковъ Иркута, какъ-то р. Еловка, берущая начало въ средней части отрога и раздѣляющая его здѣсь на двѣ части по длинѣ: юго-западную или Елань, съ горами: Шаманка, Шелехова, Воронина сопка, а также Хара-байсанъ, и юго-восточную съ горами Ундүръ-байсанъ, Хапсагай-байсанъ, Гавриловы лавки, названною такъ отъ проживавшаго здѣсь въ былое время разбойника Гаврила, и Бычьей, названной отъ имени лѣваго притока Еловки, протекающаго околѣ этой горы; р. Ахаликъ, берущая начало въ центрѣ сѣверной трети отрога и слѣдующая сначала меридіанальному направлению, приближается на разстояніе 1 версты отъ лѣваго верхняго теченія Еловки, послѣ чего она поворачиваетъ на

его-западъ въ Тункинскую котловину, къ самому селенію, какъ сказано было о томъ выше, гдѣ упоминалось также о другихъ рѣчкахъ, стекающихъ съ западнаго склона отрога, какъ-то: Хутулъ, Хобокъ и Хурей-Хобокъ. Изъ числа рѣчекъ, протекающихъ по восточному склону отрога въ Торскую котловину, принадлежать лишь три, причемъ всѣ онѣ располагаются въ сѣверо-восточной его части, какъ-то: Алыкъ-Кохой (въ переводѣ пестрая или пѣгая собака) и Улятй, образующія послѣ соединенія высыхающее русло рч. Вилюйки, и Туготй, протекающій у подножія альповъ, впадая съ правой стороны въ рч. Саганъ-Угунъ; что же касается саянской части отрога, то въ ней извѣстны лишь слѣдующіе ключи: Андалынъ, Далдышинъ, Сасалтуй и Шабартуй (т. е. ячютыстй). Долины большей части рѣчекъ Тункинской части отрога отличаются несоразмѣрною шириною въ сравненіи съ проложенными по нимъ руслами; вообще ихъ можно назвать довольно глубокими, мѣстами съ довольно крутыми, но обыкновенно поросшими склонами, съ хорошо развитыми террасами. Сѣверный отрѣзокъ Тункинской части отрога, какъ и вся Саянская его часть, покрыты дремучимъ лѣсомъ (тайга), представляя удобства лишь для звѣролововъ. Черскій <sup>1)</sup> передаетъ наприимѣръ, что въ глубокое, котловинообразное верховье рч. Замарайки (правый притокъ верхняго теченія Ахалика, на высотѣ 3337'), окруженное почти отвѣсными стѣнами слоистаго песчанаго наноса (харсьикъ, т. е. ящикъ, на языкѣ бурятъ), одному буряту удалось застрѣлить нѣсколько штукъ сернъ (козуль, *Cervus capreolus*), бросившихся съ разбѣга въ глубину оврага и взятыхъ такимъ образомъ безъ выстрѣла. Лѣсистую, хотя и не съ дикимъ характеромъ, является также и юго-восточная часть

<sup>1)</sup> Черскій, I. с. pag. 176.

отрога (на востокъ отъ р. Еловки), тогда какъ юго-западная часть почти вся покрыта пашнями, что равнымъ образомъ относится и къ низовьямъ рч. Еловки, гдѣ располагается соименная деревня. Деревня Еловка состояла въ 1889 г. изъ 24 дворовъ. Жители ея въ числѣ 140 д. об. п. (67 м. п.) крестьяне-старожины. У нихъ во владѣніи было 500 дес. земли, въ томъ числѣ пахатной 300 дес. Они содержатъ 94 взрослыхъ лошади, 108 шт. крупн. рогатаго скота и 160 мелкаго и живутъ достаточно <sup>1)</sup>. Къ лѣвому берегу Иркута отрогъ обращаетъ лѣсистый, крутой и утесистый склонъ, нерѣдко съ цѣлымъ рядомъ отвѣсныхъ, иногда довольно живописныхъ скалъ, въ числѣ которыхъ и находятся упомянутыя выше Хара-байсанъ, Ундуръ-байсанъ, Хамарикъ и сѣверо-восточный конецъ послѣдняго—Хапсагай-байсанъ, представляющіе небольшое, очень узкое и живописное ущелье, по которомъ тропа подымается на утесъ, преграждающій путь и непосредственно омываемый Иркутомъ, и выходитъ затѣмъ въ Торскую котловину.

Относительно геогностическаго строенія Еловскаго отрога мы говорили уже выше, что западная часть его и склонъ обращенный къ Тункинской котловинѣ, а по всей вѣроятности и большая часть сѣвернаго отрѣзка, состоятъ изъ лавы обыкновенно покрытой болѣе или менѣе толстымъ слоемъ наноса, нерѣдко песчаного, какъ напр. въ южной окраинѣ юго-западной части, въ такъ называемомъ Красномъ Ярѣ, гдѣ, какъ сказано выше, находились кости вымершихъ млекопитающихъ животныхъ, или напр. въ упомянутомъ выше Хамарикѣ въ верховьяхъ рч. Замарайки системы Ахалика. Кроме долинъ названныхъ выше рѣчекъ (Хурей-Хобокъ, Хобокъ, Хутуль и Ахаликъ), лава обнажается еще въ сѣмѣхъ рч. Еловки, въ горѣ Воронина сопка, затѣмъ съ стороны Иркута, считая съ запада на востокъ: отъ Звѣроу

<sup>1)</sup> Матер. по изсл. хоз. быта сельск. нас. Иркутск. губ. т. I, с. 154—157.

пуща за Краснымъ яромъ до Хара-байсана, гдѣ она образуетъ также быструю (шиверу), называемую Займакъ, пороги Хара-байсана, извѣстные со временъ плаванія этого инженера Бакшевича <sup>1)</sup>; затѣмъ утесъ Ундуръ-байсана, гдѣ лава является или въ видѣ жилы, выполняющей собою весьма широкую трещину въ кристаллическихъ породахъ, или же она выполняетъ здѣсь размытую въ названныхъ породахъ долину, дно которой скрывается подъ уровнемъ современного Иркута, наконецъ въ массѣ за такъ называемыми Нигисѣйскими долинами, южнѣ Гавриловыхъ лавокъ. Яромъ того порога эта извѣстна еще и въ нѣкоторыхъ мѣстахъ восточнаго склона отрога и найдена въ видѣ галекъ въ живописной и широкой долинѣ Алыкь-Нохоя, а также въ нѣкоторыхъ рѣчкахъ, вытекающихъ изъ Саянскаго хребта. Остальныя затѣмъ части Еловскаго отрога состоятъ изъ перемежающихся пластовъ гнейсовъ, весьма интересныхъ известняковъ, переходящихъ въ известково-байкалитовыя (пиритовыя) породы, хлоритовыхъ, слюдяныхъ сланцевъ и т. п., причемъ въ долинѣ рч. Бычей найдена также весьма рѣдкая порода, извѣстная подъ названіемъ анортитоваго диабазы. Въ геологическомъ отношеніи отрогъ этотъ имѣетъ весьма важное значеніе главнымъ образомъ потому, что, отличаясь поперечнымъ направленіемъ къ долинѣ Иркута, онъ обнаруживаетъ тѣмъ не менѣе тоже простираніе пластовъ названныхъ кристаллическихъ породъ (з.-с.-з. до с.-з.), такое наблюдается и въ связываемыхъ имъ высокихъ цѣпляхъ Гринскихъ альповъ съ одной стороны, а Саяна съ другой, называя очевиднѣйшимъ образомъ, что какъ альпы, такъ Саяны и самъ Еловскій отрогъ, суть только орографическія формы, обязанныя своимъ возникновеніемъ и направленіемъ своему образованію и соотвѣтственнымъ особенностямъ долины Иркута, тогда какъ древнія тектоническія, а не оро-

<sup>1)</sup> Бакшевичъ, Зап. Сиб. Отд. И. Р. Геогр. Общ. Т. I, 1856 г.

графическія горы, т. е. складки изогнутыхъ пластовъ, отличались не восточнымъ, а з.-с.-з.-мъ направленіемъ. Долина Иркутъ является потому діагональною, а не продольною, какъ полагали прежніе изслѣдователи. Кромѣ того, основываясь на отношеніи лавы къ древнимъ кристаллическимъ породамъ, Черскій заключаетъ, что вулканическія изверженія нашли уже долину Иркутъ готовою, песчаннаго же наносы, обличающіе бывшее здѣсь громадное скопленіе озерныхъ водъ, отложились уже послѣ изліянія лавы, а не подымались ею, какъ предполагалось Бакшевичемъ (1. с.).

Дорога, которая уже съ Туранскаго караула дѣлается телѣжною, а начиная съ Тунки можетъ быть названа хорошою, подымается на Еловскій отрогъ сначала по долинѣ Ахалика, затѣмъ, пересѣкая Шаманскую гору, спускается въ долину р. Еловки, переходитъ на ея лѣвый берегъ и на отрогъ, отдѣляющій ее отъ устья р. Бычьеи, и, слѣдуя вверхъ по долинѣ послѣдней, подымается на Бычью гору, съ которой слѣдуетъ крутой и длинный спускъ въ Торскую котловину.

Котловина эта, въ общемъ треугольнаго очертанія, имѣетъ около 25 верстъ длины, считая по средней линіи, и до 12 верстъ наибольшей ширины и, вытягивается съ запада на востокъ, куда обращена и вершина ея; что же касается частей, то очертаніе Торской котловины уподобляется копьевидному потому, что склонъ Еловскаго отрога вдается въ нее тупымъ угломъ съ запада, широкія долины Туготыя и Вилуйкоя образуютъ сѣверо-западную, а долина Зонъ-Мурина юго-западную лопасти, тогда какъ вершина треугольника или конца загибается нѣсколько къ юго-востоку къ Тибельтинскому суженію, названному такъ отъ расположенной вблизи него деревни Тибельтинской или Тибельтъ. Въ означенныхъ предѣлахъ Торская котловина («торская степь») представляетъ собою такую же равнину, какъ и Тункинская, съ болотами, пролѣсками, лугами, пашнями и

разбросанными по ней многочисленными улусами бурятъ. Эти улусы принадлежать нѣсколькимъ родамъ (напр. Тыртэй-сий, Кукойскій и т. п.) и имѣютъ здѣсь инородческую управу, т. е. центръ управленія всѣми бурятами долины р. Иркутъ. Управа эта или дума называется Торою (Тора), или Тункискою, такъ какъ здѣшнее вѣдомство бурятъ называется Тункинскимъ вѣдомствомъ и располагается приблизительно юдъ  $51^{\circ}48'$  с. ш. и  $120^{\circ}46'$  в. д. на высотѣ, недостаточно еще опредѣленной, такъ какъ цифра, полученная наблюденіемъ Радде (1300'), совершенно невѣроятна сравнительно съ высотой Тунки (2180'), между которыми разность, по мнѣнію Черскаго, можетъ достигать развѣ 180 или 200', никакъ не 880', иначе уровень Торской котловины располагался бы не только ниже поверхности Байкала (1561'), но даже и ниже устья самого Иркутъ въ Ангарту (1469'), послѣднія же двѣ цифры опредѣлены инструментально нивелировкой <sup>1)</sup> и потому заслуживаютъ полнѣйшаго довірія. Съ этимъ согласуется и то обстоятельство, что по опредѣленію Черскаго <sup>2)</sup>, высота уровня Иркутъ восточнѣе мр. Тибельтинской, около входа его въ ущелье, на 377' превосходитъ высоту поверхности Байкала, равняясь слѣдовательно 1938', т. е. на 242' ниже Тунки и на 469' выше устья его въ Ангарту (см. ниже). Кромѣ бурятскаго населенія въ Торской котловинѣ находится еще и русское, разбѣшенное въ двухъ деревняхъ, именно: въ Гуджир-сконъ селеніи (Гуджиръ или Хара-Гуджиръ), на лѣвомъ берегу Иркутъ, насупротивъ устья Зонъ-Мурина, съ частью верхняго теченія котораго мы ознакомились выше, слѣдя за маршрутомъ Полякова; а затѣмъ деревни Тибельтъ, на правомъ берегу той же рѣки, въ восточномъ концѣ котло-

<sup>1)</sup> Зап. И. Р. Геогр. Общ. по Общей Географіи, Т. XV, № 1, 1885 г.

<sup>2)</sup> Черскій, Отчетъ объ изслѣдованіи Байкала за 1869 г. Изв. Сиб.

И. Р. Геогр. Общ. Т. XI, № 1—2-й, стр. 56.



вины; въ Гуджирахъ (приблизительно на 120°37' в. д., находится миссіонерская церковь и перевозъ на правый берегъ Иркутъ къ Торѣ, а въ Тибельтахъ лишь маленькая деревянная часовня. Гужирское селеніе въ 1889 г. состояло изъ 30 двор. съ 108 жит. (85 м. р.), по преимуществу казаковъ. У нихъ во владѣніи было 500 дес. земли, въ томъ числѣ пашни 240 дес. Содержали они до 130 взрослыхъ лошадей 150 шт. круп. рогатаго скота и 220 мелкаго. Деревня Тибельти состояла изъ 25 двор. съ 140 жит. (68 м. п.), на половину казаковъ и на половину крестьянъ-сторожиловъ. Земли у нихъ во владѣніи было до 570 дес., въ томъ числѣ пашни 170 дес. Лошадей они содержали до 160, крупнаго рогатаго скота 210 шт., мелкаго 110.

Иркутъ, въ видѣ сплошной рѣки (уже начиная почти съ Туранскаго караула), шириною въ 60 — 90 саж. и до 2 саж. глубины (по Бакшевичу), протекаетъ по котловинѣ такимъ образомъ, что, выйдя изъ суженія въ предѣлахъ Еловскаго отрога въ юго-западную лопасть равнины, направляется сначала на в.-с.-в., вслѣдствіе чего въ восточной половинѣ котловины онъ приближается къ подножію сѣверныхъ ея горъ и образуя нѣсколько большихъ излучинъ («Куркутскіе повороты»), придерживается этихъ горъ до Тибельтинскаго суженія, поворачивая къ нему на юго-востокъ. Раздробляясь мѣстами на рукава (протоки) и нерѣдко мѣняя русло, вслѣдствіе чего изъ засорившихся протоковъ образовались весьма странной, кольцообразной и извилистой формы озера, свойственные въ одинаковой степени и Тункинской котловинѣ, причемъ озера эти нерѣдко изобилуютъ рыбою, въ особенности карасями, достигающими гигантскихъ размѣровъ, какъ напр. 405 миллиметровъ (болѣе 1,3 фута) въ длину при 151 мм. ширины<sup>1)</sup>. На всемъ этомъ протяженіи, не считая незначитель-

<sup>1)</sup> Черскій, Изв. Сиб. Отд. И. Р. Геогр. Общ. Т. XVI. № 1, 2 и 3. 1886 г.

шихъ ключей, Иркутъ принимаетъ съ правой стороны: р. Зонъ-Муринъ, самую значительную изъ притоковъ, многоводную, быструю и весьма опасную для бродовъ, затѣмъ рч. Кунъ-Терхонъ вблизи Торской думы, а наконецъ Верхнюю, Среднюю и Нижнюю Тибельтъ; съ лѣвой стороны, не считая высыхающей въ низовьяхъ Вилюйки, о которой сказано при описаніи Еловскаго отрога, въ него впадаютъ: Саганъ-угунъ, выходящій изъ альповъ почти на меридіанѣ села Джиръ, затѣмъ Таланцакъ, Харагунъ, Зунъ-хухэй и Барунъ-хухэй (западная и восточная «Кукойскія рѣчки»), низовья которыхъ протекаютъ въ очень широкой ищей долині. Въ геологическомъ отношеніи Торская котловина въ свою очередь похожа на Тункинскую: она выполнена слоистыми суглинными, глинистыми и песчаными наносами съ галькою; только песчаный наносъ всего болѣе развитъ въ восточномъ концѣ и на болѣе высокихъ южныхъ террасахъ. Сѣверную границу котловины образуетъ восточное продолженіе Тункинскихъ альповъ, но цѣпь эта претерпѣваетъ здѣсь значительныя измѣненія. Сохраняя альпійскій характеръ только до пересѣкающаго её Саганъ-Угуна, на правомъ берегу котораго располагается послѣдній восточный пикъ, едва выдающійся за предѣлы древесной растительности, цѣпь совершенно теряетъ зазубренный контуръ вершинъ, понижается довольно постепенно къ востоку, порастаетъ лесомъ, уподобляясь Саяну, и не только мало расчленяется поперечными долинами, но напротивъ, ближе къ Куркутскимъ изворотамъ ея конфигурація принимаетъ особенный характеръ въ видѣ появленія болѣе или менѣе параллельныхъ, продольныхъ долинъ, а разобщающіе ихъ отроги, постепенно уменьшаясь по направленію къ сѣверу, т. е. въ глубь цѣпи, образуютъ какъ бы террасовидные уступы, числомъ отъ двухъ до трехъ, впрочемъ съ плосковолнистою, а не горизонтальною линіею верхнихъ контуровъ. Начиная съ Куркутскихъ изворотовъ рѣки, отрогъ этой цѣпи направляется на юго-

востокъ, къ Тибельтинскому сѣуженію: это такъ называемы хребетъ Куличій Носъ (до 3061' высоты), около котораго какъ мы увидимъ ниже, Иркутъ, войдя въ ущелье, дѣлаетъ весьма крутую и длинную излучину такъ, что описавъ дугу въ 40 верстъ длины, онъ приближается къ послѣднему изъ Куркутскихъ поворотовъ на разстояніе всего лишь 4 версты къ сѣверо-востоку. Въ такомъ же вообще видѣ является продолженіе Саяна, ограничивающее Торскую котловину (съ южной стороны, только высшій видимый гребень его находится въ значительно большемъ разстояніи отъ подножія, обнаруживая какъ бы соотвѣтственно большую ширину хребта, ближайшій-же къ котловинѣ, почти продольный отрогъ, образованный насупротивъ Торской думы уединенную и плоско-округленную вершину, посылаетъ свое террасовидное предгорье почти на встрѣчу Куличьему носу, т. е. къ Тибельтинскому сѣуженію долины Иркуты. Въ геогностическомъ отношеніи Тункинская цѣпь горъ изслѣдовалась здѣсь только по слѣдующимъ долинамъ: 1) по рч. Саганъ-угунъ, съ которою мы ознакомимся при описаніи путешествія Черскаго по Китайскимъ альпамъ; 2) по низовьямъ Зунъ- и Барунъ-хухэя, изъ которыхъ по первому пролегаетъ скотопрогонный путь на р. Тосокъ системы Китоа, а по второму такъ называемая «Новая дорога» на Китоу, т. е. тропа, недавно еще проложенная Тункинскими промышленниками; 3) по долинѣ Ерханцъ-ки по которой изъ Подкукоискаго улуса выѣзжаютъ на Взѣмную, впадающую въ упомянутую выше излучину Иркуты въ ущелистой части его долины, и наконецъ 4) по утесамъ, переходящимъ на первомъ и третьемъ изъ Куркутскихъ поворотовъ Иркуты. Во всѣхъ этихъ мѣстахъ (Бакшевичъ Черскій) оказались вообще тѣже кристаллическія породы (гнейсы, известнякъ, діоритовые и хлоритовые сланцы и т. п.) которые встрѣчались и выше по теченію той-же рѣки, причемъ и простираніе пластовъ, по опредѣленіямъ Черскаго

---

<sup>1)</sup> Черскій, Рукописныя замѣтки о Сибири.

и въ чемъ не измѣняется отъ прежняго (з.-с.-з. до с.-з.), въ наклонѣ слоевъ на ю.-з. и ю.-ю.-з. Ниже Кукойскихъ рѣкъ, въ террасѣ, известной подъ названіемъ Красный яръ (Бурейскій Красный яръ, въ отличіе отъ Тункинскаго) можно видѣть мощное отложеніе галекъ-валуновъ и не весьма хорошо оглаженныхъ кусковъ кристаллическихъ породъ, слегка цементированныхъ углекислою известью.

Саянскій хребетъ на этомъ протяженіи изслѣдованъ не менѣе нежели Тункинскіе альпы. Вверхъ по правому берегу р. Зонъ-Мурина существуетъ дорожка, проектированная въ 1824 г. какъ предположительно лучшая и болѣе близкая къ Кяхтинской или Кругобайкальской дороги <sup>1)</sup>, начиная съ 1771 г. проложена была вверхъ по р. Жемчугъ (см. выше), черезъ Ургудайскій и Ключевской караулы. Новая вѣтвь эта отходила прямо изъ Торской думы, пересѣкала рч. Маргаинъ (прав. притокъ Зонъ-Мурина) и другія рѣчки системы той же главной рѣки и выходила къ Ключевскому-же караулу, обходя такимъ образомъ прежній путь, по которому считалось 118 бродовъ, въ томъ числѣ 25 по столь быстрой рѣкѣ Жемчугъ. Оба эти пути до сихъ поръ еще остаются неизслѣдованными. — Черскій въ 1879 г. коснулся склона Саянскаго хребта восточнѣе Тары, около долинки, называемой Бургень-желгъ (восточнѣе упомянутой выше округленной вершины), куда, застигнутый сумерками, онъ свернулъ ночью. На склонѣ этомъ до высшаго пункта террасы (243' надъ долиною) онъ видѣлъ одно лишь песчаное наносное отложеніе, поросшее частью травою, частью же лѣсомъ. Углубиться въ горы не было времени, такъ какъ онъ торопился къ Байкалу, какъ къ главной цѣли его поѣздки. Зато длиннѣй рч. Средней Тибельти мы можемъ пользоваться

<sup>1)</sup> Мюрдвинковъ, Зап. Сиб. Отд. И. Р. Геогр. Общ. 1856 г. стр.

маршрутомъ Чекановскаго 1872 г. <sup>1)</sup>), вышедшаго по это  
рѣчкѣ на р. Снѣжную и спустившагося затѣмъ къ Байкалу

ж) Поездка Чекановскаго по рч. Средней Тибельти в  
Саянскій хребетъ.

Какъ третья, еще болѣе короткая вѣтвь Забайкаль  
ской дороги, въ 1825 г. проектировалась тропа, ведущая  
изъ Тибельтинской деревни къ югу, сначала вверхъ по р.  
Верхней Тибельти, затѣмъ черезъ хребты: Дабан  
и Мартовскій, р. Мартъ, притокъ Маргасана, спа  
дающаго, какъ сказано выше, въ Зонъ-Муринъ, и Марто  
скую степь, послѣ чего дорога, на рѣчкѣ Тулусунѣ  
сходила съ пролегавшею по Зонъ-Мурину (1824 г.). Че  
кановскій между тѣмъ пересѣкъ Саянъ нѣсколько восточнѣ  
этой неизслѣдованной еще тропы, именно по рч. Средне  
Тибельти. Направляясь къ югу отъ деревни, тропа пер  
сѣкаетъ сначала Верхнюю Тибельти и сворачиваетъ затѣмъ  
на валообразное возвышеніе, отдѣляющее названную рѣчку  
отъ Средней, придерживаясь лѣваго склона ея долины. В  
трехъ верстахъ отъ деревни поверхность почвы дѣлается  
крайне неправильной: появляется множество болѣе или менѣ  
глубокихъ ямъ, въ видѣ проваловъ, отчасти и оползней д  
нѣсколькихъ сажени въ діаметрѣ; кромѣ того замѣчаются  
борозды весьма неправильнаго очертанія съ болѣе или менѣ  
крутыми склонами, происшедшія однако не отъ размыва в  
дою. Такая особенность почвы у мѣстныхъ жителей извѣстна  
подъ названіемъ *кучегуровъ* (русск.) или *булдуруновъ* (бурятск.)  
и продолжается до Байсинскаго ключа, при чемъ  
которые разрѣзы обнаруживаютъ, что почва кучегуровъ

<sup>1)</sup> Чекановскій, Зап. Сиб. Отд. И. Р. Геогр. Общ. 1879 г. Т. 3  
стр. 384.

стоитъ изъ горизонтальныхъ пластовъ мелкозернистаго, глинистаго песка, мѣстами съ желѣзистыми прослойками бураго вѣста и съ тонкими пропластками разложившихся растительныхъ остатковъ; со стороны рѣки почва имѣетъ иногда солончаковыя свойства. Ложемъ этому отложенію служить должно быть лава, выступающая около Байсинскаго ключа. <sup>1)</sup> Порода эта въ кускахъ замѣчается и далѣе, въ мѣстности, покрытой густымъ лѣсомъ и болотами, послѣ чего обнажается гнейсъ, пласты котораго простираются здѣсь на з.-ю.-з. <sup>2)</sup>, падая въ сторону Иркута. Затѣмъ слѣдуетъ бродъ черезъ Тибельти насупротивъ устья долины Чернушки, откуда тропа придерживается уже праваго берега рѣчки Ср. Тибельти, поднимаясь на водораздѣльный отрогъ между нею и системою р. Малой Бстрой (р.р. Харганты и Халаглагора, притоки Тултуя). Подъемъ ведетъ на гору Кутулъ, носящую далѣе названіе Жедонъ, а спустя сѣдловину одного изъ верховьевъ рч. Харганты, гребень этотъ называется уже Халаглагорской гривой («*грига*» на мѣстномъ нарѣчьи означаетъ гребень); на Кутулѣ и Халаглагорской гривѣ обнажается лава, тогда какъ Жедонъ состоитъ изъ известняка. Вмѣстѣ съ крутымъ подъемомъ на гору Большой Сиверъ появляются глыбы гнейса и гранито-гнейса; высокоствольный кедровникъ, покрывавшій упомянутыя выше части гребня, рѣдѣетъ и дѣлается малорослымъ, хотя гора не достигаетъ еще предѣла вертикальнаго распространенія древесной растительности; нѣмного выше, именно на этомъ предѣлѣ, располагается большая котловина, извѣстная подъ названіемъ: Большой или Голечный Сарамъ («*сарамъ*» означаетъ котловина — слово, производящееся отъ бурятъ). Котловина эта, какъ видно изъ описанія Чекановскаго, отличается громадными размѣрами (до

<sup>1)</sup> Чекановскій, I. с. pag. 346—347.

<sup>2)</sup> Простираніе это является лишь мѣстнымъ, такъ какъ на сѣверѣ, западѣ и востокѣ отъ него господствуютъ з.-с.-з.-ное.

10 верстъ или болѣе въ діаметрѣ): дно ея представляется на первый взглядъ равниною, и лишь ближайшій осмотръ обнаруживаетъ на немъ множество разсѣянныхъ скалистыхъ холмовъ и холмиковъ, а также розсыпей, между которыми извивается цѣлая сѣть плоскихъ долинъ, и располагаются болота и озера. Одно изъ такихъ озеръ, называемое Хѣликъ, помещается ближе къ западной окраинѣ Сарамы и служитъ главнымъ истокомъ четырехъ рѣчекъ, протекающимъ отъ него по тремъ различнымъ направленіямъ, именно рч. Лѣвая Большая Быстрая или Голышиха, направляется на востокъ составляя притокъ Большой Быстрой, изливающейся въ Иркутъ недалеко отъ входа его въ ущелье (см. ниже), р.р. Тултуй (притокъ Быстрой) и Ср. Тибельтъ на сѣверъ а на сѣверо-западъ слѣдуетъ теченіе рч. Мартъ, притокъ Маргасана, системы Зонъ-Мурина.

Долина рч. Голышихи раздѣляетъ дно Сарамы на сѣверную и южную части, постоянно увеличиваясь и значительно углубляясь по направленію къ востоку, воспринимая еще здѣсь правый притокъ Бишехинъ, который беретъ начало съ южныхъ гольцовъ котловины, образующихъ вообще непрерывную стѣну съ южной юго-западной, юго-восточной и отчасти съ восточной стороны т. е. отъ лѣваго берега рч. Мартъ до праваго берега долины Голышихи; къ этой стѣнѣ южная, болѣе большая часть Сарамы возвышается довольно быстро, сливаясь съ ея подножіемъ, тогда какъ въ сѣверной части, по выраженію путешественника версты нужно проходить, чтобы замѣтить, куда наклонена та либо другая долина. Описанное выше размѣщеніе рѣчекъ указываетъ уже на то, что сѣверная стѣна котловины не можетъ быть сплошною и цѣльною. И дѣйствительно, она состоитъ здѣсь собственно изъ двухъ уединенныхъ горъ, вѣрнѣе гольцовъ, изъ которыхъ Унушійнъ-Хардыкъ (или Унышійнъ что означаетъ сирота-голецъ) располагается на лѣвомъ берегу выхода Голышихи изъ котловины, а болѣе низкая часть его, вытягиваясь къ западу, достигаетъ и стѣсняется съ пра

на стороны выходы р.р. Тултуя и Ср. Тибельти изъ Сарамы, между тѣмъ въ промежуткѣ между Тибельти и Мартонъ располагается гора Дулганъ.

Въ геогностическомъ отношеніи эти высшія точки Саяна представляютъ не мало весьма интересныхъ данныхъ. Хотя по Сарамѣ образуется пластами гнейса и гранито-гнейса, тѣмъ не менѣе напр. въ крутыхъ склонахъ горы Дулганъ обнажается еще лава, залегающая на этихъ древнѣйшихъ породахъ, а изобиліе ея, зависящая отъ періодичности изверженія, указываетъ на то, что въ современномъ Дулганѣ мы видимъ лишь участившій отъ разрушенія остатокъ лавовыхъ потоковъ, занимавшихъ прежде болѣе значительный районъ; лава находится также въ верховьяхъ рч. Мартъ и поднимается на Бишехинскій голецъ, изъ котораго беретъ начало упомянутый выше, сомнительный притокъ Голышихи. По нему, т. е. вверхъ на рч. Бишехину, поднимается и тропа, по которой продолжалъ путешествіе Чекановскій, проходя мимо изломатаго наноснаго отложенія, въ которое вѣззалось русло рѣчки. Глядя на Сарамъ съ той высоты, съ которой исчезаютъ всѣя подробности конфигураціи его дна, мы видимъ, говоритъ Чекановскій, что ровная его площадь, наклоненная съ с.-в. на с.-з., представляетъ два выхода (вѣрнѣе три), какъ бы русла мощныхъ потоковъ, — одинъ въ долину Голышихи, другой между Унушиномъ и Дулганомъ (третій въ сторону рч. Мартъ), причемъ подъ словомъ потокъ онъ понималъ древніе ледники, приписывая ихъ вытачивающей способности какъ размещеніе лавоваго покрова, такъ и происхожденіе выходовъ въ Сарамѣ, а по всей вѣроятности и самой котловины, въ которой впрочемъ не найдены ни шлифы, ни изборозжденные тѣлами, ни другіе изъ существенныхъ доказательствъ бывшаго существованія этой мѣстности исчезнувшими нынѣ ледниками <sup>1)</sup>. Въ статьѣ о слѣдахъ древнихъ ледниковъ въ восточной Си-

<sup>1)</sup> Чекановскій, 1. с. pag. 386 и слѣд.



бири <sup>1)</sup>, Черскій оспариваетъ однако это воззрѣніе на разрушеніе лавоваго потока и расчлененіе его какъ здѣсь, такъ въ другихъ мѣстахъ Саяна и его окрестностей, а также и въ образованіе здѣшнихъ котловинъ онъ смотритъ какъ на результатъ соотвѣстственнаго сочетанія плоскостей растрескиванія породъ (отдѣльность) и сносъ ихъ путемъ размыва; что касается Большаго Сарамы, то, по мнѣнію того же изслѣдователя, онъ долженъ былъ образоваться отъ соединенія нѣсколькихъ котловинъ вслѣдствіе захвата отступающими веерообразными рѣчками.

Выше по Бишехиноу Чекановскій опять встрѣчается съ потоками лавы, напластованными другъ на другъ и обладающими столбчатою отдѣльностью или же растресканными и неправильные остроугольные куски; толща изверженной породы здѣсь залегаетъ на гнейсѣ и обращаетъ къ расчлененнымъ ея долинамъ крутые, усѣченные выходы пластовъ. На ю.-ю.-отсюда возвышается голецъ Улунъ-Кутулъ, (быть можетъ Уланъ-Кутулъ? *уланъ* — красивый), покрытый причудливо и громажденными глыбами; къ нему направляется и тропа по гребню, окаймленному съ лѣвой стороны глубокою, почти отвѣсною долиною безъ имяннаго притока Голышихъ принимающаго въ видѣ праваго притока ключъ Босунскій; съ правой же стороны дороги болѣе пологій склон гребня ведетъ къ р. Маргасану. Гребень этотъ состоитъ изъ лавы; онъ значительно ниже сосѣднихъ высотъ, являясь мѣстами въ видѣ округленнаго вала, мѣстами же суживается до крайнихъ предѣловъ возможности проѣзда; изрѣдка, въ сѣдловинахъ, появляется гнейсъ, служащій подпочвою лавы; противулежащіе склоны обѣихъ долинъ, ограничивающіе этотъ гребень, въ свою очередь состоятъ изъ лавы, къ тому же несравненно болѣе мощной.

<sup>1)</sup> Черскій, Изв. Сиб. Отд. И. Р. Геогр. Общ. Т. XII, № 4 и стр. 53.

Улунъ-Кутулъ нѣсколько превышаетъ высоту Хамарь-дабанскаго гольца (6650'), лежащаго на в.-с.-в. отъ него (см. ниже); онъ состоитъ изъ гранита. Хаосъ гольцовъ тянется на югъ отъ Улунъ-Кутула, и, пока глазъ въ состояніи различать наслоеніе, вездѣ въ склонахъ этихъ гольцовъ видны выходы пластовъ лавы, общая толщина которыхъ на нѣсколькихъ вершинахъ достигаетъ вѣроятно не менѣе 1000'; а далѣе, гдѣ эти подробности уже теряются, та же форма гольцовъ, именно горизонтальный контуръ вершины съ усѣченными краями (слѣдовательно, типъ столовыхъ горъ) свидѣлствуетъ о такомъ же ихъ составѣ.

Непрерывная гряда гольцовъ направляется отъ Улунъ-Кутула также на востокъ и в.-с.-в., къ Хамарь-дабану, какъ прямое продолженіе гребня Саяна; они носятъ названіе Быстринскихъ гольцовъ, выполняютъ на сѣверѣ пространство между правыми притоками Голышихи, а къ югу между притоками р. Утуликъ, впадающей въ Байкалъ. Въ составѣ ихъ замѣчается тотъ же гнейсо-гранитъ и гнейсъ, съ пригнѣсью подчиненнаго имъ слюдянаго сланца; мѣстами встрѣчаются жилы крупнозернистаго гранита съ шерломъ; пласты грубо падаютъ къ югу. И здѣсь точно также наблюдаются столовыя горы, какъ напр. гонецъ Босунъ (запоръ, преграда): онъ занимаетъ всю ширину узкой гряды названнаго подораздѣла и, обращая во всѣ стороны крутые склоны, ставитъ дальнѣйшему слѣдованію преграду, оправдывающую его названіе. Впрочемъ столовыя горы ниспадаютъ здѣсь до минимальныхъ размѣровъ, даже до нѣсколькихъ саженей въ окружности и нѣсколькихъ футовъ въ высоту.

Ближе къ Хамарь-дабану лава не встрѣчается уже болѣе; минны и сѣдловины, по замѣчанію Чекановскаго, являются впаженными и проходятъ между гольцами округленной, гуполовидной формы; путешественникъ называетъ ихъ *Rundlicker*, — *roches moutonnées*, не передавая однако никакихъ

подробностей о характерѣ какъ упоминаемой «изглаженности» долинъ, такъ и округленности вершинъ гольцовъ.

Пересѣкая эту граду въ поперечномъ направленіи, тропа приближается наконецъ къ долинѣ р. Большой Быстрой, берущей начало изъ озера Быстринскаго; озеро это лежитъ у западнаго подножія Хамаръ-дабанскаго гольца, около глубокой сѣдловины, располагающейся на предѣлѣ вертикальнаго распространенія древесной растительности и отдѣляющей верховья Б. Быстрой отъ рч. Спусковой, которая принадлежитъ уже системѣ Утуликѣ. Сѣдловина эта известна подъ названіемъ Хамарскихъ воротъ и врѣзалась въ пласты того же гнейса и гранито-гнейса, изъ котораго состоитъ и самъ Хамаръ-дабанъ, достигающій 6650 абс. высоты. Въ этомъ мѣстѣ тропа, по которой слѣдовалъ Чекановскій, сходится съ такъ называемою Хамаръ-дабанскою дорогою, намѣченной еще въ 1796 г. отъ юго-западной оконечности озера Байкала, но оконченной лишь въ 1805; съ этимъ отрѣзкомъ ея (отъ с. Култукъ на Байкалѣ до Быстринскаго озера) мы ознакомимся ниже, теперь же послѣдуемъ за Чекановскимъ далѣе на ю.-ю.-з., чтобы пересѣчь Саянъ до встрѣчи этой дороги на р. Снѣжной съ другою, — Игумновскою дорогою, значительно болѣе восточною нежели Хамаръ-дабанская, описаніе которой, какъ перерѣзывающей Прибайкальскія горы, мы помѣстимъ въ соотвѣтствующей главѣ изложенія.

Впереди Хамарскихъ воротъ располагается глубокая продольная долина системы Утуликѣ между двумя отрогами Саяна. Тропа ведетъ внизъ по весьма крутой долинѣ рч. Спусковой, многократно переходя въ бродъ съ одного берега на другой и пролегая вообще далеко отъ обнаженій склоновъ по почвѣ усѣянной глыбами, валунами и галькою гранита, гранито-гнейса, гнейса и слюдянаго сланца; видимыя пласты этихъ породъ падаютъ вообще къ югу.

Перейдя въ бродъ Утуликѣ и прослѣдовавъ нѣсколько

лечь по широкой и болотистой его долине, дорога поворачивает  
вверх по его правому притоку, — рч. Шубутуй, чтобы по  
ней опять подняться къ гольцамъ; мысъ, разобищающій объ до-  
лину, покрытъ наносною почвою и обнаруживаетъ четыре тер-  
расы, значительно превышающія современный уровень рѣки.  
Слюдяные сланцы играютъ здѣсь роль преобладающей породы  
и тянутся вверхъ по долине до бывшей Шубутуйской стан-  
ции. Еще выше долина суживается, являясь въ верховьяхъ  
живописною, но трудною для проѣзда вслѣдствіе каменистости  
и болотистыхъ тундръ; склоны достигаютъ уже предѣла лѣса;  
законецъ, послѣ крутаго подъема по каменнымъ глыбамъ,  
достигаются источники рѣчки, лежащія на Шибетскомъ  
гольцѣ.

На обширной поверхности этой вершины располагаются  
столовые горы; онѣ состоятъ изъ лавы, залегающей на гра-  
нитѣ. Шибетскій гольцъ принадлежитъ южной вѣтви Саяна,  
растанутой между системою Зонъ-Мурина и низовыми р.  
Снѣжной, впадающей въ Байкалъ; на западѣ она образуетъ  
водораздѣлъ между Иркутомъ и системою Джиды (т. е. Се-  
ленги), пересѣченный описаннымъ выше маршрутомъ Поля-  
кова на югъ отъ Ургудѣйскаго караула; въ этомъ-же мѣстѣ  
вѣтвь эта отдѣляется собою Утуликъ отъ Снѣжной, питая въ  
свою очередь нѣкоторыя рѣчки, изливающіяся по его сѣвер-  
ному склону въ Байкалъ, какъ-то Сѣгзонъ (иначе Сѣлзонъ),  
Хара-Муринъ (иначе Муринъ) и друг.; вмѣстѣ съ тѣмъ она  
образуетъ собою здѣсь границу Иркутской губерніи. На водо-  
раздѣлѣ дорога пролегаетъ между многочисленными столовыми  
горами различной высоты и размѣровъ, проходя также и около  
озера, изъ котораго беретъ начало Хара-Муринъ (озеро это  
одно изъ самыхъ значительныхъ среди разсѣянныхъ здѣсь  
другихъ), послѣ чего слѣдуетъ спускъ въ долину рч. Ши-  
бетъ, ведущей къ лѣвому берегу р. Снѣжной. По Шибетѣ  
часто встрѣчаются округленныя формы горъ, чего небыло по  
Шубутую; ея широкая долина значительно углубилась въ на-

носное отложение съ галькою и принимаетъ въ низовьяхъ луговой характеръ, переходящій и на долину р. Снѣжной, слѣдуя внизъ по которой, пройдя бурятскій Снѣжнинскій улусъ ( $51^{\circ}$  с. ш.,  $121^{\circ}37'$  в. д., 4000' н. ок.), путешественникъ достигаетъ бывшей Снѣжнинской станціи, а съ нею и Игумновскаго тракта, о которомъ упоминалось выше и къ которому мы возвратимся своевременно, теперь-же перейдемъ къ описанію Тибельтинскаго суженія долины Иркутъ и теченія этой рѣки до входа ея въ ущелье.

3) Отъ деревни Тибельти до входа Иркутъ въ ущелье; долины р.р. Быстрыхъ.

Названный отрѣзокъ теченія Иркутъ имѣетъ всего лишь 16—17 верстъ длины, считая по изгибамъ рѣки, и обнимаетъ собою сначала небольшую площадку въ нѣсколько квадр. верстъ, составляющую суженную и округленную восточную оконечность Торской котловины, въ которую изливаются упомянутыя выше три рч. Тибельти, затѣмъ Тибельтинское, или вѣрнѣе Тибельтинско-быстринское суженіе Иркутъ и, наконецъ, довольно обширную площадь, расположенную передъ входомъ рѣки въ ущелье, и расширяющуюся какъ на востокъ, такъ и на юго-востокъ отъ этого пункта; это такъ называемая Ильчинская долина, иначе Ильчинско-быстринская площадь, въ высшей степени интересная въ томъ отношеніи, что она, представляя лишь незначительный водораздѣлъ между Иркутомъ и Байкаломъ, имѣетъ прямое соединеніе съ юго-западною оконечностью послѣдняго черезъ посредство долины р. Култучной, и по этой площади, какъ доказываетъ геологическое изслѣдованіе мѣстности, Иркутъ направлялся прежде прямо къ Байкалу, составляя притокъ этого озера. По юго-восточному углу той-же площади проложены низовья долинъ р.р. Малой и Большой Бы-

стрихъ, изливающихся въ Иркутъ съ правой стороны на мѣстѣ поворота рѣки къ сѣверу, къ ущелью. Наконецъ еще ближе къ ущелью, съ той-же стороны, въ Иркутъ впадаетъ незначительный Ильчинскій ключикъ или просто Ильчй, ильче Иркутный Ильчй, называемый такъ въ отличіе отъ Култучнаго Ильчй, берущаго начало почти совмѣстно съ нимъ, но протекающаго въ противоположную сторону къ р. Култучной, которая, какъ сказано выше, изливается въ юго-западную оконечность Байкала, въ разстояніи 22 верстъ отъ устья Иркута въ ущелье.

Описываемая часть долины Иркута изслѣдована по двумъ направленіямъ, именно, по Тункинской дорогѣ, гдѣ ее описали всего подробнѣе Чекановскій <sup>1)</sup> и Черскій <sup>2)</sup>, а затѣмъ по самому теченію Иркута, гдѣ проплывали Бакшевичъ (1853 г. 1. с.) и Черскій <sup>3)</sup>, на геологической картѣ котораго, изданной въ 1886 г., <sup>4)</sup> можно видѣть и весь отрѣзокъ этой рѣки отъ Торской котловины черезъ ущелье до устья въ Анггару, въ масштабѣ 10 верстъ въ дюймѣ. По Тункинской дорогѣ, около Верх. и Средн. Тибельти, равнина разнообразится лишь разбросанными по ней различной величины холмами, иногда весьма правильной формы; они сгущаются по направленію къ югу, принимая видъ удлиненныхъ валовъ и сливаясь съ подножіемъ горъ. Это результаты размыва, перемѣщенія руселъ и углубленія ихъ въ наносное отложеніе, изъ котораго, именно изъ горизонтальныхъ песчаныхъ слоевъ, и состоятъ эти бугры. Затѣмъ слѣдуетъ подъемъ на такъ называемую Первую Песчаную гору, собственно узкую оконечность отрога, отдѣляю-

<sup>1)</sup> Чекановскій, 1. с. pag. 343—345.

<sup>2)</sup> Черскій, Изв. Сиб. Отд. И. Р. Геогр. Общ. Т. XI, № 1 и 2 и Т. XII, № 2 и 3.

<sup>3)</sup> Черскій, Изв. Сиб. Отд. И. Р. Геогр. Общ. Т. VII, № 4 и 5.

<sup>4)</sup> Зап. И. Р. Геогр. Общ. Т. XV съ картою.

щую долины двухъ Верхнихъ отъ Нижней Тибельти; возвышаясь на дорогѣ до 88' надъ Иркутомъ, гора эта въ свою очередь покрыта слоистымъ пескомъ, обнаруживающимъ здѣсь впрочемъ незначительный наклонъ слоевъ (до 7°) на с.-з.; — обстоятельство, которое Черскій, въ противоположность мнѣнію нѣкоторыхъ предшественниковъ<sup>1)</sup>, не ставитъ въ связь съ предполагавшимися вулканическими поднятіями, а объясняетъ соответственными неровностями почвы, на которой осаждался слоистый песокъ. Пески эти залегаютъ на отложеніи съ галькою, обнаженномъ руслами названныхъ рѣчекъ, причемъ въ составѣ гальки замѣчается значительный, иногда преобладающій процентъ лавовыхъ кусковъ. Съ праваго берега Нижней Тибельти начинается Тибельтинско-Быстрийское суженіе Иркуты, обусловленное съ лѣвой стороны упомянутымъ выше Куличьимъ Носомъ, тогда какъ съ правой къ рѣкѣ подступаетъ отрогъ Саяна, ограниченный съ запада долиною Тибельти съ ея правымъ Безымяннымъ притокомъ, а съ востока долиною р. Малой Быстрой. Отрогъ этотъ, отчасти террасовиднаго типа, возвышается со стороны Иркуты до 844' надъ рѣкою (1221' надъ Байкаломъ и 2782' абсолютной высоты) и извѣстенъ въ своей западной части подъ названіемъ Тоскливой горы. Онъ пересѣкается дорогою недалеко отъ Иркуты, слѣдующею сначала вверхъ по Безымянному притоку Тибельти, гдѣ въ горѣ съ сѣверной стороны дороги выступаетъ сперва бѣлый среднезернистый и мелкозернистый известнякъ, мѣстами съ кристаллами бѣлой роговой обманки, а далѣе известково-байкалитовый сланецъ, пласты котораго, по наблюденіямъ Черскаго, простираются на с.-з. и падаютъ круто (до 70°) на ю.-з.; склонъ же горы покрытъ песчанымъ наносомъ, изъ подъ котораго, на послѣднемъ подъемѣ изъ Безымяннаго притока, выступаетъ лава. Изверженная порода эта

<sup>1)</sup> Чекановскій, 1. с. выноска къ стр. 391.

замѣчается также подъ глинистою почвою и къ юго-западу отъ дороги, по тропѣ, ведущей отсюда къ рч. Харгантѣ и Тултую (системы Малой Быстрой), какъ это показала одна изъ экскурсій Чекановскаго <sup>1)</sup>, который лишь на спускѣ къ Харгантѣ встрѣтилъ кристаллическій известнякъ. Тотъ же песчаный наносъ, какъ продолженіе тибельтинскаго, тянется до высшаго пункта дороги черезъ отрогъ (726' надъ Иркутскѣмъ), и только абсолютно высшая точка его, въ видѣ уединеннаго, острововиднаго возвышенія со стороны Иркутска (844' надъ рѣкою, см. выше) обнажаетъ гранитъ и гнейсо-гранитъ мѣстами съ очень крупными листочками слюды. Виступы той-же породы выдаются мѣстами изъ подъ песчаного отложенія и на противоположномъ склонѣ отрога, гдѣ располагается такъ называемая Быстринская станція, состоящая изъ маленькой и весьма нечистой избы, въ которой живутъ два или три ямщика-бурята, и помѣщенія для экипажей. Отсюда по такой-же почвѣ слѣдуетъ довольно крутой спускъ къ р. Малой Быстрой, омывающей восточный склонъ отрога и берущей начало въ разстояніи около 35 верстъ къ ю.-ю.-в. отъ устья. Рѣчка эта, отъ 2 до 6 саж. ширины, известна по находженію въ верхней части ея теченія пріисковъ лазореваго камня (ляписъ лазули), открытыхъ въ 1853—1854 г. Пермскими и разрабатывавшихся въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ для Кабинета Его Имп. Величества. Изъ докладной записки и рапортовъ Пермянина на имя Департамента Удѣловъ слѣдуетъ, что въ теченіи 1856—1858 гг. добыто всего около 800 пудовъ этого драгоценнаго минерала. По мѣрѣ добычи минералъ, хранившійся въ Култукскомъ селеніи, небольшими партіями отправлялся въ С.-Петербургъ. Располагая ничтожными денежными средствами, Пермкинъ долженъ былъ вести разработку открытаго имъ мѣсторожденія весьма медленно и на

<sup>1)</sup> Чекановскій, 1. с. выноска къ стр. 344.



небольшомъ участкѣ. Не взирая на то, долгое время мы не имѣли еще подробнаго описанія этой рѣчки ни въ орографическомъ, ни геологическомъ отношеніи и потому должны были довольствоваться лишь болѣе общими о ней свѣдѣніями и нѣкоторыми подробностями относительно самого мѣсторожденія названнаго минерала, — свѣдѣніями, которыя могутъ быть заимствованы изъ значительно устарѣлыхъ уже сообщеній горн. инженеровъ Меглицкаго <sup>1)</sup>, Версилова <sup>2)</sup> и нѣкоторыхъ замѣчаній Чекановскаго <sup>3)</sup>, посѣщавшихъ этотъ пріискъ. Только въ 1889 году Обручевъ <sup>4)</sup> далъ подробное описаніе геологическаго строенія долины р. Малой Быстрой съ расположенными по ней пріисками лазореваго камня. Отъ Версилова мы знаемъ, что въ 10 верстахъ отъ устья этой рѣчки имѣетъ мѣсто сліяніе двухъ ея верховьевъ; Чекановскій прибавляетъ еще одинъ притокъ (лѣвый) именно р. Тултуй, съ верховьями котораго мы ознакомились при описаніи Большаго Сарамы; въ него впадаетъ съ лѣвой стороны упоминавшаяся также рч. Харганта. О мѣстѣ расположенія пріиска читаемъ у Версилова, что оно находится на правомъ берегу лѣваго верховья М. Быстрой, въ 7 верстахъ выше его сліянія съ правымъ, т. е. въ 17 верстахъ отъ устья, при чемъ, по свидѣтельству Меглицкаго, лѣсистая и ущелистая долина эта до того стѣснена крутыми склонами горъ и такъ завалена камнями и упавшимъ лѣсомъ, что только съ трудомъ можно было добраться до мѣста разработки. Вершина горы праваго берега долины состоитъ изъ

---

<sup>1)</sup> Меглицкій, Горн. Журн. 1855 г. Ч. II. Кн. IV, стр. 38 — 40; то же *Verhandl. d. Mineral. Ges. zu St. Petersburg. Jahrg. 1856.*

<sup>2)</sup> Версильовъ, Зап. Сиб. Отд. И. Р. Геогр. Общ. 1857 г. Т. IV; Горн. Журн. 1858 г. Кн. I, стр. 193. и *Bull. de la Soc. des Nat. de Moscou. 1857. № 4.*

<sup>3)</sup> Чекановскій, Изв. Сиб. Отд. И. Р. Геогр. Общ. Т. I., № 1. 1870 г.

<sup>4)</sup> Обручевъ, Изв. Сиб. Отд. И. Р. Геогр. Общ. Т. XXI, 1890.

гранита, а средняя и нижняя части склона изъ перемежающихся пластовъ кристаллическаго и байкалитоваго известняка, который Меглицкимъ названъ «известковымъ гнейсомъ», — такъ здѣсь пироксенъ преобладаетъ въ известнякѣ». Общее направленіе этихъ пластовъ Меглицкій опредѣляетъ подъ 1° с.-з. — простираніе, указывающее очевидно на существованіе здѣсь сдвига, такъ какъ на сѣверъ отъ этой рѣки (по Иркуту), на западѣ (около Нижней Тибелти) и на востокѣ, по направленію къ Байкалу, пласты по наблюденіямъ Чертаго сохраняютъ все еще господствующее здѣсь простираніе с.-с.-з. до с.-з., тогда какъ на пріиски (1<sup>h</sup> с.-з.) оно приближается болѣе къ меридіональному. Жилы кварца и одна или траппа съ блѣдно-оливково-зелеными зальбандами перекрываютъ толщи этихъ известняковъ съ запада на востокъ, а въ верхней части толщи, состоящей изъ чистыхъ известняковъ, заключается мѣсторожденіе япись-лазули. Меглицкій видѣлъ здѣсь впрочемъ лишь два гнѣзда этого минерала, имѣющія въ діаметрѣ до 3—4 вершковъ; они лежали въ системѣ трещинъ, разсѣкающихъ породу въ плоскости ея наложенія и послѣ добычи находившагося въ нихъ небольшого количества лазореваго камня, не осталось никакого слѣда, въ которому можно было догадываться о его существованіи въ этомъ мѣстѣ. Прибайкальскіе (изъ с. Култукъ) крестьяне, издавъ наименьшую воду въ рѣчкѣ, собирали обыкновенно только япись-лазули, вымытые изъ кореннаго мѣсторожденія и снесенныя въ русло; но получаемые такимъ образомъ куски были обыкновенно небольшихъ размѣровъ. Версиковъ, посѣтившій пріискъ въ его цвѣтущемъ состояніи, передаетъ, что япись-лазули, судя по развѣдкамъ, встрѣчается здѣсь на площади въ 7000 кв. саженой, въ доломитовидномъ известнякѣ, почти отвѣсныя пласты котораго прилегаютъ къ гранито-сіениту. Известнякъ съ сѣрыми полосками является здѣсь кѣстами перемѣщеннымъ и разбитымъ трещинами, выполненными мучнистымъ веществомъ, содержащимъ слюду, и слегка

окрашеннымъ желѣзомъ; въ такихъ-то мучнистыхъ прожилкахъ и располагается лазоревый камень «въ видѣ валуновъ и угловатыхъ отторженцевъ»; рядомъ съ нимъ находится и сѣра въ видѣ кристалловъ. По мѣрѣ углубленія книзу прожилки содержатъ болѣе искомаго минерала, куски котораго, добываемые на пріискѣ, достигаютъ трехъ пудовъ вѣсомъ, сохраняя замѣчательную однородность сложенія во всей массѣ и красивый синій или фіолетовосиній цвѣтъ, причемъ и количество проростающаго его колчедана сравнительно гораздо меньше, нежели въ другихъ извѣстныхъ мѣсторожденіяхъ. Кромѣ того онъ сообщаетъ, что и въ выносахъ рч. Тулунтай, впадающей въ М. Быструю, найдены недавно куски лазореваго камня, указывающіе на возможность открытія и тамъ кореннаго его мѣсторожденія. Основываясь на собранныхъ имъ данныхъ, Версиловъ полагаетъ, что эти куски ляписъ-лазули представляютъ части сдвинутаго выхода, отдѣлившіяся во время перемѣщенія известняка отъ кореннаго мѣсторожденія минерала, залегающаго гдѣ либо глубже; отъ тренія при сдвигахъ образовалось по его мнѣнію и упомянутое выше мучнистое вещество или макоть. Лазоревый камень, бывшій вначалѣ безцвѣтнымъ, окрасился, согласно этому воззрѣнію, уже впослѣдствіи дѣйствіемъ температуры паровъ сѣры, соединявшихся съ нимъ, причемъ избытокъ сѣры осаждался въ кристаллическомъ видѣ.

Противъ такого объясненія возсталъ Чекановскій (1. с.); основываясь на условіяхъ нахожденія колчедана въ лазоревомъ камнѣ, онъ доказываетъ одновременное образованіе этихъ минераловъ, — обстоятельство, исключающее участіе высокой температуры, отъ которой колчеданъ долженъ былъ бы разложиться; поэтому и образованіе этого мѣсторожденія вмѣстѣ съ сопутствующею его сѣрою, онъ объясняетъ гидрхимическими процессами. Что же касается предполагаемаго «оторваннаго» состоянія кусковъ ляписъ-лазули, найденныхъ въ описанныхъ жилахъ, то осмотръ коллекцій этого минерала

находившихся въ музеѣ Восточно-Сибирскаго Отдѣла Географическаго Общества, указываетъ, по мнѣнію Черскаго<sup>1)</sup>, на простоконный, а не обломочный способъ образованія этихъ галазовъ, неправильно называвшихся поэтому валунами или отторженцами. Что же касается геогностическаго строенія мѣстности на всемъ протяженіи долины Малой Быстрой, то у Версикова находимъ одни лишь общія свѣдѣнія, именно, что горы состоятъ здѣсь «изъ гранито-сіенита различныхъ модификацій и цвѣтовъ», тогда какъ на картѣ Меглицкаго, страдающей впрочемъ крупными недосмотрами и предположительными выводами, весь лѣвый берегъ этой долины закрашенъ краскою кристаллическихъ известняковъ.

Обручевъ такъ описываетъ мѣсторожденіе лазореваго камня.

М. Быстрая въ 10 верстахъ отъ своего устья образуется отъ слиянія двухъ рѣчекъ правой и лѣвой М. Быстрыхъ. По лѣвой изъ нихъ расположенъ старинный пріискъ, къ которому ведетъ дорога, неоднократно переходящая съ одного берега на другой. Дорога, повидимому, прежде была колесной, теперь же запущена; мѣстами ее завалило буреломомъ, а мосты подверглись полному разрушенію. По лѣвому берегу, близъ слиянія обѣихъ рѣчекъ, образующихъ М. Быструю, видны скалы, сложенныя изъ сѣрожелтаго мелкозернистаго гранита, роговообманково-біотитоваго, который переходитъ, сохраняя тотъ же минеральный составъ, въ крупнозернистую разность; простираніе пластовъ —  $10^{\circ}$  с.-з., а паденіе  $4^{\circ}$  с.-в. подъ угломъ въ  $45^{\circ}$ . Одной верстой выше замѣтны небольшія обнаженія зелено-сѣро-желтой мелкозернистой порофы, состоящей изъ ортоклаза, кварца и магнезита съ преобладаніемъ плагіоклаза и роговой обманки. Еще 2 верстами выше, по тому же берегу, обнаруживается крупный крупнозернистый біотитовый гранитъ, съ прожилками сѣраго мелкозернистаго гнейсо-гранита; паденіе пластовъ на востокъ подъ угломъ  $20^{\circ}$ .

<sup>1)</sup> Черскій, Рукописныя замѣтки о Сибири.

Тѣ же гранитъ и гнейсъ, должно быть, развиты и еще выше по рѣчкѣ, на что указываютъ встрѣчающіеся здѣсь часто валуны этихъ породъ, но передъ старымъ пріискомъ, на правомъ склонѣ уже выступаютъ двѣ скалы, состоящія изъ бѣлаго и сѣраго кристаллическаго известняка. Самый пріискъ, отстоящій въ 7-ми верстахъ выше слиянія М. Быстрыхъ, обнаруживаетъ слѣдующее геологическое строеніе. Противъ развалившихся пріисковыхъ строеній, расположенныхъ на правомъ берегу, обнажается уже на лѣвомъ берегу бѣлый и желтоватый гранитъ, состоящій изъ кварца, плагиоклаза, ортоклаза и біотита; роговая обманка иногда является замѣстительницей біотита; порода становится въ этомъ случаѣ крупнозернистой, причемъ часть обманки замѣщается коричнево- и черно-красной вениссой, ромбическіе додекаэдры которой имѣютъ иногда 1 верш. въ поперечникѣ, но весьма крупны, такъ-что нѣтъ возможности извлечь ихъ изъ породы въ цѣлости.

Тутъ же обнажается желтовато-бѣлый крупно-кристаллическій известнякъ, въ которомъ замѣтны многочисленныя скопленія (вѣроятно пироксена и топазолита) мелкозернистаго строенія и зеленовато-желтаго цвѣта. Рѣже встрѣчаются въ немъ блестки графита, иглы волластонита, байкалитъ и сѣрный колчеданъ. Простираніе пластовъ какъ гранита, такъ и известняка, съ востока на западъ, а паденіе отвѣсное. Мѣстами гранитъ соприкасается съ известнякомъ, мѣстами же между ними располагается рыхлая желтая песчанистая глина, содержащая охру, съ включеніями обломковъ кварцево-полевошпатовой породы. Обломки эти характерны присутствіемъ многочисленныхъ пустотъ, заполненныхъ охрой бурымъ желѣзнякомъ и блестками графита, образующими лучисто-пластинчатые скопленія, напоминающія молибденовыя блескъ.

Ямы, вырытыя для добычи лазореваго камня, расположены на правомъ склонѣ долины, на высотѣ 250 метр. надъ

рѣчкѣ и въ  $1\frac{1}{2}$  верстахъ отъ нея. Ведущая къ ямамъ тропа проложена по лѣвому склону сухаго русла, на днѣ котораго разбросаны были гдѣ-то валуны лазореваго камня, послужившіе для открытія мѣсторожденія. Пространство, на которомъ располагаются ямы и канавы, достигаетъ 200 саж. длины и 50 саж. ширины (10,000 кв. саж.) и было занято прежде вырубленнымъ нынѣ лѣсомъ. Въ стѣнахъ одной изъ большихъ ямъ (10 саж. ширины, 8—10 длины и до 2 глубины) виденъ только сѣрый и бѣлый кристаллическій доломитовый известнякъ съ блестками графита и кубиками сѣраго колчедана. Въ сѣверномъ углу восточной стѣнки образовались двѣ трещины, заполненные бѣлой и желтоватой известково-слюдистой рыхлой массой. Въ нижней части этой массы наблюдаются обломки бѣлаго известняка съ пятнами сѣлаго лазореваго камня. Между трещинами, имѣющими ширину 1—2 дюйма и расширяющимися книзу до 12—15 д. расположенъ кристаллическій известнякъ, въ которомъ проходятъ вертикальныя сѣрыя полосы 0,5 — 1 д. ширины, либѣющія такой цвѣтъ отъ примѣси къ известняку блесокъ графита. По простиранію этихъ трещинъ заложена была нынѣ затопленная шахта, достигавшая около 3 саж. глубины. Проводникъ Обручева оказался бывшимъ рабочимъ на этомъ приискѣ и сообщилъ путешественнику, что изъ этой ямы добывались большія глыбы лазореваго камня гѣсомъ въ 3 — 4 пуда.

Описанная яма соединена канавой съ другою (длиною 6—7 саж., шириною 1—3 и глубиною 2— $2\frac{1}{2}$ ), въ восточной стѣнкѣ которой можно видѣть крупно-кристаллическій сѣрый и бѣлый доломитовый известнякъ съ включеніями чистаго яшнись-лазули, расположенной отдѣльными гнѣздами, составленными изъ зеренъ величины въ кулакъ и больше. Въ участкахъ, лишенныхъ гнѣздъ разсматриваемаго минерала, известнякъ становится болѣе мелкозернистымъ. Какъ въ известнякѣ, такъ и въ яшнись-лазули попадаются иногда не-

большіе кристаллы сѣрнаго колчедана. Строеніе стѣнокъ второй ямы обнаружило, какъ видно, коренное мѣсторожденіе этого драгоцѣннаго минерала и подтвердило мнѣніе, высказанное Версиловымъ (см. выше), что трещины, заполненные мучнистымъ, по его выраженію, веществомъ, содержащимъ куски ляписъ-лазули, есть только выходы жилъ этого минерала, расположенныхъ глубже въ плотномъ доломитовомъ известнякѣ.

Судя по нѣкоторымъ образцамъ лазореваго камня, собраннымъ Обручевымъ въ отвалахъ, видно, что этотъ минералъ вмѣстѣ съ кальцитомъ и бѣлой слюдой образуетъ корку на сѣрой известково-кварцевой породѣ и вѣдряется иногда въ нее на подобіе жилокъ. Въ присутствіи въ лазоревомъ камнѣ кристалловъ сѣры, на что указываетъ Версиловъ (см. выше), Обручевъ не могъ убѣдиться; путешественникъ указываетъ на присутствіе въ минералѣ желтыхъ крапинъ, не видитъ въ нихъ образовавшіяся изъ сѣрнаго колчедана водныя окиси желѣза.

Среди валуновъ, собранныхъ Обручевымъ въ руслѣ М Быстрой, оказались: дымчатый кварцъ, бѣлый кварцъ съ чернымъ шерломъ, черный и темносѣрый базальтъ и куски мелко зернистой зеленовато-сѣрой породы, состоящей изъ кварца известковаго шпата, ортоклаза, плагіоклаза и сѣро-зеленаго пироксена.

Свѣдѣнія наши о долинѣ р. Большой Быстрой до сихъ поръ крайне ограничены. Выше упомянуто было, что она беретъ начало изъ озера Быстринскаго у подножія Хамаръ-Дабанскаго гольца; среднее теченіе ея какъ равно и число притоковъ вовсе неизвѣстны и только низовья, пересѣкаемые Тункинскою дорогою и располагающіяся въ общедолинѣ съ М. Быстрою, описывались или упоминались каждымъ изъ проѣзжавшихъ здѣсь путешественниковъ. Низовья эти отдѣлены отъ М. Быстрой лишь незначительнымъ напоснымъ, валообразнымъ возвышеніемъ почвы до 4 верстъ ши

рини, сливающимся къ юго-западу съ отрогомъ, разобщающимъ обѣ эти долины. Проѣздъ черезъ эти рѣчки всегда былъ сопряженъ съ немалою опасностью, такъ какъ обѣ онѣ переѣзжались въ бродъ по руслу, заваленному крупными валунами и галькою, вслѣдствіе чего телѣга обыкновенно наклонялась поочередно то на одну, то на другую сторону; если-же прибавить къ сказанному быстроту воды, вполне оправдывающую названіе этихъ рѣчекъ, къ тому же частую и весьма быструю прибыль водъ отъ выпадающихъ въ горахъ дождей, то будетъ понятно почему переправы черезъ Быстрыя сопряжены были обыкновенно съ весьма неприятными и иногда съ весьма печальными приключеніями, стоившими даже жизни многихъ людей, нежелавшихъ выходить удобнаго къ броду времени. Вотъ почему какъ населеніе долины Иркута, такъ и всѣ путешествующіе въ Тунгусскій край вполне успокоились съ тѣхъ поръ, какъ около 1878 г. построены были наконецъ на этихъ рѣчкахъ прочные мосты, позволяющіе теперь и не думать о предстоящей черезъ нихъ переправѣ, мысль о которой прежде всегда вызвала какое-то безпокойство и напряженное состояніе въ путешественникахъ, знакомыхъ съ исторіею трагическихъ случаевъ, связанныхъ съ этими переѣздами.

Въ свою очередь плаваніе по Иркуту на интересующемъ насъ протяженіи показало, что онъ протекаетъ здѣсь хотя и въ сѣуженныхъ, но почти совершенно поросшихъ смѣшаннымъ лѣсомъ и неутесистыхъ берегахъ, представляя одну лишь незначительную быстрину, такъ называемую Ихэ-нугановскую шиверу, отъ имени небольшого ключа (Ихэ-нуганъ, т. е. большая излучина), впадающаго въ него съ лѣвой стороны, откуда, т. е. съ хребта Буличій Носъ, вытекаютъ еще рѣчки Серебрянка и Нижній Ихэ-нуганъ. По изслѣдованіямъ Черскаго <sup>1)</sup>,

<sup>1)</sup> Черскій. Рукописныя замѣтки о Сибири.



верстахъ въ 4-хъ ниже устья Нижн. Тибельти (считая по извилинамъ), на крутомъ склонѣ праваго берега, непосредственно омываемаго водою, замѣчаются розсыпь и выступы гранито-гнейса съ вениссою и бѣлый гранитъ съ крупными листочками слюды; затѣмъ около Ихэ-нугановской шиверы, гдѣ рѣка образуетъ двойную излучину, на правомъ же берегу обнажается гнейсъ, отвѣсные пласты которыхъ простираются на с.-з.; та-же порода выступаетъ и ниже излучины съ паденіемъ пластовъ на ю.-ю.-з., а нѣсколько ниже по теченію еѣ можно видѣть и на лѣвомъ берегу, падающемъ къ сѣверу. Наконецъ, начиная съ устья Нижняго Ихэ-нугана (недоѣзжая съ версту до устья Малой Быстрой), горы лѣваго берега Иркутъ отступаютъ къ сѣверо-востоку, къ лѣвому берегу входа въ ущелье, уступая мѣсто неширокому впрочемъ прибрежію, высотой въ нѣсколько сажени съ ясно развитыми террасами, числомъ до трехъ; Иркутъ же, пройдя нѣсколько далѣе и принявъ воды рр. Быстрыхъ, въ свою очередь дѣлаетъ крутой поворотъ къ сѣверу, къ ущелью, ближе къ которому, около одной версты ниже устья Большой Быстрой, въ него впадаетъ еще съ правой стороны упоминавшійся уже прежде Ильчинскій ключикъ; нѣсколько выше послѣдняго, въ невысокомъ склонѣ площади, около берега Иркутъ выступаютъ отвѣсные пласты роговообманковаго гнейса и таковаго же сланца съ простираніемъ, измѣняющимся отъ з. до з.-с.-з. Въ геологическомъ отношеніи лѣвый берегъ Иркутъ на поворотѣ его къ ущелью представляетъ много важныхъ данныхъ для сужденія объ исторіи развитія этой части долины Иркутъ. Проплывая въ 1876 г. мимо устья р. М. Быстрой и лѣваго рукава Б. Быстрой, на лѣвомъ берегу Иркутъ Черскій видѣлъ сначала террасу, въ которой обнажался древнѣйшій изъ извѣстныхъ здѣсь пластовъ послѣ третичныхъ наносовъ, именно крупная округленная галька и валуны различныхъ кристаллическихъ породъ, въ томъ числѣ и лавовой, залегающей подъ упоминавшимся выше

слоистымъ пескомъ, но нѣсколько ниже по теченію, изъ подъ этой гальки и покрываясь ею, выступаютъ приподнятые пласты буровато-желтаго, довольно рыхлаго песчаника, цементованнаго углекислою известью и перемежающагося съ пластами такого же конгломерата, состоящаго изъ галекъ тѣхъ же породъ, съ базальтовою лавою включительно, но болѣе мелкихъ, нежели залегающая на головахъ этого болѣе древняго отложенія, которое Черскій относитъ къ третичной (пiocеновой) формаціи по аналогіи съ байкальской. Простираніе этихъ пластовъ оказалось поперечнымъ къ теченію Иркутъ, т. е. с.-з.  $20^{\circ}$ , съ паденіемъ на в.-ю.  $20^{\circ}$ , причемъ наклонъ ихъ, сначала равный  $35^{\circ}$ , увеличивается ниже рѣкъ до  $45^{\circ}$  и наконецъ до  $65^{\circ}$ ; видимая толщина обнаженной части этой толщи не менѣе 100 футовъ; мѣстами въ пластахъ этихъ попадались грубые отпечатки древесныхъ стволовъ, другихъ же ископаемыхъ остатковъ не найдено вовсе. Еще ниже по теченію рѣки, слѣдовательно еще ближе къ ущелью, пласты эти, черезъ посредство небольшого осыпавшагося пространства, примыкаютъ къ базальтовой лавѣ, совершенно тождественной съ тою, изъ которой образовалась погребенная въ описанныхъ пластахъ галька. Лава эта образуетъ собою удлиненную на в.-ю.-в. гору, возвышающуюся на 880' надъ Иркутомъ, располагаясь между его лѣвымъ берегомъ и лѣвымъ же берегомъ долины Нижняго Ихэ-нугана; съ сѣверной-же стороны она отчасти примыкаетъ къ склону вышихъ горъ, состоящихъ изъ древнѣйшихъ кристаллическихъ породъ, отчасти же отдѣляется отъ нихъ долиною незначительнаго ручейка (лѣвый притокъ Иркутъ), слѣдующею около подножія гнейсовыхъ горъ лѣваго берега входа въ ущелье, гдѣ лава уже болѣе не встрѣчается, тогда какъ ущѣлѣвшіе отъ размыва воступы этой изверженной породы найдены Черскимъ на правомъ берегу Иркутъ и далѣе на востокъ, въ долинѣ Илчи, а наконецъ и Култучной около Байкала.

Основываясь на этих явлениях, Черский заключает<sup>1)</sup> во-первых, что эта часть долины Иркута настолько древняя, что была готова еще в период, предшествовавший отложению описанных выше, по всему вероятію третичных осадков, и во-вторых, что раньше отложения их мѣсто современнаго входа въ ущелье Иркута преграждалось излившеюся лавой, около которой образовались слои песчаника и конгломерата, заимствуя отъ ней базальтовую гальку; что-же касается остальныхъ выводовъ, то съ ними мы ознакомимся лишь послѣ описанія Ильчинской долины и соединенія ея черезъ посредство Култучной съ Байкаломъ, посвятивъ этому вопросу отдѣльную главу, въ настоящее-же время перейдемъ къ ущелистой части долины Иркута и низовьямъ этой рѣки.

#### и) Ущелье р. Иркута.

Понизившееся до 2000' абс. высоты и потерявшее альпійскій характеръ продолженіе Тункинской цѣпи сохраняетъ здѣсь все таки въ общемъ прежнее восточное направленіе измѣняющееся въ окраинахъ отчасти въ в.-ю.-в.-ое, вслѣдствіе отроговидныхъ выступовъ, въ родѣ напр. хребта Куличий Носъ, съ юго-западною частью котораго (Тибельтинско-Быстринское сѣуженіе Иркута), какъ равно и съ юго-восточною оконечностью его (поворотъ Иркута къ ущелью), мы успѣли уже ознакомиться. Что-же касается долины Иркута, то она вообще пересѣкаетъ эти горы въ сѣверо-западномъ, слѣдовательно діагональномъ направленіи, образуя при этомъ не мало излучинъ, изъ которыхъ самая значительная располагается въ начальной части ущелья, между Куличьимъ Носомъ и слѣдующимъ за нимъ отрогомъ, называемымъ

---

<sup>1)</sup> Черскій, Изв. Сиб. Отд. И. Р. Геогр. Общ. Т. XI, № 1 и 2. См. также Зап. И. Р. Геогр. Общ. Т. XV съ картою Байкала.

Зиркузунъ. Длина ущелистой части теченія, измѣ-  
ря со всѣми его изгибами, по вычисленіямъ Черскаго, рав-  
няется 85—86 верстамъ, считая отъ входа въ нее ниже  
плота Ильчи до праваго берега долины рч. Шаманки  
около деревни Моты, — конечные пункты, отъ имени ко-  
торыхъ Бакпевичъ назвалъ эту часть долины Ильчинско-  
Мотскимъ ущельемъ («Щеки Иркута» у мѣстныхъ  
аппелей). Затѣмъ длина остальной части теченія отъ Мотъ  
до устья въ Ангару, т. е. длина низовья рѣки, равняется  
50 верстамъ, вслѣдствіе чего общая длина Иркута отъ входа  
въ ущелье до устья составляетъ 135—136 версты; если же  
пнть въ виду, что поверхность рѣки около устья Ильчи  
располагается на высотѣ 1938' н. ок. (377' надъ Байкаломъ),  
тогда какъ высота устья въ Ангару опредѣлена въ 1470,4'  
ва 90,6' ниже уровня Байкала), то цифры эти даютъ до-  
вольно значительный средній наклонъ русла этого от-  
рѣзка Иркута, равный 2,8 фут. на одну версту, тогда какъ  
для ущелистой части теченія наклонъ этотъ увеличивается  
почти въ два раза, равняясь 5 фут. на версту, если принять  
высоту поверхности рѣки около Мотъ въ 1520'. Цифры эти,  
возможное исправленіе которыхъ требовало-бы инструменталь-  
ной нивелировки отъ Байкала до устья р. Иркутнаго Ильчи,  
а также отъ станціи Моты до протекающаго недалеко отъ  
ней Иркута, указываютъ на очень быстрое теченіе рѣки въ  
ущелистой ея части, что оправдывается и въ дѣйствитель-  
ности до того, что по свидѣтельству Черскаго нѣкоторые  
отрѣзки рѣки, далеко не достигающіе версты въ длину, обна-  
руживаютъ вполнѣ замѣтный для глаза наклонъ, причемъ  
ребцы, желая уменьшить чрезмѣрную быстроту движенія  
мачи, тормозили её веслами или гребли слегка вверхъ по  
теченію, т. е. назадъ («табанили» по выраженію ихъ). Необходи-  
мо принять во вниманіе еще то обстоятельство, что въ  
предѣлахъ ущелистой части долины, а въ особенности въ  
верхней ея половинѣ, русло рѣки устѣяно большими камнями,

какъ скрытыми подъ водою и обусловливающими въ такомъ случаѣ лишь волнующіяся быстрины («шиверы»), такъ и обнаженными поперечными грядами, образующими пороги; къ тому-же, не считая отдѣльных подводныхъ камней, заставляющихъ пловца быть постоянно на сторожѣ и неуспѣшно напрягать вниманіе, количество быстринъ такъ велико, что онѣ встрѣчаются на протяженіи почти каждой двухъ верстъ<sup>1)</sup>. Такого рода условія дѣлаются понятнымъ, почему для жителей Тункинскаго края (такъ называютъ нерѣдко мѣстность по теченію описываемой рѣки отъ ея верховьевъ до ущелья) Иркутъ вполнѣ теряетъ значеніе какъ водный путь, связывающій ихъ съ однимъ изъ главныхъ центровъ торговли, — съ г. Иркутскомъ. Не взирая на столь выгодное направленіе рѣки, ни одинъ Тункинecъ не дерзнетъ спуститься по нему въ лодкѣ или вообще воднымъ путемъ: красивая, но негостепріимная эта часть Иркуты, окруженная дѣвственнымъ лѣсомъ съ большимъ количествомъ живущихъ въ немъ медвѣдей и другихъ звѣрей, посѣщается лѣтомъ и осенью лишь звѣропромышленниками (отчасти и рыбаками), попадающими туда не иначе какъ сухимъ путемъ, черезъ горы, и пользующимися наскоро связанными плотиками только для переѣздовъ на другую сторону рѣки, выбирая для этого тихія мѣста передъ порогами, называемыя *плёсами*. Зимой однако, когда Иркутъ покрывается льдомъ, Тункинцы обыкновенно прокладываютъ по нему дорогу къ Иркутску, какъ болѣе близкую и несравненно болѣе удобную нежели трактъ, ведущій черезъ высокія горы отъ юго-западной оконечности Байкала къ городу хотя сокращенный путь этотъ въ свою очередь представляетъ иногда затрудненія и не всегда удобопроложимъ какъ по тому, что нѣкоторыя быстрины не замерзаютъ, такъ и по причинѣ снѣговыхъ забоевъ.

Всѣ эти неблагоприятныя условія были причиною того

<sup>1)</sup> Бакшевичъ, I. с.

что ущелистая часть долины осмотрѣна и пройдена въ первый разъ лишь въ 1853 г. горн. инженеромъ Бакшевичемъ, совершившимъ путешествіе въ маленькой лодкѣ съ двумя гребцами. Затѣмъ, двадцать три года спустя (въ 1876 г.), пройдя ущелье это Черскій, точно также въ небольшой лодкѣ и съ двумя гребцами, но уже съ другими, такъ какъ бывшіе проводники Бакшевича не оказались въ живыхъ. Наконецъ, въ концѣ семидесятыхъ годовъ, нѣкій предприимчивый и смѣлый, но крайне неосмотрительный человѣкъ, не собравъ достаточно свѣдѣній о характерѣ теченія рѣки въ ущелистой части долины, рѣшился сплавить лѣсъ изъ Тунки въ Иркутъ и пустился съ плотами въ ущелье, не полагая встрѣтить въ немъ физической невозможности провести сплавочныя бревна; смѣлое предпріятіе это, какъ рассказывали Черскому въ Тункѣ, окончилось полнѣйшимъ крушеніемъ, такъ сказать на первыхъ-же шагахъ, съ тѣмъ лишь успѣхомъ, что людямъ удалось благополучно достигнуть ближайшаго берега рѣки, хотя и безъ провіанта. Такая печальная участь чуть было не постигла и Бакшевича. Впечатлѣніе, произведенное фізіономіею Иркуты, измѣнившееся при входѣ въ ущелье, такъ было сильно, что путешественники забыли объ опасности, среди которой они находились. Гребцы оставили весла и невольно устремили взоры на грозную и величавую картину сгустившейся долины, въ которой рѣка все болѣе и болѣе волновалась, представляя далѣе уже кипящую стихію, изъ которой выдавались десятки камней и глыбъ, обрамленныхъ кипящею вокругъ нихъ водою; между тѣмъ небольшая лодка Бакшевича, несомая порывистою струею, попала на подводный камень и въ ту-же минуту, повернувшись поперекъ теченія, стала ложиться на бокъ, такъ-что, если бы не присутствіе духа и не отчаянное усиліе оттолкнуться, лодка была бы затоплена водою и путешественникамъ предстали бы шансы на почти неизбежную смерть.

Кромѣ многихъ замѣтокъ, относящихся какъ къ общему

характеру ущелья, такъ и нѣкоторыхъ его частностей, а также геогностическаго строенія мѣстностей, Бакшевичъ приложилъ къ упомянутой уже выше статьѣ своей и геогностическую карту Иркутъ отъ Тунки до Иркутска, на которой впрочемъ нѣкоторыя породы нанесены предположительно, причемъ кромѣ взгляда на явленія съ устарѣвшей уже точки зрѣнія, въ опредѣленіе породъ вкрались нѣкоторые недомотры, исправленные впослѣдствіи Черскимъ, отъ котораго мы заимствуемъ нижеслѣдующія данныя<sup>1)</sup>.

Относительно общаго характера этой части Иркутъ Черскій замѣчаетъ, что, хотя топографическія особенности заставляютъ отнести ее къ разряду ущелій, въ особенности въ сравненіи съ столь широкими долинами какъ орошаемая рѣкою выше Ильчинскаго ключа и Тибельтинско-Быстринскаго суженія, тѣмъ не менѣе, если со словомъ ущелье путешественникъ будетъ связывать представленіе о тѣхъ только грозныхъ и величавыхъ щелевидныхъ типахъ долинъ, рисунки которыхъ прилагаются къ различнымъ описаніямъ или руководствамъ какъ образцы крайнихъ формъ этого типа (напр. Колорадо и мног. другіе), то, проплывая Ильчинско-Мотское ущелье, онъ будетъ ощущать что-то въ родѣ разочарованія, какъ это было и съ Черскимъ, такъ какъ статья Бакшевича не даетъ дѣйствительнаго понятія о наружности этого отрѣзка долины, а нѣкоторыя употребленныя въ ней выраженія, какъ напр. «щель», еще усиливаютъ эффектъ, производимый обыкновенно уже словомъ «ущелье». На самомъ дѣлѣ вы видите передъ собою долину до 50—60 саж. въ поперечникѣ, расширяющуюся вверху до 150—200 саж., при высотѣ окружающихъ ее горъ до 1000—1500 надъ уровнемъ рѣки, суживающейся мѣстами повидимому до 40 саж. Склоны этихъ горъ въ свою очередь не

<sup>1)</sup> Черскій, Изв. Сиб. Отд. И. Р. Геогр. Общ. Т. VII № 4—5; Т. IX № 1—2; Т. XI № 1 и 2; Т. XII № 2—3; Зап. Геогр. Общ. Т. XV и Рукописныя замѣтки о Сибири.

столь крутые, какъ въ образцовыхъ ущельяхъ и обнажены далеко не во всю ихъ высоту и не вездѣ: представляя мѣстами наклонъ около  $60^{\circ}$  и болѣе, съ отвѣсными нерѣдко уступистыми скалами, онѣ ниспадають въ другихъ мѣстахъ даже и до  $45^{\circ}$ , въ особенности на лѣвомъ берегу рѣки, порослая густою древесною растительностью или травой. Къ сказанному необходимо еще прибавить, что особенности эти свойственны лишь первой, т. е. верхней трети длины ущелья, тогда какъ ниже по теченію ширина рѣки и долины значительно увеличиваются (до 100 саж.), а склоны повизвившихся горъ еще менѣе утесисты, болѣе пологи и лѣсисты, причемъ, какъ на общую впрочемъ характеристику всей длины ущелья, слѣдуетъ указать на тотъ фактъ, что въ мѣстахъ второстепенныхъ изгибовъ долины (не болѣе 2—4 верстъ длины) окрестности отроговъ («мысы»), вокругъ которыхъ совершаются эти изгибы, являются обыкновенно террасовидными, возвышаясь до нѣсколькихъ саженей надъ современнымъ уровнемъ рѣки и обнаруживая въ одномъ, недоступномъ впрочемъ, мѣстѣ верхней поверхности террасы отложение, похожее на наносъ съ валунами (Гекъ-убѣурская излучина, см. ниже). Такой значительно изношенный уже характеръ склоновъ ущелья, какъ-равно и многихъ его побочныхъ долинъ, вмѣстѣ съ террасовидными уступами, указываетъ уже само по себѣ на сравнительно болѣе глубокую древность Ильчинско-Мотскаго отрѣзка долины Иркутъ, въ особенности въ его нижнихъ двухъ третяхъ или даже трехъ четвертяхъ длины, гдѣ широкія долины многихъ его притоковъ приближаются уже къ совершенно оконченному, почти вымирающему типу; террасовидность склоновъ, и въ особенности упомянутыхъ мысовъ около излучинъ (какъ напр. Гекъ-убѣуръ, Теплый мысъ, Куйтунскій и т. п.), доказываетъ въ свою очередь, что прежде долина эта отличалась значительно меньшею глубиною при сравнительно большей ширинѣ и лишь впоследствии углубилась до современнаго ея уровня. Многія второстепен-



ныя излучины образовались именно въ періодъ этого позднѣйшаго углубленія долины, въ мѣстахъ, гдѣ прежнее теченіе Иркутъ отличалось даже прямолинейнымъ направленіемъ, и, такимъ образомъ, нѣкоторые поперечные отрѣзки бывшаго дна рѣки появляются нынѣ въ видѣ террасовидныхъ поверхностей мысовъ, вокругъ которыхъ образовались излучины, врѣзавшись на нѣсколько саженой въ скалистую почву. Поэтому Черскій считаетъ ущелистую часть долины Иркутъ не трещиною (щелью), какъ это полагалъ Бакшевичъ, а результатомъ размыва, облегчаемаго и направляемаго присущимъ всѣмъ породамъ растресканнымъ ихъ состояніемъ (отдѣльность). Процессъ этотъ, удободостигаемый такимъ образомъ силкомъ даже сравнительно ничтожныхъ, періодическихъ и атмосферныхъ водъ, является способнымъ вызвать всѣ возможныя особенности рельефа на всѣхъ доступныхъ ему гипсометрическихъ уровняхъ суши, дѣйствуя независимо отъ сдвиговъ и ихъ трещинъ, нерѣдко маскируя послѣднія тамъ, гдѣ онѣ существовали, и могли когда-то вліять на временное направленіе размыва.

Переходя затѣмъ къ важнѣйшимъ частностямъ ущелья мы раздѣлимъ его для большаго удобства изложенія на три части: верхнюю, — отъ начала ущелья до Мойготскаго порога около сомненныхъ рѣчекъ; среднюю — отъ Мойготъ до устья р. Зазары и нижнюю — отъ Зазары до устья р. Шаманки.

Начиная отъ входа въ ущелье, Иркутъ омываетъ восточный, а затѣмъ сѣверо-восточный склоны Куличьяго Носа, отдѣляя его отъ отрога Зыркузѣна. Сначала (на протяженіи болѣе 4 версты) онъ придерживается здѣсь вообще почти меридіональнаго направленія, послѣ чего, образовавъ крутую Гэкъ-убурскую излучину, обращенную къ югу, онъ направляется на з.-с.-з. къ устью своего лѣваго притока, названнаго подъ названіемъ Въѣмная. Устье этой рѣчки располагается почти въ 17 верстахъ отъ входа въ ущелье

и соответствует самой узкой части основания Куличьяго Носа, вследствие чего, какъ упоминалось уже выше, Иркутъ, сдѣлавъ столь значительную петлю около названнаго отрога (40 верстъ, считая съ изгибами), приближается здѣсь опять къ знакомымъ уже намъ Куркутскимъ поворотамъ его въ предѣлахъ Торской котловины на столько, что ближайшее разстояніе между вѣтвями излучины въ этомъ мѣстѣ равняется всего лишь четыремъ верстамъ. Со склона Куличьяго Носа рѣка на этомъ протяженіи принимаетъ много небольшихъ притоковъ, вообще извѣстныхъ подъ названіемъ Сѣверныхъ (т. е. сѣверныхъ), въ частности же первый изъ нихъ имѣется Гурлей, а предпоследній Саганъ-нугунъ, тогда какъ съ правой стороны, т. е. съ Зыркузина, указывается лишь на одинъ ключъ, называемый Гэвъ-убуръ, — обстоятельство, связанное должно быть съ значительно, почти на половину меньшею шириною Зыркузуна, образующаго очень другой и скалистый правый берегъ ущелья, между тѣмъ какъ соответствующій склонъ Куличьяго Носа замѣтно положе, покрытъ густымъ лѣсомъ и представляетъ утесы только ближе къ поверхности Иркутъ. Кромѣ того склонъ Куличьяго Носа въ начальной части ущелья обнаруживаетъ весьма интересную для геологовъ особенность: въ противоположность Зыркузуну склонъ высшей части этого отрога значительно удаленъ отъ рѣки, направляясь почти прямолинейно на с.-с.-з. къ ея повороту за Гэвъ-убурскою излучиною, тогда какъ къ берегу Иркутъ подступаетъ хотя и высокая, но террасовидная часть этого склона, круто обрѣзываясь и опускаясь къ рѣкѣ. Обозначая эту террасу съ болѣе значительныхъ высотъ лѣваго берега ущелья, Черскій склоняется допустить, что въ отдаленный періодъ времени на мѣстѣ нынѣшней начальной части ущелья и на значительной высотѣ надъ современнымъ уровнемъ рѣки располагалось сравнительно широкое, котлообразное углубленіе почвы, удлиненное почти въ меридиональномъ направленіи и понижающееся къ сѣверу, въ

сторону нынѣшней Гэкъ-убурской излучины, высшая, террасовидная поверхность праваго берега которой, т. е. нынѣшняго утесистаго мыса, вокругъ котораго изгибается рѣка, точно также входила въ составъ дна этой котловины. Углубленіе это, по мнѣнію Черскаго, могло служить верховьями самостоятельной рѣки, протекавшей къ Ангарту по мѣсту, занятому нынѣ Иркутомъ, и лишь въ послѣдствіи захватившей ея воды путемъ извѣстнаго въ природѣ процесса отступаящаго движенія верховьевъ рѣкъ. Послѣдовавшее за тѣмъ углубленіе русла оставило прежнее дно котловины высоко надъ современнымъ уровнемъ воды, — періодъ, къ которому относится и образованіе несуществовавшей прежде Гэкъ-убурской излучины. Къ вопросу этому мы будемъ имѣть случай возвратиться еще въ одномъ изъ послѣдующихъ параграфовъ изложенія, касающагося прежняго направленія Иркуты въ Байкалу, а также бывшаго распространенія водъ послѣдней на Тункинскую долину, теперь же возвратимся къ другимъ подробностямъ, относящимся къ интересующей насъ частъ ущелья.

Быстрота рѣки значительно увеличивается уже съ самаго начала ущелья, а въ Гэкъ-убурской излучинѣ она достигаетъ своего максимума, образуя длинную и весьма эффектную быстрину, извѣстную подъ именемъ Куличьяй шиверы. При вистое теченіе Иркуты несетъ здѣсь лодку прямо къ утесу поворота и на торчащій передъ нимъ камень; оробѣвшимъ гребцамъ Черскаго, напуганнымъ всѣми жителями опасность предпринятаго ими плаванія, не удалось дать надлежащаго направленія лодкѣ и потому было мгновеніе, когда всѣ ожидали удара объ этотъ камень; оказалось однако, что понасу на него не было возможности даже при желаніи, такъ какъ клокочущая и пѣнящаяся вокругъ него вода сейчасъ-же отбросила лодку въ сторону, повернувъ её именно туда, куда и надо было плыть. Ниже излучины теченіе сравнительно тихое, да и Куличьяй шивера, какъ говорятъ, въ большу

юу (въ июлѣ мѣс.) представляетъ гораздо менѣе опасностей, Черскій же проплывалъ еѣ 18-го мая, когда въ горахъ лежало еще много нестаявшаго снѣга. Около устья четвертаго прѣча (считая отъ Гэкъ-убурской излучины), протекающаго по сравнительно болѣе широкой и длинной долинѣ, путешественники нашли небольшой шалаашъ (балаганъ), построенный изобрѣтателями, близъ котораго они остановились ночевать. Съ этого мѣста видно, что по направленію къ р. Възмной высота Куличьяго Носа значительно уменьшается, причемъ изъ за него виднѣются покрытыя снѣгомъ вершины восточныхъ пиковъ альпійской части Тункинской долины горъ, а еще ниже, съ ключа Саганъ-нугунъ, открывается видъ и на устье р. Възмной, около которой, въ наблюденію анероидомъ, уровень Иркутска оказывается на 348' ниже поверхности его около Кукоя (въ Торской котловинѣ), указывая на средній наклонъ русла около 8' на 1 версту.

Глубокая долина этой рѣчки («Ерханцакъ» у бурятъ) направляется на в.-ю.-в., а въ низовьяхъ и на в. къ Иркуту, которому она не уступаетъ въ ширинѣ; вверхъ по ней, а затѣмъ вверхъ по крутой ея правой вѣтви, пролагается Тунгусами упомянутая выше зимняя дорога, послѣ чего на высотѣ 737' надъ Иркутомъ, около Куркутскихъ поворотовъ, слѣдуетъ пологій спускъ въ Торскую котловину, къ Подъгорскому улусу, и такимъ образомъ семи или восьмиверстныя переваломъ черезъ Куличій Носъ сокращаютъ сороковерстный объѣздъ вокругъ этого отрога.

Начиная съ устья рч. Възмной, Иркутъ поворачиваетъ на с.-с.-в., чтобы обогнуть узкую (менѣе 3 верс.) и головчатую оконечность Зырвузѣна, послѣ чего, образуя лишь незначительные изгибы, рѣка направляется вдоль сѣвернаго отрога на в.-ю.-в., на протяженіи почти 20 верстъ, впадая въ рч. Мойготъ, т. е. до конца верхней части ущелья. Въ разстояніи около 1½ версты ниже Възмной, насупро-

тивъ средней изъ трехъ лопастей оконечности Зыркузунъ располагается устье второго изъ болѣе значительныхъ лѣвыхъ притоковъ этой части рѣки: это широкая и пологая долина рч. Зубкогонъ, слѣдующая вообще юго-восточному направленію, а ближе къ устью, гдѣ къ ней присоединяется сухая лѣвая вѣтвь, она поворачиваетъ на ю.-ю.-в. Долина вмѣстѣ со Въемною принадлежитъ уже къ категоріи болѣе продольныхъ (нѣсколько діагональныхъ) бороздъ, расчленяющихъ эту часть Тункинской цѣпи на соотвѣтственное число почти параллельныхъ хребтовъ и обусловливающихъ этимъ путемъ ту характеристическую черту цѣпи, на которую мы указывали уже при описаніи восточной части Торской котловины. Экскурсія вверхъ по главной (правой) вѣтви Зубкогона показала, что въ нѣсколькихъ верстахъ отъ устья (около долины преграждается высокою столовою горою съ слегка выгнутымъ контуромъ верхней поверхности; нѣкимъ непосѣщаемая гора эта отдѣляетъ собою оба верховья Зубкогона, — одно, слѣдующее на востокъ, а другое съ сѣвера на югъ дно долины, мѣстами болотистое, поросло смѣшаннымъ лѣсомъ, среди котораго наблюдаются и луговые полянки; склоны точно также лѣсистые; небольшіе утесики наблюдаются лишь изрѣдка, ближе къ уровню дна долины, а также около самаго устья.

Отъ устья Зубкогона до рѣчекъ, извѣстныхъ по названію Мѡйготъ, на протяженіи около 20 верстъ Иркутъ придерживается направленія въ общемъ на в.-ю.-з. омывая сѣверо-восточный склонъ отрога Зыркузунъ суживая его отъ 4 до менѣе 2 версты. За исключеніемъ болѣе значительныхъ извилинъ, образуемыхъ рѣкою около оконечности названнаго отрога, далѣе она представляетъ лишь небольшіе изгибы; долина Иркутъ здѣсь сравнительно менѣе утесистая, нежели въ верхнемъ отрѣзкѣ ущелья; вѣрѣдко склоны ея являются совершенно покрытыми лѣсомъ, причемъ и долины большей части притоковъ столь же глубоки и п

рости древесною растительностью. Тамъ не менѣ берега и русло во многихъ мѣстахъ изобилуютъ большими камнями и глыбами скаль, образующими нѣсколько быстринь (шиверы) и частые пороги. Такъ напр. первая довольно значительная шивера находится недалеко отъ устья Зубкогона; проплывая еѣ необходимо придерживаясь ближе къ правому берегу, искорѣ за нею располагается и довольно эффектный Зубкогонскій порогъ: онъ проплываетъ ближе къ лѣвому берегу рѣки, гдѣ вода, стѣсняясь между двумя каменными глыбами, низвергается, образуя острый и пѣнистый гребень на средней линіи струи. Сквозь эти узкія «ворота», гдѣ обѣ глыбы легко задѣваются веслами, малая лодка мчится съ быстротою стрѣлы, колеблясь на самомъ гребнѣ волны; для большихъ же лодокъ, по крайней мѣрѣ во время такого стѣсненія воды, при которомъ Черскій проплывалъ ущелье Иргута, порогъ этотъ долженъ ставить непреодолимое препятствіе. Проводники Бакшевича называли порогъ этотъ порогомъ верхнихъ долгихъ плёсъ, т. е. слѣдующимъ за первыми плёсами.

Далѣе во второй половинѣ описываемаго отрѣзка рѣки входятся еще двѣ шиверы, а сейчасъ же ниже устья рч. Верхней Мѡйготъ рѣка преграждается широкою грядою каменныхъ глыбъ, образующихъ самый большой и опасный порогъ, называемый Мѡйготскимъ («нижній долгій плёсъ» у Бакшевича). Громадныя глыбы скаль, до нѣсколькихъ саженой въ діаметрѣ, лежатъ и на лѣвомъ берегу рѣки; изъ нихъ одна, лежащая на протяженіи порога, значительно вдаётся въ рѣку, ограничивая собою ближайшія къ берегу ворота. При данномъ уровнѣ воды оказалось, что изъ однихъ изъ трехъ или четырехъ воротъ этого порога не было проходимо, такъ какъ въ нихъ или сейчасъ же за ними обнажались камни меньшихъ размѣровъ, на которые лодка неминуемо должна была бы наткнуться и потому еѣ необходимо было разгрузить и протащить почти по сухой

лѣвой проточкѣ. Во время плаванія Бакшевича уровень воды стоялъ должно-быть выше, вслѣдствіе чего проводник его сошли на берегъ и рѣшились спустить лодку на бичевѣ тогда какъ Бакшевичъ направлялъ её въ ближайшія к берегу ворота; лодка помчалась съ такою быстротою, что утащила въ воду людей, державшихъ бичеву; имъ удалось однако замотать веревку за камень, тѣмъ они и спаслись от угрожавшей имъ опасности.

Ниже порога, около упомянутой выше каменной глыбы можно было наблюдать какъ пять большихъ тальменей (*Salp fluviatilis*) охотились за столпившимся здѣсь стадомъ харіусовъ (*Thymallus vulgaris*); испуганныя рыбки метались въ омутѣ и на конецъ прыгали на порогъ, иногда на столько удачно, что достигали высшей поверхности воды въ воротахъ; тѣмъ не менѣ ни одна изъ нихъ не могла тамъ удержаться и низвергалась опять книзу порывистою струею падающей съ порога воды. Проводники Черскаго пытались переколоть тальменей имѣвшимися у нихъ острогами, но малый размѣръ послѣднихъ позволилъ имъ только поранить этихъ крупныхъ хищниковъ и освободить испуганныхъ харіусовъ отъ опасности для нихъ сообщества: получивъ по клеюму отъ трехъ зубцовъ остроги, тальмени уплыли дальше и не появлялись въ этотъ день около порога.

Около Мѣйготскаго порога извилистую часть Иркутъ можно считать оконченною, что же касается размѣра проплатой излучины, то достаточно указать на то обстоятельство, что порогъ этотъ удаленъ отъ начала ущелья на 38 верстъ считая по рѣкѣ, тогда какъ по прямому направленію, черезъ хребетъ, входъ Иркутъ въ ущелье располагается всего лишь въ 9 верстахъ къ юго-западу отъ устья рч. Мѣйготъ. Кроме того, начиная съ Мѣйготскаго порога, до устья Малой Зазары Иркутъ принимаетъ въ общемъ сѣверо-восточное направленіе; долина его сравнительно шире и представляетъ даже три небольшія расширенія: Бурлицкое, ок-

Теплаго мыса, и Зазарское, а склоны болѣе пологи и гѣ-  
лесты; въ концѣ первой половины длины этого отрѣзка рѣки  
и въ неё впадаютъ съ лѣвой стороны двѣ рѣчки, называемыя  
Бурликами (Верхній и Нижній), а во вторую половину, от-  
носящуюся болѣею извилистостью рѣки, въ особенности  
мало такъ называемаго Теплаго мыса, нѣсколько прито-  
ковъ; изъ нихъ извѣстны празы: Гусевъ ключъ, Криво-  
шукъ, а наконецъ Большая и Малая Зазары, изли-  
вающіяся въ одну изъ болѣе крупныхъ излучинъ, обращенную  
выпуклостью на ю.-в.

На этомъ протяженіи находятся все-таки еще три глав-  
ныя бистрины (шиверы), ставящія препятствіе сплаву бревень  
и вообще лѣса, именно: Косая шивера выше Бурликовъ,  
Бурлицкій порогъ (върѣше шивера) ниже сомненныхъ  
ручекъ и шивера Теплаго мыса въ сомненной излучинѣ.

Упомянутая выше рч. Б. Зазара представляетъ собою  
самый значительный притокъ ущелистой части Иркута. Ея  
верховья располагаются приблизительно верстахъ въ 17 на  
юго-востокъ, на высотѣ 2974 до 3274' надъ океаномъ и  
состоятъ изъ двухъ рч. Вересовокъ (Большая и Малая)  
и рч. Малой Глубокой, послѣ чего, почти на половинѣ  
длины теченія, въ неё впадаетъ съ правой стороны еще рч.  
Большая Глубокая; съ этими рѣчками мы ознакомимся  
еще ниже, такъ какъ въ своихъ верховьяхъ онѣ пересѣка-  
ются почтовымъ трактомъ, ведущимъ изъ г. Иркутска въ с.  
Иркутъ, къ Байкалу, теперь же возвратимся къ Иркуту,  
чтобы прослѣдить остальную часть его теченія.

Отъ рч. Малой Зазары, верховья которой лежатъ  
мало только-что упомянутого почтового тракта, въ 8 — 10  
верстахъ на в., а устье располагается въ той-же излучинѣ,  
въ верстѣ ниже устья Большой Зазары, Иркутъ на протяже-  
ніи первыхъ 14 верстъ образуетъ неправильно-дугообразную  
излучину, обращенную выпуклостью на с.-з., тогда какъ  
остальными 12 или 13 верстъ ущелистой части теченія онъ



придерживается въ общемъ сѣверо-восточнаго направленія образу лишь три небольшія извилины. Изъ вообще незначительныхъ его притоковъ въ первой изъ упомянутыхъ двухъ частей слѣдуетъ упомянуть рѣчки: Подпорожную, Кирмишкину, Большую и Малую Медвѣжь, впадающія съ лѣвой стороны, а Кашину, Муромцеву, Громотуху и Куликовъ влючъ въ роли правыхъ притоковъ изъ которыхъ послѣдній изливается въ самый конецъ этой излучины; въ остальной затѣмъ части съ правой стороны извѣстна лишь одна рч. Шумиха, а съ лѣвой Выгузовая Дворная, Куйтунъ и наконецъ Шаманка, съ долиною которой оканчивается ущелистая часть теченія Иркута.

На всемъ этомъ протяженіи горы значительно уже понижаются; рѣка достигаетъ до 100 саж. ширины и, не смотря на существующія еще три быстрины (шиверы), какъ-то выше Подпорожной, ниже рч. Выгузовой и нѣсколько выше Дворной (Крутая шивера), жители нижняго теченія Иркута плавать лѣсъ уже начиная съ устья Зазаръ. Тѣмъ не менѣе плаваніе и по этой части требуетъ осторожности и хорошаго знакомства съ фарватеромъ, такъ какъ и она не лишена подводныхъ камней: почти передъ выходомъ рѣки изъ главной цѣпи горъ, лодка Черскаго, успѣшно проплывшая всѣ быстрины пороги, наткнулась на одинъ изъ этихъ камней съ такою силою, что одинъ изъ двухъ деревянныхъ брусковъ, прибиваемыхъ для предохраненія дна лодки отъ удара, мгновенно былъ оторванъ и вынырнулъ изъ воды уже позади испуганныхъ путешественниковъ. Чтоже касается плаванія по всей ущелистой части долины, то Черскій приходитъ къ тому заключенію, что вполне ознакомившись съ фарватеромъ Тункинцы могли бы сплавлять кое-что въ небольшихъ лодкахъ въ Иркутскъ, въ особенности успѣшно тѣ изъ нихъ которые занимаются постройкою лодокъ, такъ какъ, оставаясь въ городѣ для работъ, они могли бы продать тамъ и лодки съ ббольшею выгодною, нежели это возможно въ Тунѣ. Тотъ

утверждали и проводники Черского и собирались даже въ скоромъ времени осуществить таковой проектъ, но впоследствии очевидно измѣнили слову, такъ какъ съ тѣхъ поръ прошло уже десять лѣтъ, а ни одинъ Тункинецъ не достигъ Иркутска воднымъ путемъ. Можно полагать что въ концѣ іюня плаваніе по болѣе многководному въ то время Иркуту сопряжено съ меньшими опасностями, но къ сожалѣнію фактически вопросъ этотъ никѣмъ еще не подтвержденъ. Вопросъ о возможности отвести воды Иркуты въ Байкаль будетъ разсмотрѣнъ ниже.

Производившіяся Черскимъ геологическія изслѣдованія обнаружили во-первыхъ, что на всемъ протяженіи ущельистой части долины Иркуты развиты тѣже кристаллическія породы, съ которыми мы встрѣчались и прежде, какъ то: гнейсы, переходящіе въ массивныя видоизмѣненія, діоритовые, хлоритовые, отчасти и слюдяные сланцы и перемежающіеся съ ними кристаллическіе известняки. Объ этихъ послѣднихъ слѣдуетъ замѣтить, что мѣстами въ роли существенной составной ихъ части появляются зерна кварца и пироксена, нередко въ видѣ кокколита; ими напр. около рч. Гурлей (1-й Сиверный ключъ у Бакшевича) известнякъ является буквально переполненнымъ, причемъ зернышки названныхъ минераловъ вдаются на пожелтѣвшей вывѣтрѣвшейся поверхности известняка, придавая ему наружность, въ высшей степени похожую на песчаникъ, что именно и ввело въ ошибку Бакшевича. Кромѣ того оказалось, что перемежаемость известняка съ названными породами распространяется только на самую верхнюю часть ущелья до устьевъ р.р. Възъемной и Зубконой, причемъ перемежаемость эта относительно остальныхъ породъ играетъ роль верхняго яруса всей кристаллической толщи, въ чемъ будемъ имѣть случай убѣдиться въ многихъ другихъ мѣстахъ Прибайкалья; что же касается известняка, названнаго Бакшевичемъ въ промежуткѣ между Мойготскимъ притокомъ и Зазарою, то ошибка эта вызвана была сѣрватомъ

бѣлымъ цвѣтомъ нѣкоторыхъ утесовъ, состоящихъ изъ каолинизирующихся съ поверхности полевошпатовыхъ породъ. За исключеніемъ небольшихъ неправильностей въ положеніи слоевъ, замѣчаемыхъ въ окрестностяхъ Зубкогона, простираніе пластовъ и здѣсь оказывается з.-с.-з., причемъ определенное Черскимъ паденіе слоевъ обнаруживаетъ присутствіе здѣсь нѣсколькихъ складокъ; тѣмъ не менѣе по отношенію ихъ къ наклону верхняго яруса толщи, развитаго только въ предѣлахъ юго-западнаго паденія, всѣ эти перегибы можно считать лишь второстепенными и подчиненными одной, широкой антиклинальной складкѣ, съ сѣверо-восточнаго крыла которой, какъ равно и съ осевой части, верхній ярусъ толщи смыть совершенно, уцѣлѣвъ лишь въ юго-западномъ ея крылѣ, въ видѣ упомянутой выше перемежаемости съ кристаллическимъ известнякомъ, подвергшейся въ свою очередь значительнымъ второстепеннымъ изгибамъ пластовъ.

к) Нижнее теченіе Иркута и Смоленская волость.

Отъ выхода Иркута изъ его ущелистой части долины до устья въ Ангарау остается, какъ сказано выше, еще 50 верстъ на протяженіи которыхъ рѣка въ общемъ образуетъ большой дугообразный изгибъ, направляясь сначала почти на сѣверъ а затѣмъ, въ нижней половинѣ, на в.-с.-в. Что же касается частныхъ, то вслѣдъ за выходомъ изъ ущелья слѣдуетъ указать еще на довольно значительную Мотскую излучину рѣки, ниже которой начинается въ общемъ почти меридіональное направленіе Иркута до села Введенскаго (иначе Введенщина), отстоящаго въ 23 верстахъ отъ ущелья тогда какъ во второй половинѣ различаютъ еще: Максимовскій, Смоленскій и Кайскій изгибы.

Не взирая на то, что первая половина интересующаго насъ отрѣзка рѣки протекаетъ еще среди горъ, достигающихъ

отъ 2674' до 3237' абс. высоты, долина Иркутъ очень рѣзко отличается уже отъ описанной выше ея части. Въ предѣлахъ Мотской излучины путешественникъ встрѣчаетъ уже въ общемъ треугольное Мотское расширеніе долины, основаніе котораго, примыкающее къ склону высшихъ горъ, помянутыхъ Иркутомъ, достигаетъ 9 верстъ въ ширину. Въ юго-западномъ углу этой площади открывается широкая, луговая долина упомянутой выше рч. Шаманки (лѣв. притокъ Иркутъ), тогда какъ съ правой стороны впадаютъ здѣсь рѣчки: Верхнія, Среднія и Нижнія Моты; правый притокъ послѣдней, извѣстный подъ названіемъ Каторжанки, образуетъ собою юго-восточный уголъ расширенія. На эту площадь спускается съ горъ и почтовый трактъ, пересѣкая ее на в.-с.-в.; около рч. Верхнія Моты, приблизительно въ 2-хъ верстахъ отъ Иркутъ, находится Мотская почтовая станція, а на устьѣ Среднихъ Мотъ — Мотское, деревня, основанная еще въ прошломъ столѣтіи при первомъ проложеніи Кругобайкальской дороги. Непогодородная почва вмѣстѣ съ неблагоприятными климатическими условіями заставляетъ жителей заниматься преимущественно рубкою и сплавомъ лѣса, а также звѣроловствомъ и добычею кедровыхъ орѣховъ въ горахъ, отдѣляющихъ ихъ отъ Байкала. Мотское состоитъ изъ 54 дворовъ. Жителей въ немъ было въ 1889 году 280 об. п., (140 м. п.) изъ нихъ 244 крестьянъ старожилъ, остальные новосѣлы и поселенцы. Земли въ нихъ владѣніи 540 дес., въ томъ числѣ пашни только 106 дес. (на хозяйство  $1\frac{3}{4}$  дес.) остальное покосы. Скотъ жители содержатъ: взрослыхъ лошадей 110 (менѣе 2 лошадей на хозяйство), крупнаго рогатаго скота 90 штукъ, мелкаго до 60. Въ низовьяхъ долины рч. Шаманки находится плотбище и заграда, принадлежащая Иркутскому монастырю; здѣсь монастырскіе рабочіе сплочиваютъ лѣсъ и сплавляютъ его въ яродъ вмѣстѣ съ дровами. Далѣе, внизъ по теченію, на пути къ Введенщинѣ, долина Иркутъ хотя и суживается,

тѣмъ не менѣ имѣть въ ширину никакъ не менѣ 1½ версты, а ниже названной деревни и до самаго устья, она не уже 4 версты, причемъ горы, сопровождавшія долину до села Введенскаго, отступаютъ къ юго-востоку, смѣняясь болѣе или менѣе расчлененною плоскою возвышенностью непревышающею здѣсь 1800' н. ок. Село Введенское состоитъ изъ 83 дворовъ; въ немъ въ 1889 г. было 460 жит (до 230 м. п.), изъ нихъ крестьянъ-старожиловъ 356, остальные новосѣлы и поселенцы. Земли въ ихъ владѣнн 1530 дес., въ томъ числѣ пахатной земли 550 дес. (по 5½ дес. на хозяйство). Скота жители содержатъ: взрослыхъ лошадей 230 (слишкомъ 2 на хозяйство), крупнаго рогатаго скота 190 головъ, мелкаго болѣе 200. За Введенскимъ рѣдѣтъ лѣсъ хвойныя уступаютъ мѣсто березѣ, а еще ниже пашнямъ и молоту березняку, выросшему здѣсь впрочемъ на мѣстѣ вырубленныхъ дремучихъ лѣсовъ; тутъ же путешественникъ встрѣчается и съ виновниками этихъ перемѣнъ въ распредѣленн древесной растительности: ниже Введенщины располагаются деревни Баклаши, Акниина и Смоленская (иначе Смоленщина), лежащія на правомъ берегу рѣки, а Максимовщина на лѣвомъ; жители ихъ съ особеннымъ успѣхомъ разводятъ коноплю. Баклаши — селеніе, состоящее изъ 60 дворовъ съ 384 жителей (185 м. п.); изъ нихъ 300 крестьянъ-старожиловъ остальные новосѣлы и поселенцы. Земли въ ихъ владѣнн 900 дес., въ томъ числѣ пашни 316 дес. (на хозяйство 4½ дес.). Скота жители содержатъ: взрослыхъ лошадей 190 (менѣ 3 лошадей на хозяйство), крупнаго рогатаго скота 150 головъ, мелкаго 74. Акниина состоитъ изъ 53 дворовъ съ 211 жит. (118 м. п.), въ томъ числѣ 187 старожиловъ. Земли въ ихъ владѣнн 660 дес., въ томъ числѣ пахатной 250 дес. (болѣе 7 десят. на хозяйство). Скота жители содержатъ: взрослыхъ лошадей 130 (менѣ 4 на хозяйство), крупнаго рогатаго скота также 130 головъ, мелкаго скота 90 штукъ. Максимовское состоитъ изъ 120 дворовъ съ 760 жителями.

(382 м. п.) въ томъ числѣ 638 старожиловъ и 15 казаковъ, остальные новосѣлы. Земли въ ихъ владѣніи 1900 дес., въ томъ числѣ пахатной до 720 дес. (до 5 дес. на хозяйство). Скота жители содержатъ: взрослыхъ лошадей 340 (болѣе 2 на хозяйство), крупнаго рогатаго скота 270 головъ, мелкаго скота до 90 штукъ. Въ Максимовскомъ селеніи есть водяная мельница. Ниже всѣхъ этихъ селеній по Иркуту расположена Смоленщина (около 15 верстъ выше впаденія Иркутъ въ Ангарту) на устьѣ перваго за Мотами и самаго значительнаго праваго притока Иркутъ, извѣстнаго подъ названіемъ р. Олхѣ. Село Смоленское есть центръ волостнаго управленія Смоленскою волостью. Оно состоитъ изъ 75 дворовъ и содержитъ 460 жит. об. п. (232 м. п.), въ томъ числѣ 356 крестьянъ-старожиловъ, 50 казаковъ, остальные на половину новосѣлы и поселенцы (послѣднихъ 23). Во владѣніи жителей села до 1000 дес. земли, въ томъ числѣ пахатной до 460 дес. (на хозяйство по 5 десятинъ). Жители Смоленскаго содержатъ скота: взрослыхъ лошадей до 250 (менѣе 3-хъ на хозяйство), крупнаго рогатаго скота 190 штукъ, мелкаго скота 75. Рѣка Олха, при устьѣ которой расположено село Смоленское беретъ начало около 50 верстъ южнѣе устья въ горахъ, въ весьма близкомъ разстояніи отъ Байкала, придерживаясь вообще меридіональнаго направленія. Съ этою мы ознакомимся ниже, при описаніи прибайкальскихъ горъ, теперь же ограничимся лишь замѣчаніемъ, что и по этой рѣчкѣ, въ разстояніи 8 верстъ отъ устья, находится одинъ заселенный пунктъ, деревня Олхинская, жители которой, кромѣ хлѣбопашества, лѣснаго и звѣринаго промысла, занимаются еще обжиганіемъ извести. Олхинское селеніе состоитъ изъ 128 дворовъ и содержитъ 774 жителей, въ томъ числѣ 580 старожиловъ, 46 поселенцевъ, остальные новосѣлы. Во владѣніи жителей состоитъ болѣе 2200 дес. земли, въ томъ числѣ пахатной болѣе 800 дес. (5<sup>1</sup>/<sub>2</sub> на хозяйство). Скота жители содержатъ: взрослыхъ лошадей 330

(болѣе 2-хъ на хозяйство), крупнаго рогатаго скота 260 головъ, мелкаго скота 150 штукъ. Въ Олхинскомъ селеніи есть и водяная мельница.

Наконецъ параллельно Олхѣ протекаетъ еще рч. Ка я, изливаясь всего лишь въ 2—3 верстахъ выше устья Иркута въ Ангару; длина ея долины около 20 верстъ; въ нѣсколькихъ верстахъ выше устья на ней расположена подгородная деревня Маркова. Между тѣмъ съ лѣвой стороны на этомъ протяженіи Иркутъ воспринимаетъ лишь незначительные ключики или сухія долины, названія которыхъ не вошли еще въ литературу. Деревня Маркова состоитъ изъ 20 дворовъ и 140 жит. об. п. (70 м. п.), въ томъ числѣ старожиловъ 122; остальные новосѣлы. Во владѣніи жителей до 420 дес., въ томъ числѣ пахатной земли 165 дес., по 8 дес. на каждое хозяйство. Скота жители содержатъ: лошадей до 100 (на хозяйство по 5), крупнаго рогатаго 76 головъ, мелкаго скота 25.

Остальные селенія Смоленской волости (Кузьмининское, Ершово, Грудѣино, Михалево, Савельевское, Разводинское, Крыжановское, Щукино, Пашковское, Новоямское, Худяково и многія меньшія расположены по обѣимъ сторонамъ Ангары между Иркутскомъ и Байкаломъ. Вся Смоленская волость содержитъ въ себѣ 1115 дворовъ и въ нихъ 6700 жит. об. п. (3400 м. п.), въ томъ числѣ крестьянъ-старожиловъ 5280, казаковъ 110, поселенцевъ 200, остальные новосѣлы. Во владѣніи крестьянъ всей волости состоитъ болѣе 17.600 дес., въ томъ числѣ пахатной 6420 дес. (что составитъ на хозяйство по 5 десятинъ). Обиліе покосовъ даетъ крестьянамъ Смоленской волости возможность содержать: лошадей 3040 (нѣсколько менѣе 2½ на хозяйство), крупнаго рогатаго скота 2700 головъ, мелкаго скота 310 головъ, въ числѣ коней большее число состоитъ изъ свиней, между тѣмъ какъ овецъ жители Смоленской волости содержатъ очень мало

Въ томъ, что описанное измѣненіе въ характерѣ долины Иркутъ ниже ущелистой его части связано съ соотвѣтственнымъ измѣненіемъ состава почвы, въ которой она проложена, убѣждаютъ насъ геологическія изслѣдованія этой мѣстности. Экскурсія Черскаго по отрогу, отдѣляющему низовья рч. Буйтунъ отъ долины Шаманки, обнаружила, что со стороны лѣваго берега Иркутъ и въ недалекомъ отъ него разстояніи распространены еще породы лаврентьевской системы (гнейсы, переходящіе въ слюдяныя и хлоритовыя сланцы), но въ 2—3 верстахъ западнѣе Иркутъ, изъ подъ растительнаго покрова торчатъ уже плиты и куски обломочныхъ породъ, а именно: со стороны Буйтуна наблюдается желтоватый, красноватый, бѣлый и грязнобѣлый, кварцитовидный песчаникъ, переходящій отъ обилія кварцевыхъ галекъ въ конгломератъ; на сѣверномъ склонѣ того же отрога, т. е. въ правомъ берегу долины Шаманки, плиты песчаника принимаютъ красный цвѣтъ; наконецъ около устья этой долины, на ея лѣвомъ берегу, наблюдается уже отвѣсный утесъ, состоящій изъ красноцвѣтнаго песчаника съ зелеными и охристожелтыми прослойками, въ составѣ котораго замѣчаются нерѣдко кусочки кварца, гнейса, полеваго шпата и очень плотнаго хлоритоваго сланца, заимствованные очевидно изъ породъ лаврентьевской толщи. Пласты этого песчаника обнаруживаютъ наклонъ, хотя и не крутой наклонъ вообще къ сѣверу, внизъ по теченію Иркутъ, — явленіе которое можно видѣть только съ отдаленія, такъ какъ доступная часть утеса, со стороны Шаманки, обнажена по линіи простиранія слоевъ, и потому пласты кажутся въ ней горизонтальными. Кромѣ того, съ южной, поросшей растительностью части того же утеса смыты періодическими водами куски и плиты сѣраго плотнаго известняка, указывая на то, что порода эта должна залегать здѣсь поверхъ краснаго песчаника, фактъ, съ которымъ мы будемъ имѣть случай ознакомиться еще ниже. Въ свою очередь отрогъ, лежащій между Иркутомъ и долиною Верх-



нихъ Мотъ, другими словами: правый возвышенный берегъ выхода Иркутъ изъ ущелья, обнажаетъ внизу хлоритовый и слюдяно-хлоритовый сланецъ, волнисто изогнутый и падающій на ю.-в., между тѣмъ какъ на болѣе высокихъ пунктахъ его тотъ же путешественникъ наблюдалъ многочисленные куски и плиты красноватаго и бѣлаго кварцита, слѣдовательно тоже, что и на Куйтунскомъ отрогѣ. Подвигаясь отсюда еще далѣе къ востоку, до юго-восточнаго угла Мотскаго расширения, склонъ горъ, ограничивающихъ эту площадь съ юга является хотя и поросшимъ лѣсомъ, тѣмъ не менѣе обиліе острореберныхъ кусковъ и глыбъ камней указываетъ что онъ состоитъ изъ гнейсовъ, что подтверждается, какъ мы увидимъ ниже, и пересѣкающею его частью почтовой дороги; если же углубиться въ болотистую и лѣсистую долину упомянутой выше рч. Каторжанки, то оказывается что она съ юго-востока, какъ низовья Шаманки съ юго-западной стороны Мотскаго расширения, пролегаетъ почти по линіи соприкосновенія лаврентьевскихъ породъ съ краснымъ песчаникомъ, развитымъ преимущественно въ правомъ (сѣверо-восточномъ) склонѣ долины. Около самаго выхода этой долины изъ горъ располагается высокій утесъ, извѣстный подъ названіемъ Красный камень. Пласты красного песчаника, падающіе въ немъ съ незначительнымъ наклономъ вообще на с. (с.-с.-в.), но обнаженные почти по простиранію, кажутся какъ бы совершенно горизонтальными; дагѣ вверкъ по долинѣ, въ утесѣ, называемомъ Каторжанскій камень, можно видѣть, какъ песчаникъ этотъ покрываетъ собою выступъ гнейса <sup>1)</sup>).

Всѣ эти данныя указываютъ очевидно на то, что сѣверо-восточный склонъ горъ, пересѣченныхъ ущельемъ Иркутъ, образовалъ собою берегъ водъ, изъ которыхъ отложился

---

<sup>1)</sup> Черскій, Изв. Сиб. Отд. И. Р. Геогр. Общ. Т. IX, № 1 п 2.

красноцветный песчаникъ, вопросъ, къ которому мы обратимся еще ниже.

Склонъ горъ, окружающихъ Мотскую площадь съ сѣверо-востока, въ свою очередь обнаруживаетъ тотъ же красный песчаникъ, не взирая на вообще поросшее его сословіе, а ближе къ правому берегу Иркутъ, въ такъ называемой Домашней горѣ (Мартышкина гора у Чекановскаго) находится весьма хорошее обнаженіе, въ которомъ красный песчаникъ въ высшей степени отчетливо покрывается фритъ и сѣроватымъ, плотнымъ мергелевымъ и горькоземистымъ известнякомъ, изъ коего сложена высшая часть горъ. Обнаженіе это въ первый разъ описано Бакшевичемъ (1. с.), а глѣбъ посвящено Чекановскимъ <sup>1)</sup> и наконецъ Черскимъ, въ статьѣ котораго помѣщенъ и рисунокъ утеса Домашней горы <sup>2)</sup>; этими изслѣдованіями окончательно опровергнуто прежнее воззрѣніе Меглицкаго <sup>3)</sup>, отождествлявшаго мотскій красный песчаникъ съ левскимъ (см. ниже) и ставившаго ему здѣсь мѣсто поверхъ известняка, а не подъ нимъ, какъ оказалось въ дѣйствительности.

Выѣстъ съ Домашнею горою начинается упомянутое выше служеніе долины Иркутъ, продолжающееся до села Введенскаго. Горы, вызвавшія это служеніе, носятъ мѣстное названіе хребта Еловаго, въ дѣйствительности же, какъ мы увидимъ ниже, ихъ слѣдуетъ разсматривать какъ звено, соединяющее восточную часть Китойской цѣпи съ западною оконечностью Онотекаго хребта, прерваннаго долиною Ангарты. Геогностическое строеніе Еловаго хребта изучается всего лучше по теченію Иркутъ ниже Мотскаго расширенія, такъ какъ рѣка эта своимъ правымъ берегомъ прижимается къ

<sup>1)</sup> Чекановскій, Изв. И. Р. Геогр. Общ. Т. V, № 6 и Записки

<sup>2)</sup> Черскій, Изв. Сиб. Отд. И. Р. Геогр. Общ. I. с.

<sup>3)</sup> Меглицкій, Горн. Журн. 1855, № 4.

склону пересѣкаемаго ею хребта и подмываетъ тамъ цѣлыя ряды поучительныхъ утесовъ, оставляя лѣвый берегъ высокимъ и низменнымъ.

Въ утесахъ этихъ видно, какъ пласты краснаго песчаника, падающіе вмѣстѣ съ покрывающимъ ихъ известнякомъ вообще на сѣверо-западъ и воспринимающіе бурожелтые припластки, какъ напр. около долинки называемой Мартышкина падь, въ послѣдствіи скрываются подъ уровень рѣки такъ, что около Артамоновой пади въ склонѣ горы наблюдается одинъ лишь известнякъ. Ниже устья этой долинки пласты принимаютъ противоположный наклонъ, и изъ подъ поверхности Иркутъ съ замѣчательною постепенностью опять поднимается красный песчаникъ съ великолѣпно обнаженною плоскостью залеганія на немъ известковой толщи нѣсколько верстъ спустя утесы краснаго песчаника прерываются на нѣкоторое время склономъ, поросшимъ растительностью, послѣ чего въ немъ замѣчается уже одинъ лишь известнякъ, сначала почти въ горизонтальномъ положеніи, затѣмъ круто падающій (до  $70^{\circ}$ ) на с.-в.  $20^{\circ}$  исчезая подъ уровень наносной луговой площади, на которой расположено село Введенское. Отсюда, какъ сказано выше, въ горахъ, отступившимъ на в.-ю.-в., примыкаетъ уже плоская возвышенность; вмѣстѣ съ нею въ подмываемомъ здѣсь Иркутомъ лѣвомъ берегу долины и, какъ мы увидимъ ниже, склонахъ праваго берега выступаютъ уже и другія породы. За Введенщиной, ниже Березоваго острова, наблюдаютъ горизонтальные пласты желтоватаго или бурожелтаго песчаника съ нѣсколькими тонкими пропластами буреаго угля и глинистаго сланца, принимающаго въ одномъ мѣстѣ яркій красный цвѣтъ отъ бывшаго здѣсь горѣнія угольныхъ флюидовъ. Черскій нашелъ въ этомъ сланцѣ множество хорошихъ сохранившихся растительныхъ остатковъ юрскаго возраста, въ песчаникѣ наблюдалась имъ концентрически скорлуповатая отдѣльность. Песчаникъ съ флечами угля, извѣстный еще

временъ Бакшевича (1. с.), относившаго его къ каменно-угольной формаци, выступаетъ на томъ же берегу, въ про-  
извѣдѣннѣ деревень Баклашей и Акининой, а далѣе и около  
Максимовщины. Наконецъ, въ нѣсколькихъ верстахъ  
отъ устья, начиная съ праваго берега долины рч. Каи,  
здесь обнажаются тѣже осадки съ пропластками угля. По  
найдѣннымъ здѣсь Чекановскимъ растительнымъ остат-  
камъ, какъ равно и по коллекціи, собранной тѣмъ же гео-  
логомъ по р. Ангартъ (собственно по рч. Усть-Балей, около  
Ангартъ), древность этихъ осадковъ, считавшихся каменно-  
угольными, впервые была отнесена къ юрскому періоду  
извѣстнымъ швейцарскимъ палеонтологомъ Освальдомъ Гее-  
мъ<sup>1)</sup>. Растительныя остатки, послужившія вышеуказанному  
геологу при опредѣленіи возраста упомянутыхъ отложений,  
расположены въ тонкослоистой сланцеватой глинѣ желтоватаго  
цвѣта. По его мнѣнію порода эта образовалась изъ весьма  
мягкаго ила, отлагавшагося на днѣ тихаго бассейна, на что  
свидѣтельствуетъ прекрасное сохраненіе самыхъ нѣжныхъ частей  
растений, такъ и встрѣчающихся тутъ же насѣкомыхъ.  
Наземныя растенія, главнымъ образомъ папоротники, господ-  
ствуютъ въ этихъ отложенияхъ, хотя иногда попадаются и  
прѣсноводныя водоросли; затѣмъ слѣдуютъ многочисленныя  
личинки въ водѣ насѣкомыхъ: личинки Ephemera- и Perla-  
подобныхъ насѣкомыхъ, поражающія величиной Agtionidae;  
въ нихъ присоединяются также и наземныя изъ семействъ  
Curculionidae и Chrysomelidae. Даже одинъ видъ бабочки  
найдѣнъ тутъ, — фактъ весьма интересный, свидѣтельствую-  
щій, что и въ юрскую эпоху существовали представители  
этого отряда насѣкомыхъ. Перечисленные остатки растений  
свидѣтельствуютъ на прѣсноводный характеръ этихъ отложений.

<sup>1)</sup> Dr. Oswald Heer, Mém. de l'Acad. Imp. d. Scienc. de St.-Petersbourg.  
t. XXII, № 12. 1876.

Въ остальныхъ мѣстахъ этого отрѣзка Иркутъ развиты наносныя отложенія, изъ которыхъ особеннаго вниманія достойны: слоистые пески съ характеромъ озерныхъ осадковъ. Пески эти достигаютъ довольно мощнаго развитія около устья р. Олхи (деревня Смоленщина) и въ низовьяхъ рч. Каа. Ближе къ устью Иркутъ, именно ниже послѣдней изъ названныхъ рѣчекъ, пески смѣняются отложеніемъ гальки, на верхъ которой, какъ и поверхъ песковъ наблюдается суглинистое образованіе, принимающее всѣ свойства такъ называемаго лёсса, начиная съ пористости, обусловленной тончайшими капальцами, при отсутствіи слоистости и почти наземною фауною погребенныхъ въ немъ моллюсковъ (*Helix* *Pupa*); какъ въ лёссѣ, такъ и въ залегающей подъ нимъ галькѣ Черскій находилъ кости вымершихъ млекопитающихъ животныхъ послѣ-третичнаго періода, о которыхъ мы упомянемъ ниже при описаніи окрестностей г. Иркутска. Здѣсь же замѣчаются и террасы до 4—5 саженой надъ уровнемъ рѣки; между тѣмъ какъ лѣвый берегъ Иркутъ образуетъ съ бою низменную широкую и луговую площадь новѣйшихъ наносовъ, сливающихся съ такою же площадью лѣваго берега долины р. Ангары.

### *Примѣчаніе.*

**Минеральные источники Ниловой пустыни въ связи съ геологическимъ строеніемъ Нилоскаго хребта по новѣйшимъ изслѣдованіямъ Обручева.**

Самыми новѣйшими свѣдѣніями о минеральныхъ источникахъ Ниловой пустыни обязаны мы посѣщенію этой мѣстности горнымъ инженеромъ Обручевымъ \*). Обручевъ не только сообщаетъ обстоятельныя свѣдѣнія о самихъ источникахъ, но даетъ также подробное геологическое описаніе ближайшихъ ихъ окрестностей.

Вотъ въ какомъ положеніи нашелъ Обручевъ Нилоскую пустыню въ 1889 году.

Зданія пустыни, состоящія изъ церкви, колокольни, архіерейск

\*) Обручевъ, Горн. Журн. 1890 г., № 10, стр. 92—103 и Изв. Сиб. И. Р. Геогр. Общ. Т. XXI, № 4, 1890 г.

на сторожки, двухъ ванныхъ зданій и двухъ холодныхъ домовъ. въ которыхъ помѣщаются въ лѣтнее время летящіяся бурати, расположены по обоимъ берегамъ рѣки Ихэ-угуна (Ехо-угунъ у Обручева см. выше стр. 63), причемъ на лѣвомъ берегу находятся вѣрныя четыре, остальные же построены на правомъ его берегу у подошвы склона, откуда изъ системы трещинъ, образовавшихся въ гранитѣ, вытекаютъ источники. Пространіе однихъ изъ этихъ трещинъ ю.-з.  $65^{\circ}$  при отвѣсномъ паденіи, другихъ с.-з.  $150^{\circ}$  при паденіи на ю.-з. подъ угломъ около  $85^{\circ}$ . Это обнаруживается въ обнаженіи надъ нижнимъ источникомъ; въ обнаженіи же верхняго источника замѣчается при простираніи трещинъ на ю.-з.  $65^{\circ}$  паденіе на ю.-в. подъ угломъ въ  $65^{\circ}$ . Такимъ образомъ господствующая система трещинъ, имѣющая простираніе на ю.-з.  $65^{\circ}$ , простирается вмѣстѣ съ тѣмъ перпендикулярно ущелью р. Ихэ-угуна и параллельно Нилловскому хребту (см. ниже). Вода источниковъ собирается въ нѣсколько небольшихъ бассейнахъ, изъ которыхъ одинъ (именно бассейнъ верхняго источника) занимаетъ площадь около 2 кв. арш.; такимъ образомъ нельзя наблюдать непосредственнаго вытеканія воды изъ трещинъ. Дно бассейна верхняго источника заполнено сѣрымъ пескомъ, а въ стѣнкахъ, обращенной къ склону горы, торчатъ углы гранитныхъ глыбъ. Бассейнъ 1,5 арш. глубиною окруженъ срубомъ, имѣющимъ 1 футъ высоты надъ земной поверхностью, и покрытъ деревянною крышкою. Вода въ бассейнѣ достигаетъ глубины не болѣе 1 арш. Подобнымъ же образомъ устроенъ и бассейнъ нижняго источника, расположеннаго позади большаго ванняго зданія, но для защиты его отъ дождя и снѣга, срубъ окруженъ крышею на четырехъ столбахъ.

Наблюденія, произведенныя Обручевымъ въ теченіи четырехъ дней, о температурѣ воды источниковъ въ связи съ показаніями барометра и температурой воздуха дали слѣдующія интересныя цифры.

	Ц°.	Ц°.	Ц°.	Ц°.
Темп. нижн. источн.	42,7	42,8	42,7	43,2
» верхн. источн.	41,85	42	42,1	42,7
» воздуха . . .	8	7	10	7
Высотъ anerоида . .	691,5	692	684	682,3
Состояніе погоды . .	пасмурно.	ясно.	ясно.	пасмурно, вечеромъ снѣгъ и сильный вѣтеръ съ С.

Наблюденія производились между 12 и 1 часомъ дня. Показанія термометра и барометра исправлены и приведены къ  $15^{\circ}$  Ц. По наблюденіямъ сторожа пустыни, заведывающаго приготовленіемъ ваннъ, ока-

залось, что передъ ненастьемъ вода источниковъ становится горячѣе, а передъ ведромъ холоднѣе, такимъ образомъ это наблюдение давало ему возможность вѣрно предугадывать состояніе погоды. Подобную зависимость температуры источниковъ отъ состоянія погоды Обручевъ объясняетъ барометрическимъ паденіемъ въ случаѣ паступленія ненастья, что влечетъ за собою болѣе быстрое поднятіе горячей воды по трещинамъ и тѣмъ самымъ повышеніе температуры воды, накопившейся въ бассейнахъ, и барометрическимъ поднятіемъ въ обратномъ случаѣ.

Вода въ бассейнахъ, по наблюденіямъ Обручева, не выделяетъ въ свободнаго газа (какъ то сообщаетъ Поповъ см. выше), ни другихъ какихъ либо газовъ и не имѣетъ потому никакого запаха; вкусъ ея слабъ горько-соленый; отложеній какихъ либо минеральныхъ веществъ на днѣ бассейна также не замѣчается. По анализу, произведенному въ 1888 году въ Иркутской золотосплавочной лабораторіи, минеральный составъ воды оказался слѣдующимъ:

NaCl . . . . .	0,326	грамм.
Na <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> . . . . .	0,5825	"
CaSO <sub>4</sub> . . . . .	0,1349	"
Ca(HCO <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> . . . . .	0,1364	"
Mg(HCO <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> . . . . .	0,0160	"
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> . . . . .	0,0168	"
Веществъ въ HCl нерастворимыхъ . . . . .	0,0388	"
Потеря и органическія вещества . . . . .	0,0243	"

---

Итого сухого остатка въ 1 литрѣ . . 0,9823 грамм.

Итакъ, отличаясь небольшимъ содержаніемъ углекислыхъ солей, напротивъ преобладаніемъ глауберовой соли (Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>), горячіе источники Ниловой пустыни должны быть отнесены по мнѣнію анализатора Моисеихъ къ *сильно-щелочнымъ* или, какъ то полагаетъ Обручевъ, къ *горькимъ* и стоять въ одной категоріи съ источниками Зедлица, Зайдишица, Киссингева, Лисогорскими и Пятигорскими.

Въ медицинскомъ отношеніи источники эти, по отзыву доктора Писарева \*), представляютъ собой индифферентныя термы.

Что касается холодныхъ источниковъ Ниловой пустыни, находящихся вблизи отъ горячихъ вверхъ по рѣкѣ, то они заключаютъ въ себѣ такъ мало минеральныхъ частей (0,17 гр. на литръ и немногое СО<sub>2</sub>), что не могутъ быть названы минеральными, и цѣлебныя свойства при глазныхъ болѣзняхъ, которыми будто-бы они обладаютъ по мнѣнію бурятъ, должны быть, какъ то полагаетъ Обручевъ, отнесены къ области воображенія.

Принимая во вниманіе среднюю годовую температуру Ниловой п.

---

\*) Прилож. № 3 къ протоколу № 2 за 1890 г. Общ. Врачей Вост. Сиб.

стии, равную приблизительно— $4^{\circ}$  Ц. \*) и среднюю величину для геотермического градуса= $31$  метр. (цифра взята изъ наблюдений въ Западной Европѣ), можно вычислить слой съ температурой  $+43^{\circ}$  Ц., т. е. температурой воды горячихъ источниковъ. Получится приблизительно следующая цифра:

$$(43 + 4) \cdot 31 + 25 = 1.482 \text{ метр.}$$

Итакъ вода источниковъ поднимается съ этой глубины или, лучше сказать, съ еще большей, принимая во вниманіе нѣкоторое ея охлажденіе при движеніи по трещинамъ. Но быть можетъ и на меньшей глубинѣ нѣтъ какой-либо очагъ съ высокой температурой, тогда конечно численная цифра будетъ гораздо меньше, однако въ пользу этого мнѣнія нѣтъ пока никакихъ данныхъ.

Обратимся теперь къ геогностическому описанію ближайшихъ окрестностей Ниловской пустыни.

Рѣка Ихэ-угунъ течетъ по широкой долинѣ между Нил о в с к и м ъ хребтомъ съ правой стороны и подъемомъ къ подошвѣ Тункинскихъ горъ съ лѣвой. На разстояніи двухъ третей долины, считая отъ вершины, рѣка измѣняетъ свое восточное направленіе въ южное какъ разъ передъ Священной Песчаной горой и протекаетъ уже по узкому ущелью, черезъ Нил о в с к і й хребетъ къ долинѣ Иркута, съ которыми и сливается въ 2—3 верстахъ отъ входа въ ущелье. Ширина Ихэ-угуна 20—25 м. при глубинѣ 1—4 арш. Дно, покрытое до входа въ ущелье пескомъ, упицано въ ущельѣ крупными валунами, по которымъ стремительно несетъ свои воды рѣка. Въ серединѣ ущелья слѣва въ Ихэ-Угунъ впадаетъ рч. Х о в г о л д о й (Х о л х о н д о й или М ѣ д а н к а у Обручева), протекающая по своему ущелью, приходящемуся перпендикулярно къ теченію Ихэ-угуна. При слияніи обѣихъ рѣкъ и расположена пустынь.

Естественныя обнаженія, обнаруживающія геологическое строеніе Ниловскаго хребта, приурочены почти исключительно къ ущельямъ Ихэ-угуна и Хонгодою.

Начало ущелья, считая отъ долины Иркута вверхъ по Ихэ-угуну, образуется пологими склонами и вслѣдствіе этого широко, но скорѣе тѣмъ на лѣвомъ берегу обнаруживаются высокія скалы, составленныя изъ зеленовато-сѣрой, плотной, не совершенно слонистой породы съ простираніемъ пластовъ на ю.-в.  $75^{\circ}$  и паденіемъ на ю.-в. подъ угломъ около  $60^{\circ}$ . Между тѣмъ на правомъ берегу противъ указанныхъ скалъ, склонъ еще весьма пологій, но немного выше обнажается и тутъ мелкозернистая зеленовато-сѣрая порода съ тѣмъ же простираніемъ, но уже съ отвѣснымъ паденіемъ, составными частями которой являются: роговая обманка, пироксенъ во всѣхъ степеняхъ разложенія, ортоклазъ, плагіоклазъ (оба послѣднихъ подверглись въ сильной степени каолинизациі) и кварцъ; мѣстами порода пересѣкается тонкими прожилками известковаго шпата. Породы эти вслѣд-

\*) Цифра вычислена приблизительно, принимая въ соображеніе, что въ сѣв. Шаньси, расположенномъ на 90 метр. ниже Ниловой пустыни, высоту южной Обручевъ принимаетъ 1.100 метр. абс. выс. по двухгодичнымъ наблюденіямъ средняя годовая— $3^{\circ}$ , и слой съ постоянной температурой находится на глубинѣ около 20 метровъ.



ствіе сильной степени метаморфизаціи не даютъ возможности точнаго ихъ опредѣленія; можно только сказать, что онѣ относятся къ діоритамъ, диабазамъ или, можетъ быть, къ сіенитамъ, но не къ известнякамъ, какъ то полагаетъ Кропоткинъ (см. выше стр. 65). Еще вышѣ по правому берегу, въ 20—30 саж. отъ указаннаго мѣста, имѣется снова обнаженіе той-же породы, но интересной тѣмъ, что вслѣдствіе параллельнаго расположенія кристалловъ роговой обманки и пироксена она напоминаетъ до нѣкоторой степени гнейсъ. Далѣе обнажается всѣ та-же порода, состоящая въ данномъ мѣстѣ главнымъ образомъ изъ каолинизированнаго полевого шпата, роговой обманки, кварца и пироксена. Порода эта, сохраняя тотъ-же характеръ, затѣмъ пересѣкается многочисленными жилами кварца съ известковымъ шпатомъ, становится мѣстами сланцеватой и напоминаетъ филлитъ. Наконецъ постепенно зелено-сѣрой породы смѣщаются розовой, гранитовидной, въ составъ которой входятъ бѣлый и сѣрый кварцъ, розовые ортоклазы, микроклины и плагиоклазы; зеленая роговая обманка, переходящая мѣстами въ хлоритъ и біотитъ; она пересѣчена многочисленными трещинами, падающими преимущественно на востокъ подъ угломъ 72°. Породу эту можно отнести къ роговообманковымъ гранитамъ. За ней обнажается зеленовато-розовая, мелко-зернистая порода съ жилами розоваго известковаго шпата, состоящая изъ каолинизированнаго полевого шпата, пироксена и кварца; она вскипаетъ съ кислотой. Ее смѣняетъ розово-красный, среднезернистый гранитъ, состоящій изъ кварца, полевого шпата и роговой обманки; въ немъ замѣтны нѣсколько системъ трещинъ, изъ которыхъ преобладающіе имѣютъ простираніе с.-з. 175° при паденіи на с.-в. подъ угломъ 85 или простираніе на в.-з. при вертикальномъ паденіи.

Вслѣдствіе за гранитомъ идетъ снова зелено-сѣрая, намъ уже знакомая порода, которая въ данномъ мѣстѣ образуетъ живописныя скалы; эта порода снова смѣняется гранитомъ, но уже желтоватымъ, среднезернистымъ, состоящимъ изъ кварца, полевого шпата, біотита и роговой обманки, съ трещинами, падающими 1) с.-з. 145° подъ угломъ 42°; 2) ю.-в. 135°, уголъ 80° и 3) вертикально съ простираніемъ с.-ю. Гранитъ этотъ доходитъ до Ниловой пустыни на правомъ берегу, на лѣвомъ же, не доходя до устья Хонголда, появляются снова скалы сѣро-зеленой средне-зернистой породы, которую Кропоткинъ и тутъ принялъ за известнякъ. Порода эта въ общемъ весьма напоминаетъ уже описанныя сѣро-зеленыя породы ущелья, заключаая въ себѣ: кварцъ, ортоклазы, плагиоклазы, пироксенъ, роговую обманку, мѣстами біотитъ и известковый шпатъ.

Граниты продолжаютъ и за Нилую пустынь на правомъ берегу Ихэ-угуна до пади, врывающейся въ склоны ущелья. Трещины, замѣчаемыя въ породахъ въ данномъ участкѣ, имѣютъ двойное паденіе: 1) ю.-в. 155° подъ угломъ 65—90°; 2) на ю.-з. 60° подъ угломъ 85°.

Ущелье рч. Хонголда имѣетъ въ длину 400 саж. и направленіе сперва съ ю.-в. на с.-з. 105°, а затѣмъ поворачиваетъ на ю.-з. 30°. Отъ устья до поворота на правомъ берегу обнажаются тѣже граниты

образуіе мѣстами розсыпи или наклонныя стѣны, образованія по трещинамъ, падающимъ на ю.-в. подъ угломъ 40—60°.

Сторона лѣваго берега видѣть нельзя, вслѣдствіе его пологости и отсутствія обнаженій. На поворотѣ ущелья обнажается черно-зеленая мелкозернистая порода, состоящая изъ біотита, роговой обманки и ортоклаза, вмѣстѣ плагиоклаза и кварца; мѣстами съ прожилками среднезернистаго розовато-бѣлаго роговообманковаго гранита. За поворотомъ выстаетъ небольшая скала желтовато-бѣлаго крупно-кристаллическаго плагиока съ жилами среднезернистаго бѣлаго, съ черными пятнами биота. Далѣе снова появляется гранитъ.

По лѣвому берегу ущелья Ихэ-угуна отъ устья рч. Хонголдоя вверхъ выходяща сперва граниты, а потомъ свѣтло-зеленая, мелкозернистая порода, въ составъ которой преимущественно входятъ: каолинизированный ортоклазъ, пироксенъ, роговая обманка, иногда и кварцъ, съ трещинами, падающими на ю.-з. 50° подъ угломъ 65°, по немного далѣе на свѣтлѣетъ утесомъ розово-желтаго гранита, легко разрушающагося и дресву, которая засыпала склонъ надъ утесомъ, съ трещинами, падающими на ю.-в. 165° подъ угломъ 65°. Гранитъ снова уступаетъ мѣсто скаламъ мелкозернистой породы, пересѣченной мѣстами жилами розоватаго кварца съ пустотами, выполненными желтой охрой. Мѣстами порода эта принимаетъ темно-сѣрый цвѣтъ и состоитъ изъ кварца, біотита, ортоклаза и роговой обманки. Скалы эти обрываются прямо въ рѣку и не даютъ возможности пройти по берегу. Тутъ рѣка течетъ по перекату.

Лѣвый склонъ упомянутой выше надъ также образованъ зеленой мелкозернистой породой, однако выше надъ правый берегъ становится пологимъ, рѣка поднимаетъ скалы лѣваго берега, на правомъ же берегу между рѣкой и склономъ расположена площадка, поросшая лѣсомъ. Выше переката ущелье вновь суживается, рѣка приближается къ правому склону, который въ данномъ мѣстѣ болѣе круто поднимается чѣмъ лѣвый, и представляетъ обнаженія и розсыпи розово-желтаго среднезернистаго гранита. До поворота рѣки на сѣверъ обнаженій зеленой породы не замѣтно, хотя она въ видѣ валуновъ находима и въ этомъ мѣстѣ. По поворотѣ же рѣки на сѣверъ правый склонъ прорѣзанъ ложиной, берега которой образуютъ скалы зеленой мелкозернистой породы. Мѣстами порода становится среднезернистой, съ преобладаніемъ пироксена, мѣстами же она почти чернаго цвѣта и содержитъ большое количество біотита и роговой обманки; иногда въ ней заключены угловатые обломки крупнозернистой кварцево-полевошпатовоной массы съ небольшимъ количествомъ роговой обманки. У устья ложины былъ найденъ Обручевымъ кусочекъ амазонскаго камня, но залеганія этой породы нигдѣ нельзя было наблюдать.

Далѣе по правому берегу появляется снова розсыпи розово-желтаго гранита. Тутъ же гранитъ переходитъ и на лѣвый берегъ и образуетъ тамъ розсыпи громаднхъ глыбъ, которая подходитъ къ кипящей въ мѣстѣ рѣкѣ.

Противъ этой розсыпи на правомъ берегу тянется терраса, сложен-

ная изъ древнихъ наносовъ, вышиной въ 5—7 саж. Съ этого пункта горы отступаютъ, русло все-таки еще довольно стремительной рѣки становится шире. Среди большихъ глыбъ, разбросанныхъ по правому берегу попадаетъ гранитъ и въ одномъ мѣстѣ крупно-кристаллическій известнякъ. Тутъ и кончается ущельистая часть Ихэ-угуна. Долина становится широкой; по ней плавно течетъ рѣка, вправо и влево уходятъ первые увалы Ниловскаго хребта, а впереди возвышаются гигантскія пики альпювъ, покрытые вѣчнымъ снѣгомъ. Среди галекъ встрѣчаются тутъ: сѣрый мелкозернистый сіенито-гнейсъ, крупнозернистый сіенитъ съ зеленой роговой обманкой и пузыристый темно-сѣрый базальтъ.

При выходѣ изъ ущелья, въ недалекомъ разстояніи на сѣверѣ, возвышается гора, считающаяся у бурятъ священной, какъ мѣстопребываніе вхъ боговъ. Высота ея около 220 метр. надъ уровнемъ долины; она нѣсколько вытянута съ с.-з. на ю.-в.; самый высокій ея пунѣтъ находится на с.-з.-номъ концѣ. Склоны ея довольно круты, исключая с.-з.-аго; с.-в. изъ нихъ покрытъ сосновымъ лѣсомъ, ю.-з.-ный мѣстами обнаженъ и представляетъ площади сыпучаго песка, образующаго барханы и гряды. Отъ горы отдѣляется широкой долиной, покрытой горѣлымъ и засохшимъ лѣсомъ, къ сѣверу еще одно песчаное возвышеніе, отчасти обнаженное, отчасти же поросшее лѣсомъ. На вершинѣ горы въ с.-з.-ой ея части возвышается кулолообразный холмъ, передъ которымъ расположена впадина, имѣющая видъ гигантскаго котла, діаметромъ 30—40 саж. и глубиной 5—6 саж. Никакихъ обнаженій твердыхъ породъ эта гора не представляетъ, всюду виденъ лишь грязно-желтый, довольно мелкій песокъ. У ю.-з.-ой подошвы горы, подмываемой излучиной Ихэ-угуна, замѣтны въ песчаномъ обрывѣ слои валуновъ и гальки. По мнѣнію Обручева эта гора представляетъ собой остатокъ древнихъ наносовъ, выполнявшихъ долину между Тункинскими альпами и Ниловскимъ хребтомъ въ то время, когда Ихэ-угунъ не успѣлъ еще промывать себѣ ущелья чрезъ названный хребетъ, однако нельзя пока еще сказать, какіе были это наносы, озерные ли, рѣчные или ледниковые. „Быть можетъ, говорить Обручевъ, здѣсь разстиалось обширное озеро, въ которое рѣки и ледники Тункинскихъ альпювъ сносили свои отложенія, и которое истекло въ какомъ-либо болѣе низкомъ мѣстѣ чрезъ Ниловскій хребетъ въ долину Иркутъ. Этотъ стокъ постепенно размывалъ свое русло, углублялъ его и наконецъ осушилъ все озеро, а затѣмъ дѣятельность проточныхъ водъ постепенно размыла толщи наносовъ, заполнявшихъ долину—дно бывшаго озера“.

Изъ изложеннаго геогностическаго строенія слѣдуетъ, что Ниловскій хребетъ образованъ исключительно кристаллическими породами, именно: бютитово-роговообманковымъ гранитомъ, среди котораго мѣстами попадаются зеленые породы типа сіенитовъ, кварцевыхъ и нормальныхъ діоритовъ и диабазовъ, пока еще неопредѣленнаго возраста. Присутствіе въ двухъ мѣстахъ известняковъ, по мнѣнію Обручева, объясняется гидрохимическими процессами, разложеніемъ пироксена и плагиоклаза зеленыхъ породъ, присутствіе котораго можно наблюдать во всѣхъ образцахъ и при томъ въ такомъ количествѣ, что Кропоткинъ отнесъ всѣ эти породы къ известнякамъ.

### 3) Горная страна между р.р. Иркутомъ и Бѣлою.

Мы говорили уже выше о томъ, что до сихъ поръ еще нѣтъ маршрутовъ, знакомящихъ со всею длиною теченія р.р. Китою и Бѣлою вмѣстѣ съ ихъ главнѣйшими притоками; на основаніи имѣющихся свѣдѣній мы не въ состояніи также представить возможно полную картину горныхъ цѣпей, разоблачающихъ эти рѣки. Поэтому для ознакомленія съ этою мѣстностью намъ остается воспользоваться отчетами путешественниковъ, болѣе или менѣе углублявшихся въ эту страну, но къ сожалѣнію не пересѣкшихъ всей ея ширины. Изъ числа такихъ путешествій всего болѣе обширный районъ захватываетъ повѣдка Черскаго <sup>1)</sup>, такъ какъ маршрутъ его пересѣкаетъ въ нѣсколькихъ мѣстахъ какъ Тункинскіе, такъ и Китоискіе альпы, углубляясь кромѣ того и въ горы системы р. Бѣлой, поэтому мы послѣдуемъ сначала за этимъ геологомъ, а затѣмъ дополнимъ переданныя имъ свѣдѣнія данными, почерпнутыми изъ другихъ источниковъ, хотя большая часть послѣднихъ принадлежитъ уже къ старѣлымъ во многихъ отношеніяхъ. Что же касается повѣдки Черскаго, совершенной имъ въ 1873 г., то и она не вполне достигла возможныхъ результатовъ потому во-первыхъ, что ей крайне мѣшало дождливое время года и возмущившійся отъ этого уровень водъ горныхъ рѣкъ, замедлившій путешествіе и доведшій до истощенія провіанта, къ тому же пожаръ, уничтожившій значительную часть г. Иркутска, истребилъ всю привезенную Черскимъ коллекцію и часть описнаго матеріала, отчего должна была пострадать обработка собранныхъ данныхъ: во-вторыхъ, сопровождавшій Черскаго естествоиспытатель Гартунгъ, занимавшійся ботаническими и энтомологическими коллекціями, умеръ, а вмѣстѣ

<sup>1)</sup> Черскій, Рукописныя замѣтки, см. также Изв. Сиб. Отд. И. Р. Гистр. Общ. Т. IV № 5, Т. VI № 4 и Т. XII № 4 и 5.

съ нимъ затерялись многія замѣтки и наблюденія, производить которыхъ онъ взялъ на себя по соглашенію съ Черскимъ.

Для большаго удобства изложенія путешествіе это мы раздѣлимъ на нѣсколько частей, а такъ какъ прежде, чѣмъ перевалить съ Иркутъ (около с. Гуджірскаго) на Китою, Черскій сдѣлалъ нѣсколько экскурсій по южному склону Тункинскихъ альповъ въ системѣ знакомой намъ уже р. Тунки, то описаніе наше начнемъ именно съ этой части гольцовъ.

а) Южный склонъ Тункинскихъ альповъ отъ верховьевъ р. Тунки до рч. Саганъ-угуна.

Эккурсія по рѣчкамъ южнаго склона Тункинскихъ альповъ въ предѣлахъ знакомой намъ уже Тункинской котловины производились не съ цѣлью изученія высшихъ пунктовъ цѣпи, покрытыхъ въ то время еще глубокимъ снѣгомъ (вторая половина мая), но для ознакомленія съ строеніемъ этого склона, а главное съ нѣкоторыми стратиграфическими вопросами, съ которыми необходимо было ознакомиться прежде, чѣмъ углубиться въ центральныя части этой горной страны. Поэтому въ большей части случаевъ экскурсія прекращалась уже на сравнительно небольшой высотѣ, гдѣ достигались хорошія обнаженія коренныхъ породъ, слагающихъ эту живописную цѣпь. Верховья рч. Тунки, берущей начало съ гольца (пика), извѣстнаго подъ названіемъ Тункинъ-ихинъ-хардыкъ (*ихинъ* означаетъ верховье, *хардыкъ*—голецъ на бурятскомъ языкѣ), располагаются въ сѣверо-западномъ углу соименной (Тункинской) котловины. Въ предѣлахъ подножія альповъ, поросшаго дремучимъ хвойнымъ лѣсомъ и въ началѣ ихъ склона вообще узкая и быстро суживающаяся кверху долина эта представляетъ весьма оригинальную наружность. Высокіе (до 70') склоны ея состоятъ изъ неслоистаго песчанаго отложенія, переполненнаго какъ острореберными глыбами скаль, достигающими 20' въ діаметрѣ, такъ оглаженными и округленными валунами такихъ

же и меньшихъ размѣровъ, такъ равно и галькою, причѣмъ весь этотъ матеріалъ переѣпанъ въ крайнемъ безпорядкѣ, напоминая ледниковыя отложенія, что равнымъ образомъ относится и къ самому песку, измѣняющему зерно отъ средней величины до мельчайшей, пылевидной. Тѣмъ не менѣе шлифованныхъ и изборозжденныхъ валуновъ и таковыхъ же поверхностей на утесахъ Черскому не удалось найти. Дно долины покрыто сплошнымъ покровомъ такихъ же глыбъ и валуновъ, между которыми мчатся съ шумомъ и грохотомъ воды рч. Тунки, не мѣшающей путешественнику проходить по ней, шагая съ глыбы на глыбу, нерѣдко даже по длинѣ ея теченія. Всего оригинальнѣе являются причудливыми скопленія и группировки глыбъ, замѣчаемыя нерѣдко среди этой долины: мѣстами на нѣсколькихъ валунахъ или сравнительно узкомъ, болѣе или менѣе конусообразномъ скопленіи ихъ располагается громадная глыба, придавая всему скопленію грибовидную или столовидную форму, въ другихъ же мѣстахъ поверхъ трехъ или четырехъ глыбъ, играющихъ роль стѣнъ грота, расположилась еще большихъ размѣровъ глыба, образуяъ собою крышу этой причудливой постройки, въ составъ которой, какъ равно и другихъ подобныхъ скопленій, почти всегда входятъ еще и почти побѣлѣвшіе уже стволы деревьевъ, липовыхъ коры и вѣтвей. Выше по долинѣ начинаются выходы и утесы знаменитыхъ намъ уже въ общемъ породъ мергельсвой системы съ преобладающимъ простираниемъ пластовъ на з.-с.-з. и съ соответственнымъ южнымъ надепиемъ на ю.-ю.-з. Высота гольца, около котораго беретъ начало Тунка, какъ равно и сосѣднихъ съ нимъ вершинъ, должна быть не меньше 8000', судя по высотѣ гольца Хобокскаго (см. ниже), лежащаго уже въ сѣверо-восточномъ углу котловины, гдѣ высота цѣпи уменьшается.

Барунъ-Бугутыйскій гонецъ, лежащій верстахъ въ 13 восточнѣе Тункиныхъ-хитовъ, легко отличается широко- и горизонтально-усѣченнымъ очертаніемъ своей вершины, снаб-

женной лишь маленькимъ коническимъ возвышеніемъ почти на половинѣ длины верхняго контура гольца. Кромѣ того онъ до нѣкоторой степени напоминаетъ собою вулканъ, такъ какъ острореберный гребень его вершины окружаетъ собою пространное, почти воронкообразное углубленіе (котловину), разорванное съ южной стороны долиною соименной рѣчки, называемой также и Тагархѣемъ, отъ имени улусовъ, расположенныхъ недалеко отъ подножія альповъ (Тагархайскіе улусы). Восхожденіе по этой рѣчкѣ Черскій предпринялъ сначала по ея лѣвому берегу, но долженъ былъ возвратиться назадъ, такъ какъ ея быстрыя воды приблизились въ одномъ мѣстѣ къ самому утесу, преградившему путь. Вторичное восхожденіе совершено по очень крутому, поросшему лѣсомъ склону гольца, недалеко отъ лѣваго берега Барунъ-Бугутъской (Тагархайской) долины. Съ трудомъ подвигаясь вверхъ, путешественникъ перешелъ вертикальную границу распространенія березъ на высотѣ 4583' н. ок., послѣ чего, на высотѣ 5810', онъ достигъ самаго низкаго мѣста юго-восточнаго края воронкообразнаго расширенія верховья долины. Пунктъ этотъ, въ противоположность остальной части гребня, располагается еще въ предѣлахъ древесной растительности, и на самомъ краю его произрастаетъ еще кедровый сланецъ и малорослый кедръ. На высшихъ частяхъ гребня и склона къ воронкѣ лежали снѣжныя поляны; съ западной стѣны этого громаднаго расширенія низвергаются верховья Барунъ-Бугуты въ видѣ трехъ сходящихся книзу потоковъ молочно-бѣлаго цвѣта; не взирая на значительное отдаленіе ихъ отъ пункта наблюденія, потоки эти издавали громкій и весьма оригинальный шумъ и грохотъ отъ непрерывнаго перекатыванія камней по въ высшей степени крутому ихъ руслу. Такое полноводіе рѣчки зависѣло впрочемъ отъ таянія снѣга, и потому на разсвѣтѣ русло ея было совершенно сухимъ, между тѣмъ какъ къ вечеру оно сдѣлалось въ нѣкоторыхъ мѣстахъ даже непрохо-

лимитъ для пѣшехода. Въ утесахъ долины обнажается бурый мелкозернистый сланецъ, стоящій въ весьма интимномъ отношеніи къ мелкозернистому же известняку; простираніе пластовъ з.-с.-з., паденіе ю.-ю.-з.; предгорье обнаруживаетъ наносъ съ валунами и галькою, напоминающей описанный въ верховьяхъ р. Тунки.

Горныя части долины р.р. Хынъ-гергѣ, лежащей около 8 верстъ къ востоку отъ Барунъ-Бугуты и Хайрема, около 4 верстъ восточнѣе Хынъ-гергѣ, съ нижнимъ теченіемъ которыхъ мы познакомились уже выше, посѣщены Черскимъ только вблизи выходовъ ихъ изъ альповъ, такъ какъ выше долины эти стѣсняются утесами, а ущелья оказались въ то время непроходимыми по причинѣ возвысившагося уровня воды въ обѣихъ рѣчкахъ, изъ которыхъ Хайремъ до того переполнился, что его воды струились даже по полямъ Тунгусской котловины, затопляя собою нѣкоторые рощи и пересѣкая дорогу, ведущую къ мельницамъ на Хынъ-гергѣ. Коренною породою являются здѣсь кристаллическіе известняки и доломиты, изъ которыхъ въ предгорьяхъ по обѣимъ долинамъ образовался оригинальный детритусъ мощностью въ нѣсколько саженой, принимавшійся во времена Бакшевича за коренную породу (на рч. Хынъ-Гергѣ). Детритусъ этотъ на Хынъ-гергѣ покрывается слоемъ галекъ и валуновъ, превращенныхъ въ конгломератъ, выше котораго залегаютъ горизонтальные пласты прѣсноводнаго известняка, въ видѣ террасы до 42' высоты надъ уровнемъ долины, похожаго на такой же известнякъ описаннаго выше Халъ-угуна. Черскій, относившій прежде отложеніе это къ послѣтретичному возросту <sup>1)</sup>, склоняется видѣть въ нихъ образованія болѣе древняго, быть можетъ третичнаго періода <sup>2)</sup>.

Въ 8-ми верстахъ восточнѣе Хайремскаго гольца, считая

<sup>1)</sup> Черскій, Изв. Сиб. Отд. И. Р. Геогр. Общ. Т. VI, № 4.

<sup>2)</sup> Черскій, Рукописныя замѣтки о Сибири.



по прямому направленію, располагается Хобокскій голецъ, лежащій уже въ границахъ меридіановъ западной части Еловскаго отрога (см. выше), въ области, гдѣ Тункинскіе гольцы начинаютъ уже понижаться по направленію къ долинѣ Саганъ-угуна, на востокъ отъ которой они, какъ сказано выше, теряютъ уже и альпійскій характеръ. Голецъ этотъ отдѣляется отъ Хайремскаго рядомъ живописныхъ пиковъ (Улябарскіе гольцы, какъ всего лучше видимы съ соименнаго улуса) и принадлежитъ еще къ болѣе высокимъ изъ ряда понижающихся здѣсь вершинъ; но онъ и представляетъ уже такихъ коническихъ или пирамидальныхъ пиковъ, какими отличаются другіе, болѣе западные. Вершина Хобокскаго гольца образуется лишь гребнемъ, который круто подымаясь съ запада, слѣдуетъ общему направленію альповъ на востокъ, переходя въ зазубренную стѣну, связывающую его съ сосѣднимъ трехглавымъ гольцомъ. Гребень этотъ отодвинутъ къ сѣверу и возвышается круто надъ южною частью массива, которая, при взглядѣ на нее съ предгорья, кажется состоящею изъ трехъ куполообразно окруженныхъ горъ, слившихся между собою. Начиная съ предгорья, входящаго уже въ составъ Еловскаго отрога, густо кедровникъ подымается на склоны этихъ куполообразныхъ горъ, но выклиниваясь, не достигаетъ и верхней трети видимой отсюда (т. е. съ предгорья) ихъ высоты. Восхожденіе на этотъ голецъ (23-го мая 1878 г.) Черскій началъ съ лѣваго берега рч. Хурей-Хобока, съ того мѣста, гдѣ онъ слѣдуетъ почти меридіональному направленію, протекая въ высокихъ берегахъ нанося съ валунами и галькою. Между западною и среднею изъ упомянутыхъ куполообразныхъ вершинъ опускалась ослѣпительно бѣлая снѣжная полоса съ пальцевидными развѣтвленіями, обращенными кверху; сходящимся нижнимъ концомъ полоса эта достигла русла Хурей-Хобока, обозначая собою верховья этой рѣчки. Въ свою очередь другая полоса снѣга, залегающая въ углубленіи

между восточною и среднею вершинами, являлась въ роли  
лѣзга притока.

Береза исчезла на высотѣ 4575'; наносъ съ валунами  
продолжается еще до 5393', порослая дѣвственнымъ лѣсомъ,  
поражающимъ своимъ угрюмымъ характеромъ и множествомъ  
мхи. Давно свалившіяся деревья совершенно покры-  
лись уже арко зеленымъ мхомъ, превратившись въ массу  
удобно раздавливаемую ногою, другія лежали на нихъ по-  
блѣвшія, заграждая собою и безъ того трудный путь; нога  
каждый разъ вязнетъ въ упругомъ и влажномъ мхѣ, стопа  
чужается въ немъ совершенно, не оставляя затѣмъ ни ма-  
лѣйшаго слѣда тамъ, гдѣ она проникала подъ уровень этой  
бархатной зелени. Ближе къ предѣлу древесной раститель-  
ности высота кедровника значительно уменьшилась, а обстоя-  
тельство это, въ связи съ несоразмѣрною толщиною дерева,  
придавало его стволамъ замѣтно коническую форму, приче-  
мъ нѣтъ ихъ обращены были, вѣрнѣе сохранились лишь на  
н.-ю.-з. сторонѣ ствола, между тѣмъ какъ на противополо-  
жнѣ ихъ не было вовсе. Затѣмъ кедровникъ сталъ выклини-  
ваться, и путешественникъ, на высотѣ 5845', вступилъ въ  
узкій впрочемъ поясъ кедроваго сланца, странная и урод-  
ливая формы котораго невольнo поражаютъ человека, встрѣ-  
чающагося съ нимъ въ первый разъ. Выше кедроваго сланца,  
на высотѣ около 5860', царствовала уже осмь остроребер-  
ную глыбъ, поростающая мѣстами липайникомъ, а съ вы-  
соты средней куполообразной вершины (около 6800') обострѣ-  
лась уже вся мѣстность до главнаго гребня гольца и, бла-  
годаря плоско-округленнымъ формамъ, представлялась лишь  
линистою, играя роль предгорья относительно крутаго, ска-  
листо и довольно высокаго главнаго гребня. Этотъ послед-  
ній отдѣляется отъ своего западнаго конца вѣтвь, слѣдующую  
на югъ и понижающуюся по направленію къ запад-  
ной куполообразной возвышенности, а затѣмъ, въ разстояніи  
около 100 сажень отъ главнаго гребня, отдѣляется и дру-

гая, восточная вѣтвь, слѣдующая къ восточной куполообразной возвышенности. Обращенные другъ къ другу склоны этихъ вѣтвей, въ особенности восточной изъ нихъ, а также южный склонъ главнаго гребня между вѣтвями, опускаются очень круто къ ограничиваемому ими пространству, открытому къ югу и углубленному внизу въ видѣ плоской котловины дно которой занимаетъ небольшое, удлиненное по меридіану озерко, располагаясь ближе къ восточной вѣтви главнаго гребня. Озеро это (повидимому до 15 саж. въ длину) было покрыто льдомъ и снѣгомъ, а очертаніе его Черскій могъ замѣтить лишь потому, что ледъ, начинающій таять по берегамъ, обрисовывалъ ихъ синею каймою, безъ чего о существованіи здѣсь озера можно было бы и не подозревать. Впрочемъ, о бывшей здѣсь водѣ можно было бы догадываться по горизонтальной, свѣтлой чертѣ, замѣтной на восточномъ прибрежномъ утесѣ, доказывающей, что уровень воды замѣтно превышалъ современный. Приблизиться къ озеру не было однако возможности вслѣдствіе глубокаго, но рыхлаго снѣга покрывавшаго осыпь съ ея опасными щелями и все углубленіе, лежащее приблизительно на высотѣ 6700'. На пути къ западной вѣтви гольцоваго гребня, на высотѣ 7137', подъ глыбами осыпи слышалось сильное журчаніе воды, стремившейся въ сторону видѣннаго снизу верховья Хурей-Хобокъ, который поэтому не имѣетъ видимой связи съ озеромъ, лежащимъ значительно ниже и восточнѣе того мѣста, на которомъ слышалось журчаніе. Огибая снѣжныя поляны и шедъ съ одной глыбы на другую, путешественникъ взобрался на гребень западной вѣтви, образующій въ этомъ мѣстѣ родъ неглубокой сѣдловины, на которой анерондъ показалъ 7164'. Отсюда восхожденіе на главный гребень совершалось уже съ немалымъ трудомъ: путь по гребню значительно ссузился, а горизонтъ зрѣнія сталъ ограничиваться иногда лишь нѣсколькими глыбами, на которыя предстояло взобраться. Еще нѣсколько минутъ спустя путешественникъ стоялъ уже

одной из выдающихся точек главного гребня, надъ которымъ высшій пунктъ гольца возвышался, повидимому, еще на 10, но къ сожалѣнію высшій пунктъ этотъ отдѣлялся отъ него пологою свѣга, перейти которую было невозможно по причине ея рыхлости, а обойти нельзя было и думать, вследствие крутизны склоновъ гребня. Высота пункта, на которомъ мы стояли и съ котораго возвратились, опредѣлена въ 7628'. На обратномъ пути, уже въ предѣлахъ кедроваго сланца, Черскій видѣлъ еще меньшее скопленіе воды, изъ котораго беретъ начало лѣвый притокъ или лѣвое верховье Хурей-Хобока.

Хобокскій голецъ, столь подробно описанный нами, представляетъ немаловажный интересъ въ томъ отношеніи, что въ немъ нельзя не видѣть одинъ изъ лучшихъ примѣровъ измѣненія конфигураціи горъ отъ растрескиванія слагающей ихъ породы и обрушиванія остроконечныхъ вершинъ и гребней. И действительно, отношеніе описанныхъ выше двухъ отроговъ (вѣтвей) къ главному гребню и къ расположенному между ними углубленію, занятому озеромъ, указываетъ безспорно на то, что прежде на гольцѣ этомъ располагалась альпійская котловина, окруженная почти со всѣхъ сторонъ скалистыми стѣнами, прерванными лишь на мѣстѣ выхода изъ нея Хурей-Хобока; въ то время голецъ нашъ долженъ былъ имѣть такую же строго-альпійскую наружность, какою отличаются нынѣ и другіе гольцы, лежащіе отъ него на западѣ. Между тѣмъ вся южная часть этой котловины отсутствовала уже въ настоящее время: она превратилась въ груду островершинныхъ обломковъ, изъ коихъ слагаются упомянутыя выше разнообразныя вершины, которыя, вмѣстѣ съ бывшимъ дномъ, входятъ въ составъ современнаго предгорья главного гребня. Этотъ послѣдній представляетъ собою остатокъ южной стѣны разрушенной котловины; въ немъ также, какъ въ двухъ вѣтвяхъ, нельзя не видѣть нѣкоторыхъ частей боковыхъ стѣнъ котловины. Но и онъ является нынѣ уже до того растрес-

канными, что только на сѣдловнѣ западной вѣтви и восточной можно встрѣтить утесистые выступы нераспавшейся скалы, пригодные для оцѣнки положенія пластов современемъ и они превратятся въ осыпь, вмѣстѣ съ тѣмъ прежній альпійскій пикъ превратится въ округленную вершину, дальнѣйшее пониженіе которой будетъ зависѣть отъ болѣе или менѣе успѣшнаго сноса осыпи стекающими по ней водами. Хобокскій гонецъ знакомитъ насъ повѣтому агентами, вызвавшими притупленіе и пониженіе нивовъ направленію къ долинѣ Саганъ-угуна и наконецъ потеченію альпійскаго характера цѣпи на востокъ отъ этой долины ведущей къ перевалу черезъ Тункинскіе альпы въ долину Китоа.

Что же касается породъ, входящихъ въ составъ этого гольца, то Черскій находилъ здѣсь гнейсы, слюдяный сланецъ и слоистыя пироксеновыя породы, а въ глыбахъ попадался кристаллическій известнякъ. Простираніе пластовъ з.-с.-паденіе ю.-ю.-з. въ  $45^{\circ}$ .

в) Перевалъ черезъ Тункинскіе альпы по рч. Саганъ-угунъ въ долину р. Китоа.

Окончивъ экскурсію по рѣчкамъ системы Тунки, 7-го іюня Черскій перешелъ въ Торскую котловину, въ знакомъ намъ уже село Гуджирское, гдѣ встрѣтился съ пріѣхавшимъ туда изъ Иркутска Гартунгомъ, вмѣстѣ съ которымъ на слѣдующій день (9-го іюня) направился къ Саганъ-угунскому горному проходу, по которому перевалаютъ съ Иркутска въ долину р. Китоа.

Болѣе семи верстъ тропа тянется по сѣверо-западному углу Торской котловины вообще къ сѣверу, пересѣкая, и не жде нежели достигнуть долины Саганъ-угуна около 10 верстъ хода ея изъ альповъ, на высотѣ 2999', сухое русло зна-

ни намъ уже рч. Вилюйки, поросшее березовыми и смѣшанными рощами. Долина этой рѣчки принадлежитъ къ самымъ прохладнымъ сравнительно съ описанными выше, поросла густымъ хвойнымъ лѣсомъ, придерживаясь въ общемъ меридіональнаго направленія. Достигая нѣсколькихъ саженей ширины, рѣка разбивается здѣсь на нѣсколько протоковъ, мчащихся довольно значительною быстротою по руслу, бѣгущему въ покрывающихъ его галекъ и валуновъ. Въ большую часть пути этотъ нельзя считать удобопроходимымъ, такъ какъ въ одномъ лишь Саганъ-угуну приходится перейти одиннадцатъ бродовъ, послѣ чего до перевала предстоитъ еще двадцать одинъ бродъ черезъ притоки этой рѣчки, не представляющіе впрочемъ никакихъ затрудненій.

Съ высоты 3214' начинаются утесистые склоны, въ нѣкоторыхъ частяхъ долины, обнаруживающіе что въ составѣ описываемаго склона альпійскій участвуетъ перемежаемость слюдяныхъ и слюдяныхъ сланцевъ съ кристаллическимъ изверженіемъ желтоватаго, бѣлаго и краснаго цвѣта, залегающихъ на гнейсахъ и другихъ полевошпатовыхъ породахъ <sup>1)</sup>; простирание пластовъ такое же какъ и по другимъ долинамъ южнаго склона (вообще з.-с.-з.) съ паденіемъ на ю.-ю.-з. до ю.-в. и даже опрокинутого положенія слоевъ. Ключки растаявшаго льда около береговъ рѣчки стали появляться уже на высотѣ около 3400', гдѣ произрасталъ уже и красивый желтый рододендронъ (*Rh. chrysanthum* Pall.). Еще выше (3585'), оставивъ Саганъ-угунъ, путешественники направились вверхъ по его лѣвому притоку, извѣстному подъ именемъ Жедой, поворачивая все болѣе и болѣе къ западу. На высотѣ 3992' они поровнялись съ устьемъ рч. Ансалтай, лѣвый притокъ Жедоя, приходящій съ с.-в.; максимальный предѣлъ распространенія березы оставленъ ими

<sup>1)</sup> Черскій Изв. Сиб. Отд. И. Р. Геогр. Общ. Т. VI, № 4, стр. 157.

на высотѣ 4515', послѣ чего долина расширилась, Жедоя остался на с.-с.-з., а тропа повернула на ю.-з., къ перевалу вверхъ по правому безымянному притоку Жедоя, около та называемаго Архутскаго гольца, вершина котора скрывалась облаками. Высшій пунктъ перевала (5245') достигнуть наконецъ въ небольшой котловинкѣ, около сѣверо-восточнаго подножія гольца, отстоящей отъ р. Иркуты около Гуджирь приблизительно въ 26 верстахъ. Отсюда путешественники предприняли восхождение на одинъ изъ болѣе высокихъ пунктовъ отрога, исходящаго изъ Архутскаго гольца, съ цѣлью осмотрѣть мѣстность, лежащую къ северу, т. е. къ долинкѣ р. Китоя, такъ какъ уже изъ рассказовъ своихъ проводниковъ они знали, что съ этого пункта они должны встрѣтиться съ значительными разногласіями между дѣйствительностью и имѣвшимися до сихъ поръ свѣдѣніями объ этой мѣстности. Вблизи отъ мѣста стоянки въ этомъ перевалѣ струился ключикъ, направлявшійся вообще къ с.-з.; проводники называли его правымъ притокомъ Архутъ, изливающейся уже въ Китой; между тѣмъ, согласно новѣйшимъ картографическимъ матеріаламъ <sup>1)</sup>, слѣдуя взятому путешественниками направленію, на пути къ Китой необходимо пересѣчь еще два верховья его праваго притока Жедоя, изъ которыхъ второе должно располагаться еще слишкомъ 20 верстахъ отъ верховьевъ системы Саганъ-угуръ и въ слишкомъ 10 верстахъ отъ Китоя, до котораго слѣдовательно, должно было оставаться еще слишкомъ 40 верстъ, а р. Архутъ должна была оставаться въ слишкомъ 40 верстахъ къ з.-с.-з., въ сторонѣ отъ дороги. Восхождение отрога Архутскаго гольца сразу обнаружило неточность прежнихъ свѣдѣній. Съ высоты 6734', до которой поднялись путешественники, всю эту мѣстность можно было обозрѣвать такъ сказать «съ полета птицы», и вотъ какая картина

---

<sup>1)</sup> Карта Шварца по свѣдѣніямъ, собраннымъ Пермякинымъ.

тина развернулась передъ глазами наблюдателей. Отрогъ, на которомъ они стояли, оказался сравнительно узкимъ мысомъ, отделяющимся между упомянутымъ правымъ притокомъ Архута и самимъ Архутомъ, котораго верхняя часть теченія виднѣлась весьма отчетливо. Верховья рѣки располагаются въ нѣсколькихъ (по видимому около 10) верстахъ на западѣ; откуда, въ очень глубокой долинѣ, Архуть слѣдуетъ восточному направленію въ отрогу Архутскаго гольца, около западнаго подножія котораго рѣка поворачиваетъ дугообразно на с. и с.-з., а впоследствии правый притокъ съ перевала, и на з.-с.-з., послѣ чего, принявъ опять сѣверо-западное направленіе, уже въ низовьяхъ своихъ поворачиваетъ почти меридіонально къ Битю. Рядъ живописныхъ альпійскихъ вершинъ сопровождаетъ оба берега верхней части Архутской долины; такой же рядъ пиковъ располагался къ югу и юго-западу отъ наблюдателей. Китоу находился отъ нихъ всего лишь въ 20 верстахъ, что же касается верховьевъ Китоискаго (въ противуположность Сагань-угунскому) Жедоя, то верховья его должны располагаться хотя и недалеко отсюда, но на сѣверо-востокъ отъ меридіана перевала и за горами, образующими правый берегъ системы водъ Архута и лѣвый верховьевъ водъ Сагань-угуна; на китоискій Жедой, какъ сказано уже выше, идетъ перевалъ по долинѣ рч. Кукойской (Хухэй), не далеко отъ знакомыхъ намъ уже Куркутскихъ поворотовъ Иртыша въ восточной части Торской котловины. Отношеніе Архута къ Сагань-угуну оказалось поэтому гораздо ближе къ изображенному на картѣ горнаго инженера Ковригина<sup>1)</sup>, которую очевидно не пользовался Шварцъ при составленіи своей карты. Вершина отрога, до которой доходили путешественники (6724'), не выходила еще за предѣлы распространія кедроваго сланца, отдѣльные кустики котораго мѣстами можно было еще замѣтить; около довольно обширныхъ по-

<sup>1)</sup> Ковригинъ, Горн. Журн. 1836 г. ч. III, кн. VII.



лянъ снѣга начиналъ цвѣсти одинъ изъ видовъ генціана изрѣдка попадались и индивидуумы рододендрона. Въ обихъ женияхъ и россыпяхъ наблюдались полевошпатовыя слои породы съ простираніемъ пластовъ на з.-с.-з. и наденіемъ н ю.-ю.-з.; но осыпямъ слышались голоса пещухъ (*Lagomys hyperboreus*, non *alpinus*), съ любопытствомъ выглядывавшихъ изъ щелей.

Спустившись съ перевала по правому притоку Архута на высотѣ 4240' путешественники достигли его устья, а слѣд вательно долины самого Архута, достигающей здѣсь почти 1 версты въ ширину, при ширинѣ русла около 16 саж. Лѣвый берегъ долины расчлененъ цѣлымъ рядомъ ложбинъ на отдѣльныя вершинки, за которыми виднѣлись покрытыя снѣгомъ пики; въ долинѣ произростала уже и береза. Перейдя три раза въ бродъ рѣку, а затѣмъ ея лѣвый притокъ Курсапк трона оставляетъ Архутъ, повернувшій на сѣверъ къ сѣзжанію его долины около устья въ Китою, и направляется въ з.-с.-з., чтобы перевалить черезъ понизившійся, узкій отрогъ горъ лѣваго берега долины. Вслѣдъ за переваломъ, на высотѣ 3653' располагается небольшое (около 1 версты въ діаметр) озерко, послѣ чего слѣдуетъ крутой спускъ въ долину, извѣстную подъ названіемъ Булгунъ-болдѣкъ (3205'); тропъ затѣмъ направляется на западъ, въ общемъ параллельно Китою отъ котораго отдѣлена неширокимъ валообразнымъ отрогомъ поросшимъ лѣсомъ. Вообще тропъ придерживается того направленія, вверхъ по теченію р. Китою, скрывавшаго нѣкоторое время за упомянутымъ возвышеніемъ, и слѣдуетъ такимъ образомъ на протяженіи около 10 верстъ, считая съ устья Архута до мѣста предстоявшей переправы на лѣвый берегъ Китою.

Ширина долины Китою достигаетъ здѣсь, повидимому, около 2 верстъ; къ концу первой половины этого ея отрога тропъ пересѣкаетъ правый притокъ, рч. Бѣлокопытн изливающуюся широкимъ русломъ, раздѣленнымъ на

рукава. Поверхность долины Китоя во многих мѣстахъ покрыта скопленіями громадныхъ глыбъ кристаллическихъ породъ, преимущественно гнейсовыхъ, входящихъ очевидно въ составъ наноса, выполняющаго эту долину и подвергшагося послѣдствію размыву, вызвавшему различныя неровности и современное расположеніе этихъ глыбъ то въ видѣ бугровъ, то въ видѣ валуобразныхъ возвышеній; діаметръ нѣкоторыхъ такихъ неокругленныхъ глыбъ достигаетъ 30—70'; на нихъ растутъ уже мѣстами толстые, мачтовые кедры и ели, нерѣдко весьма оригинально оплестая ихъ своими толстыми корнями, такъ что нѣкоторые деревья и кусты сидятъ какъ будто верхомъ на скалахъ. Если прибавить къ этому толстый моховой покровъ, облегающій многіе бугры и глыбы, а также массы древесныхъ стволовъ, припавленныхъ во время разлива и нагроможденныхъ кучами, то дикій характеръ мѣстности обрисовывается еще рельефнѣе. Мрачная картина эта оживляется здѣсь быстрымъ и широкимъ (около 50 саженой) Китоемъ, протекающимъ около лѣваго склона долины вообще въ восходящемъ направленіи; уровень его насупротивъ устья рч. Китойкина, лѣваго притока Китоя, располагается на высотѣ 3153', — цифра повидимому преувеличенная, такъ какъ она даетъ слишкомъ большое различіе сравнительно съ высотой Иркуты около Тунки (2208'). Горы противоположнаго т. е. лѣваго берега Китоя значительно ниже, въ особенности за впаденіемъ широкой долины Китойкина, гдѣ здѣсь принимаютъ округленное очертаніе вершинъ и поросла въ дремучимъ лѣсомъ, такъ что только ближайшая къ лѣвому берегу Китойкина вершина обнаруживаетъ голую скалу, тогда какъ на правомъ берегу устья той-же долины начинается единственный здѣсь впрочемъ альпійскій голыщъ — Унышинъ-Хардыкъ (т. е. сирота голецъ), съ обширными полянами въ изрывающихъ его долинахъ; три восточные его пика отдѣляются глубокою сѣдловиною отъ западнаго, съ котораго начинается террасовидный

склонъ гольца къ Китою. Въ нѣсколькихъ верстахъ выше устья Китойкина долина Китоа суживается значительно такъ какъ рѣка выходитъ здѣсь изъ ущелья, направляясь къ югу и образуя излучину, обращенную выпуклостью въ южную сторону, послѣ чего уже она принимаетъ восточное а нѣсколько ниже Китойкина и сѣверо-восточное направление. Въ ущельѣ правый берегъ Китоа приближается къ подножію высокихъ альпійскихъ гольцовъ Тункинской цѣпи, придающихъ этому суженію особенную прелесть. Въ предѣлахъ излучины, къ правому берегу подступаетъ низкій скалистый отрогъ, въ утесѣ котораго, обращенномъ къ западу, находится гротъ до 20' ширины, около 30' высоты и слишкомъ 24' въ длину, причемъ сводообразный потолокъ его, равномерно понижаясь, постепенно переходитъ въ заднюю стѣну грота. Отрогъ этотъ обнажаетъ перемежаемость гнейсовъ съ кристаллическимъ, иногда пироксеновымъ известнякомъ: простирание пластовъ з.-с.-з. паденіе ю.-ю.-з. до 45°. Не безынтереснымъ слѣдуетъ считать и то явленіе, что выше устья Китойкина наносъ съ громадными глыбами, о которыхъ мы упоминали выше, исчезаетъ повидимому совершенно, о чемъ мы будемъ имѣть случай говорить еще ниже, по поводу такого же наноса и другихъ явленій, замѣчаемыхъ въ долині Китойкина. Въ излучину рѣки впадаютъ съ правой стороны два ключа. Ущелье Китоа выше устья Китойкина считают «непроходимымъ», вѣрнѣе трудно проходимымъ, и потому прѣзжающіе сюда промышленники не углубляются далеко вверхъ по долині. Впрочемъ часть ущелья пройдена въ шестидесятыхъ годахъ партією бѣглыхъ каторжниковъ, заблудившихся здѣсь на пути въ Монголію: до сихъ поръ, какъ говорятъ Тункинскіе жители, можно видѣть слѣды пролагавшейся ими тропы для перевала черезъ скалистые отроги гольцовъ, преграждавшихъ имъ дорогу, точно также находили построенные ими балаганы и оставленные въ нихъ нѣкоторыя вещи; по костямъ можно было видѣть, что, за-

сигнатуре голодомъ, они убивали своихъ лошадей, употребляя ихъ въ пищу, а въ упомянутомъ выше гротѣ найденъ былъ разложившійся трупъ человѣка. Странствованіе бѣглецовъ окончилось, говорятъ, тѣмъ, что, переваливъ черезъ Тункинскіе альпы, они спустились почти къ самому Туранскому каравану, гдѣ и были пойманы.

Хоти Черскій, задержанный необычайною прибылью воды въ Китоѣ, долженъ былъ простоять на его правомъ берегу съ 11-го по 15-е іюня, въ теченіи которыхъ уровень воды понизился на 4,9 фута, тѣмъ не менѣе бродъ черезъ Китоѣ оказался весьма опаснымъ: лошадямъ трудно было бороться съ быстротою рѣки и потому онѣ значительно сносились ею внизъ по теченію, у ѣздоковъ между тѣмъ со стороны противуположной теченію, вода заливалась даже въ карманы; часть сушарей оказалось подмоченною и требовала скорѣйшаго ихъ употребленія, такъ какъ начавшіеся дожди не давали возможности сушить пострадавшую часть провіанта.

в) Переваль съ долины р. Китоѣ на верховья р. Малой Бѣлой.

Упомянутый выше лѣвый притокъ Китоѣ р.ч. Китоѣкинъ соответствуетъ отчасти «р. Гарлыкъ», означенной на картѣ Шварца. Хотя у Ковригина на картѣ и не обозначено названіе этой рѣчки, тѣмъ не менѣе её можно узнать какъ по отношенію ея устья къ Архуту, такъ и по общему направленію долины, положеніе которой относительно Китоѣ и Малой Бѣлой означено не вѣрно, такъ какъ верховья обѣихъ рѣкъ показаны слишкомъ близко отъ Китоѣ, въ нѣсколькихъ верстахъ отъ его лѣваго берега, тогда какъ въ дѣйствительности разстояніе это не менѣе 30 верстъ, считая по прямому направленію, а длина долины Китоѣкина не менѣе 51 верстъ. Вверхъ по этой долинѣ ведетъ и тропа, по которой

(15-го іюня) путешественники `направились къ перевалу въ систему р. Бѣлой.

На протяженіи первыхъ девяти верстъ по нижнему теченію Китойкина они направлялись вообще на с.-з. (рѣка слѣдуетъ здѣсь юго-восточному направленію). Ширина рѣчки достигала 7 — 8 сажень, и первый бродъ на ея правый берегъ оказался не безопаснымъ какъ по причинѣ быстроты, такъ и вслѣдствіе большихъ камней, выстилающихъ дно ея. Большія гнейсовыя глыбы, какъ на правомъ берегу Китойки, покрываютъ собою широкую долину Китойкина, образуя такіе-же бугры и неровности, поросшіе густымъ хвойнымъ лѣсомъ. Столь-же густымъ лѣсомъ поростають склоны и вершины вообще невысокихъ прибрежныхъ горъ долины, отличающихся округленными высшими точками, на склонахъ которыхъ, какъ напр. насупротивъ устья р. Шаламши перваго праваго притока Китойкина, наблюдаются мѣстами мощныя толщи песчанаго наноса, переполненнаго глыбами валунами и галькою и достигающаго, повидимому, болѣе 500' надъ уровнемъ долины. Альпійскихъ вершинъ нигдѣ не видно, а мрачная долина Китойкина отличается здѣсь не столько закрытымъ положеніемъ, что солнце перестаетъ освѣщать уже съ 5 ч. 25 м. пополудни. Нѣсколько выше Шаламши, съ правой стороны впадаетъ еще р. Грустная, громкая, а сейчасъ же за нею (выше) лѣвый притокъ Китойкина, извѣстный подъ названіемъ Хара-горхонъ, начинающій съ котораго тропа переходитъ на лѣвый берегъ рѣчки подымаясь все по тому-же наносу съ большими глыбами (до 14 въ діаметрѣ), лежащими также и въ руслѣ рѣчки, затрудняющій бродъ на ея правый берегъ. Начиная почти съ устья р. Горшечницы (прав. притокъ), на протяженіи около 10 верстъ, долина рѣчки принимаетъ въ общемъ направленіе в.-ю.-в., вслѣдствіе чего путешественники слѣдовали уже в.-с.-з.; вмѣстѣ съ тѣмъ отчасти сталъ измѣняться и характеръ мѣстности; на правомъ берегу долины, т. е. на ея ю-

ной сторонѣ, стали появляться альпійскія вершины со снѣжными полянами, а долина представляетъ цѣлый рядъ удлинённыхъ озеровидныхъ расширеній, извѣстныхъ здѣсь подъ бурятскимъ названіемъ «сарамъ», т. е. котловина. Около четырехъ верстъ выше Горшечницы Китойкинъ принимаетъ съ лѣвой стороны рч. Дранцы, сейчасъ-же выше которой и трона переходитъ на тотъ же лѣвый берегъ, тогда какъ съ правой стороны, въ трехъ верстахъ выше Дранцы, впадаетъ рч. Разсѣха; долина покрыта все тѣмъ же наносомъ съ валунами и глыбами, но пожаръ, истребившій значительную часть лѣса, придалъ болѣе открытый видъ во всѣ стороны. Версты съ двѣ выше, на высотѣ 3710', располагается одно изъ самыхъ большихъ расширеній долины, извѣстное подъ названіемъ Акъинтой-сарамъ, названный такъ отъ рч. Акъинтой, впадающей въ Китойкинъ съ правой стороны. Длинная, широкая, отчасти луговая котловина эта пересѣкается Китойкиномъ съ запада (вѣрнѣе з.-ю. 15°) на востокъ (в.-с. 15°) и служитъ весьма удобнымъ мѣстомъ для тузюкинскихъ промышленниковъ, оставляющихъ здѣсь своихъ лошадей на все время охоты въ окрестныхъ лѣсахъ; причёмъ здѣсь они встрѣчаются иногда и съ сойотами (см. ниже), заходящими сюда съ системы р. Оспы. На западной оконечности и южной сторонѣ сарама возвышаются уже весьма живописные и зазубренные альпійскіе пики, тогда какъ вершины восточныхъ гольцовъ и сѣверныхъ отличаются округленными контурами. Проводники Черскаго рассказывали, что на одномъ изъ такихъ гольцовъ они видѣли здѣсь пасущееся стадо дикихъ сѣверныхъ оленей; къ группѣ этой съ другой стороны приближался между тѣмъ еще одинъ олень, изъ котораго вскорѣ взвился клубъ дыма и раздался выстрѣлъ. Оказалось, что приближавшійся олень былъ ручной, а за нимъ скрывался сойотъ, убившій на повалъ одного изъ пасшихся животныхъ.

Во встрѣченныхъ утесахъ наблюдались только гнейсы, про-

стираніе пластовъ которыхъ начало уклоняться отъ развитаго южнѣе и перешло здѣсь въ с.-с.-в.-ое; обнаженія замѣчались главнымъ образомъ въ мысовидныхъ оконечностяхъ отроговъ береговыхъ горъ сарамовъ, напоминавшихъ своимъ очертаніемъ и наружностью мысы, подвергавшіеся дѣйствию прибоа волнъ, какъ напр. на Байкалѣ; такими мысами образуются и сѣуженія долины между сосѣдними сарамами. — Ниже слѣдующаго за Акинтоемъ расширенія съ Безъимяннымъ правымъ притокомъ, выше рч. Бартохай, впадающей съ лѣвой стороны, Китойкинъ на протяженіи нѣсколькихъ верстъ принимаетъ почти меридіональное направленіе, послѣ чего долина въ общемъ слѣдуетъ опять съ с.-з. на ю.-в., сохраняя такое направленіе до самаго водораздѣла. Въ разстояніи верстъ съ 11 отъ Бартохая (около 39 верстъ отъ устья Китойкина), на высотѣ 4528', располагается четвертое отъ Акинтоя расширеніе, называемое Гунонскимъ сарамомъ отъ соименнаго лѣваго притока. Горы праваго (южнаго) берега долины все еще носятъ альпійскій характеръ. Наносъ съ глыбами и галькою, образовавшій нѣсколько валообразныхъ возвышеній ниже сарама, принимаетъ еще болѣе значительное развитіе выше его, гдѣ долина сѣуживается; русло Китойкина, шириною всего лишь до 4 сажень, глубоко врѣзывается въ это отложеніе, на способъ образованія котораго бросаютъ нѣкоторый свѣтъ низеслѣдующія явленія. Въ нѣсколькихъ верстахъ выше Гунонскаго сарама, на лѣвомъ берегу долины, можно видѣть утесъ, хотя и распадающийся уже на отдѣльныя глыбы, но съ ясно оглаженною, куполообразною поверхностью, на которой впрочемъ не видно никакихъ шрамовъ; за этимъ утесомъ, на протяженіи около 4 верстъ, находятся на томъ же берегу долины еще два другіе съ ясными слѣдами обтачиванія, произведеннаго очевидно бывшими здѣсь древними ледниками, которые должны были принимать участіе и въ образованіи описаннаго выше наноса съ глыбами, преобразованнаго впоследствии какъ рѣч-

нии, такъ, можетъ быть, и озерными водами, на что указываютъ новидимому нѣкоторые террасовидные уступы, хотя, по мнѣнію Черскаго, подробности всѣхъ этихъ явленій требуютъ еще болѣе спеціальнаго изслѣдованія мѣстности, при болѣе благопріятныхъ условіяхъ. Пласты гнейса въ этихъ тесахъ простираются на с.-с.-з. съ соответственнымъ наклонѣмъ на востокъ (в.-с.-в.).

Послѣдній изъ оглаженныхъ утесовъ располагается на самомъ поворотѣ долины, откуда тропа направляется уже къ сѣверу, въ разстояніи около трехъ верстъ отъ водораздѣла. Альпійскія вершины остаются уже къ югу и юго-западу, долина расширяется, дѣлаясь болотистою; ширина Китойкина ниспадаетъ до 2 сажень; онъ раздробляется мѣстами на рѣка и воспринимаетъ незначительные притоки, мѣстами же замѣчаются и груды глыбъ и одно обнаженіе гнейса съ тѣмъ-же простираніемъ пластовъ, послѣ чего долина суживается двумя виллообразными возвышеніями, вслѣдъ за которыми, на высотѣ 5003', путешественники вступили въ водораздѣльную котловину, извѣстную подъ названіемъ Ниланъ-сарамъ, т. е. мягкая котловина («ниланъ» — мягкій).

Котловина эта, около версты въ длину (съ с. на ю.) и до 350 саж. въ ширину (съ з. на в.), отличается въ общемъ параболическимъ очертаніемъ, замкнутымъ съ южной стороны влообразнымъ, почти прямолинейнымъ возвышеніемъ. Восточная его стѣна образуется двумя округленными, влообразными отрогами, возвышающимися на сѣверо-западъ; внутренній изъ нихъ ниже наружнаго, который примыкаетъ къ подножію округленнаго гольца, расположеннаго на сѣверо-востокъ отъ центра котловины и достигающаго 6253' высоты (т. е. 1250' надъ дномъ котловины). Сѣверная, между тѣмъ, и западная стѣны котловины представляютъ невысокія возвышенія (отъ 400 до 700' надъ котловиною), причемъ на западной изъ нихъ находится еще нѣсколько болѣе значительныхъ. конусовидныхъ вершинокъ (самая высокая 700' надъ



котловиною), а къ сѣверной примыкаетъ еще террасовидная площадка до 650' надъ котловиною. Всѣ эти высоты, какъ равно и гольцъ, покрыты розсыпью кристаллическихъ породъ преимущественно гнейсовъ, между которыми встрѣчается и зелено-каменная, быть можетъ изверженная порода, оставшаяся неопредѣленною; полоса розсыпи этой породы съ меридіональнымъ направленіемъ замѣчалась среди гнейсовой розсыпи какъ на гольцѣ, такъ и на западной стѣнѣ сарама гдѣ только и встрѣчено обнаженіе гнейсовидной слоистой породы, позволившее опредѣлить простираніе (с.-з.  $30^{\circ}$ ) и паденіе (з.-ю.  $30^{\circ}$ ) пластовъ. Котловина является открытою главнымъ образомъ съ двухъ сторонъ, именно въ юго-западномъ ея углу, гдѣ въ нее входитъ Китойкинъ, берущій начало въ другой, сосѣдней котловинѣ, а затѣмъ въ юго-восточномъ углу, гдѣ изъ нея выходитъ эта рѣка, образовавъ предварительно дугообразную излучину съ выпуклостью, обращенною къ сѣверу. Кромѣ того, на высотѣ упомянутой выше сѣверной террасовидной площадки, сарамъ открывается въ другую котловинообразное, треугольное углубленіе, расположенное ниже Ниланъ-сарама и понижающееся къ сѣверу, уже къ системѣ рѣки Бѣлой, гдѣ виднѣется цѣлый рядъ болѣе высокихъ, но округленныхъ и поросшихъ лѣсомъ вершинъ, изъ которыхъ только двѣ отличаются болѣе смѣлыми контурами и обнаженными высшими пунктами. Между тѣмъ къ югу отъ Ниланъ-сарама открывается видъ на настоящую альпійскую цѣпь горъ съ западнымъ вообще направленіемъ: это Китойскіе альпы, пересѣченные нашими путешественниками по долинѣ Китойкина.

Восхожденіе на упомянутый выше Ниланъ-сарамскій гольцъ (6253') совершенно Черскимъ и Гартунгомъ при обстоятельствахъ, неблагопріятствовавшихъ ни подробному его изслѣдованію, ни достаточному осмотру съ негнѣбности.

На восточной сторонѣ гольца оказалась уже масса ос

лаковъ, закрывавшихъ какъ отдаленныя, такъ и ближайшія части горъ, а въ скоромъ времени облака и тучи покрыли постепенно верха Ниланъ-сарамскую котловину, а наконецъ и весь горный хребтъ, вслѣдствіе чего путешественники были окружены густымъ туманомъ, препятствовавшимъ нисхожденію. Прекрасная была картина, когда сквозь промежутки между сплотившимися облаками можно было видѣть еще по временамъ ледяной покровъ дна котловины съ пасущимися въ ней лошадьми и съ бѣлѣющею палаткою, около которой взвизывался стѣбъ дыма; но зрѣлище это окончилось продолжительнымъ дождемъ, сопровождавшимъ путешественниковъ до самой палатки, а на слѣдующій день (20-го іюня) какъ гольцы, такъ и вся котловина покрылась довольно толстымъ (1 вершокъ) покровомъ снѣга, пролежавшаго впрочемъ лишь нѣсколько часовъ. Въ болотистой центральной части котловины находится нѣсколько маленькихъ озерковъ, около которыхъ произрастала въ изобиліи карликовая береза (*Betula nana*). Какъ довольно рѣдкую акустическую особенность Ниланъ-сарамской котловины Черскій указываетъ на то, что эхо отъ звука удара или громкаго крика раздается въ ней въ продолженіи не болѣе тридцати секундъ.

Тункинскіе промышленники посѣщаютъ Ниланъ-сарамъ, но не часто; рога изюбра (олень близкій къ благородному), кости медвѣдя и росомахи найдены были около одного изъ шалашей; кромѣ того здѣсь водятся еще: соболи, лисы, кабарга и сѣверный олень, привлекающіе вниманіе охотниковъ.

Изъ Ниланъ-сарамы путешественники направились вверхъ Китойкину въ упомянутый выше сосѣдній западный саянскій хребтъ, гдѣ рѣчка эта беретъ начало двумя верховьями: правымъ съ юга, изъ видимой отсюда альпійской цѣпи, и лѣвымъ съ запада, изъ части котловины, покрытой въ то время туманомъ. Подвигаясь на сѣверо-западъ, можно было видѣть, что выше сліянія обоихъ верховьевъ находятся небольшія

озера; незначительная возвышенность, ограничивающая эту котловину съ сѣвера, отдѣляетъ ее отъ склона къ системъ верховьевъ р. Малой Бѣлой, одинъ изъ ключей которыхъ достигнуть былъ въ разстояніи около пяти верстъ отъ Ниланъ-сарамы, на высотѣ 4958'.

г) Отъ верховьевъ р. Малой Бѣлой до р. Оспы (Охоты

Ручеекъ, на который спустились путешественники, и превосходить 2 — 3' въ ширину и направляется къ сѣверу послѣ чего, спустя около 2 верстъ, онъ соединяется съ другимъ, притекающимъ съ востока. Обѣ сливающіяся вѣтви образуютъ рѣчку въ сажень шириную, извѣстную подъ названіемъ Малаго Булуна и образующую правое верховье р. Малой Бѣлой. Протекая въ долину, густо поросшую хвойнымъ, почти дѣвственнымъ лѣсомъ и постепенно расширяясь, М. Булунъ, на протяженіи около 10 верстъ, протекаетъ дугообразно на с.-с.-з. и с.-в., послѣ чего опять иворачивается на с.-с.-з. и въ разстояніи около 13 или 14 верстъ отъ верховьевъ соединяется съ лѣвымъ или Большимъ Булуномъ, протекающимъ въ общемъ съ юго-запада и образующимъ лѣвое верховье Малой Бѣлой, которая въ части, ближайшей отъ слиянія Булуновъ, направляется на з.-с.-з., но ниже, судя по извѣстному ея устью, должна придерживаться болѣе или менѣе меридіональнаго (до слиянія съ Оспою или Онотою), а затѣмъ и сѣверо-восточнаго направленія (до устья въ Большую Бѣлую, см. ниже). Въ утесахъ по Малому Булуну Черскій встрѣчалъ гнейзъ и діоритовые сланцы; простираніе пластовъ измѣняется отъ с. до с.-с.-з., а паденіе отъ в. до в.-с.-в., съ наклономъ 35°; слоистость мѣстами извилистая.

На высотѣ 4950', именно отъ мѣста слиянія обоихъ Булуновъ, путешественники повернули вверхъ по теченію и

но изъ нихъ, т. е. Большаго Булуна, направляясь къ западу и настолько же поднимаясь на склонъ цѣпи горъ, восточной или между Китойкиномъ и верховьями Малаго Булуна. Долина рѣчки столь же лѣсистая, какъ только что упомянутая, окружена горами съ округленными и поросшими кустами вершинами; дно долины, какъ равно и русло быстрого Большаго Булуна, обнаруживаетъ наносъ съ глыбами и валунами кристаллическихъ и полевошпатовыхъ породъ, обнажившихся мѣстами и въ утесахъ, съ простираниемъ пластовъ с.-с.-в. и отвѣснымъ наденіемъ; такой наносъ въ разрывѣ высоты около 10 сажень надъ уровнемъ рѣки, видѣлся на противоположномъ правомъ берегу, тогда какъ тропой въ разстояніи около 11 верстъ выше сліянія обоихъ верховьевъ р. М. Бѣлой, покинула долину Б. Булуна, поднимаясь на отрогъ, отдѣляющій ее отъ р. Богдашки, праваго притока Бѣлой (см. ниже), и пересѣкая его въ сѣверо-западномъ направленіи. Отрогъ этотъ лѣсистый вообще плоскій, обнаруживаетъ въ своемъ составѣ только чуждыя глыбы и валуны, а не коренную породу; ширина до вступленія въ первый ручей системы Богдашки, достигаетъ около 11 верстъ.

Поднявшись на отрогъ, путешественники увидѣли на югѣ рядъ красивыхъ альпійскихъ вершинъ, тянувшихся на с.-з.; на поверхности отрога располагается нѣсколько оверъ, изъ которыхъ первое (около 100 саж. въ діаметрѣ) даетъ начало одному изъ лѣвыхъ притоковъ Б. Булуна; затѣмъ идетъ подъемъ на высшую часть перевала, достигающую 5228' абс. высоты, а съ нея спускъ къ первому верховью рѣки Богдашки (иначе Ехѣ-Богдашка 5228' н. ок.), представляющему ручеекъ около аршина ширины, направляющійся на з.-с.-з. На протяженіи слѣдующихъ двухъ верстъ пересѣкла еще два верховья этой рѣчки, въ долинѣ которой видѣлось еще озеро, послѣ чего Богдашка, расширившись уже до 5 футовъ, направляется вообще на з.-с.-з.,

сопровождаясь съ лѣвой стороны упомянутою выше альпскою цѣпью, причѣмъ вдали, на сѣверо-западѣ, видѣются гольцы вполне столовиднаго типа. Если не обращать вниманія на небольшой дугообразный изгибъ долины къ югу, указаннымъ выше направленіемъ долина правой Богдаши отличается на протяженіи 17 верстъ, гдѣ, на высотѣ 437 съ нею соединяется Лѣвая Богдашка (иначе Хара-Бдашка), берущая начало въ гольцахъ на ю.-ю.-в. отъ слиянія, послѣ чего Богдашка достигаетъ уже 4—6 саженьей глубины и на протяженіи 21 версты, до устья въ Оспу, обзываетъ нѣсколько болѣе значительныхъ и крутыхъ изгибовъ особенно на 11-й верстѣ, считая отъ слиянія, тропка пересѣкаетъ отрогъ, вокругъ котораго изгибается рѣка. По мѣрѣ отклоненія къ сѣверо-западу и удаленія отъ главной цѣпи горъ, вершины гольцовъ дѣлаются болѣе тупыми и округленными, соединяющіе ихъ гребни болѣе длинными съ менѣе глубокими сѣдловинами; далѣе вершины принимаютъ совершенно округленное очертаніе, понижаются по мѣрѣ приближенія къ Оспѣ и поростають лѣсомъ. Въ составъ геологическій породы входятъ какъ гнейсовидныхъ, такъ и гранитовидныхъ, въ нижнемъ теченіи Богдашки появляются и кристаллическій известнякъ, перемежающійся съ названными породами, причѣмъ простираніе пластовъ, ниже слиянія Богдашекъ, опять принимаетъ направленіе, господствовавшее какъ въ Саянѣ, такъ и въ Тункинскихъ альпахъ именно з.-с.-з. съ паденіемъ на ю.-ю.-з. Дно долины выложено наносомъ съ валунами, между которыми замѣчательными мѣстами и большія глыбы, загромаждающія также и рѣчки. Въ разстояніи около 2 верстъ ниже устья лѣвой Богдашки представлялся весьма удобный случай для болѣе подробнаго изученія этого интереснаго наноса: это былъ шушунскій золотойскатель, проникшій въ дно долины до глубины 10 саженьей, шурфъ, въ производствѣ котораго участвовалъ одинъ изъ проводниковъ Черскаго, рассказавшій о немъ

которые подробности. До глубины 23 футовъ работали все местаномъ наносъ съ глыбами, валунами и галькою, остальной же часть глубины шурфа проложена въ сѣрой, съ синеватымъ отбѣнкомъ глины, сильно вскипающей отъ кислоты и держащей какъ валуны и гальку, такъ и болѣе или менѣе сухую дресву; въ ней найдены и слѣды золота, но шурфъ брошенъ по причинѣ сильнаго притока воды и коренная плочва не достигнута. Къ сожалѣнію шурфъ этотъ найденъ въ такомъ уже въ осипавшемъ видѣ, и потому знакомство съ пластами пробитаго имъ наноса возможно было лишь по материалу, выброшенному изъ выработки и подвергавшемуся дѣйствию атмосферныхъ агентовъ въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ, что разумѣется крайне недостаточно. Шлифованныхъ и обточенныхъ валуновъ около шурфа, какъ и вообще въ окрестностяхъ, не найдено.

На высотѣ 3102' путешественники достигли устья р. Богдашки въ р. Оспу, видъ на лѣвый берегъ которой открылся еще съ низовьевъ названной рѣчки: отсюда можно было видѣть низкія и поросшія лѣсомъ вершины горъ лѣваго берега Оспы, отдѣляющихъ отъ нея низовья долины рч. Угунъ-гола (лѣв. притока), впадающей нѣсколько ниже Богдашки; только на лѣвомъ берегу Угунъ-гола возвышалась болѣе высокая гора, въ сѣверной части столовидная, а въ южной съ округленнымъ высшимъ пунктомъ.

Такимъ образомъ, насколько можно вѣрить барометрическимъ даннымъ, паденіе или наклонъ русла р. Богдашки, начиная съ верховьевъ (5228') до устьевъ въ Оспу (3102'), т. е. на протяженіи почти 40 верстъ длины, равняется нѣсколько болѣе 53' на каждую версту. Что же касается альпійской цѣпи, сопровождавшей лѣвый берегъ верхняго течения Богдашки, то она кажется самостоятельной и лежащею выше цѣпи Китайскихъ альповъ, отошедшей уже къ югу отъ Ниланъ-сарамы, — вопросъ, съ которымъ мы будемъ въ слѣдующемъ случаѣ ознакомиться ниже.

д) Путь вверхъ по р. Оспѣ до лѣтнаго улуса Сойотовъ

Рѣка Оспа, называемая въ своей нижней полови-  
Ондотомъ, придерживается въ общемъ меридіональнаго на-  
правленія, протекая приблизительно верстахъ въ тридцать  
западнѣе отъ меридіана Ниланъ-сарама; что же касается  
верховьевъ, то они лежатъ гораздо южнѣе источниковъ Кыт-  
кина, приблизительно на широтѣ знакомаго намъ уже Норин-  
Хоройскаго караула на Иркутѣ (см. выше), питаемая снѣга-  
ми и ключами одного изъ высшихъ пунктовъ Китайскихъ а-  
ловъ, именно Мунку-саганъ-хардыка, верстахъ въ 70 отъ  
устья рч. Богдашки,—разстояніе, за точность котораго не-  
лучается, такъ какъ правильной съемки по р. Оспѣ не  
имѣется, а приблизительное измѣреніе длины этой части  
длины, производившееся Черскимъ и Гартунгомъ, затрудни-  
лось въ высшей степени неудобнымъ путемъ по этой стра-  
ной и негостепріимной мѣстности и доведено только до та-  
называемаго Страшнаго брода (около 48 — 50 вер-  
выше Богдашки), гдѣ часы обоихъ путешественниковъ  
испортились.

Оспа въ томъ мѣстѣ, гдѣ путешественники встрѣтили  
(3102' н. ок.), покинувъ Богдашку, достигла около 25 са-  
ширины, отличаясь быстрымъ теченіемъ, значительною го-  
биною (болѣе 3 футовъ) и каменистымъ дномъ. Довольно  
опасный бродъ, во время котораго лошади едва могли усто-  
на ногахъ, увлекаясь быстротою рѣки и запинаясь по камнямъ  
выстилающимъ ее дно, ведетъ на лѣвый берегъ Оспы, а  
ниже брода осмотрѣвъ утесъ, состоящій изъ зеленого гней-  
виднаго сланца, содержащаго прослойки краснаго поле-  
шпата и перемежающагося съ кристаллическимъ известнякомъ  
простираніе пластовъ близкое къ с.-в. паденіе отъ 60° —  
на ю.-в. Отсюда путешественники направились къ ю

верхъ по долигѣ Ослѣ, непокидая ея до самыхъ верховьевъ.

Около 10 верстъ выше, на протяженіи которыхъ Ослѣ дѣлаетъ изгибъ къ востоку, поднимая правый склонъ горъ, красная смѣшаннымъ лѣсомъ долина ея преграждается съ лѣвой стороны отрогомъ горъ, вслѣдствіе чего тропа переходитъ на правый берегъ рѣки, черезъ второй еще болѣе опасный бродъ. Рѣка усѣяна здѣсь большими валунами, изъ которыхъ одинъ высоко выдается надъ уровнемъ неизмѣнно быстрой воды; одна изъ оступившихся во время брода лошадей и потому уже падавшая вмѣстѣ съ своимъ ѣздокомъ къ теченію была прижата къ этому камню, — обстоятельство, имевшее ей оправиться и встать на ноги; иначе гибель и лошади, такъ и вѣдывшагося въ ней путешественника была бы почти неизбежною. Съ противоположнаго берега можно видѣть, что въ отрогѣ, стѣснившемъ долину, обнажается тотъ-же бѣлая порода, по всей вѣроятности известнякъ, съ такимъ наклономъ пластовъ вообще къ югу. Спусти 2 версты, такіа же особенности береговыхъ горъ долины объясняютъ необходимость перейти опять на лѣвый берегъ (третій бродъ), углубившейся здѣсь до того, что всаднику вода хватала до колѣнъ, и значительная часть проѣзда оказалась подмоченною, чему способствовали въ свою очередь почти ежедневные дожди, сопровождавшіе путешественниковъ, начиная съ Ниланъ-сарама.

Туманъ и облака, закрывавшіе горизонтъ, разсѣялись и видъ за болѣе низкими горами съ округленными и пологими хвойнымъ лѣсомъ вершинами, вверхъ по рѣкѣ, въ теченіи нѣсколькихъ верстъ, показалась группа весьма оригинальныхъ гольцовъ съ столовидными и крышевидными вершинами, выходящими за предѣлы произростанія древесной растительности и покрытыми мѣстами снѣгомъ (26-го іюня); въ видѣхъ видѣлась низкая, холмовидная и порослая лѣсомъ возвышенность, называемая Уйзенъ-толгой (толгой — голова, вершина), отъ имени впадающаго около нея праваго притока



Оспы—Уйзена. Въ ближайшихъ низкихъ горахъ обнажается кристаллическій известнякъ съ блестками графита, перемежаясь со слюдянымъ сланцемъ и гнейсомъ; простирание пластовъ з.-с.  $30—40^{\circ}$ , съ соответственнымъ падениемъ на ю.-з. до  $50^{\circ}$ . Трудный переходъ по крупнымъ каменнымъ глыбамъ какъ обнаженнымъ, такъ и поросшимъ толстымъ слоемъ мха маскирующимъ щели между валунами, а также по густому лѣсу, въ которомъ дорогу необходимо было прокладывать топоромъ, привелъ путешественниковъ къ устью рч. Уйзена: воды которой, до 5 саж. ширины, мчатся по весьма крупнымъ валунамъ, весьма затрудняющимъ бродъ черезъ этотъ притокъ во время его половодія. Будущимъ изслѣдователямъ необходимо будетъ обратить вниманіе на то обстоятельство, что выше устья Уйзена наносъ съ крупными валунами исчезаетъ на значительномъ пространствѣ. Съ версту выше и безопасный бродъ ведетъ на правый берегъ Оспы, гдѣ: обнаженіи появляется гнейсъ съ простираниемъ з.-в. и падениемъ на ю.-з. до  $60^{\circ}$ . Отсюда долина, ширина которой достигаетъ около версты, окаймлена отвѣсными или почти отвѣсными террасовидными утесами, въ составѣ которыхъ кроме гнейсовидныхъ полевошпатовыхъ породъ участвуютъ еще зеленокаменные.

На протяженіи слѣдующихъ 7 верстъ тропа 2 р. переходитъ черезъ Оспу, сначала на лѣвый, а потомъ на правый ея берегъ (пятый и шестой бродъ), на высотѣ 34' надъ океаномъ, причемъ упомянутые выше террасовидные утесы значительно приближаются къ руслу и дѣлаютъ очевидно, что Оспа глубоко врѣзалась здѣсь въ прежнее долины, оставивъ его вмѣстѣ съ прежнимъ своимъ наносомъ на высотѣ около 70' надъ современнымъ уровнемъ по барометрическому измѣренію. Въ утесахъ наблюдается перемѣжность пластовъ кристаллическаго известняка съ блестками графита съ гнейсами и другими полевошпатовыми породами; простирание пластовъ з.-с.  $40—50^{\circ}$  съ соответственнымъ

пенемъ на ю.-з. и наклономъ до  $35^{\circ}$ . Древній наносъ Оспы состоитъ изъ галекъ и большихъ валуновъ, покрывающихъ поверхность прежняго дна рѣки, поросшаго нынѣ дремучимъ лесомъ, тогда какъ современная рѣка является все глубже и глубже врѣзавшеюся въ коренную породу долины и верстахъ в 6-ти далѣе протекаетъ уже по настоящему ущелью, суженному до 10—12 сажень и заваленному большими (до 11' в диаметръ) глыбами кристаллическихъ породъ (гранитъ, гнейсъ, гнейштейнъ и конгломератъ), по которымъ и между которыми рѣка мчится съ неимоверною быстротою и шумомъ, заглушавшимъ даже громъ разразившейся здѣсь грозы. Въ этомъ ущелье, нѣсколько расширившееся тамъ, гдѣ Оспа имѣетъ поворотъ съ сѣвера на западъ, необходимо было приступить путешественникамъ для того, чтобы перебродить лѣвый берегъ рѣки, такъ какъ два правыхъ притока Оспы впадались до того глубоко въ соответственную террасу и настолько близко другъ отъ друга, что образовали непроходимыя ямы, разобщенныя скалистыми и острыми гребнями; къ тому же правая терраса за этими притоками скоро уничтожилась. Вдали виднѣлись одинъ округленный, какъ бы куполообразный галецъ, а западнѣе его зубчатый, съ нѣсколькими строконечными вершинками. Уровень Оспы, къ которой путешественники спустились по очень крутой тропинкѣ, оказался въ 3612' и на 126' ниже поверхности террасы. Въ ущелье обнажался гнейсъ съ крайне измѣнчивымъ простираніемъ, образивъ которое въ планѣ, получилась бы ломанная линія. Она оказалась здѣсь настолько глубокою, что перебродить её было невозможно, и потому, простоявъ три дня въ тщетномъ ожиданіи уменьшенія воды, путешественники рѣшились сдѣлать небольшой плотикъ съ привязанными къ нему веревками, изъ которыхъ одинъ конецъ перевезли на другую сторону рѣки, чтобы воспрепятствовать сносу плотика теченіемъ. Такимъ образомъ перевозились поочередно и вещи такъ и люди. Склонъ лѣваго берега этого рас-

ширения ущелья хотя и крутой, но поросший древесною растительностью и въ западной части прорѣзанъ весьма узкимъ (до 2—3 сажень) и глубокимъ (нѣсколько десятковъ футовъ) ущельемъ, по которому протекаетъ незначительный лѣвый притокъ Осы, называемый Хужиртэй-голь. Ущелье это замѣчательно въ томъ отношеніи, что представляетъ собою единственное въ этой горной странѣ мѣсто нахожденія обломочныхъ породъ, именно песчаника и конгломерата, возрастъ которыхъ остается до сихъ поръ загадочнымъ, такъ какъ, не взирая на множество обугленныхъ въ нихъ растительныхъ остатковъ, остатки эти сохранены слишкомъ грубыми чтобы допустить опредѣленіе рода и вида. Песчаникъ сѣраго буровато-сѣраго цвѣта, богатый слюдою, переходитъ здѣсь въ конгломератъ съ большими гальками и валунами различныхъ кристаллическихъ породъ и вслѣдствіе того, что въ нѣкоторыхъ частяхъ своихъ онъ состоитъ изъ угловатыхъ зеренъ полевого шпата и кварца, онъ дѣлается почти неотличимымъ отъ гнейса. Такою же кристаллическою наружностью отличается и цементъ нѣкоторыхъ частей конгломерата; не зависить ли это отъ метаморфизма или-же отъ того, что въ составъ этихъ частей вошли необточенные продукты раздробленія прилежащихъ кристаллическихъ породъ, остается неразрѣшеннымъ, такъ какъ коллекція, собранная здѣсь Черскимъ, погибла отъ Иркутскаго пожара прежде ея болѣе подробнаго изученія. Въ галькѣ этой рѣчки найденъ былъ между прочимъ кусокъ чернаго глинистаго сланца съ остаткомъ листа.

Простираніе пластовъ этихъ обломочныхъ породъ изменяется отъ в. до в.-с.  $20^{\circ}$  и в.-ю.  $20^{\circ}$  съ соответственнымъ паденіемъ на сѣверъ и наклономъ отъ  $35^{\circ}$  до  $45^{\circ}$ . Хотя мѣсто соприкосновенія ихъ съ древнѣйшими кристаллическими породами необнажено, но, судя по гипсометрическому уровню залеганія тѣхъ и другихъ, слѣдуетъ полагать, что песчаникъ съ конгломератомъ отложились въ углубленіи, существовавшемъ

немъ уже среди приподнятыхъ гнейсовъ, развитыхъ какъ ниже, такъ и сейчасъ-же выше по теченію Оспы, такъ равно и на ея правомъ бѣрегу, не взирая на то, что конгломератъ спускается здѣсь до самаго уровня рѣки.

Выше расширенія, въ которомъ удалось переправиться черезъ Оспу, ущелье опять сѣзилось, и потому нужно было подняться на высшія части склона лѣваго берега долины, не взирая на необычайную его крутизну. Вьюки необходимо было перенести на себѣ, а лошадей вводили на гору по одной и то съ величайшимъ трудомъ; при этомъ одна лошадь свалилась книзу, едва не стащивъ за собою ведшаго её путешественника, и до того изувѣчилась, что впослѣдствіи могла продолжать путь лишь съ трудомъ и то безъ всякой ноши. Подемъ этотъ, хотя высота его не превышала 130', стоилъ путешественникамъ половину дня времени, затрудняясь еще непрерывнымъ дождемъ, портившимъ оставшуюся у нихъ провіанта, относительно количества котораго возникали серьезныя опасенія. Бурятскія сумы и мѣшки для вьюковъ, сшитые изъ плохо выдѣланныхъ кожъ, начали издавать невыносимый запахъ гніенія, причемъ въ нѣкоторыхъ изъ нихъ находилось громадное количество червей (личинки мухъ).

Третьяго іюля путешественники, поднявшись на еще выше высокую часть склона горъ (4134' н. ок.) и обогнувъ такимъ образомъ крутой наклонъ къ отвѣснымъ утесамъ ущелья, опять вышли на террасу лѣваго берега долины, направляясь вверхъ по ней къ югу, мимо небольшого озера и поперекъ незначительнаго лѣваго притока, низвергающагося въ Оспу, должно быть, водопадомъ, такъ какъ она протекаетъ по непрерывному ущелью; въ долинѣ этого ручейка лежалъ толстый слой льда, распавшагося мѣстами на иглы, мѣстами-же еще очень плотнаго. Въ обнаженіяхъ какъ около главной рѣки, такъ и на этомъ ручейкѣ наблюдался сходъ съ простираніемъ сначала на с.-с.-в. и паденіемъ на с.-з., затѣмъ на з.-в. съ паденіемъ наюгъ до 70°. Съ одного

изъ береговыхъ утесовъ ущелья, по направленію къ югу, т. вверхъ по Оспѣ, виднѣлись отдаленные альпійскіе пики, узывая какъ бы на находящееся тамъ расширеніе долины поворотъ ея къ западу. Но впереди была еще самая опасная переправа черезъ Оспу (восьмая отъ Богдашки), такъ называемый *Страшный бродъ*, къ которому передъ вечеромъ приблизились путешественники, проѣхавъ въ этотъ день не болѣе 10 верстъ. Терраса, по которой они слѣдовали (3801' н. ок.) обрывалась передъ ними отвѣснымъ утесомъ къ небольшому расширенію ущелья, приблизившагося здѣсь почти непосредственно къ склону береговыхъ горъ долины, преградивши такимъ образомъ путь къ его обходу. Расширеніе это имѣло видъ до нѣкоторой степени ящика, вытянутаго вообще по меридіональному направленію и окруженнаго скалами; въ юго-восточный его уголъ врывалась грозная Оспа, образуя поворотъ на сѣверъ и непосредственно подмывая восточный т. е. правый берегъ скалистаго ящика, который она покидаетъ, проходя черезъ весьма оригинальную щель въ сѣверно-восточномъ углу. Щель эта, расширяющаяся какъ вверхъ такъ и книзу до нѣсколькихъ сажень, настолько суживается надъ самою поверхностью мчащейся по ней рѣки, что, при взглядѣ сбоку, кажется, какъ будто Оспа протекаетъ здѣсь подъ скалистымъ мостомъ, причемъ выступъ скалы суживающій просвѣтъ ущелья съ лѣвой стороны, довольно живо напоминаетъ собою голову льва. Между тѣмъ полосу въ нѣсколько сажень ширины на лѣвомъ берегу расширяшагося ущелья покрыта галькою и громадными округленными валунами, между которыми исчезали лошади, вводимые въ расширеніе по очень крутой тропинкѣ. Оспа, на уровнѣ которой барометръ показалъ 3660', мчится съ страшнымъ шумомъ по руслу, устланному большими глыбами, образуя въ юго-западномъ углу расширенія весьма глубокое, бухтovidное затишье подъ прикрытіемъ утеса, вдающагося въ рѣку съ лѣвой стороны, тогда какъ ближе къ серединѣ и правому

берегу, гдѣ глубина уменьшается, быстрота теченія увеличивается, а въ сѣверной части расширенія исключаетъ даже какую мысль о возможности переправы, предпринимать которую необходимо было лишь съ упомянутого выше затишья, направляясь затѣмъ нѣсколько вверхъ по теченію, къ мѣсту, гдѣ прерываются утесы праваго берега ущелья. Въ утесахъ обнаружены не вездѣ ясно-слоистыя полевошпатовыя породы (гнейсы), вообще съ измѣнчивымъ простираніемъ пластовъ съ с.-с.-з. съ паденіемъ на в.-с.-в.  $35^{\circ}$ — $55^{\circ}$  до з.-в. съ паденіемъ на югъ  $78^{\circ}$  и с.-с.-в. съ паденіемъ з.-с.-з. до  $90^{\circ}$ , причемъ замѣчается и изогнутость слоевъ. Въ валунахъ, достигающихъ мѣстами 14 футовъ въ діаметрѣ, попадаетъ кромѣ того гранитъ, порфириовидный отъ крупныхъ кристалловъ мѣзого шпата (до 30 миллиметровъ), центральная часть которыхъ отличается мясо-краснымъ цвѣтомъ, а периферическая (плагіоклазовая?) бѣлымъ.

Хотя послѣ трехдневнаго выжиданія уровень воды въ мѣстѣ понизился на слишкомъ 4 фута, первые три попытки сделать къ довольно печальнымъ результатамъ: сначала въ изворотѣ казавшагося затишья едва не погибли двѣ лошади, застрявъ съ проводникомъ, вполнѣ скрывшимся уже подъ поверхностью воды, затѣмъ тотъ же проводникъ съ плотникомъ увлеченъ былъ быстротою теченія, но спасся взобравшись на одинъ изъ крупнѣйшихъ валуновъ среди страшнѣйшей быстрины, откуда попасть обратно на берегъ стоило много трудовъ, причемъ опытъ передачи веревки черезъ посредство тупенной въ бродѣ лошади окончился тѣмъ, что лошадь застряла въ ней около противоположнаго берега; довелось отрезать веревку и тѣмъ потерять надежду на переправу. На слѣдующій день Черскій съ однимъ изъ проводниковъ пошелъ на склонъ горъ лѣваго берега долины и направился вверхъ, параллельно долинѣ, чтобы достигнуть ея расширенія выше ущелья и, розыскавъ тамъ удобный бродъ для конныхъ, перейти на правый берегъ Оспы, освободить

запутавшуюся лошадь и сдѣлать опытъ передачи одного конца веревки товарищамъ оставшимся на мѣстѣ стоянки такимъ образомъ переплавить какъ ихъ, такъ и грузъ и маленькомъ плотикѣ. На этомъ пути, недоступномъ для лошадей и отличающемся крайнею дикостью окружающей ея природы, они пересѣкли три небольшихъ притока Оспы, изъ которыхъ первый и третій протекаютъ въ глубокихъ и узкихъ ущельяхъ, причемъ послѣдній низвергается въ одномъ мѣстѣ водопадомъ до нѣсколькихъ сажень высоты, обнажая гнейсовидную полевошпатовую породу, тогда какъ въ выносимыми галькахъ наблюдался и конгломератъ такой-же какъ и Хужиртѣй-голѣ. Перейти одно изъ этихъ ущелій было весьма не легко и только благодаря сложенному прѣвѣзжающими сю, сойотами маяку изъ камней, удалось найти мѣсто возможнаго хотя и несовсѣмъ удобнаго спуска, а затѣмъ и подъѣма противуположный берегъ ручья.

Внизу между тѣмъ, въ сторонѣ Оспы совершенно исчезнувшей въ своемъ ущельѣ, закрываемомъ къ тому же густымъ хвойнымъ лѣсомъ, поростающимъ склонъ горъ, по которому слѣдовали путешественники, слышенъ былъ необычайный шумъ, указывающій на существованіе тамъ значительнаго водопада, отстоящаго всего лишь въ 2 — 3 верстахъ отъ Страшнаго брода. Съ версту выше путешественники спустились въ расширившуюся уже долину, въ которой Оспа протекла настолько тихо и въ столь удободоступномъ и въ глубокомъ руслѣ (до 6 саж. ширины и около 2 фут. глубины) что на высотѣ 3849', т. е. на 190' выше уровня рѣки около Страшнаго брода, имъ удалось перебродить на правый берегъ и, слѣдуя внизъ по теченію, достигнуть мѣста гдѣ стояла запутанная въ веревкѣ лошадь насупротивъ стоянки оставленныхъ товарищей. На этомъ пути Оспинскій водопадъ могъ быть подвергнутъ ближайшему осмотру, причемъ оказалось, что рѣка, сѣзвившись до 3 сажень и съ высоты по видимому до 10 сажень низвергается въ узкую и гл

бую щель, которую именно и начинается ущелье, затрудняющее путь по этой долине. Оглушительный грохот и шум низвергающейся струи сопровождается еще весьма оригинальным сотрясением воздуха, ощущаемым стоящими близко зрителями, но вследствие небольшой ширины щели и недоступности дна ущелья, вблизи водопада замѣчается лишь непроницаемый слой клубящегося пара, выполняющего щель и мешающего видѣть что-либо и только съ нѣкотораго отдаленія, подвинувшись на сѣверъ отъ водопада и съ самаго края щели, можно наслаждаться величественнымъ зрѣлищемъ, причемъ невольно рождается сожалѣніе о томъ, что издальчѣ этимъ нельзя любоваться съ уровня рѣки: недоступное ущелье Оспы продолжается въ такомъ видѣ до самаго Страшнаго брода, измѣнивъ меридіональное вначатіи направленіе на сѣверо-западное.

Освободивъ запутавшуюся въ веревкѣ и ночевавшую такимъ образомъ лошадь, путешественникамъ удалось послѣ долгихъ усилий передать конецъ веревки товарищамъ, послѣ чего переправа на правый берегъ стоила уже лишь незначительнаго труда, и на слѣдующій день (8-го іюля) путешественники продолжали путь къ верховьямъ р. Оспы. Бродъ на лѣвый берегъ рѣки совершить въ знакомомъ уже намъ мѣстѣ выше водопада и тропа повела по долине, поросшей мѣстами довольно рѣдкимъ смѣшаннымъ и отчасти сухимъ лѣсомъ, среди котораго въ подѣ растительнаго слоя нерѣдко выдавались большіе валуны гранита и другихъ кристаллическихъ полевошпатовыхъ породъ, обличая продолженіе того же наноса, среди котораго впрочемъ не замѣчались уже гальки конгломерата.

За первымъ лѣвымъ притокомъ (Верхній Хужиртѣй-голъ 4280' н. ок.) валуны стали учащаться; горы, окружающія долину Оспы, почти не выходятъ за предѣлы распространенія древесной растительности, замѣтной даже на высшихъ частяхъ довольно оригинальной, притупленно-сосцевидной вершины, возвышающейся на правомъ берегу долины



второго лѣваго притока, Хъримъ-гола, въ руслѣ котораго какъ глыбы, такъ валуны и дресва состоятъ изъ гранита. Замѣтно подымаясь и проходя иногда мимо гранитныхъ глыбъ необыкновенно большаго размѣра, тропа приближается къ Оспѣ; здѣсь ея русло, до 4 саж. ширины, положено въ гранитѣ, выступы котораго, образующіе каменное дно, такъ и берега рѣки, являются весьма хорошо изглаженными, хотя и не носятъ слѣдовъ изборозженія; мѣстами около русла рѣки, попадаются остатки нерастаявшаго ея льда до 2 футовъ толщины. За слѣдующимъ притокомъ около тропы, располагается группа гигантскихъ гранитовыхъ глыбъ, изъ которыхъ одна достигаетъ 79 шаговъ въ окружности и называется Каменнымъ-балаганомъ — Шлунъ-хонолхъ, такъ какъ подъ нависшимъ ея краемъ ночуютъ иногда сойоты, спасаясь также и отъ дождей.

Вскорѣ за этими глыбами исчезаетъ гранитъ, а почва вмѣстѣ съ нимъ, на высотѣ 4864' надъ океаномъ, и бѣлая береза; бродъ черезъ Каменистую рѣчку обнаруживаетъ въ ней глыбы и гальку слюдянаго сланца и грюштейна; долина Оспы вытягивается въ направленіи съ з. в.; впереди виднѣются живописные альпійскіе пики, а правомъ берегу рѣки можно видѣть поросшее мхомъ и частью лѣсомъ, но какъ бы изглаженное, волнообразно-холмистое основаніе гольцовъ, надъ которымъ возвышается весьма правильно-куполовидная гора съ вершиною, поросшею мхомъ и недостигающею высшаго гребня гольцовъ, къ которымъ и поле этотъ примыкаетъ. Ближайшее изслѣдованіе какъ по ножию, такъ и куполовидной горы этой, быть можетъ, обнаружитъ въ нихъ со временемъ слѣды ледниковаго дѣйствія, которому слѣдуетъ приписать по всей вѣроятности и низменное описанное явленіе. И дѣйствительно, за слѣдующимъ лѣвымъ притокомъ, почти на серединѣ значительно расширившейся долины, принимающей здѣсь отчасти уже луговой характеръ, располагается довольно высокій, уединенный и к

изообразный холмъ (108' надъ уровнемъ рѣки), состоящій изъ мѣлководья, со многими, отпавшими отъ него глыбами; покрытая мхомъ поверхность его оглажена, но слѣдовъ бороздъ и царапинъ не видно; на поверхности этой лежатъ некоторые обточенные валуны той же породы, а одинъ валунъ состоялъ изъ гнейса. Поверхность Оспы около этого холма лежитъ уже на высотѣ 5488'; на ея правомъ берегу выступаютъ головы сланца (филлитъ?) съ простираниемъ по ширинѣ на ю.-в.  $15^{\circ}$  и падениемъ на в.-ю.  $15^{\circ}$  или же съ вѣрнымъ положениемъ пластовъ; въ плохо обнаженномъ наклонѣ отложеніи замѣчается суглинокъ съ осколками сланца и кусочками другихъ породъ. Мохъ и ужасная грязь, сопровождавшая путешественниковъ на протяженіи нѣсколькихъ верстъ, исчезли, вѣрнѣе отступили къ подножіямъ гольцовъ, окружающихъ долину, смѣнившись прекрасною луговою землей, на которой чернѣлись маленькія деревянныя юрты, — типичнѣйшій сойотскій улусъ, располагающійся на высотѣ 5419' н. ок. Онъ состоитъ изъ трехъ юртъ, построенныхъ по типу бурятскихъ, но весьма миниатюрныхъ, къ тому же четырехугольныхъ, а не шестигранныхъ, какъ у бурятъ; замѣчались здѣсь еще слѣды четвертой сгорѣвшей юрты; около юртъ устроены загородки для помѣщенія оленей. Зимнія жилища эти, какъ и слѣдовало ожидать, оказались совершенно пустыми, такъ какъ на лѣто здѣшніе сойоты перекочевывали къ самымъ верховьямъ р. Оспы; къ тому же въ 2—3 верстахъ выше этого зимника они построили другой, зимникъ, и потому опустѣвшія старыя юрты предназначены не на топливо. Долина, расширившаяся здѣсь до 2 верстъ, окружена весьма красивыми альпійскими пиками съ лежащими на нихъ немалыми полянами снѣга; въ особенности изукрашенными и живописными являются вершины гольцовъ южной стороны, образующихъ лѣвый склонъ долины рч. Урдугалъ, праваго притока Оспы, впадающаго насупротивъ старыя зимниковъ. Слоистый ледъ, мощностью до  $1\frac{1}{2}$  саже-

ни, заполняет собою русло этой рѣчки въ предѣлахъ по-  
ножія гольцовъ, поросшаго рѣдкимъ листовнымъ лѣсомъ  
оленимъ мхомъ; глыбы змѣвика лежатъ около русла, ме-  
стами съ прожилками хризотила, а выше на рѣчкѣ обна-  
жается слюдяный и тальковый сланцы съ простираниемъ на з.-с.  
 $30^{\circ}$  и падениемъ ю.-з.  $30^{\circ}$ , отъ  $85^{\circ}$  доотвѣснаго; отсюда ви-  
дно, что рѣчка низвергается выше каскадами. Въ галькахъ  
попадаетъ кромѣ того черный известнякъ съ сѣрыми поло-  
ками и кристаллами колчедана. Между тѣмъ экскурсія и  
подножію сѣверныхъ гольцовъ убѣдила въ томъ, что слю-  
дяный сланецъ перемежается тамъ съ кристаллическимъ извес-  
някомъ, сохраняя тоже простирание (до с.-з.) при отвѣсно-  
положеніи пластовъ. Тотъ же слюдяный сланецъ обнажаетъ  
и выше новыхъ зимнихъ куртъ, гдѣ, еще далѣе, Оспа не-  
вергается каскадомъ въ небольшое ущелье, и долина ея при-  
нимаетъ меридіанальное направленіе. Простирание пластовъ  
мѣняется въ в.-с.  $25^{\circ}$  съ падениемъ на ю.-в.  $25^{\circ}$  подъ угломъ  
 $80-85^{\circ}$ . Спустя нѣсколько верстъ пути, тропа пересѣкаетъ лѣ-  
вый притокъ Оспы, извѣстный подъ названіемъ Дабанъ-  
желга; онъ считается также лѣвымъ верховьемъ Оспы, (с-  
рующимъ начало на западѣ, не далеко отъ верховьевъ, и  
Даялокъ (см. ниже); затѣмъ около тропинки располагается  
бугоръ, похожій на такъ называемые бараньи лбы,—резу-  
татъ обтачиванія древними ледниками; бугоръ этотъ состоитъ изъ  
слюдянаго или глинисто-слюдянаго сланца съ простираниемъ  
в.-с.  $25^{\circ}$  и падениемъ с.-з.  $25^{\circ}$ , но на особенности его вер-  
ней поверхности не обращено достаточнаго вниманія, и по-  
тому будущимъ изслѣдователямъ необходимо будетъ поискъ  
на немъ слѣдовъ шлифовки или изборожденія. Въ ближай-  
шемъ сосѣдствѣ отсюда имѣетъ мѣсто соединеніе остальныхъ  
двухъ верховьевъ р. Оспы, и потому вся эта мѣстность  
съ Дабанъ-желга включительно, извѣстна подъ названіемъ  
Оспинъ-гурбунъ-бильчиръ, т. е. въ дословномъ пе-  
водѣ: тройное развѣтвленіе Оспы. Долина замыкается

внѣ стороны высокимъ и крутымъ гольцомъ, оканчивающимся нѣсколькими зубцами, расположенными на одной высотѣ, какъ зубцы короны, тогда какъ между ними, т. е. въ срединѣ зубчатаго вѣнца, выдается повидимому плоско-куполообразная вершина, покрытая снѣгомъ. Это высшій изъ лѣстныхъ пунктовъ цѣпи Китайскихъ альповъ,—Мунку-саганъ-хардыкъ, которому сойоты приписываютъ вѣчный снѣгъ. Бѣлый куполъ гольца исчезаетъ по мѣрѣ приближенія къ нему, замѣняясь лежащими ниже его зубцами, группирующимися уже вслѣдствіе законовъ перспективы совершенно иначе, причемъ одинъ изъ зубцовъ отличается почти чернымъ цвѣтомъ и горизонтальными на немъ полосами, указывая на отличный его составъ. Нѣсколько выше мѣста соединенія обоихъ верховьевъ Осы, берущихъ начало на восточномъ и западномъ склонахъ Мунку-соганъ-хардыка (и ниже), почти въ полуверстѣ отъ его сѣвернаго подножія, располагаются лѣтнія сойотскія юрты вблизи отъ леваго берега западнаго (лѣваго) верховья рѣки. Къ юртамъ нѣтъ, стоящимъ на высотѣ 6437' н. ок., направились путешественники, чтобы отсюда предпринять восхожденіе на Мунку-саганъ, а затѣмъ перевалить въ систему р. Китоа; идѣвъ караванъ, олени, пасшіеся около подножія восточныхъ горъ долины, подбѣжали къ путешественникамъ и сопровождали ихъ до самыхъ юртъ.

#### в) ПРЕБЫВАНІЕ у сойотовъ.

Въ улусѣ оказались только женщины, дѣти и одинъ 72 лѣтній старикъ, такъ какъ все способное носить оружіе население отправилось на охоту еще 17 дней тому назадъ. Хотя самая богатая юрта, почтенная старушка, слышавшая арешей, за три дня до прибытія путешественниковъ «*протоптала уже пріпадъ чужихъ на вѣчныхъ и съ сухарями*», гостямъ же проводниковъ, подбѣжавшихъ къ ея юртѣ пер-

выми, она спросила: кто они такіе, а затѣмъ есть ли у нихъ часы, считая послѣднее очевидно мѣриломъ соціальнаго положенія прїѣзжихъ. Узнавъ, что имѣетъ дѣло съ естественными испытателями («шумъ-ноинъ» — въ дословномъ переводѣ: кочевникъ), обладающими даже двумя часами, — и тому же съ «смирными и веселыми», старушка не замедлила выказать все гостепріимство номадовъ и пригласила путешественниковъ въ юрту, окруженную уже пестрою группою женщинъ, дѣтей и оленей, цѣлый лѣсъ роговъ которыхъ придавалъ сплотившемуся кружку весьма своеобразный видъ. Весь улусъ состоялъ изъ шести маленькихъ лѣтнихъ юртостовъ которыхъ образуется четырьмя вкопанными столбами съ столькими же деревянными связями, тогда какъ стѣны крыши съ дымовымъ отверстіемъ сложены изъ наклонно поставленныхъ палокъ и необдѣланныхъ древесныхъ стволовъ и покрыты четырехугольными кусками лиственничной коры, прижатой въ свою очередь древесными стволами, жердями и камнями, причемъ оставлено отверстіе для дверей, украшаемыхъ довольно шаткими колодами. Внутренность юрты напоминаетъ бурятскую обстановку, но носитъ печать небрежности, низведенія запроса на удобства до возможнаго минимума и отдѣлки на скорую руку, такъ-что и полъ замощенъ корою. Такому общему характеру подчинялось какъ количество, такъ и качество мебели, посуды и всѣхъ вообще хозяйственныхъ принадлежностей, по типу вполне тождественныхъ съ бурятскими; четыре столба съ наклонною крышею изъ коры и съ подмостками на половинѣ ихъ высоты фигурировали въ качествѣ «амбара» только около юрты с магомъ зажиточнаго изъ сойотовъ и помѣщали въ себѣ нѣсколько малыхъ сосудовъ съ съѣстными припасами и натянутую ревку съ развѣшаннымъ на ней мокрымъ бѣльемъ. При этомъ имѣются также загородки для молодыхъ оленей.

Типъ сойотовъ-мужчинъ, съ которыми въ послѣдствіи оказались путешественники, настолько близокъ къ бурятско-

то есть, повидимому, никакой возможности отличить ихъ, по крайней мѣрѣ безъ самыхъ тщательныхъ антропологическихъ исследований и сравненій, что впрочемъ и неудивительно, благодаря существующему у нихъ обычаю жениться на бурятахъ (тункинскихъ и окинскихъ) и отдавать дочерей за бурты. Относительно женщинъ поэтому не можетъ быть и речи, потому что всѣ онѣ оказались бурятками. Въ костюмѣ ячно также не замѣчается различій какъ равно и въ языкѣ; въ настоящее время, какъ извѣстно, сойоты на столько забыли языкъ своихъ родичей, что Радде (l. c.), ознакомившись съ единоплеменниками ихъ, живущими въ западной части описываемой горной страны (графитовый рудникъ Албера, см. ниже) убѣдился и слышалъ отъ другихъ сойотовъ, что между ними нѣтъ ни одного, говорящаго на этомъ языкѣ. Тѣмъ не менѣе ближайшее знакомство съ упомянутымъ выше 72-лѣтнимъ старикомъ, по имени *Дыржинз*, позволяло, что въ памяти его сохранились еще нѣсколько древнихъ словъ, которые списаны были Черскимъ и переданы академику Радлову, какъ специалисту монгольскихъ языковъ.

То обстоятельство, что здѣшніе сойоты строятъ себѣ жилища какъ зимнія такъ и лѣтнія жилища, отличаетъ ихъ уже отъ такихъ номадовъ, у которыхъ жилища эти переносныя (какъ напр. у тунгусовъ, карагасовъ и друг.), и ставитъ ихъ на степень переходной формы, связывающей типичныхъ номадовъ съ прибайкальскими бурятами. Въ остальныхъ они почти не отличаются отъ названныхъ бродячихъ племенъ, такъ какъ невозможность хлѣбопашества и скотоводства заставляетъ ихъ посвящать охотѣ все свое время, а исключеніемъ незначительныхъ отдыховъ въ семьѣ, остающейся въ стойбищахъ. Добытую такимъ образомъ пушнину (лиса, соболь, лисица, росомаха, медвѣдь, лось, изюбрь, лютун, кабарга; иногда дикій сѣверный олень), какъ равно и рога изюбровъ, они частью промѣниваютъ на ржа-

ную муку, чай, табакъ, соль и аршинные товары, часты продають, вывозя ихъ въ населенные пункты системы Иркутска и Оки, или же на р. Бѣлую (село Голуметское см. ниже) черезъ посредство выборныхъ отъ артели, а такъ какъ другихъ сношеній съ этими пунктами они не имѣють, то по этому можно иногда встрѣтить сойотовъ, никогда не выходящихъ изъ любимыхъ ими горъ и имѣющихъ лишь смутное понятіе о центрахъ земледѣлія. Такимъ образомъ одинъ изъ нихъ крайне удивился, увидѣвъ горохъ, изъ котораго привошники Черскаго варили кушанье, и просилъ даже дать ему нѣсколько зеренъ, чтобы показать своимъ единоплеменникамъ. Мясо убиваемыхъ животныхъ служить имъ въ пищу какъ въ свѣжемъ, такъ и въ вяленомъ видѣ; къ тому же изрѣзавъ мясо на небольшіе куски, они кладутъ его на помостки, сдѣланные изъ тонкихъ и сырыхъ березовыхъ и другихъ древесныхъ стволовъ, послѣ чего разводять подъ ними небольшой огонь, дѣйствіемъ котораго мясо отчасти поджаривается, отчасти же коптится, а затѣмъ высушивается. Такими консервами должны были запастись здѣсь и наши путешественники, такъ какъ провіантъ ихъ, какъ сказано выше, значительно истощился; оказалось однако, что мясо это пригодно было только для суповъ, придавая имъ впрочемъ весьма своеобразный и непріятный вкусъ; что же касается сойотовъ, то они ѣдятъ его иногда даже не развѣривая. Кирпичный чай, къ которому они прибавляютъ нѣсколько соли и заправляютъ ржаной мукою, поджаренною на оленьемъ маслѣ, служить главнѣйшею пищею («*затрѣнъ*»), хотя нерѣдко, когда запасъ его истощится, чай замѣняется нѣкоторыми мѣстными растеніями, какъ у бурятъ или же особенными наростами на березѣ, извѣстными въ Сибири подъ названіемъ «*чага*». Густое и вкусное оленьё молоко, играя роль сливокъ къ такому чаю, даетъ имъ кромѣ того нѣкоторое количество масла, для выдѣленія котораго они кладутъ въ кипящее молоко столько муки, чтобы обрѣ-

изалось довольно густое тѣсто, сильно нагрѣваютъ его въ чугунномъ котлѣ, постоянно мѣшая, а затѣмъ, уменьшивъ тѣсно огонь, подливаютъ въ горячее тѣсто нѣсколько воды, продолжая мѣшать и растирать полученную такимъ образомъ массу, причемъ, по мѣрѣ болѣе тѣснаго соединенія воды съ мукою, выдѣляется изъ смѣси масло, собираемое обыкновенно въ раздутыя и высушенныя кишки убиваемыхъ ими крупныхъ животныхъ или домашнихъ оленей. Что же касается оставшагося въ котлѣ тѣста, то оно, подъ названіемъ «зоохэй» (у смежныхъ съ бурятами русскихъ — «самантъ»), служитъ лакомымъ блюдомъ и лучшимъ угощеніемъ. Такой способъ выдѣленія масла изъ оленьяго молока сойоты считаютъ единственно возможнымъ, такъ какъ сквашенное холодное молоко, хотя и сбивается въ довольно твердый комъ, похожій на сливочное масло, но кушать его, положенный напр. въ горячій чай, превращается въ сливки и бѣлитъ чай, не оставляя послѣ себя ни одного куска масла, въ чемъ убѣдились и наши путешественники. Самый богатый изъ оспинскихъ сойотовъ обладаетъ 11-ю оленями, всѣхъ же оленей въ улусѣ не болѣе 40, причемъ самый рослый достигалъ 5 футовъ и 4 дюйма роста.

Кромѣ того въ пищу употребляютъ корни и луковицы некоторыхъ растений, собираемыхъ и бурятами, а сойоты, живущіе лѣвое верховье Иркутска, именно озеро Ильчиръ (и ниже), занимаются и рыбнымъ промысломъ, употребляя для этого особенный снарядъ, извѣстный подъ названіемъ «хуръ». Это своеобразно устроенный, металлическій крюкъ, привязанный къ длинной палкѣ; онъ опускается въ воду и подается подъ плывущую рыбу, которая и захватывается такимъ, цѣлесообразнымъ движеніемъ снаряда, требующаго при его употребленіи не только ловкости и привычки, но и значительной воды.

Вообще санитарныя условія этихъ горцевъ очевидно



настолько благоприятствуют ихъ жизни, что смертность между ними оказывается незначительною, многіе доживаютъ до глубокой старости и не подвергаются вообще никаки особеннымъ болѣзнямъ; поэтому вопросъ о быстромъ и постепенномъ уменьшеніи количества сойотовъ получаетъ тѣ болѣе интереса. Свѣдѣнія, собранныя въ этомъ отношен Черскимъ, показали, что среднимъ числомъ у нихъ рождаетъ больше дѣвочекъ нежели мальчиковъ, а такъ какъ, согласно принятому у нихъ обычаю, они отдаютъ дочерей за буря и сами женятся на буряткахъ, то поэтому уменьшеніе численности ихъ вполне понятно и неизбежно, не взирая на отсутствіе повальныхъ болѣзней и на достаточную плодовитость.

Насколько можно было узнать въ теченіи нѣсколькихъ дней пребыванія въ юртахъ и по разспросамъ у проводниковъ, хорошо знакомыхъ съ этими сойотами, вѣрованіе міросозерцаніе въ свою очередь почти во всемъ тождественны съ бурятскими, главнымъ образомъ съ воззрѣніями и обрядами бурятъ Тункинскаго вѣдомства. Каждая мѣстность по ихъ мнѣнію, каждая долина рѣки, озера, даже отдѣльныя горы, утесы и альпійскія вершины, не говоря уже жилищахъ, имѣютъ отдѣльныхъ, завѣдывающихъ ими духовъ называемыхъ *хангаями* (*хангай*), какъ напр. Кытоскій хангай, Оспинскій, Булунскій, Богдашкинскій и т. д. Духамъ этимъ они приносятъ жертвы, состоящія главнымъ образомъ изъ частицъ употребляемой ими пищи, которыя бросаются или брызгаются въ огонь, въ воду или, если это спиртной напитокъ, то и прямо на землю, съ соответственными и приличными случаю молитвами и просьбами. Молитвы эти начинаются обыкновенно возгласомъ: завѣдывающаю-то долиною, рѣкою или мѣстностью (напр. Оспин богатыи властелинъ или хангай! затѣмъ слѣдуетъ просьба оканчивающаяся приглашеніемъ его кушать: *сэжъ, сэжъ бай хангай* (*байнзъ* означаетъ богатый)! Такимъ образомъ, пер

ходя напр. съ р. Богдашки на Оспу, проводники Черскаго благодарили хангая первой рѣки за то, что онъ позволялъ благополучно проѣхать ея долину, Оспинскаго-же хангая заобривали, упрашивая успѣха въ путешествіи по его области.

Отступленія отъ такой нормы строго наказываются хан-гаями, и паденіе одной лошади съ узкой прибрежной тропинки въ р. Оспу объяснилось тѣмъ обстоятельствомъ, что хангай этой мѣстности не былъ угощаемъ путешественниками сахаромъ; поэтому онъ стащилъ въ воду именно ту лошадь, во вьюкѣ которой, между прочимъ, была голова сахару, промокшая и растаявшая понятно послѣ такого паденія. Угощать хангая можно и табакомъ; для этого выкуриваютъ трубку, поднимаютъ её высоко и говорятъ: *ку-те (татымъ-тэ баймъ хантай!)*, послѣ чего табакъ выбрасывается изъ трубки на землю, а въ случаѣ недостатка въ этомъ продуктѣ, выкуривается жертвоприношениемъ; что же касается бросанія табаку прямо изъ кисета, то обычай этотъ, столь распространенный у прибайкальскихъ бурятъ, не принятъ ни у тункинскихъ, ни у сойотовъ. Слѣды обряда сожиганія кусочковъ пищи на такъ называемыхъ *тахилахъ* (тахи), т. е. маленькихъ подмосткахъ, установленныхъ на трехъ толстыхъ прутикахъ или палочкахъ, въ видѣ столпа, встрѣчались путешественниками въ нѣсколькихъ мѣстахъ какъ на р. Оспѣ, такъ и на озерѣ Ильчирѣ, причемъ въ описанныхъ выше зимнихъ юртахъ найденъ и другого рода жертвенникъ до 1½ фут. высоты, обдѣланный весьма искусно топоромъ въ видѣ двухъ конусовъ, соединенныхъ другъ съ другомъ вершинами; на основаніи одного изъ конусовъ, нѣсколько чашевидно выдолбленномъ, замѣчались обугленные пятна и ямки отъ сожигавшихся жертвъ. Около Ильчира найденъ также жертвенникъ (*Ханъ*) около 2 фут. высоты, сложенный сойотами изъ небольшихъ каменныхъ камней и живо напоминающій такія же, но болѣе высокія

древнія монгольскія сооружеія, найденныя Черскимъ около Байкала (см. ниже); около жертвенника, какъ въ другихъ мѣстахъ самостоятельно, воткнутъ былъ древесный стволъ на вѣтвяхъ котораго висѣли разноцвѣтныя ленточки и травы (*зург-модднэ*). У сойотовъ имѣются свои шаманы, кои иногда они привозятъ къ себѣ на время и какого либо изъ извѣстныхъ бурятскихъ. И въ углу юрты, въ которой останавливались путешественники, висѣла очевидно «*зашаманенная*» шкурка соболя, съ навѣшанными на ней ленточками (*хотмунэ*). Кромѣ того, въ стѣнахъ юрты воткнуты были нѣкоторыя охотничьи, какъ объясняли, амулеты; одно изъ такихъ издѣлій состояло изъ небольшой, но довольно широкой кожаной полоски, нижняя часть которой (почти  $\frac{2}{3}$  длины) разрѣзана на девять продольныхъ ремней, а къ верху пришита маленькая металлическая фигурка, напоминающая человѣка съ ногами; другое изображало собою кольцо около 4 дюймовъ въ діаметрѣ, къ окружности котораго подвѣшаны два кожаныхъ ремешка съ округленными концами и с пришитыми къ нимъ раковинками (Сургаса), по одной на каждомъ, а затѣмъ маленькая костяная подѣлка въ родѣ нѣскольکو изогнутаго и довольно широкаго сабельнаго клинка; амулеты эти смазываются масломъ при соответственныхъ заклинаніяхъ. Къ числу извѣстныхъ и общепринятыхъ урять дѣтскихъ амулетовъ слѣдуетъ прибавить еще пробуравленные и напизанные въ видѣ бисера клыки благороднаго оленя, которыми былъ увѣшанъ поясъ одного сойотскаго мальчика, при чемъ нельзя не замѣтить, что точно также пробуравленные клыки того же животнаго вырѣзаны описаны Черскимъ вмѣстѣ съ издѣліями каменнаго періода въ г. Иркутскѣ <sup>1)</sup>.

Условія, вліявшія на упрощеніе какъ въ постройкѣ такъ и во всей домашней обстановкѣ, отразились повидимому

<sup>1)</sup> Черскій, Изв. Сиб. Отд. И. Р. Геогр. Общ. Т. III № 3.

на упрощеніи и уменьшеніи различныхъ обрядностей, столь обильныхъ и распространенныхъ у бурятъ. Во время въѣр-  
жато проищсѣя, напримѣръ, тункинскій буряты, по наблюде-  
ніи Черскаго, считаетъ неумѣстнымъ и вреднымъ ловить  
рыбу, изъ его балагана для каждой (даже для естественной)  
нужности должна быть особая дорожка поперекъ которой  
не должны лежать дрова; воду изъ рѣки надо брать непре-  
менно черпальною ложкою, а не прямо котломъ, къ тому-же  
примѣть некипяченую воду въ огонь, считается предзнаме-  
наніемъ полнѣйшаго неуспѣха въ проищсѣ. Убитую бѣлку  
нельзя класть вмѣстѣ съ соболями: её слѣдуетъ подѣлывать  
в поясу, тогда какъ соболи кладутся за пазуху; къ тому-же  
нельзя не вноситься въ двери балагана, а подается черезъ  
проемъ для этой цѣли окошечко и кладется на разоблан-  
женъ войлокъ; кромѣ того берутъ его за лапки, подносятъ  
несколько разъ вверхъ, приговаривая: «ахаръ, ахаръ бани  
ахаръ» (т. е. дай больше, богатый властелинъ), послѣ чего  
обходятъ его еще вокругъ пояса. Точно также соболь обди-  
рается у нихъ непременно съ хвоста, а не съ головы, какъ  
в Байкаломъ, или какъ это допускается у нихъ для хорька и  
простака; ободранному соболю отрѣзываются также послѣднія  
три фаланги пальцевъ какъ переднихъ, такъ и заднихъ ногъ,  
и складываются въ брюшную полость черезъ сдѣланное для  
той цѣли небольшое отверстіе, послѣ чего туловище свер-  
тывается колючикомъ, конецъ хвоста вкладывается въ нодри  
и опускается обыкновенно въ душло дерева или въ ямки  
между корнями. Сойоты между тѣмъ говорятъ, что они не  
могли бы даже упомянуть всѣхъ этихъ обрядностей, для  
измѣненія которыхъ къ тому-же имъ не доставляло бы и  
времени. Соболя они подчасъ даже ѣдятъ, только въ варе-  
номъ, а не въ жареномъ видѣ, остальные же туловища  
этихъ животныхъ приготовляются ими по бурятскому спо-  
соби, кладутся въ вырубленное въ стволѣ дерева углубленіе  
и забиваются дощатчатымъ деревяннымъ клиномъ, какъ это

видѣли путешественники на р. Оспѣ, недоѣзжая до старыхъ зимниковъ, причемъ имъ объясняли, что ѣсть соболя можно только на томъ стойбищѣ, на которомъ животное это убито.

Кромѣ оленей сойоты всѣхъ извѣстныхъ стойбищъ описываемой мѣстности (Оспинскіе, Ильчирскіе, Ботугольскіе Ханчинскіе и Ирленскіе см. ниже) содержатъ также не большое количество лошадей (записки, въ которыхъ заключались численныя данныя, потеряны), стѣсняющихъ ихъ ужъ отчасти въ перекочевкахъ и въ свою очередь до нѣкоторо степени привязывающихъ къ мѣсту, потому что съ жеребятинами они не могутъ уже совершать перевалы черезъ крутыя гольцы, не могутъ бродить черезъ горныя рѣки и должны выбирать мѣста съ достаточнымъ кормомъ для этихъ животныхъ, а такъ какъ съ оленями они въ состояніи посѣщать даже самыя неудобопроходимыя мѣстности и такимъ образомъ значительно сокращать себѣ дорогу, то лошади употребляются ими сравнительно рѣдко. Когда же Алибертъ покидая свой графитный рудникъ, оставилъ живущимъ тамъ сойотамъ нѣсколько коровъ и барановъ, то сойоты эти съ тѣхъ поръ сдѣлались уже совершенно осѣдлыми, такъ какъ переходы съ рогатымъ скотомъ даже за предѣлы вертикальнаго распространенія березы не вездѣ и не всегда возможны.

Оспинскіе сойоты въ то время, когда къ нимъ прибыли путешественники, оставались безъ чая и потому для угощенія употребленъ былъ чай пріѣзжихъ, но саламать, оленья молоко и тарасунъ появились въ достаточномъ изобиліи и сопровождались оживленными разговорами и разспросами. Хозяева каждой изъ юртъ сочли своей обязанностью поочередно приглашать путешественниковъ въ гости, предлагая имъ сильное угощеніе, за что, понятно, со стороны пріѣзжихъ, получали чай, порохъ, иголки, нитки и т. п. предметы, въ которыхъ крайне нуждались. Явленіемъ, необычайно поразившимъ всѣхъ сойотовъ былъ процессъ намагничиванія стрѣлки горнаго компаса, предпринятый Черскимъ

въ юрту собралось все наличное населеніе стойбища, упранивая ознакомить ихъ съ дѣйствіемъ магнита, и когда стали намагничиваться различные стальные предметы, когда иголки такъ бы самостоятельно подымались вверхъ по наклонной плоскости бумажнаго листа, подъ которымъ двигалась скрытая магнитная подкова (изъ устъ пораженныхъ зрителей вырывались различные, соотвѣтственные случаю, междомѣтій) — когда наконецъ намагниченными предметами сойоты сами могли уже подымать съ пола иголки и т. п., вся юрта долго оглашалась безпрестанными взрывами самаго неподдѣльнаго и наивнаго хохота, завершившаго это «магнитное представленіе».

#### Восхождение на Мунку-саганъ-хардыкъ и перевалъ на р. Саганъ-харъ системы р. Китоа.

Выше мы говорили уже о томъ, насколько очертаніе вершины Мунку-саганъ-хардыкъ измѣнилось по мѣрѣ приближенія къ его подножію; болѣе низкіе зубцы, окружающіе видимый съ отдаленія снѣжный куполь, вошли теперь въ составъ контура высшихъ точекъ гольца, сѣверный склонъ котораго обнаруживаетъ двѣ ложбины, служащія ложемъ стекающихъ съ вершинъ снѣжныхъ водъ. Изъ 6-ти низкихъ зубцовъ, вѣрнѣе зубцовъ, образующихъ вершину этого гольца, при взглядѣ на него съ нижней части праваго верховья р. Китоа, четыре зубца располагаются на правомъ берегу высшей части восточной изъ упомянутыхъ двухъ ложбинъ, постепенно возвышаясь къ юго-западному, высшему изъ нихъ — третьему, съ горизонтальными полосками; пятый зубецъ отдѣленъ собою восточную ложбину отъ западной, отличаясь вознесеніемъ высшей своей точки на два невысокіе, но острые зубца; наконецъ шестая изъ видимыхъ вершинъ, самая западная и тупая, располагается на лѣвомъ берегу западной

ложбины, образуя склонъ праваго берега долины лѣваго верховья Оспы, точно также какъ съ вершины перваго изъ названныхъ зубцовъ начинается склонъ лѣваго берега долины праваго верховья этой рѣки. Восточная изъ упомянутыхъ двухъ ложбинокъ, изрывающихъ сѣверный склонъ гольца, отличается болѣе значительнымъ развитіемъ нежели западная ступеньчатымъ русломъ, образующимъ въ средней части высоты склона два высокихъ и отвѣсныхъ уступа, съ которыхъ въ началѣ лѣта низвергаются водопадами періодическій ручей. На высотѣ основанія нижняго изъ этихъ уступовъ, около обѣихъ ложбинокъ, залегаютъ небольшія поляны снѣга, — отсюда начинается уже и крупная осыпь кристаллическихъ породъ (розынь), образующая нижнюю треть видимой высоты склона гольца и нивелирующая нижнія части ложбинъ до полного исчезновенія послѣднихъ, хотя изъ положенія ихъ можно все-таки заключить, что ложбины эти принадлежатъ къ лѣвымъ притокамъ праваго верховья Оспы. Сдѣланная Черскимъ попытка восхожденія на гонецъ по его сѣверному склону (12-го іюля) не увѣнчалась успѣхомъ чрезмѣрная крутизна, а затѣмъ дождь заставилъ его возвратиться въ юрту, гдѣ старикъ-сойотъ объяснилъ, что достиженіе самыхъ значительныхъ высотъ возможно только съ стороны праваго верховья Оспы, слѣдовательно, подымаясь на восточному склону гольца, гдѣ они ходятъ охотиться за дикимъ козломъ (*Capra sibirica*); что-же касается абсолютной высшей точки Мунку-сагана, то она, по его мнѣнію, недостижима, такъ какъ при каждомъ изъ такихъ посягательствъ онъ встрѣчался съ отвѣсными уступами, ставившими ему непреодолимую преграду.

Правое верховье Оспы, насколько его можно было наблюдать, какъ слѣдуя вверхъ по нѣкоторой его части, такъ съ высоты склона гольца, состоитъ изъ двухъ отрѣзковъ: верхняго, отличающагося почти меридіональнымъ направленіемъ и нижняго, протекающаго въ общемъ на з.-с.-з., вдо

сѣверо-восточнаго подножія гольца къ соединенію съ лѣвнымъ верховьемъ, имѣющимъ уже мѣсто въ долинѣ лѣтней стоянки сойотовъ. На всемъ этомъ протяженіи рѣчка принимаетъ съ правой стороны три притока, а именно: два въ самой отдаленной части верхняго отрѣзка, а третій на самомъ переломѣ этого отрѣзка въ нижній, причемъ притокъ этотъ беретъ начало въ воронкообразной котловинѣ гольца Уланъ-сага и на пути къ устью низвергается въ одномъ мѣстѣ водопадомъ. Между тѣмъ изъ лѣвыхъ притоковъ, не считая упомянутыхъ выше двухъ ложбинъ сѣвернаго склона Мунку-сагана, извѣстенъ только одинъ, берущій начало на восточномъ склонѣ названнаго массива и изливающийся въ правую Оспу нѣсколько ниже устья втораго изъ двухъ верхнихъ правыхъ притоковъ. По долинкѣ этого ключа, столь-же безымянной какъ все теченіе правой Оспы и вообще подножіе интересующаго насъ гольца, Черскій началъ второе восхожденіе (13-го іюля) совместно съ товарищемъ своимъ Гардиномъ. Съ высоты 6793' надъ океаномъ, т. е. 356' надъ лѣвыми юртами сойотовъ, гдѣ склонъ гольца сдѣлался болѣе пологимъ, путешественники покинули русло ключа и выбрались на высоты лѣваго берега долинки, встрѣтивъ тамъ обнаженія мелкозернистаго сланцеватаго известняка, массивнаго и полосатаго (съ бѣлыми прослойками). Пласты той породы залегаютъ поверхъ хлоритово-талъковаго сланца и другихъ, оставшихся неопредѣленными, полевошпатовыхъ и гранштейновыхъ породъ, образующихъ осмы сѣвернаго подножія Мунку-сагана; простираніе пластовъ известковаго сланца измѣняется здѣсь отъ з.-в. до в.-с.  $10^{\circ}$ — $20^{\circ}$  съ соответственнымъ паденіемъ на югъ и наклономъ до  $85^{\circ}$ ; мѣстами слои породы являются изогнутыми въ мелкія волнистыя складки. На высотѣ 6978', окончивъ довольно утомительную часть подъема, показалось нѣсколько кустовъ кедроваго сланца, а футовъ съ 200 выше замѣчено нѣсколько индивидуумовъ лиственницы, растущихъ уже на самомъ предѣлѣ распространенія древесной расти-



тельности. Поднявшись еще настолько-же, путешественники достигли ложбины, слѣдующей по простиранію породъ на 3-ю и ведущей къ основанію темнаго, почти чернаго утеса, входящаго въ составъ упомянутого выше зубца вершины Мунку-сагана, видѣннаго еще съ долины Оспы. Ближайшій осмотръ утеса показалъ, что въ основаніи его, на головахъ знакомыхъ намъ уже полосатаго известняка, на высотѣ 8478', залегаетъ довольно толстый пластъ конгломерата бураго цвѣта, состоящій изъ различной величины галекъ и необточенныхъ кусковъ мѣстныхъ породъ, въ томъ числѣ и лавовыхъ, слѣпленныхъ песчаникомъ. Поверхъ конгломерата располагается мощная толща лавы, слагающая всю видимую часть этой вершины. Изверженная порода эта обнаруживаетъ весьма ясную по видимому вполне горизонтальную слоистость, зависящую отъ періодичности вулканическихъ изліаній, вслѣдствіе чего основная часть (лежащій бокъ) каждого изъ слоевъ является плотною, а верхняя (висячій бокъ) пузыристою, причемъ ясно видимыхъ такихъ слоевъ можно насчитать восемь. Ею отдѣльности лавы замѣтно стремленіе какъ къ пластовой, такъ къ призматической и сферической, но всѣ эти формы растрескиванія не вполне правильно развиты; въ нѣкоторыхъ местахъ и ячейкахъ наблюдаются цеолиты; что-же касается состава этой лавы, то она напоминаетъ собою тункинскую, т. е. базальтовую, но ближайшаго ея опредѣленія слѣдуетъ выждать еще отъ будущихъ изслѣдователей. Продувты въ вѣтриванія лавы смываются періодическими водами въ ложбину, ведущую къ этому утесу, покрывая ее слоемъ глины на которой красовалась яркая зелень и обильно цвѣли и забудки; въ одномъ мѣстѣ на глинѣ видѣлись свѣжіе слѣды дикой козы (*Capra sibirica*). Начиная съ высоты 8550' путешественники вступили уже на сплошной покровъ лавы слѣдуя около почти отвѣсной лавовой стѣны, достигли довольно узкаго карниза, располагающагося уже на сѣверной сторонѣ гольца и опускающагося отвѣснымъ уступомъ

юсточной изъ описанныхъ выше двухъ ложбинъ этого склона. Съ высоты 8662' этого карниза открывался красивый видъ на слияніе обоихъ верховьевъ р. Осны около лѣтнихъ юртъ, рассмотреть которыхъ можно было только въ зрительную трубу, иначе онѣ отыскивались на зеленомъ фонѣ долины съ большимъ трудомъ и могли быть сочтены за камни. Оригинальный и весьма интересный для геолога видъ представляли и высія точки горъ лѣваго берега долины Осны. Внимательный взглядъ бажущагося хаоса альпійскихъ пиковъ, окрашенныхъ замѣчательно интенсивнымъ фіолетовымъ цвѣтомъ отдаленія, обнаруживаетъ, что они вытягиваются почти въ сплошной рядъ, въ общемъ параллельный долинѣ Осны, ограничивая собою запада, повидимому, замѣчательно ровную широкую и длинную площадь, уровень которой превосходитъ 8662', а отношеніе къ современной долинѣ Осны низводитъ ее отчасти къ-бы въ роль террасы, отчасти-же и всего вѣроятіе площадь эта является въ видѣ древней долины, мѣстами открытой къ востоку, т. е. въ сторону Осны, такъ-что въ сѣверной части площадь эта охватывается уже съ обѣихъ сторонъ горными вершинами, прерывающимися лишь отчасти глубокими въ нихъ долинами и воронкообразными котловинами лѣвыхъ притоковъ Осны. На высотѣ этой площади, сравнительно съ которою нынѣшняя долина Осны углубилась еще на слишкомъ 2225', замѣчается въ одномъ мѣстѣ (по-видимому какъ разъ на широтѣ слиянія верховьевъ Осны) весьма ясно очерченная горизонтальная толща черной породы, залегающей поверхъ болѣе древнихъ скалъ лѣваго берега долины Осны и обнаруживающей какъ-бы горизонтальную слоистость. Послѣ знакомства съ явленіями на только что описанныхъ высотахъ Мунку-сагана, а затѣмъ его окрестностей (см. ниже), не можетъ быть сомнѣнія въ томъ, что лѣтний покровъ этотъ образованъ лавою, пласты которой также обрѣзаны состороны долины р. Осны, какъ и Мунку-саганъ, указывая возможность прежняго, гораздо бо-

лѣе обширнаго распространенія этихъ лавовыхъ потоковъ. Подробное изученіе особенностей и строенія этой высокоплощади, которому, разумѣется, слѣдовало бы посвятить и мало времени, должно дать въ будущемъ весьма интересные данныя для возстановленія исторіи развитія современной конфигураціи описываемой мѣстности и тѣхъ значительныхъ ея преобразованій, какія имѣли мѣсто въ періодъ истекшій со времени бывшихъ здѣсь вулканическихъ изверженій.

Почти отвѣсный склонъ лавоваго утеса заставилъ путешественниковъ прекратить восхожденіе; видимый отсюда высшій пунктъ гольца могъ достигать еще отъ 800 до 100 высоты надъ достигнутымъ путешественниками карнизомъ слѣдовательно, отъ 9462 до 9662' надъ океаномъ; что касается абсолютно высшаго пункта Мунку-сагана, касающагося съ отдаленія (недоѣзжая еще лѣтнихъ юртъ, с выше) снѣжнымъ куполомъ, расположеннымъ среди окружающихъ его зубцовъ въ видѣ короны, то ни съ этого конца ни съ западной стороны гольца, гдѣ находится перевалъ системы р. Китоа, ни наконецъ съ южной его стороны (с ниже) путешественникамъ не удалось его видѣть, не смотря на то, что этотъ вопросъ они имѣли въ виду, находясь каждой изъ названныхъ точекъ окрестностей гольца. Приблизимъ, что на обратномъ пути съ гольца въ числѣ галекъ и другаго обломочнаго наноса, Черскимъ найденъ былъ кусокъ весьма рѣдкой здѣсь обломочной вулканической породы, извѣстной подъ названіемъ грасса. Перейдемъ теперь къ описанію перевала съ р. Оспи на р. Саганъ-харъ системы Китоа, такъ какъ путь этотъ знакомитъ насъ съ особенностями ближайшихъ западныхъ окрестностей Мунку-саганъ-хардыка и съ самымъ или лѣвымъ верховьемъ Оспи, видѣть которые съ высоты лавоваго карниза не было возможности, такъ какъ они закрывались какъ вершиною лавоваго зубца, такъ и тремя остроконечными пиками, принадлежащими скалистому гребню.

лѣваго берега восточной ложбины сѣвернаго склона Мунку-сагана.

Тропа отъ лѣтнихъ юртъ къ перевалу на Саганъ-харъ идетъ вверхъ по лѣвому верховью р. Ослы, представляющему въ столь же глубокой долинь, какъ и правое. Путешественники направились по ней сначала на ю.-з., около имѣнно эффектнаго каскада, образуемаго рѣчкою вблизи выходящей въ общую долину Ослы; затѣмъ, обогнувъ восточный конецъ Мунку-сагана, вошли въ находящееся тамъ котловинное расширение, гдѣ, перебродивъ на правый берегъ рѣки, тропа поворачиваетъ на ю.-в., къ необычайно крутому, совершенно обнаженному и безлѣсному склону скалистыхъ горъ, окружающихъ котловину. Отсюда видно, что на западѣ отъ Мунку-сагана, т. е. на правомъ берегу долины лѣваго верховья Ослы, вершины еще двухъ гольцовъ смотрятъ лавою, залегающею на нихъ въ такихъ же условіяхъ, какъ и на только что описанномъ пикѣ.

Путешественникъ, не предупрежденный заранее о мѣстѣ перевала на Саганъ-харъ, не могъ бы даже подумать о томъ, чтобы тропа, направившаяся прямо къ стѣнѣ глыбины, дерзнула подняться на этотъ скалистый и, повидному, совершенно недоступный склонъ, кажуційся такимъ не даже при взглядѣ съ самаго его подножія, съ высоты 7457', гдѣ дѣлаютъ обыкновенно отдыхъ, готовая къ этому, истинно трудному и весьма эффектному перевалу. Тѣмъ не менѣе, внимательно вглядываясь въ груды крупныхъ неправильныхъ глыбъ и обломковъ кристаллическихъ породъ, покрывающихъ этотъ склонъ, можно видѣть, что на нѣкоторыхъ изъ этихъ отторженцевъ сложены маленькія башенки и кучки изъ плитокъ и камней небольшихъ размѣровъ: это такъ называемые «маячки» сойотовъ, руководствуясь которыми путешественникъ находитъ тропу, поднимающуюся восьмью выгнутыми по столь крутой и каменной поверхности, что окончаніемъ каждой изъ отдѣльныхъ частей этой ломанной линіи,

не взирая на незначительную ихъ длину, служить вмѣстѣ съ тѣмъ и необходимымъ отдыхомъ передъ слѣдующимъ подъемомъ. Угрюмая и мрачная стѣна вскорѣ оживилась, представляя видъ, достойный кисти художника въ то время, когда всѣ лошади были введены на тропу и размѣстились по три или по двѣ на каждомъ плечѣ зигзага; крутой склонъ скалы преобразовался въ многоярусную галлерею, съ отдыхающими на ней лошадьми и проводниками; во главѣ послѣднихъ былъ знакомый уже намъ 72-лѣтній сойотъ Дыржинъ, взявшій провожать путешественниковъ до Саганъ-харской долины. Подымаясь постепенно на 216, 395, 547, 637, 667 и 82 футовъ надъ мѣстомъ перваго отдыха, путешественники достигли такимъ образомъ высшей точки перевала, на высотѣ 8283' надъ ок. Это была довольно ровная, плоская и широкая площадь, образующая дно сѣдловины и рѣзко контрастирующая съ мрачностью и скалистостью подъема, такъ какъ значительная часть ея покрывалась даже альпійскою зеленью, среди которой цвѣли желтые маки, а изъ болотистой части сѣдловины струились ручейки, дающіе начало безымянному лѣвому притоку рч. Саганъ-харъ, изливающейся въ Китоу съ лѣвой стороны. Открытая такимъ образомъ обоими противоположными сторонами сѣдловина эта позволяла обозрѣвать во-первыхъ, часть горъ лѣваго берега прилежащаго верховья р. Оспы, гдѣ кромѣ нѣсколькихъ альпійскихъ пиковъ виднѣлась справа плоская, можно сказать столовая вершина ближайшаго къ долинѣ гольца, покрытая толстою массой лавы съ горизонтальною въ ней слоистостью, какъ и Мунку-саганъ и съ невысокою пирамидальною вершиною, выдающеюся надъ этою столовою поверхностью; затѣмъ въ сторону долины Саганъ-хара виднѣлся прежде всего самый низкій, столовидный же голецъ съ пирамидальною вершиною почти на серединѣ его горизонтальной верхней поверхности надъ нимъ значительно возвышался другой, нѣсколько болѣе южный, съ почти такою же столовидною и широкою повер-

ностью, изъ-за которой, съ лѣвой стороны, подымался пикъ съ черною заостренною вершиною, состоящею очевидно изъ лавы, такъ какъ на ней различались даже и горизонтальныя поясы, зависящіе по всей вѣроятности и здѣсь отъ періодичности изверженій; наконецъ, еще лѣвѣе, возвышались отдаленные альпійскіе пики, принадлежащіе уже Тункинской глѣ, тянущейся по правому берегу Китоа. На перевалѣ лежало большая куча камней, постоянно увеличивающаяся, такъ какъ каждый изъ путешественниковъ обязанъ прибавить въ ней одинъ или два; около кучи воткнуты нѣсколько нарочно привязанныхъ сюда древесныхъ стволиковъ, вѣтви которыхъ увѣшаны по обыкновенію ленточками (*зурмодонг*). Сокрѣпить обрядъ благодарственнаго жертвоприношенія на перевалѣ предоставлено было старику сойоту, который, содравъ маковый цвѣтокъ, торжественно обмачивалъ его въ чашкѣ съ налитымъ для этой цѣли виномъ, брызгалъ сначала Санинскому хангаю, благодаря за успѣшный подъемъ, а затѣмъ Саганъ-харскому, упрашивая покровительствовать въ дальнѣйшемъ путешествіи въ предѣлахъ завѣдываемой имъ области, послѣ чего старикъ сообщилъ, что послѣ каждого перевала чрезъ эту сѣдловину обыкновенно бываетъ снѣгъ или дождь и потому не мѣшаетъ поторопиться покинуть ее и скорѣе спуститься въ предѣлы произрастанія древесной растительности гдѣ къ тому же, на Саганъ-харѣ, находится пустыя сойотскія юрты.

Вообще спускъ внизъ по долинѣ оказался пологимъ, въ особенности на высотѣ 7852', при чемъ и дно долины состоитъ болѣе или менѣе совершенно травкою, пускающею корни въ тонкій впрочемъ слой атмосфернаго наноса, изъ котораго нерѣдко выдаются куски и выступы коренной породы, тождественной съ породою нисшихъ частей Мунку-шана, но съ большимъ участіемъ змѣвика. На высотѣ 7420' воды ручья протекаютъ черезъ небольшое озерко; дамба, покрываясь мѣстами довольно толстымъ еще слоємъ

прошлогодняго снѣга (15 іюля), ключъ врѣзывается довольно глубоко въ толщу змѣвика, образуя узкое и вообще мині-  
турное ущелье среди хорошо развитаго и достаточно обшир-  
наго тальвега; послѣ чего открывается уже видъ на широку  
и весьма живописную долину верховьевъ Саганъ-хара  
съ расположенными въ ней юртами на высотѣ 6923', т.  
на 486' выше лѣтнихъ юртъ на Оспѣ.

з) Долина Саганъ-хара и путешествіе по р. Китою до Бол-  
шаго Хонголда.

Саганъ-хара, какъ и Оспа, образуется изъ соединен-  
двухъ верховьевъ, вытекающихъ съ обѣихъ сторонъ леж-  
ащаго между ними гольца, съ тѣмъ лишь главнымъ отличіемъ  
что общее направленіе долины рѣки юго-восточное и голца  
разобицающій верховья, не достигаетъ столь значительн-  
высоты, какъ Мунку-саганъ-хардыкъ. Долина праваго ве-  
ховья выходитъ съ южной стороны гольца, направляясь  
нижней своей части съ востока на западъ; она не побѣжда-  
Черскимъ, что же касается записокъ Гартунга, углубляя-  
гося въ эту долину, то онѣ затеряны; на картѣ бывшаго  
долинѣ Саганъ-хара горнаго инженера Ковригина (л. с. 1836  
на этомъ верховѣ рѣчки показано озеро, но карта эта, ка-  
и значительная часть текста вообще, не заслуживаютъ полн-  
довѣрія потому, что въ ней не показанъ маршрутъ путе-  
ственника, вслѣдствіе чего нѣтъ возможности отличить собствен-  
ныя наблюденія автора отъ весьма сбивчивыхъ разспросныхъ  
свѣдѣній, въ особенности, что въ той же долинѣ Саганъ-ха-  
(«Цаганъ-хари» у Ковригина) на картѣ не значится ове-  
лѣваго верховья, изъ которыхъ нижнее весьма отчетливо  
жетъ быть видимо съ дороги. И дѣйствительно, долина  
ваго верховья, направляясь вообще съ ю.-ю.-в. на с.-с.-в., со-  
щаетъ въ себѣ сначала Верхнее озеро около вер-

дливо и неправильно-миндалевидной формы, съ заострен-  
нымъ и изогнутымъ сѣверо-западнымъ концемъ; уровень его  
поверхности располагается на высотѣ 7110'.

Озеро это, на которомъ Черскій встрѣтилъ нѣсколько  
присыхъ утокъ («Турпаны» *Anas rutila*), соединяется  
протокъ (менѣе версты) ручьемъ съ другимъ Нижнимъ  
зеромъ, на высотѣ 6888', отличающимся гораздо мень-  
шими размѣрами и суженнымъ юго-восточнымъ концемъ,  
изъ чьей правой стороны въ него впадаетъ ключикъ съ  
предгорья гольца, разобщающаго оба верховья Саганъ-хара.  
Нѣсколько ниже этого озера рѣчка воспринимаетъ въ видѣ  
малаго притока ручей, берущій начало на знакомомъ уже  
намъ Осинскомъ перевалѣ, и направляется уже въ общей  
мѣстѣ на ю.-ю.-в., къ мѣсту сліянія съ правымъ верховьемъ,  
изъ чего объединенный уже Саганъ-харъ многократно из-  
меняется по бархатной зелени своей широкой и почти без-  
дношной долины, обрамленной живописными гольцами, изъ ко-  
торыхъ видный съ перевала столовый, съ пирамидальною  
вершиною располагается на ея правомъ берегу, близъ пер-  
ваго праваго притока, около 2 версты ниже сліянія обоихъ  
ручьевъ.

Породы, развитыя въ этой мѣстности, Черскій относитъ  
къ тому возрасту съ тѣми, которыя преобладали и до сихъ поръ;  
петрографическомъ отношеніи они отличаются здѣсь только:  
а) общіемъ различнымъ видоизмѣненіемъ тальковаго сланца,  
переходящаго въ такъ называемый лиственитъ, нерѣдко  
очень крупнозернистымъ горькимъ шпатомъ, придающимъ  
ему наружность крупнозернистаго и порфировиднаго гра-  
нита, какъ напр. на правомъ берегу долины около выхода  
этого верховья рѣчки; порода эта до сихъ поръ, какъ  
мы знаемъ, была находима только въ Уральскомъ хребтѣ; б)  
мѣстами зифовика, нерѣдко весьма красиваго, какъ бы порфиро-  
иднаго отъ размѣщенія блѣдно-зеленовато-желтыхъ пятенъ  
въ темномъ фонѣ; порода эта образуетъ собою почти цѣлыя



горы (какъ напр. около упомянутого выше праваго притока рѣки) и перемежается какъ съ тальковымъ сланцемъ, такъ и съ известнякомъ, нерѣдко брекчиевиднымъ и конгломеративнымъ; наконецъ, в) присутствіемъ въ сланцахъ соеда хрома, окрашивающихъ ихъ въ красивый, яркозеленый цвѣтъ (какъ напр. въ долинѣ того же праваго притока, гдѣ попадаются еще куски весьма красиваго блѣднозеленаго, но не опредѣленнаго магнезiальнаго минерала, называемаго соитамин *ширмунг-шулунъ* и употребляемаго ими въ видѣ порошка для посыпанія ранъ; изъ него могутъ быть легко выдѣлываемы трубки, печати и т. п. подѣлки. Кромѣ того на вершинахъ нѣкоторыхъ гольцовъ залегаетъ также и лава въ условіяхъ, ясно обличающихъ въ ней остатки нѣкогда обширнаго покрова, разрушеннаго и расчлененнаго позднѣйшимъ размывомъ, размѣры котораго могутъ быть достаточно оцѣненными высотой залеганія лавы надъ дномъ расчлененныхъ ее долинъ. Такіе остатки лавовыхъ потоковъ, распадающіеся на высотѣ, повидимому никакъ не меньшей какъ на Мунку-саганѣ, и принадлежащей безъ сомнѣнія одному тому же, но расчлененному въ послѣдствіи покрову, наблюдались здѣсь: на гольцѣ лѣваго берега лѣваго верховья Саган-хара, въ промежуткѣ между Верхнимъ и Нижнимъ озерами слѣдовательно на западномъ продолженіи цѣпи, къ которой принадлежитъ Мунку-саганъ-хардыкъ, а затѣмъ на двухъ гольцахъ праваго берега Саганъ-харской долины, именно: недалеко отъ выхода долины праваго верховья рѣки, а далѣе гольцѣ въ верховьяхъ перваго праваго притока Саганъ-хара при чемъ лава всѣхъ этихъ мѣсторожденій, хотя и не можетъ достигнута восхожденіемъ, но констатирована обрѣзками, выносимыми оттуда какъ періодическими, такъ и ключевыми водами. Простираніе пластовъ сланцевъ колеблется между з. и з.-ю.-з. съ соответственнымъ паденіемъ на югъ наклономъ до 85°. Весьма интересными въ геологическомъ отношеніи являются также невысокіе, куполовидные или яй-

видные бугры, найденные Черскимъ около Верхняго озера, между нимъ и Нижнимъ озеркомъ, затѣмъ около юго-восточнаго подножія гольца, отдѣляющаго верховья Саганъ-хара, и, наконецъ, окодо упоминавшагося уже перваго праваго притока рѣки. Бугры эти, рисунки которыхъ приложены къ статьѣ Черскаго о слѣдахъ древнихъ ледниковъ въ Восточной Сибири <sup>1)</sup>, состоятъ изъ округленныхъ коренныхъ выступовъ кристаллическихъ породъ, обнажающихся на крутыхъ сторонахъ этихъ холмиковъ, при чемъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, въ особенности около юго-восточнаго конца Верхняго озера и ближе къ Нижнему, наблюдаются на нихъ весьма ясны шлифованныя поверхности, хотя значительно уже изуродованныя и лишенныя изборозженія. Явленія эти Черскій приписываетъ бывшему здѣсь древнему леднику, при чемъ сообщаетъ, что наносы въ этой долинѣ слишкомъ плохо обнажены, чтобы можно было ознакомиться хотя бы съ нѣсколькими глубокими ихъ слоями; найденные здѣсь слѣды древнихъ шурфовъ (съ 1833 или 34 г.), совершенно осыпанные и поросшіе травой, въ свою очередь не давали матеріала къ знакомству съ этими отложеніями. Шурфы эти дѣлались казенною золотопоисковою партіею подъ начальствомъ упоминавшагося выше Ковригина (л. с.), въ статьѣ котораго мы не находимъ однако никакихъ подробностей о почвѣ, произведенной шурфами; на его геогностической картѣ почти все пространство Саганъ-хара покрыто краскою «филлада», къ которой въ верхней части примыкаетъ площадь известняковъ. На картѣ, соответствующемъ Мунку-саганъ-хардыку, на той же картѣ означена вершина, названная имъ Петропавловскою, при чемъ въ текстѣ находимъ, что по сдѣланному имъ тригонометрическому измѣренію, высота этого пика равняется 510 саженимъ, т. е. 3570' надъ поверхностью Саганъ-хара.

<sup>1)</sup> Черскій, Изв. Сиб. Отд. И. Р. Геогр. Общ. Т. XII, № 4.

Такъ какъ, по замѣчанію Черскаго, не можетъ быть сомнѣнія, что измѣренный Ковригинымъ пикъ относится къ одному изъ видимыхъ отсюда вершинъ Мунку-сагана, тогда какъ уровень рѣки не опускается здѣсь ниже 6800' (около устья перваго праваго притока), то абсолютная высота гольца въ такомъ случаѣ оказывается равною 10370' и достигающе почти уровня начала ледника на южномъ склонѣ Мунку-Сардыка (10400' см. выше); но, видѣнъ ли съ долины Саганъ-хара дѣйствительно высшій пунктъ Мунку-сагана, об этомъ названный путешественникъ не берется судить, такъ какъ во время пребыванія его въ этой мѣстности, въ особенности въ тѣхъ частяхъ долины, съ которой вершина гольца могла быть видимою всего лучше, облачность мѣшала наблюденію. Іюля 16-го, хотя въ самой долинѣ Саганъ-хара пдалъ продолжительный дождь, окружающія ее горы покрылись толстымъ слоемъ снѣга, низшимъ предѣломъ распространенія котораго было озерко, располагающееся на южномъ склонѣ Оспинскаго перевала (см. выше), на высотѣ 7420' слѣдовательно, только на 497' выше юртъ, на уровнѣ которыхъ (6923') падалъ уже дождь; если прибавить къ тому же, что 15-го іюля около лѣтнихъ юртъ въ верховьяхъ Оспи температура воздуха въ 4 часа утра понижалась до  $+4^{\circ}$ , а 16-го іюля на Саганъ-харѣ, въ 9 часовъ вечера до  $+3^{\circ}$  Ц. что утромъ 17 іюля на высотѣ 6800' былъ иней и вода въ лужахъ замерзла, что вечеромъ 18-го іюля падала крупа съ дождемъ, а 19-го утромъ опять всѣ гольцы оказались покрытыми снѣгомъ, при чемъ за всѣ эти дни температура воздуха не превосходила  $+18^{\circ}$  Ц., то данныя эти служатъ достаточно нагляднымъ доказательствомъ суровости господствующихъ здѣсь климатическихъ условій.

20-го іюля путешественники покинули юрты, лежащія подножія гольца, между обоими верховьями Саганъ-хара, и направились внизъ по долинѣ рѣчки, длина которой

урт до устья въ Китой достигаетъ повидимому 15 верстъ<sup>1)</sup>. На половине этого разстоянія располагаются другія, пустыя же урты, принадлежащія тѣмъ же оспинскимъ сойотамъ и назначенныя для зимы; около нихъ въ утесахъ обнажается строватый кристаллическій известнякъ, съ простираниемъ пластовъ на с.-з.  $30^{\circ}$  и падениемъ на в.-ю.  $80^{\circ} - 59^{\circ}$ . В котловинообразнымъ расширениемъ открывается видъ на долину р. Китоя; Саганъ-харъ поворачиваетъ на ю.-в. къ своему устью въ доли лѣваго притока, тропы между тѣмъ перескакиваетъ черезъ плоское и низкое окончаніе отрога горъ праваго берега рѣки и спускается въ долину Китоя, уровень котораго располагается здѣсь на высотѣ 5370', слѣдовательно на 2217' выше устья въ него рч. Китойкинъ, гдѣ путешественники въ первый разъ встрѣтились съ этою рѣкою, въ разстояніи около 80 верстъ ниже устья Саганъ-хара. Долина Китоя, въ особенности ея лѣвый берегъ, отличалась здѣсь части даже луговымъ характеромъ при значительной ширинѣ; на правомъ болѣе лѣсистомъ ея берегу возвышались такія же альпійскіе пики, какъ и на лѣвомъ, но принадлежащія уже Тункинскимъ альпамъ. Направленіе долины съ востока на западъ; въ обнаженіяхъ лѣваго берега виднѣется кристаллическій известнякъ съ южнымъ падениемъ пластовъ. Ширина рѣки на мѣстѣ брода на ея правый берегъ не превышала 8 сажень, но быстрота теченія была столь значительна, что лошади едва могли удерживаться на ногахъ, не смотря на глубину, недостигавшую трехъ футовъ. По правому берегу тропы нѣсколько удалилась отъ Китоя приблизительно на столько же къ предгорью альповъ и направлялась вверхъ по теченію. Въ разстояніи около 12 верстъ выше устья Саганъ-хара, путешественники перешли въ бродъ правый притокъ Китоя, извѣстный подъ названіемъ Малый Хонгодой.

<sup>1)</sup> Часы путешественниковъ, какъ сказано было выше, испортились на р. Осѣ, и потому оцѣнка разстояній могла быть лишь очень приблизительною.

Это весьма быстрый, хотя и узкий (до 3 сажень) горный поток, мчащийся среди громадных гранитных (?) глыб низвергающийся местами каскадами. За нимъ, спустя версъ 5 и переваливъ черезъ невысокую, лѣсистую оконечность отрога, располагаются низовья Большаго Хонголда известнаго подъ названіемъ Ард-Хонголдай (т. е. с верный). Здѣсь, на высотѣ 5564', путешественники остановились; Гартунъ со всѣмъ обозомъ расположился около рѣчки а Черскій съ однимъ изъ проводниковъ отправился вверхъ по Хонголдоу, чтобы изслѣдовать его долину до верховьевъ лежащихъ на водораздѣлѣ между Китоемъ и Иркутомъ.

и) Долина Ард-Хонголдай и дорога къ оз. Ильчирь.

Тогда какъ описанные выше маршруты по рч. Китокину, а затѣмъ по Саганъ-хару позволили намъ ознакомиться съ особенностями южнаго склона Китайскихъ альповъ, долины и теченіе рч. Ард-Хонголдай даетъ разрѣзъ прилежащаго къ этой цѣпи сѣвернаго склона Тункинскихъ альповъ, дополняя собою маршрутъ по долинѣ р. Архута ознакомившей насъ съ тою же покатою Тункинской цѣпи въ разстояніи около 107 верстъ восточнѣе.

Поросшія довольно густымъ лѣсомъ и достаточно закрытыя отъ вліянія солнечныхъ лучей, низовья Хонголда отличаются уже болѣе дикимъ характеромъ, свойственнымъ большей части долинъ сѣвернаго склона горныхъ цѣпей, хотя благодаря сравнительно меньшей глубинѣ долины, она все таки болѣе открыта и несравненно менѣе мрачная, нежели долина Китоя около устья въ нее Китойкина. Въ береговыхъ утесахъ обнажается кристаллическій известнякъ съ тѣмъ же простираніемъ з.-ю.  $15^{\circ}$  и паденіемъ ю.-в.  $15^{\circ}$ , какое мы видѣли господствующимъ на Саганъ-харѣ; Хонголдай, мнява въ эти утесы, разбивается на нѣсколько рукавовъ, впадающихъ сейчасъ же ниже стоянки въ Китой и обладаетъ здѣ

значительно быстрою, такъ какъ низовья его проложены въ довольно высокомъ уступѣ. И дѣйствительно, начиная съ стоянки (5564') тропа быстро подымается до высоты 5963', тѣ долины Хонголдо я является уже пологою, отчасти луговою и достигаетъ около  $\frac{3}{4}$  версты въ ширину, направляясь вообще на с.-с.-в.; здѣсь же она принимаетъ и свой первый лѣвый притокъ. Въ обнаженіяхъ окружающихъ ее гольцовъ видно, что известнякъ смѣняется залегающею на немъ красноватою породою, оказавшеюся впоследствии гнейсомъ.

Далѣе, около второго лѣваго притока (6249'), уже съ некотораго отдаленія, можно было видѣть, что гнейсъ въ свою очередь покрывается бѣлою породою, ближайшій осмотръ которой въ склонахъ этой узкой долинки показалъ, что это значительно измѣненный, мѣстами вовсе не вскипающій отъ кислот известнякъ. Простираніе пластовъ его оказалось з.-с. съ паденіемъ на ю.-ю.-з. отъ 38 до 60°; порода эта образуетъ довольно живописные остроконечные скалы на лѣвомъ праваго берега долины этого притока, тогда какъ въ долину его промыто еще среди пластовъ гнейса, залегающаго такъ же подъ известнякомъ; тутъ же попадаются еще куски гранита изъ неизвѣстнаго мѣсторожденія.

Долина Хонголдо между тѣмъ все также широкая и принимаетъ степной характеръ, обнаруживаемый даже фауною, такъ какъ на пути этомъ стали показываться нерѣдко жуки (*Spermophilus Evermanni*); по берегамъ рѣки, разбѣгающейся мѣстами на рукава и протоки, замѣчается песчаная наносъ, на бывшее здѣсь болѣе мощное развитіе котораго указываетъ также бугоръ, достигающій около 5 саж. высоты и обнажающій повидимому одинъ лишь слоистый известнякъ. Въ утесахъ гольцовъ праваго берега долины виднѣется тотъ же известнякъ съ такимъ же паденіемъ (ю.-ю.-з.), какъ и въ долину, но сейчасъ же выше утесы измѣняютъ характеръ, представляя явленіе весьма интересное въ геологическомъ отношеніи. Уже при взглядѣ съ нѣкотораго отдаленія

ленія видно, что около долинки праваго притока Хонгодо въ особенности начиная съ ея лѣваго берега, бѣлый цвѣтъ известняка смѣняется темною породою (слюдяной сланецъ) слагающею далѣе всю высоту гольцовъ и обнаруживающею наклонъ пластовъ въ сторону, противоположную прежнему паденію, причемъ кажется, что мысовидный выступъ этого сланца, падающаго на с.-с.-в. съ наклономъ до  $48^{\circ}$ , покрывается бѣлымъ кристаллическимъ известнякомъ, образующимъ гольцы праваго склона той же долинки и падающаго ю.-ю.-з., насколько впрочемъ можно судить здѣсь только по выступамъ слоевъ, видимымъ на высшей части горы. Ближайшій осмотръ долины этого ручья, дающей поперечный разрѣзъ сланцеваго мыса, захватывая также и покрывающій его известнякъ, повидимому вполне подтверждаетъ кажущееся несогласное напластованіе названныхъ породъ, такъ какъ, слѣдуя вверхъ по долинѣ, сначала наблюдается узкая полоса сланца, падающаго на с.-с.-в., затѣмъ наблюдается покрывающій его, неслоистый здѣсь, бѣлый известнякъ, а на восточномъ склонѣ сланцеваго мыса слоистость примыкающаго къ нему известняка обнаруживаетъ паденіе слоевъ на в.-с.-в., вполне соответствующее, такимъ образомъ, склону покрываемаго мыса. Въ статьѣ о слѣдахъ древнихъ ледниковъ въ Восточной Сибири (I. с.), гдѣ говорится между прочимъ объ этомъ явленіи съ приложеніемъ рисунка описаннаго обнаженія, Черскій склоняется къ предположенію, что несогласное напластованіе между названными породами, причисляемыми имъ къ верхнему ярусу лаврентской формации, слѣдуетъ разсматривать какъ результатъ послѣдствій сжатія синклинальной складки, поврежденной предварительно размывомъ, причемъ авторъ этотъ ссылается на подобныя же явленія, замѣченныя имъ въ области разлитія того же яруса пластовъ около озера Байкала; къ тому же разрѣзы, параллельныя Хонгодою, какъ по Архуту, такъ и западнѣе описываемой долины, указываютъ только на существованіе здѣсь сжатой синклинали.

Сейчас же далѣе по Хонгодою, на высотѣ 6572', на степной долинь наблюдается поперечный къ ней и полукруглый валъ около сажени высоты, съ выпуклостью, обращенною внизъ по теченію. Валъ этотъ прерываетъ русломъ рѣки, уничтожившей очевидно бывшее его восточное продолженіе; въ проселкѣ травкою склонъ его Черскій видѣлъ впрочемъ одну лишь обточенную гальку, но замѣчаетъ, что будущія, болѣе подробныя изслѣдованія этой мѣстности, быть можетъ, покажутъ, что валъ этотъ представляетъ собою морену, измѣненную бывшими здѣсь впослѣдствіи озерными и проточными юдами.

Вскорѣ за описаннымъ валомъ, на высотѣ 6600', начинается котловинообразное расширеніе верховьевъ рѣки. Довольно пространная котловина эта окружена высокими гольцами и широко открыта къ сѣверу, т. е. въ сторону Аро-Хонгодою, а къ югу она представляетъ узкій скалистый проломъ въ сторону р. Иркуты; въ противоположность восточной, гольной, — западная стѣна котловины прерывается глубокою продольною долиною, играющею роль вѣтви этого расширения. На днѣ котловины, на высотѣ 6731' н. ок., располагается небольшое озеро, вытянутое въ сѣверо-восточномъ направленіи, гдѣ изъ него вытекаетъ Ар-Хонгодо (притокъ Китоа), тогда какъ черезъ южный проломъ котловины выходитъ изъ ней другой, южный, или Убуръ-Хонгодой, образуясь изъ главной правой своей вѣтви, берущей начало въ упомянутой выше западной долинь и незначительнаго ручейка, въ роли лѣвой вѣтви, вытекающаго изъ болотъ юго-западной оконечности озера. Убуръ-Хонгодой, какъ мы увидимъ ниже, направляется по крутой долинь къ югу и впадаетъ съ лѣвой стороны въ р. Ихэ-угунъ (лѣвый притокъ Иркуты), на устьѣ котораго располагается знакомая намъ уже Нилова пустынь (см. стр. 161). Въ котловинѣ около озера растутъ въ изобиліи ерники (*Betula nana*); небольшое количество остатковъ сухихъ индивидуумовъ лиственницы появляется только



выше озера, около подножія гольцовъ, окружающихъ котловину. Относительно геогностическаго строенія мѣстности Черскій сообщаетъ, что подъ слюдянымъ сланцемъ, съ которыми мы ознакомились выше, залегаетъ довольно мощный пластъ средне и крупно-кристаллическаго известняка краснаго цвѣта перѣдко съ большимъ количествомъ листочковъ черной слюды и подъ нимъ выступаетъ опять слюдяный сланецъ, образующій остальную часть котловины; пласты этихъ породъ лежатъ вполнѣ согласно на с. или с.-с.-в. съ наклономъ  $45^{\circ}$ , слѣдовательно въ сторону противоположную паденію наблюдавшемуся въ среднемъ и нижнемъ теченіи Хонгодо и синклинально къ нему. Судя по узкой ущелистой и завленной остросереберными глыбами долинъ выхода южнаго Хонгодоа, котловина эта, вмѣстѣ съ западною ея вѣтвью, могла первоначально принадлежать только одному китойскому Хонгодоу и лишь впоследствии могла быть захваченна отступающими верховьями Убуръ-Хонгодоа, присоединенными еѣ отчасти къ системѣ водъ Иркуты. Весьма интересною котловина эта является еще и въ томъ отношеніи, что въ ней можно видѣть шлифованныя поверхности, сохранившіяся еще лучше, нежели на Саганъ-харѣ, хотя точно такъ безъ шрамовъ и царапинъ.

Прежде всего бросается въ глаза рядъ красиво обточенныхъ, мѣстами куполообразныхъ поверхностей, располагающихся въ видѣ возвышенія, поперечнаго къ южному выходу изъ котловины: почти на серединѣ этого шлифованнаго возвышенія, достигающаго 6783', т. е. 52' надъ уровнемъ озера и игравшаго роль подножія прерванной ущельемъ южной стѣны цирка, врѣзалось въ него русло Убуръ-Хонгодоа передъ входомъ въ свою крутую долину. Такими шлифованными поверхностями отличается мѣстами и подножіе восточной стѣны котловины, оглаженное, повидимому, во всей нижней трети видимой высоты гольцовъ, причемъ обтертыя поверхности наблюдались также и около озера. Черскій не и

желается разсматривать эти явленія какъ результатъ дѣйствія древняго ледника, такъ какъ, еслибы кто либо попытался объяснить политуру около южнаго выхода изъ котловины, напр. дѣйствіемъ водопада, образовавшагося послѣ захвата озера водами Убуръ-Хонголдоя, то возникновеніе такихъ-же поверхностей около восточной стѣны, около озера и еще сѣвернѣе противорѣчило бы подобному заключенію, не говоря уже о томъ, что водопадъ не могъ бы шлифовать сѣверный склонъ возвышенія, а только верхнюю его поверхность и часть южной, на которой однако, на мѣстѣ выхода Убуръ-Хонголдоя изъ котловины, шлифы смѣняются крутыми, неровными и растресканными поверхностями утесовъ. Черскій имѣлъ сдѣлать еще экскурсію внизъ по долинѣ Убуръ-Хонголдоя, имѣя между прочимъ въ виду и вопросъ о распространеніи шлифовъ, вопросъ, рѣшеніе котораго могло бы указать на относительное время захвата котловины этою рѣчкою. Долина ея однако была до того заполнена облаками, что все тамъ казалось бѣлою массою клубящагося пара надъ какою-то гигантскимъ котломъ. Необходимо было поэтому возвратиться на стоянку около озера, откуда вскорѣ можно было любоваться поразительно красивымъ зрѣлищемъ. Подъ вліяніемъ южнаго теченія воздуха большіе кучевые облака шли входить въ котловину черезъ узкое ущелье Убуръ-Хонголдоя, расширяясь въ ней и принимая весьма изящныя изгибистыя формы; величественное зрѣлище это окончилось впрочемъ совершеннымъ выполненіемъ цирка непроницаемо густымъ туманомъ, а затѣмъ продолжительнымъ, хотя и очень мелкимъ дождемъ, а спустя нѣкоторое время и снѣгомъ, упавшимъ уже въ болѣе высокихъ облакахъ, послѣ исчезновенія низшихъ. Черскій отправился обратно къ Китою, не имѣя возможности осмотрѣть и долину, которою прорывается западная стѣна котловины, а между тѣмъ весьма возможно, что въ ней лежали бы въ свою очередь шлифованныя поверхности, рѣшеніе которыхъ только около правой стѣны котловины

(южной и восточной) указывает повидимому на усиление подтачивающее дѣйствіе ледника на мѣстѣ его поворота и западной долины внизъ по меридіональному теченію современнаго Арб-Хонголдоа. Въ видѣ дополненія къ собраннымъ свѣдѣніямъ о долинѣ этой рѣчки необходимо еще указать на тригонометрическое измѣреніе высоты двухъ гольцовъ, произведенное здѣсь упоминавшимся выше Ковригинымъ <sup>1)</sup>. Одна изъ этихъ вершинъ, лежащая «въ вершинѣ рѣчки Хонголдоа съ лѣвой стороны» и названная имъ Синговою, опредѣлена въ 2954,5' надъ поверхностью озеръ слѣдовательно 9740' н. ок., если принять высоту озера 6783', по барометрическому измѣренію Черскаго. Другая тѣмъ вершина, названная Ковригинымъ Воздвиженскою, располагается по его словамъ «на лѣвой сторонѣ Хонголдоа, близъ его устья» и возвышается на 3199' надъ Китаемъ; если къ этой цифрѣ прибавить гипсометрическій уклонъ Китаю, равный (по Черскому) 5554', то абсолютная высота Воздвиженскаго гольца достигнетъ 8753'.

На картѣ Ковригина названные и измѣренные имъ гольцы означены впрочемъ слишкомъ далеко, къ тому-же, не взирая на то, что на ней показано и озеро верховьевъ сѣвернаго Хонголдоа; верховья Убурь-Хонголдоа означены не въ той котловинѣ, а не менѣе 6 верстъ къ юго-востоку отъ озеръ, кромѣ того и все теченіе средней части Китаю и Ирку отодвинуто слишкомъ значительно къ югу.

24-го іюля, оставивъ устье Хонголдоа, путешественники направились вверхъ по правому берегу долины р. Китаю расширившейся здѣсь до 1½ верстъ. Въ разстояніи 6 верстъ отъ Хонголдоа на высотѣ 5721', они повернули въ долину праваго притока Китаю, извѣстнаго подъ названіемъ Уширанга, около устья которой располагаются пустыя лѣтнія юрты сойотовъ, тогда какъ нѣсколько выше по Китаю на

<sup>1)</sup> Ковригинъ, Горн. Журн. 1886 г. ч. III, кн. IX, стр. 506.

ится и зимнія, точно также необитаемыя нынѣ юрты. По этой долинѣ тропы ведутъ къ лѣвому верховью р. Иркуты, въ такъ называемому Ильчирному Иркуту, берущему начало изъ озера Ильчиръ, слѣдуя въ общемъ юго-западному направленію. Рѣчка Ушаранга, изображенная съ достаточною точностью и у Ковригина (1. с.), но названа въ Нижнимъ Китоемъ, въ смыслѣ нижняго верховья этой рѣки; она имѣетъ около 20 верстъ длины и, протекая вообще на в.-с.-в. по довольно широкой, но почти безлѣсной, степной долинѣ, среди альпійскихъ гольцовъ, въ разстояніи около 12 верстъ отъ устья принимаетъ правый притокъ, называемый Тажонга, по низовьямъ которой, какъ и по Ушарангѣ, проживаютъ суслики. Начиная съ устья въ Китой и въ Тажонги, около которой, на высотѣ 6183', расположены охотскія юрты, въ склонахъ долины обнажался одинъ лишь кристаллическій известнякъ, главнымъ образомъ бѣлаго и розоватаго цвѣта, мѣстами со слюдою, придающею ему нарядность гнейса, изрѣдка съ пропластками краснаго цвѣта; простираніе пластовъ близкое къ с.-в.  $40^{\circ}$  съ соответствующимъ юго-восточнымъ паденіемъ до  $50^{\circ}$ .

Дождь, продолжавшійся почти съ устья Хонголдоя, смѣнился крупною, а затѣмъ и снѣгомъ, покрывшимъ вершины гольцовъ, а въ ночь  $24/25$  іюля вода замерзла въ лужахъ. По ошибкѣ проводника, давно не бывшаго въ этой мѣстности, изъ-за того, чтобы слѣдовать по Ушарангѣ, путешественники выправились вверхъ по Тажонгѣ. Круто поднятые слои известняка, падающіе на ю.-в.  $30^{\circ}$ , скоро смѣнились зеленымъ (люритовымъ?) сланцомъ, часть котораго падаетъ уже повишному въ противоположную сторону, что вскорѣ подтвердилось и прямымъ наблюденіемъ, такъ какъ, спустя гранитовую россыпь и отдаленныя обнаженія бѣлаго и краснаго цвѣта (известняки?) съ кажущимся сѣвернымъ наклономъ слоевъ, наступъ зеленаго сланца позволилъ опредѣлить простираніе на с.-в. съ паденіемъ на с. до  $65^{\circ}$ . Пройдавъ верстъ съ пять

вверхъ по Тажонгѣ, на высотѣ 6768', путешественники достигли котловинообразнаго расширенія ея верховьевъ, окруженнаго недоступными скалистыми стѣнами и покрытаго розсыпью; подъ слюдянымъ сланцемъ около этого расширенія залегаетъ желтый и сѣрый известнякъ съ сѣвернымъ наклономъ пластовъ, причемъ необходимо замѣтить, что горы окружающія это расширеніе съ южной стороны, отдѣляютъ его уже отъ долины р. Ихэ-угуна, лѣваго притока Иркутки упоминавшагося уже нами выше (см. также ниже). Убѣдишись, что выходъ изъ этой котловины невозможенъ, путешественники направились обратно къ Ушарангѣ, сопрягаясь дождемъ, послѣ котораго всю ночь <sup>25</sup>/<sub>26</sub> іюля палъ обильный снѣгъ, покрывшій какъ гольцы, такъ и дно долины, гдѣ онъ лежалъ довольно долго и на слѣдующій день. Проѣхавъ нѣсколько верстъ, по Ушарангѣ, путешественники вступили въ расширеніе (6557' н. ок.), въ западномъ концѣ котораго открывались двѣ долины: одна съ ю.-ю.-в. откуда беретъ начало сама Ушаранга, другая почти съ запада, съ протекающимъ по ней лѣвымъ притокомъ. рѣчка тропа направила въ верхъ по этому послѣднему, поднимаясь до высоты 6683', на которой долина эта суживается, превращается въ узкое (до нѣсколькихъ сажень) ущелье представляющее вмѣстѣ съ тѣмъ водораздѣлъ между системою Китоя и Иркутки. Ущелье это проложено въ слоистомъ кристаллическомъ известнякѣ съ простираніемъ пластовъ в. - с. - в. и паденіемъ на ю.-ю.-в. до 75°, причемъ, судя по глыбамъ лавы, такой-же какъ и въ верховьяхъ р. Оспы, съ ваемымъ и падающимъ съ высшихъ, невидимыхъ отсюда частей береговыхъ горъ, известнякъ этотъ долженъ покрываться сверху названною изверженною породою. Вслѣдъ за верховьемъ лѣваго притока Ушаранги, на днѣ того же ущелья, поворачивающаго на з.-ю.-з., замѣчается сначала незначительный ручеекъ, направляющійся относительно Ушаранги хотя и въ противоположную сторону, но сейчасъ ж

терпящийся въ небольшомъ углубленіи дна ущелья; но затѣмъ появляется другой ключъ, уже не исчезающій: это верховье рч. Толты, впадающей въ Иркутъ нѣсколько ниже впадающаго въ озеро Ильчира.

Б) Ильчирская котловина и ея окрестности.

Такъ какъ длина ущелья, въ которомъ мы оставили нашихъ путешественниковъ, не достигаетъ по видимому и  $\frac{1}{4}$  версты, то по этому передъ глазами ихъ вскорѣ открылся видъ на прилегающую къ этому ущелью часть Ильчирской котловины; этотъ представлялъ къ тому-же слишкомъ рѣзкій контрастъ съ тѣми пейзажами, съ которыми путешественники были знакомы на протяженіи знакомаго уже намъ ихъ маршрута. Въ противоположность вообще узкимъ альпійскимъ долинамъ и окружающими ихъ живописными, зазубренными пиками, среди нихъ разстилався система широкихъ и плоскихъ, почти безлѣсныхъ долинъ, степныхъ и тундренныхъ, изрѣдка и то лишь мѣстами каменистыхъ; вокругъ нихъ возвышались столь-же безлѣсныя, весьма пологія, сверху плоскія или плоско округленныя, сравнительно менѣе высокія горы, придавая всей этой мѣстности волнистый характеръ, хотя и въ большомъ масштабѣ, и только къ югу горизонтъ закрывался частью видимой отсюда альпійской цѣпи, смѣлая контуры которой вмѣстѣ съ снѣжною бѣлизною, рѣзко контрастировали съ нѣсколько унылымъ и монотоннымъ пейзажемъ ближайшей къ ущелью мѣстности: это гребень оставшихся къ югу Тункинскихъ альповъ, возвышающійся около недалекихъ отсюда верховьевъ р. Ихэ-угуна и покрытый недавно выпавшимъ снѣгомъ. Гольцы эти виднѣлись именно въ южной части почти меридіональной широкой долины, въ которую впадаетъ рч. Толты (иначе Тулта, «Тультерь» у Радде, «Колѣчатая» на картѣ Ковригина); вывело нашихъ путешественниковъ изъ ущелья, постепенно поворачивая къ

сѣверу и направляясь къ центру Ильчирской котловины, относительно которой долина эта играет роль юго-западной вѣтви. Съ высоты 6156', гдѣ Толта проходит поочередно черезъ два озерка, воспринимая еще правый притокъ, берущій начало въ третьемъ, еще меньшемъ озерѣ этой долины, можно уже видѣть, что известковый голецъ, образовавшій сѣверную стѣну ущелья и входящій въ составъ горноопоясывающихъ Ильчирскую котловину съ юго-востока, покрывается на значительной высотѣ черною толщею лавы куски которой, упавшіе съ высотъ наблюдались и на днѣ ущелья. Нѣсколько ниже по теченію Толта принимаетъ лѣвый притокъ — небольшой ключикъ, берущій начало на южной сторонѣ гольца, ограничивающаго Ильчирскую котловину съ юго-запада, отдѣляя долину упомянутаго ключа отъ Иркута, смывающаго сѣверное и сѣверо-западное подножіе этой высшей точки, не безынтересной въ геологическомъ отношеніи, какъ и всѣ окрестности котловины. Голецъ этотъ отличается длиннымъ (около 4 верстъ) и на столько пологимъ склономъ, что Черскій могъ удобно вѣхаться верхомъ на его плоскоокругленную вершину, на которой, еще съ удаленія, виднѣлось небольшое столовидное возвышеніе, рѣзкое и круто обрѣзанное со всѣхъ сторонъ и потому названное однимъ изъ проводниковъ *столикомъ*.

Склонъ этотъ, поросшій въ общемъ травою, обнаруживаетъ почти по всей его длинѣ (доступной осмотру къ сѣверу лишь съ поверхности, гдѣ трава рѣже), глинистую наносъ, перемѣшанный съ мелкими, острореберными обломками известковаго и нѣкоторыхъ другихъ сланцевъ (хлоритоваго или слюданаго?); на высотѣ 6993', т. е. 919' надъ долиною Ильчира, встрѣченъ однако небольшой выступъ лавы нарушающій ровность поверхности склона. Пласты, зависящіе по видимому отъ періодичности изліянія этой породы лежатъ почти горизонтально, обнаруживая лишь незначительный наклонъ (до 5°) къ западу. Изъ той-же изверженіи



породы состоятъ и упомянутый выше *столикъ*, т. е. высшій пунктъ этого гольца, достигающій по опредѣленію Черскаго 7446' н. ок., хотя надъ уровнемъ гольца высота этого лавового выступа не превышаетъ 10'. На юго-западъ отъ *столика* (върнѣе на ю.-з.  $30^{\circ}$ ), на высотѣ 7193', на поверхности того же гольца находится еще другой выступъ лавы, въ промежуткѣ между которыми обнажаются головы слоистаго известняка, образовавшаго почву лавовымъ потокамъ, послѣ размыва которыхъ остались описанные клочки прежняго обшрнаго покрова; простираніе пластовъ известняка на в.-с.  $30^{\circ}$  съ паденіемъ на ю.-в.  $30^{\circ}$ . На верхней поверхности *столика*, не взирая на то, что, какъ сказано выше, онъ образуетъ собою высшій пунктъ гольца, наблюдается дресва изъ стререберныхъ обломковъ кристаллическихъ сланцевъ, въ числѣ и известняка: дресва эта имѣетъ характеръ того же наноса, какимъ, какъ сказано выше, покрывается юго-восточный гольца; нахождение такого наноса на лавовомъ сто-лидномъ бугрѣ довольно загадочно: быть можетъ это остатки бывшаго здѣсь ледниковаго наноса,—вопросъ, по замѣчанію Черскаго, требующій еще болѣе подробныхъ изслѣдованій описываемой мѣстности. Съ высоты этого гольца можно, кромѣ того, удобно осматривать его окрестности. Отсюда видно во-первыхъ, что система рч. Толты отдѣляется отъ пармальной ей долины верховьевъ р. Тымѣликъ плоскимъ мысомъ, удлиненнымъ въ меридіональномъ направленіи, при чемъ послѣдняя изъ названныхъ рѣчекъ, съ верховьями которой мы ознакомимся ниже, дѣлаетъ здѣсь два поворота: сначала съ юга на западъ, а затѣмъ, спустя небольшое пространство опять на ю.-ю.-з. и почти на югъ, гдѣ она вступаетъ въ ущелье, изливаясь далѣе въ Иркутъ съ лѣвой стороны. Затѣмъ на юго-западѣ и западѣ видны такія же плоскія мысы какъ таковая рч. Толты, въ которыхъ, не взирая на густой туманъ, можно было различать нѣсколько наибольшихъ озеръ и рѣчекъ: это, по словамъ проводниковъ, рч. Мунку-



булукъ, лѣвый притокъ Иркутъ (см. ниже) и самъ Ильчинъ или Черный Иркутъ, поворачивающій постепенно къ югу, къ мѣсту соединенія съ другими, описанными выше верховьями этой рѣки. Наконецъ на востокъ и сѣверо-востокъ открывается видъ на Ильчирскую котловину, ея юго-восточныя и еще болѣе отдаленныя горы. Кромѣ гольца съ лавнымъ покровомъ, лежащаго около знакомаго намъ ущелья, виднѣется стоящая рядомъ съ нимъ, крышевидная гора, около сѣверо-западнаго склона которой располагается одно изъ озеръ Ильчирской котловины, называемое Тункинъ-нуръ. Это ближайшая къ Толтѣ часть юго-восточныхъ горъ котловины, которую Радде называетъ «*Еспандикъ*» <sup>1)</sup> (должно бытъ отъ невѣрно переданнаго ему названія ключа Зашпыдыкъ, вытекающаго около нихъ изъ озера Тункинъ-нуръ). За ними виднѣются альпійскія вершины болѣе отдаленныхъ горъ, которыя, на румбѣ видимой отсюда юго-западной части озера Ильчира, покрываются очевидно толщею лавы, благодаря которой вершины эти, начиная съ извѣстнаго гипсометрическаго уровня, отличаются почти чернымъ цвѣтомъ. Отсюда же наблюдается и невысокая, острововидная и поросшая лѣсомъ гора, лежащая на поверхности незначительнаго возвышенія, которое вдается въ котловину отъ сѣверо-восточнаго подножія гольца-столика, сопровождаая лѣвый берегъ Иркутъ и теряясь затѣмъ въ тундренной площади долины.

Радде <sup>2)</sup>, достигнувъ Ильчирской котловины совершенно другимъ путемъ, именно, изъ Хангинскаго на раула на р. Иркутѣ вверхъ по р. Шоломуръ (см. ниже) и затѣмъ черезъ упомянутый выше ключъ Мунку-буду и вверхъ по теченію Чернаго Иркутъ, сообщаетъ, что устья рч. Толты (Тультеръ) открывается видъ на широкую долину верховьевъ Иркутъ (т. е. Ильчирскую), окруженную горами.

<sup>1)</sup> Радде, I. с. pag. 29.

<sup>2)</sup> Радде, I. с. pag. 28 и слѣд.

постепенно возвышающимися къ востоку и достигающую 8—10 верст «средней ширины», — цифра, которая, по замѣчанію Черскаго, должна относиться собственно къ длинѣ долины, такъ какъ ширина ея въ дѣйствительности болѣе чѣмъ на половину меньше продольнаго діаметра, вытянутаго съ с.-з. на с.-в. Прежде нежели достигнуть ближайшей (ю.-з.) оконечности озера Ильчира, тропа ведетъ около нѣсколькихъ, связанныхъ другъ съ другомъ озеръ, называемыхъ Тунгйнъ-нѳръ (*нѳръ* или *норъ*, какъ извѣстно означаетъ озеро), на которыхъ Радде видѣлъ нѣсколько стай дикихъ утокъ (*Anas clangula et fuligula*). Нѣсколько далѣе (около 3—4 верстъ отъ подножія гольца-столика, по Черскому) и ближе къ подножію сѣверо-западныхъ горъ, располагается озеро Ильчиръ, вытягиваясь 4—5 верстъ въ длину, при ширинѣ, колеблющейся отъ  $\frac{3}{4}$  до 1 версты. Большая часть поверхности въ бытность Радде ( $\frac{15}{27}$  іюня) покрывалась толстымъ льдомъ, толщина котораго во многихъ мѣстахъ доходила 2 фута; обстоятельство это слѣдуетъ приписать необычайно холодной веснѣ того года (1859), такъ какъ обыкновенно, по увѣренію живущихъ здѣсь сойотовъ, озеро это вскрывается 19—24 мая и замерзаетъ не позже 1-го сентября. Сѣверо-восточная оконечность озера раздѣляется на двѣ большія лопасти, соотвѣтствующія впадающимъ здѣсь истокамъ двухъ другихъ озеръ малаго размѣра и не носящихъ собственного названія. Истокъ, направляющійся съ юго-востока, носитъ названіе Хара-булукъ, а съ сѣверо-востока — Ду-лукъ, образующій маленькое озерко передъ устьемъ въ Ильчиръ; кромѣ того Радде упоминаетъ еще объ одномъ прибрежномъ озерѣ, впадающемъ въ его сѣверо-западный край, называемомъ Тэтѣ-Джоборъ, а Черскій прибавляетъ еще одинъ — Берго-ланта и другой съ юго-восточныхъ горъ, около юго-западной оконечности озера. — Для опредѣленія высоты поверхности Ильчира надъ уровнемъ океана мы располагаемъ цифрами, дающими весьма разногласные результаты: по опре-

дѣленію Радде высота эта колеблется между 6600 и 6700 тогда какъ средняя изъ восьми наблюденій Черскаго, произведенныхъ какъ въ концѣ іюля, такъ и на обратномъ путѣ въ первыхъ числахъ августа, равняется 6124'. Черскій произвелъ также *промѣры глубины Ильчира* (30-го іюля 1873 г. по пяти параллельнымъ линіямъ, поперечнымъ къ наибольшей длинѣ озера, подвигаясь отъ сѣверо-восточной къ юго-западной оконечностямъ его. Въ результатѣ оказалось: 1) что глубина Ильчира увеличивается по направленію къ истоку Иркуты, т. е. къ юго-западу, 2) что въ сѣверо-восточной части озера, судя по двумъ линіямъ *промѣровъ*, въ конфигураціи его дна можно различать слѣды какъ бы трехъ, болѣе и менѣе продольныхъ озеру долинъ, разбѣженныхъ двумя высоченностями, тогда какъ въ юго-западной долины эти соединяются въ одну, болѣе глубокую, съ пологимъ сѣверо-западнымъ и крутымъ юго-восточнымъ склонами; 3) ближе къ сѣверо-восточной оконечности озера, наибольшая глубина подводной долины, ближайшей къ сѣверо-западному берегу, равняется 6 метрамъ (26'), такая же глубина средней долины (по той-же линіи *промѣра*) 11,5 метр. (37'), а юго-восточная только 4,4 метр. (14,4'), тогда какъ разбѣгающія ихъ возвышенія не достигаютъ поверхности воды озера на 2,5 метра (первое) и на 1,7 метр. (юго-восточное); затѣмъ, по линіи второго *промѣра* (отъ устья первой рѣчки) глубина сѣверо-западной подводной долины не измѣняется (6 метр.), ограничивающее ее возвышеніе почвы покрыто слоемъ воды толщиной всего лишь въ 2,5 метра; глубина средней долины уменьшается до 4,4 метр. (14,4'), причемъ часть возвышенности отдѣляющая ее отъ юго-восточной, превращается въ единственный на Ильчирѣ, низменный впрочемъ и небольшой *островъ*, между тѣмъ какъ юго-восточная долина углубляется до 7 метровъ (22,9'). Наконецъ на юго-западъ отъ острова гдѣ дно озера является уже въ видѣ одной долины, линіи *промѣра* отъ устья рч. Жерголанты дала наибольшую цифру

глубины въ 15 метровъ (49,2') причемъ около юго-восточнаго берега обнаружилась здѣсь террасовидная площадь съ наибольшою глубиною только въ 1,8 метра, занимающая нѣсколько болѣе  $\frac{1}{4}$  части ширины озера на этой линіи; затѣмъ, въ 100 саженьяхъ на юго-западъ—34,3 метра (112,5'), а еще ближе къ юго-западной оконечности озера—25,2 метра (82,6'), возвышающіе на начавшееся уже повышеніе дна по направленію къ истоку Чернаго Иркута, такъ что *наибольшая цифра* глубины Ильчира является 34,3 метра (112,5'). По замѣчанію Гартунга Ильчиръ, какъ и вообще всѣ озера, видѣнныя имъ въ Восточной и Западной Сибири, представляетъ слѣды древняго, болѣе обширнаго распространенія, какъ болотъ, тундръ (Тункинъ-нуръ) и кочекъ, такъ и песчанаго наноса на юго-восточномъ берегу, а произведенныя измѣренія показываютъ, что въ случаѣ, если продолжающееся высыханіе озера понизитъ его поверхность на три метра, то въ сѣверо-восточной его части, кромѣ нынѣ существующаго острова, должны появиться еще три, а осушеніе террасовидной площади насчитавъ Жерголанты, уменьшить ширину озера на  $\frac{1}{3}$  часть бывшей. Къ сожалѣнію произведенная Гартунгомъ топографическая съемка Ильчира и озеръ юго-западной части котловины затерялась вмѣстѣ съ другими его бумагами, и отъ него значительно пострадала полнота собранныхъ объ этомъ свѣдѣній.

Ильчиръ, какъ уже замѣтилъ Радде <sup>1)</sup>, весьма богата рыбою, заходящею по веснамъ даже въ мелкіе притоки и то въ такомъ количествѣ, что по свидѣтельству охотниковъ, лошади боятся бродить черезъ эти рѣчки во время лѣта въ нихъ рыбы, которую тогда можно ловить даже котлами, чашами и т. п. Преобладающими являются здѣсь самые обыкновенные виды восточно-сибирскихъ форелей, какъ-то хариусы, ленки и тальмени (*Salmo thymallus*, *coregonus*

<sup>1)</sup> Радде, 1. с. pag. 30.

et fluviatilis); кромѣ того водятся еще налимы и маленькая рыбка, извѣстная у сойотовъ подъ названіемъ «болотенка», которую Радде не могъ однако видѣть; Черскій получилъ одинъ, отчасти поврежденный экземпляръ этой рыбки и переслалъ его Гартунгу, занимавшемуся коллекторскою частью, о судьбѣ этой рыбки въ настоящее время ничего не извѣстно. Не взирая на указанное выше обиліе рыбъ, рыболовство сойотовъ, какъ равно и у окинскихъ бурятъ, находится на весьма первобытной степени развитія и совершается только съ помощью описаннаго выше татура, кромѣ котораго у сойотовъ нѣтъ ни удочекъ, ни сѣтей, ни даже лодки, такъ что промысловъ озера Черскому необходимо было сдѣлать маленькій плотикъ изъ нѣсколькихъ связанныхъ бичевою листочныхъ стволовъ. Одинъ изъ сойотовъ привезъ однажды Тунки нѣсколько рыболовныхъ снарядовъ, извѣстныхъ подъ названіемъ морды, предполагая ловить рыбу въ заѣзкахъ, снаряды эти, въ бытность Черскаго, лежали безъ употребленія на болотистомъ берегу озера и подверглись уже гніенію.

Экскурсія Черскаго вверхъ по истоку Ильчира, впадшему въ его сѣверо-восточную оконечность, обнаружила, за незначительными холмистыми возвышенностями, прегрдающими здѣсь долину озера, но пересѣкаемыми названнымъ ручьемъ, располагается другая, значительно меньшая, ковинообразная долина, занятая четырьмя озерами, изъ которыхъ самое большое достигаетъ развѣ 150 саж. въ діаметрѣ; изъ нихъ беретъ начало этотъ притокъ (по всей вѣроятности тотъ, который у Радде названъ Дучокъ). Долина по словамъ обитающихъ здѣсь сойотовъ, отдѣляется отъ незначительною возвышенностью отъ праваго притока р. Тоя, извѣстнаго подъ названіемъ Булукъ, впадающаго недалеко отъ верховьевъ этой рѣки, состоящихъ по Ковригу изъ двухъ ключей, лежащихъ на с.-в. отъ Ильчира въ разстояніи немногимъ болѣе 10 верстъ (см. ниже). Въ этой сторонѣ (т. е. на с.-в.) долина системы Ильчира замыкается цѣлою

мною какъ болѣе близкихъ, такъ и отдаленныхъ гольцовъ, изъ хорошо видныхъ и съ р. Жерголанты. Наблюдатель, стоявъ лицомъ къ сѣверо-востоку, видитъ съ лѣвой стороны этого ряда сначала болѣе близкіе три гольца, съ довольно острыми вершинами и крутыми склонами, падающими къ сѣверо-западной части долины озера Дучока; за третьемъ изъ нихъ, называемымъ Кундылунъ-убуръ и отличающимся самою острою вершиною, виднѣется часть плоской и террасовидной вершины болѣе отдаленнаго гольца, — вершины, состоящей безъ сомнѣнія изъ мощнаго покрова лавы, такъ какъ черный цвѣтъ, ея въ противоположность остальной части гольца, и всю видимая горизонтальная слоистость, вызвавшая террасовидность склона, достаточно свидѣлствуютъ объ этомъ. Слѣдующая же за лавовою вершиною, прямо передъ наблюдателемъ (с.-в.), замѣчается другой рядъ вершинъ, расположенный по почти меридіональной линіи, слѣдующей къ юго-восточнымъ горамъ Ильчирской долины. На самый отдаленный изъ этихъ гольцовъ, покрытый снѣгомъ, указывали Чернышъ какъ на голецъ, лежащій въ верховьяхъ р. Оспы, по сужденію этой довольно плоской вершины съ небольшимъ пирамидальнымъ пикомъ, одинаково напоминаетъ собою какъ некоторые описанные выше гольцы по лѣвому верховью Оспы, такъ и гольцы праваго берега рч. Саганъ-харъ, но никакъ не Мунку-саганъ; голецъ этотъ отчасти скрывается за болѣе близкимъ, съ округленною вершиною и террасовиднымъ сѣвернымъ склономъ, еще ближе котораго возвышается весьма оригинальная, уединенная, усѣченно-коническая вершина гольца, названная сойотами Малгайтѣй-хардыкъ, т. е. голецъ съ шапкою, потому что уцѣлѣвшая на немъ часть лавоваго покрова дѣйствительно напоминаетъ собою черную шапку; наконецъ четвертый въ этомъ ряду, ближайшій къ горамъ юго-восточнаго берега озера, съ округленною же вершиною и такимъ-же террасовиднымъ сѣвернымъ склономъ, — второй, считая отъ Оспинскаго, называется Унышйинъ-

хардѣкъ, т. е. сирота голецъ, вслѣдствіе его уединеннаго вѣрнѣе обособленнаго положенія; за этимъ рядомъ видѣются уже лишь весьма отдаленныя, отчасти покрытыя снѣгомъ вершины. Поучительность описанныхъ вершинъ, и мнѣнію Черскаго, состоитъ во первыхъ въ томъ, что расположеніемъ своимъ они видимо продолжаютъ современную Ильчирскую долину далеко на сѣверо-востокъ, и со стороны лѣвыхъ притоковъ верховьевъ р. Китоя, гдѣ она постепенно возвышается, и придаютъ всей заключенной между ними мѣстности характеръ одного орографическаго цѣла не взирая на то, что въ частности долина эта является уже значительно преобразованною, бока ея многократно прерваны и расчленены водами смежныхъ здѣсь системъ Иркутка и Китоя, а дно представляетъ неправильныя углубленія, несомнѣнно неизмѣненнымъ, менѣе древнимъ долинамъ. Кроме того и здѣсь, какъ въ окрестностяхъ верховьевъ р.р. Оси и Саганъ-хара, представляются явленія, подробное изслѣдованіе которыхъ должно современемъ дать матеріалъ для исторіи развитія этихъ долинъ. И дѣйствительно, если обратитъ вниманіе на клочки лавоваго покрова 1) въ горѣ около ущелья праваго верховья рч. Толты, т. е. въ горахъ юго-восточнаго берега Ильчирской долины, 2) на гольцѣ-столикѣ, ограничивающемъ эту долину съ юго-запада, затѣмъ 3) въ гольцѣ за Кундылунъ-убуромъ, а наконецъ 4) на Малгатѣй-хандыкѣ, слѣдовательно и въ горахъ сѣверо-восточной оконечности долины,—если прибавить къ тому-же, что лежащій боковой лавы во всѣхъ этихъ мѣстахъ возвышается не менѣе какъ 1300' надъ уровнемъ озера Ильчиря, а по направленію сѣверо-востоку, быть можетъ, и нѣсколько выше и только на сѣверномъ склонѣ гольца-столика опускается до 919' надъ озеромъ, въ долину котораго и въ склонахъ горъ развита только перемежаемость известняка съ хлоритовымъ сланцемъ, гнейсомъ и змѣвикомъ, то всѣ эти данныя позволяютъ полагать, что конфигурація мѣстности въ периодъ, предшествовавшій изверженію лавы, значительно от-

мась отъ современной. Судя по уровню залеганія лавы, можно полагать, что на мѣстѣ многихъ нынѣшнихъ долинъ выступались площади отъ 7436—8470' н. ок., по которымъ вышли продукты вулканическихъ изверженій на протяженіи отъ верховьевъ р. Оспы до юго-западныхъ окрестностей Ильчиря, гдѣ должно было существовать углубленіе или долина, вѣзавшаяся до 7043'. Съ тѣхъ поръ площадь эта успѣла расчлениваться системою долинъ, углубившихся въ ней отъ 1300—2000' и превратившихъ ее въ рядъ альпійскихъ пиковъ и гольцовъ, на вершинахъ которыхъ остались вѣсти лавоваго покрова. Подробное изученіе распространенія остатковъ этой изверженной породы и отношенія ихъ къ выстамъ, не покрывавшимся потоками лавы, позволятъ съ временемъ ознакомиться съ орографическою ролью залитой въ древней площади и такимъ образомъ реставрировать прежнюю конфигурацію этой въ высшей степени интересной местности, причемъ будущіе изслѣдователи не должны упустить изъ виду и упомянутую выше террасовидность сѣверо-западнаго склона гольцовъ юго-восточнаго ряда, сосѣднихъ съ Малгайтэй-хардыку, въ особенности потому, что террасовидныя части этихъ склоновъ располагаются повидимому на одномъ гипсометрическомъ уровнѣ и потому могутъ представить доказательства бывшаго здѣсь весьма высокаго стоянія озерныхъ водъ, — другими словами, существованія въ этихъ мѣстѣ гораздо болѣе обширнаго и значительно болѣе глубокаго альпійскаго озера, нежели современный Ильчирь. Замѣчательно, что даже одинъ изъ сойотовъ, провожавшій Иерскаго отсюда на Алиберовскій графитовый рудникъ, высказывалъ воззрѣніе «стариковъ» на Ильчирь, какъ на остатокъ водъ, распространявшихся прежде на всю описанную нами долину, хотя къ сожалѣнію онъ не знакомъ былъ съ данными, на которыхъ основывалось это мнѣніе. Въ заключеніе свѣдѣній, переданныхъ въ этой главѣ объ Ильчирѣ, упомяну еще, что основаніе склоновъ его долины порастаетъ



лиственничнымъ лѣсомъ, хотя рѣдкимъ и сравнительно малорослымъ, тогда какъ самая долина отличается отчасти степнымъ отчасти тундреннымъ характеромъ, причемъ изъ обитающихъ ее фауны бросаются въ глаза суслики (*Spermophilus Evermanni*), сопровождавшіе нашихъ путешественниковъ уже начиная съ рч. Аро-Хонгодой (см. выше) и зашедшіе сюда очевидно съ долины р. Иркуты, а въ самый день прибытія экспедиціи Ильчирскую долину посѣтилъ даже медвѣдь, явленіе, о которомъ сойоты рассказывали какъ о чемъ-то выходящемъ изъ ряда обыкновеннаго. Сойотскія юрты построены въ трехъ мѣстахъ около самаго озера, имени по обѣимъ сторонамъ юго-западной его оконечности около устья Жерголанты, кромѣ того четвертый улусъ находится еще около озеръ сѣверо-восточнаго притока Ильчиры и только онъ былъ обитаемъ въ бытность Черскаго, тогда какъ остальные оставались пустыми. Всѣхъ-же сойотовъ въ Ильчирѣ было въ то время только 19 человѣкъ, считая въ томъ числѣ и дѣтей.

л) Отъ озера Ильчира до Алиберовскаго рудника.

Оставивъ коллекціи и большую часть лошадей на Ильчирѣ откуда путешественники предполагали возвратиться ближайшимъ путемъ въ Тунку, 1-го августа Черскій отправился далѣе къ сѣверу, чтобы посѣтить графитовый рудникъ Алибера и вмѣстѣ съ тѣмъ заготовить кое-какимъ провіантомъ обитающихъ тамъ сойотовъ, у которыхъ, по словамъ Ильчирскихъ, можно было достать нѣкоторую часть ржаной муки недавно привезенной ими изъ ближайшихъ населенныхъ пунктовъ по р. Бѣлой (см. ниже). Тропа, по которой въ свѣдѣніи Радде <sup>1)</sup>, направляется сначала внизъ по правому берегу Чернаго Иркуты, вообще на сѣ-

<sup>1)</sup> Радде, I. с. pag. 31 и слѣд..

Итека изъ юго-западной оконечности озера въ видѣ рѣчки, она достигающей 2 саж. ширины, Иркутъ многократно вливается по болотистой и тундренной долинѣ, представляющей лишь незначительный наклонъ, которому соответствуетъ и небольшая быстрота теченія въ весьма поверхностномъ руслѣ. Миновавъ устье знакомой намъ уже Толты, впадающей съ лѣвой стороны, пересѣкая затѣмъ низовье Джора, берущаго начало недалеко изъ горъ праваго берега Алты, и впадающаго въ 4 верстахъ отъ Ильчира, тропа проходитъ въ нѣсколькихъ мѣстахъ мимо нараставшихъ еще, небольшихъ впрочемъ полянъ прошлогодняго снѣга, на окраинахъ котораго встрѣчалась весенняя флора а въ одномъ мѣстѣ и кустикъ шиповника, только-что начавшій цвести. Изъ древесной растительности и здѣсь господствуетъ она лишь ливственница.

Спустя другой незначительный и безъимянный правый притокъ Иркута и поровнявшись съ устьемъ упомянутого выше Мунку-булѹка, по которому Радде достигъ оз. Ильчира, и который мы видѣли уже съ высоты гольца-стола, вдали на ю.-з. 30°, путешественники увидѣли бѣлѣющую вершину Мунку-Сардыка; по увѣренію сойотовъ, ее можно видѣть также и съ юртъ около Жерголанты на Ильчирѣ, слѣдому не мѣшаетъ туманъ и облака, скопляющіяся около этого гиганта. Наконецъ, приблизительно въ 10 верстахъ отъ озера, на высотѣ 6055', тропа покидаетъ Иркутъ, поворачивая къ сѣверу, въ почти меридіональную долину низовьевъ праваго притока, извѣстнаго подъ названіемъ Иркутъ-Гарганъ, т. е. иркутскій Гарганъ, въ отличіе отъ Гаргана, впадающаго въ верхнее теченіе р. Оки, верховья которой предполагаются отсюда приблизительно въ 20 верстахъ къ сѣверу, считая по прямому направленію. Иркутъ между тѣмъ принимаетъ постепенный поворотъ къ югу и, воспринявъ съ лѣвой стороны устья обоихъ Тымэликовъ, а затѣмъ приходя изъ Сусеръ-нора, т. е. озера, сосѣдняго съ Окин-

скимъ (см. выше), соединяется уже съ Бѣлымъ Иркутомъ берущимъ начало на Мунку-Сардыкѣ. Въ устьѣ, около лѣваго берега низовьевъ Ирку-Гаргана, Черскій встрѣтилъ переполненный блестками слюды кристаллическій известнякъ съ прожилками кварца; простираніе пластовъ з.-ю.  $10^{\circ}$  паденіе ю.-в.  $10^{\circ}$  съ наклономъ до  $40^{\circ}$ . Достигнувъ рѣчки, ширина которой не менѣе 4 сажени, видъ къ сѣверу дѣлается болѣе открытымъ; по сухимъ частямъ этой довольно широкой долины Радде находилъ въ цвѣту многіе изъ представителей красивой альпійской флоры, какъ-то: *Dracoscephalum altaicense*, *Leucanthemum arcticum*, *Saxifraga oppositifolia*. Далѣе насупротивъ устья праваго притока рѣчки, берущаго начало въ котловинообразномъ расширеніи горъ и называемаго Хорокъ-дудыкъ, на лѣвомъ берегу обнажается гнейзъ вообще съ тѣмъ же простираніемъ (з.-ю.  $20^{\circ}$ ) и паденіемъ (ю.-в.  $20^{\circ}$  съ наклономъ до  $40^{\circ}$ ), какъ и залегающій поверженно известнякъ. Нѣсколько выше этого мѣста, спустя вѣлообразное, продольное къ долинѣ возвышеніе, состоящее изъ россыпи мѣстныхъ кристаллическихъ породъ и происшедшее быть можетъ, отъ размыва наноса вслѣдствіе перемѣщенія русла, долина поворачивается на в.-с.  $30-35^{\circ}$ , считая вверхъ по теченію, а въ горахъ праваго берега обнажается хлоритовый гнейзъ, причемъ Гарганъ принимаетъ здѣсь небольшой клочокъ съ правой стороны. Высота мѣста, по опредѣленію Черскаго, оказалась равною 6300'. Древесная растительность состояла здѣсь изъ лиственницы, рододендрона (*Rh. parvifolium* Ad.) и ерника (*Betula nana*); на болѣе сухихъ мѣстахъ произрастала *Dracoscephalum altaicense*, а сквозь покровъ олеаго мха выставляли синія чашечки генціаны (*G. altaica* Pall.) точно также какъ около берега ручья можно было лютоваться красивыми группами *Trollius* и альпійскаго *Hedysarum* (25—27 іюня, Радде), причемъ по вечерамъ сибирскій бека (*Scolopax stenura*) совершалъ свои шумныя и своеобразныя экскурсіи.

Далѣ долина поворачиваетъ на с.-з. (счетъ вверхъ по теченію), а на высотѣ около 6500' тропа приводитъ къ слиянію обоихъ верховьевъ Ирку-Гаргана, изъ которыхъ лѣвое выходитъ съ с.-з., а правое, ведущее къ перевалу, съ з.-с.-з.; въ этой послѣдней долинѣ достигается высшій пунктъ перемычки (6908' абс. высоты), образующій водораздѣлъ между системою р.р. Иркутъ и Бѣлой, въ разстояніи около 9 верстъ отъ устья Ирку-Гаргана. Это довольно глубокая сѣдловина въ гребнѣ горъ, извѣстныхъ здѣсь подъ названіемъ Ильтѣй-дабанъ и достигающихъ, повидимому, не менѣе 7500' высоты. Относительно орографическаго значенія этой цѣпи существовали довольно разногласныя мнѣнія. Такъ напр. Радде <sup>1)</sup> рассматриваетъ Ильтѣй дабанъ (называемый имъ невѣрно Ултуу а также Снѣжными горами) какъ подчиненный вѣтъ Тункинскихъ альповъ, именуемыхъ имъ Саяномъ, причемъ полагаетъ, что къ востоку вѣтъ эта соединяется съ Тункинскими альпами около верховьевъ Ихэ-угуна (Екинъ у Радде). Затѣмъ Кропоткинъ, непосѣтившій впрямую этой мѣстности <sup>2)</sup>, говоритъ объ Ильтѣй-дабанѣ, какъ о водораздѣлѣ между системою р.р. Бѣлой и Китою, но западную продолженіемъ Китайскихъ альповъ онъ считаетъ цѣпь горъ, видѣнную имъ на широтѣ Алиберовскаго рудника, къ востоку отъ него, причемъ однако оба путешественника эти сообщаютъ, что Ильтѣй-дабанъ направляется съ запада на востокъ. Вопросъ о дѣйствительномъ значеніи Ильтѣй-дабана, изъ тѣхъ орографическихъ и картографическихъ данныхъ, которыми могли пользоваться названные изслѣдователи, рѣшася дѣйствительно не легко; съ тѣхъ поръ однако, какъ маршрутъ Черскаго показалъ во-первыхъ, что долина Ильчира располагается почти на одной широтѣ съ Китайскою около знаменитаго намъ Саганъ-хара, затѣмъ, что гребень Тункинскихъ

<sup>1)</sup> Радде, 1. с. pag. 32.

<sup>2)</sup> Кропоткинъ. Зап. Сиб. Отд. Геогр. Общ. Т. IX и X, стр. 41.

альповъ продолжается на западъ во всей его красотѣ поперекъ верховьевъ долины рч. Толты, около близкихъ отъ нея источниковъ Ихэ-угуна, слѣдовательно южнѣ Ильчира, съ тѣхъ поръ дѣлается очевиднымъ что западное продолженіе Китайскихъ альповъ, пересѣченныхъ Черскимъ сначала по р. Китойкину, а затѣмъ въ верховьяхъ Оспы и Саганъ-хара, слѣдуетъ искать въ горахъ, лежащихъ лишь немногими сѣвернѣ Ильчирской долины, а такой именно и является цѣпь, водораздѣльная часть которой, на меридіанѣ Ирку-Гаргана, носить названіе Ильтэй-дабанъ. Цѣпь эта, отличаясь здѣсь значительно болѣе мягкими и округленными контурами, нежели параллельная ей Тункинская, слѣдуетъ востокъ почти прямолинейно къ Мунку-саганъ-хардыку, т. е. къ верховьямъ р. Оспы, образуя своимъ южнымъ подножіемъ горы сѣверо-западнаго берега Ильчира. На западѣ, согласно Радде, высота Ильтэй-дабана замѣтно уменьшается по мѣрѣ приближенія къ правому берегу верхняго теченія р. Окутѣмъ не менѣе, по замѣчанію Черскаго, суженіе р. Окутѣмъ описанное Кропоткинымъ въ 4-хъ верстахъ ниже Норинт-Хоройскаго караула, располагается почти съ точностію на одной широтѣ съ Ильтэй-дабаномъ, и потому орографическое продолженіе Китайскихъ альповъ достаточно замѣтно еще и въ хребтѣ, пересѣкаемомъ Окою около названнаго пограничнаго поста, но никакъ не на широтѣ графитнаго ручья, лежащаго на слишкомъ 30 верстѣ къ сѣверу.

Около самаго перевала, гдѣ долина верховья Ирку-гаргана принимаетъ нѣсколько болѣе меридіональное направленіе мѣстность является почти лишенною растительности; на высшей точкѣ, около тропы, и здѣсь нагромождена не малая куча жертвенныхъ камней, около которой остановились и наши путешественники для обязательнаго жертвоприношенія. И въ этотъ разъ однако, соображаясь съ весьма плачевнымъ состояніемъ провіанта, союоть, провожавшій Черскаго, долженъ былъ ограничиться въ сущности лишь выраженіемъ искрен-

него желанія угостить хангаю, и потому закуренная имъ трубка, хотя и подымалась къ небу съ приличными случая молитвами и приглашеніями («*татышъ-тэ байнь хангай*», т. е. курите богатый властелинъ), но табакъ не вытряхивался уже на скалу, а напротивъ, смѣшанный еще на Ильчирѣ съ листовною корою. съ цѣлью по возможности продлить существованіе ничтожныхъ остатковъ этой специн, онъ съ жадностью былъ выкурень всѣми членами экспедиціи.

Съ перевала открылся видъ на весьма крутой сѣверный склонъ его, занятый небольшимъ правымъ притокомъ р. Хоркъ, слѣдующимъ сѣверо-западному направленію. Притокъ этотъ называется И л ь т ѣ й-д а б а и нъ-ж е л г а, онъ вскорѣ поворачивается на з.-с. и соединяется съ Хоркомъ, протекающимъ съ ю.-з. На перевалѣ и на крутомъ его сѣверномъ склонѣ обнажается гнейсъ, простираніе пластовъ котораго въ выступѣ, сдвинутомъ по всей вѣроятности, оказалось с.-в., 30° съ паденіемъ на в.-ю. 30° подъ угломъ до 45°. Здѣсь же, благодаря значительной влажности отъ обилія тающего снѣга <sup>1)</sup>, произрастаютъ кедры; въ кустахъ, въ августѣ мѣсяцѣ. Черскій встрѣтилъ много черной смородины съ неспѣлыми еще ягодами; что-же касается лиственицы, то она преобладаетъ уже въ долинѣ Хорка, на высотѣ 5304', достигая нерѣдко гигантскихъ размѣровъ. Начиная съ этой высоты, въ началѣ меридіональное теченіе Хорка поворачивается на с.-в., а вскорѣ и на с.-з., гдѣ рѣка эта принимаетъ лѣвый безымянный притокъ съ ю.-з., нѣсколько ниже котораго въ долинѣ, на высотѣ 5168', располагаются пустыя сойотскія орты. Въ долинѣ наблюдаются здѣсь наносные бугры съ характеромъ остатковъ прежде сплошнаго отложенія, расчлененнаго впослѣдствіи размывомъ; въ нѣкоторыхъ разрѣзахъ можно видѣть гальку, перемѣшанную съ пескомъ. Обнаженія кристаллическихъ породъ наблюдались только на болѣе зна-

---

<sup>1)</sup> Радде, I. с.

чительныхъ высотахъ, приче́мъ падене́е пластовъ, прежде во  
обще южное, принимаетъ здѣсь уже, повидимому, противу  
положный наклонъ (см. также ниже). При вообще сѣверо-  
западномъ направленіи, Хорокъ ниже первыхъ юртъ при-  
нимаетъ съ лѣвой стороны рѣчки Богрѣй-желга и Зу-  
гулунтѣй-желга, въ промежуткѣ между которыми, съ  
правой стороны, въ него изливается рч. Туглұ-хошѣ съ  
расположенными около ней пустыми-же юртами. Далѣе, гдѣ  
Хорокъ направляется на с.-с.-з., въ него впадаетъ еще одинъ  
правый притокъ, называемый Жаглѣкъ (тоже Жаглыкъ)  
точно также съ юртами, ниже которыхъ, на высотѣ 5298  
замѣчаются ясныя слѣды высохшаго озера съ протекавшимъ  
по нему низовьемъ незначительнаго праваго притока Хорка  
начиная съ котораго рѣка постепенно поворачивается на сѣ-  
веро-востокъ, обнаруживая въ долинѣ песчаный наносъ. Бродъ  
на лѣвый берегъ Хорка совершается нѣсколько выше горы  
извѣстной подъ названіемъ Хара-толгѣй (черная вершина  
или голова), гдѣ обнажается сѣрый доломитъ, послѣ чегъ  
тропа приводитъ къ мѣстности, извѣстной подъ названіемъ  
Газыры-аманъ (*газыры* означаетъ земляной, тогда какъ  
*аманъ* или *амынъ* есть устье или ротъ), неправильно назы-  
ваемой у Радде (Газыра-аманъ), а отчасти и у Кропоткина  
(Газыра-аманъ). Мѣстность эта упоминалась уже нами при  
описаніи пути съ р. Оки на Хорокъ, по рч. Каштакъ  
впадающей въ Оку съ правой стороны и посѣщенной какъ  
Крыжинымъ въ 1858 г., <sup>1)</sup> такъ Радде (1859 г. I. с.), такъ  
затѣмъ и Кропоткинымъ (1865 г. I. с.). Въ верховьяхъ Каш-  
така, какъ описываетъ послѣдній изъ названныхъ путеше-  
ственниковъ, находится нѣсколько озеръ «уходящихъ въ из-  
вестняки, составляющіе подпочву», слѣдовательно неимѣю-  
щихъ видимаго истока, вслѣдствіе чего мѣстность эта, при

<sup>1)</sup> Крыжнинъ, Труды Сиб. Экспед. И. Р. Геогр. Общ. Матем. отдѣл.  
1864 г. стр. 81.

исчезающая къ лѣвому берегу долины Хорка, высота которой, по опредѣленію Черскаго, достигаетъ здѣсь 5231' высоты и носить упомянутое выше названіе. Черскій видѣлъ здѣсь противъ того небольшой ключикъ, исчезающій въ образовавшемся въ известнякѣ провалѣ, и нѣсколько сухихъ уже руселъ; у подножія этой каменистой возвышенности вытекаетъ другой еще ключъ, омывающій ее и впадающій въ Хорокъ. Здѣсь-же глазъ путешественника привыкшій видѣть одну лишь образцово-дикую природу, пріятно поражается сначала одинокими крестами, изъ которыхъ на второмъ прибиты указатели сходящихся здѣсь двухъ дорогъ, съ надписями: въ Гарганъ (т. е. въ Норинъ-Хороійскій караулъ на р. Окѣ) и въ Монды (слѣдовательно, черезъ Ильтѣй-дабанъ въ Хантискій караулъ на р. Иркутѣ).

Отсюда, въ противоположность замѣтно понизившимся горахъ между Ильтѣй-дабаномъ и Газыры-аманъ, на сѣверъ отъ гребня, видѣется цѣлый рядъ гольцовъ, которые, какъ видно изъ приведенныхъ выше изслѣдованій Черскаго, неправильно считались западнымъ продолженіемъ Китайскихъ альповъ (Брижинъ, Кропоткинъ), а представляютъ собою параллельную имъ не самостоятельную и болѣе сѣверную цѣпь. Судя по занимаемой ею широтѣ мѣста ( $52^{\circ} 21' 19''$ ), цѣпь эта должна быть въ дѣйствительности продолженіемъ той альпійской гряды, которая сопровождаетъ собою лѣвый берегъ р. Богдашки (см. выше) и располагается, какъ сказано выше, сѣвернѣе Ниланъ-сарамы, съ высоты котораго гребень Китайскихъ альповъ видѣется къ югу, слѣдовательно, въ такомъ-же отношеніи, какъ Ильтѣй-дабанъ (приблизительно  $52^{\circ} 6' 15''$  сѣв. шир.) къ описываемому мѣсту около долины Хорка. Въ противоположность Китайскимъ альпамъ, образующимъ водораздѣлъ между р.р. Китоємъ (отчасти Иркутомъ) и Билою, альпійская гряда эта названа Черскимъ Бѣльскими альпами, такъ какъ она орошается, а въ боль-



шинствѣ случаевъ и пересѣкается системою притоковъ Бѣлой, и только въ западной оконечности, гдѣ названна цѣпь должна была бы примкнуть къ сѣверо-западному склону Эргикъ-Таргакъ-Тайга, ее перерѣзываетъ р. Ока, макируя связь между этими цѣпями. Въ ряду видимыхъ оскода гольцовъ различается уже и Ботугольскій, съ его графитовыми залежами, и восточный его сосѣдь, — Хашгольскій (у Раде неправильно: «Кошогольскій»), похожій на него очертаніемъ вершины.

Нѣсколько сѣвернѣе Газыра-аманъ, откуда путешественникъ вступаетъ уже на дорогу, ведущую къ руднику и направлявшуюся по мѣрѣ возможности владѣльцемъ графитовыхъ копей, Хорокъ отклоняется къ с.-в., гдѣ, въ разстояніи около 40 (?) верстъ послѣ сліянія съ болѣе сѣвальною рѣкою Хоншинъ (см. ниже), образуетъ собою р. Урикъ правый притокъ р. Большой Бѣлой, какъ это подтверждаю и живущіе по Хоншину сойоты. Поэтому мнѣніе Раде согласно которому Хорокъ составляетъ правый притокъ «Алара» <sup>1)</sup> слѣдуетъ считать недоразумѣніемъ; возникши по мнѣнію Черскаго, вслѣдствіе неумѣнія сойотовъ объясняться на русскомъ языкѣ, и потому на вопросъ, куда впадаетъ эта рѣчка, они могли отвѣтить, что по ней выѣзжаютъ въ Аларъ, т. е. въ предѣлы такъ называемой Аларской степной управы, между тѣмъ какъ рѣчка того-же имени здѣсь не существуетъ. — Удаляясь отъ лѣваго берега долины Хорока дорога направляется къ сѣверу и, переваливъ черезъ сравнительно узкій отрогъ, достигающій до 5500' высоты, спускается въ долину рч. Хагархай (иначе Тагархай) гдѣ, на высотѣ 5375', построена юрта для отдыха путешественниковъ послѣ въ высшей степени болотистаго и неудобнаго пути отъ Газыра-аманъ. Кедръ является здѣсь прѣобладающимъ древеснымъ растеніемъ, къ которому поди

<sup>1)</sup> Раде, I. с. pag. 34.

живаются оба рододендрона и *Osmanthus fragrans*. Тагархай направляясь вообще на в.-ю.-в., образует собою лѣвый притокъ удалившагося на нѣсколько верстъ отсюда Хорка, какъ объ этомъ впервые писалъ Кропоткинъ, оспаривая прежнее извѣщеніе Крыжина, на основаніи котораго Тагархай значится однимъ изъ верховьевъ Китою на картѣ астронома Шварца. У Раде Тагархай названъ Холтогѡномъ, названіе употребляемое должно быть рѣдко, такъ какъ всѣ мѣстные и Ильирскіе сойоты его не употребляютъ.

м) Ботугольскій голецъ и Адигеровскій рудникъ.

Отъ юрты на Тагархай, отъ которой до Ильтѣй-дабана считается 20 верстъ, а къ шахтѣ рудника 13 верстъ, слѣдуютъ двѣ дороги. Одна широкая, проложенная Алиберомъ, ведетъ черезъ верховье Тагархая прямо на Ботугольскій голецъ, къ шахтѣ (13 верстъ); по ней слѣдовали всѣ перекочеванные путешественники, а на обратномъ пути и Черскій, тогда какъ въ передній путь, желая обогнуть голецъ со всѣхъ его сторонъ, Черскій направился сначала внизъ по рч. Ханголь, ограничивающей голецъ съ юго-востока и впадающей съ правой стороны въ упомянутую выше рч. Ханшинъ, образующую вмѣстѣ съ Хоркомъ рѣку Урикъ, затѣмъ нѣсколько вверхъ по Ханшину и наконецъ по ея правому притоку Ботугѡлу: этотъ послѣдній, ограничивая голецъ съ сѣверо-запада, даетъ ему вмѣстѣ съ тѣмъ и свое названіе, хотя голецъ этотъ (неправильно «Бутогольскій» у Кропоткина) именуютъ еще Алиберовскимъ, а у сойотовъ въ извѣстенъ нынѣ подъ именемъ Харандашкинъ-харинъ, т. е. Графитовый голецъ («харандашъ» — испорченное русское слово *карандашъ*, т. е. графитъ). Въ нижеслѣдующемъ описаніи этой мѣстности мы прослѣдимъ сначала маршрутѣ Черскаго, присоединивъ впослѣдствіи и свѣдѣнія, собранныя другими путешественниками.

Съ юрты на рч. Тагархай (5375') трѣпа поднимается сначала вверхъ по правому берегу незначительнаго и безымяннаго лѣваго притока этой рѣчки, придерживаясь меридіональнаго направленія до высшей точки перевала (5820'), за которымъ сейчасъ же наблюдаются верховья Хашигола въ видѣ трехъ небольшихъ ключей (5728'). На этомъ пути въ обнаженіяхъ встрѣчался одинъ лишь хлритовый сланецъ съ простираниемъ, измѣняющимся отъ в.-10° (система Тагархая) до в.-с, 20° и з.-в. (верховья Хашигола), съ паденіемъ въ обоихъ случаяхъ на сѣверъ (с.-10°, с.-в. 20° и с.) и наклономъ въ 65°, причемъ по Хашиголу пласты мѣстами являются извилистыми, обнаруживая діагональную слоистость, а мѣстами и сдвиги. Узкая лѣссная и мрачная долинка Хашигола (у Радде не правильно «Кошоголъ»), достигаетъ въ длину около 13 верстъ, ограничена сначала вообще сѣверо-восточнымъ направленіемъ и значительною глубиною, вслѣдствіе чего она плохо освѣщается солнцемъ и порослаетъ мхомъ. Въ нѣсколькихъ местахъ ниже верховьевъ и перваго ея безымяннаго притока на высотѣ около 4984', въ нее открывается съ лѣвой стороны долинка, извѣстная подъ названіемъ Харандайкинъ-барунъ-желгъ (*барунъ* означаетъ западъ, *желай* и *желмай*—долина на бурятскомъ языкѣ). Верховья этой долины, съ которыми мы ознакомимся ниже, располагаются одной изъ сѣдловинъ Ботугольскаго гольца, вблизи отъ верховьевъ рч. Ботуголь. Далѣе, спустя еще одинъ, незначительный правый притокъ, ниже котораго, въ выходахъ на лежащаго склона Графитоваго гольца замѣчается кристаллическій известнякъ съ блестками графита и отвѣсныя пласты (простирание з.-в., паденіе иногда 85° на ю). Хашиголь поворачиваетъ на с.-з., гдѣ онъ воспринимаетъ второй лѣвый притокъ изъ долины, называемой Харандайкинъ-наңэ-желгъ (*наңэ* означаетъ *ближайшая*); она беретъ начало въ болѣе сѣверной сѣдловинѣ Ботугольскаго

гольца, вблизи от верховья одного из правых притоков соименной рѣчки (см. ниже). Ниже устья желги, среди известковой толщи, задегаетъ пластъ сланца бурого цвѣта (остался неопредѣленнымъ), простирающійся на з.-с.  $20^{\circ}$  и выходящій на с.-в.  $20^{\circ}$  съ наклономъ  $65^{\circ}$ ; долина Хашигола между гѣмъ, на высотѣ 4000', дѣлаетъ поворотъ на сѣверо-востокъ и сѣверъ, причемъ въ нее впадаетъ съ правой стороны ключъ Хартѣй-желгá, ниже котораго тропа, оставшая устье Хашигола къ с.-в., пересекаетъ заостренный и низкій конечный отрогъ предгорья Ботугольского гольца (3882') и спускается въ долину р. Ханшинъ, ограничивающую сѣверный склонъ этой горы (иначе Ханшá, у Радде неправильно: Канча). Долина этой рѣчки, располагаясь здѣсь на высотѣ 3714', направляется съ з. на в., къ устью Хашигола, нѣсколько выше котораго она принимаетъ лѣвый притокъ, извѣстный подъ названіемъ Зодѣ. Значительная ширина долины, ея открытость, и луговой характеръ и положеіе бѣлой березы значительно контрастируетъ съ мрачными пейзажами Хорка и Хашигола; видъ скошеннаго сѣна моискихъ юртъ еще болѣе оживляетъ картину, а верстахъ трехъ выше насупротивъ устья рч. Ботуголь, вниманіе путешественника обращаетъ на себя весьма изящная берѣзка, — очевидный плодъ высшей культуры, не предполагающейся въ столь дикихъ мѣстностяхъ. Это бесѣдка Алибера, сидѣвшаго здѣсь какъ во время прогулокъ изъ своего образцоваго рудника, такъ и послѣ осмотра сѣнокосныхъ мѣстъ р. Ханшинъ, уровень которой около устья Ботугола определенъ Черскимъ въ 3799'; здѣсь-же въ свою очередь выдѣляется крестъ въ видѣ не менѣе рѣзкаго контраста съ окружающими принадлежностями шаманства, находящимися въ сѣверныхъ сойотскихъ юртахъ.

Дорога, уже широкая и весьма хорошо устроенная, поворачиваетъ въ Ханшинъ, протекающій съ сѣверо-запада, и поворачиваетъ на юго-западъ, вверхъ по достаточно широкой

здѣсь и открытой долиной низовьевъ рч. Ботуголь, въ краяхъ лѣваго берега которой, какъ и на Ханшинѣ, въ томъ мѣстѣ, гдѣ Черскій вошелъ съ Хашигола, бѣлѣются розсыпи и выходы известняка. Такимъ сѣверо-восточнымъ направлениемъ долина Ботугола отличается на протяженіи нѣсколькихъ верстъ, до соединенія съ нею долинки праваго притока называемаго Ботуголь-зунъ-желга (зунъ — восточный). Ключъ этотъ беретъ начало вблизи знакомаго намъ уже лѣваго притока Хашигола — Харандашкинъ-нанъ-желга (см. выше направляясь на с.-с.-з. (с.-з.  $30^{\circ}$ ), къ долиной Ботугола, съ которой весьма хорошо обрисовывается уже профиль Графитоваго гольца, сначала въ видѣ ближайшаго къ долиной, широко и плоско-куполообразнаго массива, рядомъ съ которымъ южнѣе наблюдается небольшое и, повидимому, болѣе низкое куполообразное вздутіе, примыкающее къ еще болѣе южной сравнительно узкой, незамѣтно болѣе высокой, притупленной конической вершинѣ. Выше устья Зунъ-желги долина Ботугола отклоняется на з.-ю.-з. (считая вверхъ по теченію), затѣмъ поворачивается на ю.-ю.-з. гдѣ, въ разстояніи около 5 верстъ отъ Ханшина, на высотѣ 4239' н. ок. по опредѣленію Черскаго, и 4920' по Крыжину и Кропоткину, располагается Займка Алибера. Она состоитъ изъ весьма удобнаго и большаго дома владѣльца рудника и помѣщенія для лошадей и скота, который пригонялся сюда съ р. Бѣло и содержался для прииска. По серединѣ большаго двора займки построена высокая и просторная юрта съ стеклянными большими окошками, вообще по типу, непринятому здѣшнихъ номадовъ; юрта эта назначена Алиберомъ для сойота, служащаго караульнымъ на рудникѣ: онъ обиталъ въ ней и въ бытность Черскаго, завѣсивъ окошки тряпьемъ какъ излишнюю по его мнѣнію и не принятую у нихъ прелесть. Здѣсь-же еще въ 1859 г. Радде могъ видѣть успѣшные опыты разведенія нѣкоторыхъ огородныхъ овощей, какъ то: нѣсколькихъ породъ редиски, рѣдьки, картофеля и даже капусты.

Изъ домашнихъ животныхъ здѣсь были, кромѣ лошадей, овцы и бараны, которыхъ Черскій въ 1873 г. нашелъ въ числѣ 40 штукъ (20 коровъ и столько же барановъ), собаки, кошки и породистыя, хохлатыя куры, погибшія вскорѣ послѣ оставленія пріиска Алиберомъ, и потому Черскій не сталъ уже здѣсь ни одного изъ трехъ послѣднихъ животныхъ. Чтоже касается коровъ и барановъ, то оставленные нѣсколькимъ сойотамъ животные эти заставили ихъ принять болѣе осѣдлый образъ жизни, избирая мѣсто удобное какъ для пастбища, такъ и для сѣнокоса, тогда какъ часть сойотовъ, не получившая рогатаго скота, до сихъ поръ кочуетъ въ верховьяхъ Ханшина, пользуясь обиліемъ произрастающаго тамъ амьняго мха. По наблюденіямъ Радде климатическія условія Ботугола не остались безъ вліянія на нѣкоторыхъ изъ переселенныхъ сюда животныхъ, дѣйствуя главнымъ образомъ на ихъ половыя отправления и то преимущественно на собакъ, кошекъ и птицъ; такимъ образомъ курицы начинали нѣсь нестись только въ концѣ мая, — опаздываніе, которое являлось въ проявленіи половыхъ инстинктовъ и другихъ названныхъ животныхъ <sup>1)</sup>. Высоту займки, расположенной на предѣлѣ произрастанія березы, Радде опредѣляетъ въ 5500', довершая этимъ несогласіе въ барометрическихъ цифрахъ всѣхъ имѣющихся до сихъ поръ высотъ этого пункта (4239, 4920 и 5500'), максимумъ колебанія между которыми достигаетъ 1261', тогда какъ средняя равняется 4886'.

Какъ на одну изъ замѣчательнѣйшихъ работъ, произведенныхъ Алиберомъ, нельзя не указать на широкую (до 3 сажень) и длинную (слишкомъ 2 версты?), зигзаговидную дорогу, ведущую изъ займки на вершину Ботугольскаго гольца, гдѣ находится рудникъ: это плодъ двѣнадцатилѣтняго труда, стоимость котораго оцѣниваютъ въ 2 рубля за каждый вершокъ ширины дороги <sup>2)</sup>. Не взирая на значительную кру-

<sup>1)</sup> Радде, I. с. pag. 65.

<sup>2)</sup> Радде, I. с.

тизну и скалистость склопа гольца, дорога эта, красиво извиваясь, дает настолько пологий путь, что по ней сравнительно удобно могут подыматься телѣги и сани; къ тому-же между каждымъ изъ двухъ поворотовъ устроена двойная дорога и потому, въ случаѣ необходимости разѣхаться двумъ партіямъ, идущимъ въ противоположномъ направленіи, или-же если одна изъ этихъ дорогъ занесется снѣгомъ, то представляется возможность проѣхать по другой. Производитель этой гигантской работы къ тому-же недовольствовался одною линейною утилитарною стороною: изящество и эстетическое разнотіе замѣтно на каждой пяди дороги, борты которой, когда они не обрамлены склономъ обнаженныхъ скалъ гольца, обведены весьма красивымъ больверкомъ, сложеннымъ изъ каменныхъ плитъ и играющимъ роль перилъ; въ соотвѣтственномъ мѣстѣ построена приличная бесѣдка, а еще выше крестъ, въ свою очередь съ приспособленіями для отдыха. Дорога эта даетъ вмѣстѣ съ тѣмъ удобный случай для ознакомленія съ геогностическимъ строеніемъ гольца со стороны Ботугола, благодаря многимъ искусственнымъ на ней обнаженіямъ. Такимъ образомъ на первомъ зигзагѣ, недолго до воротъ Черскій наблюдалъ выходы сѣраго, слоистаго, иногда слащеваго, мелкозернистаго известняка, мѣстами побурѣла отъ разложенія находящагося въ немъ колчедана, причемъ въ породахъ замѣчались и графитовыя блески. Также порода выступаетъ и за воротами, лежащими на 345' выше юр. въ заимкѣ, причемъ попадаетъ и россыпь крупнокристаллическаго сіенита; на высотѣ 423' можно видѣть, что сіени этотъ образуетъ какъ небольшія, такъ и болѣе значительныя гнѣзда въ известнякѣ, принимающіи и крупнокристаллическое сложеніе, причемъ появляются уже прослойки графита, достигающія нѣсколькихъ дециметровъ толщины. Промежность выходовъ известняка и сіенита продолжается и до высшей точки гольца, причемъ до высоты упомянуты выше бесѣдки (1156' надъ заимкою) можно наблюдать и пр

стираніе пластовъ, измѣняющееся здѣсь отъ з.-ю. 20° черезъ з.-в. до з.-с.-з. съ соответственнымъ паденіемъ на сѣверъ и наклономъ до 70°, а въ одноѣхъ мѣстѣхъ поверхность известня около дороги является весьма хорошо сглаженною и представляетъ слѣды изборозженія, на которые слѣдуетъ обратить вниманіе будущимъ изслѣдователямъ; такъ Черскій, излѣзшій эту шлифованную поверхность, не придавалъ ей въ то время особеннаго значенія и лишь въ послѣдствіи запозналъ въ ней не что либо искусственное, а результатъ дѣйствія древнихъ ледниковъ. Съ различныхъ высотъ этой дороги можно удобно видѣть и все верхнее теченіе Ботугола, измѣняющее выше займки двумя волнообразными изгибами вообще на ю.-в., а въ самыхъ верховьяхъ и на востокъ, являя вверхъ по теченію, гдѣ, какъ сказано было выше, источники его располагаются вблизи отъ Хашитольской Харндашкинъ-барунъ-желга, такъ-что главная часть Ботугольскаго гольца, собственно графитовый голецъ, располагается между названными долинами съ одной стороны и долинами Харндашкинъ-нанъ-желга съ Ботуголь-зунъ-желга съ другой. Въ этой части теченія (выше займки) рч. Ботуголь принимаетъ три лѣвыхъ притока, берущихъ начало въ сосѣднихъ мѣстахъ, отличающихся нѣсколько болѣе ломанными контурами вершинъ и отчасти воронкообразными вымоинами въ склонахъ, и одинъ правый притокъ, — ключикъ, изливающейся въ промежуткѣ между среднимъ и нижнимъ лѣвыми притоками. Наконецъ, на высотѣ 1724' надъ займкою (по опредѣленію Черскаго), располагается отверстіе шахты рудника (52°21'19" с. ш. и 118°22' в. д., по опредѣленію Крылова), а по ея сосѣдству и другія постройки, возведенныя Алиберомъ на вершинѣ гольца, длинная ось которой направляется на с.-с.-з. Крайнею сѣверною постройкою является маленькая, но весьма красиво отдѣленная часть, богато убранная внутри; южнѣе и въ нѣкоторомъ разстояніи отъ нея возвышается весьма удобный и не менѣе



изящный домъ Алибера (1689' надъ займкою) съ верандою и садикомъ на восточной его сторонѣ и отдѣльною общиною кухнею и людскою на западной; южнѣе между тѣмъ располагается упомянутая выше шахта съ возведенною на ней красивою постройкою съ цвѣтными стеклами и флюоромъ съ надписью: 1847 года. Застроенныя мѣста эти, какъ равно и соединяющія ихъ дорожки, отличаются гладкостью и ровностью шоссированной почвы и обведены возвышенными барьеромъ, сложеннымъ изъ кусковъ пустой породы, добываемой изъ шахты, такъ-что вся эта часть поверхности гольца напоминаетъ собою клумбу, въ которой роль дерева обрамляющаго дорожки, играютъ упомянутыя выше каменные сооруженія. Менѣе изящныя постройки, какъ напр. баня, отнесены ближе къ западному склону. Относительно барометрически опредѣленныхъ высотъ Ботугольскаго гольца существуетъ почти такое-же разногласіе, какъ мы указали и для высоты займки. Наблюденія Черскаго (5963') и Кропоткина (6740') даютъ самыя меньшія цифры для шахты, т. е. для сѣверной вершины гольца, тогда какъ у Радде (7135' и Сборнику высотъ Кропоткина) и Крыжина (7190' потому что Сборн.) получены самыя большія, изъ которыхъ по исправленіямъ введеннымъ Кропоткинымъ, вѣроятною высотой этой части гольца слѣдуетъ считать 7150'. Для средняго купола Черскій получилъ 6030', между тѣмъ какъ южная вершина гольца, на которой поставленъ крестъ, достигаетъ, по наблюденіямъ Крыжина, 8150' высоты. Высота положенія бани на западномъ склонѣ гольца, опредѣлена Кропоткинымъ 6680'.

Относительно исторіи развитія Ботугольскаго рудника Кропоткинъ <sup>1)</sup> передаетъ, что графитъ этотъ извѣстенъ былъ уже до 1842 года, въ которомъ, по указаніямъ нѣкоего Черпанова, крестьянинъ Кобелевъ добылъ здѣсь 30 пудовъ

---

<sup>1)</sup> Кропоткинъ, Зап. Сиб. Отд. I. с.

графита и доставилъ его въ Иркутскій солеваренный заводъ за плату по 2 рубля за пудъ. Но графитъ этотъ, добывавшійся по всей вѣроятности съ поверхности, былъ не высокаго качества, смѣшанъ съ известью и пескомъ, и по пробѣ, сдѣланной ему на Тельминской фабрикѣ, для огнеупорныхъ горшковъ оказался совершенно негоднымъ. Приискъ этотъ, принадлежавшій тогда Черепанову, купленъ былъ за 300 рублей прѣхавшимъ въ 1846 г. въ Восточную Сибирь тавастисскимъ купцомъ Алиберомъ, который въ 1847 г. и приступилъ къ предварительной развѣдкѣ мѣсторожденія. Какъ видно изъ записки самого Алибера, напечатанной въ изданіяхъ Географическаго Общества за 1854 г. <sup>1)</sup>, въ продолженіи первыхъ лѣтъ разрабатывались верхніе слои прииска, хотя при этомъ добыто большое количество искомаго минерала, но качество его все еще не соответствовало ожиданіямъ. Настойчивость, съ которою Алиберъ принялся за это дѣло, заставляла его продолжать работу даже и тогда, когда вслѣдствіе семи-лѣтнихъ затратъ и трудовъ, гнѣздо графита вдругъ совершенно выработалось, оставивъ послѣ себя лишь незначительныя прожилки въ сіенитѣ, изъ котораго онъ добывался.

Работа не прекращалась въ едва сокрушимомъ сіенитѣ и наконецъ, въ первыхъ числахъ февраля 1854 года, послѣ издержки 80 тысячъ рублей, боковою развѣдкою, извѣстною подъ названіемъ Маринской, встрѣчена громадная залежь графита, достоинство котораго, какъ оказалось, ничѣмъ не уступало знаменитому Кумберлендскому (Бороудель). Крѣпость и плотность минерала оказалась настолько значительною, что позволяетъ изъ него выпиливать тончайшіе штифты и пластинки, между тѣмъ чистота графита, вмѣстѣ съ пылеобразнымъ состояніемъ содержащихся въ немъ примѣсей, дѣ-

<sup>1)</sup> Алиберъ, Вѣстникъ И. Р. Геогр. Общ. 1854 г. ч. XI, смѣсь, стр. 9.

ласть приготовленный изъ него карандашъ мягкимъ, употребляющимъ резинѣ, но не легко стирающимся отъ прикосновенія другихъ тѣлъ, причемъ и относительно цвѣта черн карандаши эти оказались выдерживающими всякую конкуренцію. Химическіе анализы Ботугольскаго графита, произвѣдены были различными, какъ русскими, такъ и иностранными учеными, пользовавшимися очевидно образцами его одинакаго достоинства, на что указываетъ разногласіе въ процентномъ содержаніи опредѣленнаго ими углерода (отъ 75,65 до 96,3%).

Первое, хотя и приблизительное опредѣленіе процентнаго содержанія углерода въ ботугольскомъ графитѣ было сдѣлано Кокшаровымъ <sup>1)</sup> и оказалось равнымъ около 75,65<sup>0</sup> но первый полный анализъ былъ сдѣланъ Пузыревскимъ въ 1856, который далъ слѣдующіе результаты: С — 84,08<sup>0</sup> Н — 3,77%, Si — 10,98%; кромѣ того оказались слѣды Fe Ca и Mn; уд. вѣсъ 2,26 — 2,31.

Болѣе подробный анализъ графита произведенъ въ томъ же году Ауэрбахомъ <sup>2)</sup> въ Москвѣ, причемъ тѣмъ же авторомъ указаны и его физическія свойства, откуда мы заимствуемъ слѣдующее описаніе: Ботугольскій графитъ встречается въ трехъ кристаллографическихъ разностяхъ: 1) рѣд находится онъ въ довольно большихъ кристаллахъ (10 м длины при 5 мм. шир.) стального цвѣта; кристаллографическая форма этой разности не могла быть точно определена, но во всякомъ случаѣ она отличается отъ той, въ которой обыкновенно кристаллизуется графитъ, именно въ нестигманныхъ таблицахъ. Эти кристаллы съ прекрасно вырѣ-

---

<sup>1)</sup> Кокшаровъ, Verhandl. d. mineral. Ges. zu St. Petersburg. Jah 1852 — 1853, pag. 336.

<sup>2)</sup> Пузыревскій, Verhandl. d. mineral. Ges. in St. Petersburg. 1857 1858, pag. 158.

<sup>3)</sup> Ауэрбахъ, Bull. de la soc. d. nat. de Moscou. Tome XXI 1856, № 1, pag. 154—158.

ленной спайностью тѣсными группами расположены на по-  
мѣщенной породѣ. 2) Другая разность является въ видѣ  
сферическихъ агрегатовъ съ гладкой, блестящей и какъ-бы  
измѣненной поверхностью. Промежутокъ между сферическими  
единицами, напоминающими дробь, замолненъ плотнымъ  
мѣлистымъ графитомъ. Строение этой разности напоминаетъ  
тоже Карлсбадскаго пьезолита, однако строение недѣль-  
ныхъ въ данной разности совершенно иное: оно не состоитъ  
изъ концентрически расположенныхъ слоевъ, а представляетъ  
собой рядъ кристалловъ, группирующихся въ видѣ лучей  
около какихъ-то постороннихъ зеренъ. Ауэрбахъ сравни-  
ваетъ эту разность съ той, которая встрѣчается въ окрест-  
ностяхъ Мѣска, съ тѣмъ отличіемъ, что у послѣдней поверх-  
ность не гладкая, а шероховатая, что происходитъ вслѣд-  
ствіе торчащихъ вершинъ составляющихъ ее кристалловъ.  
Третья разность — волокнистый графитъ, состоитъ изъ  
тѣсно связанныхъ между собой параллельныхъ волоконъ.  
Наконецъ послѣдняя наиболѣе распространенная разность  
является въ видѣ компактнаго графита съ землистымъ изло-  
момъ. Изрѣдка эта разность является въ видѣ псевдоморфозъ  
(рисегональная призма) по апатиту.

Двѣ изъ перечисленныхъ разностей, именно кристалли-  
стый и волокнистый графиты подвергались въ лабораторіи  
Московского Университета анализу, причемъ получились слѣ-  
дующія цифры:

Кристаллич. граф.		Волокнистый граф.	
С.	91,019%	С.	83,755%
Золы.	3,213 »	Золы	15,111 »
H <sub>2</sub> O.	1,205 »	Воды	0,888 »
	<hr/> 95,437%		<hr/> 99,754%

Потеря при первомъ изъ указанныхъ анализовъ (4,56%)  
по мнѣнію Ауэрбаха вѣроятно относится къ С, такъ какъ  
вся СО<sub>2</sub>, должно быть, поглощалась ѣдкой щелочью. Зола  
состояла изъ обломковъ кварца и полеваго шпата.

Зола второй изъ анализированныхъ разностей сохранила вполне волокнистую форму и состояла изъ кремне-кислоты съ примѣшанными къ ней окисью желѣза и глиноземомъ.

Не смотря на меньшее количество углерода, вторая разность оказалось гораздо болѣе пригодной въ технику.

Кромѣ указанныхъ Кокшаровымъ <sup>1)</sup>, циркона, желта канкринита и апатита, по Ауэрбаху графитъ сопровождающіе еще слѣдующіе: магнитный колчеданъ, желѣзный шпатъ, сдалитъ, плавиковый шпатъ, пироксенъ, силикатъ, напоминающій волластонитъ и сопровождающій обыкновенно графитъ Финляндіи; наконецъ оловянный камень.

Наконецъ интересная замѣтка объ этомъ графитѣ появилась въ 1864 году и принадлежитъ знаменитому химику Дюма <sup>2)</sup>. Его анализъ далъ слѣдующія цифры:

C.	. . .	89,3%	96,2%
Золы . . .		10,4 >	3,7 >
		<u>99,7%</u>	<u>99,9%</u>

Зола состояла изъ кремнекислоты, глинозема, окиси желѣза и извести. Принимая во вниманіе прекрасное качество ботугольскаго графита и притомъ мощныя, занимающія малую площадь залежи его, Дюма предсказывалъ ему будущую славу, то же экономическое значеніе, какими пользовался Кумберлендскій графитъ, залежи котораго уже и въ то время были значительно истощены.

Относительно физическихъ особенностей кромѣ того Рад Кропоткинъ и Черскій замѣчаютъ, что строеніе нѣкоторыхъ частей ботугольскаго графита, состоящее, какъ указано выше, въ замѣчательно правильной и тонкой, продольной, параллельной и отчасти концентрической, мелко-волнистой борозчатости, весьма живо напоминаетъ строеніе древесныхъ стволовъ.

<sup>1)</sup> Кокшаровъ, 1. с.

<sup>2)</sup> Dumas, Bull. de la soc. d'encouragement pour l'industrie nationale, Tome XI, série II, 1864, pag. 129.

Въ началу 1855 года Алиберъ предполагалъ устроить  
 въ Петербургѣ карандашную фабрику въ обширныхъ раз-  
 мѣрахъ и въ такомъ видѣ, какъ нѣкогда мануфактура эта  
 процвѣтала на заведеніяхъ знаменитаго Бракмана. Но проектъ  
 этотъ не состоялся: разсортированный графитъ укупоривался  
 въ ящики по 5 — 6½ пудовъ каждый и вывозился зимнимъ  
 путемъ сначала въ деревню Голуметь на р. Бѣлой (200  
 верстъ отъ рудника), куда перевозка его обходилась уже отъ  
 1 до 3 руб. съ пуда, а затѣмъ уже минералъ отправлялся  
 въ Нюрнбергъ въ Баварію, слѣдовательно на разстояніе не  
 менѣе 7000 верстъ, гдѣ уже, на заводахъ извѣстнаго Фабера,  
 изъ него приготовлялись карандаши. Неудивительно поэтому,  
 что издѣлія эти продавались въ послѣдствіи въ Иркутскѣ по  
 цѣнѣ отъ 20 до 25 коп. за штуку. Наконецъ, лѣтомъ 1859  
 года Алиберъ уѣхалъ въ Петербургъ, какъ говорили по дѣ-  
 ламъ приска, но съ тѣхъ поръ уже не возвратился. Шахта  
 съ машинами и склады съ орудіями оставлены незапертыми;  
 въ окошки дома можно было видѣть столы, покрытые скатер-  
 тями, мебель въ обыкновенномъ порядкѣ, шкапы, перепол-  
 ненные посудой, самовары, въ столѣ на верандѣ лежали  
 сапоги, а на поверхности гольца кучи разсортированного  
 графита. Въ такомъ видѣ найденъ этотъ замѣчательный руд-  
 никъ Кротошкинымъ въ 1865 г., точно также описываетъ  
 его Черскій, бывшій тамъ въ 1873 г., при чемъ въ одной  
 изъ вѣтвей шахты, служившей очевидно кладовою для ку-  
 ренныхъ припасовъ, найдена посуда, въ которой лежало нѣ-  
 сколько штукъ замѣчательно высохшихъ лимоновъ и другая,  
 наполненная столь же сухими ягодами. Причины, повлекшія  
 за собою прекращеніе работъ въ рудникѣ, остаются до сихъ  
 поръ неизвѣстными, и относительно ихъ существуютъ одни  
 лишь догадки и предположенія. Во всякомъ случаѣ отъѣздъ  
 Алибера вызванъ не истощеніемъ графита, такъ какъ, по  
 приблизительному вычисленію Львова, сопровождавшаго Радде  
 въ 1859 г., количество невыработаннаго еще графита опре-

дѣляется многими сотнями тысячъ пудовъ, обезпечивая руды на цѣлое столѣтіе, причемъ необходимо имѣть въ виду то обстоятельство, что, по мѣрѣ углубленія шахты, графитъ получался лучшаго достоинства. Точно также не имѣются данныя для точнаго опредѣленія всего количества добытаго здѣсь минерала; извѣстно только, что въ 1859 г. до 1-го мая добыто изъ шахты 4116 кубич. футовъ, что должно составить 446 пудовъ графита, годнаго къ употребленію; при этомъ для работы было употреблено 697 чело-вѣкъ, трудившихся по 12 часовъ каждый, и 5 пудовъ поро-ху въ качествѣ взрывчатого матеріала; кромѣ того изъ другихъ, побочныхъ развѣдокъ и приисковъ получено 100 пудовъ графита, который небылъ еще разсортированъ <sup>1)</sup>. В настоящее время, съ прииска вывозится только такое количество графита, какое необходимо для приготовления огнеупорныхъ горшковъ для Иркутской золотосплавочной фабрики, причемъ, понятно, что графитъ этотъ выбирается изъ кучъ, лежащихъ на гольцѣ со времени отъѣзда Алибер-Оставшіяся въ совершенной цѣлости подземныя работы состоятъ, по описанію Черскаго, изъ просторной шахты, глубину которой Кропоткинъ опредѣляетъ въ 63 фута, а ширину въ 28 и 35 футовъ; со дна этой шахты, именно съ южной стѣны, направляются двѣ параллельныя орты въ ю.-в. 15°, изъ которыхъ западная короткая, съ двумя выходами по бокамъ оставленной породы въ видѣ крѣпи, тогда какъ восточная орта длинная и наклонно углубляющаяся книзу, причемъ на своемъ продолженіи она представляетъ сначала значительное расширеніе, укрѣпленное оставленною по срединѣ массою породы съ двумя короткими боковыми развѣдками, слѣдующими въ двѣ противоположныя стороны

<sup>1)</sup> Экономическія записки, издаваемые Вольн. Эконом. Общ. 1859. Поправки къ этой статьѣ см. Труды Сиб. Экспед. I. с. выноски стр. 84.

(2. и 3.), а еще дальѣе, ближе къ концу орты, она вторично расширяется двумя боковыми развѣдками, изъ которыхъ замѣтная нѣсколько длиннѣе восточной и поворачивается къ югу, куда очевидно предполагали продолжать работы параллельно конечной части главной орты. Глубина этой орты, по приблизительному измѣренію Кропоткина, равняется не менѣе 120 и не болѣе 140 футамъ, такъ-что отвѣсная глубина, до которой достигли подземныя работы Алибера, опредѣляется изъ этихъ данныхъ (со скидкой 11', т. е. высоты орты надъ уровнемъ шахты) отъ 172 до 192 футовъ, — цифры, заслужившія уже гораздо болѣе довѣрія, нежели прежнія, опредѣленные на глазъ (Брыжинъ, Радде). Температура въ шахтѣ оказалась ниже нуля, хотя къ крайнему сожалѣнію, она не измѣрилась Алиберомъ во время постояннаго углубленія работы, а приведена въ извѣстность лишь посѣщавшими рудникъ путешественниками. Такимъ образомъ 26 іюня 1858 г. Брыжинъ первый опредѣлилъ, что въ самой глубокой части рудника ходъ достигаетъ —  $5^{\circ}$  R., тогда какъ «по срединѣ» (на половинѣ глубины или длины всего рудника, такъ какъ орты не отличались у него отъ шахты) оказалось —  $3^{\circ}$ , а на открытомъ воздухѣ термометръ показывалъ  $+4^{\circ}$  R. Кропоткинъ, посѣтившій рудникъ этотъ 27 мая 1865 г. нашелъ на днѣ рудника (т. е. орты) ту же температуру (—  $5^{\circ}$  R.), тогда какъ на днѣ шахты оказалось —  $7^{\circ}$  R. Вѣтрянныхъ и въ воздухѣ —  $5,4^{\circ}$ ; затѣмъ, на половинѣ глубины шахты термометръ показывалъ —  $2,2^{\circ}$ , а на открытомъ воздухѣ, т. е. вѣнѣ шахты  $+2,8^{\circ}$  R. Что-же касается наблюдений, произведенныхъ Гартунгомъ (5-го августа 1873 г.), то они погибли вмѣстѣ съ его бумагами. Показанія двухъ изъ названныхъ ученыхъ заставляютъ во всякомъ случаѣ полагать, что рудникъ Алибера углубленъ до слоя земли, обладающаго, повидимому, постоянною температурою, равною —  $5^{\circ}$  R. Температура эта, какъ извѣстно, должна соответствовать средней годичной температурѣ воздуха на



гольцѣ, что и подтверждается здѣсь производившимися Алиберомъ метеорологическими наблюденіями, отысканіемъ и оцѣновою работою которыхъ наука обязана Радде (1. с.). Изъ наблюдений этихъ, производившихся въ теченіи 1858 г. три раза въ день (8 ч. утра, въ полдень и 8 ч. вечера) обнаружались среднія температуры, считая по старому стилу за январь— $12,24^{\circ}\text{P.}$ , февраль— $13,17^{\circ}$ , мартъ— $5,02^{\circ}$ , апрѣль— $1,30^{\circ}$ , май +  $1,59^{\circ}$ , іюнь +  $7,01^{\circ}$ , іюль +  $11,42^{\circ}$ , августъ— $2,96^{\circ}$ , сентябрь— $2,30^{\circ}$ , октябрь— $8,63^{\circ}$ , ноябрь— $12,69^{\circ}$ , декабрь— $15,67^{\circ}$ , изъ которыхъ среднія для зимнихъ мѣсяцевъ— $13,58^{\circ}$ , для весеннихъ— $1,58^{\circ}$ , лѣтнихъ +  $7,11^{\circ}$ , для осеннихъ— $7,87^{\circ}$ , тогда какъ средняя годовичная оказывается равною— $4^{\circ}\text{P.}$  (—  $3,97^{\circ}$ ). Несовпаденіе этой среднѣй температуры, наблюдавшеюся на глубинѣ рудника (—  $5^{\circ}\text{P.}$ ) обратило на себя вниманіе астронома Шварца, который выразилъ сожалѣніе, что термометръ Алибера не былъ повѣренъ во время посѣщенія Радде, и оставался также сомнѣніи относительно дѣйствительной глубины рудника, такъ какъ цифры Крыжина (210') и Радде (около 80 фтовъ), какъ взятія на глазъ, представляли значительное разногласіе. Наконецъ Кропоткинъ (1. с.), опредѣлившій возможно точную (не прибѣгая къ нивелиру) цифру глубины подземныхъ работъ и подтвердившій постоянство температуръ на днѣ рудника, не замедлилъ также вывести и необходимую поправку для термометра Алибера, найденнаго имъ въ совершенной цѣлости на наружной сторонѣ веранды дома около шахты, гдѣ и производились наблюденія. Одна поправка эта (+  $0,5^{\circ}\text{P.}$ ) заставляетъ уже полагать, что средняя годовичная температура воздуха на гольцѣ была ниже той, которая получается изъ дневника наблюдений и равняется не— $4^{\circ}\text{P.}$ , а— $4,5^{\circ}\text{P.}$  Кромѣ того, на что указывалъ уже и Радде, термометръ Алибера повѣшенъ былъ неправильно

<sup>1)</sup> Шварцъ, Труды Сиб. Экспед. 1. с. стр. 84.

именно на сторонѣ, обращенной нѣсколько къ востоку, вслѣдствие чего, при вычисленіи среднихъ, утреннія наблюденія не принимались въ расчетъ; Кропоткинъ же замѣтилъ, что 27-го мая термометръ освѣщался солнцемъ даже въ 8 часовъ вечера, причемъ и сама веранда должна была нагрѣваться и сверхъ того отражать теплоту, такъ-что инструментъ долженъ былъ показывать вообще температуру выше действительной, и потому, основываясь на согласіи наблюдений на глубинѣ рудника, Кропоткинъ склонился принять среднюю температуру равною —  $5^{\circ}$  Р. Производившіяся Алибромъ совмѣстныя наблюденія и надъ направленіемъ вѣтра, дали въ высшей степени интересные результаты, хотя и они, въ свою очередь, требовали нѣкоторыхъ поправокъ. Изъ обнародованной у Радде таблицы видно, что въ январѣ наблюдались 53 раза западный вѣтеръ и 40 штилей; въ февралѣ: 40 разъ З., 4 раза С. и 40 штилей; въ мартѣ: 47 разъ З., и 46 штилей; за апрѣль: 51 разъ З., 1 разъ С.-З., 1 разъ С.-В., 6 разъ В. и 31 штилей; за май: 50 р. З., 9 р. В. и 34 штиля; за іюнь: 21 р. З., 5 р. С., 6 р. С.-В., 8 р. В., 1 р. Ю.-В., 3 р. Ю. и 46 штилей; за іюль: 20 р. З., 16 р. В., 5 р. Ю. и 52 штиля; за августъ: 36 р. З., 3 р. С., 2 р. В., и 52 штиля; за сентябрь: 39 р. З., 1 р. С.-В., 1 р. В. 5 р. Ю.-В. и 44 штиля; за октябрь: 68 р. З., 1 р. С., 4 р. С.-В. 1 р. Ю.-В., и 19 штилей; за ноябрь: 72 р. З. и 18 штилей и, наконецъ, за декабрь: 56 р. З., и 37 штилей; слѣдовательно, за весь 1858 г. наблюдались: 153 р. З.; 1 р. С.-З.; 13 р. С.; 12 р. С.-В.; 42 р. В.; 7 р. Ю.-В.; 8, Ю.; и 459 штилей. По свидѣтельству Кропоткина, наблюденія производились съ помощью флюгера, о существованіи котораго на шахтѣ упоминаетъ и Черскій; но показанія флюгера отсчитывались, должно быть, на глазъ, такъ какъ въ немъ не было стержня съ указателемъ внутри постройки, ни розы вѣтровъ подъ флюгеромъ; къ тому же параллельныя плоскости, на которой установленъ инструментъ,

расположены не съ с. на ю., а съ с.-с.-з. на ю.-ю.-в., хот положеніе это считалось вѣроятно меридіональнымъ, а такъ какъ при отсчетахъ горизонтъ дѣлился только на 8 румбовъ то этимъ погрѣшность могла еще усилиться. Изъ сказаннаго можно было бы заключить, что показанные Алиберомъ западные вѣтры слѣдуетъ разсматривать какъ з.-ю.-з., в здѣсь же имѣлись уже нѣкоторые основанія полагать, что он могли быть даже з.-с.-з. или с.-з., такъ какъ на пріисѣ возводилась каменная стѣна для защиты построекъ именн отъ этихъ вѣтровъ. Кромѣ того наблюденія надъ вѣтрами, при изведенныя въ томъ же 1858 г. Крыжинымъ, во время еи путешествія по этимъ горамъ и по Эргикъ-таргакъ-тайга, в свою очередь показали преобладаніе сѣверо-западныхъ вообще западныхъ вѣтровъ, а произведенныя впоследствии (въ 1869 г.) изслѣдованія въ горахъ системы р. Лены (и Вознесенскомъ пріисѣ) приводятъ даже къ убѣжденію, что тамъ существуетъ на извѣстной высотѣ теплое и влажно вообще западное теченіе воздуха <sup>1)</sup>. Такъ какъ по орографическимъ условіямъ пунктовъ наблюденій теченіе это нельзя признать мѣстнымъ, то можно полагать, что оно распространяется на значительную часть Восточной Сибири, повышая температуру зимнихъ мѣсяцевъ. Такимъ образомъ наблюденія Алибера представили первыя сомнѣнія относительно вѣрности существовавшихъ до тѣхъ поръ воззрѣній; а, какъ извѣстна гипотеза Веселовскаго предполагала постоянное сѣверное восточное теченіе воздуха надъ Сибирью, тогда какъ, по мнѣнію Дове, поднимающійся надъ среднею Азіею восходящій токъ воздуха уносится потомъ къ востоку, — между тѣмъ на Ботугольскомъ гольцѣ западные вѣтры дуютъ сравнительно рѣже, именно въ лѣтніе мѣсяцы, отличаясь замѣчательнымъ постоянствомъ зимою. Въ дневникѣ Алибера найдены еще двѣ замѣтки о бывшихъ значительныхъ буряхъ

<sup>1)</sup> Кротокинъ, Зап. И. Р. Геогр. Общ. по общ. географіи 1873. Т. I

и три отѣтки землетрясеній: 1)  $\frac{2}{14}$  января 1858 г. въ 5 ч. утра наблюдались при восточномъ вѣтрѣ молнія и громъ, а 2 часа спустя, при  $-10^{\circ}$  Р. и сѣверномъ вѣтрѣ, была сильная зарница (Wetterleuchten — молнія безъ грома); 2)  $\frac{26 \text{ июля}}{8 \text{ июля}}$  въ 12 ч. утра былъ штормъ съ юга съ дождемъ; сила этой бури превосходила все видѣнное въ теченіи послѣднихъ 12 лѣтъ; 3)  $\frac{9}{21}$  мая въ  $10\frac{1}{4}$  часовъ вечера было землетрясеніе съ ю. на с., продолжавшееся 5 секундъ; 4)  $\frac{9}{21}$  июня землетрясеніе продолжалось около 7 секундъ; наконецъ 5) 19-го февраля 1859 г. въ 3 ч. 25' утра было землетрясеніе съ ю.-в. на с.-з., продолжавшееся 30 секундъ и съ такою силою, что имъ повредились трубы и печи.

Упомянутый выше садикъ, разведенный на восточной сторонѣ дома Алибера, на гольцѣ, и найденный Радде еще въ цвѣтущемъ состояніи, представлялъ не безынтересное явленіе для ботаниковъ, такъ какъ въ немъ воспитывались растенія, перенесенныя изъ области произрастанія бѣлой березы, т. е. съ долины Ботугола и Ханшина, на столь значительную высоту, гдѣ произрастаютъ уже одни лишь лишай. Подъ прикрытіемъ зданія, спасающаго ихъ отъ господствующаго вѣтра, Радде нашелъ здѣсь *Trollius asiaticus* L. и *Asotum Napellus* L., не превышающіе впрочемъ 2 ф., затѣмъ *Veratrum album* L. въ 1 ф. высоты, *Saussurea*, *Aster*, *Sedum*, а также одну изъ лилій (*L. martagon*), доказывающую, насколько луковичны этихъ растеній способны переносить суровость климатическихъ и гипсометрическихъ условій. Что же касается животнаго міра на Ботугольскомъ гольцѣ, то въ вѣтѣ рудника Радде нашелъ погибшій экземпляръ грызуна — мышки, оказавшійся вполне новымъ видомъ, не найденнымъ еще до сихъ поръ въ другихъ мѣстностяхъ. Изрѣдка наблюдали здѣсь также стада гусей и журавлей, во время ихъ перелета. Въ долину Ханшина и Ботугола встрѣчаются нѣкоторые виды утокъ (*A. crecca* et *boschas*).

Въ дополненіе къ свѣдѣніямъ, сообщеннымъ объ этой мѣстности, намъ остается передать результаты осмотра двухъ неописанныхъ еще дорогъ, ведущихъ съ Ботугольскаго рудника, во-первыхъ, обратно къ знакомой намъ уже юртѣ на Тагархаѣ, а во-вторыхъ, тропы, по которой какъ Радде такъ и Кропоткинъ перешли съ Ботугола въ систему р. Оки.

Дорога отъ шахты къ Тагархаю ведетъ почти по средней линіи верхней поверхности Ботугольскаго гольца, къ югу внѣ вертикальныхъ предѣловъ распространенія древесной растительности, и знакомитъ насъ главнымъ образомъ съ породами, развитыми по этой линіи, дополняя свѣдѣнія о геогностическомъ строеніи гольца. Полевошпатовая порода, въ которой заложена шахта, продолжается черезъ среднюю, куполообразную вершину гольца (67' выше шахты) и южную, конусообразную и самую высокую (8150'), остающуюся по восточной (лѣвой) сторонѣ дороги; затѣмъ, на высотѣ 67' над шахтою, проѣзжаютъ около верховьевъ рч. Ботуголь, причемъ въ ясную погоду виднѣется къ югу снѣжная вершина Мунку-Сардыка. Пересѣкая полосу известняка, залегающую подъ полевошпатовою породою, дорога спускается въ долину верховьевъ Харандашкинъ-бару́нъ-желга, съ названіемъ которой мы ознакомились, слѣдуя внизъ по Хашголу; на правомъ притоцѣ Желги, на высотѣ 6367' (78' ниже шахты), уже въ предѣлахъ лѣса, построенъ балаганъ для отдыха путешественниковъ, около моста черезъ ключъ здѣсь развитъ хлоритовый сланецъ, а за нимъ известнякъ съ паденіемъ пластовъ на сѣверъ. Известнякъ съ простираніемъ на з.-ю.  $20^{\circ}$  и паденіемъ пластовъ на с.-з.  $20^{\circ}$  подъ угломъ до  $55^{\circ}$  образуетъ собою и гонецъ, на который подымается дорога отъ балагана; на вершинѣ перевала, на высотѣ 466' над балаганомъ, поставленъ крестъ. Отсюда видно, что гонецъ этотъ принадлежитъ къ цѣлому ряду болѣе высокихъ горъ, тянущихся какъ къ западу, такъ и къ востоку отъ дороги, и которая спускается къ лѣвому берегу знакомой намъ уже д

лвнн рч. Тагархай, лѣваго притока Хорка. На спускѣ, вслѣдъ за известнякомъ, падающимъ вообще на сѣверъ, развита гранитовидная, полевошпатовая порода, переходящая въ гнейсъ; отсюда видно, что терраса лѣваго берега Тагархая сообщается съ сѣдловиною, разобщающею рядъ гольцовъ: болѣе подробное ознакомленіе съ частностями этого явленія можетъ дать, по мнѣнію Черскаго, матеріалъ для не безъ-интересныхъ выводовъ относительно исторіи развитія орографическихъ и гидрографическихъ особенностей этой мѣстности, но послѣдшность, съ которою, по недостатку провіанта и средствъ, необходимо было возвращаться въ предѣлы хлѣбопашества, не позволяла ему предпринимать болѣе подробныхъ изслѣдованій.

Что же касается пути отъ рудника на р. Оку, именно, на рч. Тустукъ, притокъ описанной уже выше Сороки, то, согласно описанію Кропоткина, тропа отъ Займки Алибера переходитъ на лѣвый берегъ рч. Ботуголь, а затѣмъ вверхъ по одному изъ ея лѣвыхъ притоковъ (по которому?), называемому Малымъ Ботуголомъ, по которому поднимаются около 8 верстъ до высшей точки гольца, высота которой опредѣлена Кропоткинымъ въ 7100'. На подъемѣ произрасталъ въ изобиліи можжевельникъ, который проводники его (бураты) собирали какъ цѣлебное средство отъ различныхъ болѣзней и отъ падежа скота; выше встрѣчался одинъ лишь мохъ, преимущественно оленій. На всемъ этомъ пространствѣ Кропоткинъ встрѣчалъ зелено-каменный сланецъ и только на перевалѣ черезъ самый гонецъ, въ верховьяхъ Малаго Ботугола, обнажается хлоритовый сланецъ. Отсюда слѣдуетъ очень крутой и неудобный спускъ въ долину Тустука, описанный уже выше, при изложеніи свѣдѣній, собранныхъ о системѣ р. Оки. Замѣтивъ, что маршрутъ этотъ (съ Ботугола на р. Тустукъ) пересѣкаетъ западное продолженіе цѣпи горъ, которой принадлежитъ Ботугольскій или графитовый гонецъ, возвратимся къ озеру Ильчиру, откуда

Черскій перешелъ на верховья р. Ихэ-угуна и спустился внизъ по его долинь къ р. Иркуту.

н) Отъ озера Ильчира до Ниловой Пустыни по долинь рѣки Ихэ-угуна и другія дороги, соединяющія оз. Ильчиръ съ Иркутомъ.

Отъ озера Ильчира (6124' надъ океаномъ) Черскій (10-го августа) направился на юго-западъ къ верховьямъ упомяншейся уже выше р. Тымэликъ, впадающей въ Иркутъ. Для этой цѣли необходимо перевалить черезъ описанный нами плоскій голецъ, образующій водораздѣлъ между верховьями этой рѣчки и параллельною ей долиною рч. Толты по которой Черскій въ первый разъ достигъ Ильчира. Высота перевала въ этомъ мѣстѣ не превышаетъ 6746' н. ок. и позволяетъ видѣть на в.-с.-в.-ой сторонѣ ущелье праваго верховья Толты, гдѣ известнякъ, слагающій это ущелье, покрытъ сверху лавою. Съ высшей точки перевала тропа спускается въ долину общихъ верховьевъ р.р. Тымэлика и Ихэ-угуна, гдѣ около двухъ небольшихъ озеръ, принадлежащихъ еще системѣ Тымэлика и отстоящихъ около 12 верстъ отъ Ильчира, барометръ показалъ 6634'. Въ ближайшихъ утесахъ обнажается хлоритовый гнейсъ, принимающій гранитовидное строеніе. Общее направленіе долины, слаб поросшей лиственницей, съ ю.-в. на с.-з. Тропа направляется вверхъ по правому берегу Тымэлика (на ю.-в.), принимаящаго съ лѣвой стороны два притока съ з.-ю.-з. Вслѣдъ за гранитомъ, покрытымъ точно также лавою, какъ известнякъ ущелья Толты, въ горахъ праваго берега долины, насупротивъ только что упомянутыхъ лѣвыхъ притоковъ, обнажается сначала известнякъ, а подъ нимъ слюдяный сланецъ, интересныя еще въ томъ отношеніи, что пласты ихъ, простираясь на з.-ю. 20°, обнаруживаютъ уже сѣверное с.-з. 20° паденіе (до 65°), т. е. синклинальное къ развитому около

Ильира и совпадающее съ тѣмъ, какое наблюдалось по рч. Тажонгъ и въ верхнемъ теченіи Ард-Хонголдоя. Выше верхняго изъ двухъ лѣвыхъ притоковъ располагается небольшое озеро, изъ котораго беретъ начало Тымѣликъ; рядомъ съ нимъ и почти на той же высотѣ (7436'), находится другое озеро, дающее начало Ихэ-угуну, долина котораго направляется уже на востокъ. Озера эти располагаются уже среди гребня Тункинскихъ альповъ, видѣннаго нами еще съ долины рч. Толты и съ юго-западной оконечности Ильчира; въ обнаженіяхъ замѣчается гнейсъ; широта гѣста приблизительно должна быть таже, что и для озера, дающаго начало р. Окъ. Отсюда, на протяженіи около 26 верстъ, до устья рч. Убуръ-Хонголдой, съ верховьями которой мы ознакомились уже выше, Ихэ-угунъ придерживается почти юго-восточнаго направленія (вѣрнѣе в.-ю.-в.), а ниже, отъ Хонголдоя до Ниловой пустыни (24 версты) протекаетъ почти съ запада на востокъ, откуда, уже въ самомъ низовьѣ, опять поворачиваетъ на юго-востокъ къ Иркуту, вливаясь въ него, какъ извѣстно, съ лѣвой стороны.

Въ нѣсколькихъ верстахъ ниже верховьевъ располагаются самыя южныя юрты, принадлежащія Ильчирскимъ сойотомъ, но нинѣ необитаемыя, а ниже, на высотѣ 6404', тропа пересѣкаетъ первый лѣвый притокъ Ихэ-угуна, долина котораго поросла густымъ хвойнымъ лѣсомъ и уже не представляетъ выходовъ коренныхъ породъ. На высотѣ 4701' располагается устье Убуръ-Хонголдоя, русло котораго переполнено большими валунами и округленными глыбами гранита и гнейса, затрудняющими бродъ во время прибыли воды. Горный потокъ этотъ, берущій начало въ одной котловинѣ съ описаннымъ выше Аро-Хонголдоемъ, лѣвымъ притокомъ Китоа, посѣщенъ однимъ лишь Пермикинымъ, изъ рукописныхъ замѣтокъ котораго извѣстно, что долина его отличается значительною крутизною, а рѣчка представляетъ не мало каскадовъ, хотя въ малую воду она вездѣ проходима,



и потому Черскій указываетъ на этотъ путь, какъ на самый удобный и безъопасный для достиженія верхняго теченія р. Осы (изъ Тунки, черезъ Нилову Пустынь, Убуръ-Хонгоldой, Аро-Хонгоldой, Китой, Саганъ-Харъ и на Оспу) гдѣ уже, взявъ проводникомъ сойота, можно предпринимать экскурсіи внизъ по Оспѣ, по дорогамъ менѣе опаснымъ, нежели та, по которой прошелъ Черскій, не зная объ имѣющихся здѣсь, болѣе удобныхъ тропкахъ.

Ниже устья Убуръ-Хонгоldой долина Ихэ-угуна, отклонившагося здѣсь въ сторону отъ тропы, образуетъ, должно быть, нѣкотораго рода уступъ, такъ какъ, послѣ незначительнаго впрочемъ подъема до высоты 4927' (226' над устьемъ Хонгоldой), слѣдуетъ довольно крутой и длинный спускъ до высоты 4247', — склонъ, на которомъ появляются уже бѣлая береза, сосна, а въ особенности обильно осины. Уступъ этотъ, извѣстный у бурятъ подъ именемъ Уляганъ-дабанъ (*уляганъ* — осина, *дабанъ* — гора или подъемъ), представляетъ единственное, менѣе удобное мѣсто по всей длинѣ Ихэ-угуна, иначе долина эта, по замѣчанію Черскаго, вполне доступна для проложенія по ней телѣжной дороги. Самаго Ильчира, коль скоро въ этомъ встрѣтилась бы необходимость; но и подъемъ на Уляганъ-дабанъ потребовалъ бы сравнительно небольшихъ работъ, чтобы сдѣлать его удобнымъ, такъ-что долину этой рѣки слѣдуетъ считать нынѣ удобнѣйшимъ и ближайшимъ путемъ къ озеру Ильчиръ, а оттуда къ Алиберовскому графитовому руднику, такъ и въ Китой и Оспу. Далѣе, спустя нѣсколько болѣе узкій и лѣсистый отрѣзокъ долины, на протяженіи котораго, въ двухъ мѣстахъ обнаружился гранитъ, а въ наносѣ видны были большія глыбы, валуны и галька кристаллическихъ породъ, тропка вступаетъ въ длинное и весьма живописное озеро. Видное расширеніе долины Ихэ-угуна, называемое Хойта-гольскимъ, отъ имени расположеннаго здѣсь бурятскаго улуса, на правомъ берегу рѣки, на высотѣ 2776'. Пейзажъ

принимаетъ уже совершенно другой характеръ. Расширеніе, достигающее нѣсколькихъ верстъ въ поперечномъ діаметрѣ, вытянутое на в.-с.-в., напоминаетъ собою Тункинскую долину, только въ гораздо меньшемъ масштабѣ; на сѣверѣ здѣсь точно также возвышается цѣлый рядъ альпійскихъ пиковъ, принадлежащихъ гребню Тункинскихъ альповъ, тогда какъ контуры болѣе низкихъ южныхъ горъ, отдѣляющихъ Ихэ-угунъ отъ Иркуты, напоминаютъ собою округленные и приплюснутыя очертанія вершинъ Саяна; только ровная площадь дна этой долины, вмѣсто пестряющихъ въ Тункѣ песчаныхъ и иловыхъ холмовъ, покрывалась сплошною душистою зеленью, флора которой извивается лентою Ихэ-угунъ, разбиваясь на протоки и сопровождаясь растущими около него ивами. Многочисленные копыта свѣжаго сѣна, отдаленный звукъ монотонной и заунывной пѣсни бурята, а наконецъ видъ разбросанныхъ по лугу большихъ юртъ, оживили этотъ красивый пейзажъ и произвели замѣчательно ободряющее дѣйствіе на уставшихъ и большею частью хромыхъ въючныхъ лошадей экспедиціи, такъ-что вмѣсто обычнаго медленнаго и неохотнаго слѣдованія за ѣздоками, они опередили ихъ самовольно и рывкомъ направились къ улусу, выжидавшемуся не безъ причины и ѣздоками: здѣсь, между прочимъ, послѣ продолжительнаго употребленія чистой листовичной коры вмѣсто табаку, выкурена была первая трубка махорки, подѣйствовавшая уже опьяняющимъ образомъ даже на проводниковъ.

Нѣсколько верстъ ниже улуса, гдѣ на пути встрѣчаются и слѣды бывшаго здѣсь прежде, очевидно болѣе мощнаго, слоисто-песчанаго наноса, долина Ихэ-угуна суживается главнымъ образомъ отъ подступившаго отрога сѣверныхъ горъ. Отрогъ этотъ опускается здѣсь ясно различаемыми ступенями, на которыхъ песчаный наносъ подымается до высоты около 300' надъ уровнемъ долины. Около низшей террасы обнажается пластъ наноса съ галькою кристаллическихъ породъ, въ числѣ которыхъ находится и лава (по-

видимому базальтовая), а также валуны и глыбы, достигавшія 3' въ діаметрѣ; на второй же террасѣ находится уцѣлѣвшая, деревянная часовня. На правомъ берегу рѣки и блюдается здѣсь же и коренной выходъ лавы, первый изъ встрѣченныхъ и извѣстныхъ до сихъ поръ такъ высоко на южномъ склонѣ Тункинскихъ альповъ, такъ какъ упомянутыя выше лава, залегающая на гранитѣ праваго берега Тымэли, т. е. на сѣверномъ склонѣ, принадлежитъ безъ сомнѣнія тому громадному покрову, съ расчлененными частями котораго мы встрѣчались, начиная съ верховьевъ р. Осы и Сганъ-хара до юго-западныхъ и южныхъ окрестностей озера Ильчира.

Начиная съ описаннаго суженія, песчаный наносъ втораго, вмѣстѣ съ накопленіемъ гальки, указываетъ на возможность бывшаго прежде скопленія озерныхъ водъ въ Хотокольскомъ расширеніи, долина Ихэ-угуна обнаруживаетъ значительный наклонъ и порастаетъ густымъ хвойнымъ лѣсомъ, придающимъ ей мрачный характеръ, впрочемъ не надолго, такъ какъ вскорѣ, спустя переваль черезъ отрогъ лѣвыя т. е. сѣверныхъ горъ долины, достигающій 2937', тропа уходитъ до той живописной части суженія низовьевъ рѣки въ которой построена знакомая намъ уже Нилова пустыня (см. выше) около термального источника (2648' н. ок.). Отсюда (14-го августа стар. стиля) Черскій и Гартунгъ, слѣдуя внизъ по теченію Иркуты, возвратились опять въ с. Тункинское, а затѣмъ въ Иркутскъ.

Кромѣ этого вполне новаго пути, связывающаго озеро Ильчиръ съ среднимъ теченіемъ Иркуты, существуютъ еще двѣ другія тропы, пересекающія Тункинскіе альпы западнаго меридіана верховьевъ Ихэ-угуна и ведущія къ тому же Ильчиру.

Самый восточный изъ этихъ путей пролегаетъ черезъ голецъ Нуху-дабанъ, описанный уже нами около сѣла Чернаго (Ильчирнаго) и Бѣлаго Иркутова; отсюда тропа

верачиваетъ къ сѣверо-востоку, переходитъ въ бродъ черезъ Черный Иркутъ и достигаетъ устья рч. Тымэликъ; поднимаясь вверхъ по этой рѣчкѣ, путешественникъ встрѣчаетъ ея правый притокъ, извѣстный подъ названіемъ Бага-Тимэликъ (*байа*—малый), съ расположенными въ его верховьяхъ сойотскими юртами. Отъ юртъ остается уже половина дня хорошей ѣзды до Ильчира, въ томъ же сѣверо-восточномъ направленіи. Тропа эта до сихъ поръ остается еще неизслѣдованною, и свѣдѣнія о ней переданы вкратцѣ въ сочиненіи Радде <sup>1)</sup>.

О теченіи и вообще о системѣ Чернаго, т. е. Ильчирнаго Иркута мы находимъ немало свѣдѣній въ статьѣ Ковригина <sup>2)</sup>. Онъ передаетъ, что долина этого верховья достигаетъ 35 верстъ и что ширина при самомъ выходѣ въ Ильчира около 5 саж. На протяженіи своемъ Черный Иркутъ то расширяется, то суживается снова, что зависитъ отъ подобныхъ же измѣненій его долины, которая находится ниже соединенія съ Тымэликомъ и при устьѣ, т. е. при соединеніи съ Среднимъ и Бѣлымъ Иркутами (у Ковригина Малый Иркутъ), сжимаясь съ обѣихъ сторонъ горъ, не превосходитъ  $6\frac{1}{2}$  саж. въ ширину; глубина рѣки мѣняется отъ  $\frac{3}{4}$  аршина (около Ильчира) до 1 сажени при сліяніи съ другими верховьями). Длину Тымэлика (Большаго) онъ принимаетъ въ 27 верстъ, ширину его до 5 сажени; устье въ Черный Иркутъ должно располагаться въ разстояніи  $4\frac{1}{2}$  верстъ отъ сліянія всѣхъ верховьевъ Иркута. Въ той же статьѣ мы находимъ и свѣдѣнія о геогностическомъ строеніи горъ около названныхъ рѣчекъ. Такъ напр. прогъ между верховьями рч. Колѣнчатой (т. е. Толты), Тымэликомъ и Иркутомъ, затѣмъ между Тымэликомъ и Такчи до устья послѣдней, между Такчи и устьями Ты-

<sup>1)</sup> Радде, I. с. pag. 19—20.

<sup>2)</sup> Ковригинъ, I. с. pag. 489 и слѣд.

мэлика, Черного Иркута, Шоломура и Икэ-тусуна (въ текстѣ неправильно: Эксусуна, а на картѣ Экс-усуна), образуютъ гранитомъ, который по рч. Такчи (соотвѣтствующей по имени Оро-Шоломѹру) является порфировиднымъ, причѣмъ въ немъ появляются тонкіе призматическіе кристаллы розовой обманки черного цвѣта, обусловливающіе переходъ породъ въ гранито-сіенитъ. Въ верховьяхъ Такчи, между нею и Тымэликомъ, количество роговой обманки до того увеличивается, что гранито-сіенитъ этотъ переходитъ въ амфиболитъ, въ которомъ авторъ находилъ нерѣдко кристаллы тремолита. Къ сожалѣнію однако статья Ковригина отличается во-первыхъ такимъ изложеніемъ собранныхъ имъ географическихъ данныхъ, которое не вездѣ позволяетъ считать описанное авторомъ по его личнымъ наблюденіямъ отъ передаваемого имъ на основаніи распросныхъ свѣдѣній такъ какъ направленіе его маршрута не показано ни въ текстѣ, ни на картѣ. Геогностическая карта, приложенная къ его статьѣ, въ свою очередь не въ состояніи рѣшить вопроса о подробностяхъ маршрута Ковригина, такъ какъ красная окраска, покрывающая вся изображенная на ней мѣстность, а область, занятая красною гранита, неимоверно обширна и распространяется даже на мѣста извѣстнаго уже развитія совершенно другихъ породъ, такъ-что одни лишь петрографическія подробности, передаваемые въ текстѣ относительно измѣненій породъ, замѣченныхъ въ нѣкоторыхъ долинахъ, могутъ служить доказательствомъ личнаго осмотра ихъ авторомъ. Такимъ образомъ сообщенныя выше свѣдѣнія о порфировидности гранита и о переходѣ его въ амфиболитъ служатъ прямымъ указаніемъ на то, что имъ осматривалась долина рч. Такчи и соотвѣтственная часть Тымэлика, гдѣ впрочемъ по устарѣлой петрографической терминологіи, амфиболитъ этотъ рассматривается имъ какъ видоизмѣненіе «діабазъ» къ тому же какъ о діабазѣ, такъ и объ амфиболитѣ сказано (стр. 525), что они почти вездѣ являются въ видѣ «потоковъ», крутопадающихъ (до 72°) или отвѣсныхъ.

Что же касается второго пути, то, по географическому положению, онъ занимаетъ среднее мѣсто между первымъ и второю Ихэ-угуна, пролегая по упоминавшейся уже выше рч. Шоломъуръ, лѣвому притоку Иркута, впадающему въ 9 верстъ выше Хангинскаго караула. По этой рѣчкѣ Радде проѣхалъ на Ильчиръ, а оттуда на Ботугольскій рудникъ. Очень интересная долина Шоломура отличается почти меридіональнымъ направленіемъ, а тропа придерживается ея праваго берега до южной границы древесной растительности, располагающейся на высотѣ 7300', и только въ предѣлахъ альпійской цѣпи, гдѣ въ Шоломуръ изливаются многочисленные притоки съ южныхъ сторонъ, направленіе тропы дѣлается извилистымъ, благодаря болотистой мѣстности, поросшей нерѣдко верескомъ хвостомъ (*Caragana jubata* Poig.). Около водораздела, высота котораго хотя и не опредѣлена барометрически, тропа по приведенной выше цифрѣ, должна превышать 8000', тропа проходитъ около высокаго и зубчатаго гранитнаго утеса (*байсанъ* или *байса* по бурятски означаетъ вообще скала), мимо котораго проходитъ главный гребень Тункинскаго альповъ (Саянъ у Радде), направляясь на западъ, къ Шоломъу (т. е. Ильчирному) Иркуту; вскорѣ достигаются и вершины Ордо-Шоломъура (т. е. сѣвернаго), протекающаго по сѣверному склону альповъ, но впадающаго съ лѣвой стороны въ тотъ же Черный Иркутъ, очевидно выше пересѣкаемой послѣднимъ названной альпійской цѣпи. Относительно растительности долины южнаго Шоломура Радде замѣчаетъ, что она, какъ и вообще на подножій восточной части этихъ альповъ, отличается скудностью и слабымъ развитіемъ, только брусничники ревены съ его темными и широкими листьями, и брусничники выдѣляются съ большею рѣзкостью. Лиственица является преобладающимъ деревомъ, достигая здѣсь крайняго южнаго распространенія древесной растительности, гдѣ ея экземпляры дорастаютъ иногда до 15' высоты, и не обнаруживаютъ наклонности къ кустарниковой формѣ. 14/26 Іюня, на

высотѣ 5000', хвои лиственницы развились здѣсь только до половины ихъ нормальной длины, затѣмъ на высотѣ 6000' вѣтви были почти столь-же обнаженными какъ и зимою, между тѣмъ какъ на самой границѣ распространенія (7300') почки являлись едва раскрывающимися, а цвѣтки въ состояніи нѣсколько болѣе значительнаго развитія, хотя вездѣ на этой высотѣ обнаружались слѣды мороза, отчасти или совершенно погубившаго молодые побѣги. Даже листья жимолости (*Lonicera coerulea*) забирающейся здѣсь иногда даже за предѣлы вертикальнаго распространенія древесной растительности, почти совершенно завяли и почернѣли, контрастируя съ неуязвимымъ рододендромъ, легко выдерживающимъ всѣ мѣстные климатическія невзгоды, въ томъ числѣ и холодъ снѣга, падающаго здѣсь даже въ іюнь. Относительно фауны Радде замѣчаетъ, что промежутки между Шоломуромъ и Чернымъ Иркутомъ водилъ дикій козель (*Capra sibirica*) большими стадами, тогда какъ восточнѣе онъ попадается лишь единичными экземплярами. За водораздѣломъ тропа спускается верстъ 7 внизъ по Олѣ Шоломуру, послѣ чего поворачиваетъ на сѣверо-востокъ окрестность болотистыхъ юго-восточныхъ склоновъ трехъ горъ, изъ которыхъ только средняя оказалась проходимою, какъ болѣе сухая. Очень скудная флора, рѣдко разсѣянныя и плохо развившіяся лиственницы, верблюжій хвостъ и альпійскія ивы. Даурскимъ рододендромъ сопровождали путешественники до рч. Большой Тымѣликъ, съ верховьями котораго на знакомить только карта упоминавшагося уже Ковригина. Согласно этому автору источники названной рѣчки лежатъ въ падѣ верхняго теченія Ихэ-угуна и южнѣе верховьевъ Малаго Тымѣлика, описанныхъ Черскимъ; въ противуположность южному Шоломуру (Шоломуръ у Ковригина), сѣверный (Орд-Шоломуръ) не обозначенъ, а вмѣсто него фигурируетъ рч. Тарка, (Тачка въ текстѣ), впадающая въ Тымѣликъ съ лѣвой стороны.

Русло Большаго Тымѣлика въ томъ мѣстѣ, гдѣ его пересѣкаетъ

съ Радде, отличалось значительною глубиною и быстротою, струнявшею бродъ, а также поросшими мхомъ и болотистыми берегами. Полтора часа спустя, уже позднимъ вечеромъ, Радде достигъ Малаго Тымэлика (Бага Тымэликъ), впадающаго въ большой съ правой стороны: на правомъ берегу этой рѣчки располагались 8 пустыхъ въ то время сойотскихъ юртъ, считавшихся самымъ южнымъ поселеніемъ этого народа до тѣхъ поръ, пока неизвѣстны были ихъ юрты въ верхнемъ теченіи Икэ-угуна (см. выше). Слѣдуя еще далѣе къ сѣверо-востоку, уже по безлѣсной, лишайной тундрѣ, Радде пріѣхалъ къ юрту Мунку-Булукъ (Мунгу-булукъ у Радде), долину котораго Черскій видѣлъ съ высоты гольца-столика, а съ подъемъ его мы ознакомились на пути къ Ильтэй-дабану. Тотъ-же обложій хвостъ выдѣлялся здѣсь всего рѣзче; едва видимыя мхи (*Saxex*) подмѣшивались къ преобладающему оленьему мху, только около водяной струи наблюдались *Primula nivalis*, *Callianthemum rutaefolium* и *Pedicularis*; бѣлыя куропатки и бабланы попадались здѣсь также, какъ, по свидѣтельству Черскаго, и около Ильчира, къ которому Радде приблизился, идя уже вверхъ по Черному Иркуту, мимо устья рч. Толты (ошибочно Тультеръ).

**Свѣдѣнія о р. Китоѣ, въ частяхъ его, лежащихъ внѣ описанныхъ маршрутовъ, и общее обзорѣніе теченія этой рѣки.**

Описанные выше маршруты Черскаго, дающіе весьма удовлетворительные разрѣзы всѣхъ трехъ альпійскихъ цѣпей (Тунгусской, Китойской и Бѣльской) по тремъ, болѣе или менѣе параллельнымъ направленіямъ, знакомятъ насъ однако лишь незначительными отрѣзками теченія р. Китоя и лишь нѣкоторыми его притоками, какъ-то: лѣвыми — Китойки-нъ и Саганъ-харомъ, и правыми — Архутомъ, Хонголдоемъ и Ушарангой. Поэтому, чтобы составить возможно полное



понятіе о всей системѣ интересующей насъ рѣки, необходимо прибѣгнуть еще какъ къ нѣкоторымъ литературнымъ источникамъ, такъ и къ собраннымъ объ этой мѣстности разспраннымъ свѣдѣніямъ, причемъ изложеніе наше начнемъ съ самыхъ верховьевъ Китоа, слѣдуя оттуда постепенно къ востоку и сѣверо-востоку, т. е. къ устью его въ Анггару, какъ это сдѣлано выше при описаніи теченія Иркуты.

а) Течение р. Китоа отъ верховьевъ до устья рч. Халмаган

Относительно верховьевъ Китоа мы можемъ пользоваться лишь свѣдѣніями изъ упоминавшагося выше путешествія Ковригина <sup>1)</sup>, какъ всего болѣе обстоятельными и собранными, очевидно, по личнымъ наблюденіямъ. Изъ описанія этого вида, что Китоа образуется изъ трехъ рѣчекъ, берущихъ начало недалеко отъ озера Ильчира (менѣе 15 верстъ) и названныхъ Ковригинымъ: Верхнимъ, Среднимъ и Нижнимъ Китоа. Верхній Китоа беретъ начало изъ горъ, слѣдующихъ сѣверо-западной («правой») сторонѣ Ильчирнаго Иркуты, озера Ильчира, къ сѣверу отъ сѣверо-восточной оконечности послѣдняго. Начальное направленіе его отъ с.-с.-з. къ ю.-ю.-з. послѣ чего онъ дѣлаетъ поворотъ къ востоку, а, наконецъ, склоняется къ юго-востоку и въ такомъ видѣ доходитъ до устья Средняго Китоа, съ которымъ соединяется въ разстояніи 21 версты отъ своихъ верховьевъ. Ширина его при устьѣ не болѣе 6½ сажень, тогда какъ на половинѣ длины, даже недалеко отъ источниковъ (въ 7 верстахъ), она достигаетъ 10 сажень. Въ послѣднемъ мѣстѣ, говоритъ Ковригинъ, есть даже затишья, столь рѣдко встрѣчающіяся въ этихъ мѣстностяхъ, изъ чего очевидно, что долина рѣчки должна здѣсь отличаться незначительнымъ наклономъ. Изъ картъ, кромѣ того видно, во-первыхъ, что верховье это беретъ начало изъ небольшого озера и что почти на самомъ мѣстѣ упомянутого выше поворота его изъ восточнаго направле-

<sup>1)</sup> Ковригинъ, 1. с. pag. 493 и слѣд.

на юго-востокъ, Верхній Китою воспринимаетъ съ лѣвой стороны рч. Быструю, а еще ниже, почти на половинѣ разстоянія къ Среднему Китою, рѣчку Самарту, въ роли второго лѣваго притока. Средній Китою, впадающій, какъ сказано выше, уже въ 21 верстѣ ниже источниковъ Верхняго, въ видѣ праваго верховья, беретъ начало, согласно тексту «въ южной части Иркутскаго отрога» (т. е. Тункинскихъ щельей), что слѣдуетъ считать, очевидно, недоразумѣніемъ, поправленнымъ картою, на которой верховья этой рѣчки означены въ горахъ юго-восточнаго берега Ильчирской долины, какъ и слѣдовало ожидать изъ описанія маршрута Черскаго, такъ какъ Средній Китою этотъ соединяется съ Верхнимъ гораздо выше устья рч. Ушаранги, считаеваемой Ковригинымъ Нижнимъ Китоемъ, а по Ушарангѣ именно Черскій вышелъ съ Китою на озеро Ильчиръ (см. выше). Направление Средняго Китою почти съ запада на востокъ, и только въ верховьяхъ онъ слѣдуетъ нѣсколько къ югу, а въ низовьяхъ поворачиваетъ къ сѣверу. Длина рѣчки согласно тексту достигаетъ 13 верстѣ, а ширина 4—5½ сажени, хотя на картѣ длина теченія лишь немногимъ превосходитъ 8 верстѣ. Длина его отличается ущелистостью («въ ней нѣтъ мѣста, гдѣ бы можно было пройти свободно») и необыкновенно крутымъ наклономъ, причемъ рѣчка образуетъ цѣлый рядъ водопадовъ вышиною отъ ½ до 3 сажени. Наконецъ, Нижнимъ Китоемъ Ковригинъ называетъ знакомую намъ уже рч. Ушарангу, считая длину ея равною 12 верстамъ, а ширину отъ 1 до 6 сажени.

По поводу принимаемыхъ Ковригинымъ трехъ названныхъ выше верховьевъ Китою Черскій <sup>1)</sup> дѣлаетъ слѣдующія возраженія. Въ мѣстности, столь часто посѣщаемой Ильчирскими охотами, почти каждая долина имѣетъ уже безъ сомнѣнія какое-либо мѣстное названіе, въ числѣ которыхъ, по всей

<sup>1)</sup> Черскій, Рукописныя замѣтки о Сибири.

вѣроятности, не отсутствуетъ и что нибудь въ родѣ напѣ Китой-ихинъ (*ихинъ* означаетъ верховье), указывающее ужь абсолютно на ключъ или потокъ, считаеый верховьемъ этой рѣки; между тѣмъ въ мѣстныхъ названіяхъ, пользующихся обыкновенно приоритетомъ, мы не находимъ ничего соотвѣтствующаго тремъ, принятымъ Ковригинымъ верховьямъ. Вышѣ «Средняго Китоя» сойоты указывали Черскому на существованіе рч. У буръ-Затхасъ (*Сасхашасъ* на картѣ Пермикина «Нижній Китой», какъ сказано выше, называется Ушарангою, — самый близкій отъ Ильчира правый притокъ Китой, соотвѣтствующій очевидно «Среднему верховью» Ковригины сойоты называютъ Булукъ, составляющій повидимому притокъ рч. Ард-Затхасъ, и потому одинъ только «Верхній Китой» долженъ пользоваться у нихъ значеніемъ настоящаго источника интересующей насъ рѣки, но мѣстное названіе его остается еще неизвѣстнымъ. Съ этимъ какъ нельзя лучше согласуются и гидрографическія условія этой части теченія, выражающіяся какъ въ относительной длинѣ притоковъ, такъ и въ размѣщеніи ихъ, благодаря которому Верхній Китой съ Быстрою образуютъ уже достаточно правильное вѣрообразное развѣтвленіе верховьевъ, отчасти увеличивающееся затѣмъ съ лѣвой стороны гораздо болѣе длинною Самартою (болѣе 15 верст.), берущею начало изъ небольшого озера, тогда какъ короткій Средній т. е. ущелистый Булукъ, или Аро-Затхасъ и болѣе длинный (около 20 верстъ согласно Черскому) Нижний Китой, т. е. Ушаранга, являются уже въ роли правыхъ притоковъ, значительно удаленныхъ отъ описаннаго развѣтвленія. Начала эти, которыми руководствуются обыкновенно абригены при опредѣленіи источниковъ рѣкъ, не вполне примѣнены къ Иркуту должно быть потому, что знакомство съ этою рѣкою начиналось какъ съ Бѣлаго Иркута (Саганъ-Иркутъ) такъ и съ низу, до слиянія Бѣлаго съ Чернымъ (Хара-Иркутъ) гдѣ рѣчки эти сочтены равнозначущими, тогда какъ Ильчинскіе сойоты называютъ Черный Иркутъ просто Иркутомъ.

Если прибавить къ названнымъ выше притокамъ верхней части Китоа еще одинъ правый «Безъимянный» (можетъ быть это Убуръ-Затхаса?), впадающій выше Средняго, т. е. Булука, да еще два лѣвыхъ, какъ-то: незначительный Буликъ, впадающій въ промежутокъ между устьями Булука и Ушаранги, а затѣмъ Гарлыкъ, болѣе 18 верстъ длины, берущій начало изъ альпійскаго озера и впадающій нѣсколько выше Ушаранги, то этимъ до сихъ поръ исчерпываются свѣдѣнія наши о системѣ верховьевъ Китоа на протяженіи около 100 верстъ длины, считая отъ источниковъ, т. е. отъ «Верхняго Китоа» Ковригина.

Относительно геогностическаго строенія мѣстности въ пределахъ этой части Китоа у Ковригина находимъ, что Верхній Китоа съ Быстрою протекають въ гранитовой почвѣ, причемъ въ верховьяхъ Самарты гранитъ этотъ переходитъ въ сланецъ, обыкновенно разрушающійся и потому покрытый довольно толстымъ слоемъ каолина. Мелкокристаллическій известнякъ найденъ въ отрогѣ, отдѣляющемъ Верхній Китоа отъ Безъимяннаго праваго притока, а такъ-же въ сѣвѣйшей части горъ, отдѣляющихъ рч. Самарту отъ Гарлика, гдѣ онъ мѣстами уподобляется Карарскому мрамору. Въ сожалѣнію Ковригинимъ нигдѣ не опредѣлялось ни проплавленія, ни паденія породъ, а только уголь подъ которымъ пласты наклоняются, доходящій въ данномъ случаѣ до 42°. Въ известнякѣ этомъ, въ обоихъ вышеуказанныхъ мѣстахъ, Ковригинимъ найденъ змѣвикъ, отчасти покрываемый известнякомъ, отчасти-же перемежающійся; это очевидно проплавленіе змѣвиковъ, встрѣченныхъ Черскимъ въ такомъ изомѣненіи на рч. Саганъ-харъ, гдѣ впрочемъ, къ удивленію, порода эта не значится на картѣ Ковригина. Въ статьѣ его читаемъ, что змѣвикъ указанныхъ выше мѣстностей является какъ въ видѣ «змѣвиковога камня», представляющаго «смѣшеніе змѣвика съ талькомъ» или съ желѣзною охрою, такъ въ большей части и въ видѣ чистаго змѣвика, который, въ

свою очередь, является или «плотнымъ, т. е. благороднымъ или слоистымъ, называемымъ Ковригинымъ нефритомъ»; обстоятельство это доказываетъ очевиднѣйшимъ образомъ, что между «нефритомъ» Ковригина и дѣйствительнымъ нефритомъ, найденнымъ Пермикинымъ въ Китайскихъ-же или въ Бѣльскихъ альпахъ (см. ниже) не можетъ быть ничего общаго, точно также какъ въ описанномъ выше «змѣвиновомъ камнѣ» можно предполагать породу, неимѣющую никакого отношенія къ змѣвику, а представляющую продолженіе тѣхъ тальковыхъ сланцевъ, которые на Саганъ-харѣ переходятъ въ описанный Черскимъ лиственитъ. Нѣкоторые виды упомянутого змѣвиноваго камня, именно смѣшанные съ желѣзною охрою, содержатъ въ себѣ вкрапленными кубическіе кристаллы цинковой обманки. Въ обоихъ мѣстахъ, между пластами змѣвика и змѣвиноваго камня, Ковригинъ находилъ асбестъ, пересекающій его (змѣвикъ?) по всевозможнымъ направленіямъ; въ числѣ разновидностей этого минерала онъ отличаетъ: аміантъ или горный ленъ, отличающійся желто-бѣлымъ цвѣтомъ; волокна его располагаются параллельно, имѣя слабую связь между собою и превышая въ длину одного дюйма; что-же касается другой разновидности, называемой Ковригинымъ обыкновеннымъ или горнымъ асбестомъ, то цвѣтъ его масляно-зеленый, длина волоконъ не болѣе  $\frac{1}{2}$  дюйма и связь между ними настолько болшая, что онѣ лишь съ трудомъ отдѣляются другъ отъ друга. Понятно, что на основаніи этихъ данныхъ нельзя еще рѣшить, имѣлъ ли Ковригинъ дѣло съ минералогически различными асбестами, или же, что и правдоподобнѣе, только съ видоизмѣненіями одного и того же хризотила, т. е. змѣвиноваго асбеста, находимаго и Черскимъ на Саганъ-харѣ. Кроме того въ верховьяхъ Китая находились Ковригинымъ сѣнаторскія жилы.

Далѣе, въ отрогахъ между Верхнимъ Китоємъ и Булаккомъ (Средній Китай), также въ верхнихъ частяхъ отроговъ между Самартою и Гарлыкомъ, а въ нижнихъ между Гарлыкомъ

и въ Саганъ-харомъ, по лѣв. берегу Китоа, Ковригинъ на-  
 юдилъ филлитъ («филладъ»), переходящій и на сѣверо-во-  
 сточное продолженіе Ильчирской долины. Въ сланцѣ этомъ,  
 заключающемъ не мало желѣзной охры, найдена имъ въ горѣ  
 между Верхнимъ Китомъ и озеромъ Ильчиромъ (на склонѣ  
 въ долину послѣдняго), цѣлая жила охры, заключающей въ  
 себѣ тонкіе призматическіе кристаллы галмея; на залыбан-  
 ныхъ жилахъ филлитъ проникнуть кристаллами сѣрнаго колче-  
 ва. Слюдяной сланецъ найденъ имъ между Булукъ (Сред-  
 ній Китою) и Ушарангою, а также между нею и Ханголдоемъ  
 въ 2½ верстахъ ниже устья Саганъ-хара, причемъ, въ ука-  
 занныхъ предѣлахъ развитія какъ этой породы такъ и фил-  
 лита, по обѣ стороны рч. Булукъ (Средній Китою) показанъ  
 еще хлоритовый сланецъ. Объ этой породѣ Ковригинъ замѣ-  
 чаетъ, что она имѣетъ «травяно-зеленый цвѣтъ»; въ составѣ  
 ея находится нѣкоторое количество темно-сѣраго кварца  
 (между Верхнимъ и Среднимъ Китоями), въ другихъ-же мѣс-  
 тахъ сланецъ этотъ «проникнуть окисломъ мѣди и тогда  
 цвѣтъ его представляется яремѣдянковымъ». Будущимъ изслѣ-  
 дователямъ необходимо обратить вниманіе на такой цвѣтъ слан-  
 цевъ, имѣя въ виду описанное выше нахожденіе хромовой  
 руды, открытое Черскимъ на Саганъ-харѣ, до устья котораго  
 Китою протекаетъ уже около 50 верстъ, считая отъ источ-  
 никовъ (т. е. Верхняго Китоа). Пространство между Саханъ-  
 харомъ и Ушарангою знакомо намъ уже по описанію Черскаго.  
 Далѣе, относительно теченія Китоа между Саганъ-харомъ и  
 устьемъ Китойкина, слѣдовательно на протяженіи около 70  
 верстъ (по Черскому), имѣются до сихъ поръ только распрос-  
 ные свѣдѣнія. Долина Китоа, какъ говорятъ, суживается  
 весьма значительно: до устья рч. Ехё-голь (см. ниже) можно  
 проходить по ней только въ малую воду, такъ какъ во мно-  
 гихъ мѣстахъ горы опускаются къ рѣкѣ отвѣсными скалами,  
 заграждающими путь и заставляющими бродить на противу-  
 положный берегъ, что не всегда достижимо по причинѣ не-

обычайной быстроты. Отъ устья-же Ехе-гòла, по словамъ сойотовъ, начинаются мѣста непроходимыя, причемъ Китъ въ трехъ мѣстахъ долженъ низвергаться водопадами, изъ которыхъ меньшій достигаетъ 10 сажень въ высоту <sup>1)</sup>. На этомъ протяженіи, по распросамъ Черскаго, въ Китой впадаютъ правой стороны: р.р. Ошой, и Верхній Архутъ, противоположность знакомому намъ уже Нижнему Архуту, съ лѣвой стороны: Гарлѣкъ-гòлъ, Ехè-гòлъ (неправильно: Эксголь у Ковригина) и Хатлѣкъ-гòлъ, ближайшій къ Китойкину, причемъ, согласно показанію Ковригина Ехè-гòлъ (*Ехè* большая, *гòлъ* рѣка) беретъ начало «с одной горы» съ Хара-булѣномъ (т. е. Малою Бѣлою), Хар Богдашкою и съ Китойкиномъ, слѣдовательно въ западныхъ окрестностяхъ котловины Ниланъ-сарамъ.

Маршрутомъ Черскаго соединяются затѣмъ устье Китойкина съ низовьями Архута, ниже котораго, на протяженіи приблизительно 20 верстъ, мы опять встречаемся съ нѣкъмъ непосѣщенною еще частью р. Китоя, который долженъ принимать здѣсь уже сѣверо-восточное направленіе. Изъ разпросныхъ свѣдѣній, собранныхъ въ 1834 г. горнымъ инженеромъ Стрельманомъ <sup>2)</sup>, но не отличающихся точностью, такъ какъ онъ имѣлъ дѣло съ жителями низовьевъ Китоя, неуглублявшимися вверхъ по теченію рѣки, можно полагать, что итересующій насъ отрѣзокъ долины долженъ значительно суживаться, такъ какъ ширина Китоя, достигающая около устья Китойкина около 60 сажень, ниспадаетъ ближе къ устью р.ч. Халмагана даже до 10 сажень, послѣ чего онъ только опять расширяется, вступая въ предѣлы изслѣдованій того же Стрельмана, къ статѣ котораго мы и обратимся при нижеслѣдующемъ изложеніи.

<sup>1)</sup> Ковригинъ. I. с. pag. 495.

<sup>2)</sup> Стрельманъ, Горн. Журн. 1835. Ч. III. стр. 9.

в) Течение р. Китоя отъ рч. Халмагана до устья въ Анггару.

Открытие золотосодержащихъ россыпей около устья Китоа послужило поводомъ къ снаряженію правительствомъ золотокимательной партіи въ 1834 г., начальникомъ которой и былъ пензенскій стрѣльцовъ Стрельманъ, изслѣдовавшій течение Китоа отъ рѣчки Халмаганъ до устья, а также и долины притоковъ этой части рѣчки. Китою, слѣдовавшій на нѣкоторомъ протяжении почти восточному направленію, въ разстояніи около 6 верстъ выше устья упомянутого выше Халмагана (лѣвый притокъ), какъ видно изъ приложенной къ статьѣ Стрельмана карты, дѣлаетъ крутой поворотъ вообще къ сѣверу, по направленію къ устьямъ Бытхей и Алангара (съ лѣвой-же стороны), слѣдовательно на протяжении почти 25 верстъ, послѣ чего, образовавъ небольшую излучину къ югу, онъ направляется нѣсколько дугообразно къ сѣверо-востоку, а затѣмъ къ востоку и немного къ юго-востоку, къ устью р. Тойсока, отстоящему отъ Халмагана почти въ 65 верстахъ, такъ-что на всемъ этомъ протяжении образуется значительный дугообразный изгибъ рѣчки, обращенный выпуклостью къ сѣверо-западу. Ниже устья Тойсока Китою принимаетъ сѣверо-восточное направленіе и только около 30 верстъ спустя, уже въ разстояніи около 15 верстъ отъ своего устья, поворачиваетъ нѣсколько къ западу и опять на сѣверо-востокъ къ Анггарѣ. Длина этой части Китоа, отъ Халмагана до устья, равняется на картѣ образомъ слишкомъ 100 верстамъ. Изъ притоковъ въ текстѣ и на картѣ Стрельмана значатся, съ лѣвой стороны: 1) рч. Халмаганъ (Халамганъ на картѣ), болѣе 15 верстъ длины, съ двумя верховьями, придерживающаяся почти восточнаго направленія; 2) рч. Быдхей (или Бытхей), около 20 верстъ длины и вообще съ с.-в.-нымъ направленіемъ; устье ея располагается всего лишь въ 2 верстахъ выше впаденія; 3)



рч. Алангаръ болѣе 15 верстъ длины и съ юго-восточнымъ направленіемъ. Далѣе, спусти около 13 верстъ, впадаютъ въ весьма близкомъ другъ отъ друга разстояніи рѣчки 4) Болдокъ (на картѣ Богдокъ), менѣе 10 верстъ длины и находящаяся въ такомъ же отношеніи къ слѣдующей за нею (Шарасуну), какъ Бытхей къ Алангару; 5) Шарасунъ до 1 верстъ длины, параллельный Алангару и 6) незначительный Харахунъ; спусти слишкомъ 30 верстъ ниже послѣдней впадаетъ небольшой ручей 7) Бурундуй, менѣе 10 верстъ длины, а 17 верстъ ниже его 8) рч. Целота (у Стрельмана неправильно «Солота») болѣе 25 верстъ длины, протекающая на сѣверо-востокъ, а около 8 верстъ ниже 9) рч. Картагонъ, параллельный Целотѣ, но до 40 верстъ длины и въ концѣ, сейчасъ-же ниже Картагона, уже въ 12 верстахъ отъ Ангара, 10) рч. Биликтуйка, болѣе 10 верстъ длины, впадающая около мѣста пересѣченія Китою московскимъ почтовымъ трактомъ. Что же касается правыхъ притоковъ, то ихъ извѣстно здѣсь только четыре, а именно: 1) Черемшанъ до 10 верстъ длины, впадающая въ 50 верстахъ ниже Халмгана; 2) р. Тойсокъ, самый большой изъ притоковъ, слишкомъ 50 верстъ длины; у Стрельмана мы находимъ, что Тойсокъ «имѣетъ свои родники въ горахъ, прилегающихъ къ Иркуту», слѣдовательно въ Тункинскихъ альпахъ, восточнѣе Сганъ-угунскаго перевала, приблизительно на меридіанѣ зѣкомаго намъ уже лѣваго притока Иркуты, рч. Кукой (Хухай по долину которой, какъ сказано въ своемъ мѣстѣ, проложена даже скотопрогонная тропа съ Торской котловины въ Тойсокъ. Общее направленіе рѣчки съ ю.-ю.-з. на с.-с.-в. съ значительнымъ S-образнымъ изгибомъ въ разстояніи болѣе 2 верстъ отъ устья, которое располагается около 9 верстъ ниже Черемшанки. Изъ притоковъ Тойсока извѣстны съ лѣвой стороны: а) Малый Жедой (или М. Жидой), впадающій въ предѣлахъ верхняго теченія рѣчки; б) Большой Жедой въ области восточнаго изгиба упомянутой выше извилины; в)

Индирей и Бургудей въ области западнаго ея изгиба, съ правой стороны рч. Тальянъ, впадающая нѣсколько выше Большаго Жедоя, и Бодканъ, устье котораго располагается немногимъ выше впаденія Хыдырея; наконецъ, послѣдній изъ правыхъ притоковъ Китоа 3) Адъ, болѣе 10 верстъ длины, изливается въ разстояніи около 19 верстъ ниже устья Тойсока; 4) Еловка въ 5 вер. ниже устья Ады.

Изъ передаваемыхъ Строльманомъ довольно скудныхъ и прочемъ орографическихъ свѣдѣній о мѣстности, орошаемой перечисленными рѣками, не можетъ подлежать сомнѣнію лишь то, что горы, съ которыми онъ встрѣтился только на западѣ отъ меридіана устья р. Тойсока, представляютъ собою восточное продолженіе, вѣрнѣе восточное окончаніе цѣпей, съ которыми мы ознакомились въ предшествовавшихъ главахъ нашего изложенія, но съ которыми изъ нихъ именно, это не удается описаніемъ Строльмана, такъ какъ онъ называетъ эти горы лишь отрогами Саяна, не будучи знакомымъ съ западнымъ продолженіемъ видѣнныхъ имъ цѣпей. Поэтому мы приведемъ здѣсь относящееся къ этому вопросу мнѣніе Черскаго <sup>1)</sup>, основанное на географическомъ положеніи изслѣдованной Строльманомъ мѣстности и на отношеніи ея къ горамъ, пересѣченнымъ маршрутомъ съ Саганъ-угуна черезъ Иркутъ и Китойкинъ на Богдашку съ одной стороны, а по долину и низовью Иркутъ съ другой. Сопоставленіе это дѣлаетъ во-первыхъ очевиднымъ, что гребень Тункинской цѣпи, представляющій, какъ извѣстно, альпійскій характеръ уже начиная отъ меридіана Саганъ-угунскаго перевала, располагается гораздо южнѣ этой мѣстности, именно, въ широтахъ верховьевъ Тойсока и ущелистой части Иркутъ; затѣмъ, описаніе теченія того-же Иркутъ сейчасъ-же ниже ущелья обнаружило, что впереди, т. е. сѣвернѣе горъ, образующихъ это длинное ущелье, располагаются другія (Еловый хребетъ), параллель-

<sup>1)</sup> Черскій, Рукописныя замѣтки о Сибири.

ныя Тункинскимъ. Такъ какъ мысленное продолженіе гребня Китайскихъ альповъ къ востоку проходитъ черезъ часть Китою между Архутомъ, Халмаганомъ и Бытыхеемъ и, переская теченіе Тойсока, съ достаточною точностью падаетъ хребетъ Еловый, продолженіе котораго мы найдемъ еще и ту сторону р. Ангарты, въ видѣ хребта Онотскаго, входяща въ составъ горъ сѣверо-западнаго берега Байкала. Поэтому Черскій предполагаетъ, что въ системѣ р. Тойсока Стрельманъ имѣлъ дѣло съ отрѣзкомъ Китайской цѣпи горъ, востокъ отъ пересѣченія ея Китоемъ въ томъ мѣстѣ, гдѣ рѣка, ниже устья Архута, поворачиваетъ на сѣверо-востокъ. Восточное продолженіе Бѣльской цѣпи слѣдуетъ искать поэтому по лѣвому берегу Китою, въ системахъ р.р. Алангара и Шарауна. Само собою разумѣется, что соображенія эти, требующія болѣе подробнаго изслѣдованія названнаго района, для того, чтобы возвести ихъ на степень непреложныхъ данныхъ, могутъ относиться лишь къ орографическимъ цѣпямъ горъ, никакъ не къ складкамъ пластовъ, направленіе и положеніе которыхъ, какъ мы увидимъ ниже при общемъ обзорѣ и какъ можно было судить изъ приведенныхъ выше опредѣленій простиранія и паденія пластовъ, не совпадаетъ съ направленіемъ описанныхъ горныхъ цѣпей.

Относительно конфигураціи изслѣдованныхъ Стрельманомъ горъ мы находимъ лишь весьма недостаточныя свѣдѣнія изъ его статей, гдѣ, въ свою очередь, не имѣется никакихъ указаній на ихъ высоту. Во всякомъ случаѣ въ статьѣ этой нигде не упоминается объ альпійскомъ характерѣ видѣнныхъ горъ, какъ и слѣдовало ожидать, судя по ближайшему маршруту Черскаго, какъ равно и потому, что, въ предѣлахъ изслѣдованія Стрельмана, горы эти должны уже теряться въ примыкающей къ нимъ плоской возвышенности, къ тому-же и при взглядѣ на нихъ съ Ангарты и низовьевъ Китою и вообще съ пролегающей здѣсь части почтоваго тракта, они являются уже какъ въ роли поросшаго лѣсомъ предгорья относительно весьма о

мѣстныхъ и замѣтныхъ лишь съ болѣе возвышенныхъ мѣстъ альпійскихъ пиковъ, лежащихъ уже западнѣе описываемаго района. Съ этимъ согласуется и текстъ Стрельмана, изъ котораго можно усмотрѣть напр. что, въ двухъ верстахъ отъ устья Доржоя (притокъ Халмагана), слѣдовательно въ самой западной окраинѣ области его изслѣдованій, «возвышается круто-возстающая, почти обнаженная гора, господствующая надъ окрестными высотами» (стр. 28); на западъ отъ Тойсока, къ которому горы эти понижаются и исчезаютъ, смѣнившись плоскою возвышенностью, «взоръ наблюдателя почти на каждомъ шагу встрѣчаетъ здѣсь круто-возстающіе, совершенно обнаженные откосы горъ, нависшіе надъ рѣками утесы, долины, усыпанныя каменными отломками или загроможденныя гранитовыми глыбами» (стр. 14), тогда какъ напр. между р. Бодханъ и устьемъ Тойсока горы «имѣютъ пологіе откосы и округленныя вершины» и «покрыты толстымъ слоемъ растительной земли и густыми лѣсами» (стр. 25). Что же касается долины, изрѣзывающихъ эти горы, то главная изъ нихъ, т. е. долина р. Китоя, отличается и самою значительною шириною, достигающею мѣстами даже 5 верстъ и болѣе. Долина Тойсока «имѣетъ въ сложности неболѣе 1½ версты ширины; самыя значительныя ея расширенія, какъ напр. при устьяхъ рѣчекъ Тальяна и Хыdereя (или Гидерея), не превышаютъ 3 верстъ»; съ приближеніемъ къ верховьямъ долина эта «до такой степени сжата краями горъ, что на всемъ этомъ протяженіи образуетъ крутосклоняющуюся ущелью, простирающуюся между отвѣсными почти откосами и, кромѣ немногихъ мѣстъ, покрытую непроходимыми болотами» (стр. 11); остальные затѣмъ долины по большей части очень рѣдкія и болотистыя.

Если провести почти меридіональную (ю.-ю.-в.) линію черезъ долины рѣкъ: Харагуна, Китоя, Черемшанки и Тойсока до устья въ него Бодхана, а затѣмъ повернуть ея къ юго-востоку, по теченію послѣдняго, то линія эта въ геогности-

ческомъ отношеніи будетъ играть роль границы, отдѣляюще двѣ различныя группы породъ, описанныхъ Стрельманомъ въ этой мѣстности. На западъ и юго-западъ отъ этой границы слѣдовательно въ предѣлахъ гористой части площади, развиты почти исключительно полевошпатовыя кристаллическія породы, а къ востоку и сѣверо-востоку, кристаллическіе сланцы, оломочныя породы и известнякъ.

Въ числѣ полевошпатовыхъ породъ Стрельманъ различаетъ: граниты, гранито-сіениты, діоритъ, порфиръ, бѣлый мѣнь и гнейсъ, причемъ о массивныхъ изъ нихъ онъ говоритъ, что всѣ онѣ «образуютъ непрерывный рядъ взаимныхъ переходовъ по составу и строенію» (стр. 30) и «суть не что иное, какъ случайныя только измѣненія въ составѣ гранитъ и всегда одновременнаго съ нимъ происхожденія» (стр. 31), и, если изъ всей этой толщи онъ выдѣляетъ гнейсъ въ особую группу (стр. 29), то обстоятельство это объясняется лишь теоретическими соображеніями автора, подчиненными господствовавшимъ въ то время воззрѣніямъ на гранитъ, какъ на породу, неминуемо изверженную, тогда какъ передаваемые частности вовсе не мѣшаютъ смотрѣть и на гнейсъ какъ на образованіе, стоящее въ близкой генетической связи съ названными массивными толщами. Гнейсъ этотъ, въ свою очередь, отчасти перемежается, отчасти соприкасается съ пластами слюдянаго сланца, которому подчинены кремнистый и талковый, причемъ слоистыя породы эти, съ гнейсомъ включительно, развиты только въ глубинѣ изслѣдованной части гор, слѣдовательно въ западной окраинѣ площади и напр. въ упомянутой выше, почти обнаженной горѣ, образующей высшій пунктъ въ системѣ рч. Халмагана (въ 2 верстахъ отъ устья Доржоя); пласты ихъ «падаютъ почти отвѣсно на юго-востокъ» (стр. 29). Такимъ образомъ, въ горахъ этихъ мы встречаемъ въ сущности продолженіе тѣхъ древнѣйшихъ же породъ, съ которыми мы не разставались на протяженіи всѣхъ описанныхъ выше маршрутовъ; гнейсъ вмѣстѣ съ слюданы

сидцемъ относится Стрельманомъ къ «первозданной области» (стр. 30), но вслѣдъ за гранитами, около означенной выше предѣльной черты и на востокъ отъ нея, появляются уже выходы другихъ, сравнительно менѣе древнихъ отложений. Такъ напр., хотя отрогъ горъ, расположенный между р.р. Шарасу-анъ и Харахуномъ (иначе Харахонъ) состоитъ еще въ главн. своей массѣ изъ гранита какъ мелкозернистаго, такъ крупнозернистаго и порфировиднаго, тѣмъ не менѣе порода эта въ оконечности названнаго отрога соприкасается уже съ толщами известняка, «изъ коего сложены горы, простирающіяся къ лѣвую сторону Харахона и образующія конечные отроги «святы горъ» (стр. 18). Точно также въ оконечности отрога, лежащаго между Большимъ Жедоемъ и Гидереемъ (лѣвые при-токи Тойсока) граниты и гранито-сienиты смѣняются со стороны Тойсока филлитомъ темно-сѣраго цвѣта (стр. 23), замѣ-чаемымъ въ видѣ обломковъ у подошвы горы и выше по те-чению Тойсока, именно между Большимъ и Малымъ Жедоями, причемъ къ филлиту подмѣшивается здѣсь и песчаникъ. Та-кое же измѣненіе въ строеніи горъ наблюдается и по рч. Бодавъ, такъ какъ по его лѣвому берегу развиты полевошпа-товые породы, именно гранитъ, между тѣмъ въ отрогѣ пра-ваго берега и до устья р. Тойсокъ въ Китой, хотя въ немъ встрѣчено мало обнаженій, но разбѣянные во множествѣ по скло-намъ «остроугольные, иногда весьма крупные, обломки песчаника и отсутствіе между ними ва-гнеровъ всякихъ другихъ породъ позволяютъ съ достовѣрною вѣроятностью заключить, что горы этого отрога сложены преимущественно изъ пес-чаника». Наконецъ, по правому берегу Китоя, ниже устья Тойсока, почва состоитъ изъ пластовъ известняка; толща этой породы, образуя сначала довольно высокія горы, образуютъ тѣмъ холмы почти непрерывно сливающіеся съ Ангарскою равниною, т. е. съ плоскою возвышенностью.

По вопросу объ относительной древности и стратиграфи-

ческих особенностях этих пород у Стрельмана находим следующие данные. Низшими стратиграфическими членами толщ онъ считает во-первыхъ филлитъ («филладъ»), который напр. между Жедоемъ и Гидереемъ, въ 4 верстахъ от устья послѣдняго, обнаруживаетъ ясное залеганіе на гранитъ при юго-восточномъ паденіи пластовъ и наклонъ въ  $55^{\circ}$ ; переходъ этой породы въ обломочную выражается находеніемъ въ ея массѣ угловатыхъ обломковъ такого-же сланца (филлита). Къ одному возрасту съ филлитомъ (къ «переходной области» стр. 36) Стрельманъ относитъ и толщ «сѣро-вакки», въ составъ которой онъ отличаетъ: а) мелкозернистый песчаникъ сѣраго цвѣта, образующій «главнѣйшую часть сей формации», б) сѣрую вакку или трауматъ, состоящую изъ довольно крупныхъ угловатыхъ обломковъ кварца, связанныхъ глинистымъ цементомъ и обладающую мѣстами сланцеватостью, и в) «горный известнякъ, встрѣчающійся въ обѣихъ предъидущихъ въ видѣ тонкихъ пластовъ», причемъ порода эта отличается кварцеватостью, темно-сѣрымъ цвѣтомъ и плотнымъ сложеніемъ. Перемена этого известняка съ «сѣрою ваккою» не оставляетъ уже сомнѣнія въ томъ, что на прилагательное «горный» слѣдуетъ смотрѣть здѣсь какъ на выраженіе петрографическихъ, а никакъ не возрастныхъ особенностей этой породы, относимой авторомъ, какъ сказано выше, къ «переходной области» (стр. 36), тогда какъ къ дѣйствительной «формации горнаго известняка» (стр. 36) или къ «известняку новѣйшаго образованія» (стр. 26) Стрельманъ причисляетъ пласты этой породы, развитые по лѣвому берегу Харахона (лѣв. притокъ Китоа) и Гургудея (лѣв. притокъ Тойсока), а также и известняки, тянущіеся по правому берегу Китоа къ Ангартъ; известнякъ этотъ, какъ передаетъ авторъ, залегаетъ поверхъ сѣрой вакки, всегда обилуетъ кремнеземомъ, мѣстами «видимо приближается къ состоянію рухляка» и заключаетъ многочисленныя, хотя

вообще узкія пещеры. Упомянувъ, что ископаемыхъ остатковъ въ пластахъ этихъ породъ нигдѣ не удалось найти, нельзя не замѣтить, что стратиграфическіе выводы Строльмана, не взимая на то, что они относятся къ 1834 г., вполне подтверждаются такими же отношеніями породъ, въ общемъ тождественныхъ по составу, описанныхъ позднѣйшими изслѣдователями въ горахъ сѣверо-западнаго берега Байкала, гдѣ онѣ такъ же прилегаютъ къ полевошпатовымъ, какъ къ болѣе древнимъ. Къ сожалѣнію и тамъ до сихъ поръ въ нихъ не найдено еще ископаемыхъ остатковъ, и потому древность ихъ опредѣляется лишь тѣмъ обстоятельствомъ, что верхній членъ всей этой весьма мощной толщи, представляющій какъ бы видимъ ниже непосредственное продолженіе Китойскаго известняка («известнякъ новѣйшаго происхожденія» Строльмана), покрывается далѣе къ сѣверу несомнѣнными девонскими осадками. Наконецъ, что касается наносныхъ отложеній долины р. Китоя, то Строльманъ сообщаетъ слѣдующій разрѣзъ почвы, наблюдавшійся имъ въ шурфѣ около устья этой рѣки, на правомъ ея берегу. Подъ слоемъ чернаго залегаеъ глинисто-песчаный пластъ съ гальками различныхъ породъ, преимущественно кварцевыхъ, зеленого камня, гранитовыхъ и филлитовыхъ; подъ этимъ пластомъ находится другой такой-же, но содержащій менѣе глины и болѣе мелкихъ гальки. Въ этихъ двухъ пластахъ, толщина которыхъ не показана, найдено было въ 1833 г. золото, количество котораго опредѣлено Строльманомъ для перваго пласта въ 20 до 40 и даже до 60 долей, а для втораго, т. е. болѣе глубокаго не болѣе 20 долей на 100 пудовъ, причемъ золото это добывается въ видѣ мельчайшихъ блескокъ, всплывающихъ на водѣ. Изъ послѣдующихъ затѣмъ новѣйшихъ изслѣдованій, относящихся къ низовьямъ р. Китой<sup>1)</sup>, известно, что все теченіе упомянутой выше рч. Кар-

<sup>1)</sup> Съѣмки межеваго отдѣленія въ Иркутскѣ, Геологическая карта Байкаловскаго при Зап. Сиб. Отд. Геогр. Общ. Т. XI.



тагонъ, за исключеніемъ верховьевъ ея лѣвыхъ притоковъ, также и Солоты (вѣрнѣе Целоты), слѣдуетъ считать продолженными въ предѣлахъ долины Китоа, ширина которой поэтомъ ниже устья Тойсока, достигаетъ 19 верстъ, послѣ чего она постепенно суживается такъ, что въ разстояніи около 6 верстъ отъ устья, ширина эта ниспадаетъ до  $8\frac{1}{2}$  верстъ; къ тому-же въ 5-ти верстахъ ниже устья упомянутой уже выше рч. Ад (или Оды), въ Китоѣ впадаетъ съ правой-же стороны небольшая рч. Еловка, извѣстная по соляному ключу, расположенному недалеко отъ устья, на правомъ берегу рѣчки, въ не эксплуатированному и не изслѣдованному еще подробно. Относительно геогностическаго строенія сдѣлалось также и извѣстнымъ, что ближе къ устью Китоа, въ берегахъ его долины, обнажаются юрскіе прѣсноводные осадки, въ видѣ буровато-желтыхъ песчаниковъ, подъ которыми здѣсь долженъ скрываться «известнякъ новѣйшаго происхожденія». Строльмана, и, если на геогностической картѣ Чекановскаго (1. с.) мы видимъ юрскую краску, распространенную на юго-западъ до устья р. Тойсока, то причину этого явленія слѣдуетъ искать въ томъ обстоятельствѣ, что Чекановскій не былъ знакомъ съ работами Строльмана и цитировалъ его статью лишь по краткому реферату проф. Эрмана; поэтому распространеніе юрской области, гдѣ Строльманъ встрѣтилъ известняки, является лишь предположеніемъ, такъ какъ самъ Чекановскій не углублялся вверхъ по Китою на западъ отъ пересѣкающаго его почтоваго тракта. Что-же касается указаній на достовѣрность залеганія известняка подъ юромъ, то съ ними мы ознакомимся при изложеніи свѣдѣній, имѣющихся о той части плоскогорья возвышенности, которая прилегаетъ къ сѣверо-восточному склону интересующаго насъ отрѣзка горной страны между системами р.р. Оки и Иркута.

Вмѣстѣ съ устьемъ Тойсока измѣняется характеръ долины Китоа и въ томъ отношеніи, что даетъ уже мѣсто какъ полупустыннымъ скотоводамъ, такъ и земледѣльческимъ поселеніямъ.

Здѣсь, т. е. около Тойсока, въ первый разъ можно видѣть  
вѣтъ бурятъ, разсѣянные по обоимъ берегамъ Китою неболь-  
шими улусами, представляющими крайнія западныя поселе-  
нія по этой рѣкѣ. Далѣе на востокъ, почти въ девяти вер-  
стахъ выше устья рч. Ады (30 верстъ отъ Ангара), на лѣ-  
вомъ берегу Китою располагается первое осѣдлое поселеніе,  
извѣстное подъ именемъ деревни Архіерейской. Деревня  
эта въ 1889 г. состояла изъ 17 дворовъ и 87 жит., исклю-  
чительно бурятъ. Во владѣніи ихъ было до 420 дес. земли,  
въ томъ числѣ пахатной 144 дес. Лошадей у нихъ было 60,  
крупнаго рогатаго скота 54, мелкаго 105. Въ 11 верстахъ  
дальше, слѣдовательно между устьями Ады и Еловки, находится  
другая, Ясашная деревня, съ 37 дворами и 180 жите-  
лями, также бурятами, во владѣніи которыхъ состоитъ 780  
дес. земли, въ томъ числѣ пахатной до 260 дес. Лошадей у  
нихъ было въ 1889 г. до 100, крупнаго рогатаго скота 100  
головъ, мелкаго 110. Оба эти селенія, вмѣстѣ съ выселкомъ  
Савватеевскимъ (на р. Одѣ, прав. пр. Китою) и улусамъ  
почтовыхъ бурятъ, образуютъ Китойское инородчес-  
кое вѣдомство.

Инородцы этого вѣдомства занимаютъ двѣ межевыя дачи  
въ двухъ отдаленныхъ одна отъ другой мѣстностяхъ. Первая  
въ 44 т. дес. по р. Китою, гдѣ кромѣ осѣдлыхъ инородцевъ упо-  
мянутыхъ деревень обитаютъ кочевые бурятскіе роды Кур-  
патскій и Чечеловскій. Пашни упомянутыхъ родовъ и деревень  
большую частію черезполосны, покосы находятся въ общемъ  
владѣніи всѣхъ однопланныхъ селеній и рѣдко въ отдѣль-  
номъ владѣніи каждаго селенія или улуса. Другая межевая  
дача въ 24 т. дес., занятая инородцами Китойскаго вѣдомства,  
находится за Ангарию, въ верховьяхъ ея праваго притока  
Балея и въ сосѣдствѣ съ землями Буяковского рода бурятъ  
Капсальскаго вѣдомства. Тамъ обитаетъ Сойгутскій родъ Ки-  
тойскаго вѣдомства, состоящій изъ 5 улусовъ, имѣющихъ через-  
полосныя пашни и сообща пользующихся выгонами и покос-

сами. Во всемъ Китайскомъ вѣдомствѣ инородцевъ 1940 м. п. (997 м. п.); изъ нихъ осѣдлыхъ 285, остальные кочевныя. Лицъ м. п. въ рабочемъ возрастѣ 523, хозяйствъ 360. Изъ нихъ 212 имѣютъ по 1 работнику, (въ томъ числѣ въ нихъ есть полуработники), 75 по 2 работника, 50 по 3 и болѣе. Въ 24 хозяйствахъ нѣтъ взрослыхъ работниковъ, но въ нихъ есть подростки (полуработники). Грамотныхъ, грамотныхъ и учащихся только 31 м. п.

Земель въ пользованіи инородцевъ вѣдомства кромѣ общаго 9240 дес. т. е. болѣе 9 дес. на душу м. п., по 18 работниковъ и около 26 на хозяйство. Земли пахатной 42 дес., но только половина ея занята дѣйствительно запашкою, что и составляетъ 2 дес. на душу м. п., 4 на взрослого работника и 6 на хозяйство. Изъ каждаго 100 дес. засѣяно 83 подъ рожью (75 подъ озимою и 8 подъ ярицею), 13 подъ овсомъ и 3 подъ пшеницею. Чистый средній сборъ: ржи 8 пуд., овса 40, пшеницы 37 на дес. каз. мѣры. Луговъ 3600 дес. Скота инородцы вѣдомства содержатъ: лошадей 14 (рабочихъ 1070), крупнаго рогатаго 2050, мелкаго скота 1680 головъ (въ т. ч. овецъ 800, козъ 200, свиней 40). На каждое хозяйство приходится среднимъ числомъ около 1 лошадей, болѣе 6 штукъ крупнаго рогатаго скота и менѣе 5 мелкаго. Въ особенности овцеводство мало развито, да вообще инородцамъ волости приходится бороться съ не самыми благоприятными условіями почвы и климата. Китайское вѣдомство очень богато лѣсомъ, но сбыта ему нѣтъ. Лѣсами инородцы пользуются свободно. Кромѣ удовлетворенія собственныхъ нуждъ, нѣкоторые хозяйства (48) занимаются лѣсными промыслами. Что же касается до остальныхъ промысловъ, болѣе 40% способныхъ работниковъ занимаются сверхъ земледѣлія и промыслами, причемъ половина охотою, рыболовствомъ и собираніемъ кедровыхъ орѣховъ, а другая нѣкоторыми кустарными промыслами.

Русскія же селенія находятся только на нижней члѣнѣ

селенія Китоа. Первое изъ нихъ Китойское расположено около устья р. Целоты. Въ селеніи этомъ съ заимками 102 двора и 570 жителей, въ томъ числѣ 22 новосела и 26 поселенцевъ, остальные русскіе старожилы. Во владѣніи ихъ земли 1,590 дес. (менѣе 6 дес. на душу м. п.), въ томъ числѣ пахатной 762 дес. Скота они содержатъ: лошадей 280, крупнаго рогатаго скота 313, мелкаго 375. Второе русское селеніе на Китоѣ Биликтуйское находится уже на пересѣченіи Китоа почтовымъ трактомъ при устьѣ рѣки Биликтуйки. Въ этомъ селеніи 184 двора (съ 4 заимками) и 1,086 жит. об. п., въ числѣ коихъ 190 новоселовъ, 100 поселенцевъ, остальные русскіе старожилы. Они владѣютъ 4,000 десятинъ земли, въ томъ числѣ у нихъ пахатной земли 1,490 дес. Скота у нихъ: лошадей 484; 562 крупнаго рогатаго и 680 головъ мелкаго скота. Кромѣ того въ бассейнѣ Китоа входятся еще слѣдующія русскія селенія: 1) Целота, на сѣмьинной рѣкѣ, лѣвомъ притоцѣ Китоа, съ 126 дворами, 450 жит. об. п. (52 новосела, 36 поселенцевъ, остальные старожилы), владѣющими 1,390 дес. земли (720 пахотной) и содержащими 520 лошадей, 290 головъ крупнаго рогатаго и 440 мелкаго скота (въ томъ числѣ болѣе 130 свиней). 2) Больше-Еланское на р. Картагонѣ, также лѣвомъ притоцѣ Китоа, съ 255 дворами, 1,350 жит. об. п., почти исключительно русскихъ старожилловъ, владѣющихъ 4,900 дес. земли (пахотной 2,980 дес.) и содержащихъ лошадей болѣе 700, крупнаго рогатаго скота 600 головъ, мелкаго 1,300 (въ томъ числѣ 525 свиней): 3) Мало-Еланское на той же рѣкѣ, съ 64 дворами, 400 жит. об. п. (47 новоселовъ, 4 поселенца, остальные старожилы), владѣющими 1,400 дес. земли (600 дес. пахатной) и содержащими 214 лошадей, 140 головъ крупнаго рогатаго скота и 60 мелкаго. 4) Култукское на одномъ изъ верхнихъ притоковъ Картагона съ 94 дворами, 534 жит. об. п. (40 новоселовъ, 30 поселенцевъ, остальные старожилы), владѣющихъ 1,770 дес. земли

(1194 пахотной) и содержащихъ болѣе 400 лошадей, 28 головъ крупнаго рогатаго скота и 690 мелкаго. Селенія Китойское, Биликтуйское, Целота и Мало-Еланское относятся вмѣстѣ съ тремя селеніями расположенными по Ангартѣ между устьями Иркутка и Китоя, къ Суховской волости, волостное селеніе которой с. Сухое расположено на р. Ангартѣ почтовомъ трактѣ. Селенія Больше-Еланское и Култуковское относятся, вмѣстѣ съ 6 селеніями расположенными по Ангартѣ ниже устья Китоя, къ Тельминской волости, главное селеніе которой находится на р. Ангартѣ и большомъ сибирскомъ трактѣ. Общія свѣдѣнія о Суховской и Тельминскихъ волостяхъ между которыми дѣлятся бассейнъ Нижняго Китоя будутъ сообщены ниже тамъ гдѣ мы будемъ говорить о селеніяхъ Сухомъ и Тельминскомъ <sup>1)</sup>. О фаунѣ и флорѣ мѣстности будетъ сказано въ особой главѣ изложенія; въ слѣдствіи читатель ознакомится и съ весьма интересными остатками человѣка каменнаго (неолитическаго періода, окрытыми Витковскимъ въ 4 — 5 верстахъ отъ лѣваго берега устья Китоя, около Ангарты <sup>2)</sup>; здѣсь-же слѣдуетъ упомянуть, что сибирскою нивелировкой, о которой было сказано уже раньше, абсолютная высота уровня р. Китоя около с. Биликтуйскаго, опредѣлена въ 1413 футовъ (см. ниже).

Такимъ образомъ, изъ приведенныхъ выше данныхъ оказывается, что длина всего теченія р. Китоя опредѣляетъ приблизительно въ 240 верстъ <sup>3)</sup>, распредѣляющихся слѣдующимъ образомъ по различнымъ его частямъ: а) отъ верховья

<sup>1)</sup> Новѣйшія свѣдѣнія о селеніяхъ и сельскомъ хозяйствѣ Иркутскаго округа см. Матеріалы по изслѣдованію землепользованія и хозяйственнаго быта сельскаго населенія Иркутской и Енисейской губерній Т. I. Иркутскъ 1889.

<sup>2)</sup> Витковский, Изв. Сиб. Отд. И. Р. Геогр. Общ. Т. XX № 1 и 2.

<sup>3)</sup> Свѣдѣнія Словцова (Историч. Обзоръ Сибири. 1844 г. Т. I Гегемейстера (Статистич. Обзор. Сибири) и Штукенберга (Hydrograph. 1844 г. В. II), основаны на устарѣвшихъ уже данныхъ.

Верхній Китой Ковригина) до устья Ушаранги 30 верстъ, б) отъ Ушаранги до Саганъ-хара 20; в) отъ Саганъ-хара до устья Китойкина 62; г) отъ Китойкина до устья Халмагана 28 и д) отъ Халмагана до Ангара 100 верстъ. Пользуясь же при этомъ имѣющимися гипсометрическими данными величина общаго паденія долины рѣки отъ устья Ушаранги (5701') до Ангара (върѣе до Биликтуя 1413') нѣсколько превышаетъ 10' на версту, между Ушарангою и Саганъ-харомъ (5370') 16,5', между Саганъ-харомъ и Китойкиномъ (3153'), гдѣ явно находятся, какъ говорятъ, непроходимыя мѣста и водопады, паденіе достигаетъ около 36' на версту, а наконецъ, въ промежуткѣ между устьемъ Китойкина и Ангарию, склонъ этотъ уменьшается до слишкомъ 13' на версту, при чемъ понятно, что точность цифръ этихъ слѣдуетъ считать лишь приблизительною до тѣхъ поръ, пока всѣ эти пункты не будутъ соединяться точными съемками и инструментальною, а не барометрическою нивелировкой.

##### 5) Теченіе р. Бѣлой и система ея притоковъ.

Верхнее теченіе р. Бѣлой или Большой Бѣлой (Ехе-булунъ у бурятъ) на протяженіи около 130 верстъ, до устья р. Урикъ, слѣдовательно, почти половина всей длины рѣки, извѣстна до сихъ поръ только по распроснымъ свѣдѣніямъ, собраннымъ главнымъ образомъ Пермикинымъ, Части Кропоткинымъ и Черскимъ. На основаніи этихъ свѣдѣній эта часть рѣки изображается и на современныхъ картахъ (см. ниже), и только, начиная съ устья р. Урикъ, т. е. остальныхъ 140 верстъ теченія, до устья въ Ангарию, сняты на рукописныхъ картахъ Иркутскаго Межеваго Отдѣленія и изображены по этимъ даннымъ на упомянутой выше географической картѣ Чекановскаго въ масштабѣ 10 верстъ въ дюймѣ. Въ нижеслѣдующемъ изложеніи, для большаго удобства обзора, теченіе р. Бѣлой мы раздѣлимъ на три части,

менно: отъ верховьевъ до устья р. Урикъ включительно затѣмъ отъ Урика до Малой Бѣлой или Онота, и наконецъ отъ Онота до устья въ Ангару.

а) Верхняя часть р. Бѣлой до устья р. Урикъ.

Верховья Большой Бѣлой означаются на картахъ въ 20 верстахъ къ с.-з. отъ Алиберовскаго графитоваго рудника и въ 30 верстахъ на с.-в. отъ устья знакомой намъ уже р. Сороки въ р. Оку, вблизи отъ источниковъ лѣвыхъ притоковъ Сороки, причемъ въ той же мѣстности должны брать начало и нѣкоторые изъ правыхъ притоковъ той же главной рѣки. Отсюда р. Бѣлая образуетъ большой дугообразный изгибъ: слѣдуетъ на с.-с.-в. и с.-в., послѣ чего поворачиваетъ въ востокъ, придерживаясь вообще такого направленія до самаго устья. Въ предѣлахъ этой части, въ разстояніи около 130 верстъ отъ верховьевъ, въ нее впадаетъ одинъ изъ болѣе значительныхъ правыхъ притоковъ, упомянутая выше р. Урикъ, образующая предѣлъ малоизвѣстной части теченія Бѣлой, но, начиная съ верховьевъ, мы знаемъ еще слѣдующіе притоки. Съ лѣвой стороны, въ разстояніи около 30 верстъ отъ верховьевъ, указываютъ только на одинъ притокъ, называемый Зимовною рѣчкою, вѣроятно отъ построеннаго тамъ гдѣ-либо теплаго охотничьяго балагана, называемого зимовьемъ, тогда какъ съ правой стороны въ Бѣлую впадаютъ: 1) рч. Захребетная, впадающая нѣсколько ниже Зимовной, затѣмъ два ключа: 2) Верхній и 3) Нижній Таргазай; далѣе, въ разстояніи уже около 90 верстъ отъ верховьевъ 4) р. Ермъ <sup>1)</sup>, берущая начало между источниками

---

<sup>1)</sup> У Штукенберга (Hydrographie) неправильно «Горманъ», длина которой приписывается въ 150 верстъ, точно также какъ Урикъ называется имъ «Уракъ».

ли Бѣлой и водѣ, впадающихъ въ Урикъ, причемъ длина той рѣчки должна достигать болѣе 60 верстъ, а ближе къ верховьямъ значатся два притока: Хыдылгѣй съ лѣвой, Бурухтай съ правой стороны. Наконецъ самою значительною въ описываемой части теченія является 5) р. Урикъ, принадлежащая вмѣстѣ съ тѣмъ и сравнительно къ болѣе исследованнымъ правымъ притокамъ. Она составляется изъ двухъ знакомыхъ намъ уже рѣчекъ, именно: Ханшина и Горка. Ханшинъ, называемый въ верховьяхъ также Ханшею (Ханшя), беретъ начало на з.-с.-з. отъ Алиберовскаго рудника въ тѣхъ же горахъ, т. е. въ западной части Бѣлосой дѣли, изъ которой вытекаютъ какъ Бѣлая, такъ и система р. Сороки. Эта часть Ханшина или Ханши до сихъ поръ никѣмъ еще не исследована, и только въ промежуткѣ между ея правыми притоками Ботугѣломъ и Хашигѣломъ, около сѣверо-западнаго подножія Графитоваго гольца, мы ознакомились съ нею по описаннымъ выше маршрутамъ Черскаго, видѣвшаго и устье рч. Зодѣ или Зодѣ-желгѣ, впадающей въ Ханшинъ съ лѣвой стороны, нѣсколько выше устья Хашигѣла. Отсюда остается еще около 25 верстъ теченія на сѣверо-востокъ, до сліянія съ Хоркомъ, на пути, къ которому извѣстны еще два лѣвыхъ притока Ханшина, именно: Верхняя и Нижняя Хорѣй-желгѣ. Въ свою очередь съ верховьями рч. Хорѣка мы ознакомились при описаніи дороги, ведущей отъ озера Ильчира къ Алиберовскому руднику, и прослѣдили его долину почти до устья рч. Гагархай или Хагархай. Такимъ образомъ, начинаясь въ той части Китайскихъ альповъ, которая извѣстна подъ именемъ Ильтѣй-дабана, слѣдовательно гораздо южнѣе Ханшина, и придерживаясь въ общемъ меридіональнаго направленія до устья Хагархай, Хорѣкъ поворачиваетъ затѣмъ къ сѣверо-востоку, къ сліянію съ Ханшиномъ (болѣе 30 верстъ ниже Хагархай?), на пути къ которому онъ воспринимаетъ съ правой стороны двѣ рѣчки: Хѣлбу и Амбарту (Амбартѣ-



голь). Отъ соединенія Ханшина съ Хоркомъ длина теченія Урика предполагается въ слишкомъ 70 верстъ, считая дутья въ Большую Бѣлую. На этомъ протяженіи въ него впадаютъ съ лѣвой стороны: рч. Щигна, берущая начало недалеко отъ верховьевъ Ханшина, а затѣмъ незначительныя ручей Ганой; что-же касается правыхъ притоковъ Урика то первымъ изъ нихъ, самымъ длиннымъ, является рч. Даялокъ, весьма интересная въ геогностическомъ отношеніи вслѣдствіе находженія въ ея долинѣ нефрита. Первые свѣдѣнія объ этой рѣчкѣ относятся еще къ 1836 г. и заключаются въ цитированной уже выше статьѣ Ковригина<sup>1)</sup> Рѣчка Даялокъ, по его свидѣтельству и согласно его картѣ на которой впрочемъ изображено не все теченіе ея, беретъ начало недалеко отъ источниковъ знакомой намъ уже Оспы и имѣетъ два верховья: одно изъ нихъ вытекаетъ изъ озера, лежащаго «на горѣ, раздѣляющей долину Даялка отъ Онота», т. е. Оспы, а другое «составляется на сѣверо-западной сторонѣ изъ нагорныхъ ключей». Направленіе теченія Даялка Ковригинъ считаетъ отъ юго-запада на сѣверо-востокъ; въ такомъ видѣ онъ проходитъ до верховьевъ рч. Ирленка (см. ниже), послѣ чего дѣлаетъ поворотъ почти прямо на сѣверъ, а спустя около 1 верстъ «впадаетъ въ Хорокъ» (слѣдуетъ понимать Урикъ). Длину всего теченія Даялка, считая съ его изгибами Ковригинъ принимаетъ около 45 верстъ, изъ чего слѣдуетъ заключить, что около 35 верстъ этой длины, т. е. до упомянутого выше поворота къ сѣверу, падаетъ на его сѣверо-восточное направленіе, — условіе, представляющее немаловажное недоразумѣніе, такъ какъ при современномъ состояніи картографіи мѣстности, начерченная такимъ образомъ линія теченія Даялка упрется съ одной стороны въ Оспу и даже пересѣчетъ её, съ другой-же не достигнетъ теченія р. Урика

<sup>1)</sup> Ковригинъ, Горн. Журн. 1836 г. Ч. III. Кн. VII стр. 499.

Недоразумѣніе это не уничтожается равнымъ образомъ и свѣдѣніями, переданными о Даялкѣ Пермикинымъ, посѣтившимъ эту мѣстность въ началѣ пятидесятихъ годовъ для розысковъ цѣнныхъ и драгоцѣнныхъ камней. Кромѣ представленныхъ имъ рукописныхъ отчетовъ Пермикинъ составилъ въ 1853 г. наглядную карту водараздѣла рѣкъ Иркутъ, Оки, Китоя и Бѣлой въ масштабѣ 30 верстъ въ дюймѣ. Карта эта, хранящаяся въ библіотекѣ Восточно-Сибирскаго Отдѣла И. Р. Географическаго Общества и уничтоженная впоследствии пожаромъ 1879 года, была въ свое время единственною подробною картою этой мѣстности, такъ какъ карта Ковригина не охватываетъ собою всего названнаго района. Въ уменьшенномъ масштабѣ (40 верстъ въ дюймѣ) карта Пермикина, въ предѣлахъ р.р. Бѣлой и Китоя, а также относительно некоторыхъ подробностей верхнихъ притоковъ р.р. Оки и Иркутъ, вошла въ карту астронома Шварца почти безъ измененийъ, такъ какъ съ работою Ковригина (1836 г.) Шварцъ не имѣлъ случая ознакомиться <sup>1)</sup>. Длина Даялка по Пермикину точно также не превышаетъ 45 верстъ; на картѣ его, копія которой въ увеличенномъ масштабѣ (около 2,5 версты въ дюймѣ) сохранилась у Черскаго <sup>2)</sup>, точно также означены два верховья, располагающіяся вблизи отъ верховья Оспы, только оба эти верховья берутъ начало изъ озеръ, а вся длина Даялка отличается с.-с.-в.-мъ и почти совершенно прямолинейнымъ направленіемъ, что впрочемъ объясняется очевидно тѣмъ обстоятельствомъ, что карта дѣлана лишь для самаго общаго, «нагляднаго» и лишь приблизительнаго изображенія гидрографической сѣти, которая и отличается на ней (на рукописной картѣ) неестественною прямолинейностью. Такъ какъ близость праваго верховья Даялка къ Оспѣ подтверждается и распросами Черскаго, то поэтому

<sup>1)</sup> Шварцъ, Труды Сиб. Экспед. Матем. Отд. стр. 66—67.

<sup>2)</sup> Черскій, Рукописныя Замѣтки о Сибири.

линія теченія этой рѣчки не можетъ совмѣститься на картѣ и въ томъ видѣ (с.-с.-в.), въ какомъ её изображаетъ Пермикинъ, такъ какъ она во-первыхъ потребовала-бы нѣкотораго перемѣщенія р. Оспы къ востоку и значительнаго, для невозможнаго передвиженія Урика къ юго-востоку, безъ чего Даялокъ направится прямо въ Бѣлую и приметъ не собственную ему длину. Вотъ почему на картѣ Черскаго Даялокъ только въ его верховьяхъ протекаетъ согласно съ указаніями Ковригина, тогда какъ далѣе онъ принимаетъ уже почти сѣверо-западное направленіе и только въ такомъ видѣ не нарушаетъ сѣти описанныхъ выше маршрутовъ его Оспѣ и Китою. Правда, что и эти маршруты не установленные еще вполне правильною и непрерывною съемкою и потому современнымъ должны замѣтно измѣниться, тѣмъ не менѣе сравнительно съ предшествовавшими, а въ особенности съ изображеніемъ этихъ рѣкъ на картѣ Шварца, они заслуживаютъ гораздо болѣе довѣрія и временно могутъ служить базисомъ, къ которому должны покамѣсть относиться какъ всѣ разспросныя данныя, такъ тѣ, достовѣрность которыхъ еще не подтверждена позднѣйшими изслѣдованіями.

Относительно долины Даялка Ковригинъ сообщаетъ, что ширина ея весьма различна: въ нѣкоторыхъ мѣстахъ достигаетъ до двухъ верстъ, а въ другихъ до того суживается окрестными горами, что превращается почти въ ущелье и не вергается водопадами; ширину русла онъ опредѣляетъ мѣстами въ 15 сажень. Такъ какъ на картѣ Ковригина означена только верхняя часть теченія Даялка, поэтому на немъ можно видѣть лишь два безымянныхъ притока, впадающихъ въ рѣчку ниже соединенія ея верховьевъ, по одному каждой стороны; у Пермикина Даялокъ начерченъ безъ притоковъ, и только въ разстояніи около 7 верстъ выше устья Урикъ означенъ ничтожный правый притокъ около 3-хъ верстъ длины, въ верховьяхъ котораго стоитъ надпись «*Коловина Ирленка*», а въ ней шесть маленькихъ озеръ

наки, указывающіе на нахожденіе тамъ сойотскихъ юртъ. То-мъ, что сойоты живутъ на Ирленѣ, сообщаетъ также и Радде, считая эту мѣстность сѣвернымъ предѣломъ распространія названнаго племени; тождественныя-же свѣдѣнія получилъ и Черскій отъ Оспинскихъ и Ильчирскихъ сойотовъ, указывающихъ на котловину Ирленки, какъ на мѣсто постоянного жительства ихъ единоплеменниковъ. Ковригинъ въ своей статьѣ вслѣдъ за Даялко-мъ описываетъ Ирленокъ, говоря, что она беретъ начало въ горахъ праваго берега долины Даялка; главное направленіе Ирленки съ сѣверо-запада на юго-востокъ, длина съ изгибами около 15 верстъ, ширина при устьѣ 10 сажень. О доли-нѣ рѣчки говоритъ, что она довольно обширная и «что трудно найти въ этой странѣ такіе мѣста, гдѣ бы горы дохо-дили до самаго русла рѣчки; паденіе ея, въ сравненіи съ другими долинами, незначительное, и воды текутъ до-вольно спокойно»; но къ сожалѣнію въ текстѣ не сказано то-мъ, въ какую рѣку впадаетъ этотъ Ирленокъ, на картѣ между тѣмъ рѣчка эта значится притокомъ не Даялка, а впадавшагося уже Угунъ-гѣла, впадающаго въ Оспу (см. выше ниже). По словамъ того-же Ковригина (I. с. pag. 505—506) горы около Даялка не отличаются такою крутизною склоновъ, вершины ихъ болѣе или менѣе округлены, а вы-сота сравнительно гораздо меньше, причемъ въ доли-нѣ появ-ляется и бѣлая береза (стр. 508). Что-же касается геогно-стическаго строенія этихъ горъ, то въ верховьяхъ долины Ковригинымъ найденъ гранитъ, принимающій мѣстами пор-фировидное строеніе и переходящій около озера праваго верховья въ бѣлый камень; затѣмъ въ 1½ верстахъ ниже слиянія обоихъ верховьевъ встрѣчена полоса кристалличес-каго известняка, ниже которой опять показанъ гранитъ.

Нефритъ, пріобрѣвшій столь классическую извѣстность, казался еще болѣе интереснымъ минераломъ съ тѣхъ поръ, когда наука узнала о значеніи, какое онъ имѣлъ для

доисторического человѣка какъ матеріалъ для каменныхъ орудій и нѣкоторыхъ другихъ издѣлій. Что касается съмысловъ положительныхъ данныхъ о мѣстности, въ которой встрѣчается этотъ красивый минералъ, то ими мы обязаны уже упоминавшемуся выше Пермикину, вывезшему изъ интересующей насъ части горной страны немалое количество нефрита. Но такъ какъ отчеты его не были къ сожалѣнію въ печати и на географическое положеніе мѣстности, съ которой добывался нефритъ нерѣдко не обращалось достаточнаго вниманія, поэтому въ литературѣ, по вопросу о нахожденіи этого минерала въ Восточной Сибири мы находимъ цѣлый рядъ въ высшей степени сбивчивыхъ разногласныхъ и неточныхъ показаній. Такъ напр. мѣсто рожденіемъ нефрита у нѣкоторыхъ считается «южная часть Иркутской губерніи или точнѣе Забайкальскій область» <sup>1)</sup>; согласно другимъ, минералъ этотъ находитъ «около Иркутска» <sup>2)</sup>; говорятъ даже, что нефритъ кажется распространеннымъ по всей области Байкальскаго озера, но всего болѣе извѣстенъ въ горѣ Ботуголь, недалеко отъ графитоваго рудника» <sup>3)</sup>, затѣмъ «въ окрестностяхъ Култука т. е. деревни около юго-западной оконечности Байкала, с. р. Слюдянкѣ» — притокъ той-же оконечности озера и «с. р. Быстрой» — знакомый намъ уже притокъ Иркуты въ ущелья, — слѣдовательно все мѣстности, въ которыхъ нефритъ или никогда не находился, или-же (на рч. Быстрой, ниже) найденъ былъ въ видѣ кусковъ, привезенныхъ съ Байкальскихъ альповъ и оставленныхъ тѣмъ же Пермикинымъ.

<sup>1)</sup> Щуровскій, О коллекціи минераловъ, служившихъ матеріаломъ для изготавленія каменныхъ орудій.

<sup>2)</sup> Анучинъ, Антропологическая выставка въ Москвѣ.

<sup>3)</sup> Гревингъ, Eine Ostsibirische Gräberstätte des Steinalters. Dorpat 1882.

проживавшимъ долгое время на приискѣ лазореваго камня  
на р. Быстрой, какъ равно и въ Кулукѣ, гдѣ имъ произ-  
водились и многіе опыты шлифованія собранныхъ цвѣтныхъ  
и драгоценныхъ минераловъ и горныхъ породъ <sup>1)</sup>. Такимъ  
образомъ только въ позднѣйшихъ ссылкахъ на «р. р. Бѣ-  
лую и Китою» <sup>2)</sup> можно видѣть указанія на мѣстности,  
которыя и самъ Пермикинъ считалъ мѣсторожденіемъ инте-  
реснѣшаго намъ минерала. И дѣйствительно, уже на упо-  
мянутой выше сгорѣвшей картѣ Пермикина, гдѣ показаны  
мѣста находженія кварцовъ, мраморовъ, агальматолита, гра-  
нита и лазореваго камня, означены были рѣки, по берегамъ  
которыхъ найдены имъ самые красивые нефриты травяно-  
зеленаго цвѣта и другія, по которымъ найдены нефриты темно-  
зеленаго цвѣта (очевидно въ галькахъ), а также и мѣста ко-  
ренного мѣсторожденія этого минерала <sup>3)</sup>, что равнымъ обра-  
зомъ подтверждалось и его рукописнымъ отчетомъ, котораго,  
къ сожалѣнію, постигла одинаковая участь съ картою, такъ  
что только замѣткамъ Черскаго (I. с.), читавшаго этотъ от-  
четъ, мы обязаны сохраненіемъ главныхъ свѣдѣній, относя-  
щихся къ интересующему насъ вопросу. Согласно этимъ за-  
мѣткамъ, какъ на мѣста кореннаго мѣсторожденія нефрита  
Пермикинъ указывалъ во-первыхъ на знакомую намъ уже рч.  
Саганъ-харъ (лѣвый притокъ Китою), а затѣмъ на Даялокъ  
и Оспу (?). На Саганъ-харъ нефритъ долженъ былъ сла-  
вать собою значительную часть нѣкоторыхъ горъ (гольцовъ),  
а Даялокъ коренное мѣсторожденіе хотя и поросло рас-  
тительностью, но обнаруживается увеличеніемъ нефритовыхъ  
валуновъ по мѣрѣ приближенія къ нему, — валуновъ, дости-  
гающихъ наконецъ громаднхъ размѣровъ и до 50 пудовъ

<sup>1)</sup> Черскій, Рукописныя замѣтки о Сибири.

<sup>2)</sup> Фишеръ, Мушкетовъ и друг. см. ниже.

<sup>3)</sup> Труды Сиб. Экспед., I. с., стр. 66—67; Черскій, Рукописныя замѣтки  
о Сибири.

вѣсомъ; что-же касается Оспы, то по ней, повидимому, мѣсто рожденіе предполагалось только на основаніи небольшихъ галекъ и валуновъ, причемъ необходимо замѣтить, что Пермикну были знакомы только низовья Оспы и часть сама верхняго ея теченія (выше водопада), куда онъ попалъ рч. Саганъ-харъ, тогда какъ среднюю часть Оспы, послѣ неудачной попытки пройти вверхъ по ней, онъ считалъ непроходимою.—Не взирая на упомянутыя выше вещественныя доказательства нахожденія нефрита въ интересующихъ насъ горахъ, указанную Пермикнымъ область распространія этого минерала необходимо все-таки значительно уменьшить, основываясь на описанныхъ нами изслѣдованіяхъ Черскаго. Путешественникъ этотъ удостовѣряетъ <sup>1)</sup> во-первыхъ, что всѣ найденныя имъ гальки и валуны по свойствамъ рѣкъ Китоа, Иркуты и Бѣлой, хотя бы нѣсколько напоминающія по наружности и цвѣту нефритъ, оказались состоящими изъ змѣвика и потому легко царапаются ножомъ, производящимъ, какъ извѣстно, никакого дѣйствія на столь твердый минералъ какъ нефритъ; то же оказалось и относительно коренныхъ выступовъ породъ, похожихъ на нефритъ какъ въ верхнемъ теченіи р. Оспы или Онота, такъ и Саганъ-хару, породы эти могутъ быть признаны только различными видоизмѣненіями змѣвика, которыми, какъ сказано выше, въ особенности изобилуетъ долина Саганъ-хара томъ мѣстѣ (первый правый притокъ ниже сліянія верховьевъ гдѣ на картѣ Пермкина означено мѣсторожденіе нефрита). На основаніи этихъ данныхъ Черскій заключаетъ, что мѣсторожденіе добытаго Пермикнымъ нефрита, при настоящемъ уровнѣ нашихъ свѣдѣній, можно считать только Дайлокомъ, что подтверждается и тѣмъ фактомъ, что хранившихся въ Музеѣ Восточно-Сибирскаго Отдѣла Геогр.

<sup>1)</sup> Черскій, Изв. Сиб. Отд. И. Р. Геогр. Общ. 1886 г. Т. X № 1—4 стр. 278, а также Рукописныя замѣтки о Сибири.

Черского Общества зеленыхъ штуфовъ валуновъ и галекъ Пермикинской коллекціи, только тѣ оказались дѣйствительно нефритовыми, которые по каталогу значились съ рч. Даялокъ. Съ этимъ вполне согласуются и свѣдѣнія, почерпнутыя Черскимъ изъ рукописнаго отчета Пермикина, въ которомъ только при описаніи поисковъ его по рч. Даялокъ говорится о постепенномъ увеличеніи нефритовыхъ валуновъ по мѣрѣ приближенія къ верховьямъ долины и огромныхъ размѣрахъ этихъ валуновъ: а въ такомъ видѣ, т. е. въ видѣ окатанныхъ и хорошо округленныхъ отторженцевъ, являлось именно не количество вывезеннаго Пермикинимъ нефрита, въ томъ числѣ и тѣ тяжеловѣсные валуны, о которыхъ упомянуто было выше, и тотъ большой валунъ, который до сихъ поръ сохраняется еще въ Иркутскомъ Музеѣ, изменившійся въ цвѣтъ послѣ пережитаго имъ пожара. Изъ числа нефритовыхъ валуновъ той-же коллекціи допожарнаго музея Черскій помнитъ одинъ небольшихъ размѣровъ и весьма красиваго темнезеленаго цвѣта, съ одной стороны побурѣлый и чертящійся даже ножомъ; въ одномъ изъ многочисленныхъ, какъ бы раздѣленныхъ углубленій, которыми была усѣяна бураловая валуна, углубленіе еще отчасти асбестовидный минералъ, выполнявшій прежде это углубленіе; въ этомъ случаѣ, это былъ несомнѣнный змѣевиковый асбестъ. Гдѣ именно находится коренной выходъ нефрита, изъ котораго произошли названные имъ валуны на Даялкѣ и среди какой породы вмѣстѣ этотъ минералъ, Пермикинъ не могъ опредѣлить, такъ какъ склонъ горъ на мѣстѣ вѣроятнаго мѣсторожденія нефрита оказался поросшимъ; разъясненіе этого вопроса слѣдуетъ выжидать, разумѣется, отъ будущихъ, специальныхъ исследованийъ этой долины. Во всякомъ случаѣ, всѣ имѣющіяся до сихъ поръ данныя говорятъ лишь въ пользу самостоятельности мѣсторожденія нефрита въ долинахъ системы Даялка: маршруты Черскаго опоясываютъ верховья этой рѣчки съ востока (по р. Оспѣ), съ юго-востока и юга (Саганъ-харъ



и верхняя часть течения Китола), съ юго-запада (Ильчир Ирку-гарганъ) и съ запада (Хорюкъ, Ботуголь, Ханшинъ) не встрѣчая на этомъ пути ни самого нефрита, ни условіи указывающихъ на какую либо возможность переноса с юго-запада, хотя бы съ южной или западной стороны, гдѣ впрочемъ нахождение этого минерала вовсе не извѣстно, а при настоящемъ уровнѣ нашихъ свѣдѣній даже неправдоподобно, что-же касается течения Ханшина и Урика до устья Даяля слѣдовательно линіи, замыкающей кругъ маршрутовъ, обрамляющихъ верхнее течение Даялка, то по этой линіи, в которой придерживается и дорога (тропа), ведущая отъ Алберовскаго рудника на р. Бѣлую, проѣхалъ и самъ Перминъ, не находя тамъ ни валуновъ, ни мѣсторожденій нефрита, не показывавшихся имъ равнымъ образомъ ни Ботуголь, ни въ окрестностяхъ графитоваго гольца <sup>1)</sup>, геогностическихъ особенностяхъ котораго мы говорили уже въ своемъ мѣстѣ. Относительно микроскопическихъ и химическихъ особенностей восточно-сибирскаго нефрита, мы пользуемся здѣсь работами Мушкетова и Бека <sup>2)</sup>, въ которыхъ читатель, интересующійся этимъ вопросомъ, можетъ найти и ссылки на иностранную литературу объ этомъ минералѣ. Сравнительное изученіе сибирскаго и хотанскаго нефритовъ обнаружило, что сибирскій нефритъ имѣетъ составъ нѣсколько отличный отъ средне-азиатскаго и характеризуется именно гораздо болѣе значительнымъ содержаніемъ желѣза, кромѣ того сибирскій нефритъ обладаетъ болѣе развитою микросланцеватостью, содержаніемъ зеренъ хромистаго и хромистаго желѣзняка, а также прожилковъ асбеста, тогда какъ хотанскіе нефриты представляютъ наиболѣе плотную массу, примѣся зеренъ различныхъ желѣзняковъ въ нихъ оче-

<sup>1)</sup> Черскій, Рукописныя замѣтки о Сибири.

<sup>2)</sup> Мушкетовъ и Бекъ, Зап. Мин. Общ. 1882 г. Т. XVII; Туркестанъ 1886. Т. I, и Гор. Журн. 1882 г. ч. I.

рѣки, но зато они содержатъ характерныя скопленія діопсида или близкаго къ нему минерала. Вообще же названіе ученымъ относительно природы нефрита приходятъ къ тому же заключенію, какъ и Бервертъ <sup>1)</sup>, именно, что нефритъ есть ничто иное, какъ плотная разность лучистаго или роговообманковаго ряда; но съ другой стороны, то обстоятельство, что Мушкетову удалось открыть нахождение діопсида въ составѣ этого минерала, заставило его высказаться за вѣроятную принадлежность нѣкоторыхъ нефритовъ къ пироксеновому ряду и что эта разница въ природѣ интересующаго насъ минерала можетъ быть связана съ различными мѣсторожденіями его <sup>2)</sup>.

Въ слѣдующемъ параграфѣ изложенія мы ознакомимся еще съ нѣкоторыми указаніями на нахождение нефрита въ низовьяхъ р. Омота, а теперь возвратимся къ теченію р. Урика отъ устья въ него Даялка до впаденія въ р. Ылэю. Отрѣзокъ этотъ, достигающій около 60 верстъ длины, никѣмъ еще не описанъ; онъ посѣщался правда тѣмъ же Пермикинымъ на пути его къ Даялку и Ботуголу, но краткія свѣдѣнія о немъ, преимущественно географическія, затерялись вмѣстѣ съ рукописнымъ отчетомъ, и только извѣстно, что на этомъ протяженіи въ Урикѣ впадаютъ съ правой стороны еще двѣ рѣчки, именно Хоя и Глохдой, причемъ и въ нѣсколькихъ верстахъ выше устья Урика на картѣ Чекановскаго означенъ правый притокъ, впрочемъ безъ названія. Изъ распросныхъ свѣдѣній оказывается <sup>3)</sup>, что въ низовьяхъ Урика, очевидно въ наносѣ, какъ и слѣдовало полагать изъ сообщенныхъ выше данныхъ, нефритъ извѣстенъ въ видѣ валуновъ и мелкихъ камешковъ, знакомыхъ и мѣстнымъ жителямъ, тогда какъ оби-

<sup>1)</sup> Бервертъ, Sitzungsberichte d. k. Acad. d. Wissenschaften. Wien. 1880.

<sup>2)</sup> Мушкетовъ, Горн. Журн. 1882 ч. I. стр. 41.

<sup>3)</sup> Изв. Сиб. Отд. И. Р. Геогр. Общ. 1882 г. Т. XIII № 1—2.

татели низовьевъ Китоа, по словамъ Витковского, вовсе не знакомы съ этою «зеленою порою», гальки которой и он встрѣчали въ горахъ на р. Бѣлой. Этимъ ограничиваютъ наши современныя свѣдѣнія о верхней части теченія р. Большой Бѣлой; что-же касается всей западной и сѣверо-западной (лѣвой) стороны теченія этого отрѣзка и узкой впрочемъ полосы мѣстности (около 50 верстъ), отдѣляющей верховъ Бѣлой отъ р. Оки, то часть эта до сихъ поръ еще абсолютно неизвѣстна, хотя у Словцова (Историч. обзоръ Сибири I. хребетъ, разобщающій Оку отъ Бѣлой, носить названіе Идинскаго.

в) Отъ устья р. Урика до устья Малой Бѣлой.

Длина средняго теченія Большой Бѣлой, именно отъ устья Урика до устья Малой Бѣлой, достигаетъ 75 верстъ считая по изгибамъ, при общемъ направленіи почти на востокъ (нѣсколько на в.-ю.-в.). Долина рѣки расширяется здѣсь сначала до 3—4, а далѣе и до 10 верстъ, представляя уже всѣ условія, необходимыя какъ для скотоводства, такъ и для земледѣлія, вслѣдствіе чего часть эта уже заселена какъ бурятами такъ и русскими. Если не обращать вниманія на самыя незначительныя прибрежныя ключики, не достигающія и 5 верстъ длины, то лѣвые притоки р. Бѣлой начинаютъ лишь въ 25 верстахъ ниже устья Урика, въ лицѣ Шарагуна и Ирети. Шарагунъ, уже представляетъ собой небольшой ручей до 10 верстъ длины, берущій начало въ самой долинѣ Бѣлой и протекающій съ запада на востокъ почти параллельно ей. Такимъ же въ общемъ направленіи отличается и р. Иреть до 35 верстъ длины, берущая также начало въ самой долинѣ Бѣлой, на мѣстѣ значительнаго ея расширенія и впадающая въ 6 или 7 верстахъ ниже Шарагуна. Судя по большой ширинѣ Ирети и по верховьямъ ея, расположеннымъ всего лишь въ 3 верстахъ отъ лѣва

берега главной рѣки, Черскій полагаетъ <sup>1)</sup>, что современная Иреть играла вначалѣ роль лѣваго рукава р. Бѣлой, омывшаго съ сѣверной стороны большой островъ (около 30 верстъ длины и до 10 верстъ ширины), по осевой части котораго протекаетъ нынѣ упомянутый выше Шарагунъ; ручей этотъ впоследствии долженъ былъ засориться съ верхней стороны по теченію (т. е. съ западной) и поддерживался нынѣ впадающимъ въ него въ томъ мѣстѣ ключемъ, замерзающимъ зимою (Талый ключъ). Въ разстояніи около 60 верстъ выше устья Ирети, въ нее изливается длинный (болѣе 60 верстъ) лѣвый притокъ, извѣстный подъ названіемъ Голуметь, протекающій въ общемъ параллельно рѣкѣ Бѣлой, съ запада на востокъ, но въ разстояніи около 10 верстъ и болѣе отъ нея. Рѣчка эта беретъ начало уже на возвышенности, соприкасаясь своею системою съ лѣвыми притоками р. Ои и съ вѣдряющимися сюда верховьями нѣкоторыхъ рѣчекъ, впадающихъ въ Ангару ниже р. Бѣлой (см. ниже). Изъ болѣе значительныхъ лѣвыхъ притоковъ Голумети необходимо упомянуть рч. Ендотъ, а также Аларъ (всѣ болѣе 30 верстъ длины), изъ которыхъ послѣдній беретъ начало изъ Алятскаго озера, протекающаго 4 версты длины и болѣе версты въ ширину (см. ниже). Озера находятся также и въ самой долинѣ р. Бѣлой, какъ напр. Кривое и Божье, оба на правомъ берегу долины; изъ нихъ Кривое лежитъ почти на меридіанѣ р. Ирети, недалеко отъ берега рѣки, а Божье нѣсколько ютѣе, около 5 верстъ отъ Бѣлой. Что же касается правыхъ притоковъ, то въ промежуткѣ между Урикомъ и Малой Бѣлою, извѣстны лишь незначительные ручейки, впадающіе въ Большую Бѣлою; одинъ изъ нихъ, означенный и на картѣ Пермикина, носитъ названіе Налетѣгунъ; въ разстояніи же около 10 верстъ выше устья М. Бѣлой, на

<sup>1)</sup> Черскій, Рукописныя замѣтки о Сибири.

картъ Чекановскаго показанъ соляной ключъ Талый, т. незамерзающій зимою, хотя, къ сожалѣнію температуръ его, какъ равно и образующаго современное верховъ Ирети (см. выше) до сихъ поръ неизвѣстна; точно такъ какъ неизвѣстна и степень насыщенія его солью.

Геогностическія условія строенія этого отрѣзъ р. Бѣлой изображены на картѣ Чекановскаго, по которъ видно, что лѣвый берегъ долины сопровождается юрскими прѣсноводными осадками, главнымъ образомъ песчаникомъ изъ подъ котораго, напр. насупротивъ и нѣсколько ниже устья Урика, а также ниже устья Ирети, выступаетъ известнякъ, продолжающійся и далѣе внизъ по рѣкѣ. Порода являющаяся продолженіемъ известняка, описаннаго нами низовьяхъ р. Китоя (ниже устья Тойсока см. выше), выступаетъ изъ подъ юрскихъ осадковъ и въ нѣкоторыхъ мѣстахъ въ системѣ р. Голумети, гдѣ, въ десяти верстахъ выше Ендю, также какъ по Бѣлой нѣсколько ниже Урика, служить матеріаломъ для обжиганія извести. Юрскіе осадки показаны Чекановскимъ и въ промежуткѣ между Большою и Малою Бѣлою, впрочемъ на основаніи лишь распросныхъ свѣдѣній такъ какъ маршрутъ Чекановскаго въ предѣлахъ интересующаго насъ отрѣзка рѣки касается только средней трети теченія, поворачивая вверхъ по р. Ирети и пересѣкая затѣмъ Голуметскую долину, на пути къ упомянутому выше Алескому озеру, причемъ въ наносѣ посѣщенныхъ имъ бережій р. Бѣлой онъ не находилъ нефритовой гальки. На одномъ мѣстѣ той же части теченія р. Бѣлой, лежащемъ въ 8 верстахъ выше устья Малой Бѣлой, именно къ окрестности деревни Мотовской или Мотовой (на прав. берегу Б. Бѣлой см. ниже) относится также одно изъ наблюденій золотоискательской партіи 1824 г., научными результатами которой, касавшимися главнымъ образомъ нижняго теченія р. Бѣлой, а также Малой Бѣлой и Оюта (см. ниже), не могъ пользоваться Риттеръ, такъ какъ они обнаружены только въ 1858

Н. Щукинъ <sup>1)</sup>, къ сожалѣнію безъ поименованія фамиліи бывшаго въ этой партіи учителя Иркутской (?) гимназіи, которому мы и обязаны упомянутыми естественно-историческими замѣтками. Въ дневникѣ этомъ читаемъ, что въ названномъ мѣстѣ (около дер. Матовой) гора на берегу р. Бѣлой обнажаетъ въ основаніи крупно-зернистый точильный камень (очевидно песчаникъ), потому идуть слои отвердѣвшей глины и каменнаго угля, убѣждающіе, что въ этомъ мѣстѣ путешественникъ имѣлъ дѣло съ юрскими осадками, сопровождающимися обыкновенно углемъ (см. ниже). Жители этой части р. Бѣлой занимаются преимущественно земледѣліемъ; нѣсколько существующихъ здѣсь заводовъ, какъ-то: винопренный, фарфоровый (см. ниже) и кожевенный, облегчаютъ въ возможность сбыта произведеній, а также и заработки мѣстожителства; собраніе кедровыхъ орѣховъ, и котичій промыселъ развиты главнымъ образомъ только у жителей крайнихъ населенныхъ мѣстъ какъ по Бѣлой, такъ и по Толумети, напр. въ деревняхъ Иретской, Краснобродской и другихъ.

в) Теченіе р. Малой Бѣлой и Оюта, иначе Оспы.

Съ системою верховьевъ р. Малой Бѣлой (Хара-бдунъ у бурятъ) мы ознакомились выше, при описаніи маршрута Черскаго. Она беретъ начало въ горахъ, причисляемыхъ названнымъ путешественникомъ уже къ Бѣльской цѣпи, въ сѣверныхъ и сѣверо-западныхъ окрестностяхъ котловины Ниланъ-сарамъ (см. выше) въ видѣ праваго меньшаго и лѣваго большаго многоводнаго верховья, располагающихся недалеко отъ источниковъ Китойкина съ одной, а Богдашки съ другой стороны. Лѣвое верховье р. М. Бѣлой, согласно

<sup>1)</sup> Щукинъ, Журн. Мин. Внутр. Дѣлъ 1858. Ч. XXVIII. Записки первого золотопромышленника.

Ковригину <sup>1)</sup>, на протяженіи 6 верстѣ отличается юго-восточнымъ направлениемъ, при ширинѣ около 4 сажень, но послѣ соединенія съ правымъ источникомъ, Хара-булунъ поворачиваетъ почти подъ прямымъ угломъ на сѣверо-востокъ, при чемъ ширина его увеличивается до 6 сажень. Поворотъ этотъ (*булунъ* означаетъ уголъ), совершаемый рѣчкою въ мѣстности, густо поросшей лиственницею, елью и кедромъ (чернолѣсіемъ), послужилъ поводомъ къ названію рѣчки Хара-булунъ, т. е. черный уголъ. На картѣ Ковригина верховья эти обозначены ошибочно всего лишь въ разстояніи менѣе 3 верстѣ отъ лѣваго берега Китоя и въ 21 верстѣ къ юго-западу отъ верховьевъ Богдашки, впадающей, какъ извѣстно въ р. Оспу, изъ чего очевидно, что Ковригинъ не перешелъ съ Малой Бѣлой на Богдашку; то же относится отчасти и къ картѣ Пермикина, которому во-первыхъ Богдашка была неизвѣстна, а источникъ М. Бѣлой показанъ, хотя и въ разстояніи 20 верстѣ сѣвернѣе Китоя, но въ видѣ одной только рѣчки, вытекающей изъ озера, по сосѣдству съ верховьями «Горлыка», играющего на его картѣ роль отсутствующаго Китойкина. Исходя по этому изъ знакомаго намъ уже маршрута Черскаго, связывающаго Хара-булунъ какъ съ Китоемъ и Иркутомъ, такъ и съ Богдашкою, верховья Малой Бѣлой или Хара-булуна оказываются лежащими приблизительно на меридіанѣ источника рч. Тунки (см. выше), въ 30 верстахъ сѣвернѣе р. Китоя, слѣдовательно гораздо восточнѣе пункта, указывавшагося предшественниками, обстоятельство еще болѣе уменьшающее предполагавшуюся длину этой рѣчки сравнительно съ воспринимаемымъ ею Онотомъ или Оспою. Такимъ образомъ, если принять во вниманіе положеніе низовьевъ Малой Бѣлой, гдѣ производилась топографическая съемка отъ устья этой рѣчки до сліянія ея съ Онотомъ, т. е. въ протяженіи около 63 верстѣ отъ Большой Бѣлой, то на длинѣ

<sup>1)</sup> Ковригинъ, 1. с. pag. 500—501.

Хара-булуна отъ верховьевъ до Онота остается приблизительно только 50 верстъ. Пространство это до сихъ поръ никѣмъ еще не изслѣдовано, что-же касается нижней части теченія, т. е. отъ Онота до устья, то изъ упомянутой выше топографической съемки, которую воспользовался Чекановскій для своей карты, видно, что эта часть теченія имѣетъ уже характеръ не горныхъ рѣкъ, отличающійся извилистостью, многими островами и шириною долины, мѣстами расходящею 5 верстъ. Съ лѣвой стороны, на половинѣ длины этого отрѣзка М. Бѣлой, въ нее впадаютъ два небольшихъ притока, изъ которыхъ одинъ, согласно картѣ Перелюдина, а слѣдовательно и Шварца, именуется Шарагунъ, а другой какъ съ правой стороны извѣстенъ: Курга, лѣвое верховье которой носитъ названіе Черной пѣди, затѣмъ Малой, еще ниже рч. Иреть или малая Иреть (см. ниже) наконецъ, незначительный Безимьянный притокъ. Иреть эта впервые показана на картѣ Чекановскаго по рисунку межеваго отдѣленія и оказывается самымъ значительнымъ притокомъ низовьевъ М. Бѣлой, такъ какъ наибольшая длина его достигаетъ почти 60 верстъ. Иреть образуется изъ двухъ лучевидно сходящихся верховьевъ, изъ которыхъ лѣвое (около 20 верстъ длины) беретъ начало только въ 6 верстахъ отъ Хара-булуна, нѣсколько выше сліянія его съ Онотою, а правое (до 25 верстъ длины) въ 10 верстахъ отъ Онота, почти въ 40 верстахъ выше устья въ него знакомаго намъ уже Тойсока. Между названными двумя верховьями располагается цѣлая свита ключей и ручейковъ въ видѣ правыхъ притоковъ лѣваго верховья и лѣвыхъ притоковъ праваго, параллельность которыхъ (т. е. ручейковъ) и значительное число ихъ придаетъ на картѣ довольно оригинальную рисовидную наружность этому развѣтвленію. Мѣсто сліянія двухъ верховьевъ располагается въ 33 верстахъ отъ устья, по направленію къ которому Иреть претекаетъ въ общемъ на северо-востокъ съ дугообразнымъ изгибомъ къ юго-востоку.



Долина Ирети, согласно той же съемкѣ, является значительно расширенною въ области описаннаго выше древовиднаго развѣтвленія верховьевъ, а ниже его ширина долины измѣняется отъ 2 до 4 верстъ, причемъ на половинѣ длины теченія считая отъ слиянія верховьевъ, въ Иреть впадаютъ одинъ лѣвый и одинъ правый притокъ, названія которыхъ остаются неизвѣстными. Начиная отъ мѣста слиянія описанныхъ верховьевъ, гдѣ располагается крайняя, т. е. самая нижняя деревенька Парамонова (см. ниже), по теченію Ирети находятъ еще три другія (Осинцева, Перевалова и Гагаринская) и одна заимка, т. е. хуторъ въ 3 верстахъ отъ устья.

По нижнему теченію Малой Бѣлой прошла упомянутая выше золотоискательная партія 1824 г., направившись из с. Бѣльскаго, расположеннаго на лѣв. берегу Большой Бѣлой насупротивъ устья Малой. По этой рѣчкѣ, говоритъ путешественникъ, продолжаютъ мѣста ровныя, на которыхъ стояли заимки или хутора, принадлежащія Бѣльскимъ крестьянамъ; одинъ изъ нихъ, на которомъ партія провела ночь, располагается въ 25 верстахъ, считая отъ Бѣльскаго, а другой въ 40 верстахъ, т. е. 15 верстами далѣе и называется Огарковою, при чемъ дорога все время пролегала по прекраснымъ лугамъ долины; промытый на ручномъ вальгертѣ песокъ не обнаруживалъ золота, а только «листочки молибдена». Въ 8 верстахъ выше заимки Огарковой населенность Малой Бѣлой оканчивается жилищемъ осѣдлыхъ тунгусовъ, занимающихся здѣсь хлѣбопашествомъ, а отчасти и звѣроловствомъ. Отсюда тропа подымается уже на хребетъ, черезъ который переваливаютъ на р. Оноть (см. ниже); хребетъ этотъ устьянъ обломками известняка, образующаго очевидно коренную породу, слагающую этотъ отрогъ и выступающую и подъ юрскихъ осадковъ, показанныхъ Чекановскимъ и правомъ берегу низовьевъ Малой Бѣлой, отъ ея устья почти до Онота, а также и по Малой Ирети. По этой послѣдней Чекановскій проѣхалъ до заимки Переваловой (около 16 вер

выше устья въ М. Бѣлую); развитыя здѣсь юрскія породы (песчаники и глинистые сланцы) отличаются краснымъ цвѣтомъ, явленіе, которое вначалѣ не легко было объяснить. Посѣтивъ однако въ послѣдствіи мѣста горѣнія каменнаго угля, Чекановскій убѣдился, что красноватый цвѣтъ названныхъ породъ неслѣдуетъ и здѣсь отъ бывшаго горѣнія флецовъ. Особенно вѣдательное доказательство такому воззрѣнію онъ видитъ въ красныхъ глинистыхъ сланцахъ, залегающихъ между красноватыми песчаниками нѣсколько выше Переваловой: они вполне однородны съ такими же сланцами, добывавшимися еще въ горячемъ состояніи съ мѣста подземнаго пожара на р. Знѣ (системы Оки, см. выше), и обнаруживаютъ отпечатки тропическихъ растеній; къ тому же мѣстные жители утверждаютъ, что въ наносахъ Ирети они находили кусочки каменнаго угля, залежи котораго слѣдуетъ, должно быть, искать гдѣ либо выше на рѣкѣ. Что же касается валуновъ и галекъ нефрита, то о нахожденіи ихъ по низовьямъ Малой Бѣлой не упоминаютъ ни Чекановскій, ни путешественникъ 1824 г.; а ему, какъ мы увидимъ ниже, извѣстно было предполагавшееся происхожденіе валуновъ этого минерала по р. Оноту, къ которому мы и обратимся.

Слѣдя за описаннымъ выше маршрутомъ путешествія Черскаго, мы ознакомились съ верхнею частью р. Онота, извѣстнаго тамъ подъ названіемъ р. Оспы, до устья въ него р. Богданки. Рѣка эта, т. е. Оспа, знакома была отчасти уже Ковригину<sup>1)</sup> и имъ впервые нанесена на карту, на которой впрочемъ мы видимъ только одно изъ ея верховьевъ, соответствующее лѣвому. Верховье это означено Ковригинымъ въ 12 верстахъ сѣвернѣе р. Кытоя, въ 15 верстахъ сѣвернѣе источниковъ Малой Бѣлой или Хара-булуна и въ 30 верстахъ на з.-с.-з. отъ послѣднихъ, вслѣдствіе чего все теченіе Оспы должно было принять в.-с.-в.-ое направле-

<sup>1)</sup> Ковригинъ, Горн. Журн. 1. с.

ніе. Почти въ такомъ же отношеніи къ Китою изображается верховье Оспы и на картѣ Пермикина, но относительно истока Малой Бѣлой оно лежитъ уже въ разстояніи 24 верстъ къ з.-ю.-з. Наконецъ Черскій на своей картѣ обозначаетъ источники р. Оспы въ видѣ двухъ верховьевъ, берущихъ начало по обѣ стороны высшаго пункта Китойскихъ альповъ, — Мунку-саганъ-хардыка, въ разстояніи около 13 верстъ на сѣверъ отъ Китою (слѣдовательно, какъ у Ковригина и Пермикина), но въ 45 верстахъ на юго-западъ отъ источниковъ Малой Бѣлой, почти на меридіанѣ Ниловой Пустыни (119° 21' вост. долг.). Если не обращать вниманія на восточное направленіе въ предѣлахъ сойотскихъ зимниковъ, теченіе Оспы до устья въ нее Богдашки (70 верстъ отъ верховьевъ) отличается въ общемъ почти меридіональнымъ направленіемъ, причемъ почти вся средняя треть этого отрѣзка ниже водопада протекаетъ по довольно глубокому ущелью. Главнѣйшіе притоки этой части съ лѣвой стороны: рѣчка, притекающая со стороны верховьевъ Даялка, считающаяся третьимъ или Нижнимъ верховьемъ Оспы, затѣмъ ущелистый Хужиртэй-голь, затѣмъ Уйзенъ и наконецъ Угунъ-голь (у Ковригина ошибочно «Гунголь», а у Пермикина: «Охоль-голь»), впадающій уже ниже Богдашки, но видимый съ ея устья. Рѣчка эта (т. е. Угунъ-голь) не описана ни у Пермикина ни у Ковригина, а только изображается ими на картахъ, причемъ, по Пермикину, она беретъ начало изъ озера, расположеннаго въ горахъ между Даялкомъ и Оспою, откуда рѣчка, достигающая 40 верстъ длины, слѣдуетъ сначала на с.-с.-в., а затѣмъ на востокъ, къ устью въ Оспу, но съ устья Богдашки, какъ сказано выше, Черскій видѣлъ долину Угунъ-гола, направляющуюся въ низовьяхъ на сѣверо-востокъ. Въ видѣ лѣваго притока Угунъ-гола у Пермикина показанъ маленькій ручей безъ названія, берущій начало около описанной выше котловины Ирленки, принадлежащей системѣ Даялка, между тѣмъ у

Ковригина именно этотъ лѣвый притокъ Угунъ-гола носить название Ирленки, являясь въ видѣ рѣчки около 25 верстъ длины и до 10 саженой ширины (при устьѣ), отличаясь, какъ сказано выше, довольно широкою долиною съ сравнительно небольшимъ паденіемъ, причемъ подробности эти, передаваемые въ текстѣ, служатъ доказательствомъ тому, что рѣчка эта осматрѣна Ковригинымъ лично, при чемъ онъ указываетъ на обнаженія известняка на правомъ берегу верхней части теченія этой рѣчки, тогда какъ остальная часть долины занята гранитомъ, въ которомъ, около истоковъ Ирленки, Ковригинъ находилъ кристаллы вениссы. Поэтому, хотя въ текстѣ Ковригина и не сказано, куда впадаетъ Ирленка, нѣтъ не менѣе существованіе этой рѣчки, независимо отъ впадающей въ Даялокъ изъ котловины Ирленки, дѣлается очевиднымъ, а замѣчаніе, что она направляется къ юго-востоку, совпадаетъ съ показаннымъ на его картѣ устьемъ Ирленки въ Угунъ-голь. Что-же касается правыхъ притоковъ Оспи, то изъ нихъ достойнымъ замѣчанія является одна лишь р. Богдашка, знакомая намъ уже изъ путешествія Черскаго. На картѣ Ковригина нижняя половина теченія этой рѣчки означена совершенно невѣрно (на с.-с.-з. почти на сѣверъ), точно также какъ невѣрно и отношеніе ея къ верховьямъ Хара-булуна, о чемъ сказано было выше.

Ниже устья р. Богдашки Оспа принимаетъ названіе Оюта, сохраняя его впрочемъ лишь до сліянія съ Малою Бѣлою, не взирая на то, что по ширинѣ своей и по длинѣ Оюта значительно превышаетъ такіе же размѣры Хара-булуна. Длина этой части рѣчки, т. е. отъ устья Богдашки до сліянія съ Малою Бѣлою, откуда уже начинается правильная теченія, опредѣляется лишь приблизительно въ 52 версты, такъ-что вся длина рѣчки, начиная съ верховьевъ около Нунку-сагана, превосходитъ 120 верстъ, тогда какъ ширина достигаетъ 50 саженой. На этомъ протяженіи, согласно Перкинсу, въ Оюта впадаютъ съ лѣвой стороны, считая сверху

внизъ: Большой Нарынъ, берущій начало изъ озера не далеко отъ котловины Ирленки, затѣмъ Малый Нарынъ и наконецъ рч. Аутанъ (можетъ быть Алтанъ?), тогда какъ съ правой стороны въ Оноть изливаются Верхній и Нижній Бибой (у Пермикина невѣрно «Бабой»), впадающіе ниже устья Аутана, слѣдовательно въ самыхъ низовьяхъ рѣки. Болѣе или менѣе подробныя описанія мѣстности и природы относятся до сихъ поръ лишь къ низовьямъ Онота. Экспедиція 1824 г. (I. с. pag. 9), какъ сказано уже выше, поднялась на горный отрогъ, чтобы перевалить съ Тунгускаго стойбища на Оноть. Дорога черезъ хребты этотъ оказалась весьма не удобною, такъ какъ она устлана обломками известняка. Спусти 6 часовъ путешествія то пѣшкомъ, то верхомъ, партія спустилась съ горы и по луку приближалась къ Оноту, пройдя 23 версты.

Оноть оказался здѣсь отъ 10 до 50 сажень ширины необыкновенно быстрымъ и обильнымъ порогами, въ которыхъ вода пѣнится и производитъ оглушительный шумъ. Въ рѣку водятся здѣсь лучшія сибирскія форели, какъ-то: ленки, талмени и хариусы. Партія слѣдовала дальше уже по лѣвому берегу Онота, ровному и поросшему березою, но вскорѣ приближалась къ утесу, преградившему имъ путь, опускалась прямо въ рѣку. На подъемѣ на этотъ отрогъ они собирали «куски гранита, роговой обманки, сіенита и гнейса, въ которомъ видѣлись мельчайшіе кристаллы красной венисы». Изъ растений видны были: черника и голубика, *Majanthemum bifolium*, *Pyrola rotundifolia*. Наконецъ партія спустилась съ отрога недалеко отъ устья Верхняго Бибоя. На правомъ берегу Онота возвышался грозный утесъ; партія перебродила къ нему и первая попавшаяся ей порода оказалась «известковымъ камнемъ съ прожилками желѣзнаго блеска», остальные породы были «тѣ-же, какъ и на хребтѣ», слѣдовательно полевошпатовыя и роговообманковыя. Выше обнажался известнякъ, «въ которомъ нашли множество горныхъ хрусталей».

съ двойными шестисторонними заостреніями, вмѣстѣ съ ромбическимъ известковымъ шпатомъ. Кристаллы лежали по нѣмъ трещинамъ известняка; тутъ же находили бѣлый кварцъ въ шести-стороннихъ столбикахъ. Всѣ минералы покрыты красною желѣзною окисью. Поиски аквамариновъ, о нахожденіи которыхъ на Онотѣ имѣлись нѣкоторыя свѣдѣнія, не обѣщались успѣхомъ. Поднимаясь по утесу выше и выше, путешественники увидѣли пещеру въ известнякѣ; входъ въ нее своеобразный, вышиною въ сажень, шириною около 2 сажень; при самомъ входѣ открывается глубокая пропасть съ крутыми склонами: звукъ отъ бросавшихся туда камней продолжался съ полминуты, причемъ камень падалъ какъ бы съ уступа на уступъ.

Нефритъ, существованіе котораго на Онотѣ давно было извѣстно партіи, находимъ былъ ею въ видѣ «кругляковъ» около Верхняго Бибоя (стр. 10). Оттуда путешественники спустились на Нижній Бибой. Отправивъ одну часть находившихся съ ними крестьянъ вверхъ по Оноту, а другую по Бибю, для собиранія образцовъ горныхъ породъ, причемъ по Бибю поручено ѣхать до того мѣста, гдѣ попадаются зеленые камни, извѣстные подъ мѣстнымъ названіемъ «шир-ля» (предположительно аквамариновъ), партія возвратилась обратно въ село Бѣльское (см. ниже). На пути она посѣтила озеро Ныке-норъ, близъ котораго возвышались большіе утесы, хотя къ сожалѣнію положеніе этого озера, не означеннаго и на имѣющихся картахъ, не описано ими. Дорога къ нему шла полями, на которыхъ росла *Spiraea ulmaria*, *Swertia corniculata*, *Euphrasia officinalis*, *Origanum vulgare*. О составѣ утесовъ около озера, о размѣрахъ послѣдняго ничего не сказано, кромѣ замѣчанія, что въ утесахъ этихъ не найдено ни малѣйшаго слѣда рудъ. Отсюда путешественники возвратились въ с. Бѣльское. Крестьяне, окончившіе свое порученіе, возвратились съ коллекціями, между которыми не найдено ни малѣйшихъ признаковъ золота, ни серебра,

ни мѣди; породы, привезенныя ими оказались такими же, с которыми партія встрѣчалась лично по Оноту, «а вмѣстѣ аквамариновъ оказался мягкій нефритъ, облѣпленный известковымъ шпатомъ» (должно быть змѣевикъ?). Тутъ же были куски известняка съ вкрапленнымъ желѣзнымъ блескомъ. О бродѣ черезъ Онотъ на пути къ верхнему Бибою сказано (стр. 10), что вода хватала до сѣдла и валила лошадей.

Кромѣ этихъ свѣдѣній о низовьяхъ Онота мы находимъ еще небезынтересныя данныя въ отчетѣ Фитингофа <sup>1)</sup>, командированнаго въ 1861 г. генералъ-губернаторомъ Восточно Сибиря для осмотра русла р. Онота и окружающихъ его горъ. Фитингофъ выѣхалъ въ первыхъ числахъ іюня изъ деревни Иретской (см. ниже) и въ тотъ же день вечеромъ достигъ устья рч. Бибой («Бибай» у Фитингофа), хотя въ отчетѣ не озвѣчено, былъ ли это верхній или нижній изъ двухъ Бибоевъ. При самомъ устьѣ Бибоя лѣвый берегъ Онота до высотъ 1—2 аршинъ состоитъ преимущественно изъ валуновъ еврита затѣмъ, по словамъ отчета, «слѣдуютъ амфиболиты съ вкрапленнымъ въ нихъ нефритомъ и безъ онаго», и рѣдко попадаются обыкновенный кварцъ и гранито-сіенитъ,—все это очевидно въ валунахъ, слагающихъ прибрежный наносъ. Отсюда Фитингофъ отправился вверхъ по Оноту до горы, известной подъ названіемъ Харантѹла или до рѣчки Балангиртѹлѣ впадающей въ Онотъ съ лѣвой стороны. Названная гора оказалась состоящею изъ амфиболита и роговообманковаго сланца, но въ обнаженіяхъ этихъ не было замѣтно нефрита между тѣмъ около самой горы и по косамъ, т. е. на прибрежьи Онота, «минералъ этотъ находится вкрапленнымъ и желваками въ большихъ валунахъ и встрѣчается уже гораздо чаще, чѣмъ около устья Бибоя. Въ перечнѣ породъ, найденныхъ около горы Харантѹла зна-

---

<sup>1)</sup> Фитингофъ, Отчетъ Сиб. Отд. И. Р. Геогр. Общ. за 1868 стр. 106.

тиса: «нефритъ съ порою амфиболита въ нефритѣ» (нефритъ включающій въ себѣ амфиболитъ?), затѣмъ «амфиболитъ съ массою (частью нефрита)» (?), «почти чистый нефритъ» и «діабазы». Крестьяне гдѣ-то Фитингофа, что, по мѣрѣ приближенія «къ верховьямъ Оноты», количество такихъ породъ увеличивается. Послѣ двухдневнаго осмотра этихъ мѣстностей Фитингофъ возвратился въ Иркутскъ, придя къ заключенію, что «для поисковъ нефрита въ горахъ не слѣдовало бы назначать особой партіи, такъ горы по р. Оноту, или по крайней мѣрѣ гдѣ есть въ нихъ обнаженія, состоящія изъ амфиболита, не будутъ осмотрѣны крестьянами и бурятами-звѣровщиками», причемъ онъ далъ указаніе крестьянамъ, что только въ темносѣрой породѣ (такъ называютъ они амфиболитъ) слѣдуетъ искать въ горахъ прожилки и желваки нефрита.

Въ томъ, что Фитингофъ знакомъ былъ какъ съ нефритомъ, такъ и съ жемчужникомъ, доказываетъ хранившаяся въ Иркутскомъ музеѣ опредѣленная имъ коллекція горныхъ породъ и минераловъ, въ которой куски нефрита, какъ и жемчужника, значились подъ дѣйствительными ихъ названіями <sup>1)</sup>; нахождение описывавшагося имъ нефрита по р. Оноту въ связи съ роговообманковою порою въ свою очередь не противурѣчить даннымъ, имѣющимся какъ о составѣ нефрита, такъ и о извѣстныхъ до сихъ поръ мѣсторожденіяхъ этого минерала и въ другихъ мѣстностяхъ, гдѣ связь его съ роговообманковыми породами въ свою очередь несомнѣнна <sup>2)</sup>. Съ другой стороны, если принять во вниманіе во-первыхъ, то обстоятельство, что въ Музеѣ Восточно-Сибирскаго Отдѣла

<sup>1)</sup> Черскій, Рукописныя замѣтки о Сибири.

<sup>2)</sup> Fischer, Nephrit u. Jadett; Schlagintweit, Reisen in Indien und Ost-Asien B. IV. 1880; Столячка, Records of the Geological Survey of India 1874 № 1—2—3; Richthofen, Verhandl. d. Gesell. für Erdkunde zu Berlin 1874 № 6—7, pag. 183.



Географическаго Общества въ Иркутскѣ не оказалось даже ни одного образца породы съ вкрапленнымъ въ ней нефритомъ, такъ-что остается неизвѣстнымъ, представлена ли къ нему, даже собрана ли Фитингофомъ коллекція тѣхъ породъ и минераловъ, о которыхъ упоминается въ его отчетѣ <sup>1)</sup>, а во-вторыхъ, если имѣть въ виду очевидную небрежность и неточность, допущенныя Фитингофомъ въ описаніи столь важнаго значенія данныхъ, то на результаты поспѣхъ этой можно смотрѣть до сихъ поръ не иначе, какъ на весьма интересныя указанія для будущихъ изслѣдователей, отъ которыхъ и слѣдуетъ выжидать рѣшенія вопроса объ особенностяхъ и условіяхъ весьма правдоподобнаго впрочемъ нахожденія самостоятельнаго мѣсторожденія нефрита въ нижнемъ теченіи р. Онота, часть котораго, отъ р. Богдашки до Урантулы остается еще совершенно неизвѣстною. Во всякомъ случаѣ, основываясь уже на изложенныхъ выше свѣдѣніяхъ, именно, на длинѣ и ширинѣ Онота сравнительно съ Хара-булуномъ, очевидно, что дѣйствительнымъ верховьемъ Малой Бѣлой слѣдовало бы считать источники р. Оспы, берущаго начало въ разстояніи около 185 верстъ отъ Большой Бѣлой, тогда какъ Хара-булунъ (50 верстъ длины) является въ сущности не болѣе какъ правымъ притокомъ. Отъ будущихъ изслѣдователей этой мѣстности необходимо ожидать также рѣшенія вопроса, насколько обособленно является пускаемая Черскимъ Бѣльская цѣпь горъ на меридіанѣ теченія р. Оспы или Онота и какую часть этой рѣки слѣдуетъ считать пересѣкающею названную цѣпь (не ущелистую часть теченія Оспы?), къ тому же, кромѣ Бѣльской цѣпи горъ, не существуетъ ли еще болѣе сѣвернаго параллельнаго ей хребта, разумѣется, болѣе низкаго и безъ альпійской конфигураціи: хребетъ такой пересѣкался бы уже низовыми правыхъ притоковъ р. Бѣлой.

<sup>1)</sup> Черскій, Рукописныя замѣтки о Сибири.

г) Течение Большой Бѣлой отъ Малой до р. Ангары.

Нижнее теченіе р. Большой Бѣлой въ указанныхъ пределахъ представляетъ отрѣзокъ верстъ въ 65 длины, считая изгибамъ рѣки, а 36 верстъ по прямой линіи отъ впаденія Малой Бѣлой до устья въ Ангару. Значительное различіе въ только-что приведенныхъ цифрахъ указываетъ уже и соответственно большую извилистость этого участка; и действительно, въ верхней части интересующаго насъ отрезка мы видимъ значительную главную излучину, обращенную широкостью почти къ сѣверу, затѣмъ слѣдуетъ средняя часть, извилистая, но въ общемъ отодвинутая къ юго-востоку, послѣ чего рѣка, въ свою очередь извиваясь, поворачиваетъ вообще на сѣверо-востокъ къ Ангарѣ, такъ-что общимъ направлениемъ всей этой части рѣки слѣдуетъ считать в.-с.-в. Долина Бѣлой, расширившаяся до 7-ми и болѣе верстъ выше устья въ нее Малой Бѣлой, ниже ея и на всемъ протяженіи верхняго участка интересующей насъ части рѣки, опять суживается до одной версты и менѣе, и только въ среднемъ участкѣ снова расширяется до 6 верстъ, тогда какъ ближе къ устью ширина долины не превышаетъ 2 — 2½ верстъ. На всемъ этомъ протяженіи съ лѣвой стороны въ р. Бѣлую падаетъ только два болѣе извѣстныхъ притока, именно небольшой ручей Булай, устье котораго располагается верстахъ въ шести отъ устья Малой Бѣлой и рч. Мальта въ 12 верстахъ отъ Ангары.

Послѣдняя издавна стала извѣстной по нахожденію въ ея нижнѣ залежей бурога угля. Верховье Мальты образуется двумя ручьями, протекающими по полого-холмистой, болотистой мѣстности, поросшей плохимъ сосновымъ и березовымъ лѣсомъ. На берегу одного изъ ручьевъ въ небольшой распадѣ распадѣ найденъ былъ въ 1854 г. пласть смо-

листаго бѣлаго угля <sup>1)</sup> толщиной въ  $1\frac{1}{2}$  арш. и распрост-  
няющійся на площадь въ 2700 квадрат. саж. Немножко далѣе  
внизъ по рѣчкѣ, у пруда Власовой мельницы, гдѣ образов-  
лось искусственное обнаженіе при скапываніи откоса д-  
ремонта плотины <sup>2)</sup>, видно слѣдующее напластованіе: ввер-  
наблюдается рыхлый, глинистый, среднезернистый песчани-  
желтовато-бѣлаго цвѣта, состоящій изъ зеренъ кварца, б-  
тита и мусковита, связанныхъ зеленовато-бѣлымъ, глинист-  
известковымъ цементомъ; въ немъ проходятъ прослои то-  
песчаника, но охряно-желтаго цвѣта, образованнаго зерна-  
кварца и бѣлой слюдой съ глинисто-охрянымъ цементомъ.  
Кромѣ того въ этомъ же слоѣ замѣчаются неправильныя  
выклинивающіеся прослои и включенія твердаго, бѣлова-  
сѣраго, известковистаго песчаника. Подъ только-что описа-  
нымъ песчаникомъ, въ массѣ перваго замѣтны тонкіе п-  
жилки землистаго угля и одинъ рядъ крупной и мел-  
галки кварца и кристаллическихъ породъ, подъ которы-  
располагается уже настоящій пластъ угля въ 20 сант. т-  
щины. Цвѣтъ угля желто-бурый съ желтыми и черными п-  
слоями и пятнами. Онъ рассыпается на тонкія пластин-  
на поверхности которыхъ расположены обугленные остат-  
растений. Вслѣдъ за пластомъ угля расположена сланцеват-  
песчаная глина сѣро-желтаго цвѣта. Въ ней встрѣчают-  
многочисленные, но неясные отпечатки растений. Подъ э-  
толщей обнажается второй пластъ угля мощностью въ  
сант. Уголь въ изломѣ черный, но съ поверхности жел-  
бурый, тонкослоистый и обладаетъ смолянымъ блескомъ.  
Внизу обнаженія видна также сланцеватая глина, котор-  
была уже описана выше. На правомъ берегу пруда рас-  
лагается рядъ шурфовъ развѣдки 1853—1854 г. Запущен-  
ные шурфы, достигавшіе иногда 5—6 саж. глубины, ны-

<sup>1)</sup> Отчетъ Сиб. Отд. И. Р. Геогр. Общ. за 1868 г., стр. 214.

<sup>2)</sup> Обручевъ, Горн. Журн. 1891 г. № 12, стр. 453.

совершенно обрушились и заросли уже деревьями. И тутъ геологическое строеніе тоже, что на лѣвомъ берегу. Но къ уже описаннымъ породамъ присоединяется твердый сѣрый, известковый, плитковатый песчаникъ съ черными полосами, куски котораго разбросаны по отваламъ шурфовъ. Возрастъ этого угля, какъ и вообще во всѣхъ мѣсторожденіяхъ Иркутской губ., относится къ юрской эпохѣ и, по классификаціи Мука, стоитъ въ ряду *неспекающихся каменныхъ углей*. Его уд. в.  $1,34\%$ , содержитъ влаги  $4,34\%$ , летучихъ веществъ  $40,67\%$ , кокса  $46,71\%$ ; золы въ углѣ  $15,53\%$ , золы въ коксѣ  $28,24\%$ , теплопроизводительность 6318 ед. тепла <sup>1)</sup>).

Насупротивъ Булая впадаетъ самый значительный правый притокъ этой части р. Бѣлой, извѣстный подъ именемъ Хайта. Рѣчка эта, до 54 верстъ длины, беретъ начало двумя верховьями между правымъ источникомъ Малой Ирети, Ытсомъ и верховьями Картагона, направляясь сначала вообще на сѣверо-востокъ, а затѣмъ почти къ сѣверу, и отличается значительною шириною долины (около 5 верстъ), въ особенности въ нижней половинѣ длины, гдѣ рѣчка разливается на рукава; въ расширеніи этомъ извѣстны также два озера: Долгое и Ельничное; кромѣ того въ нее впадаютъ съ лѣвой стороны два притока: Большой или верхній и Малый или нижній Кунтуликъ и одинъ незначительный правый притокъ съ неизвѣстнымъ названіемъ. Наконецъ ниже Хайты извѣстны только незначительные правые притоки Бѣлой, впадающіе въ средній участокъ этой части теченія; по долинѣ одного изъ нихъ почтовый трактъ спускается къ р. Бѣлой и пересѣкаетъ ее въ разстояніи 12 верстъ отъ устья, около села, извѣстнаго подъ названіемъ Мальта или Мальтинскаго. Слово *мальта*, производится отъ нѣсколько искаженнаго впоследствии, бурятскаго *малта*, т. е. обильный скотомъ (*малз* означаетъ скотъ) <sup>1)</sup> на что впер-

<sup>1)</sup> Обручевъ, 1. с. pag. 494.

ные указаль еще упомянутый выше естествоиспытатель, с проводившій золотопоисковую партію 1824 года <sup>1)</sup>. Слово это доказываетъ что уже съ весьма отдаленнаго времени низовья долины р. Бѣлой представляли мѣста, удобныя для скотоводства; такими лугами, послѣ завоеванія Сибири, могли не воспользоваться и хлѣбопашцы, постепенно подвигавшіеся и вверхъ по теченію, такъ-что въ настоящее время долина Большой Бѣлой, ниже впаденія въ нее Урика, принадлежитъ уже къ мѣстамъ довольно густо заселеннымъ нерѣдко безлѣснымъ. Отъ Мальты начинаются замѣтки партіи 1824 г. на пути ея къ Малой Бѣлой и Оноту. Изъ нихъ уже видно, что къ западу и сѣверо-западу отъ названнаго селенія простирается обширная степь, по которой кочуютъ бурята Аларскаго и Балаганскаго вѣдомства. Въ пяти верстахъ отъ Мальты, партія, слѣдуя по лѣвому берегу Бѣлой, прошла черезъ деревню Тайтурку, а въ 15 верстахъ далѣе, черезъ Узкій-Лугъ, около котораго добывали огнеупорную глину для плавильныхъ горшковъ, тогда какъ въ настоящее время здѣсь добываютъ весьма хорошую бѣлую глину для фарфороваго завода Переваловыхъ (см. ниже). По дорогѣ партія находила кремни, роговикъ, разноцвѣтныя яшмы, кварцы, индійскій камень. Далѣе партія прошла черезъ деревню Нижне-Булайскую до с. Бѣльскаго, лежащаго въ 15 верстахъ отъ Узкаго-луга, насупротивъ устья Малой Бѣлой. Бѣльское было прежде острогомъ, т. е. имѣло деревянную крѣпостцу, изъ которой содержались въ повиновеніи окрестные буряты; между его обитателями до сихъ поръ существуютъ еще потомки боярскихъ дѣтей Курдюковыхъ, часть которыхъ съ теченіемъ времени поступила въ казаки, а другая въ крестьяне; въ 1824 г. они помнили еще свое происхожденіе.

<sup>1)</sup> Черскій, Рукописныя замѣтки о Сибири, а также Журн. М. Внутр. Дѣлъ 1858 г. Ч. XXVIII, гдѣ впрочемъ бурятское слово произносится невѣрно *малтѹ* или *малетѹ*, стр. 6.

Жители Бѣльскаго занимаются между прочимъ и разведениемъ хмѣля и сбываютъ его на винокуренный заводъ. Члены партіи ѣздили изъ Бѣльскаго осматривать окрестности, гдѣ были «отвердѣлую желѣзную охру, покрытую желтыми и красными пятнами; охра эта валялась по розсыпи одной горы, состоящей изъ известковаго камня съ капельниками, въ котромъ лежала гнѣздами желѣзная руда». На обратномъ пути они находили по розсыпямъ кварцъ — бѣлый и розовый, роговики кремни, покрытые желтою и красною окисью желѣза. Насупротивъ Бѣльскаго, на другомъ берегу рѣки, видѣли «желѣзныи синеватый песокъ, красную яшму, кварцъ, роговики и гранить съ вкрапленною молибденою» — все это очевидно въ видѣ галекъ, изъ которыхъ гранить принесенъ правыми притоками рѣки. По дорогѣ росла во множествѣ *Scabiosa alba*.

Въ 1869 г. низовье р. Большой Бѣлой было изслѣдовано съ большою подробностью Чекановскимъ, вышедшимъ въ село Бадайское изъ за Ангары <sup>1)</sup>. Около этого селенія измѣненные берега Бѣлой обнаруживаютъ лишь наносныя отложенія и незначительные выступы известняка. Названную породу Чекановскій прослѣдилъ на западъ до Узкаго-луга, къ которому ведетъ около крутыхъ и мѣстами живописныхъ известняковыхъ утесовъ лѣваго берега рѣки. Отноительно упомянутой выше бѣлой глины (каолинъ), употребляемой для фарфороваго завода Бр. Переваловыхъ,строеннаго вблизи отъ Узкаго-луга, Чекановскій считаетъ «превосходнымъ, жировикоподобнымъ каолиномъ; его добываютъ недалеко отъ села, въ ямахъ на лѣвомъ берегу р. Бѣлой, «на востокъ склона, состоящаго со стороны рѣки изъ известняка». По недостатку удобныхъ обнаженій трудно рѣшить вопросъ: принадлежитъ ли залежь этого каолина низшимъ членамъ юрскихъ осадковъ, уцѣлѣвшихъ

---

<sup>1)</sup> Чекановскій, Зап. Сиб. Отд. И. Р. Геогр. Общ. Т. XI 1874 г. стр. 168.

мѣстами къ сѣверу отъ р. Бѣлой, или же минераль это слѣдуетъ отнести къ известняку, верхніе пласты которыхъ мѣстами отличаются содержаніемъ глинъ. Въ известнякѣ сѣ Узкій-лугъ Чекановскому удалось найти нѣсколько пластовъ со слѣдами коралловъ, которые были отосланы въ Петербургъ академику Шмидту. По письменному заявленію послѣдняго, кораллы эти напоминаютъ собою силурійскіе прибалтійской области этой формаціи, но сохраненіе ихъ оказывается настолько несовершеннымъ, что не допускаетъ точнаго опредѣленія, въ особенности остатковъ, происходящихъ изъ столь отдаленныхъ мѣстностей. Кораллы эти составляютъ впрочемъ единственные слѣды жизни, отысканные до сихъ поръ геологами въ этихъ известнякахъ, о залеганіи которыхъ подъ девонскими осадками мы упомянули уже, говоря объ известнякахъ низовьевъ Китоа. Около того же сѣ (Узкій-лугъ) на картѣ Чекановскаго означенъ соляной ключъ, о которомъ впрочемъ не имѣется никакихъ подробностей въ текстѣ. Объ этомъ источникѣ упоминаетъ еще В. А. Обручевъ, называя его незамерзающимъ. Отъ Узкаго-луга известнякъ прослѣженъ Чекановскимъ до с. Бѣльскаго, гдѣ онъ обрѣтаетъ собою низкій лѣвый берегъ рѣки. Но на противуположномъ, сравнительно высокому берегу выступаютъ юрскіе осадки, продолжающіеся съ одной стороны вверхъ по Малой Бѣлой, гдѣ мы ознакомились съ ними при описаніи долины рч. Ирети, съ другой стороны по р. Хойтѣ, а въ нѣкоторомъ отдаленіи отъ праваго берега низовьевъ Большой Бѣлой около котораго обнажается все тотъ же известнякъ, значительная площадь юрскихъ пластовъ распространяется самой Ангары и низовьевъ какъ Китоа, такъ и Иркутска.

---

<sup>1)</sup> В. А. Обручевъ въ Матер. по изсл. Иркутск. губ. Т. II, вып. 4 стр. 62.

Население бассейна р. Бѣлой, его размѣщеніе и экономическій бытъ. Аларское инородческое вѣдомство и русская во-  
лость Бѣльская Балаганскаго округа <sup>1)</sup>).

Весь бассейнъ верхняго теченія р. Большой Бѣлой, до  
падѣнія въ нее р. Урика и весь бассейнъ р. Урика, а отчасти  
и бассейнъ Малой Бѣлой, не имѣютъ другихъ жителей кромѣ  
по преимуществу кочующихъ и только отчасти осѣдлыхъ ту-  
земцевъ, принадлежащихъ здѣсь къ Аларскому инородческому  
вѣдомству Балаганскаго округа. Такъ какъ инородцы эти ко-  
чутъ по преимуществу въ бассейнѣ р. Бѣлой, а главный адми-  
нистративный центръ ихъ Аларская степная дума нахо-  
дится около р. Алара, одного изъ притоковъ р. Ирети, лѣв. прит.  
р. Большой Бѣлой, верстахъ въ 8 къ с.-с.-в. отъ села Иретьскаго  
(Бѣльской волости), то свѣдѣнія объ экономическомъ положеніи  
инородцевъ Аларскаго вѣдомства будутъ здѣсь какъ разъ на  
своемъ мѣстѣ.

Аларское вѣдомство состоитъ изъ 10 родовъ бурятъ, а  
именно 3-го Холтубаева, Шаранизовскаго и 8 Хонгодорскихъ  
родовъ, а также изъ одного рода тунгусовъ — Мало-бѣльскаго.  
Мало-бѣльскій родъ живетъ въ отдѣльной дачѣ, третій Хол-  
тубаевъ — смѣшанно съ Зангеевскимъ родомъ Балаганскаго  
вѣдомства, на двухъ отведенныхъ имъ межевыхъ дачахъ, всѣ  
же остальные бурятскіе роды живутъ смѣшанно между со-  
бою, такъ-что отведенныя этимъ родамъ три межевыя дачи  
значатся просто: «во владѣніи Аларскаго вѣдомства разныхъ  
родовъ». Дачи эти занимаютъ обширное пространство въ  
246 тыс. дес. Буряты Аларскаго вѣдомства принадлежать къ  
бурятской вѣрѣ, также какъ и буряты Тункинскаго вѣ-

---

<sup>1)</sup> Превосходнымъ источникомъ свѣдѣній объ экономическомъ по-  
ложеніи сельскаго населенія Иркутской губерніи служатъ Матеріалы по  
ислѣдованію землепользованія и хозяйственнаго быта сельскаго на-  
селенія Иркутской губерніи. Т. I, 1889 г.; Т. II, 1890 г.



домства <sup>1)</sup>, въ противоположность буратамъ и инорцамъ другихъ вѣдомствъ Иркутской губерніи, придерживающимся шаманства. Потому при Аларской степной думѣ также какъ и при Тункинской, есть по одному дацану, т. е. буддійскому храму, при которомъ живетъ нѣсколько ламъ различныхъ степеней священства. Ламы эти получаютъ свѣдѣніе духовное образованіе въ Монголіи, а сами же имѣютъ въ своихъ дацанахъ школы, въ которыхъ обучаютъ мальчиковъ монгольской грамотѣ. Многіе изъ этихъ мальчиковъ впослѣдствіи поступаютъ въ русскія школы и становятся образованными русскими людьми, что, при основательномъ знаніи ими монгольскаго языка, литературы и знакомствѣ съ буддизмомъ чрезвычайно способствуетъ упроченію связи русскихъ съ монгольскими племенами Китая и распространенію русскаго вліянія на населеніе Средней Азии. Буддійское духовенство въ Аларскомъ и Тункинскомъ вѣдомствахъ содержится добровольнымъ поданіями, такъ охотно даваемыми ламамъ въ каждомъ улусѣ, но на содержаніе дацана (храма) вносится ежегодно въ смѣту народнаго управленія въ Аларскомъ вѣдомствѣ опредѣленная сумма (130 руб. сторожу и 150 р. на дрова). Народнымъ управленіемъ этимъ завѣдываютъ въ Аларскомъ, какъ и въ другихъ степныхъ вѣдомствахъ, Степныя думы, состоящія изъ главнаго родоваго старшины (тайши) и нѣсколькихъ заседателей, при наемномъ письмоводителѣ. Званіе тайши по жизненно, а нерѣдко и наслѣдственно и пользуется большимъ почетомъ, хотя власть тайши значительно ограничена администраціей, такъ-что нынѣшнія думы мало чѣмъ отличаются отъ волостныхъ правленій, а находящіяся въ нихъ вѣдѣнія родовыя управленія отъ сельскихъ общественныхъ управленій

---

<sup>1)</sup> Объ инородцахъ Тункинскаго вѣдомства, образующихъ 14 родовъ живущихъ въ 130 улусахъ и селеніяхъ, расположенныхъ въ долинахъ р. Иркуты и Оки было уже говорено выше. Общія же черты ихъ образа жизни и экономическаго положенія весьма сходны съ образомъ жизни и экономическимъ положеніемъ Аларскихъ бурятъ.

Только думскіе и управскіе сходы (сугланы) у бурятъ малочисленнѣе чѣмъ волостные и сельскіе сходы у русскихъ крестьянъ, такъ какъ въ нихъ являются только немногочисленные выборы (3 до 5 выборныхъ отъ рода изъ 100 до 200 домохозяевъ). Писаря бурятскихъ думъ и управъ несравненно ниже по своему развитію русскихъ волостныхъ писарей въ Сибирѣ.

Число населенныхъ пунктовъ (улусовъ и селеній съ 5 и болѣе хозяйствами) Аларскаго вѣдомства не превышаетъ 86 (въ Тункинскомъ вѣдомствѣ ихъ 136). Впрочемъ при полукочевомъ бытѣ бурятъ Аларскаго и Тункинскаго вѣдомствъ, представляющій всѣ ступени постепеннаго перехода отъ кочеваго быта къ сѣлому, самое опредѣленіе понятія о томъ, что такое населенный пунктъ весьма затруднительно. Бурятскій улусъ представляетъ собою болѣею частью группу болѣе или менѣе компактно сложенныхъ бурятскихъ построекъ, жилыхъ и нежилыхъ, окруженныхъ *утугами* (унавоженными покосами), за общою изгородью. Но нерѣдко бываетъ, что жилища отдѣльныхъ семей раздѣлены между собою промежутками въ нѣсколько десятковъ и даже сотенъ сажень, и каждый домъ окруженъ собственнымъ утугомъ, обнесеннымъ изгородью. Само собою разсѣдается, что каждый дворъ такого улуса можетъ быть припнсаемъ, какъ и всякая русская заимка (хуторъ), за отдѣльный населенный пунктъ. Затѣмъ кромѣ этихъ поселковъ, въ которыхъ буряты живутъ зимою, у нихъ есть еще и лѣтники, — лѣтнія стойбища. Всѣхъ жилыхъ строеній въ Аларскомъ вѣдомствѣ считается въ настоящихъ населенныхъ пунктахъ (улусахъ или зимовьяхъ) до 5000, да въ лѣтникахъ 1900. До начала нынѣшняго вѣка буряты не знали домовъ и избъ, а жили только въ юртахъ; нынѣ у богатыхъ бурятъ построены комфортабельные дома, даже и городской садъ иногда въ 6 и 5, иногда въ 6 и 6 сажень. Избы бурятъ устраиваются какъ у русскихъ крестьянъ, только углы постройки выдвигаются «въ лапу» и на шипахъ, а не «крючкомъ», какъ у

русскихъ крестьянъ, чѣмъ достигается экономія относительно длины бревна. Нынѣ уже до крайности мало хозяйствъ, имѣющихъ однѣ только юрты, да и тѣ на зиму переходятъ жи- въ избы къ какимъ нибудь родственникамъ. Но, конечно, лѣ- ники состоятъ еще преимущественно изъ юртъ. Да и самыя юр- ты представляются балаганами, устраиваемыми деревяннымъ сру- бомъ, въ видѣ 4, 5, 6 и даже 8 угольниковъ. Срубы эти имѣютъ отъ  $2\frac{1}{3}$  до 4 саж. въ длину и ширину, при вышинѣ отъ 3 до 5 аршинъ. При входѣ въ юрту устраиваются нерѣдко глух- сѣни съ чуланами по сторонамъ, но перегородокъ въ юртахъ нѣтъ, а есть только занавѣски. По стѣнамъ развѣшивается одежда, разставляются сундуки, кладутся подушки, а на по- кахъ устанавливается посуда. Крыша на юртахъ или тесово- скатами, или же на горбыли, которые кладутся на крышу, на- вливаются большіе куски лиственничной и березовой коры и пр- давливаются слоемъ земли, такъ-что крыша получаетъ купол- образную форму. Крыша поддерживается нѣсколькими сто- бами, а посреди ея оставляется круглое или четырехугол- ное отверстіе для выхода дыма отъ костра, раскладываема- посреди юрты на земляномъ полу. Въ богатыхъ юртахъ пространство вокругъ костра, для котораго оставляется око- одной квадратной сажени, забирается досками, въ видѣ пол- Въ юртахъ лѣтомъ гораздо прохладнѣе, чѣмъ въ домахъ- избахъ и воздухъ лучше вентилируется, въ зимнее же время юрты остаются необитаемыми, но служатъ для склада ра- ныхъ произведеній, а также для выдѣлки тарасуна (хмѣл- наго напитка изъ молока). Вообще у бурятъ гораздо мен- нежилыхъ построекъ, чѣмъ у русскихъ; скотъ, а въ особе- ности лошади, всю зиму стоятъ на дворѣ, легко огороженномъ жердями и иногда имѣющемъ гдѣ нибудь навѣсъ; молодыя животныхъ на ночь загоняютъ въ какую нибудь старую юрту. Настоящихъ дворовъ (съ воротами) въ бурятскихъ улусахъ совсѣмъ не бываетъ, кромѣ какъ у самыхъ богатыхъ и кул- турныхъ бурятъ. Дома не образуютъ улицъ, а разбросаны с-

вершено произвольно на обширной площади, занимаемой улусами въ неимовѣрномъ безпорядкѣ, такъ какъ каждый домохозяинъ старается постройиться на своемъ участкѣ утуга (унавоженого покоса) и только вдоль большихъ дорогъ и рѣкъ замѣтно что-то похожее на деревенскій «порядокъ» (рядъ домовъ) или улицу. Такой видъ имѣютъ зимовники, но еще болѣе оригинальными представляются лѣтники: въ нихъ домовъ уже почти не бываетъ, а есть только юрты; около каждой имѣется небольшой пригонъ для скота, т. е. загороженное пространство съ небольшимъ навѣсомъ въ углу. Кромѣ зимниковъ и лѣтниковъ у бурятъ иногда бываютъ и *осенники*, т. е. жилища третьемъ мѣстѣ, а именно близъ самыхъ отдаленныхъ пастбищъ; туда буряты перебираются послѣ уборки хлѣба, для того, чтобы понаести скотъ по живцу и прокормить его до января соломой и мякиной, которая почти невозможно вывезти съ дальнихъ полей отстоящихъ верстахъ отъ 10 до 20 отъ зимниковъ. Въ такихъ случаяхъ бурятскій годъ раздѣляется на три сезона:  $4\frac{1}{2}$  мѣсяца, отъ декабря до начала мая, они проводятъ въ зимникахъ,  $4\frac{1}{2}$  мѣсяцевъ, отъ начала мая до половины сентября, въ лѣтникахъ и отъ половины сентября до начала декабря въ осенникахъ.

Всѣхъ инородцевъ въ Аларскомъ вѣдомствѣ по переписи 1887—88 г. было 11.700 об. п. (6.085 м. п.), изъ коихъ совершенно осѣдлыхъ только 750, остальные кочевники, живущіе въ зимнихъ улусахъ и лѣтникахъ, какъ было разъяснено выше. Численность населенія, со времени ревизіи, въ 30 лѣтъ увеличилась только на 6%, между тѣмъ какъ въ Тункинскомъ вѣдомствѣ, гдѣ инородцамъ болѣе простора и приволья, такъ въ Аларскомъ, приростъ населенія за этотъ же 30 лѣтній періодъ составилъ 21%. Инородцы Аларскаго вѣдомства составляютъ 2.400 хозяйствъ; лицъ въ рабочемъ возрастѣ между ними 6.350 (3.330 м. п.). Изъ 2.400 хозяйствъ 1.550 имѣютъ въ своемъ составѣ по 1 работнику, но въ 356 изъ нихъ сверхъ работниковъ имѣются еще и подростки (полуробот-

ники), въ 550 хозяйствахъ по 2 работника, въ 176 по 3 болѣе. Въ остальныхъ (124) хозяйствахъ совсѣмъ нѣтъ взрослыхъ работниковъ, но въ 76 изъ нихъ есть подростки (полуработники)<sup>1)</sup>. Въ числѣ инородцевъ Аларскаго вѣдомства грамотныхъ, полуграмотныхъ и учащихся въ 1888 году было только 347 м. п. и 15 женскаго.

Земель въ дѣйствительномъ пользованіи инородцевъ Аларскаго вѣд. кромѣ лѣсовъ 79 т. дес., т. е. слишкомъ вдвое болѣе чѣмъ у инородцевъ Тункинскаго вѣдомства, что объясняется тѣмъ, что Тункинскіе инородцы свободно пользуются обширными площадями необмежеванныхъ и совершенно свободныхъ земель по горнымъ склонамъ Саянскаго хребта. У Аларскихъ же инородцевъ приходится земель по 13 дес. на душу м. п. и по 24 на взрослого работника м. п., и по 33 на хозяйство т. е. почти вдвое болѣе чѣмъ въ сосѣднихъ русскихъ волостяхъ.

Въ числѣ этой земли пахатной (съ залежами) у Аларскихъ инородцевъ 38 тыс. десятинъ, при чемъ пашни разныхъ улусовъ находятся между собою въ череполосности. Изъ упомянутаго количества пахатныхъ земель находится подъ дѣйствительными посѣвами только половина, слѣдовательно немного болѣе 3 дес. на душу м. п., около 6 на взрослого работника и 8 на хозяйство. Это доказываетъ, что Аларскіе буряты несравненно болѣе земледѣльцы, чѣмъ Тункинскіе, у которыхъ засѣвовъ приходится на душу м. п. не болѣе 1 дес., на работника менѣе 2-хъ, на хозяйство 2<sup>1</sup>/<sub>3</sub> дес. Изъ каждаго 100 дес. посѣва Аларскіе буряты засѣваютъ

<sup>1)</sup> Въ Тункинскомъ инородческомъ вѣдомствѣ, гдѣ на равное съ Аларскимъ по численности населеніе (11.700 ж. и 6.050 м. п.) приходится тоже количество хозяйствъ (до 2.400) и немного менѣе лицъ въ работѣ (6.040 об. п., а м. п. 3.160), въ числѣ хозяйствъ были съ работникомъ тѣже 1.550 (въ т. числѣ въ 396 было еще по 1 подростку съ 2-мя 480, съ 3-мя и болѣе 190. Въ остальныхъ 180 хозяйствахъ совсѣмъ не было работниковъ, но въ 108 изъ нихъ были подростки. Грамотныхъ, полуграмотныхъ и учащихся было въ Тункинскомъ вѣдомствѣ еще менѣе, чѣмъ въ Аларскомъ, а именно 127 м. п. и 11 женскаго.

рожью 59 дес., въ томъ числѣ 26 озимую и 33 ярицею (Тункинскіе 70 дес., въ т. числѣ ярицею 68), 23 овсомъ (Тункинскіе 18 овсомъ), 14 пшеницею (Тункинскіе только 6) и 3 ячменемъ (Тункинскіе 6). Эти цифры достаточно указываютъ на то, что земли Аларскихъ бурятъ находятся въ лучшихъ климатическихъ условіяхъ для земледѣлія, чѣмъ земли Тункинскихъ. Чистый средній сборъ хлѣбовъ въ Аларскомъ вѣдомствѣ составляетъ по изслѣдованіямъ 1888 года: пшеницы 41 пуд. (тоже что и у Тункинскихъ бурятъ), ржи 45 пуд. (тоже что у Тункинскихъ), овса 59 пуд. (у Тункинскихъ 55) съ десятины казенной мѣры.

Луговыхъ земель у инородцевъ Аларскаго вѣдомства до 34 тыс. десятинъ. Во всѣхъ Аларскихъ улусахъ, кромѣ улуса третьяго Колтубаевского рода, покосы разверстаны уравнильно, т. е. пропорціонально числу душъ между семью группами улусовъ, названныхъ въ раздѣльномъ приговорѣ «поскосянками». Такимъ образомъ въ отличіе отъ Тункинскаго вѣдомства, сходнаго съ Аларскимъ въ томъ отношеніи, что и въ немъ различные роды живутъ смѣшанно, у Аларскихъ бурятъ покосныя общины совпадаютъ не съ родами, а съ группами поселковъ, что прямо указываетъ на большую осѣдлость Аларскихъ бурятъ. Внутри отъ каждой группы или «поскосянки» покосы разверстаны по болѣе мелкимъ группамъ и даже отдѣльнымъ улусамъ, при чемъ каждая мелкая группа или улусъ передѣляетъ свои луга по душамъ ежегодно или въ болѣе продолжительные сроки. Третій Колтубаевскій родъ, живущій череполосно съ Закгеевскимъ родомъ Балаганскаго вѣдомства, владѣетъ покосами отдѣльно отъ закгеевскихъ, но сообща всѣми своими улусами кромѣ Кербулакскаго улуса, издавна пользующагося своими покосами отдѣльно. Благодаря обилію покосовъ, Аларскіе буряты содержатъ лошадей 11.660 (рабочихъ 6.750), крупнаго рогатаго скота 10 тыс. головъ, мелкаго скота до 36 тыс. головъ (въ томъ числѣ овецъ 24.500, свиней 8.000, козъ 4.700), между тѣмъ

какъ у Тункинскихъ бурятъ лошадей 13.150 (рабочихъ 9.870) крупнаго рогатаго скота 21.500, а мелкаго 12.500 головъ. Такимъ образомъ на хозяйство приходится среднимъ числомъ лошадей у Аларскихъ бурятъ менѣе 5, у Тункинскихъ 5<sup>1/2</sup>, крупнаго рогатаго у аларцевъ болѣе 4, у тункинцевъ 4<sup>1/2</sup>, мелкаго скота у аларцевъ болѣе 15, у тункинцевъ болѣе 15. Само собою разумѣется, что если принять въ расчетъ альпійскіе луга на склонахъ Саяна, то у тункинцевъ ихъ болѣе, но у аларцевъ есть прекрасные покосы по р. Бѣлой и прилегающимъ къ ней падямъ, а также по рѣкамъ Ирети, Голумети и Яндону. По рѣкамъ же Алари, Шалоту, Курзат и прилегающимъ падямъ покосы очень сыры, съ осокою, даютъ хорошій укосъ только въ сухіе и теплые годы, а въ дождливые вода сильно затопляетъ покосы и портитъ качество травъ. Много способствуетъ обилію покосовъ какъ въ Аларскомъ, такъ и въ Тункинскомъ вѣдомствѣ, такъ называемыя утуги, т. е. повышеніе естественно-травяной растительности практикуемымъ бурятами навознымъ удобреніемъ луговыхъ уходомъ за ними, способствующимъ развитію на лугахъ злаковъ и въ особенности пырея. Утуги располагаются, какъ уже мы говорили выше, около бурятскихъ улусовъ (зимовниковъ) обнесены надежною изгородью и строго охраняются отъ посягательствъ. Весною скотъ пасется на утугѣ только до появленія замѣтной зелени; вслѣдъ за этимъ появленіемъ буряты уже переключиваются на свои лѣтники, оставляя и охраняя утугу до покоса. Подъ утугами у Аларскихъ бурятъ до 5.500 десятинъ, а у Тункинскихъ болѣе 5.600 дес. Замѣчательно, что утужное луговодство перешло до нѣкоторой степени въ сосѣднія русскія волости, особливо въ Тункинскую, тамъ подъ утугами у русскихъ крестьянъ уже 430 десятинъ, между тѣмъ какъ въ Бѣльскую и Черемховскую волости утуги едва начинаютъ переходить, а въ ближайшихъ къ Ангарѣ волостяхъ ихъ и совсѣмъ не существуетъ.

Въ лѣсахъ на обширной площади, занятой Аларскимъ

лѣсомъ, нѣтъ недостатка. Лѣса въ Аларскихъ дачахъ занимаютъ 94 тыс. дес.; хорошаго строеваго лѣса—сосны, лиственницы, березы и осины нѣтъ въ Куйтинтинскомъ участкѣ. Здѣсь дроваго лѣса получается за 1 до 3 вер., строевой за 6 и 7 версть. Въ Алчинскомъ и Шалотскомъ участкахъ дроваго лѣса также близокъ, а строевой версть за 15 до 25. Въ Ныгдинскомъ участкѣ отъ Мало Иретьскаго улуса дроваго строевой лѣса очень близки. Сбыта дровъ изъ лѣсныхъ дачъ лѣсовъ вообще нѣтъ. Въ Аларскихъ дачахъ рубятъ лѣса и крестьяне сосѣднихъ русскихъ волостей, что подавало бурятамъ поводъ къ спорамъ и процессамъ съ русскими сосѣдями. Лѣсные промыслы не особенно развиты въ Аларскомъ лѣсовѣ, такъ какъ ими занимается не болѣе 40 хозяйствъ изъ 2400 всѣхъ хозяйствъ, между тѣмъ какъ въ Тункинскомъ лѣсовѣ лѣсными промыслами занято 129 хозяйствъ (также изъ 2400). Да и вообще промыслы въ Аларскомъ лѣсовѣ менѣе развиты, чѣмъ въ другихъ инородческихъ лѣсовъ губерніи, а именно сверхъ земледѣлія и скотоводства промыслами занимается въ Аларскомъ лѣсовѣ 33% всѣхъ способныхъ работниковъ, а въ Тункинскомъ 58%. Въ Аларскомъ лѣсовѣ только 13% населенія занимается охотою, рыбною ловлею и собираніемъ кедровыхъ орѣховъ, а въ Тункинскомъ, при обиліи лѣсовъ и богатствѣ рыбы въ р. Иркутѣ болѣе половины всѣхъ взрослыхъ работниковъ. Однимъ изъ главныхъ предметовъ охоты служить бѣлка, которой въ 1888 г. въ Аларскомъ лѣсовѣ было добыто 3240 штукъ; между тѣмъ какъ въ Тункинскомъ въ томъ же году было добыто только 1430 штукъ. Вообще же въ Аларскомъ лѣсовѣ звѣринымъ промысломъ занимаются 340 человѣкъ, а въ Тункинскомъ болѣе 1000 человѣкъ. Рыбною ловлею промышляютъ въ Аларскомъ лѣсовѣ въ р. Ирети въ озерахъ, гдѣ налавливаютъ рыбы (преимущественно лососей) въ лѣто отъ 4 до 5 пудовъ на промышленника. Всѣхъ рыболововъ въ Аларскомъ лѣсовѣ до 70, между тѣмъ



какъ въ Тункинскомъ ихъ болѣе 100. Сборомъ кедровыхъ орѣховъ въ Аларскомъ вѣдомствѣ занимаются не болѣе 11 человекъ, между тѣмъ какъ въ Тункинскомъ ихъ болѣе 130. Весьма мало развиты въ Аларскомъ вѣдомствѣ кустарные и извозные промыслы. Первыми занимается всего только 5% всѣхъ взрослыхъ работниковъ (въ Тункинскомъ вѣдомствѣ 7%) а вторымъ 3% (въ Тункинскомъ вѣдомствѣ также только 3%).

Русскія селенія бассейна р. Бѣлой принадлежатъ къ волостямъ Бѣльской, недавно раздѣленной на Бѣльскую и Голуметскую и Черемховской Балаганскаго округа, а также къ Мальтинской—Иркутскаго округа.

Бѣльская волость въ своемъ составѣ до 1888 года занимала двѣ межевыя площади, не связанныя между собой и находящіяся въ нѣкоторомъ разстояніи одна отъ другой. Первая изъ нихъ расположена по рѣкамъ Голумети и двумъ притокамъ ея Иреги и Алару, вторая по Большой и Мало Бѣлой, близъ ихъ сліянія, а также по р. Хаитѣ, правомъ притоку и р. Буланѣ, лѣвому притоку Бѣлой, ниже сліянія ея обѣихъ вѣтвей. Первая изъ этихъ площадей обращена нынѣ въ особую Голуметскую волость, состоящую изъ двухъ сельскихъ обществъ—Голуметскаго и Иретскаго. Голуметское—большое село на р. Голумети съ 2 церквями, школою съ 65 учащимися и богадѣльней, состоитъ изъ 372 дворовъ (съ заимками), имѣетъ 515 жилыхъ строеній, 18 питейныхъ заведеній, 18 лавокъ, 13 мельницъ, 5 кузницъ, 2850 жителей, изъ которыхъ 170 постороннихъ, а 2580 (1292 м. п. и приписанныхъ къ сельскому обществу. Изъ этихъ послѣднихъ ссыльно-поселенцевъ 127 (100 м. п.), новоселовъ 416 (21 м. п.). Хозяйствъ до 500, взрослыхъ работниковъ 1200 (59 м. п.). Въ пользованіи крестьянъ состоитъ 6630 десятинъ въ т. числѣ пахатной до 4300 дес., да луговой 1960 дес. Скота крестьяне содержатъ: лошадей 1770 (1316 рабочихъ), крупнаго рогатаго скота 610 голов., мелкаго до 3900 (въ т. числѣ овецъ 2500, свиней 965). Голуметское производитъ

бывасть не мало хлѣба, а съ 1884 имѣть и базары, не развивающіеся однако-же потому, что существованіе такихъ базаровъ не выгодно для мѣстныхъ хлѣбныхъ торговцевъ и купщиковъ. Изъ Голуметскаго селенія выселился не мало лѣтъ тому назадъ поселекъ—дер. Мойганская, расположенная на рч. Мойганѣ системы р. Алара верстахъ въ 30 отъ Голуметскаго. Въ этомъ селеніи 33 хозяйства и 220 жит., а въ сосѣднихъ заимкахъ дворовъ 66, жилыхъ строеній 82, жителей 440 (216 м. п.); въ томъ числѣ ссыльно поселенцевъ 16 (7 м. п.), новоселовъ 45 (25 м. п.), остальные старожилы. Хозяйствъ 76, взрослыхъ работниковъ 208 (101 пач.). Въ пользованіи крестьянъ 1560 дес.; въ томъ числѣ пахатной 930 дес., луговой 370 дес. Скота крестьяне держатъ: лошадей 337, (234 рабочихъ), крупнаго рогатаго скота 307 головъ, мелкаго скота 970. Село Иретское на рч. Ирети состоитъ (съ заимками) изъ 177 дворовъ и имѣть 236 жилыхъ строеній, церковь, 2 лавки, 6 питейныхъ заведеній, 6 мельницъ, 1 кузницу, жителей въ немъ до 1046 (543 м. п.), а съ посторонними лицами, проживающими въ сельскомъ обществѣ до 1100 об. п. Въ числѣ арендныхъ жителей: ссыльно поселенцевъ 65 (45 м. п.), новоселовъ 81 (36 м. п.), остальные старожилы. Между населеніемъ села Иретскаго не мало страдающихъ развитіемъ зобовъ. Хозяйствъ 218, взрослыхъ работниковъ 520 (262 м. п.). Въ пользованіи крестьянъ 2700 дес., въ томъ числѣ пахатной 1624 дес., луговъ 920 дес. Скота крестьяне держатъ: лошадей 680 (488 рабочихъ), крупнаго рогатаго скота до 300 головъ, мелкаго скота 1380 <sup>1)</sup>. Такъ какъ межевая дача, въ которой расположены крупныя

<sup>1)</sup> О населенныхъ мѣстахъ волости см. Матер. по изсл. нас. Иркутской губ. Т. I, вып. 2-й стр. 13; остальные свѣд. см. тамъ-же, таблицы стр. 154—169.

селенія Голуметское и Иретское, отдалена отъ межевой дачи окружающей село Бѣльское (отъ Бѣльскаго эти села находятся въ 50 до 60 верстъ) и окружена со всѣхъ сторонъ территоріею инородцевъ Аларскаго вѣдомства, то изъ упомянутыхъ двухъ селеній образована въ 1889 г. особая волость Голуметская, а выселокъ Мойганскій, какъ расположенный вѣ Голуметской межевой дачи, перечисленъ въ смежную съ нимъ Заларинскую волость.

Нынѣшняя Голуметская волость владѣетъ пашнями и довольно обособленныхъ участкахъ, хотя часть этихъ пашен и выгоновъ лежитъ за предѣлами Голуметской дачи въ Аларскихъ дачахъ, покосы обоихъ сельскихъ обществъ Голуметской волости также обособлены, но строевой лѣсъ Голуметская волость рубить въ бурятскихъ дачахъ по р. Большо Бѣлой. Какъ это обстоятельство, такъ и нахождение многихъ Голуметскихъ пашенъ и покосовъ въ бурятскихъ дачахъ, подали поводъ къ ожесточеннымъ поземельнымъ спорамъ между голуметцами и бурятами <sup>1)</sup>. Такъ одинъ изъ этихъ споровъ покосѣ продолжался 100 лѣтъ и разрѣшенъ въ пользу голуметскихъ крестьянъ только новымъ проэктомъ надѣленія крестьянъ Бѣльской волости 1877 года. Но Голуметское селеніе заявляло свои притязанія и на другія бурятскія земли. Такъ еще въ 1836 г. голуметцы, ссылаясь на свое малоземелье, просили дополнить его надѣлъ изъ урочищъ Ендонъ и Баба Совѣтъ Главнаго Управленія Восточной Сибири согласился на это, но надѣленіе это не состоялось вслѣдствіе несогласія на него Министерства Государственныхъ Имуществъ. При всемъ томъ, въ 1850 г. землемѣръ Самаринъ отмежевалъ голуметцамъ 3500 дес. изъ указанныхъ ими урочищъ, но это межеваніе было уничтожено распоряженіемъ генералъ-губернатора. Въ 1871 г. вопросъ о надѣленіи голуметцевъ спорнымъ участкомъ возникъ снова и былъ рѣшенъ Совѣтомъ

<sup>1)</sup> См. Матер. по изсл. нас. Иркутск. губ. Т. II, вып. 2-й стр. 6

Главнаго Управленія въ пользу голуметцевъ, но проэктъ на-  
дѣловъ былъ уничтоженъ пожаромъ 1879 года, а въ новомъ  
проэктѣ 1887 года упомянутыя урочища въ предположенный  
надѣлъ голуметцевъ уже не вошли. Всѣ эти колебанія обо-  
стрили отношенія между сосѣдями, и аларскіе буряты стали  
уже запрещать голуметцамъ производить въ дачахъ Алар-  
скаго вѣдомства рыболовный и звѣриный промыселъ, сборъ  
лѣсовыхъ орѣховъ и даже рубку лѣса. Въ 1886 г. голу-  
метцы вынуждены отправить къ аларцамъ особыхъ послан-  
цевъ, которые и заключили съ аларцами соглашеніе объ осво-  
божденіи за плату срубленнаго голуметцами лѣса. Но и это  
соглашеніе не привело къ прочному миру, и въ 1887 г. го-  
луметцы, указывая на чинимыя имъ аларцами стѣсненія въ  
рубкѣ лѣса, производствѣ звѣринаго и рыбнаго промысла и  
уже пастьбы скота въ «мнимопринадлежащихъ имъ владѣ-  
ніяхъ», ходатайствовали передъ начальствомъ, «чтобы оно  
провѣрило справедливость притязаній аларскихъ бурятъ и  
указало точно границы Аларскаго вѣдомства, внѣ которыхъ  
не выдѣлило бы голуметцамъ извѣстное пространство для рубки  
лѣса», а также оградилъ бы голуметцевъ «отъ хищенія тѣхъ  
же бурятъ, которое они производятъ въ неоспоримо принад-  
лежащихъ голуметцамъ дачахъ въ окрестностяхъ села Ирет-  
скаго».

Селенія же, находящіяся на главной дачѣ Бѣльской во-  
лости, т. е. около слиянія рѣкъ Большой и Малой Бѣлой,  
составляютъ два сельскихъ общества—Бѣльское и Хайтинское.  
Въ первому принадлежатъ три селенія: 1) Бѣльское, при  
слияніи Большой и Малой Бѣлой, состоитъ изъ 230 дворовъ,  
308 хозяйствъ, имѣетъ до 300 построекъ, церковь, школу  
съ 43 учащимися и библіотекой въ 722 тома <sup>1)</sup>, богадѣльню,  
молотное правленіе, 1316 жителей (640 м. п.). 2) Дер.

<sup>1)</sup> О школахъ см. Матер. по изсл. нас. Иркутск. губ. Т. II вып. 2-й  
стр. 205 и прилож. къ стр. 2 и пр.

Еловская, въ 5 вер. отъ Бѣльской съ 35 хозяйствами и 20 жит. (100 м. п.). 3) Дер. Средне-Булайская, на среднем теченіи ручья Булая, лѣв. притока Бѣлой въ 10 верстахъ отъ Бѣльска, съ 60 хозяйствами и 330 жителями (176 м. п.). Во всемъ же Бѣльскомъ сельскомъ обществѣ съ заимками 56 дворовъ, 705 жилыхъ строеній, 7 питейныхъ заведеній, 6 лавокъ, 3 мельницы, 10 кузницъ, 2954 жит. (1510 м. п.), съ посторонними проживающими въ сельскомъ обществѣ до 3290 об. п. Изъ числа коренныхъ (приписныхъ) жителей: ссыльно-поселенцевъ 242 (196 м. п.), новоселовъ 32 (170 м. п.), остальные старожилы. Между жителями Бѣльскаго, также какъ и въ нижеупомянутомъ нами селеніи Булайскомъ, не мало страдающихъ развитіемъ зоба но замѣчательно, что уже отъ Средне-Булайскаго селенія вверхъ по Булаю зобовъ совсѣмъ не встрѣчается, и даже за болѣвшіе зобомъ въ Бѣльскомъ нерѣдко выздоравливали въ Средне- и Верхне-Булайскомъ. Хозяйствъ въ Бѣльскомъ сельскомъ обществѣ 557, взрослыхъ работниковъ 1365 (701 м. п.). Въ пользованіи крестьянъ 10500 десятинъ, въ томъ числѣ пахатной земли 6400, а луговой 3200 дес. Скотъ крестьяне Бѣльскаго сельскаго общества держатъ: лошадей 1600 (1215 рабочихъ), крупнаго рогатаго скота 1480 головъ, мелкаго скота 4150. Другое сельское общество Хайтинское состоитъ также изъ 3 селеній, а именно: 4) Нижне-Булайское находится при впаденіи Булая въ Большую Бѣлуку въ 6 вер. отъ Бѣльска. Оно состоитъ изъ 96 дворовъ, 108 жилыхъ зданій, 4 питейныхъ заведеній, 1 лавки, 2 мельницы, 1 кузницы, 410 жителей, а съ посторонними проживающими въ селеніи 450 об. п. Изъ кореннаго населенія (204 м. п.) въ томъ числѣ ссыльно-поселенцевъ 29 (16 м. п.), новоселовъ 61 (23 м. п.), остальные старожилы. Хозяйствъ 84, взрослыхъ работниковъ 194 (98 м. п.). Въ пользованіи крестьянъ болѣе 1700 дес., изъ нихъ пахатной 1110 дес., луговой 510. Скота крестьяне держатъ 240 (184 рабочихъ).

крупнаго рогатаго скота 280 головъ, мелкаго рогатаго скота 630. 5) Хайтинское, на р. Хайтѣ, прав. притокѣ Бѣлой въ 11 вер. отъ Бѣльскаго, состоитъ изъ 116 дворовъ, 166 жилищъ строеній, 2 питейныхъ заведеній, 1 лавки, 3 мельницъ, 610 жителей (294, а съ посторонними проживающими въ селеніи въ 650 об. п. Изъ кореннаго населенія: ссыльно-поселенцевъ 32 (15 м. п.), новоселовъ 93 (46 м. п.), остальные старожилы. Хозяйствъ 120, взрослыхъ работниковъ 320 (167 м. п.). Въ пользованіи крестьянъ 4086 дес., въ томъ числѣ пахатной 1546 дес., луговой 2280 дес. Скота жители содержатъ: лошадей 530 (368 рабочихъ), крупнаго рогатаго 867, мелкаго скота 1130. 6) Кулаковское, на Малой Бѣлой, въ 6 вер. отъ Бѣльскаго, состоитъ изъ 24 дворовъ, 32 жилищъ строеній, имѣетъ 133 жит. (66 м. п.), въ томъ числѣ новоселовъ 6, остальные старожилы. Хозяйствъ 27, взрослыхъ работниковъ 67 (35 м. п.). Въ пользованіи крестьянъ 440 дес. земли, изъ нихъ пахатной 244, луговой 150. Скота крестьяне содержатъ: лошадей 87 (64 рабочихъ), крупнаго рогатаго 134, мелкаго скота 174. Наконецъ на земляхъ Бѣльской волости, вдали отъ группы исчисленныхъ поселковъ, верстахъ въ 25 выше впаденія въ р. Бѣлую рѣки Голумети, находится верхнее изъ русскихъ поселеній на р. Большой Бѣлой Вознесенскій винокуренный заводъ, имѣющій до 330 жителей.

Объ экономическомъ положеніи Бѣльской волости въ прежнемъ ея составѣ, т. е. до ея раздѣленія на Голуметскую и Бѣльскую и до присоединенія къ новой Бѣльской волости Гимельскаго сельскаго общества сосѣдней Черемховской волости, мы имѣемъ слѣдующія свѣдѣнія <sup>1)</sup>. Во всей Бѣльской волости было по переписи 1887—88 г. дворовъ болѣе 1400, жилищъ строеній болѣе 1850. Изъ дворовъ волости 77%

<sup>1)</sup> См. Матер. по изсл. нас. Иркутск. губ. Т. I, таблицы стр. 154—169.

размѣщалось въ селеніяхъ, а остальные 23% по займамъ (отдѣльнымъ хуторамъ), что ясно указываетъ на развитіе хторскаго хозяйства въ волости, — явленіе достаточно распространенное во всемъ Балаганскомъ округѣ. Наличныхъ жителей въ волости по той же переписи было: 8170 об. п. (4125 п.), а съ посторонними проживающими въ волости 8850 об. Изъ числа коренныхъ жителей: ссыльно-поселенцевъ до 58 (болѣе 300 м. п.), новоселовъ до 1030 (515 м. п.), остальные старожилы. При этомъ населеніе волости со времени ревизіи въ 30 лѣтъ приросло на 51%. Въ числѣ жителей волости грамотныхъ, полуграмотныхъ и учащихся было 47 м. п. и 21 ж. п. Выше уже было упомянуто о развитіи и предѣлахъ волости, а именно въ двухъ, можно сказать, очагахъ — по р. Ирети и по р. Бѣлой, эпидемической болѣзни а именно зобовъ. Здѣсь мы можемъ только замѣтить, что зобатость во второмъ и дальнѣйшихъ поколѣніяхъ перѣд приводитъ за собою, какъ это замѣчено и въ нѣкоторыхъ швейцарскихъ долинахъ идиотизмъ, кретинизмъ, а также недоразвитіе въ ростѣ и другіе виды физическаго калѣчества. При этомъ несомнѣнно, что эпидемическія болѣзни эти обуславливаются, какъ и въ другихъ подобныхъ мѣстностяхъ земнаго шара, физическими и климатическими условіями долины Бѣлой (въ ея среднемъ теченіи) и Ирети.

Хозяйствъ въ Бѣльской волости, по переписи 1887—88 было 1500, лицъ въ рабочемъ возрастѣ 3870 (1960 м. п.). Въ числѣ хозяйствъ было: съ 1 работникомъ 978 (въ томъ числѣ въ 324 были еще и подростки или полуработники), съ 2 работниками 305, съ 3 и болѣе 85. Въ остальныхъ 132 хозяйствахъ совсѣмъ нѣтъ взрослыхъ работниковъ, въ 92 изъ нихъ были подростки. Земель въ пользованіи крестьянъ всей волости было 28.500 дес., т. е. по 7 дес. на душу м. п., по 15 на работника, по 19 на хозяйство, и жители Бѣльской волости, особливо въ Голуметской дачѣ, охваченной со всѣхъ сторонъ владѣніями аларскихъ бурятъ, съ

или себя уже стѣсненными. О положеніи надѣльных земель въ дачѣ нынѣшней Голуметской волости было уже говорено выше, а въ дачахъ собственно Бѣльской волости, кромѣ Хайтинскаго селенія, имѣющаго свою особую дачу и представляющую особую естественную общину, остальные селенія Бѣльское съ Средне-Булайскимъ выселкомъ, Нижне-Булайское (Булаковское) владѣютъ пашнями черезполосно, а покосами обща, кромѣ Средне-Булайскаго выселка, у котораго покосы общія съ с. Верхне-Булайскимъ Черемховской волости.

Пахатныхъ земель въ волости 17.850 дес., изъ нихъ заливается только 53%, т. е. на посѣвы приходится по 2 дес. на душу м. п., до 5 дес. на работника и болѣе 6 дес. на хозяйство. На каждыя 100 дес. посѣва засѣвается рожью 5 дес. (38 озимую и 17 ярицею), овсомъ 19, пшеницею 7, ячменемъ 4. Достаточная пропорція пшеничныхъ засѣвовъ свидѣлствуетъ о благопріятныхъ климатическихъ и почвенныхъ условіяхъ волостной территоріи. Вообще же Бѣльская волость относится къ числу волостей, характеризующихся всею болѣе интенсивною, чѣмъ въ большинствѣ волостей Иркутской губерніи, системою хозяйства, приближающеюся къ трехпольной системѣ и представляющей въ Бѣльской дачѣ (нынѣшней Бѣльской волости) уже постепенное развитіе уваживанія полей. Чистый сборъ хлѣбовъ въ Бѣльской волости составляетъ: пшеницы 45, ржи 45, а овса 63 пуда десятины каз. мѣры <sup>1)</sup>).

Луговой земли въ волости 9500 дес., что, принимая въображеніе положеніе этихъ покосовъ, подававшее въ Голуметской дачѣ волости поводъ къ ожесточеннымъ спорамъ съ крестьянами по мѣстнымъ условіямъ, не вполне достаточно и само въ Бѣльской дачѣ выкупается хорошимъ качествомъ луговыхъ. Скота крестьяне волости держатъ: ло-

<sup>1)</sup> А. И. Ушаковъ, Матер. по изсл. нас. Иркутск. губ. Т. II, вып. I, стр. 53, 78.



шадей 5250 головъ (рабочихъ 3875), крупнаго рогатаго болѣе 4000, мелкаго 12460, въ томъ числѣ овецъ болѣе 7000, а свиней болѣе 3200. Такимъ образомъ рабочихъ лошадей приходится на взрослого работника по 2, а всѣхъ лошадей на каждое хозяйство  $3\frac{1}{2}$ , между тѣмъ какъ у бурятъ сосѣдняго аларскаго вѣдомства ихъ по 5; крупнаго и рогатаго скота у крестьянъ Бѣльской волости по  $2\frac{3}{4}$  на хозяйство, а у аларскихъ бурятъ болѣе 4-хъ; наконецъ мелкаго скота у крестьянъ волости по 8 головъ, а у аларскихъ бурятъ по 15. Конечно такое большое различіе объясняется не только меньшимъ количествомъ луговъ у бѣльскихъ крестьянъ (болѣе 6 дес. на хозяйство, а у аларскихъ бурятъ по 14) но и малымъ распространеніемъ въ Бѣльской волости *утуговъ* (см. выше), такъ хорошо привившихся на примѣръ отъ Тункинскихъ инородцевъ къ крестьянамъ Тункинской волости. Во всей Бѣльской волости утуговъ только 90 дес., и большая часть ихъ находится при сосѣднемъ съ аларскими бурятами селѣ Голуметскомъ.

Лѣсъ крестьяне Бѣльской волости рубятъ не только на собственныхъ дачахъ, но и за ихъ предѣлами, что у голуметцевъ и вызывало ожесточенные съ бурятами споры, о которыхъ мы упоминали выше. Лѣсные дачи Бѣльской волости занимаютъ пространство болѣе 100 тыс. дес. На дачѣ нынѣшней Бѣльской волости, гдѣ не было пограничныхъ споровъ, лѣсные промыслы идутъ болѣе успѣшно, такъ-что во всей волости прежняго состава изъ 1500 хозяйствъ болѣе 210 занималось лѣсными промыслами и доставляло болѣе 1500 саж. дровъ на сосѣдніе съ волостью заводы. Охотою (звѣриннымъ промысломъ) занимается въ волости не болѣе 40 человѣкъ. Бѣльская волость по отношенію развитія въ ней земледѣльческихъ промысловъ занимаетъ между волостями русскихъ крестьянъ Иркутской губерніи низшее мѣсто, а именно: въ ней только  $27\frac{1}{2}\%$  изъ общаго числа всѣхъ способныхъ работниковъ занимаются сверхъ земледѣлія еще и промыслами. Изъ мѣст-

нихъ промысловъ крестьянъ нѣкоторое значеніе имѣютъ ломка известняка и обжиганіе извести, идущей на сосѣдніе кожевенные заводы въ с. Нижнемъ Булаѣ и изготовленіе кирпича въ Голуметскомъ селеніи. Затѣмъ жители волости занимаются выдѣлкою древесныхъ издѣлій (10 столяровъ, 9 бондарей, 16 занимающихся драньемъ козья), выдѣлкою животныхъ продуктовъ (10 шерстобитовъ, 11 сапожниковъ и башмачниковъ), металловъ (кузнецовъ 22) и шитьемъ одежды (портныхъ 11).

Рыболовствомъ въ Бѣльской волости занимаются 28 чело-  
вѣкъ. Рыбная ловля производится главнымъ образомъ въ Алят-  
скомъ озерѣ, изъ котораго, какъ сказано выше, вытекаетъ  
р. Аларь системы р. Голумети. Объ озерѣ этомъ интерес-  
ныя свѣдѣнія сообщаетъ Агапитовъ <sup>1)</sup>. Озеро это пользуется  
довольно обширною извѣстностью какъ у бурятъ, такъ и у рус-  
скихъ, благодаря приписываемому его водамъ цѣлебному дѣй-  
ствію противъ водобоязни какъ людей, такъ и животныхъ, такъ-  
же нѣкоторыхъ укушенныхъ бѣшенными собаками или такими  
же волками <sup>2)</sup> посылаютъ купаться въ этомъ озерѣ даже съ мѣст-  
ностей, лежащихъ по правому берегу р. Ангарты, указывая  
на якобы многочисленные случаи исцѣленія. Ширина озера  
у Агапитову достигаетъ 4 версты, а длина до 1 версты;  
наибольшая глубина оказалась равною 4 саженимъ и рас-  
полагается около сѣверо-западнаго конца, откуда дно посте-  
пенно возвышается къ истоку рч. Алары, гдѣ глубина нис-  
падаетъ уже до 1 сажени. Въ вновь возникающей деревнѣ  
Койтоновой, верстахъ въ 15 отъ Алята, Агапитову пере-  
сказали, что изъ озера этого вытаскивали какія-то доски съ

<sup>1)</sup> Агапитовъ. Изв. Сиб. Отд. И. Р. Геогр. Общ. 1878 г. Т. IX, № 3

<sup>2)</sup> Черскій (Рукописныя замѣтки о Сибири) указываетъ на обиліе  
бѣшенства какъ собакъ, такъ и волковъ по низовьямъ р.р.  
Бѣлой и Иркуты, а также и въ системѣ р. Ангарты и вредъ, при-  
чиняемый ими людямъ и скоту.

мѣдными гвоздями. Рыбное богатство Алята прежде было значительнѣе и разнообразнѣе, тогда какъ въ настоящее время буряты Алятскаго улуса добываютъ только карасей. По мнѣнію Агапитова Алятское озеро представляетъ нынѣ собою лишь остатокъ прежняго, гораздо болѣе обширнаго воднаго бассейна, простиравшагося нѣкогда до р.р. Ирети и Бѣлой съ одной стороны, и долины Нигдунъ съ другой, судя по болотисто-солончаковой степи, продолжающейся до Аларскаго степной думы и упирающейся здѣсь «въ возвышенность съ жени въ три», подъ которою авторъ очевидно понималъ прежнюю террасу предполагаемаго имъ бассейна.

**6) Полоса плоской возвышенности, прилегающая къ сѣверо-восточному склону описанной части горной страны  
Большой сибирскій трактъ.**

Такимъ образомъ теченія описанныхъ выше р.р. Иркутки, Китой, Бѣлой и Оки, ознакомивъ съ пересѣкаемою ими горною страной, каждый разъ приводило насъ вмѣстѣ съ тѣмъ и къ той значительно болѣе низкой и ровной площади, которая прилегаетъ къ нагорью со стороны низовьевъ каждой изъ названныхъ рѣкъ, опредѣляя собою и направленіе этого склона.

И дѣйствительно, если сравнивать географическое положеніе пунктовъ, въ которыхъ по теченію этихъ рѣкъ оказывались горы, то оказывается, что, по мѣрѣ удаленія съ запада на востокъ, пункты эти, какъ напр. слияніе р. Ононъ съ Харабулунгомъ, верховья Малой Ирети, притока Малой Бѣлой, устье р. Тойсока въ Китой, а наконецъ, село Введенское на р. Иркуткѣ, постепенно и значительно отклоняются къ югу и этимъ путемъ обнаруживаютъ юго-восточное направленіе подножія горъ, наблюдавшееся уже начиная отъ меридіана верховьевъ р. Кана (Енисейской губерніи, приблизительно съ 113° вост. долготы и 54° сѣв. широты),

западъ отъ которыхъ окраина горъ, какъ извѣстно, придерживается сѣверо-восточнаго направленія, примыкая къ такой-же, болѣе низкой и ровной площади. Площадь эта, какъ по обширности ея протяженія къ сѣверу, такъ и по самому ея орографическому типу, не можетъ цѣликомъ войти въ программу настоящаго изложенія, главною цѣлю котораго служить собственно только нагорная часть Восточной Сибири, мы же нѣсколько расширимъ рамки, установленныя въ Азін Риттера, и рассмотримъ эту площадь, поскольку она входитъ въ предѣлы Иркутской губ. Въ данной же главѣ мы ознакомимся лишь съ полосой этой площади, лежащею между предгоріями Саяна и Ангараю, имѣя въ виду во-первыхъ, орографическое значеніе ея какъ подножія къ которому опускается вся горная часть страны, а во-вторыхъ, что въ этой именно полосѣ, какъ мы увидимъ ниже, скрываются и данныя для разоблаченія какъ древности, такъ и вообще исторіи физико-географическаго развитія опоясываемой ею горной страны, а такъ какъ площадь эта изслѣдована уже во многихъ отношеніяхъ съ достаточною подробностью, то изложеніе имѣющихся о ней свѣдѣній мы раздѣлимъ на три параграфа, изъ которыхъ въ первомъ мы ознакомимся съ орографическими особенностями поверхности и строеніемъ этой полосы, во-второмъ съ почвою и флорою и въ третьемъ съ ея населеніемъ.

#### а) Орографія и строеніе площади.

Лучшимъ маршрутомъ для нашей цѣли является Большой сибирскій почтовый трактъ («Московскій трактъ» у сибиряковъ), какъ путь, пролегающій именно по интересующей насъ площади, къ тому-же вообще въ небольшомъ разстояніи отъ склона горъ и почти параллельно ему.

Съ этою дорогою связаны, въ большей или меньшей степени имена почти большей части ученыхъ, проѣзжавшихъ изъ Европы въ Сибирь (см. предшествующіе томы этого

сочиненія), начиная съ древнѣйшихъ временъ, а въ относящійся къ нимъ періодъ, въ особенности въ послѣднія два десятилѣтія, по всей линіи названнаго тракта произведены уже весьма обстоятельныя и подробныя оро-географическія изслѣдованія.

Послѣ карты Шварца (1864 г.), на которой можно видѣть трактъ этотъ изображенный въ масштабѣ 40 верстъ въ дюймѣ <sup>1)</sup>, интересующій насъ его отрѣзокъ съ гораздо большими подробностями нанесенъ на геогностическую карту Иркутской губерніи Чекановскаго (1874 г.) въ 10-ти-верстномъ масштабѣ <sup>2)</sup>, а въ послѣднее время съ значительными дополненіями, на основаніи подробныхъ изслѣдованій, и на Геологическую карту Сибирскаго почтового тракта Черскаго <sup>3)</sup>.

По линіи ограничивающей описанную нами часть горной страны съ сѣверо-востока, связывая съ собою р. Оку около села Зиминскаго съ устьемъ р. Иркуты и пересѣкая низовья какъ р. Большой Бѣлой (около с. Мальтинскаго), такъ Китоя (около Биликтуя), Сибирскій почтовый трактъ перерѣзываетъ еще и нѣкоторые другіе самостоятельные притоки р. Ангары принадлежащія, судя по ихъ размѣрамъ и сравнительно съ упомянутыми выше главными притоками, не болѣе какъ къ второстепеннымъ. Такимъ образомъ, въ промежуткѣ между Окою и Бѣлою, сначала пересѣкается верхнее теченіе рч. Унгй, въ разстояніи около 23 верстъ къ сѣверо-востоку отъ ея верховьевъ, расположенныхъ на той-же площади, въ 12 верстахъ отъ р. Оки, около устья въ нее рч. Тагны. Длина р. Унги достигаетъ 95 верстъ, при ширинѣ рѣчки всего лишь въ нѣсколько сажень; придержи-

---

<sup>1)</sup> Шварцъ, Труды Сиб. Эксп. I. с.

<sup>2)</sup> Чекановскій, Зап. Сиб. Отд. Т. XI. I. с.

<sup>3)</sup> Черскій, Приложение къ 59-му тому Зап. И. Акад. Наукъ № 1888 г. Геологическое изслѣдованіе почтового тракта отъ озера Байкала до восточнаго склона хребта Уральскаго.

вась сначала сѣверо-восточнаго направленія, а затѣмъ почти  
восточнаго до устья въ Ангарту, въ которую она впадаетъ  
нѣсколько ниже города Балаганска. Далѣе, въ разстояніи  
менѣе 20 верстъ къ юго-востоку, трактъ пересѣкаетъ значи-  
тельный правый притокъ р. Унги, извѣстный подъ названіемъ  
р. Залари; притокъ этотъ, отличающійся сѣверо-восточнымъ  
направленіемъ, беретъ начало всего лишь въ нѣсколькихъ  
верстахъ отъ праваго берега р. Тагны, въ промежуткѣ между  
нею и верховьями упоминавшихся выше лѣвыхъ прито-  
ковъ р. Голумети, въ разстояніи около 42 верстъ на юго-  
западъ отъ мѣста пересѣченія трактомъ, причемъ вся длина  
Залари достигаетъ 76 верстъ. Затѣмъ, почти на половинѣ  
разстоянія между Окою и Бѣлою, дорога, придерживаясь въ  
общемъ долины незначительной рч. Кутуликъ, спускается  
сбоку нея и пересѣкаетъ собою рч. Нотъ, воспринимаю-  
щую Кутуликъ съ лѣвой стороны. Рѣчка эта, отчасти высы-  
лающаяся, составляетъ непосредственное продолженіе Куты, а  
перущаго начало недалеко отъ тракта, на юго-западной  
ея сторонѣ, и слѣдующаго сначала болѣе или менѣе парал-  
лельно ему на протяженіи около 25 верстъ, послѣ чего, не-  
много поворачиваетъ на сѣверо-востокъ, принимая названіе  
Нотъ, а затѣмъ въ 10 верстахъ на с.-в. отъ тракта, по-  
ворачиваетъ къ востоку, къ Ангартѣ, гдѣ она извѣстна уже  
подъ именемъ Каменки, продолжаясь еще около 30 верстъ,  
такъ что общая длина этой долины достигаетъ около 75  
верстъ. Что-же касается остальной части тракта, то въ про-  
межуткѣ между Бѣлою и Китомъ онъ пересѣкаетъ только  
незначительную рч. Тельмѣ, а между Китомъ и Иркутомъ  
только: Еловку, Мыгетъ и Вересовку.

Не взирая на представляемые этою мѣстностью значитель-  
ныя колебанія въ гипсометрическомъ уровнѣ и на глубину  
каньоновъ, видъ съ дна которыхъ нѣрѣдко живо напоминаетъ  
близкіе пейзажи гористыхъ странъ, всѣ наблюдатели, проѣз-

жавшіе по тракту и писавшіе объ этой мѣстности, согласны въ томъ отношеніи, что интересующая насъ площадь принадлежитъ къ типу плоскихъ возвышенностей, расчлененныхъ болѣе или менѣе глубокими долинами <sup>1)</sup>: высшіе пункты между такою сѣтью долинъ являются поэтому плоскими и ровными, располагаясь приблизительно на одной высотѣ или не представляя вообще значительныхъ колебаній въ гипсометрическомъ уровнѣ. Наконецъ, самыя точныя данныя о положеніи этой возвышенности надъ уровнемъ океана, какъ равно о гипсометрическихъ подробностяхъ устройства ея поверхности по линіи тракта, дала упоминавшаяся уже выше сибирская нивелировка 1875—76 г.г., результаты которой опубликованы въ 1885 году Фусомъ <sup>2)</sup>. Изъ приложенныхъ къ этому труду таблицъ и профили мы видимъ, что, начиная отъ уровня р. Оки (1508,5'), мѣстность возвышается къ юго-востоку до 2003,4', послѣ чего склоняется къ р. Унгѣ, поверхность которой врѣзывается до 1509,2' н. ок.; въ промежуткѣ затѣмъ между Унгою и Заларою, площадь опять возвышается до 1943,9', далѣе, между Заларою (1493,8') рч. Нотъ до 1950,2', а между Нотомъ (1456,9') и Бѣлою до 1984,5' надъ океаномъ; наконецъ начиная съ р. Бѣлой, поверхность которой около Мальты располагается на высотѣ 1385,3', дорога пролегаетъ вверхъ по долинѣ р. Ангара върнѣе по ея террасамъ, и потому высшій пунктъ на пути между Бѣлою и Китоемъ не превосходитъ 1587,6', а между Китоемъ, уровень котораго около Биликтуя равняется 1411' и устьемъ Иркуты не превосходитъ даже 1486,1', тогда какъ поверхность Ангара сейчасъ-же ниже впаденія въ нее Иртыша лежитъ на высотѣ 1469,3'. Тѣмъ не менѣе площадь, въ которую врѣзалась Ангара до только-что указаннаго ур-

<sup>1)</sup> См. прекрасный трудъ Кропоткина: „Общій очеркъ орографіи Восточной Сибири“. Зап. И. Р. Геогр. Общ. по общей Географіи 1903 г.

<sup>2)</sup> Фусъ, Зап. И. Р. Геогр. Общ. Т. XV. № 1.

возвышается по берегамъ долины и на этомъ протяженіи до цифръ, близкихъ къ 2000'.—Ближайшее изученіе данныхъ, доставленныхъ сибирскою нивелировкою по всей длинѣ ея маршрута, вмѣстѣ съ совершеннымъ въ 1885 г. изслѣдованіемъ почтового тракта отъ озера Байкала до восточнаго склона хребта Уральскаго, привели Черскаго къ небезынтереснымъ заключеніямъ <sup>1)</sup>; выводы этихъ мы должны коснуться здѣсь для выясненія роли, которую играетъ интересующая насъ площадь въ общей геопластикѣ Сибири по линіи почтоваго тракта.

Подвигаясь съ гребня Уральскаго хребта на востокъ-ю-востокъ, чтобы пересѣчь въ этомъ направленіи Сибирь у Байкала, мы спускаемся, какъ извѣстно, сначала въ Западно-Сибирскую низменность, раздѣляемую теченіемъ р. Иртыша на двѣ части. Высота западной части низменности колеблется между 210' (и менѣе) и 484' надъ океаномъ, тогда какъ средняя высотъ восточной части низменности (отъ Иртыша до Оби), или такъ называемой Барабинской степи, оказалась равною 394' съ колебаніями отъ 224 до 556'.

Далѣе, вмѣстѣ съ переѣздомъ на правый берегъ р. Оби (100° 50' восточ. долготы), путешественникъ поднимается на болѣе высокую, хотя и расчлененную долинами, но въ общемъ достаточно плоскую и ровную площадь, простирающуюся на востокъ до р. Чулыма около города Ачинска (108° 10' вост. долготы). Площадь эту Черскій называетъ низменною террасою сѣверо-западной плоской возвышенности азіатскаго материка; средняя высота этой террасы равняется 752', съ колебаніями отъ 226,8 (уровень р. Томи) до 1010', причемъ высшіе пункты располагаются уже ближе къ р. Чулыму, поверхность котораго лежитъ на высотѣ 628,6'. Затѣмъ, отъ Чулыма до р. Би-

<sup>1)</sup> Черскій I. с. pag. 3 — 10.



рюсы, т. е. до  $115^{\circ} 20'$  вост. долготы, простирается средняя терраса плоской возвышенности, средняя высота которой равняется  $1094'$ ; особенно рѣзкія колебанія въ высотѣ отдѣльныхъ пунктовъ этой террасы по линіи почтового тракта выражаются съ одной стороны русломъ р. Енисея, вѣдущагося до  $450,1'$  н. ок., и съ другой стороны тѣмъ обстоятельствомъ, что около праваго берега этой долины ( $1529,9'$ ) дорога пересѣкаетъ подножіе возвышающихся къ югу горъ въ общемъ-же и эта площадь, даже изображенная на профили, усиливающей, какъ извѣстно, всѣ неровности почвы обнаруживаетъ характеръ плоской возвышенности съ вполне достаточною наглядностью. Наконецъ, на востокъ и юго-востокъ отъ р. Бирюсы располагается еще болѣе высокая площадь, названная Черскимъ высшею террасою плоской возвышенности; средняя высота ея равняется  $1750'$  высшія точки ея не превосходятъ  $2028,6'$ , что-же касается долинъ, то изъ нихъ только двѣ углубляются болѣе значительно, именно, р. Уда (до  $1315,2'$ ) и Бѣлая ( $1315,3'$ ), тогда какъ уровень дна остальныхъ долинъ не опускается ниже  $1415,1'$ , а поверхность Байкала, составляющая какъ бы заливообразную часть этой площади, вдавшуюся въ окраинную горной страны черезъ посредство долины р. Ангары, располагается на высотѣ  $1561'$  н. ок. Уровень Байкала, какъ члена разсматриваемой площади, превосходитъ такимъ образомъ высоту даже самыхъ выдающихся точекъ средней террасы, точно также какъ дно самыхъ глубокихъ долинъ ея (т. е. высшей террасы) превышаетъ уровень высшихъ пунктовъ низшей террасы. Высшая терраса эта по обѣ стороны Ангары примыкаетъ непосредственно къ склону горъ и альпійскихъ цѣпей, окаймляющихъ собою съ сѣверо-запада такъ называемое высокое плоскогорье съ лежащими на немъ верховьями рѣкъ Енисея, Селенги и Витима; частью высшей террасы плоской возвышенности является поэтому и описываемая площадь, на которую выходятъ изъ горъ низовыя

рѣкъ Оки, Бѣлой и Иркуты, пересекаемыя интересующимъ насъ отрѣзкомъ почтоваго тракта.

Относительно геогностическаго строенія этой части высшей террасы плоской возвышенности мы находимъ свѣдѣнія главнымъ образомъ въ работахъ Чекановскаго (1. с.) и Черскаго (1. с.), къ которымъ присоединяются еще болѣе примѣчательныя данныя предшествовавшихъ имъ путешественниковъ, какъ-то: Гофмана <sup>1)</sup> и Макуровскаго <sup>2)</sup>; къ тому-же идутъ еще нѣкоторыя замѣтки у Злобина <sup>3)</sup> и замѣтки упоминавшейся выше золотопоисковой партіи 1824 г. <sup>4)</sup>, или не считать еще болѣе старыхъ данныхъ, которыми пользовался уже и Риттеръ. Перечисленные изслѣдованія показываютъ, что все пространство пересекаемой трактомъ террасы отъ Иркуты до Оки занято преимущественно горизонтальными осадками юрскаго системы, т. е. бурожелтыми песчаниками съ сланцеватою глиною, глинистымъ сланцемъ, а мѣстами и съ флечами бурога угля. Осадки эти занимаютъ собою высшія точки террасы между Бѣлою и Окою, гдѣ въ низшихъ мѣстахъ, какъ напр. въ долинѣ р. Бѣлой, на значительномъ протяженіи къ сѣверо-западу отъ лѣваго берега послѣдней, затѣмъ въ долинахъ рч. Нотъ, Залари, Унги (до Гофману) и Оки, изъ подъ юры выступаетъ знакомый уже известнякъ, залегающій точно также въ горизонтальныхъ пластахъ, и только на спускѣ съ праваго берега долины Унги можно видѣть, что подъ юрскимъ песчаникомъ залегаетъ еще довольно мощная толща красноцвѣтныхъ рухляковъ съ сѣроватобѣлыми и зелеными прослойками и пятнами съ пропластками краснаго же песчаника. Красноцвѣтныя

<sup>1)</sup> Гофманъ, Beiträge zur Kenntniss des Russischen Reiches v. Baer und Schrenck 1847. В. XII; Горн. Журн. 1844 г. Ч. IV.

<sup>2)</sup> Макуровскій, Горн. Журн. 1844. Ч. II. № 4.

<sup>3)</sup> Злобинъ, Горн. Журн. 1835. Ч. III стр. 527.

<sup>4)</sup> Журн. Мин. Внутр. Дѣлъ 1858. Ч. XXVIII.

породы эти, найденныя здѣсь въ 1875 г. Черскимъ <sup>1)</sup>, распространяются на сѣверо-востокъ отъ тракта, занимая значительную площадь по Унгѣ, низовьямъ Залари, по Ангаре и ниже по р. Окѣ, явственно залегая поверхъ известня около такъ называемой Балаганской или Мельхатуйской пещеры, недалеко отъ г. Балаганска; далѣе на востокъ и сѣверо-востокъ таже толща можетъ быть непрерывно прослѣжена до р. Лены и верхняго теченія р. Нижней Тунгуски гдѣ только и найдены въ ней неоспоримые девонскіе остатки ископаемыхъ животныхъ, опредѣляющіе древность этого положенія. Пласты эти точно также отличаются горизонтальнымъ положеніемъ и во многихъ мѣстахъ до того пересечены сrostками гипса, что минеральнотъ этотъ является предметомъ постоянной эксплуатаціи напр. по р. Унгѣ и Ангаре. Кромѣ того съ красноцвѣтною толщею всего чаще связанъ здѣсь и соляные ключи, какъ напр. по р. Унгѣ, вода воторой, прѣсная въ верхней части теченія, гдѣ долина проложена среди юрскихъ осадковъ, дѣлается солоноватою негодною для употребленія по мѣрѣ вступленія ея въ пдѣлы девонской толщи <sup>2)</sup>. Впрочемъ главные соленосные источники, эксплуатируемые уже съ весьма отдаленнаго времени вытекаютъ на островѣ р. Ангара въ промежуткѣ между Ботоемъ и Бѣлою, ниже устья рч. Тельмы, въ 60 верстахъ отъ Иркутска, въ томъ мѣстѣ, гдѣ девонская толща отсутствуетъ а известнякъ непосредственно покрывается юрскими осадками которые, какъ показали исследованія Черскаго, выполняюща собою пространныя долины, промытыя въ девонскихъ пластахъ до подлежащаго имъ известняка <sup>3)</sup>. Солеваренный заводъ, построенный около этихъ ключей, и село, на лѣво

<sup>1)</sup> Изв. Сиб. Отд. Геогр. Общ. Т. VII № 2 и 3.

<sup>2)</sup> Черскій, Рукописныя замѣтки о Сибири.

<sup>3)</sup> Черскій, Изв. Сиб. Отд. И. Р. Геогр. Общ. Т. VII № 2 и 3 и XVI № 1, 2, 3.

берегу Ангары, извѣстны подѣ названіемъ Усоля, считающаго 690 дворовъ съ 3280 жителями (1730 мужск. пола, а 1884 годѣ). По наблюденіямъ Гофмана и его спутника Макировскаго (П. с.), изъ подѣ песчаника съ углемъ (прскаго, но считавшагося въ то время каменноугольнымъ), мерсты съ двѣ ниже Усоля обнажается тонкослоистый, битуминозный вонючій известнякъ; пласты его или горизонтальны, или-же въ нѣкоторыхъ мѣстахъ обнаруживаютъ слабый наклонъ ( $8 - 10^{\circ}$ ) на ю.-в.  $7^{\circ}$  (у Макировскаго с.-в  $10^{\circ}$ ), причемъ они пересѣкаются жилкою чистаго известковаго шпата до  $\frac{1}{2}$  фута толщиною. Соляные источники, по показанію экспедиціи 1824 г., «видныя и на днѣ протока, отдѣляющаго островъ отъ матерой земли», находятся, какъ сказано выше, на островѣ р. Ангары. По Гофману (1843 г.) ихъ три: одинъ съ насосомъ, двигаемымъ лошадьми, отличается 7-процентнымъ рассоломъ и температурою въ  $+5,^{\circ}$  Ц.; другой, или ключъ большой шахты имѣетъ  $6\frac{1}{2}\%$  рассоль и  $+4,^{\circ}$  Ц. и наконецъ третій или ключъ малой шахты, заключаетъ  $5,75\%$  соли и  $+5,25^{\circ}$  Ц.

Кромѣ того имѣется еще четвертый ключъ, вытекающій уже на лѣвомъ берегу Ангары непосредственно изъ скалы; онъ отличается температурою, не превышающею  $+1,75^{\circ}$  Р., изъ чего очевидно, что глубина, изъ которой выходятъ ключи острова, не одинакова съ материковой. Въ 1824 г. надъ ключами этими были сдѣланы высокіе колодцы, изъ которыхъ черпали рассоль бадьями и выливали въ жолобы, переводящіе рассоль въ ларь, устроенный подлѣ варницы; изъ ларя вода выпускалась въ цирень или огромную сковороду, висящую на крючьяхъ надъ сильнымъ огнемъ. Варница построена была въ видѣ высокаго восьмиугольнаго сарая съ куполообразною кровлею, на вершинѣ которой находится отверстіе для дыма. Огонь поддерживается короткими отрѣзками толстыхъ бревенъ, называемыми здѣсь «елтышами». Добывается соли нельзя сказать, чтобы ужъ очень много. Въ 60-ыхъ годахъ воли-

чество добытой соли было около двухсотъ тысячъ пудовъ, за послѣднее время это количество возросло. Максимумъ добычи относится къ 1884 году — 383,<sup>999</sup> пудовъ, затѣмъ по порядку слѣдуютъ 1883 г. — 380,<sup>335</sup>; 1885 — 367,<sup>942</sup>; 1886 — 315,<sup>048</sup>; 1888 — 292,<sup>745</sup>; 1887 — 290,<sup>429</sup>; 1890 — 271,<sup>870</sup>; 1889 — 263,<sup>218</sup> <sup>1)</sup>. Изъ этихъ цифръ видно, что количество добытой соли въ началѣ 80-ыхъ годовъ было больше чѣмъ за самое послѣднее время. Соль плохого качества и сѣраго цвѣта; особенно непригодна она для соленія омулей, которые получаютъ непріятный вкусъ и не выдерживаютъ продолжительнаго сбереженія. Иркутскій солеварный заводъ снабжаетъ солью всю Иркутскую губ. и часть Забайкалья. Работы производились ссыльно-каторжными. Въ послѣднемъ десятилѣтіи именно въ 1877 — 80 г.г. производились работы цѣлью усиленія разсола въ Усольскихъ ключахъ, командированнымъ туда горнымъ инженеромъ Бродовичемъ, который на острову заложена была буровая скважина, дающая возможность до мельчайшей подробности прослѣдить геологическое строеніе данной мѣстности <sup>2)</sup>. Чередуваніе пластовъ начиная сверху будетъ слѣдующее:

1) Сѣрый крупный песокъ . . . . .	5 ф.	
2) Темносѣрый глинистый мелкій песокъ . . . . .	7 ф.	6 д
3) Окатанная рѣчная галька . . . . .	6 ф.	10 д
4) Сѣрая песчанистая глина . . . . .		8 д
5) Желтовато-сѣрый рухлякъ . . . . .	1 ф.	3 д
6) Сѣрый твердый известнякъ . . . . .	3 ф.	8 д
7) Доломитовый кремнистый известнякъ съ сѣрнымъ колчеданомъ и известково- вымъ шпатомъ . . . . .		9 д

<sup>1)</sup> Свѣдѣнія собраны изъ Сбор. стат. свѣд. о горноз. промыш. Россіи соответствующихъ годовъ.

<sup>2)</sup> Свѣдѣнія заимствованы изъ рукописнаго „Журнала буровой скважины, заложеной на Иркутскомъ солеваренномъ заводѣ“, хранящагося въ архивѣ Горнаго Департамента.

8) Тоже известнякъ, но только темнаго цвѣта и съ сильнымъ смолистымъ запахомъ, похожій на настоящій вонючій известнякъ. Слои падаютъ на с.-з. подъ угломъ приблизительно въ  $10^{\circ}$ . Весь известнякъ разбитъ тонкими вертикальными трещинами . . . . .

6 ф.  $4\frac{7}{8}$  д.

9) Доломитизированный известнякъ темно-бурого цвѣта, издающій при ударѣ смолистый запахъ, съ прослойками роговика и сѣрнымъ колчеданомъ, значительной твердости. Кромѣ того мѣстами въ немъ встрѣчаются настоящіе стелеолиты, напоминающіе стелеолиты Рюдерсдорфа . . . . .

36 ф.  $11\frac{3}{8}$  д.

10) Желтовато-сѣрый известнякъ, содержащій отпечатки раковинъ, разбитый трещинами (вертикально) и пустотами, отчасти наполненными желтовато-сѣрой глиной. Отпечатки раковинъ не ясны, но одинъ изъ нихъ напоминаетъ брюшную створку *Productus Cancrini*. Встрѣчаются и стелеолиты. На глубинѣ 123 футовъ отъ поверхности обнаружилась въ породѣ пустота въ видѣ трещины, простирание которой съ с.-з. на ю.-в. и паденіе на с.-в. Ширина ея оказалась не менѣе  $1\frac{1}{2}$  фута. По стѣнкамъ торчали кристаллы известкового шпата и гипса. По трещинѣ проходилъ рассолъ, температура котораго на глубинѣ 5 футовъ отъ поверхности была  $5\frac{1}{2}^{\circ}$  Ц. при температурѣ наружнаго воздуха  $+1^{\circ}$  Ц. и воздуха на глу-

бинѣ шести + 4° Ц., а на глубинѣ 106 ф. оказалась + 6<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Ц. Наблюденіе производилось 12 марта въ 11 ч. утра. На глубинѣ 150 футовъ оказалась новая вертикальная трещина, заполненная жильною породою, трещина эта постепенно уклонялась въ сторону, что стало замѣтнымъ на глубинѣ 170 ф.

137 ф. 5<sup>5</sup>/<sub>8</sub> д.

- 11) Темно-сѣрый роговикъ съ сѣрнымъ колчеданомъ . . . . .

39 ф. 5<sup>5</sup>/<sub>8</sub> д.

- 12) Свѣтло-сѣрый известковый рухлякъ съ включеніемъ гипса и небольшими пустотами . . . . .

104 ф. 9<sup>3</sup>/<sub>8</sub> д.

- 13) Доломитизированный известнякъ, слабо-вскипающій съ кислотами, довольно плотный. Съ глубины 374 футовъ порода становится тонко-слоистой, а на глубинѣ 380 ф. оказалась трещина, по которой двигался разсолъ, удаляясь въ стороны отъ скважины, что свидѣтельствуеъ въ пользу наклона трещины. На глубинѣ 420 ф. встрѣчены куски чистаго известковаго шпата, добытые изъ жилы, пересекающей породу . .

135 ф. 3 д.

- 14) Свѣтло-сѣрая пластичная глина съ микроскопическими кристаллами сѣраго колчедана. Куски глины на воздухѣ быстро высыхаютъ и дѣлятся на пластинки, не толще листа бумаги. Органическихъ остатковъ не найдено . .

41 ф. 10 д.

- 15) Глинистый сланецъ свѣтло-сѣраго цвѣта, содержащій мелкіе кристаллы сѣрнаго колчедана, не содержащій ока-

меньшостей и довольно твердый. Книзу  
сланецъ становится весьма плотнымъ.

18 ф. 8 д.

16) Глина, подобная предъидущей, но нѣс-  
колько болѣе свѣтлаго оттѣнка и съ  
меньшимъ количествомъ сѣрнаго кол-  
чедана . . . . .

28 ф. 6 д.

17) Глинисто-известковый сланецъ свѣтло-  
сѣраго цвѣта, весьма трещиноватый и  
довольно твердый. Въ скважинѣ обна-  
руживался чистый разсолъ на разныхъ  
глубинахъ, что свидѣтельствуеъ о  
встрѣчѣ буромъ трещинъ, приводя-  
щихъ разсолъ . . . . .

51 ф. 5 д.

89 с. 2 ф. 7 д.

На этой глубинѣ буреніе было приостановлено, хотя  
часть (17) еще не прекратился.

Не взирая на значительное и непрерывное истребленіе  
окрестныхъ и болѣе отдаленныхъ лѣсовъ Усольскимъ заво-  
домъ, долго не было удовлетворяющей современнымъ требо-  
ваніямъ горнаго дѣла, развѣдки бурого угля <sup>1)</sup>, флецами ко-  
раго изобилуютъ окрестныя юрскіе осадки; къ тому-же и  
количество угля, обнаруживавшагося этими развѣдками, которыя  
производились большею частью по правому берегу р. Ангары  
въ системѣ рч. Балеи), не было изслѣдовано надлежа-  
щимъ образомъ <sup>2)</sup>. Укажемъ здѣсь еще на одну изъ са-  
мыхъ древнихъ <sup>3)</sup>, очевидно забытую позднѣйшими поиско-

<sup>1)</sup> Только въ 1891 г. появились въ печати результаты подробныхъ  
ислѣдованій мѣсторожденій бурого угля въ Иркутской губ. Обручева,  
исследованиямъ направленія будущей Сибирской дороги. Въ со-  
сопствующихъ мѣстахъ мы указывали и будемъ указывать на этотъ  
Журн. Горн. 1891 г. № 12.

<sup>2)</sup> Отчетъ Сиб. Отд. Геогр. Общ. за 1868 г., стр. 211.

<sup>3)</sup> Горн. Журн. 1835 г. Ч. III. Кн. IX, стр. 527.



выми и развѣдочными партіями, въ особенности потому, что развѣдка эта, кромѣ практической стороны, имѣетъ еще малый интересъ и для геологіи этой мѣстности <sup>1)</sup>. Согласно рапорту управляющаго сибирскими солеваренными заводами полковника Злобина (отъ 7-го іюня 1835 г.), въ 70 верстахъ ниже Усольскаго завода, или, какъ его иногда называютъ Иркутскаго солевареннаго завода, и въ четырехъ верстахъ отъ лѣваго берега Ангары, въ горѣ около Балдуйской (иначе Балтуйской) пади (долинка системы описанной выше долины Куйтъ-Нотъ-Каменка), испытательная шахта встрѣтила концѣ пятой сажени пласть буреаго угля «превосходнѣйшаго качества» въ девять футовъ толщины; непосредственно по этимъ флечомъ, мощность котораго превышаетъ всѣ извѣстныя до сихъ поръ залежи этого минерала въ Иркутской губерніи, найденъ пласть буреаго желѣзняка, толщиною отъ 8 до 12 вершковъ, «который лежитъ по всѣмъ направлѣніямъ, не перемѣняя ни въ качествѣ, ни въ толщинѣ, такъ-что прочность сего мѣсторожденія не подлежитъ ни малѣйшему сомнѣнію». Въ геологическомъ отношеніи сообщеніе это весьма интересно потому, что Балдуйская долина располагается на площади, закрашенной на картѣ Чекановскаго сплошною краскою известнаго между тѣмъ какъ нахожденіе слоя каменнаго угля, въполноту отсутствующаго въ известковой толщѣ, прямо указываетъ на то, что въ названномъ мѣстѣ должна была уцѣлѣть отъ размыва по крайней мѣрѣ нѣкоторая часть угленосныхъ юрскихъ осадковъ <sup>2)</sup>. Въ заключеніе переданныхъ здѣсь геологическихъ свѣдѣній скажемъ еще во-первыхъ, что юрскія отложенія площади состоятъ изъ рѣчныхъ, озерныхъ

<sup>1)</sup> Черскій, Рукописныя замѣтки о Сибири.

<sup>2)</sup> Свѣдѣнія о подобныхъ же клочкахъ юрскихъ осадковъ встрѣчаются на той-же картѣ границы распространенія отложеній этой системы, можно найти еще въ Изв. Сиб. Отд. Геогр. Общ. Т. XVI № 2 и 3 стр. 240 — 242.

и атмосферныхъ послѣдствіи осадковъ, а наконецъ, что линія соприкосновенія всѣхъ перечисленныхъ нами осадочныхъ толщъ съ развитыми въ прилежащихъ горахъ кристаллическими породами, какъ мы видѣли при подробномъ описаніи низовьевъ р.р. Китоа, Урика, Онота и Малой Бѣлой, до сихъ поръ еще вовсе неизслѣдована въ стратиграфическомъ отношеніи, несмотря на важность такихъ данныхъ въ дѣлѣ опредѣленія относительной древности описанной части горной страны. Объ этомъ вопросѣ можно судить только по описаннымъ выше низовьямъ р. Иркутъ, а въ особенности, какъ мы увидимъ ниже, по отношенію тѣхъ же породъ въ прибайкальскихъ горахъ; основываясь на этихъ данныхъ, Черскій полагаетъ, что складки кристаллическихъ породъ, слагающія описанную часть горной страны, образовались еще въ періодъ, предшествовавшій отложенію филлита (низовья Батоя), и вообще толщи, залегающей подъ известнякомъ плоской возвышенности и что складки эти образовали здѣсь собою юго-западный берегъ всѣхъ позднѣйшихъ морей доюрского періода, вопросъ, къ которому мы возвратимся еще при описаніи прибайкальскихъ горъ, какъ сѣверовосточнаго продолженія изучаемаго нами нагорья.

б) Климатъ, почва и флора разсматриваемаго плоскогорья.

О климатѣ разсматриваемой площади получаемъ мы полное понятіе по метеорологическимъ наблюденіямъ, производившимся близъ волостнаго селенія Черемховской площади, расположеннаго посреди плоскогорья на абсол. высотѣ 490 метровъ, подъ  $53^{\circ} 14'$  с. ш. и  $102^{\circ} 58'$  в. д. отъ Гринв. Наблюденія эти производились въ Черемховской образцовой фермѣ М. А. Шеестаконимъ съ 13 Авг. 1873 по 22 Мая 1875 г. <sup>1)</sup> По этимъ наблю-

---

<sup>1)</sup> Вильдъ, О темпер. воздуха Россійской Имперіи. 1889 г. Табл. № 340 и прилож. стр. 312.

деніямъ средняя годовая температура  $+0^{\circ}_{,33}$  мало разнится отъ Иркутской (тамъ средняя годовая температура, выведенная изъ 28 лѣтнихъ наблюдений  $-0^{\circ}_{,02}$ ). Среднія температуры весны  $+1^{\circ}_{,3}$ , лѣта  $+17^{\circ}_{,2}$  осени  $0^{\circ}_{,4}$  и зимы  $-11^{\circ}_{,8}$  также мало разнятся отъ Иркутскихъ (въ Иркутскѣ весна  $+1^{\circ}_{,3}$ , лѣто  $+16^{\circ}_{,6}$  осень  $0^{\circ}$  зима  $-15^{\circ}_{,5}$ ), а именно лѣто на плоскогорьѣ немного теплѣе, а зима холоднѣе чѣмъ въ Иркутскѣ, какъ то и слѣдовало ожидать. Температура теплѣйшаго мѣсяца  $+18^{\circ}_{,8}$  также выше чѣмъ въ Иркутскѣ, (гдѣ она  $+18^{\circ}_{,6}$ ), какъ и холоднѣйшаго  $-19^{\circ}$  (въ Иркутскѣ  $-20^{\circ}_{,6}$ ). Если же взять 5-мѣсячный растительный періодъ (съ мая по сентябрь включительно), то средняя его температура въ Черемховскомъ  $+14^{\circ}_{,4}$  окажется даже нѣсколько благопріятнѣе чѣмъ въ Иркутскѣ ( $+13^{\circ}_{,7}$ ) и можетъ быть признана вполне достаточною для развитія земледѣлія, не исключая и посѣвовъ пшеницы. Въ теченіи года выпадаетъ 350 миллим. водныхъ осадковъ, но къ счастью 208 миллиметровъ изъ нихъ падаютъ на лѣтніе мѣсяцы; 76 падаютъ на осенніе, 34 на весенніе и только 31 на зимніе, такъ-что зимы на плоскогорьѣ представляются довольно безснѣжными.

Почвы плоскогорья также какъ и флора его въ послѣднее 25-лѣтіе были обстоятельно изслѣдованы Агапитовымъ, Прейномъ и Смирновымъ <sup>1)</sup>. Агапитовъ совершилъ въ 1877 г. весьма интересное путешествіе съ гео-ботаническою цѣлью, причемъ маршрутъ названнаго ученаго, не ограничиваясь почтовымъ трактомъ, отклонялся еще: по р.р. Целотѣ и Картагону системы низовьевъ Китою, затѣмъ по Хайтѣ, низовьямъ р. Большой Бѣлой, Ирети и Голумети, а наконецъ, на Заларѣ.

---

<sup>1)</sup> Агапитовъ, Изв. Сиб. Отд. геогр. общ. 1878 Т. IX, № 3, 4. Прейнъ и Смирновъ, Матер. по изсл. нас. Иркутск. губ. Т. II, вып. 1-й стр. 64, 83; Прейнъ—Матер. для флоры Балаганск. окр. Изв. Сиб. Отд. 1890 Т. XXI, № 4; Прейнъ, Предвар. отч. о ботанич. изсл. Балаганск. окр. въ Изв. Сиб. Отд. 1892. Т. XXIII, № 2.

Унгѣ и до р. Оки, послѣ чего онъ выходитъ уже за предѣлы рассматриваемой нами полосы.

Прейнъ въ 1888 г. производилъ въ Балаганскомъ округѣ, по порученію генераль-губернатора графа Игнатъева, почвенныя и ботаническія изслѣдованія, причемъ объѣхалъ все рассматриваемое плоскогорье; наконецъ въ 1891 г. Прейнъ совершилъ новую поѣздку на средства Восточно-Сибирскаго Общества, причемъ посѣтилъ опять среднія наиболѣе населенныя части Балаганскаго округа, дополняя совершенныя имъ въ 1888 г. изслѣдованія.

Самою характерною особенностью почвеннаго покрова рассматриваемаго плоскогорья является громадное развитіе и немѣ *черныхъ почвъ*. Первый изслѣдователь этихъ почвъ Агапатовъ относитъ ихъ къ настоящему чернозему, приравливая ихъ къ типичному чернозему южно-русскихъ степей. Онъ говоритъ, что эта черноземная площадь прилегаетъ съ юга къ лѣвому берегу р. Бѣлой, съ сѣвера къ Заларѣ и отчасти къ Унгѣ, а съ с.-в. подступаетъ къ лѣвому берегу Ангары и занимаетъ площадь въ 425 тыс. десятинъ или до 1000 кв. верстъ. Не представляя впрочемъ сплошной площади, черноземъ этотъ, по Агапатову, смѣняется мѣстами частками глинистой почвы и березняка, а иногда и хвойнаго лѣсомъ. Впрочемъ, уже Черскій замѣчаетъ, что подъ именемъ «черноземъ» здѣсь понимаютъ лишь слои хорошо перегноившагося навоза, залегающіе и накапливающіеся по крестьянскимъ дворамъ или вообще жилымъ мѣстамъ, слѣдовательно, такъ сказать, культурные слои, обязанные своимъ происхожденіемъ жительству человѣка, тогда какъ естественное накопленіе перегноя въ растительномъ слое, а слѣдовательно и черноземъ они называютъ «черною землею». Не смотря на высокій гипсометрическій уровень и волнообразную, холмистую поверхность, область, занятая черноземомъ, имѣетъ степной характеръ: какъ для степной полосы Россіи, такъ и здѣсь, характерно преобладаніе семействъ бобовыхъ,

губоцвѣтныхъ и присутствіе перистаго ковыля (*Stipa pennata*) восточною границею котораго въ Сибири считалась преж. р. Енисей. Новѣйшіе же изслѣдователи (Прейнъ и Смирновъ) пришли къ совершенно другимъ выводамъ. Они полагаютъ, что если нѣкоторыя изъ почвъ описываемой площади и могу быть названы черноземомъ, то лишь условно, въ смыслѣ и котораго, но далеко не полного соотвѣтствія ихъ, а имен. по количеству содержанія гумуса, съ типичными черноземами отъ которыхъ они отличаются своимъ сложеніемъ. Сложеніе это очень близко къ структурѣ лѣсныхъ суглинковъ, въ такой степени, что черныя почвы разсматриваемаго плоскогорья, мнѣнію Прейна, могутъ быть отнесены къ суглинковымъ.

Черемховское селеніе, находящееся посреди разсматриваемаго плоскогорья, расположено на плоской, слегка волнистой мѣстности, съ которой во всѣ стороны отходятъ сухія пади, часто съ оврагами-промоинами, въ которыхъ вода бывала только весною послѣ таянія снѣговъ <sup>1)</sup>. Пади эти направляются на сѣверъ и сѣверо-западъ въ падъ Нотъ, впадающую въ Ангару, на востокъ въ довольно широкую, и глубокую Черемховскую падь, когда-то, какъ утверждаютъ, богатую зарослемъ черемхи (*Prunus padus* L.), а на югъ пади Волчью Нору и Булайскую, принадлежащія уже системѣ р. Бѣлой. Волнистый характеръ этого плоского зависитъ не только отъ этихъ падей, но и отъ того, что ему проходятъ не глубокія, но широкія развѣтвленія пади по мѣстному выраженію *разложины*. На вершинахъ невысокихъ гривъ между падами и разложинами растутъ кое-гдѣ березовыя рощи, иногда съ примѣсью мелкихъ сосенъ. По берегамъ гривъ глинистаго характера, но въ разложинахъ и долинахъ становятся черными. Такія почвы отличаются однако отъ типическаго чернозема тѣмъ, что почвенная масса

---

<sup>1)</sup> Прейнъ, Матер. по изсл. нас. Иркутск. губ. Т. II, вып. 1-й стр.

своей структурѣ мельче: она не крупичатая, а отчасти мучнистая, легкая, пылящая (по мѣстному выраженію *пыхунъ*). Иногда въ низинахъ, гдѣ долго застываетъ весенняя вода, мучнистый горизонтъ имѣетъ синеватый цвѣтъ, а въ жаркіе дни на ея поверхности выступаетъ бѣлый налетъ (по мѣстному выраженію *бузунъ*). Подпочвой въ самыхъ низкихъ мѣстахъ служитъ иногда мергелевый суглинокъ, и тогда переходный къ ней горизонтъ отъ почвеннаго бываетъ очень чистаго строенія, при чемъ мучнистость эта увеличивается съ углубленіемъ; иногда же подпочва состоитъ изъ сѣрой глинистой массы, раскалывающейся на большіе угловатые куски. Масса эта такъ крѣпка, что ломъ беретъ ее съ трудомъ; она вскипаетъ съ кислотами и покрывается по бокамъ желтовато-синевато-ржавчиннымъ налетомъ. Если идти вдоль склона вверхъ ея склона, то можно замѣтить, что почвенная масса становится менѣе мощною, что синій ея оттѣнокъ постепенно исчезаетъ, а зерна почвеннаго строенія становятся крупнѣе и угловатѣе. Въ вершинахъ падей почва принимаетъ желтоватый оттѣнокъ, зерна становятся еще крупнѣе, особливо въ переходномъ отъ почвы къ подпочвѣ горизонтѣ, незамѣтно сходящемся съ подпочвою. На вершинахъ гривъ почвы еще темнѣе, хотя еще настолько черны, что послѣ дождей могли бы быть приняты за черноземъ, если бы въ разрѣзахъ, особливо тамъ, гдѣ на этихъ почвахъ растутъ березняки, даже непосредственно подъ дерномъ, не обнаруживалось ихъ типичное для суглинковъ крупно-гороховое строеніе. Болѣе 30 искусственныхъ разрѣзовъ такихъ почвъ, сдѣланныхъ въ окрестностяхъ Черемховскаго селенія, привели Прейна къ заключенію, что почвы эти переходныя отъ суглинковъ къ лаганскимъ черноземамъ, сходнымъ по нѣкоторымъ условіямъ происхожденія, но не тождественнымъ съ русскими; Прейнъ предлагаетъ назвать эти почвы *лесо-степными суглинками*. Отличіе ихъ отъ типичныхъ черноземовъ состоитъ въ меньшемъ количествѣ гумуса, болѣе величинѣ зерна, угло-

ватости его и гороховатости особенно въ переходномъ почвы къ подпочвѣ горизонтѣ, а отъ лѣсныхъ суглинковъ томъ, что сверху они не прикрываются лѣснымъ войлокомъ, а дерномъ, и имѣютъ тѣже горизонты, что и черноземъ, не замѣчается у лѣсныхъ суглинковъ. Замѣчательно, чѣмъ болѣе почвы удерживаютъ въ себѣ суглинковое строеніе тѣмъ выше цѣнятся они крестьянами, такъ-что мѣста, крытыя березнякомъ на вершинахъ гривъ, охотнѣе занимаю подъ пашни, чѣмъ мѣста совершенно степныя: подъ лѣсо говорятъ крестьяне, земля крѣпче (т. е. цѣльнѣе, новѣе). бассейнѣ Бѣлой и въ нынѣшней Голуметской волости изслѣдованія 1888 года также не обнаружили настоящаго чернозема, такъ какъ, по мнѣнію Прейна, нельзя считать за таковую черную почву низину съ мелкою структурою. окрестности Мойганскаго выселка (бывшей Бѣльской волости) не только часто наблюдалось въ почвахъ указанное въ переходное строеніе, но и удавалось нерѣдко прослѣдить близкую связь между ними и типичными лѣсными суглинками часто расположенными рядомъ съ черноземами Агапитовыхъ. Лѣсо-степные суглинки окрестностей Мойгана выражены такъ, что здѣсь въ нихъ преобладаетъ болѣе лѣсной характеръ, не степной, какъ у Черемховскаго селенія. На этихъ почвахъ можно видѣть и сосны и лиственницы, уцѣлѣвшія донесенныя а также пни и полусгнившіе стволы большихъ деревьевъ.

Вообще изслѣдованія Прейна не подтвердили многихъ положеній, высказанныхъ Агапитовымъ. Такъ Прейну никогда не случалось наблюдать, чтобы черноземъ между прочимъ залегалъ на перевалахъ и высшихъ точкахъ площади, да еще былъ бы покрытъ ковылемъ (*Stipa pennata*). Ковыль, по наблюденіямъ Прейна, встрѣчается въ Иркутской губерніи рѣдко, спорадически и всегда на сухихъ известковыхъ скалахъ возвышенностей. Высшія же точки разсматриваемыхъ плоскогорья всюду покрыты лѣсомъ, обыкновенно сосновымъ съ плотною суглинистою почвою, которая правда имѣетъ

бываетъ черна, но во всякомъ случаѣ содержитъ гумуса не болѣе 4—5%. Если же въ окрестностяхъ Заларинскаго, Тиретскаго и др. селеній почвы и на высокихъ точкахъ бываютъ черными, то это происходитъ по неоднократнымъ наблюденіямъ Прейна отъ того, что въ подпочвѣ попадаются очень мелкія плитки бурого угля. Также нельзя сказать, чтобы черноземъ Балаганскаго округа всегда залегалъ на лессѣ; очень часто черныя почвы залегаютъ на красныхъ пескахъ. Вообще, по мнѣнію Прейна, вопросъ о распространѣніи лесса въ Балаганскомъ округѣ требуетъ еще специальныхъ изслѣдованій, и еще не достовѣрно, что можно принимать за лессъ тѣ мергелистые суглинки и рѣчные отложенія, которыя имѣютъ часто слабо-выраженную структуру лесса, но не имѣютъ раковинокъ, встрѣчающихся въ болѣе типичныхъ лессовидныхъ суглинкахъ. Факты же, наблюдаемые Прейномъ относительно плодородія балаганскихъ лессовидныхъ суглинковъ приводятъ Прейна къ тому заключенію, что, чѣмъ болѣе типиченъ лессъ, на которомъ залегаетъ почва, тѣмъ менѣе она цѣнится. Въ нѣкоторыхъ, впрочемъ исключительныхъ глѣстахъ, выпаживаніе наружу лессовиднаго суглинка даже совершенно портитъ почву.

Списокъ растений, приводимыхъ Агапитовымъ какъ характеристическихъ для чернозема интересующей насъ мѣстности, заключаютъ въ себѣ двадцать семь видовъ, которые мы перечисляемъ здѣсь, имѣя въ виду не малый интересъ, представляемый этою черноземною флорою восточной Сибири: *Stipa pennata*, L., *St. sibirica*, Lam., *St. capillata*, L., *Lilium tenuifolium* Fisch., L. *Martagon* L., *Veratrum album* L., *V. nigrum*, L., *Jris ruthenica* Ait., *Phlomis tuberosa* L., *Nepeta lavandulacea* L. fil. *Agrimonia pilosa* Led., *Rosa cinnamomea* L., *Sanguisorba officinalis* L., *Anemone dichotoma* L., *An. narcissiflora*, L., *Delphinium grandiflorum* L., *Chelidonium majus* L., *Cerastium maximum* L., *Hypericum attenuatum* Choisy, *Scabiosa ochroleuca* L., *Cacalia hastata* L., *Ligularia sibi-*



*rica*, Cass. *Veronica incana* L., *Pedicularis comosa* L., *Ombrychis sativa* Lam., *Pyrus baccata* L. и *Prunus padus* L. Почти всѣ приводимыя растенія встрѣчаются, по свидѣтельству Агапитова, вмѣстѣ на покрытыхъ черноземомъ склонахъ возвышенностей и по долинамъ, образуя густой и пестрый коверъ: красотой котораго можетъ съ полнымъ правомъ гордиться Сибирь, не взирая на воспѣтую суровость ея климата; на наиболѣе жирномъ и тучномъ черноземѣ отдѣльные экземпляры превышаютъ ростъ человѣка, — къ разнообразію и густотѣ растительности присоединяется и усиленное развитіе недѣлимыхъ

Прейнъ изъ поименованныхъ растеній никогда не встрѣчалъ на Балаганскомъ черноземѣ: *Stipa sibirica*, *Cerastium maximum* и *Pedicularis comosa*. Остальныя растенія хотя встрѣчаются на черныхъ почвахъ, но и не на однихъ черныхъ, а очень часто и на другихъ, и обратно растенія, чаще встрѣчающіяся на другихъ почвахъ, попадаютъ и на черныхъ. Къ этому замѣчанію Прейна мы можемъ съ своей стороны присовокупить, что въ Европейской Россіи *Scabiosa ochroleuca* и *Veronica incana* растутъ нерѣдко и на чисто песчаныхъ почвахъ, а *Lilium Martagon* на лѣсныхъ почвахъ и даже въ густыхъ лѣсахъ. Впрочемъ вообще Прейнъ находитъ, что нѣтъ возможности приравнивать черноземную почву Иркутской губерніи къ южно-русской черноземной полосѣ. Южно-русская черноземная полоса занимаетъ большое сплошное пространство съ довольно рѣзкимъ климатическимъ отличіемъ отъ сосѣднихъ областей, между тѣмъ какъ черныя земли Иркутской губерніи залегаютъ небольшими участками среди другихъ почвъ; степи чередуются здѣсь съ лѣсами, врѣзываясь другъ въ друга; климатическія условія здѣсь разнообразны; всѣ почвы генетически связаны между собою, такъ-что здѣшній «черноземъ», по мнѣнію Прейна, и не можетъ обладать какой либо особенной, исключительно для него характерной флорой. Потому, говоритъ Прейнъ, еслибы и было строго доказано, что въ черноземной флорѣ Иркутской гу

бернии преобладаютъ тѣ же семейства какъ и въ европейско-русской черноземной полосѣ (Compositae, Papilionaceae, Labiateae), то и тогда заключеніе о тождествѣ и одновременности образованія того и другаго чернозема не имѣло бы еще достаточнаго основанія, такъ какъ названныя семейства явятся по числу видовъ повсюду преобладающими въ Восточной Сибири. Прейнъ полагаетъ, на основаніи многихъ данныхъ, что въ Иркутской губерніи степная флора моложе лѣсной и при благопріятныхъ для нея условіяхъ степная флора вытѣсняетъ лѣсную, чему помогаетъ и человѣкъ, вырубка лѣса и способствуя этимъ увеличенію засухъ. Этотъ фактъ, а именно бѣлая юность степной флоры сравнительно съ лѣсной, а также нахожденіе въ нѣкоторыхъ мѣстахъ разнотравнаго пространства лѣсо-степныхъ суглинковъ заставляютъ думать, что многіе его степные участки были прежде покрыты лѣсомъ.

Но если нельзя не согласиться съ Прейномъ въ томъ, что Иркутская «черноземная» полоса находится въ условіяхъ, совершенно различныхъ съ южнорусскою степною черноземною полосою, то, по нашему мнѣнію, нельзя найти такихъ резкихъ различій въ условіяхъ, въ которыхъ находится нынѣ Иркутская полоса «черныхъ земель» съ тѣмъ, въ которыхъ находилась въ сравнительно неотдаленныя историческія времена нестепная черноземная полоса Россіи. Такъ напримѣръ въ XIV вѣкѣ, во времена знаменитой Куликовской битвы, важные черноземные уѣзды Тульской и Рязанской, восточные Орловской и средніе Тамбовской были покрыты не менѣе тѣмъ нынѣ Иркутская губ. обширными пространствами лѣсовъ между которыми находились и обширные безлѣсные оазисы, вознишіе у мѣстныхъ жителей этой, въ то время русской, окраины Московскаго государства названіе «полей», несмотря на то, что пространства эти были мѣстами очень влажны и даже болотисты. Таково было знаменитое и обширное Куликово поле, которое, будучи со всѣхъ сторонъ окружено лѣ-

сами, могло служить для имѣвшаго міровое значеніе Кудковской битвы только потому, что представляло единственную тогда обширную, свободную отъ лѣсовъ площадь въ южной черноземной части Тульской губерніи. Таково было и въ южной черноземной части Рязанской губерніи еще болѣе обширное Рязское (Ряжское) поле, границы распространенія котораго и среди лѣсовъ въ XVI вѣкѣ можно даже и нынѣ опредѣлить съ достаточною точностью. Вотъ эти-то нынѣ признаваемые за вполне черноземныя пространства врѣзывались весьма разнообразно, какъ и въ Иркутской губерніи, въ лѣсныя площади, которыя въ свою очередь представляли не мало черноземныхъ полей меньшихъ размѣровъ. Если же принять въ соображеніе, что въ приведенныхъ мѣстностяхъ Рязанской и Тульской губерній подъ нынѣ уцѣлѣвшими площадями лѣсовъ въ переходномъ отъ почвы къ подпочвѣ горизонтѣ замѣчается тоже строеніе, какое заставило Прейна назвать такъ почвы «лѣсо-степными суглинками», то аналогіи между «чужими землями» Иркутской губерніи и черноземами Европейско-русской нестепной полосы представляются болѣе значительными, чѣмъ они кажутся Прейну. Во всякомъ случаѣ интересный вопросъ изученія восточно-сибирскихъ черныхъ земель по сравненію съ образовавшимися въ иныхъ условіяхъ южно-русскими степными черноземами и по сравненію съ чужими землями нестепной черноземной среднерусской полосы представляется далеко неисчерпаннымъ и требуетъ еще мало внимательныхъ сравнительныхъ изслѣдованій и почвенныхъ анализовъ.

Вотъ почему мы считаемъ весьма важнымъ представить опытъ классификаціи почвъ разсматриваемаго пространства на которомъ развиты Иркутскія черныя земли, предложенный Прейномъ и опирающійся на достаточно количество изведенныхъ въ Иркутскѣ почвенныхъ анализовъ.

Къ *сухопутно-растительнымъ* почвамъ разсматриваемаго пространства Прейнъ относитъ <sup>1)</sup>).

<sup>1)</sup> Прейнъ, Матер. I. с. Т. II, вып. 1-й стр. 77—79 и 80.

# *А. Черныя земли.*

1) *Буковина* — почва чернаго цвѣта, залегающая въ па-  
изь, на днѣ ихъ и по нижнимъ третямъ склоновъ и не  
образующая сплошныхъ участковъ. Цвѣтъ этой почвы черный  
безъ красноватаго оттѣнка, который замѣчается только у  
легко высушенныхъ почвъ, да и то слабо. Структура чисто-  
жристая, разсыпчатая; мощность почвеннаго горизонта отъ  
1 до 2 ф. Въ сухое время почва эта сильно выдувается  
вѣтромъ, поднимаясь цѣлыми тучами и подсыхается обыкно-  
венно лессомъ или лессовиднымъ суглинкомъ.

Вотъ и анализъ этой почвы, сдѣланный И. Сѣлицкимъ,  
по образцу, взятому около с. Каменки, на нижней части  
пологатаго склона одной пади.

Въ 100 част. содержится гигроскопической воды, выдѣ-  
ляющейся при 105° Ц. — 5,637.

Въ 100 част. высушенной Изъ 100 част. высуш. при  
при 105° Ц. почвы содержится: 105° Ц. холодная соляная

1. Химически свя-	кислота извлекаеть:
занный воды, цео-	Кремнезема (SiO <sup>2</sup> ). . . 0,013
литовъ и азота . . . 3,71	Сѣрной кислоты (SO <sup>2</sup> ) 0,132
2. Гумуса . . . 15,28	Фосфорной (P <sup>2</sup> O <sup>5</sup> ) . . . 0,102
3. Минер. веществъ	Кали (K <sup>2</sup> O) . . . . 0,094
разлагаемыхъ го-	Натра (Na <sup>2</sup> O) . . . . 0,026
ряч. соляной ки-	Глинозема (Al <sup>2</sup> O <sup>3</sup> ) . . . 2,028
слогой. . . . 22,67	Желѣзной окиси (Fe <sup>2</sup> O <sup>3</sup> ) 2,670
4. Глины. . . . 10,54	Марганцов. ок. (Mn <sup>2</sup> O <sup>4</sup> ) 0,136
5. Песку кварцеваго	
и полево-шпато-	Извести (CaO) . . . . 1,416
ваго . . . . 47,80	Магnezіи (MgO) . . . 0,984

2) *Черноземъ-суглинокъ* (лѣсо-степной суглинокъ). Почва  
эта уже была охарактеризована выше, причемъ и выяснено ея  
различіе отъ настоящаго чернозема. Вотъ и анализъ этой  
почвы, сдѣланный И. Сѣлицкимъ по образцу, взятому близъ

дер. Коротавой съ дѣлины на верхней половины разло-  
жины.

Въ 100 част. содержится гигроскопической воды, выдѣ-  
ляющейся при  $105^{\circ}$  Ц. — 3,410.

Въ 100 част. высушенной Изъ 100 част. высушен. пр  
при  $105^{\circ}$  Ц. почвы содержится:  $105^{\circ}$  Ц. холодная соляна  
кислота извлекаетъ:

1. Химически связ.	Кремнезема ( $\text{SiO}^2$ ) . .	0,02
воды, цеолитовъ	Сѣрной кислоты ( $\text{SO}^3$ )	0,07
и азота . . .	Фосфорной ( $\text{P}^2\text{O}^5$ ) . .	0,11
3,39	Кали ( $\text{K}^2\text{O}$ ) . . .	0,10
2. Гумуса. . . .	Натра ( $\text{Na}^2\text{O}$ ) . . .	0,02
6,61	Глинозема ( $\text{Al}^2\text{O}^3$ ) . .	2,54
3. Минер. вещ. раз-	Желѣзной окиси ( $\text{Fe}^2\text{O}^3$ )	3,64
лагаемыхъ горяч.	Марганцов. ок. ( $\text{Mn}^3\text{O}^4$ )	0,16
солян. кислотой .	Извести ( $\text{CaO}$ ) . . .	1,03
24,07	Магнезии ( $\text{MgO}$ ) . .	0,79
4. Глины. . . .		
5,87		
5. Песку . . . .		
60,06		

3) *Черныя степныя почвы* — *пыхунъ* (черная легкая, пес-  
чанистая масса мелкой структуры). Она встрѣчается въ сте-  
пяхъ Заларинской, Аларской, въ падахъ Табунъ, Нотъ  
Волчья нора и т. д. Для культуры не особенно хороша  
скоро выпаживается; въ засушливый годъ хлѣбъ на ней легко  
выгораетъ, въ сырой получается одна солома, зерно у хлѣба  
мелкое. Въ Аларской степи пыхунъ близко подходит къ  
солончакамъ, врѣзываясь въ нихъ. Вотъ два анализа этой  
почвы, сдѣланныя  $\Theta$ . Молодыхъ и Т. Юринскимъ по двумъ  
образцамъ, изъ коихъ первый взятъ близъ с. Кутумени  
изъ глубокой пади Асай, а второй со степи вблизи д. Бар-  
хатовой.

Въ 100 част. содержится гигроскопической воды, выдѣ-  
ляющейся при  $105^{\circ}$  Ц. въ 1-мъ образцѣ 4,616, а во 2-мъ  
4,866.

Въ 100 частяхъ высуш. при 105° Ц. почвы содержится:

	въ 1 обр.	во 2-мъ.
1. Химич. связ. воды, цеолитовъ и азота .	5,26	4,06
2. Гумуса . . . . .	17,98	11,24
3. Минер. вещ. разлагаемыхъ горячею HCl.	21,40	39,36
4. Глины . . . . .	12,28	6,49
5. Песку. . . . .	43,08	38,85

Изъ 100 ч. высуш. при 105° Ц. холодная соляная кислота  
извлекаетъ:

	въ 1 обр.	во 2-мъ.
Кремнезема (SiO <sup>2</sup> ) . . . . .	0,012	0,049
Сѣрной кислоты (SO <sup>3</sup> ) . . . . .	0,132	0,080
Фосфорной (P <sup>2</sup> O <sup>5</sup> ). . . . .	0,110	0,080
Кали (K <sup>2</sup> O). . . . .	0,100	0,208
Натра (Na <sup>2</sup> O) . . . . .	0,050	0,017
Глинозема (Al <sup>2</sup> O <sup>3</sup> ). . . . .	1,662	2,480
Окиси желѣза (Fe <sup>2</sup> O <sup>3</sup> ) . . . . .	2,857	3,420
Окиси марганца (Mn <sup>3</sup> O <sup>4</sup> ) . . . . .	0,110	0,180
Извести (CaO). . . . .	1,245	1,176
Магнезии (MgO) . . . . .	0,962	0,895

4) Черная почва степныхъ низинъ, бывшихъ долгое время  
водою — бузунъ, трунда. Эта почва, особенно распростра-  
ненная около с. Черемховскаго, выселка Мойганскаго и дер.  
Баратаевской, была охарактеризована выше. Вотъ и анализъ  
ея, сдѣланный И. Сълицкимъ по образцу ея, взятому со дна  
пади близъ с. Черемховскаго.

Въ 100 част. содержится гигроскопической воды, выдѣ-  
ляющейся при 100° Ц. — 5,578.

Въ 100 ч. высуш. при 105° Ц. Изъ 100 ч. высуш. при 105° Ц.  
почвы содержится. холодная соляная кислота из-  
влекаетъ:

1. Химич. связ. воды,	Кремнезема . . .	0,016
цеолитовъ и азота. 2,67	Сѣрной кислоты . .	0,192

2. Гумуса . . . . .	15,71	Фосфорной . . . . .	0,094
		Кали . . . . .	0,128
3. Минер. вещ. разла- гаемыхъ горячею НСІ . . . . .	23,64	Натра . . . . .	0,015
		Глинозема . . . . .	2,903
4. Глины . . . . .	5,73	Окиси желѣза. . . . .	3,291
		» марганца . . . . .	0,105
5. Песку . . . . .	52,25	Извести . . . . .	1,171
		Магнезиі . . . . .	1,007

Б. *Лѣсные суглинки* разныхъ цвѣтовъ, начиная отъ сѣраго розоватаго, красно-бураго и кончая очень чернымъ, если какъ напр. близъ Тырети, Залари и Аларской степной думы въ подстилающей эту почву глины встрѣчаются осколки бураго угля. Почвы эти генетически связаны съ лѣсо-степными суглинками, представляющими, по мнѣнію Прейна, только измѣненіе лѣсныхъ суглинковъ степною растительностью (?) Разсматриваемыя почвы имѣютъ типичную структуру суглинковъ, а цвѣтъ ихъ зависитъ главнымъ образомъ отъ условій рельефа и отъ характера подпочвы. Безконечное разнообразіе рельефныхъ условій, выражающихся въ большей или меньшей величинѣ угла склона ихъ покатости, вызывая возможность сноса легко смываемыхъ веществъ, такъ велико, что часто нѣсколько рядомъ лежащихъ пашенъ при одинаковой суглиняковой породѣ почвы различаются цвѣтомъ. Даже и растительность, покрывающая суглинки, оказываетъ вліяніе на ихъ цвѣтъ: тамъ, гдѣ на суглинкѣ растетъ березнякъ и осина, иногда съ примѣсью лиственницы, почва чернѣе чѣмъ тамъ, гдѣ на суглинкѣ растетъ соснякъ. Вотъ анализъ суглиняковой почвы, сдѣланный Ѳ. Лаврентьевымъ на образцѣ, взятому близъ с. Голумети съ вершины низкаго увала, покрытаго березнякомъ и сосною.

Въ 100 част. содержится гигроскопической воды, выходящейся при 105° Ц. — 4,248.

Въ 100 ч. высуш. при 105° Ц. почва содержится:		Изъ 100 ч. высуш. при 105° Ц. холодная соляная кислота извлекается:	
1. Химич. связ. воды,		Кремнезема . . .	0,044
цеолитовъ и азота. 3,74		Сѣрной кислоты . .	0,073
2. Гумуса . . . . .	9,92	Фосфорной. . . . .	0,096
		Кали . . . . .	0,111
3. Минер. вещ. разла-		Натра . . . . .	слѣды.
гаемыхъ горяч. НСІ. 26,10		Глинозема . . . . .	1,673
4. Глины . . . . .	5,82	Окиси желѣза. . . .	3,399
		» марганца . . . .	0,093
5. Песку . . . . .	54,42	Извести . . . . .	0,641
		Магнезиі . . . . .	0,423

В. *Супеси и супеси-суплики*. Хотя типичныхъ борovýchъ песковъ на разсматриваемомъ пространствѣ и не встрѣчается, Прейль признаетъ здѣшнія песчанистыя почвы сухопутно растительными, основываясь на слѣдующихъ соображеніяхъ: на самыхъ высшихъ точкахъ разсматриваемаго пространства залегаютъ пески иногда въ качествѣ продукта вывѣтриванія песчаниковъ, а чаще какъ самостоятельный наносъ, при чемъ пески эти бывають желтаго цвѣта, крупно-зернисты, тяжелы и являются то рыхлыми и разсыпчатыми, то соединенными въ плотные комья или массы желѣзистымъ цементомъ. Непосредственно надъ почвой они являются только на самыхъ возвышенныхъ пунктахъ описываемаго пространства, болѣею же частью покрыты сверху глинисто-желтовато-сѣрымъ наносомъ отъ  $\frac{1}{2}$  до 1 ф. толщины. Глины эти являются иногда въ смѣси съ пескомъ и такимъ образомъ представляютъ песчано-глинистую массу. Понятно, что почвы, возникшія на пескѣ, имѣють чисто песчаный характеръ, а возникшія на глинисто-песчаной подпочвѣ имѣють характеръ супесей-суглилковъ. Чисто песчаная подпочва считается непригодными для культуры, благодаря не только малой своей про-



изводительности, но и малодоступности мѣстностей, въ которыхъ онѣ встрѣчаются. Супеси-суглинки, обнаруживая обыкновенно типичную свою структуру, различаются между собой цвѣтомъ, зависящимъ отъ условій рельефа и отъ покрывающей почвы растительности.

Г. *Почвы сухопутно болотныя и типично болотныя*, здѣсь встрѣчающіяся, для культуры непригодны. Нѣкоторое приближеніе къ нимъ обнаруживаетъ и *буковина*, когда она залегаетъ въ низинахъ пади, гдѣ и болотная растительность принимаетъ нѣкоторое участіе въ образованіи почвы, а еще ближе къ болотнымъ почвамъ *бузунъ*, о которомъ было упомянуто выше..

Д. Къ почвамъ *перемытымъ* Прейнъ полагаетъ возможнымъ отнести тѣ супеси и суглинки, которые залегаютъ въ мѣстахъ, гдѣ процессы вымыванія могутъ имѣть мѣсто вслѣдствіе условій орографическихъ; иногда отъ такого вымыванія почва дѣлается въ такой степени хрищеватою и каменистою, что для культуры совсѣмъ непригодна.

Е. *Наземно-наносныя почвы* въ рассматриваемомъ пространствѣ встрѣчаются рѣдко, и потому практическаго значенія не имѣютъ.

Ж. Наконецъ *солонцеватыя* почвы, столь распространенныя въ Аларской степи, встрѣчаются и въ разныхъ частяхъ рассматриваемаго пространства. Онѣ занимаютъ или самыя низкія мѣста рѣчныхъ долинъ, или залегаютъ ниже лесовыхъ толщъ, образующихъ мѣстами террасовидные рельефы. Агапитовъ описываетъ такіе солонцы въ долинѣ р. Унги со своей своеобразною флорою, состоящею изъ такихъ растений какъ напримѣръ *Salicornia herbacea* L., *S. prostrata*, *Ranunculus cymbalariae* Pursh., *R. plantaginifolius* Murr., *Barkhausia nana* DC., *Corispermum hyssopifolium* A. Juss., *C. intermedium* Rech., *Halimocnemis crassifolia* C. A. Mey., *Aster trifolius* L., *Calimeris tatarica* Lindl., *Artemisia maritima* L., *Triglochin maritimum* L., *T. palustre* L. Солонцы, даже

наименѣ типичныя, на разсматриваемомъ пространствѣ въ культуру не употребляются, но солончаковыя «степи» во многихъ мѣстахъ, какъ напримѣръ въ широкой долинѣ р. Унги, заняты лѣтними улусами бурятъ, считающихъ солонцы очень полезными для скота, который ѣстъ даже соленую землю. Въ случаѣ падежа скота, буряты угоняютъ его въ лѣса и везутъ туда мѣшками соленую землю для образования искусственныхъ солонцовъ.

Новѣйшими изслѣдователями растительности описываемаго обитаемаго подгорья (между Саянскими предгорьями и Ангарою) являются Агапитовъ <sup>1)</sup> и Прейнъ <sup>2)</sup>. Независимо отъ того въ 1888 г. иностранецъ Фердинандъ Каро собиравъ на этомъ подгорьѣ растенія, описанныя Фрейномъ <sup>3)</sup>, и трудъ этихъ лицъ служить превосходнымъ дополненіемъ классической Байкало-Даурской флоры Турчанинова. Мы припомнимъ здѣсь при разсмотрѣніи флоры описываемаго пространства установленныхъ и охарактеризованныхъ Прейномъ растительныхъ формаций, а именно:

1. *Формация сосновыхъ боровъ*. Главное дерево бора сосна, достигающая здѣсь, по показанію Агапитова, весьма часто вершина и болѣе въ діаметрѣ. Сосновыя насажденія встрѣчаются, по Прейну, на болѣе высокихъ точкахъ разсматриваемаго пространства, на вершинахъ водораздѣльныхъ уваловъ, въ гривахъ между падами, на вершинахъ падей и отпадково. Въ такихъ мѣстахъ залегаютъ болѣею частію почвы глинистаго характера, но иногда и песчанистаго, когда обнажаются прикрытые тонкимъ глинистымъ слоемъ пески съ облом-

<sup>1)</sup> Агапитовъ, Изв. Вост. Сиб. Отд. 1878 г. Т. IX. № 3 и 4.

<sup>2)</sup> Прейнъ, Матер. для флоры Балаганск. окр. Иркутск. г. въ Изв. В. Сиб. Отд. Т. XXI, № 4, стр. 1—19; его же предвар. отч. о ботанич. изслѣд. Балаганск. окр. тамъ же Т. XXIII, № 2, стр. 23—39.

<sup>3)</sup> J. Freyn, *Plantae Karoanae. Aufzählung der von Ferd. Karo im Jahre 1888 im Baikalischen Sibirien so wie in Dahurien gesammelten Pflanzen.* Oester. Bot. Zeit. Bd. XXXIX. 1889.

ками песчаника или известняка. Но не на однихъ такихъ почвахъ растетъ сосна. Ее можно встрѣтить и на другихъ почвахъ, не исключая и болотистой, но въ такихъ случаяхъ къ ней примѣшиваются и другія древесныя породы, а именно лиственница, по показанію Агапитова довольно рѣдкая, а по Прейну встрѣчающаяся иногда въ большомъ количествѣ, а также ель и пихта, растущія преимущественно въ падяхъ съ ручьями (Агапитовъ), но всегда небольшими участками—кочками по выраженію Прейна; кедръ, котораго Агапитовъ не встрѣчалъ здѣсь вовсе, является, какъ можнo заключить изъ показаній Прейна, въ «таежныхъ мѣстахъ» расположенныхъ уже на предгорьяхъ Саяна, въ бассейнахъ Оки и Бѣлой. Изъ лиственныхъ породъ въ сосновыхъ борахъ береза, а въ таежныхъ мѣстахъ и ольха (Прейнъ). Площадки, заросшія березнякомъ—*елани* по мѣстному выраженію—попадаютъ среди сосновыхъ и лиственничныхъ лѣсовъ расположенныхъ по отлогостямъ уваловъ. Очень часто эти мѣста образуются изъ подъ вырубленнаго лѣса, травянистая флора которыхъ состоитъ изъ смѣшенія лѣсныхъ и лугово-степныхъ формъ. Характеръ кустарной и травянистой растительности сосноваго бора, кажущійся съ перваго взгляда однообразнымъ представляетъ все-таки нѣкоторое разнообразіе, зависящее столько отъ самаго состава растительныхъ породъ, сколько отъ ихъ взаимной группировки и преобладанія тѣхъ или другихъ видовъ, что въ свою очередь обусловливается большею или меньшею сыростью почвы, а также большею или меньшею густотой древесныхъ насажденій, отъ которой зависитъ та или другая степень освѣщенія. Вообще же здѣшніе сосновые боры представляютъ большой просторъ для развитія свѣтолюбивыхъ формъ, такъ какъ особенной густоты въ древесныхъ насажденіяхъ этихъ боровъ не замѣчается. Вслѣдствіе того и спорофиты въ этихъ борахъ имѣютъ слабое развитіе: мхи и лишайники не только покрываютъ почвы сплошнымъ ковромъ, но ихъ съ перваго взгляда совсѣмъ незамѣтно и только на пняхъ и валежнѣ.

ах и у корней деревьевъ, т. е. въ мѣстахъ наиболѣе за-  
тѣненныхъ попадаются чаще. Изъ кустарниковъ, растущихъ  
и борахъ, Прейнъ приводитъ европейско-русскіе виды: *Rosa*  
*chamomea* L., *Spiraea hypericifolia* L., *Vaccinium Myrtillus*  
L., *V. vitis idaea* L., а изъ кустарниковъ Саянскаго нагорья  
и подгорья *Rhododendron dahuricum* L., служащій въ здѣш-  
нихъ борахъ какъ бы замѣстителемъ столь распространеннаго  
въ европейско-русскихъ борахъ обыкновеннаго вереска (*Cal-  
my vulgaris* Salisb.), здѣсь уже не встрѣчающагося и не про-  
израстающаго въ Сибирь далѣе восточнаго склона Урала. Въ  
ельникахъ Агапитовъ указываетъ еще на присутствіе слѣдую-  
щихъ европейско русскихъ кустарниковъ: *Juniperus communis*  
L., *Ribes rubrum* L. и *R. nigrum* L. и сибирскихъ формъ  
*Junus alba* L. и *Atragene alpina* L. Что же касается до тра-  
вянистой растительности боровъ, то къ характернымъ расте-  
ніямъ здѣшней боровой формаціи Прейнъ причисляетъ евро-  
пеекіе виды: *Anemone narcissiflora* L., *Adonis appenina* L.,  
*Myagala comosa* Schr., *Dianthus superbus* L., *Trifolium lu-  
minaster* L., *Lathyrus pratensis* L., *Fragaria vesca* L., *Fr.  
Molina* Ehr., *Rubus saxatilis* L., *Antennaria dioica* Gaert.,  
*Geranium umbellatum* L., *Campanula glomerata* L., *Pyrola  
rotundifolia* L., *Polygonatum officinale* All., *Majanthemum  
folium* DC., *Carex sylvatica* Huds., изъ урало-сибирскихъ  
формъ *Aconitum barbatum* Patr. и *Pedicularis resupinata* L.,  
и чисто сибирскихъ *Aquilegia sibirica* Lam., *Viola uniflora* L.,  
*Chama alpina* Wulf., *Orobis lathyroides* L., *Chrysanthemum  
bircicum* Turcz. Эти растенія, вмѣстѣ съ хвощами и папорт-  
никами составляютъ травянистый коверъ сосновыхъ боровъ,  
которымъ по опушкамъ и на открытыхъ полянахъ при-  
соединяются также нѣкоторые представители лугово-степной  
растительности. По наблюденіямъ Прейна ельники не пред-  
ставляютъ никакихъ особенностей въ своей травянистой ра-  
стительности, заимствуя эту растительность изъ сосновыхъ  
и другихъ лѣсовъ и вообще изъ сосѣднихъ мѣстностей.

Впрочемъ Агапитовъ указываетъ на нѣкоторыя травы, свойственныя ельникамъ, какъ напримѣръ европейскія *Pyrola minor* L., *Moneses grandiflora* Salisb., *Polypodium Dryopteris* L. и сибирскія: *Trigonella platycarpus* L. и *Majanthemum trifolium* DC.

2. *Лугово-степная формація.* Участки, покрытые лугово-степными формами, встрѣчаются во многихъ мѣстахъ разсматриваемаго пространства, и даже среди сосновыхъ боровъ есть открытыя площади, занятыя лугово-степными формами. Наибольшее развитіе лугово-степныхъ растеній представляетъ вышеописанное плоскогорье, въ центрѣ котораго расположено с. Черемховское. Это плоскогорье образуетъ обширный луговой оазисъ, по древнему выраженію русскихъ лѣтописей — *полю* т. е. огромную поляну посреди лѣсистаго пространства, въ которомъ преобладаютъ сосны и отчасти лиственницы, но съ которыми Черемховское «поле» рѣзкихъ границъ не имѣетъ. Въ наиболѣе развитомъ видѣ лугово-степная формація можетъ быть наблюдаема въ окрестностяхъ села Черемховскаго на степи по дорогѣ отъ этого селенія къ с. Бархатовскому между селеніями Черемховскимъ и Бастоновскимъ. Вотъ растительныя формы, по показанію Прейна, характеризующія здѣсь лугово-степную формацію. Изъ растеній, встрѣчающихся и въ Европѣ: *Anemone narcissiflora* L., *Thalictrum* sp., *Dianthus Seguieri* Vill., *Geranium pratense* L., *Onobrychis sativa* L., *Vicia cracca* L., *Lathyrus pratensis* L., *Medicago falcata* L., *Sanguisorba officinalis* L., *Agrimonia pilosa* Led., *Rosa cinnamomea* L., *Bupleurum falcatum* L., *Gallium verum* L., *G. boreale* L., *Scabiosa ochroleuca* L., *Aster tataricus* L., *Inula salicina* L., *Tanacetum vulgare* L., *Achillea millefolium* L., *Achyrophorus maculatus* L., *Tragopogon pratense* L., *Cacalia hastata* L., *Campanula glomerata* L., *Adenophora liliifolia* Led., *Linaria vulgaris* L., *Veronica incana*, *V. latifolia* L., *Phlomis tuberosa* L., *Origanum vulgare* L., *Dracocephalum Ruyschiana* L., *Lilium Martagon* L., *Veratrum album* L.,

nigrum L., *Hemerocallis flava* L., *Stipa capillata* L., *Poa pratensis* L., *Bromus inermis* L., *Triticum repens* L.; изъ растений исключительно сибирскихъ: *Delphinium grandiflorum* L., *Aconitum barbatum* Patn., *Hypericum attenuatum* Chois., *Potentilla viscosa* Don., *Bupleurum multinerve* DC., *Poecaedenum baicalense* Koch., *Saussurea discolor* DC., *Nepeta lavendulacea* L., *Lilium tenuifolium* Fisch., *Elymus sibiricus* L. По безлѣснымъ склонамъ уваловъ, особенно южнымъ, эта флора встрѣчается въ смѣси съ чисто степными формами (см. ниже). Отличительныя черты Черемховскаго «поля» состоятъ, по показанію Прейна, въ слѣдующемъ: а) сравнительно довольно темной краскѣ почвъ, являющихся по своей структурѣ средними между черноземомъ и лѣсными суглинками, причемъ на окраинахъ «поля» встрѣчаются почти исключительно суглинки; б) въ обилии открытых, безлѣсныхъ мѣстъ наряду съ березовыми рощами и перелѣсками, въ которыхъ иногда попадаются (при полномъ отсутствіи ели) мелкія сосны и толстыя пни березъ, иногда у корней деревьевъ остаются лѣсныя формы: *Pyrola rotundifolia* L., *Vaccinium vitis idaea* L., *Trientalis europaea* L., *Antennaria dioica* R., наряду съ преобладающимъ здѣсь лугово-степными формами; в) въ смѣшанномъ характерѣ флоры, состоящей изъ лѣсныхъ и лугово-степныхъ формъ; по мѣрѣ приближенія къ окраинамъ поля, на которыхъ уже начинаютъ попадаться чисто тасжныя формы, какъ напримѣръ *Antennaria septentrionale* Bess., *Halenia sibirica* Borkh., *Delphinium elatum* L., *Crepis sibirica* L. и т. п.; г) въ значительной мѣрѣ, съ которою разрастается здѣсь березнякъ, особенно въ мѣстахъ порубокъ, пожарищъ, брошенныхъ пашняхъ и поляхъ; д) наконецъ, въ нахожденіи по сухимъ безлѣснымъ склонамъ чисто степныхъ растений, даже ковыля (*Stipa pennata* L.). Принимая во вниманіе все это, а также и то, что, еслибы по этому пространству Черемховской поляны когда нибудь была распространена тайга, то почвы ея должны были бы явственнѣе сохранять лѣсной характеръ, Прейнъ полагаетъ, что централь-

ныя части этой равнины не могли быть покрыты хвойны лѣсомъ, а если имѣли лѣсную растительность, то только берзовую, при чемъ по окраинамъ нынѣшней поляны березовы лѣса врѣзывались въ прилегающую тайгу, остатки котор можно видѣть не только въ уже указанныхъ выше пунктахъ но и вблизи рѣкъ Бѣлой и Ангары (с. Бархозовское). Съ стороны мы можемъ указать на то, что въ Европейской Россіи черноземныя нынѣ пространства, представлявшія въ XIV вѣкѣ на подобіе Куликова и Рясскаго полей, обширныя поля: посреди еще болѣе обширныхъ площадей нынѣшней среднорусской черноземной нестепной полосы, заросшей сплошны лѣсами и притомъ преимущественно лиственными (березовы и дубовымы) съ небольшою примѣсью сосны, нынѣ совершенно здѣсь исчезнувшей, были всегда совершенно лишены лѣсной растительности единственно вслѣдствіе такой ихъ сырости которая не позволяла расти на нихъ лѣсамъ и на котор указываютъ ихъ древне-историческія названія — Куликово по Рясское поле («раса» въ мѣстномъ рязанскомъ нарѣчій значить трясиное болото).

3. *Степная формація* сухихъ, безлѣсныхъ склоновъ, горъ и уваловъ развита по рѣкамъ Унгѣ, Алару и Ангарѣ отъ с. Евневскаго до дер. Шиверской и состоитъ изъ очень многихъ лугово-степныхъ растительныхъ формъ съ примѣсомъ растений каменистыхъ склоновъ, между прочимъ выходомъ известняка, песчаника и отчасти гипса, а также изъ немногихъ, свойственныхъ исключительно этой формаціи растений. Вотъ, по Прейну, перечисленіе растений, чаще встрѣчающихся въ этой формаціи. а) Встрѣчающіяся и въ Европѣ: *Thalictrum foetidum* L., *Papaver alpinum* L., *Polygala sibirica* L., *Erysimum* sp., *Arabis* sp., *Dianthus Seguieri* Vill., *Gypsophila Gmelini* Bge., *Linum perenne* L., *Cotoneaster vulgaris* Lin. виды *Spiraea*, *Potentilla bifurca* L., *P. cinerea* Chois., *Bupleurum falcatum* L., *Galium verum* L., *Aster alpinus* L., *Galatella* sp., *Calimeris* sp., *Erythrichium* sp., *Convolvulus arvensis*

*v. sagittatus* Led., *Veronica incana* L., *Thymus serpyllum* L., *Phlomis tuberosa* L., *Dracocephalum nutans* L., *Thesium* sp., *Euphorbia Esula* L., *Allium* sp., *Iris flavissima* Bess., *Veratrum album* L., *Avena flavescens* L.; в) исключительно сибирскія формы: *Delphinium grandiflorum* L., *Silene graminifolia* Oth., *S. repens* Patr., *Lychnis sibirica* L., *Hypericum attenuatum* Choisy, *Astragalus fruticosus* Pall. и нѣкоторые другіе виды *Astragalus* *Oxytropis*, *Chamaerodos erecta* Bge., *Artemisia frigida* W., *Saussurea salicifolia* DC., *Phlox sibirica*, *Nepeta lavandulacea* L., *Statice speciosa* L., *Lilium tenuifolium* Fisch.—Растенія эти встрѣчаются не только по степнымъ, безлѣснымъ склонамъ горъ, но и на днѣ долинъ многихъ рѣчекъ (Унги, Залари, Алара). Только здѣсь степная флора уже теряетъ свойственный ей характеръ, переходя въ однихъ мѣстахъ въ солончаки, въ другихъ въ растительные сырые кочковатые луга или заросли черемухи. Особенно интересно по развитой степной растительности на лѣвой сторонѣ Ангары представляется Унгинская степь, простирающаяся между городомъ Балаганскомъ и станціею Тыретскою. Красный цвѣтъ глинистой почвы горныхъ склоновъ и уваловъ и не густой ростъ растений придаютъ имъ съ перваго взгляда весьма обнаженный видъ, но при ближайшемъ осмотрѣ склоны эти обнаруживаютъ богатую степную флору, состоящую изъ вышепоименованныхъ степей, къ которымъ еще примѣшиваются и такія, которыя или находимы Турчаниновымъ только въ Забайкальѣ. Типичные солончаки съ своею своеобразною флорою, березовыя и сосновые боры на вершинахъ возвышенностей еще болѣе разнообразятъ здѣшнюю флору. Степная долина р. Унги съ солончаками имѣютъ большое сходство съ степями Забайкалья и сосѣдней Монголіи, а верблюды, которыхъ въ небольшомъ количествѣ держатъ здѣсь буряты, и монгольская рѣчь не болѣе содѣйствуютъ указанному сходству. Только въ такихъ мѣстностяхъ растетъ ревень (*Rheum undulatum* L.), *Asparagus dahuricus* Fisch., *Glycyrrhiza uralensis* Fisch., *Astra-*



*galus melilotoides* Pall., *Hedysarum setigerum* Turcz., *Corvolvulus Ammani* Desr.

4. *Формация каменистых склонов* состоит из степных форм с примѣсю еще и таких растений, которыя свойственны только рассматриваемой формации, за главнѣйшихъ представителей которой Преинъ считаетъ: *Thalictrum minus* L., *Delphinium grandiflorum* L., *Alyssum Fischerianum* DC., *Gypsophila Gmelini* Bunge., *Lychnis sibirica* L., *Sedum purpureum* Link., *S. Aisoon* L., *Umbilicus speciosus* DC., *Aster alpinus* L., *Vincetoxicum sibiricum* DC., *Thymus serpyllum* L., *Drosera rotundifolia* L., *Elsholtzia cristata* W., *Thesium refractum* C. A. Mey; *Pteris argentea* Gm., *Woodsia glabella* R. В. Кроме этихъ травянистыхъ формъ сюда принадлежать еще и нѣкоторые кустарники какъ напримѣръ: *Spiraea hypericifolia* L., *Cotoneaster vulgaris* Lindl., v. *nigra*, *Rosa cinamomea* L., *Caragana arborescens* Desf., *Crataegus sanguinea* L.

Мѣстами попадаются и яблони (*Pyrus baccata*), дѣлая рѣдкость которыхъ встрѣчена Агапатовымъ на возвышенности въ нѣсколькихъ верстахъ отъ села Иретьскаго, при устьѣ Ирети въ Бѣлую; яблоня росла здѣсь на границѣ отчасти солончаковой степи, на опушкѣ лѣса въ сообществѣ съ березою и арешникомъ и достигала отъ 1 до 1½ сажени высоты; кромѣ того здѣсь подмѣшивалась уже и береза. По свидѣтельству мѣстныхъ жителей, яблоня встрѣчается въ изобиліи по Бѣлой, и плоды ея составляютъ даже предметъ запасовъ на зиму. Различныя обстоятельства, какъ-то крутизна склона, положеніе относительно странъ горизонта, физическія и химическія свойства породъ обнаженныхъ на склонахъ, способность этихъ породъ къ выветриванію оказываютъ большое вліяніе на разнообразіе растительности каменистыхъ склоновъ.

5. *Солончаковая формация* является только развитою на лѣвой сторонѣ Ангары въ низинахъ долинъ Унги и Алар. Солончаки являются здѣсь повидимому всегда въ строгой зависимости отъ лессовидно-суглинистыхъ отложеній, занимающихъ

самыя низкія мѣста долинъ и залегая или ниже лессовой  
пласти, или непосредственно на лессѣ. Въ первомъ случаѣ  
продукты выщелачиванія лесса, смываемые съ его залежей  
по бокамъ долинъ, уносятся въ нижнія, мало покатыя къ рѣкѣ  
части долинъ, гдѣ уже и безъ того тутъ залегающій лессовый  
пластинокъ не можетъ достаточно выщелочиться. Смывы еще  
сильнѣе обогащаютъ его солями, умноженіе которыхъ пре-  
ствуетъ развитію болѣе разнообразной растительности, до-  
пуская здѣсь только ростъ немногихъ видовъ солончаковыхъ  
растений, каковы напримѣръ *Ranunculus plantaginifolius* Murr.  
*R. cymbalariae* Pusch., *Aster tripolium* L., *Statice Gmelini*  
W., *St. speciosa* L., *Teloxys aristata* Moq.-Tand., *Axyris*  
*amaranthoides* L., *Salicornia herbacea* L., *Salsola Kali* L., нѣ-  
которые виды *Chenopodium*, *Blitum polymorphum* C. A. Mey.,  
*Triglochin palustre* L., *Triglochin maritimum* L.

6. *Сорная растительность* состоитъ изъ травъ, расту-  
щихъ среди хлѣбныхъ посѣвовъ, по межамъ на только что бро-  
шенныхъ пашняхъ, около дорогъ, жилищъ и т. д. Тутъ можно  
встрѣтить и нѣкоторыя лѣсныя, лугово-степныя и заносныя  
травы. Сюда относятся слѣдующія растенія: *Isopyrum fu-*  
*arioides* L., *Chelidonium majus* L., *Thlaspi arvense* L., *Bras-*  
*ica oleracea* Pall., *Sysimbrium Sophia* L., *Camelina sativa* Cr.,  
*epidium ruderales* L., *Capsella bursa pastoris*. Mönch., *Melan-*  
*tum pratense* Röhl., *Githago segetum* Desf., *Stellaria media*  
*Malva verticillata* Turcz., *Chaerophyllum Sphallerocarpus* Kar.,  
*temisia glauca* Pall., *Cirsium arvense* DC., *Lappa tomentosa*  
L., *Crepis tectorum* L., *Echinospermum Lappula* Lehm.,  
*Redowskii* Lehm., *Hyosciamus niger* L., *Solanum dulcamara*  
*Linaria vulgaris* Mill., *Galeopsis tetrahit* L., *Plantago major*  
*Pl. media* L., *Teloxys aristata* Moq.-Tand., *Chenopodium*  
*bum* L., *Ch. glaucum* L., *Ch. hybridum* L., *Blitum poly-*  
*morphum* C. A. Mey., *Axyris amaranthoides* L., *Polygonum*  
*avolvulus* L., *Polygonum aviculare* L., *Urtica cannabina* L.,  
*dioica* L., *Equisetum arvense* L.

. *Озерно-рѣчная формация* представляет растительность заливныхъ луговъ, луговыхъ и таежныхъ болотъ, побережій рѣкъ и озеръ, стоячихъ и текучихъ водъ. Къ этой формации принадлежатъ слѣдующія растенія, имѣющія болѣею частью обширное на земномъ шарѣ распространение: *Caltha palustris* L., *C. natans* Pall., *Ranunculus acris* L., *R. repens* L., *R. aquatilis* L., *R. sceleratus* L., *R. auricomus* L., *R. cymbalariae* Pusch., *Nuphar luteum* Sm., *Nasturtium palustre* DC., *Spiraea ulmaria* L., *Comarum palustre* L., *Epilobium palustre* L., *Hippuris vulgaris* L., *Sium cicutaefolium* Gm., *Anthriscus nemorosa* Sp., *Galium palustre* L., *Bidens tripartita* L., *Ligularia sibirica* Cass., *Mulgedium sibiricum* Less., *Utricularia vulgaris* L., *Geranium barbatum* Fröhl., *Myosotis palustris* L., *M. caespitosa* Schl., *Veronica anagallis* L., *Rhinantus crista galli* L., *Odontites rubra* Pers., *Pedicularis palustris* L., *P. uncinnata* Steph., *Stachys palustris* L., *Rumex maritimus* L., *R. acetosa* L., *Polygonum viviparum* L., *P. bistorta* L., *Alisma plantago* L., *Butomum umbellatum* L., *Triglochin palustre* L., *T. maritimum* L., *Potamogeton natans* L., *P. lucens* L., *Typha latifolia* L., *Sparganium simplex* L., *Lemna trisulca* L., *Juncus filiformis* L., *J. effusus* L., *Scirpus Tabernaemontani* Gm., *Eleocharis palustris* R. B., много видовъ *Carex*, *Glyceria aquatica* Sm., *Baccharis ericaeformis* Host. Большее разнообразіе вносятъ въ характеръ растительности этой формации многія древесныя растенія, образующія частью обширныя заросли по берегамъ рѣчекъ. Сюда принадлежатъ рябина (*Sorbus aucuparia* L.), черемуха (*Prunus Padus* L.), *Cornus alba* L., *Spiraea salicifolia* L., но въ особенности многочисленныя породы ивъ (*Salix*), какъ напримѣръ *S. pentandra* L., *S. viminalis* L., *S. myricoides* L., *S. pyrolaefolia* Led.

в Статистическо-экономическій обзоръ населенія разсматриваемой плоскости. Волость Зиминская, Балаганское инородческое вѣдомство, волости Заларинская и Черемховская Балаганскаго округа, волости Мальтинская, Тельминская и Стховская Иркутскаго округа. Дополнительные свѣдѣнія о волости Смоленской.

Зиминская волость есть первая территория Балаганскаго округа, пересекаемая большимъ Сибирскимъ трактомъ по переходѣмъ границъ Нижнеудинскаго и Балаганскаго округовъ и по приближеніи къ р. Окѣ, которую трактъ пересекаетъ при с. Зиминскомъ. Отдѣльная межевая дача, занимаемая волостью, включаетъ въ себя 41.150 дес. земли (съ лѣсами и неудобными землями). Она прилегаетъ съ одной стороны къ Киньтейской волости Нижнеудинскаго округа, а со всѣхъ другихъ сторонъ окружена землями Балаганскаго инородческаго вѣдомства. Въ Зиминской волости только одно сельское общество и 2 селенія <sup>1)</sup>. Изъ нихъ 1) село Зиминское на лѣвомъ берегу р. Оки, при устьѣ р. Зимы, есть большое село, состоящее изъ 464 дворовъ, 585 жилыхъ строеній и 553 хозяйствъ. Оно имѣетъ церковь, школу съ 53 учащимися и библиотекой въ 515 томовъ <sup>2)</sup>, богадѣльню, волостное правленіе, почтовую станцію, врачебный пунктъ, 11 питейныхъ заведеній, 16 лавокъ, 2 мельницы, 11 кузницъ, базаръ и 2.860 кв. об. п. (1.408 м. п.). Между ними есть 78 хозяйствъ, состоящихъ изъ 560 д. об. п. (298 м. п.) раскольниковъ, именно субботниковъ, сосланныхъ сюда еще въ 20-хъ годахъ нынѣшняго вѣка <sup>3)</sup>. Базары утверждены здѣсь въ 1846

<sup>1)</sup> О селеніяхъ см. Мат. по изсл. землепольз. Иркутск. г. Т. I, списокъ нас. пункт. стр. 11; табл. Балаганск. окр. стр. 138—145.

<sup>2)</sup> О школахъ см. В. И. Григорьева, въ Матер. Иркутск. г. I. с. II, вып. 2-й, стр. 205 и прилож. стр. 2.

<sup>3)</sup> О раскольникахъ см. И. М. Астирева въ Матер. Иркутск. г. I. с. II, вып. 2-й, стр. 59.

по воскресеньямъ, ярмарки съ 15 марта по 1 апрѣля, съ 25 сент. по 15 окт. и съ 1 дек. по 1 янв. Но ярмарокъ фактически совсѣмъ не существуетъ, да и базары незначительны. На нихъ прѣзжаютъ крестьяне преимущественно только своей волости, да буряты Балаганскаго вѣдомства для продажи хлѣба и сѣна <sup>1)</sup>. 2) дер. Ухтуйская находится только въ 6 вер. отъ Зиминскаго и содержитъ 55 хозяйствъ и 330 жит. об. п. (164 м. п.); остальные жители волости размѣщаются въ 31 заимкахъ.

Объ экономическомъ положеніи населенія Зиминской волости можно судить по слѣдующимъ даннымъ <sup>2)</sup>. Во всей волости, по переписи 1887—88 г. было болѣе 780 дворовъ, 930 жилыхъ построекъ. Наличныхъ жителей сельскаго сообщенія болѣе 3.200 об. п. (1.590 м. п.), въ томъ числѣ временно поселенцевъ 150 (80 м. п.), остальные старожилы. Сверхъ того постороннихъ сельскому населенію лицъ проживаетъ въ волости 280, такъ-что все ея населеніе состоитъ изъ 3.480 д. об. п. Приписное населеніе волости со временъ ревизіи, въ 30 лѣтъ, возрасло на 66% <sup>3)</sup>. Наличныхъ хозяйствъ 680, лицъ въ рабочемъ возрастѣ 1.580 (755 м. п.). Въ числѣ хозяйствъ было съ 1 работникомъ 380 (въ числѣ 75 имѣли подростковъ), съ 2-мя 108, съ 3-мя болѣе 80; остальные хозяйства не имѣли взрослыхъ работниковъ, но въ половинѣ ихъ были подростки. Въ числѣ жителей волости грамотныхъ, полуграмотныхъ и учащихся 21 м. п. и 8 ж. п. Въ селѣ Зимѣ по р. Окѣ у мѣстнаго населенія развиты зобы <sup>4)</sup>.

---

<sup>1)</sup> О базарахъ см. Личева въ Мат. І. с. Т. II, вып. 4-й стр. 245.

<sup>2)</sup> Матер. Иркутск. г. І. с. Т. I, табл. Балаг. окр. стр. 138—140.

<sup>3)</sup> О приростѣ населенія см. И. М. Астырева въ Матер. Иркутск. г. І. с. Т. II, вып. 2-й, стр. 96.

<sup>4)</sup> О зобатыхъ см. И. М. Астырева въ Матер. по Иркутск. г. Т. II, вып. 2-й, стр. 71.

Земель въ пользованіи крестьянъ всей волости, кромѣ лѣсовъ, до 12.700 дес., т. е. до 8 дес. на душу м. п., до 17 дес. на способнаго работника, до 19 на хозяйство. Вся волость образуетъ по землевладѣнію одну юридическую общину. Выгоны и покосы общіе у всей волости; значительное количество пашень расположено за предѣлами Зиминской дачи, въ дачахъ инородцевъ Балаганскаго вѣдомства, череполосно съ кѣ пашнями <sup>1)</sup>, вслѣдствіе чего между крестьянами Зиминской волости и балаганскими бурятами нерѣдко происходятъ возмездные споры.

Пахатныхъ земель въ волости до 6.600 дес. Въ дѣйствительномъ посѣвѣ изъ этихъ земель 57%, т. е.  $2\frac{1}{3}$  на душу м. п., 5 на взрослого работника,  $5\frac{1}{2}$  на хозяйство. На каждые 100 десятинъ посѣва засѣвается рожью 39 дес. (16 ячмеемъ и 23 ярицею), 37 овсомъ, 20 пшеницею, 2 ячмеями <sup>2)</sup>. Чистый сборъ хлѣбовъ въ волости: пшеницы 45 пуд., ржи 51 пуд., овса 53 пуд. съ казенной десятины <sup>3)</sup>. По размѣру хуторскаго хозяйства волость занимаетъ четвертое мѣсто между волостями губерніи, такъ какъ 41% всѣхъ ея дворовъ размѣщены въ заимкахъ <sup>4)</sup>. Покосной земли въ волости 5.510 дес., что составитъ по 8 десятинъ на хозяйство. Лѣсовъ совсѣмъ нѣтъ. За то благодаря положенію волости, окруженной землями богатаго покосами Балаганскаго инородческаго вѣдомства, зиминцы арендуютъ внѣ предѣловъ своей волости много покосовъ, такъ-что на каждые 100 дес. собственныхъ покосовъ зиминскіе крестьяне имѣютъ еще 78 дес.

---

<sup>1)</sup> Е. А. Смирновъ, Матер. по Иркутск. г. I. с. Т. II, вып. 3-й стр. 70.

<sup>2)</sup> А. И. Ушаковъ Матер. по Иркутск. г. I. с. Т. II, вып. 4-й, стр. 53.

<sup>3)</sup> Тамъ же, стр. 78.

<sup>4)</sup> И. М. Астыревъ, въ Матер. по Иркутск. г. I. с. Т. II, вып. 2-й, стр. 139.

арендованныхъ. При такихъ условіяхъ <sup>1)</sup> крестьяне волост держать лошадей 2.770 (2.120 рабочихъ), крупнаго рогатаго скота 1.230, мелкаго скота 3.500. Рабочихъ лошадей приходится на работника нѣсколько менѣе 3-хъ, а всѣхъ лошадей на хозяйство болѣе 4, крупнаго рогатаго скота менѣе 2-хъ, мелкаго болѣе 5. Такимъ образомъ, по развитію скотоводства Зиминская волость стоитъ ниже Черемховской.

Лѣсъ крестьяне Зиминской волости рубать въ своихъ дачахъ, въ которыхъ лѣса имѣется до 21 тыс. десятинъ; лѣсными промыслами, не смотря на обиліе лѣса въ дачахъ Зиминской волости, крестьяне занимаются мало, а именно всего только 26 хозяйствъ <sup>2)</sup>. Вообще же по развитію промысловъ Зиминская волость стоитъ высоко, а именно въ ней 63% способныхъ работниковъ занимаются сверхъ земледѣлія еще промыслами <sup>3)</sup>, въ томъ числѣ бѣльшая часть (48% всѣхъ работниковъ) занимается извозомъ (1.130 человѣкъ). Изъ остальныхъ промысловъ въ волости 20 человѣкъ занимаются плотничествомъ, 9 сапожничествомъ, 10 кузнечествомъ, 2 рыболовствомъ, 35 торговлею. Мѣстныхъ доходовъ волость получаетъ 3.870 руб., въ т. числѣ съ питейныхъ заведеній 2.325 руб., съ перевозовъ 1.280 р. Казенныхъ податей волости сходить 5.370 р., волостныхъ расходовъ съ сельскими 3.480 р., такъ-что денежныхъ повинностей съ душъ м. п. сходить 5 р. 56 к.

Большое значеніе для Зиминской волости будетъ имѣть въ послѣдствіи находящееся въ дачахъ волости и развѣданное въ 1889 году горнымъ инженеромъ В. А. Обручевымъ богатое мѣсторожденіе буроаго угля. Оно находится близъ мѣстности Кулгунай <sup>4)</sup>, выше села Зиминскаго по Окѣ, въ 15 ве

<sup>1)</sup> И. Г. Шешуковъ, въ Матер. I. с. Т. II, вып. 3-й, стр. 291.

<sup>2)</sup> Н. И. Стрежневъ въ Матер. I. с. Т. II, вып. 4-й, стр. 327.

<sup>3)</sup> Л. С. Личковъ въ Матер. I. с. Т. II, вып. 4-й, стр. 322.

<sup>4)</sup> Подробности о мѣсторожденіяхъ буроаго угля по р. Окѣ будутъ изложены во 2-ой части нашихъ дополненій.

отъ нынѣшняго Московскаго тракта и верстахъ въ 20 съ небольшимъ отъ предполагаемой линіи желѣзной дороги <sup>1)</sup>. Въ двухъ мѣстахъ на р. Окѣ, а именно въ 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> вер. ниже устья и 2 вер. выше ея оказались обширные запасы бурого угля, образующаго свиту пластовъ общей мощности до 1<sup>1</sup>/<sub>4</sub> саж. и залегающею въ условіяхъ, весьма благопріятныхъ для добычи. На первой изъ этихъ площадей запасъ угля опредѣленъ въ 210 мил. пудовъ, на второй въ 205 мил., но цифры эти минимальныя, такъ какъ залежи гораздо обширнѣе разбросанныхъ площадей. Образчики угля были подвергнуты анализу въ Иркутской золотосплавочной лабораторіи. По качеству и составу уголь подходитъ къ каменнымъ углямъ подмосковнаго бассейна, содержитъ приблизительно столько же золы и даетъ столько же порошкообразнаго кокса; при лежаніи на воздухѣ разсыпается въ мелочь, но при всемъ томъ годенъ къ употребленію на желѣзныхъ дорогахъ и заводахъ, но особенно хорошъ для приготовленія свѣтильнаго газа, для добычи бензина и каменно-угольнаго дегтя.

Балаганское инородческое вѣдомство. Заграницами Зиминской волости, въ промежуткѣ между рѣками Окю и Заларю, Большой Сибирскій трактъ пересѣкаетъ территорію Балаганскаго вѣдомства. Центръ управленія — Балаганская степная дума находится верстахъ въ 25 въ сторонѣ отъ тракта на р. Заларѣ, немного выше впаденія ея въ р. Унгу, въ 37 вер. отъ Балаганска, при Нукутскомъ улусѣ Бурятскаго юда. При думѣ находится церковь, школа и врачебный пунктъ. Балаганское вѣдомство состоитъ изъ 24 родовъ, разселенныхъ болѣе чѣмъ по 140 улусамъ, причемъ въ каждомъ населенномъ пунктѣ болѣею частью живутъ представители только одного рода. По земельному пользованію <sup>2)</sup> буряты

<sup>1)</sup> Обручевъ, въ Матер. по Иркутск. г. I. с. Т. II, вып. 1-й стр. 58.

<sup>2)</sup> Смирновъ, въ Матер. по изсл. Иркутск. г. I. с. Т. II, выпускъ 3-й, стр. 94 — 100, а о селеніяхъ и улусахъ Т. I-й, списокъ нас. мѣстъ, стр. 17—20.



Балаганскаго вѣдомства распредѣляются на 20 юридическихъ общинъ, а именно: 1) Онгоевъ и Булутскій роды образуютъ одну общину, владѣютъ двумя дачами, прилежащими къ р. Унгѣ, а Онгоевъ родъ еще сверхъ того и небольшой приагарской дачей. Оба рода живутъ въ 10 улусахъ; въ 2-хъ совместно, въ 4-хъ одни онгоевцы, въ 4 одни булутцы. Совмѣстные улусы—самые значительные поселки общины, одинъ изъ нихъ Усть-Хамхорскій при впаденіи рч. Хамхоры въ Унгу, въ 15 вер. отъ степной думы, состоитъ изъ 50 хозяйствъ и имѣетъ 208 жителей, другой Хамхорскій выше по рч. Хамхорѣ только въ 5 вер. отъ Балаганской степной думы, состоитъ изъ 80 хозяйствъ и 333 д. об. п. При улусѣ Нукутскомъ на р. Заларѣ, состоящемъ изъ 38 хозяйствъ и 175 д. об. п., находится Степная Балаганская инородческая Дума. Пашни Булутскихъ улусовъ череполосны между собою и отчасти съ пашнями Онгоевскими; а пашни Онгоевскія еще и съ пашнями Кульметскаго и Мурьевскаго родовъ. Покосами Булутскій и Онгоевскій роды владѣютъ отдѣльно. Булутскій періодически передѣляетъ ихъ по душамъ, а у Онгоевъ они подѣлены по улусамъ. Относительно лѣтнихъ выгоновъ Булутскіе улусы (кромя Усть-Хамхорскаго) составляютъ одну общину съ Онгоевскими. Улусъ же Усть-Хамхорскій принадлежитъ къ бывшей Унгинской выгонной общинѣ, выгонъ которой тянутся по р. Унгѣ на нѣсколько десятковъ верст (отъ впаденія въ нее р. Тангута до устья ея). 2) 1-й Олзоевъ родъ имѣетъ въ своемъ единственномъ владѣніи двѣ дачи: одну, примыкающую къ р. Унгѣ, а другую къ р. Ока. Родъ размѣщается въ 5 улусахъ. Самый большой изъ нихъ Средне-Бутукейскій, изъ 42 хозяйствъ и 206 жит., находится на правой сторонѣ р. Унги въ 6 вер. отъ Балаганской степной думы. По выгону всѣ эти улусы примыкаютъ къ Унгинской общинѣ. 3) 1-й Кульметскій родъ имѣетъ свою особую дачу, примыкающую къ р. Заларѣ и ея правому притоку Бажиру. Родъ этотъ размѣщается въ 10

улусахъ, 3-хъ займахъ и одной Бажирской деревнѣ осѣдлыхъ инородцевъ. Дер. Бажирская находится въ 25 вер. отъ Балаганской степной думы, имѣетъ 83 хозяйства и 440 жит. (210 м. п.). Пашни ихъ черезполосны между собою и съ пашнями другихъ родовъ; покосами каждый улусъ владѣетъ отдѣльно, а по выгонамъ родъ распадается на двѣ общины: одну составляетъ деревня Бажирская съ займами, другую всѣ улусы. 4) 2-й Икинатскій родъ, имѣетъ въ единственномъ владѣніи двѣ дачи, одну на Унгѣ, другую на слияніи Залари съ Унгою. Родъ размѣщается въ 4 улусахъ и одной деревнѣ осѣдлыхъ инородцевъ. Деревня эта Ханжирская, въ 47 вер. отъ Балаганской степной думы, состоитъ изъ 34 хозяйствъ и имѣетъ до 160 жителей. Пашни одного изъ улусовъ лежатъ на чужихъ дачахъ. Покосами каждый улусъ пользуется особо отъ прочихъ. По выгонамъ два улуса составляютъ одну общину съ дер. Ханжирскою, треть примыкаетъ къ Булутской общинѣ, другой къ Унгинской. 5) 2-й Кульметскій родъ владѣетъ тремя межевыми дачами (одна очень маленькая) по р. Унгѣ. Родъ этотъ размѣщается въ 10 улусахъ. Самые большіе улусы имѣютъ: Баргунайскій, на р. Унгѣ, въ 25 вер. отъ степной думы, 62 хозяйства и 160 жит., Ейскій, въ 21 вер. отъ думы, 58 хозяйствъ и 274 жит. Пашни всѣхъ улусовъ расположены черезполосно между собою, а отчасти въ чужихъ дачахъ. Покосы отдѣлены только у одного улуса (Дубунскаго), у остальныхъ разверстываются не рѣже одного раза въ 5-лѣтіе, а за тѣмъ каждый улусъ дѣлитъ покосы по душамъ: одни улусы ежегодно, другіе каждые 2 и 3 года. По выгонамъ два улуса примыкаютъ къ Унгинской общинѣ, прочіе улусы пользуются выгонами сообща съ двумя улусами Шаротскаго рода. Лѣнами пользуются свободно какъ свои, такъ и чужіе. 6) Два Муруевыхъ рода (1 и 2-й) владѣютъ сообща 5 дачами: одна изъ нихъ очень небольшая (состоящая изъ покосовъ и выгона) находится на Унгѣ ниже устья Залари, всѣ остальные

сѣвернѣе р. Унги. Кромѣ того въ общемъ владѣніи двухъ Муруевыхъ родовъ вмѣстѣ съ Тагнинскимъ родомъ, состоящимъ только изъ 3 селеній осѣдлыхъ инородцевъ, состоитъ еще одна дача примыкающая къ правому берегу р. Оки и ея притоку Тагнѣ. Муруевы роды размѣщаются въ 13 улусахъ, изъ которыхъ въ самомъ большомъ Хоротскомъ 47 хозяйствъ и 213 жит. Единственное значительное селеніе Тагнинскаго рода (остальные два поселка займки) дер. Тагнинская находится на р. Тагнѣ, въ 85 верстахъ отъ Балаганской степной управы, и состоитъ изъ 58 хозяйствъ и 280 жит. Пашни одноплеменныхъ улусовъ большею частью черезполосны. Покосы оба Муруевыхъ рода разверстываютъ сообща каждыя 20 — 30 лѣтъ по такъ называемымъ десяткамъ, внутри каждой десятка ежегодно по душамъ; по выгонамъ часть улусовъ обоихъ Муруевыхъ родовъ входитъ въ составъ Унгинской общины, а часть составляетъ отдѣльную общину. Въ Тагнитскомъ же родѣ покосы и выгоны у каждого селенія отдѣльные. Лѣсомъ въ Тагнитской дачѣ, кромѣ бурятъ, пользуются и русскіе Заларинской волости. Инородцы другихъ дачъ пользуются лѣсомъ и въ своихъ и въ чужихъ дачахъ.

7) Шаротскій родъ владѣетъ 2 дачами—одной на правомъ берегу р. Оки, ниже устья рч. Хара-угуна, другой сѣвернѣе р. Унги. Весь Шаротскій родъ размѣщается въ 3 улусахъ, изъ которыхъ самый большой Тунгутскій находится въ 23 верстахъ отъ степной думы и состоитъ изъ 50 хозяйствъ и 221 д. об. п. Земли улусовъ находятся въ упомянутыхъ дачахъ только выгонами они пользуются сообща съ нѣкоторыми улусами 2 Кульметскаго рода.

8) Тыретскій родъ осѣдлыхъ инородцевъ владѣетъ особою дачею, пересѣкаемою въ южной своей части р. Унгою. Тыретскій родъ размѣщается въ 1 селеніи и 4 займкахъ. Селеніе Тыретское, на р. Тырети въ 3 вер. отъ Балаганской степной думы, есть самое большое осѣдлое селеніе въ вѣдомствѣ; оно имѣетъ 164 хозяйства и 751 д. об. п. (366 м. п.). Селеніе это имѣетъ торговое значеніе.

юти въ немъ и нѣтъ базаровъ. Въ него прїѣзжаютъ сбы-  
 ть свои хлѣба и постороннія селенія: за немѣніемъ ба-  
 ара они стучать подъ окнами и спрашиваютъ нѣтъ ли же-  
 мющихъ купить ихъ хлѣбъ. Пашни Тыретскаго рода распо-  
 ложены преимущественно въ своей дачѣ (гдѣ имѣются и пашни  
 русскихъ крестьянъ Зиминской и Заларинской волостей), отчасти  
 и въ чужихъ дачахъ. Покосы и выгоны, по отношенію къ ко-  
 торымъ Тыретскій родъ составляетъ одну общину, расположены  
 въ своей дачѣ. Лѣсомъ родъ пользуется только въ своей дачѣ.  
 9) Боролдаевскій родъ расположенъ и пользуется землями  
 въ дачѣ единственнаго владѣнія, находящейся въ верховьяхъ р.  
 Залари. Боролдаевскій родъ размѣщается въ 4 улусахъ и одной  
 деревнѣ осѣдлыхъ инородцевъ этого рода. Деревня эта За-  
 балгарская находится въ 67 вер. отъ Балаганской степ-  
 ной думы и состоитъ изъ 26 хозяйствъ и 140 душъ об. п.  
 10) Харанутскій родъ владѣть дачею, простирающеюся  
 между лѣвнымъ берегомъ Оки и р. Зимою. Харанутскій родъ раз-  
 мѣщается въ одномъ улусѣ и 2 селеніяхъ. Деревня Верхне-  
 Зиминская находится на р. Зимѣ, въ 90 вер. отъ Балаган-  
 ской степной думы и состоитъ изъ 49 хозяйствъ и 270 жит.  
 (114 м. п.). На р. Окѣ, въ 100 вер. отъ Балаганской степной  
 думы, находится Верхне-Окинское селеніе состоящее изъ  
 36 хозяйствъ и 170 жит. Улусъ (Игнитскій) также нахо-  
 дится на р. Зимѣ, а средняя большая часть обширной дачи  
 необитаема и занята лѣсомъ и необработанными землями.  
 Всѣми угодьями кромѣ лѣса всѣ три поселка пользуются от-  
 дѣльно одинъ отъ другаго. 11) Ашехабатскій родъ вла-  
 дѣетъ двумя отдѣльными дачами, изъ коихъ одна расположена  
 по лѣвнмъ сторонамъ р. Оки, а другая по р. Кимильтею.  
 Ашехабатскій родъ размѣщается въ 8 улусахъ, 3 деревняхъ и 4  
 поселкахъ. Главное селеніе рода дер. Карьинская на пр.  
 берегу Кимильтея, въ 106 верстахъ отъ Балаганской степной  
 думы, состоитъ изъ 70 хозяйствъ и имѣетъ 350 ж. (178 м.  
 п.). Пашни селенія и улусовъ череполосны. Покосы въ одной

дачѣ разверстаны между селеніями, въ другой дѣлятся между улусами и селеніями лѣтъ черезъ 5. Выгонъ въ одной дачѣ одинъ общій между всѣми селеніями, въ другой образуетъ общины. Пользованіе лѣсомъ свободно: въ Ашехабатскихъ дачахъ рубятъ и чужіе. 12) Зунгарскій родъ владѣетъ межевою дачею, прилегающею на ю.-в. къ р. Ангартъ. Улусы имѣютъ черезполосныя пашни, отдѣльные покосы, выгонъ общій съ улусами Быкотскаго рода. Зунгарскій родъ размѣщается въ 7 улусахъ и 2 деревняхъ осѣдлыхъ инородцевъ. Изъ деревень этихъ Парамонова на лѣв. бер. Ангары, въ 49 вер. отъ Балаганской степной дороги съ 12 хозяйствами и 30 жит. имѣетъ отдѣльные пашни и покосы, а выгономъ пользуется общимъ съ сосѣдними русскими селеніями Малышевской волости. Другая деревня Верхне-Мятлеева, на пр. бер. рѣчки Бироти въ 50 вер. отъ Балаганской степной думы, съ 3 хозяйствами и 200 жит.; пашни имѣетъ черезполосныя съ своими улусами и сосѣднею одноименною русскою деревнею Малышевской волости, покосы отдѣльные, а выгонъ общій съ русской деревней. 13) Быкотскій родъ владѣетъ особою дачею на лѣв. берегу Ангары. Быкотскій родъ размѣщается въ 4 улусахъ, въ 1 деревнѣ осѣдлыхъ инородцевъ и 1 выселкѣ. Дер. Быкотская, въ 64 вер. отъ Балаганской степной думы, состоитъ изъ 48 хозяйствъ и имѣетъ 230 жит. (123 м. п.). Пашни улусовъ и деревень черезполосны; покосы въ общемъ владѣніи всего рода передѣляются каждые 3—4 года; выгонъ у осѣдлыхъ отдѣльный; у кочевыхъ общій съ кочевьями Зунгарскаго рода. Пользованіе лѣсами свободно; въ нихъ рубятъ и русскіе крестьяне Яндинской волости. 14) Часть 1-го Иконатскаго рода (Харанурскій участокъ), состоящая изъ 2-улусовъ (Шалотскаго и Вершинскаго), владѣетъ 2 дачами, изъ которыхъ одна находится при впаденіи Унги въ Ангару, а другая западнѣе Ангары и южнѣе Унги. Въ первой дачѣ находятся зимнія усадьбы, утуги, пашни, покосы и лѣса обонхъ улусовъ, во второй ихъ лѣтники и лѣтній выгонъ, по отно-

нению къ которому улусы входятъ въ составъ Унгинской общины. Улусъ Шалотскій есть самый большой изъ неосѣдлыхъ поселковъ волости. Онъ находится въ 20 вер. отъ степной думы и состоитъ изъ 128 хозяйствъ и 550 душъ об. п. 15) Другая часть 1-го Иканатскаго рода (Бутайскій участокъ), состоящая изъ 5 улусовъ, владѣть дачею, прилегающею непосредственно къ лѣв. берегу Ангары. Самый большой въ улусовъ Нарангунскій, въ 58 вер. отъ степной думы, состоитъ изъ 33 хозяйствъ и 174 д. об. п. Пашни этихъ улусовъ череполосны между собою и съ имѣющимися въ ихъ дачѣ пашнями чужихъ родовъ (Ноэтскаго и Зангеевскаго). По выгонамъ дѣлятся сперва по улусамъ, потомъ по душамъ, а иногда и прямо по душамъ. Выгонъ общій; за строевымъ лѣсомъ ходить въ чужія дачи. 16) 2-й Олзоевъ родъ владѣть дачею межевыми дачами, изъ которыхъ одна находится на низменныхъ р. Унги, другая на границѣ Нижнеудинскаго округа, вост. отъ р. Оки. 2-й Олзоевъ родъ размѣщается въ 6 улусахъ. Самые большіе изъ нихъ Закулейскіе; одинъ изъ нихъ, въ 24 вер. отъ степной думы, состоитъ изъ 114 хозяйствъ и до 500 д. об. п.; другой въ 27 вер. отъ думы, состоитъ изъ 95 хозяйствъ и до 220 д. об. п. Пашнями родъ пользуется отчасти въ своихъ, но преимущественно въ чужихъ дачахъ (1-го Иканатскаго, Булутскаго съ Онгоевымъ и Кульметскаго родовъ). Луга улусовъ находятся въ обѣихъ ихъ дачахъ; они издавна подѣлены на нѣсколько участковъ. По выгону большинство улусовъ принадлежитъ къ обширной Унгинской общинѣ. Одинъ улусъ 2-го Олзоева рода (Агисайскій), живущій въ дачѣ вост. отъ р. Оки, пользуется всѣми угодьями, кромѣ лѣса, отдѣльно отъ прочихъ. 17) Ноэтскій родъ живетъ и пользуется землей въ дачѣ, выходящей узкою полоскою къ лѣвому берегу Ангары противъ села Нижне-Середнинскаго. Онъ размѣщается въ 4 улусахъ. Изъ нихъ самый большой Бахтайскій, въ 30 вер. отъ степной думы, состоитъ изъ 60 хозяйствъ и 334 д. об. п. Пашни они имѣютъ въ своей и чужихъ дачахъ. Покося Но-

этскаго рода были въ 1883 г. разверстаны между улусами и съ тѣхъ поръ каждый улусъ передѣляетъ ихъ ежегодно по душамъ отдѣльно отъ прочихъ. Выгонами Ноэтскій родъ пользуется въ приангарской степи сообща съ родами Хангинскимъ и Изголовскимъ, лѣсъ рубятъ свободно въ дачахъ Заларинской волости. 18) Хангинскій родъ владѣтъ межевыми дачами расположенными отчасти на лѣв. берегу Ангары, отчасти на Осинскомъ островѣ Ангары. Хангинскій родъ размѣщается въ 3 улусахъ, изъ которыхъ самый большой Хандаханскій, въ 42 вер. отъ степной думы, состоитъ изъ 4 хозяйствъ и 190 д. об. п. Пашней у Хангинскаго рода въ своихъ дачахъ нѣтъ, а пашнями они пользуются въ дачахъ родовъ Ноэтскаго и Иконатскаго. Покося находятся въ общемъ владѣніи всего рода и дѣлятся ежегодно. Выгонъ общій съ родами Ноэтскимъ и Изголовскимъ въ приангарской степи. Лѣсъ улусы Хангинскаго рода рубятъ въ чужихъ дачахъ. 19) Изголовскій родъ владѣтъ дачей, расположенной главнымъ образомъ на лѣвомъ берегу Ангары и отчасти на южной оконечности Осинскаго острова. Изголовскій родъ размѣщается въ 5 улусахъ, изъ которыхъ самый большой Куретскій, въ 49 вер. отъ степной думы, состоитъ изъ 56 хозяйствъ и 200 д. об. п. Пашни его лежатъ въ своей дачѣ. Покося общіе у всего рода, кромѣ одного улуса, владѣющаго покосомъ отдѣльно. Выгонъ въ приангарской степи, общій съ соседними родами. Лѣсъ рубится въ чужихъ дачахъ. 20) Маленькій Островскій родъ, состоящій изъ 2 небольшихъ улусовъ, владѣтъ небольшою отдѣльною межевою дачею, расположенною на Осинскомъ островѣ. Наконецъ 21) Зангеевскій родъ не имѣетъ своей особой дачи. Онъ живетъ въ 5 улусахъ около р. Ангары смѣшанно съ 3-мъ Холтубаевымъ родомъ Аларскаго вѣдомства, такъ-что и пашни этихъ двухъ родовъ домашнихъ родовъ черезполосны и выгонъ у нихъ общій. Покося раздѣлены, а лѣсомъ Зангеевскій родъ пользуется въ дачахъ Аларскаго вѣдомства. Поземельные споры между р

ами Балаганскаго вѣдомства довольно рѣдки и обусловливаются захватами. Одинъ изъ такихъ споровъ между Иконатскимъ и Нозтскимъ родами о 450 дес. земли по пади Ире-гирѣ продолжался 70 лѣтъ, съ 1819 г.

Территорія инородцевъ Балаганскаго вѣдомства (съ лѣсами и неудобными землями) занимаетъ обширное пространство въ 676.000 десятинъ <sup>1)</sup>. Изъ нихъ впрочемъ въ дѣйствительномъ пользованіи инородцевъ Балаганскаго вѣдомства, кромѣ земель неудобныхъ и лѣсовъ, состоитъ 104 тыс. десятинъ земли. Дворовъ во всемъ вѣдомствѣ по переписи 1887—88 г. <sup>2)</sup> было 3740, въ томъ числѣ 2830 у кочевыхъ, 826 у осѣдлыхъ, остальные принадлежали новоселамъ и постороннимъ вѣдомству лицамъ. Жилыхъ строеній было до 7.700, наличныхъ жителей 17.220 об. п. (до 9.000 м. п.), въ томъ числѣ 640 постороннихъ вѣдомству лицъ, 3.850 осѣдлыхъ инородцевъ, остальные кочевники. Приростъ населенія въ Балаганскомъ вѣдомствѣ со времени X-й ревизіи былъ ничтожный, а именно въ 30 лѣтъ составилъ менѣе 4% <sup>3)</sup>. При этомъ замѣчательно, что приростъ населенія м. п. составляетъ все-таки 8%, а въ женскомъ населеніи есть убыль, да и вообще по переписи 1887—88 г. женщинъ въ Балаганскомъ вѣдомствѣ оказывается на 9% менѣе, чѣмъ мужчинъ. Не объясняется ли это, кромѣ возможной неточности цифръ женскаго населенія по X-ой ревизіи, еще и побѣгами бурятскихъ кенъ отъ мужей язычниковъ, на которыя есть указанія въ матеріалахъ <sup>4)</sup>. Весьма возможно, что многія изъ крещеныхъ тратокъ выходятъ не за однихъ крещеныхъ бурятъ, но и за ссыльно-поселенцевъ, между которыми мужескій полъ

<sup>1)</sup> См. Матер. I. с. Т. II, вып. 3-й. Прилож. къ гл. VI, стр. 36.

<sup>2)</sup> См. Матер. I. с. Т. I, Балаганск. окр., стр. 202—257.

<sup>3)</sup> Астиревъ въ Матер. I. с. Т. II, вып. 2-й, стр. 97.

<sup>4)</sup> См. Матер. т. II, вып. 2-й, стр. 63.



численностью чрезвычайно преобладает надъ женскимъ. Во всякомъ случаѣ фактъ этотъ заслуживаетъ спеціальнаго изслѣдованія. Наличныхъ хозяйствъ въ Балаганскомъ вѣдомствѣ 3.730, лицъ въ рабочемъ возрастѣ 8.950 (4.800 м. п.). Замѣчательно, что между лицами въ рабочемъ возрастѣ, женщинъ на 12% меньше, чѣмъ мужчинъ, между тѣмъ какъ между дѣтьми до 7 лѣтн. возраста женскаго пола почти на 4% болѣе чѣмъ мужскаго, что уже прямо указываетъ на убыль женскаго пола во взросломъ возрастѣ, которая и прямо и косвенно должна вліять на отсутствіе прироста въ инородческомъ населеніи. Въ числѣ 3.730 хозяйствъ было съ 1 работникомъ 2.460 (изъ нихъ въ 580 были подростки), съ 2-ми 754, съ 3 и болѣе 246, въ остальныхъ 240 хозяйствахъ взрослыхъ работниковъ совсѣмъ не было, но въ 160 были подростки. Въ числѣ жителей вѣдомства грамотныхъ, полу грамотныхъ и учащихся было 830 мужч. и 13 женщ.

Земель въ непосредственномъ пользованіи инородцевъ во вѣдомствѣ кромѣ лѣсовъ было 104 тыс. дес., т. е. болѣе 11<sup>1</sup>/<sub>2</sub> дес. на д. м. п., 28 на взрослого работника и 42 на хозяйство. Пахатныхъ земель до 39 тыс. дес., но только половина ихъ состоитъ подъ дѣйствительнымъ посѣвомъ, такъ что подъ посѣвами состоитъ на д. м. п. болѣе 2 дес., на взрослого работника по 4 дес., на хозяйство 5<sup>1</sup>/<sub>2</sub> дес. Изъ 100 дес. посѣва подъ рожью 55 (озимой 15 и ярицы 40), подовсомъ 23, подъ пшеницей 17, подъ ячменемъ 2 дес. <sup>1)</sup> Чистый сборъ хлѣбовъ: пшеницы 42, ржи 45, овса 47 пудовъ съ десятины каз. мѣры <sup>2)</sup>).

Покосной земли въ вѣдомствѣ до 56.500 дес., да сверхъ того подъ утугами 6.700 дес., такъ что все количество покосовъ составитъ по 17 дес. на хозяйство. Это составляетъ

---

<sup>1)</sup> См. А. Н. Ушаковъ, Матер. I. с. Т. II, вып. 4-й, стр. 54.

<sup>2)</sup> Тамъ-же стр. 78.

такой избыток покосовъ, что Балаганскіе инородцы сдаютъ 40% своихъ покосовъ въ аренду лицамъ, постороннимъ ихъ вѣдомству <sup>1)</sup>. Инородцы вѣдомства держатъ лошадей болѣе 25.000 (рабочихъ 10.500), крупнаго рогатаго скота 21.600, великаго скота до 61.500 головъ (въ т. числѣ овецъ 42.600). Такимъ образомъ рабочихъ лошадей приходится на работника болѣе 2-хъ, всѣхъ лошадей на хозяйство по 7, крупнаго рогатаго скота около 6, мелкаго болѣе 16.

Лѣса на дачахъ Балаганскаго вѣдомства произрастаетъ болѣе 310.000 дес., такъ-что въ лѣсѣ въ Балаганскомъ вѣдомствѣ нѣтъ недостатка и имъ пользуются не только буряты, но и крестьяне сосѣднихъ волостей. При всемъ томъ лѣсными промыслами буряты занимаются очень мало, а именно во всемъ вѣдомствѣ не болѣе 32 хозяйствъ. Да и вообще по развитію промысловъ Балаганское вѣдомство стоитъ не выше, хотя выше многихъ другихъ инородческихъ вѣдомствъ, именно въ немъ только 25% всѣхъ способныхъ работниковъ кромѣ земледѣлія и скотоводства занимаются еще не земледѣльческими промыслами, между которыми конечно на первомъ планѣ стоятъ охота, рыболовство и сборъ кедровыхъ орѣховъ <sup>2)</sup>. Охотою (звѣроловствомъ) занято свыше 500 человекъ, рыбною ловлею болѣе 100, сборомъ орѣховъ до 20. Дальнѣе промыслы имѣютъ ничтожное развитіе. Въ 1888 г. въ вѣдомствѣ занималось плотничествомъ 20 дворовъ, выдѣломъ орѣховъ 7, кузнечествомъ 32 двора, извозомъ 166 дворовъ.

Такимъ образомъ инородцы Балаганскаго вѣдомства являются какъ и инородцы Аларскаго, отъ которыхъ они отли-

<sup>1)</sup> Шешуновъ, Матер. I. с. Т. II, вып. 3-й, стр. 291.

<sup>2)</sup> О промыслахъ инородцевъ Балаганскаго вѣдомства см. Личкова и Гринева въ Матер. по изсл. Иркутск. г. Т. II, вып. 4-й, стр. 322, 327 прилож.

чаются только религіею (такъ какъ они придерживаются преимущественно шаманства) полукучевымъ племенемъ, занимающимся земледѣліемъ и скотоводствомъ, при чемъ земледѣліе уже начинаетъ преобладать надъ скотоводствомъ, что и дѣлаетъ Балаганскихъ бурятъ болѣе осѣдлыми, чѣмъ Аларскихъ. Тѣмъ болѣе чѣмъ Тункинскихъ бурятъ, что выражается не только въ большей пропорціи между Балаганскими бурятами осѣдлыхъ инородцевъ, но и въ большей пропорціи хозяйствующихъ жилищъ строенія на лѣтникахъ. Въ Балаганскомъ вѣдомствѣ 71% хозяйствъ имѣютъ постройки на лѣтникахъ, а въ Аларскомъ только 62%<sup>1)</sup>. На то же указываетъ и пропорція юртъ къ домамъ въ зимникахъ инородцевъ, которая составляетъ въ Балаганскомъ вѣдомствѣ 42%, Аларскомъ 45%, Тункинскомъ 49%.

Заларинская волость занимаетъ три межевыя дачи по рѣкамъ Заларѣ, Бажиру и Кутулику и на значительно протяженіи (верстъ на 65) вдоль Сибирскаго тракта. Пространство этихъ дачъ 106.400 дес. Площадь Заларинской волости со всѣхъ сторонъ окружена инородческими землями Балаганскаго и Аларскаго вѣдомствъ. Въ Заларинской волости 4 сельскихъ общества и въ нихъ, кромѣ заимокъ, поселковъ, а именно<sup>2)</sup>: 1) Заларинское на р. Заларѣ Сибирскомъ почтовомъ трактѣ состоитъ изъ 250 дворовъ, имѣетъ 354 хозяйства, церковь, школу съ 56 учащимися, бібліотеку изъ 330 томовъ<sup>3)</sup>, волостное правленіе, почтовую станцію, 6 питейныхъ заведеній, 16 лавокъ, 19 кузницъ.

---

<sup>1)</sup> Астыревъ, Матер. I. с. Т. II, вып. 2-ой, стр. 149, 151.

<sup>2)</sup> О селеніяхъ Заларинской волости см. Матер. по Иркутск. I. с. Т. I списки нас. пункт., стр. 2—13; о сельскихъ обществахъ волости тамъ же Т. I, Балаганск. окр., стр. 138—145.

<sup>3)</sup> О школѣ см. В. И. Григорьева въ Матер. I. с. Т. II, вып. стр. 205, и прилож. стр. 3.

базары в 1464 жит. об. п. (710 м. п.). На здѣшніе базары съѣзжаются изъ Кутулика, Тырети и всѣхъ заимокъ и селеній волости, а также изъ Черемховской и Бѣльской волостей. Изъ вѣдомствъ Аларскаго и Балаганскаго на базаръ вывозятъ не только хлѣбъ, но и деревянную и глиняную посуду, изъ Усолья и Тельмы — соль и рыбу, изъ Бѣльскаго — кожи и кожаннныя издѣлія. Особенно многолюдны заларинскіе базары передъ масляницею, когда одного хлѣба привозится болѣе 50 воевъ, а народу прибываетъ до сотни человѣкъ. Радіусъ тяготѣнія заларинскихъ базаровъ до 60 верстъ <sup>1)</sup>. Въ Заларинскомъ сельскомъ обществѣ, къ которому принадлежатъ еще много заимокъ, дворовъ 580, жилыхъ строеній 720, мельницъ 8, хозяйствъ 564, жителей 3010 (1560 м. п.), в т. числѣ ссильно-поселенцевъ 160 (85 м. п.), новоселовъ 460 (240 м. п.). Изъ 710 муж. въ рабочемъ возрастѣ 200 занимаются извозомъ. Въ пользованіи крестьянъ до 12400 д., в т. числѣ пахатной до 8400 дес., луговой болѣе 3600. Заларинскіе крестьяне держатъ скота: лошадей 2430 (рабочихъ 1720), крупнаго рогатаго скота до 2500 головъ, мелкаго скота болѣе 4500 головъ. 2) станица Головинская находится также на большомъ Сибирскомъ трактѣ въ 15 вер. отъ Заларинской въ сторону Нижнеудинска. Она образуетъ мѣстѣ съ находящеюся отъ нея въ 7 вер. 3) станицею Борховскою одно сельское общество, въ которомъ 70 дворовъ, 77 жилыхъ построекъ, хозяйствъ 73. Жителей болѣе 400 об. п. (213 м. п.) на половину казаковъ, на половину крестьянъ изъ казаковъ. Во владѣніи ихъ болѣе 2400 дес., в т. числѣ пахатныхъ 1140, луговыхъ до 1.200. Скота Головинцы держатъ: лошадей 240 (190 рабочихъ), крупнаго рогатаго скота 180, мелкаго 540 головъ. Жители Головинской станицы занимаются между прочимъ обжиганіемъ угля.

4) Кутуликское село также на большомъ Сибирскомъ трактѣ

<sup>1)</sup> О базарахъ см. Личкова въ Матер. I. с. Т. II, вын. 4-й, стр. 283.

на р. Кутуликѣ, въ 28 вер. отъ Заларинскаго въ сторону Иркутска, состоитъ изъ 280 дворовъ, 320 жилыхъ строеній имѣетъ церковь, церковно-приходскую школу съ 37 учащимися, почтовую станцію, 13 питейныхъ заведеній, 11 лавокъ, 9 кузницъ и базары, впрочемъ незначительные. Жителей 1710 об. п. (870 м. п.). Кутуликское сельское общество состоитъ съ заимками изъ 530 дворовъ. Въ немъ 600 жилыхъ строеній, мельница, 532 хозяйства. Жителей въ обществѣ 2710 (1400 м. п.), въ томъ числѣ ссыльно-поселенцевъ болѣе 200 (170 м. п.), новоселовъ болѣе 510 (263 м. п.), остальные старожилы. Изъ 640 мужч. въ рабочемъ возрастѣ 176 занимаются извозомъ. Въ Кутуликѣ распространены зобы. Земель во владѣніи общества 9350 дес., въ томъ ч. пахатной 6640, луговой 2330. Жители общества держатъ 1660 лошадей (1330 рабочихъ), крупнаго рогатаго скота до 1500, мелкаго скота до 4300 головъ. 5) село Холмогойское, въ сторонѣ отъ большаго Сибирскаго тракта, въ 15 вер. выше Заларинскаго по р. Заларѣ, имѣетъ церковь и церковно-приходскую школу съ 35 учащимися, 184 хозяйствъ и 810 жит. (393 м. п.). 6) дер. Сарты, въ 4 вер. отъ Холмогойскаго на рѣкѣ Холмогой, имѣетъ 95 хозяйствъ и 480 жит. (248 м. п.). Въ этой деревнѣ распространены зобы. 7) Троицкій винокуренный заводъ въ 10 вер. отъ Холмогойскаго имѣетъ до 60 хозяйствъ и 230 жит. (119 м. п.). Всѣ три послѣдніе поселка съ заимками составляютъ Холмогойское сельское общество. Въ немъ 330 дворовъ, 400 жилыхъ строеній, 3 мельницы, 336 хозяйствъ, наличнаго населенія 1690 (840 м. п.), въ т. числѣ ссыльно-поселенцевъ 126 (65 м. п.), новоселовъ 346 (174 м. п.), остальные старожилы. Въ рабочемъ возрастѣ 840 (416 м. п.). Земель во владѣніи общества болѣе 7000 дес., въ т. числѣ пахатныхъ болѣе 4500, луговыхъ 2400. Жители общества держатъ лошадей 1460 (рабочихъ 1040), крупнаго рогатаго скота 1200, мелкаго скота 3400 головъ.

Объ экономическомъ положеніи Заларинской волости имѣются слѣдующія данныя. Четыре сельскихъ общества Заларинской волости образуютъ три юридическія общины <sup>1)</sup>. Одной общей межевой дачей владѣютъ общества: Заларинское и Холмогойское; пашни входящихъ въ нихъ селеній черезполосныя, покосныя общины совпадаютъ съ сельскими обществами, лѣсомъ селенія пользуются сообща по всей своей дачѣ. Второю межевою дачею владѣетъ Кутуликское общество, селеніе коего имѣетъ свои отдѣльные выгоны, пашни и покосы, а строевымъ лѣсомъ пользуются изъ бурятскихъ дачъ, но не даромъ, а за оброкъ. Третьею межевою дачею пользуется сельское общество Головинское. Жители обѣихъ станицъ сельскаго общества, какъ казаки, такъ и крестьяне изъ казаковъ, имѣютъ черезполосныя пашни и общіе выгоны и покосы. Во всей волости по переписи 1887—88 г. было 1510 дворовъ и до 1800 жилыхъ строеній. Наличныхъ жителей 7810 об. п. (4010 м. п.), въ т. числѣ ссыльно-поселенцевъ 520 (270 м. п.), новоселовъ 320 (180 м. п.), казаковъ 170 (100 м. п.), остальные старожилы. Кромѣ того въ волости проживаетъ лицъ постороннихъ сельскому населенію 834, такъ-что все населеніе волости составляетъ болѣе 8640 д. об. п. Приписное населеніе послѣ X-ой ревизіи въ теченіи 30-лѣтняго періода увеличилось на 63% <sup>2)</sup>. Наличныхъ хозяйствъ было до 1500, лицъ въ рабочемъ возрастѣ 3725 (1875 м. п.). Въ числѣ хозяйствъ было: съ 1 работникомъ 1016 (изъ нихъ 230 имѣли и подростковъ), съ 2-мя 260, съ 3-мя и болѣе 70. Въ остальныхъ 153 хозяйствахъ не было взрослыхъ работниковъ, но въ 90 изъ нихъ были подростки (полуроботники). Въ числѣ жителей волости грамотныхъ, полу-

<sup>1)</sup> Смирновъ, Матер. I. с. Т. II, вып. 3-й, стр. 71.

<sup>2)</sup> Астиревъ, Матер. I. с. Т. II, вып. 2-й, стр. 96.

грамотныхъ и учащихся было 490 мужчинъ и 47 женщинъ. Въ Заларинской вол. встрѣчаются и зобатые, а именно по р. Заларѣ, въ селѣ Кутуликѣ, и въ дер. Сартовской по р. Кутулику. Земель въ непосредственномъ пользованіи сельскаго населенія волости кромѣ лѣсовъ 31460 десятинъ, т. е. около 8 дес. на душу м. п., до 17 на способнаго работника, и 21 на хозяйство. Пахатныхъ земель въ волости 21700 дес. но подѣ действительную запашкою состоитъ 54<sup>0</sup>/<sub>100</sub> этихъ земель, т. е. менѣе 3 дес. на душу м. п., по 6<sup>1</sup>/<sub>2</sub> дес. на взрослого работника, около 8 дес. на хозяйство. На каждыя 100 десятинъ посѣва засѣвается: рожью 50 дес. (озимой 31 ярицею 15), овсомъ 27 дес., 18 пшеницею. Чистый сборъ хлѣбовъ въ волости составляетъ: пшеницы 53 пуд., ржи 53 пуд., овса 53 пуд. съ казенной десятины. По развитію хуторскаго хозяйства волость занимаетъ первое мѣсто во всей губерніи, такъ какъ около 46<sup>0</sup>/<sub>100</sub> всѣхъ ея дворовъ размѣщаются въ заимкахъ. Покосной земли въ волости до 9800 дес. что составитъ по 6<sup>1</sup>/<sub>2</sub> дес. на хозяйство. Утуговъ совсѣтъ нѣтъ. Къ счастью при благопріятномъ положеніи волости, окруженной землями богатыхъ покосами инородцевъ Балганскаго и Аларскаго вѣдомствъ, Заларинскіе крестьяне арендуютъ за предѣлами своей волости столько покосовъ, что на каждыя 100 дес. собственныхъ покосовъ у нихъ приходится еще 100 дес. арендованныхъ. Крестьяне волости держатъ лошадей 5640 (4170 рабочихъ), крупнаго рогатаго скота 5230, мелкаго 11700. Такимъ образомъ рабочихъ лошадей на взрослого работника приходится болѣе 2-хъ всѣхъ же лошадей на хозяйство около 4-хъ, крупнаго рогатаго скота болѣе 3-хъ, а мелкаго около 8 головъ.

Лѣса въ межевыхъ дачахъ Заларинской волости до 60 т. дес. но крестьяне волости рубятъ строевой лѣсъ не только въ своихъ дачахъ, но и въ сосѣднихъ бурятскихъ. Лѣсные промыслы въ Заларинской волости болѣе развиты, чѣмъ въ Заминской, а именно изъ 1500 хозяйствъ лѣсными промыслами

занимаются 156 хозяйств<sup>1)</sup>. Въ волости заготавливается для продажи до 280 саж. дровъ для винокуреннаго завода и квартир. Нѣкоторые крестьяне волости гонятъ смолу, а также собираютъ съ деревьевъ сырую смолу. Но еще большее количество занимается сидкою дегтя (37 человекъ), бондарнымъ промысломъ (15), столярнымъ (8), плотничествомъ (до 50), а отчасти выдѣлкою колесъ и телѣгъ. Вообще же въ волости 50% всѣхъ способныхъ работниковъ занимаются и промыслами. Однимъ извозомъ занимается одна треть всѣхъ способныхъ работниковъ, а именно до 500 человекъ. Охотою и рыбнымъ промысломъ занимаются въ волости по 12 человекъ. Между остальными промыслами можно назвать еще выдѣлку шкуръ (5), сапожное ремесло (17), кузнечество (27), выдѣлку гонимыхъ издѣлій (8), портное ремесло (10).

Мірскіе доходы Заларинской вол. простираются до 5500 р. въ годъ<sup>2)</sup>, въ т. числѣ 3.975 р. съ питейн. заведеній, 990 р. съ базаровъ, лавокъ и вѣсовъ. Казенныхъ податей сходить въ волости 11.900 р. Волостныхъ расходовъ 3.135 р., въ т. числѣ на писаря и канцелярс. расходы 1.640 р., врачебную часть 864 р., содержаніе тюрьмы 305 р. Сельскихъ расходовъ 5.800 р., въ т. числѣ на писарей и канцелярс. расходы 1.880 р., училища 1.450 руб., земскія квартиры 600 р., церковные расходы 700 р., гоньбу 250 р., оспопрививаніе 130 р. Суммируя подати, волостные и сельскіе расходы, находимъ, что съ каждой души м. п. кромѣ натуральныхъ повинностей сходить по 5 р.

Черемховская волость занимала до 1888 года территорию, выходящую съ одной стороны на р. Бѣлую, между устьями рѣкъ Голумети и Малой Бѣлой, а съ другой простирающуюся на с.-в. до Ангары черезъ волнистую равнину, впадающую среднее теченіе Бѣлой отъ Ангары. Часть вла-

<sup>1)</sup> О гонимыхъ промыслахъ волости см. Н. И. Стрежневъ въ Матер. Иркутск. г. I. с. Т. II, вып. 4-й, стр. 327, 332, 356, 362.  
<sup>2)</sup> Астиревъ, Матер. I. с. Т. II, вып. 5-й, стр. 20, 66.



дѣній Черемховской волости находится въ однихъ и тѣхъ же межевыхъ дачахъ съ владѣніями Бѣльской волости. Всѣ межевыхъ дачъ, въ которыхъ размѣщаются обѣ волости, занимаютъ обширное пространство въ 147 тысячъ десятинъ. Съ физическимъ строеніемъ площади, занимаемой Черемховскою волостью, и особливо съ физическими и климатическими условіями Черемховскаго плоскогорья мы уже ознакомились выше, здѣсь остается намъ говорить только о размѣщеніи экономическомъ положеніи населенія волости.

На описанномъ выше волнистомъ и по свойствамъ своей почвы плодородномъ плоскогорьѣ, кромѣ села Черемховскаго его заимокъ и Черемховской образцовой фермы расположены еще селеніе Табукское съ выселкомъ Нены, а на верховьяхъ текущей съ этого плоскогорья рѣчки Булая расположено селеніе Верхне-Булайское той же волости, между тѣмъ какъ остальные селенія волости, въ прежнемъ е составѣ, Гымыльское, Кекурское и Мотское уже находятся на самой Бѣлой, въ близкомъ сосѣдствѣ съ селеніями Бѣльской волости, къ которой Гымыльская группа отнесена въ 1889 году, при отдѣленіи отъ Бѣльской волости вновь образованной Голуметской.

Въ прежнемъ составѣ Черемховской волости было сельскихъ общества: Черемховское, Табукское, Верхне-Булайское и Гымыльское. Въ Черемховскомъ обществѣ два селенія: 1) Село Черемховское (34°14' с. ш. и 102°58' в. л. отъ Грив.) состоитъ изъ 300 дворовъ, имѣетъ 340 жилыхъ строеній, въ коихъ размѣщается до 500 хозяйствъ и 1,92 жит. (950 м. п.). Въ селѣ есть церковь, школа съ 57 учащимися, богадѣльня, волостное правленіе, 15 питейныхъ заведеній, 25 лавокъ, 11 кузницъ, 1 мельница на земляхъ сельскаго общества и ежедневные базары. Впрочемъ по буднямъ на нихъ нѣтъ никакого пріѣзда, но по воскресеньямъ съѣзжаются не только заимочные но и изъ сосѣднихъ деревень, а также изъ волостей Заларинской, Бѣльской, Иди-

ской, Мальтинской и Тельминской, а также изъ инородческих вѣдомствъ Балаганскаго, Аларскаго и Китойскаго. Наибольше оживленная торговля происходитъ въ октябрѣ, передъ праздникомъ Казанской Божіей Матери, отъ 10 до 22 окт. Въ это время сюда привозится изъ Гымыли, Ирети и Бѣльска пшеница, а съ Покрова и до холодовъ картофель, капуста, лукъ и др. овощи; изъ Тельмы, Тайтурки и Мотовскаго передъ Пасхой колеса и лопаты, а около Прокофьева дня грабли и ялы. Здѣсь идетъ торговля ягодами (черемухой, голубикой, черникой, смородиной и клюквой), домашней птицей (курами, индѣйками, гусями и утками), а иногда и дичью; продаются также сѣно, солома и мясо, а покупаются крестьянами ситцы, мелочной товаръ и привозимый изъ Бѣльской волости кожевенный товаръ. Радиусъ района тяготѣнія базаровъ до 100 вер. Общественные вѣсы сдаются здѣсь въ аренду отъ 300 до 400 руб. Такимъ образомъ по размѣрамъ своимъ здѣшніе базары изъ сельскихъ базаровъ Иркутской губерніи уступаютъ только Тольскимъ. Съ 1846 г. здѣсь утверждены двѣ ярмарки: съ 1 по 15 іюня и съ 15 окт. по 1 ноября; но фактически существуетъ только вторая, да и то не совсѣмъ въ утвержденные сроки <sup>1)</sup>. 2-е селеніе Черемховскаго сельскаго общества деревня 2) Магаровская находится въ 20 вер. отъ с. Черемховскаго на самой Ангарѣ и имѣетъ 39 хозяйствъ и 240 жит. (121 м. п.). Остальное населеніе сельскаго общества размѣщается въ разогочисленныхъ заимкахъ, изъ коихъ самая значительная и отдаленная (Грищѣва), въ 36 вер. отъ Черемховскаго, простирается уже въ селеніе съ 36 хозяйствами и 214 жит. (110 м. п.). Во всемъ Черемховскомъ сельскомъ обществѣ 745 дворовъ, 860 жилыхъ строеній, 15 питейныхъ заведеній, 25 лавокъ, 1 мельница, 11 кузницъ; жителей 4.080 об. п. (около 2.100 м. п.), въ т. числѣ ссыльно поселенцевъ 635 (340 м. п.), новоселовъ 570 (300 м. п.), остальные

<sup>1)</sup> Личковъ, Матер. I. с. Т. II, вып. 4, стр. 252, 253.

старожилы. Хозяйствъ до 800, лицъ въ рабочемъ возрастѣ 1.810 (904 м. п.). Въ пользованіи крестьянъ 16.850 дес. въ т. числѣ пахатной земли 10.830, луговой 4.800. Скота крестьяне держатъ: лошадей 2.800 (1.940 рабочихъ), крупнаго рогатаго 2.140, мелкаго скота до 7.200 головъ. На Черемховской фермѣ производились М. А. Шестаковымъ метеорологическія наблюденія съ 12 авг. по 12 декабря 1873 года и съ 13 янв. 1874 по 22 мая 1875, знакомящія насъ съ климатическими условіями плоскогорья; объ этихъ наблюденіяхъ мы будемъ говорить въ своемъ мѣстѣ. Въ Табукскомъ сельскомъ обществѣ находится два селенія: 3) дер. Табукская, въ 21 вер. къ ю.-ю.-в. отъ Черемховскаго, состоитъ изъ 50 хозяйствъ и 360 жит. (160 м. п.). 4) выселокъ Нены, въ 17 вер. къ ю.-в. отъ Черемховскаго и 11 вер. отъ Табукскаго, состоитъ изъ 53 хозяйствъ и 360 жит. (184 м. п.). Во всемъ Табукскомъ обществѣ 156 дворовъ, до 190 жилыхъ строеній, 3 питьевыхъ заведенія, 3 лавки, 1 кузница. Жителей 960 (до 490 м. п.), почти исключительно старожиловъ. Хозяйствъ до 160, лицъ въ рабочемъ возрастѣ до 440 (220 м. п.). Въ пользованіи крестьянъ болѣе 3.800 дес. земли, въ т. числѣ пахатной болѣе 2.600, луговой до 900 дес. Скота крестьяне держатъ: лошадей 550 (410 рабочихъ), крупнаго рогатаго 300, мелкаго до 1.510 головъ. Въ Верхне-Булайскомъ сельскомъ обществѣ только одно селеніе 5) село Верхне-Булайское на ручьѣ Булаѣ въ 11 вер. отъ Черемховскаго, состоитъ съ займами изъ 230 дворовъ изъ коихъ въ самомъ селеніи 186. Жилыхъ строеній въ сельскомъ обществѣ 270 (въ самомъ селѣ до 220), 2 питьевыхъ заведенія, 3 лавки, 6 кузницъ. Въ селѣ есть церковь и церковно-приходская школа съ 43 учащимися, а также богадѣльня. Жителей 1.275 (636 м. п.), въ т. числѣ ссыльнопоселенцевъ 80 (44 м. п.), новоселовъ 118 (56 м. п.) остальные старожилы. Хозяйствъ 230, лицъ въ рабочемъ возрастѣ до 600 (296 м. п.). Въ пользованіи крестьянъ

3.060 дес., въ т. ч. пахатной 3.240, луговой 1.550. Скота крестьяне держатъ: лошадей 700 (540 рабочихъ), крупнаго рогатаго 730, мелкаго скота 2.330. Въ Гымильскомъ сельскомъ обществѣ кромѣ занимаеъ 5 селеній: 6) село Гымильское на лѣв. берегу Бѣлой, въ 34 верстахъ отъ Черемховскаго, имѣетъ церковь, 93 хозяйства и 416 жителей (196 м. п.); 7) деревня Тапкинская въ 2 вер. отъ Гымильскаго, въ 30 хозяйствами и 190 жит. (96 м. п.); 8) дер. Кекурская, въ 4 вер. отъ Гымильскаго, на прав. берегу Бѣлой, съ 34 хозяйствами и 174 жит. (90 м. п.); 9) дер. Мотская въ 6 вер. отъ Гымильскаго, съ 70 хозяйствами и 344 жит. (170 м. п.); 10) дер. Прокофьевская съ 32 хозяйствами и 156 жителями (81 м. п.). Остальные жители общества живутъ въ занимахъ. Вообще же въ обществѣ 400 дворовъ, 464 жилыхъ строенія, 4 питейныя заведенія, 4 лавки, 1 мельница, 1 кузница. Жителей 2.200 (1.015 м. п.), изъ нихъ только поселенцевъ 134 (67 м. п.), новоселовъ 34 (20 м. п.), остальные старожилы. Хозяйствъ 365, лицъ въ рабочемъ возрастѣ 970 (до 480 м. п.). Въ пользованіи крестьянъ сельскаго общества до 8.500 дес., въ т. числѣ пахатной 5.260, луговой 2.430. Скота крестьяне держатъ: лошадей 1.150 (840 рабочихъ), крупнаго рогатаго 1.130, мелкаго скота 3.560 головъ.

Территорія волости, при плодородной почвѣ и удовлетвори-  
тельномъ климатѣ, а также при своемъ положеніи на глав-  
номъ Сибирскомъ трактѣ находится въ благопріятныхъ  
экономическихъ условіяхъ. Объ экономическомъ положеніи  
населенія волости можно судить по слѣдующимъ даннымъ.  
Во всей волости къ 1888 году было 1.530 дворовъ и 1.780  
жилыхъ строеній. Изъ числа дворовъ 42% расположены въ  
мынкахъ (отдѣльныхъ хуторахъ), что указываетъ на необык-  
новенное развитіе въ волости хуторскаго хозяйства, по ко-  
торому Черемховская волость занимаетъ второе мѣсто въ  
Балаганскомъ округѣ и цѣлой губерніи. Наличныхъ жителей

въ волости по переписи 1887—88 г. <sup>1)</sup> 8.340 об. п. (4.22 м. п.), въ т. числѣ ссильно поселенцевъ 850 (450 м. п. новоселовъ до 730 (380 м. п.), остальные старожилы. Сверх того проживало въ волости лицъ постороннихъ сельском сословію 700 об. п., такъ-что все населеніе волости составляло 9.040 жит. Приписное населеніе волости со временъ Х-ой ревизіи въ 30 лѣтъ приросло на 43%. Хозяйствъ было 1.560, лицъ въ рабочемъ возрастѣ 3.820 (1,900 м. п.). Въ числѣ хозяйствъ было: съ 1 работникомъ 980 (въ т. числѣ до 240 имѣли еще и подростковъ), съ 2-мя 260, съ 3-мя болѣе до 100. Остальные 220 хозяйствъ были безъ взрослыхъ работниковъ, но въ половинѣ ихъ были подростки. Въ числѣ жителей волости было грамотныхъ, полуграмотныхъ и учащихся 508 м. п. и 43 женскаго. Въ Гымыльскомъ обществѣ Черемховской волости по р. Бѣлой какъ и въ сосѣдней Бѣлоской волости развиты зобы, а параллельно съ этимъ является и развитіе идиотизма и кретинизма. Зобы развиты въ волости также и по р. Ангартъ, а именно замѣчены въ селеніи Макаровскомъ. По свѣдѣніямъ, собраннымъ Щановымъ, въ всѣхъ 15 селеніяхъ Черемховской волости было зобатыхъ 68 мужч. и 300 женщинъ <sup>2)</sup>).

Земель кромѣ лѣса въ дѣйствительномъ пользованіи крестьянъ всей волости (въ прежнемъ ея составѣ) 34.200 дес. т. е. болѣе 8 дес. на душу м. п., 18 на работника, 22 на хозяйство,—пропорціи, нѣсколько болѣе благоприятныя чѣмъ въ сосѣднихъ Бѣлоской и Мальтинской волостяхъ. Черемховское сельское общество составляетъ совершенно самостоятельную юридическую общину, но поселки его владѣютъ падами черезполосно и между собою и даже отчасти съ Аларскими бурятами, въ дачахъ которыхъ есть Черемховскія рас-

<sup>1)</sup> Астыревъ, Матер. I. с. Т. II, вып. 2-й, стр. 71, 72.

<sup>2)</sup> О Черемховск. вол. см. Матер. I. с. Т. I, Балаганск. окр., стр. 146.

чисти и на оборотъ. Относительно пользованія покосами Черемховское общество образуетъ одну отдѣльную дачу. За остальные сельскія общества волости (Табуцкое, Булайское и Гимильское) владѣютъ пашнями черезполосно, а покосами совмѣстно съ сельскими обществами Бѣльской волости. Очень можетъ быть, что присоединеніе Гимильскаго общества къ Бѣльской волости въ новомъ ея составѣ будетъ способствовать болѣе правильному разверстанію земель между Бѣльской и Черемховскою волостями, такъ какъ у послѣдней уже пашни земель въ долинѣ р. Бѣлой не останется.

Пахатныхъ земель въ Черемховской волости прежняго состава было 22 тыс. десятинъ; изъ нихъ засѣвается 53%, т. е. посѣвовъ приходится менѣе  $2\frac{1}{2}$  дес. на душу м. п., около 6 дес. на работника и  $7\frac{1}{2}$  дес. на хозяйство, т. е. значительно болѣе чѣмъ въ сосѣднихъ Бѣльской и Мальтинской волостяхъ. На каждые 100 дес. запашки высѣвается рожь 53 дес. (35 озимую и 18 ярицею), 18 пшеницею, 1 овсомъ, 4 гречихою и 3 ячменемъ. Кромѣ того высѣвается еще нѣсколько проса, картофеля и конопли. Чистый сборъ посѣвовъ въ волости: пшеницы 48, ржи 51, овса 68 пуд. съ каждой десятины, т. е. нѣсколько болѣе чѣмъ въ Бѣльской и Мальтинской волостяхъ, что и указываетъ на болѣе благоприятныя климатическія и почвенныя условія. Луговой земли въ волости 9.700 дес., что составитъ по  $6\frac{1}{2}$  дес. на хозяйство, т. е. нѣсколько болѣе чѣмъ въ Бѣльской и Мальтинской волостяхъ. Покосы вообще хорошаго качества; при Черемховскомъ есть и утуги, общее количество коихъ во всей волости не превосходитъ 124 дес. При всемъ томъ количество покосовъ было бы недостаточно, еслибы крестьяне волости, при своемъ сосѣдствѣ съ землями богатыхъ покосами владѣльцевъ Аларскаго и Балаганскаго вѣдомствъ, не арендовали у нихъ покосовъ въ такомъ количествѣ, что на каждые 100 дес. собственныхъ покосовъ Черемховскіе крестьяне

арендуютъ еще 88 десятинъ внѣ предѣловъ волости <sup>1)</sup>. Крестьяне волости держатъ скота: лошадей 5.200 (3.750 рабочихъ), крупнаго рогатаго 4.000, мелкаго скота 14.500 головъ (въ томъ числѣ овецъ до 8.000, свиней до 3.900). Такимъ образомъ рабочихъ лошадей приходится на работника по 2, а всѣхъ лошадей на хозяйство  $3\frac{1}{2}$ , какъ и в Бѣльской волости; крупнаго рогатаго скота около 3, а мелкаго болѣе 9 на хозяйство, т. е. немного болѣе чѣмъ в Бѣльской волости.

Лѣсомъ крестьяне Черемховской волости пользуются кроме собственной дачи въ общихъ дачахъ, отведенныхъ волостямъ Бѣльской и Черемховской, такъ какъ количество лѣсовъ въ этихъ дачахъ простирается до 51 тыс. дес. Но собственная Черемховская волость лѣсомъ не богата; дровяной лѣсъ хотя имѣется въ ея дачахъ, но такъ далекъ отъ нѣкоторыхъ селеній (напр. отъ Черемхова отъ 15 до 20 верстъ), что крестьяне волости предпочитаютъ рубить дрова у сосѣднихъ брать за угощеніе водкою. Строевой лѣсъ берутъ на разстояніи отъ 8 до 30 верстъ, большею частью въ бурятскихъ дачахъ напр. Большой Бѣлой, по которой и сплавляютъ его въ Ангара для продажи идинскимъ и др. крестьянамъ <sup>2)</sup>. Лѣсные промыслы Черемховской волости гораздо менѣе развиты чѣмъ въ Бѣльской. Звѣринымъ промысломъ въ волости занимается не болѣе 10 человекъ. Изъ 1.550 способныхъ работниковъ волости не болѣе 90 заняты лѣснымъ промысломъ. Да и вообще и земледѣльческіе промыслы не особенно развиты въ волости. Не болѣе 33% всѣхъ способныхъ работниковъ занимается въ волости сверхъ земледѣлія и промыслами <sup>3)</sup>. Занятія относятся преимущественно къ извозу (12%) и кустарнымъ

---

<sup>1)</sup> Шешуковъ, Матер. I. с. Т. II, вып. 3-й, стр. 290.

<sup>2)</sup> Смирновъ, Матер. I. с. Т. II, вып. 5-й, стр. 401.

<sup>3)</sup> Личковъ, Матер. I. с. Т. II, вып. 4-й, стр. 318.

промысламъ (10%). Въ 1888 г. въ предѣлахъ волости занималось плотничествомъ 40 человѣкъ, пилкой лѣса 15, дегтирнымъ промысломъ 9, бондарствомъ 6, столярнымъ дѣломъ 5; сборомъ кедровыхъ орѣховъ 32, охотою 10. Саножниковъ было 13, кузнецовъ 13, портняжествомъ занималось 11 и т. д. Извозомъ занимаются до 180 дворовъ волости, а торговлею 44 двора. Впослѣдствіи въ Черемховской волости можетъ развиться и каменноугольное производство, такъ какъ пласты именнаго угля до 2 арш. мощности найдены были въ колюдѣ кузнеца Клейменова близъ кладбища с. Черемховскаго.

Мірскіе доходы Черемховской волости простираются до 4500 р. въ годъ, въ томъ числѣ питейныхъ 1600 р., да съ базаровъ, лавовъ и вѣсовъ 2.640 р. Казенныхъ податей съ волости сходить 13.290 р. Волостныхъ расходовъ 4.350 р., въ томъ числѣ на волостнаго писаря и канцелярскіе расходы 2.000 р., на волостнаго старшину и правленіе 240 р., врачебные расходы 980 р. Сельскихъ расходовъ 5.650 р., въ томъ числѣ на сельскихъ писарей 2.440 р., на училище 450 р., на земскія квартиры 550 р., на церковь и духовенство 710 р., на оспопрививаніе 245 р. Если суммировать подати, волостные и сельскіе расходы, то окажется, что съ каждой души м. п., кромѣ натуральныхъ повинностей, сходится по 5 р. 50 к.

Мальтинская волость Иркутскаго уѣзда расположена вдоль нижняго теченія р. Бѣлой до самой р. Ангары, по обѣ стороны Бѣлой до границы Иркутскаго округа, такъ-что  $\frac{2}{3}$  территоріи волости, пересѣкаемой большимъ Сибирскимъ трактомъ, находятся на правой сторонѣ Бѣлой. Территорія волости занимаетъ 16 межевыхъ дачъ, общее пространство которыхъ составляетъ 76.300 дес. Волость состоитъ изъ 6 сельскихъ обществъ: Узколугскаго, Холмушинскаго, Тайтурина, Бадайскаго, Мальтинскаго и Буретскаго. Изъ 6 сельскихъ обществъ волости 5 живутъ вдоль теченія р. Бѣлой на лѣвомъ ея берегу и одно только на Ангартѣ, въ десяткѣ верстъ ниже впаденія



въ нее Бѣлой. Селенія же волости, въ числѣ 9 <sup>1)</sup>, мы приведемъ въ порядкѣ ихъ расположенія сверху внизъ по теченію рѣкъ: 1) Село Узкій лугъ расположено на лѣв. берегу Бѣлой ниже впаденія въ Бѣлую р. Хайты въ 19 вер. выше с. Мальты. Селеніе Узкій лугъ состоитъ изъ 270 дворовъ, изъ коихъ 45 разбросаны въ заимкахъ. Жилыхъ строеній до 340 (50 въ заимкахъ), есть церковь и школа съ 36 учащимися, учр. въ 1882 г., 4 питейн. заведенія, 3 лавки, 4 кузницы. Близъ села находится фарфоровый заводъ братьевъ Переваловыхъ. Жителей болѣе 1434 (735 м. п.), изъ нихъ ссыльно-поселенцевъ 74 (48 м. п.), новоселовъ болѣе 280 (146 м. п.), остальные старожилы. Хозяйствъ болѣе 300, лицъ въ рабочемъ возрастѣ 660 (340 м. п.). Въ пользованіи крестьянъ свыше 5400 дес. земли, въ томъ числѣ пахатной 3280, луговой 1940. Скота крестьяне держатъ: лошадей 860 (630 рабочихъ), крупнаго рогатаго 870, мелкаго скота 1840 головъ. 2) дер. Холмушинская, также на лѣв. берегу Бѣлой, верстахъ въ 5 ниже Узкаго луга и 14 отъ Мальты, состоитъ изъ 84 дворовъ и до 110 жилыхъ строеній, имѣетъ 1 питейн. заведеніе, 2 лавки. Жителей немного болѣе 540 (280 м. п.), въ томъ числѣ ссыльно-поселенцевъ 28 (16 м. п.), новоселовъ 37 (16 м. п.), остальные старожилы. Хозяйствъ 152, лицъ въ рабочемъ возрастѣ 265 (130 м. п.). Въ пользованіи крестьянъ состоитъ до 2300 дес. земли, въ томъ числѣ пахатной 1280, луговой 930 десятинъ. Скота крестьяне держатъ: лошадей болѣе 300 (210 рабочихъ), крупнаго рогатаго 290, мелкаго скота болѣе 600. 3) Село Тайтурское верстахъ въ 9 ниже предшедшаго и 5 выше Мальты, состоитъ изъ 310 хозяйствъ и 1670 жит. (853 м. п.), имѣетъ церковь, школу съ 41 учащимися, учрежденную въ 1886 г., богадѣльню. Въ составъ Тайтурскаго сельскаго общества вхо-

---

<sup>1)</sup> О селеніяхъ Мальтинск. вол. Матер. I. с. Т. I, см. списокъ насел. мѣстъ стр. 3.

дять еще половина деревни Половинной, дер. Касьяновская и нѣсколько займокъ. Въ обществѣ 450 дворовъ, 520 жилыхъ строеній, 8 питейн. заведеній, 5 лавокъ, 6 мельницъ, 16 кузницъ. Жителей 2050 об. п. (1036 м. п.), въ томъ числѣ ссыльно-поселенцевъ 180 (100 м. п.), новоселовъ 430 (205 м. п.), остальные старожилы. Между жителями этими есть и раскольники, а именно субботники (въ числѣ 13 хозяйствъ и 90 д. об. п.), сосланные еще сюда въ 20-хъ годахъ нынѣшняго столѣтія. Всѣхъ хозяйствъ болѣе 420, лицъ въ рабочемъ возрастѣ 970 (500 м. п.). Въ пользованіи крестьянъ состоятъ 7500 дес. земли, въ томъ числѣ пахатной 5240, луговой 800 дес. Скота содержится: лошадей 1480 (1140 рабочихъ), крупнаго рогатаго болѣе 700 головъ, мелкаго скота до 1630.

4) Село Мальта или Мальтинское, въ 4 вер. ниже по Бѣлой, на пересѣченіи ея Сибирскимъ трактомъ, имѣетъ 344 хозяйства и 1460 жит. (740 м. п.), церковь, школу съ 64 учащимися, учрежденную въ 1870 г., богадѣльню и волостное правленіе. Въ составъ Мальтинскаго сельскаго общества входитъ половина дер. Головинской и дер. Лужки. Во всемъ сельскомъ обществѣ 280 дворовъ, 356 жилыхъ строеній, 7 питейныхъ заведеній, 1 лавка, 6 мельницъ, 5 кузницъ, нѣсколько казенныхъ заводовъ. Жителей до 1600 (740 м. п.), въ томъ числѣ ссыльно-поселенцевъ до 150 (77 м. п.), новоселовъ 245, 126 м. п.), остальные старожилы. Хозяйствъ 335, лицъ въ рабочемъ возрастѣ 715 (370 м. п.). Въ пользованіи крестьянъ до 5500 дес. земли, въ томъ числѣ пахатной 3330 дес., луговой до 1900. Скота у крестьянъ: лошадей 860 (690 рабочихъ), крупнаго рогатаго 630, мелкаго до 1500 головъ.

5) Село Бадайское находится въ 7 верстахъ ниже Мальтинскаго, уже 10 вер. не доходя до устья Бѣлой. Бадайское состоитъ, вмѣстѣ съ займой Кочериковой, изъ 165 дворовъ изъ коихъ 15 въ займкахъ), имѣетъ 216 жилыхъ строеній, церковь, богадѣльню, 1 лавку, 3 питейн. заведенія, 5 кузницъ. Жителей въ немъ 914 (460 м. п.), въ томъ числѣ ссыльно-посе-

ленцевъ 57 (28 м. п.), новоселовъ 118 (67 м. п.), остальные старожилы. Хозяйствъ 180, лицъ въ рабочемъ возрастѣ 430 (до 240 м. п.), крестьяне владѣютъ 3240 дес. земли въ томъ числѣ пахатной до 2400, луговой 740. Скота у крестьянъ: лошадей 610 (500 рабочихъ), крупнаго рогатаго 450, мелкаго скота 1070. 6) деревня Лужки, входящая въ составъ Мальтинскаго сельскаго общества, находится на сибирскомъ трактѣ, въ 4 вер. отъ Мальты, и имѣетъ 13 хозяйствъ и 65 жит. (35 м. п.). 7) дер. Половинская, входящая на половину въ составъ Мальтинскаго и на половину въ составъ Тайтурскаго общества, находится на сибирскомъ трактѣ и отстоитъ уже въ 29 вер. отъ Мальты, имѣетъ 3 хозяйствъ и болѣе 170 жит. (86 м. п.). 8) дер. Касьяновская, входящая въ составъ Тайтурскаго сельскаго общества, находится также на сибирскомъ трактѣ, въ 32 вер. отъ Мальты и имѣетъ 17 хозяйствъ и до 100 жит. (49 м. п.). 9) дер. Бретская есть единственное селеніе волости, расположенное въ Ангартѣ. Она состоитъ изъ 70 дворовъ, имѣетъ 80 жилыхъ строеній, 2 питейн. зав., 2 лавки, 2 кузницы и 408 жит. (200 м. п. въ томъ числѣ ссыльно-поселенцевъ 34 (23 м. п.), новоселовъ 60 (30 м. п.), остальные старожилы. Хозяйствъ 85, лицъ въ рабочемъ возрастѣ 200 (102 м. п.), земли 1820 дес., въ томъ числѣ пахатной 1270, луговой 460. Скота у крестьянъ: лошадей до 250 (200 рабочихъ), крупнаго рогатаго 170, мелкаго скота 430 головъ.

Объ экономическомъ положеніи всей волости имѣются слѣдующія свѣдѣнія <sup>1)</sup>. Во всей волости по переписи 1887—88 было дворовъ 1325, изъ коихъ 17% были разбросаны въ запустѣлыхъ мѣстахъ, а остальные находятся въ селеніяхъ. Жилыхъ строеній 1620, наличныхъ жителей 6600 (3360 м. п.), въ томъ числѣ ссыльно-поселенцевъ 520 (290 м. п.), новоселовъ 1170 (590 м. п.), остальные старожилы. Кромѣ того въ вѣ

<sup>1)</sup> Матер. I. с. Т. I, стр. 74—89.

жесты проживаютъ 325 лицъ постороннихъ, такъ-что все население волости состоитъ изъ 6925 д. об. п. Приписное население волости съ X-ой ревизіи прирасло въ 30 лѣтъ на 50%. Хозяйствъ 1400, лицъ въ рабочемъ возрастѣ 3250 (1180 м. п.), грамотныхъ, полуграмотныхъ и учащихся въ волости было около 60 м. п. и 60 женскаго. Изъ 1400 хозяйствъ съ 1 работникомъ 910 (въ томъ числѣ у 200 были и подростки) съ 2 работниками 240, съ 3 и болѣе 60. У остальныхъ 186 хозяйствъ взрослыхъ работниковъ вовсе не было, но почти половины изъ нихъ имѣлись подростки (полуроботники). Земель въ пользованіи крестьянъ волости было до 25800 дес., т. е.  $7\frac{3}{4}$  дес. на душу м. п., 15 на взрослого работника и болѣе 18 на хозяйство. Два изъ шести сельскихъ обществъ Мальтинской волости, а именно Узколугское и Холмушинское, составляютъ по землевладѣнію одну юридическую общину, эти надѣльными землями (кромѣ лѣса) пользуются отдѣльно одно отъ другаго; всѣ остальные 4 сельскихъ общества (Мальтинское, Тайтурское, Бадайское и Буретское) составляютъ отдѣльныя юридическія общины. У Мальтинской и Бадайской общинъ происходятъ съ 1878 г. поземельные споры изъ-за граничной полосы верстъ въ 10 длины и только сажень въ ширины.

Пахатныхъ земель въ Мальтинской волости болѣе 17 тыс. десятинъ, изъ нихъ засѣвается 53%, т. е. посѣва приходится болѣе  $2\frac{1}{2}$  дес. на д. м. п., болѣе 5 дес. на работника и 6 на хозяйство. На каждыя 100 десятинъ запашки высѣвается: рожь 57 дес. (25 озимую и 32 ярицею), 17 пшеницею, 15 гречихою, 3 ячменемъ и менѣе 3 гречихою. Кромѣ того крестьяне сѣютъ еще очень немного гороха, проса, конопли и люфеля. Поля въ волости уже начинаютъ уваживать, но уваживаніе это не представляетъ сплошнаго явленія.

Чистый сборъ главныхъ хлѣбовъ составляетъ: пшеницы 44 пуд., ржи 44 пуд. и овса 47 пуд. съ десятины. Хуторское хозяйство въ Мальтинской волости имѣетъ еще посредствен-

ное развитіе, такъ какъ 17<sup>0</sup>/<sub>0</sub> всѣхъ дворовъ волости размѣщены въ заимкахъ <sup>1)</sup>. Въ волости были вводимы начальствомъ общественныя запашки въ сел. Мальтѣ и Бурети, но онѣ не удались, потому что съ этою запашкой было много хлопотъ и убытковъ и потому что ее трудно было устроить міромъ <sup>2)</sup> а главнымъ образомъ потому, что крестьяне не терпятъ обязательнаго труда, подчиненнаго цѣлому міру и считаютъ даже такую форму труда невозможною.

Луговой земли въ волости 7900 дес., что и составляетъ по 5<sup>1</sup>/<sub>2</sub> дес. на хозяйство. Покосы хуже чѣмъ въ Черемховской волости, угуговъ совсѣмъ нѣтъ. Вслѣдствіе такого недостатка въ лугахъ Мальтинская волость арендуетъ покосы на значительномъ разстояніи, преимущественно по р. Малой Бѣлой, у малобѣльскихъ тунгусовъ и въ Аларскомъ вѣдомствѣ, частью же въ бѣдной покосами Черемховской волости. На каждыя 100 дес. собственныхъ покосовъ крестьяне Мальтинской волости арендуютъ за предѣлами волости 45 дес. <sup>3)</sup>; Крестьяне волости держатъ скота: лошадей 5360 (рабочихъ около 4000), крупнаго рогатаго 3100, мелкаго скота 8000. Такимъ образомъ рабочихъ лошадей приходится на работника около 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>, всѣхъ лошадей на хозяйство около 4, крупнаго рогатаго скота немного болѣе 2-хъ головъ, мелкаго скота менѣе 6 головъ. Слѣдовательно вообще крестьяне въ Мальтинской волости держатъ менѣе скота, чѣмъ въ сосѣднихъ Черемховской и даже Бѣльской волостяхъ, но лошадей въ Мальтинской волости сравнительно болѣе, что объясняется положеніемъ ея на Сибирскомъ трактѣ, пересѣкающемъ волостную территорію по самой ея срединѣ, и вслѣдствіе того развитіемъ извознаго промысла.

Лѣсомъ крестьяне Мальтинской волости пользуются

<sup>1)</sup> Астыревъ, Матер. I. с. Т. II, вып. 2-й, стр. 139.

<sup>2)</sup> Лычковъ, Матер. I. с. Т. II, вып. 3-й, стр. 252.

<sup>3)</sup> Шешуновъ, Матер. I. с. т. II, вып. 3, стр. 290.

только въ своихъ дачахъ, въ которыхъ имѣется его 27000 дес., но и въ сосѣднихъ. Дровяной лѣсъ мальтинцы рубятъ большею частью въ Усольскихъ дачахъ, платя сторожамъ отъ 10 до 15 коп. съ воза, и заготавливаютъ дрова для солеваренныхъ заводовъ Усоля и для отопленія города Балаганска ю 1000 сажень. Для винокуренныхъ заводовъ крестьяне волости обжигаютъ березовыя угля. Сверхъ того они занимаются и гонкою смолы, и для этого промысла крестьяне села Мальты собираются въ небольшія артели. За строевымъ лѣсомъ мальтинцы поднимаются по Бѣлой, рубятъ его въ Узко-лугскихъ дачахъ за оброкъ (отдай 5 р. и руби сколько хочешь). Лѣсъ этотъ мальтинцы сплавляютъ по Бѣлой на 25 до 60 верстъ на Ангари. При всемъ томъ по разлитію лѣсныхъ промысловъ Мальтинская волость занимаетъ одно изъ послѣднихъ мѣстъ между волостями Иркутскаго округа, такъ какъ лѣсными промыслами въ волости занимаются только 190 хозяйствъ, т. е. 13% всѣхъ хозяйствъ (еще менѣе въ русской Тункинской волости — 92 хозяйства или около 12% и въ Тугутуйской только 7%), между тѣмъ какъ во многихъ другихъ волостяхъ этими промыслами занято 34 до 36%, а въ одной (Смоленской) даже 79%. Охотою, т. е. звѣринымъ промысломъ занимается въ волости не болѣе 30 человѣкъ, менѣе чѣмъ въ нѣкоторыхъ другихъ русскихъ волостяхъ Иркутскаго округа, гдѣ, напримѣръ въ Смоленской волости, болѣе 90, а въ Тункинской (русской) волости болѣе 110 звѣролововъ. Рыболовствомъ мальтинцы занимаются съ успѣхомъ въ р. Бѣлой, въ числѣ до 60 человѣкъ. Въ Мальтинской волости существуетъ еще одинъ промыселъ, добыча бѣлой фарфоровой и фаянсовой глины для посудныхъ фабрикъ. Такая добыча существуетъ близъ селъ Мальты, Узкаго-луга и Бадая; глина перевозится на фабрики зимою. При с. Узкомъ лугъ добывается еще и известнякъ и обжигается въ печь. Близъ деревни Бадайской по р. Бѣлой есть мѣсторожденіе огнеупорной глины, а въ верховьяхъ рч. Маль-

тинки, не болѣе 10 вер. отъ московскаго тракта, найдены залежи каменнаго угля, а именно пласть въ  $1\frac{1}{2}$  арш. толщины, занимающій площадь въ 2700 кв. саж., опредѣленную еще развѣдками 1862—84 годовъ. (см. выше стр. 338).

Вообще по развитію неземледѣльческихъ промысловъ Мальтинская волость стоитъ довольно высоко между волостями губерніи, такъ какъ въ ней 66% всѣхъ способныхъ работниковъ заняты сверхъ земледѣлія различными промыслами. Между этими промыслами наибольшее значеніе имѣютъ кустарные промыслы (25% всѣхъ способныхъ работниковъ) и извозъ (26%). Изъ кустарей было въ волости: бондарей 10, колесниковъ 15, столяровъ 9, санниковъ и телѣжниковъ 7, скорняковъ 7, сапожниковъ 13, шерстобитовъ 8, вязальщиковъ сѣтей и неводовъ 8, каменщиковъ 6, гончаровъ 8, кузнецовъ 30, пріисковыхъ рабочихъ 60, портныхъ 15.

Мальтинская волость получаетъ мірскихъ доходовъ до 5.210 руб., а именно 2.275 руб. съ питейныхъ заведеній, 1.260 р. съ каменоломень, 915 р. съ перевозовъ, 130 руб. съ мельницъ, 120 р. съ базаровъ, лавокъ, вѣсовъ и пр. Волостные расходы по волости составляютъ 4020 руб., въ томъ числѣ на жалованье волостному писарю и вообще на писменную часть 2200 р., волостную гоньбу 760 р., содержаніе училища 485 р., врачебную часть 330 р. Государственныхъ податей съ крестьянъ волости сходитъ 15.400 р. Если причислить сюда волостные и сельскіе расходы (послѣднихъ до 8.040 р.), то на наличную душу м. п. (кромѣ ссыльно-поселенцевъ) выйдетъ до 9 руб. всѣхъ сборовъ, не считая натуральныхъ повинностей.

За Мальтинскою волостью, ближе къ Иркутску, слѣдуютъ волости Тельминская и Суховская, владѣющія сообщиною семью межевными дачами, занимающими свыше 108.000 десят. Шесть сельскихъ обществъ, изъ коихъ состоитъ Тельминская волость, и семь составляющихъ Суховскую, образуютъ по своему

земельному владѣнію семь юридическихъ общинъ. Первая состоитъ изъ Тельминскаго общества и владѣтъ своею землею отдѣльно. Вторая юридическая община состоитъ изъ Больше-Жилкинскаго, Больше-Еланскаго и Култукскаго обществъ Тельминской волости и изъ Китойскаго и Целотинскаго обществъ Суховской волости. Пашни всѣхъ селеній волости, кромѣ Култукскаго, черезполосны между собою; по-прежнему каждое общество пользуется отдѣльно отъ другихъ. У дер. Жилкинской общій съ Култукомъ, а у дер. Целотинской съ Чебогорскимъ улусомъ инородцевъ Китойскаго общества. Лѣсомъ вся община пользуется совмѣстно и свободно. Третью юридическую общину составляетъ Усольско-Жилкинское общество (4 деревни) Тельминской волости, — у одной изъ деревень общества (Ружниковой) пашни покосы отдѣльныя, у остальныхъ черезполосныя. Выгонъ лѣсной только у деревень Верхне- и Нижне-Жилкинскихъ, лѣсная община пользуется въ своей дачѣ и дачѣ с. Александровскаго, строевой лѣсъ рубятъ за оброчную плату въ с. Базеѣ и Биликтуйѣ. Четвертая юридическая община состоитъ изъ обществъ Подгорно-Жилкинскаго, Зуевского и Больше-Еланскаго Суховской волости. Въ этихъ трехъ обществахъ 4 селенія. Пашни всѣхъ обществъ черезполосны; два общества образуютъ одну покосную общину; двѣ деревни Подгорно-Жилкинскаго общества имѣютъ и отдѣльные и общіе покосы. Выгонъ отдѣльный у каждого изъ селеній общины. Лѣсомъ всѣ селенія пользуются свободно и совмѣстно. Пятая и шестая юридическія общины состоятъ изъ Суховскаго и Биликтуйскаго обществъ. Оба состоятъ изъ отдѣльных фактическихъ общинъ по пользованію всѣми землями, если не считать того обстоятельства, что лѣсъ въ волостяхъ Суховской и Биликтуйской рубятъ и чужіе. Седьмая юридическая община образуется изъ Усольскаго общества. У этого общества до сихъ поръ не было никакой дачи, и



ее вымезиваютъ изъ дачь казеннаго солевареннаго завода<sup>1)</sup>.

Тельминская волость состоитъ изъ 6 сельскихъ обществъ, въ которыхъ семь селеній<sup>2)</sup>, а именно: 1) Село Тельма на большомъ сибирскомъ тракѣ, въ 61 вер. отъ Иркутска, на лѣвомъ берегу Ангары, при впаденіи въ него р. Тельмы, состоитъ изъ 370 дворовъ, 480 жилыхъ строеній, имѣетъ до 3.400 жит. (1.690 м. п.), школу съ 6 учащимися, учрежденную въ 1864 году<sup>3)</sup>, волостное правленіе, больницу, 8 питейныхъ заведеній, 13 лавокъ, 8 кузницъ, 3 мельницы на земляхъ сельскаго общества (въ которыхъ Тельма единственное селеніе), суконную и кожевенную фабрики, почтовую станцію и ежедневные базары. На базары эти привозится хлѣбъ главнымъ образомъ изъ волостей Мальтинской, Бѣльской, Идинской и изъ окрестныхъ селеній Тельминской и Суховской волостей, табакъ, лукъ и мясо. Впрочемъ ежедневный привозъ обыкновенно незначителенъ: пріѣдутъ на базарную площадь 2 или 3 воза, распродадутъ свои продукты и разѣдутся. За то осенью, вскорѣ послѣ сбора хлѣба, привозъ этотъ значителенъ. Крупныя базарныя сборища бывають и передъ праздниками, особенно передъ Рождествомъ и Казанской, тогда пріѣзжаетъ воевъ до 50 болѣе. Къ Тельминскимъ базарамъ тяготеють кромѣ своей волости: Черемховская, Идинская, Мальтинская, ближайшія части Бѣльской, Суховской и Усть-Балейской и Китайскоинородческое вѣдомство. Здѣсь, кромѣ хлѣбныхъ операцій производится покупка чаю, ситцевъ, сошниковъ, хомутовъ, всякой сбруи, также простой мебели у мѣстныхъ столяровъ.

<sup>1)</sup> Смирновъ, Матер. I. с. Т. II, вып. 3, стр. 56—58.

<sup>2)</sup> О селеніяхъ волости см. Матер. I. с. Т. I, Спис. нас. п., стр. 100 о сельскихъ общ. тамже Т. I, таблицы Иркутскаго окр., стр. 82—100.

<sup>3)</sup> О школахъ и библіотекахъ при нихъ см. Григорьева, Матер. с. Т. II, вып. 2-й, стр. 205 и прилож., стр. 8.

<sup>4)</sup> О базарахъ см. Лѣсковъ, Матер. I. с. Т. II, вып. 4-й, стр. 250.

Общественные вѣсы сдаются сельскимъ обществомъ въ аренду за 215 руб. Лицъ, принадлежащихъ къ сельскому обществу, кромѣ живущихъ въ немъ 1.200 постороннихъ (большую частью мѣщанъ, которыхъ 1.060 об. п.) до 2.180 (1.090 м. п.), въ томъ числѣ ссыльно-поселенцевъ 90 (46 м. п.), но-юсоловъ 270 (130 м. п.), остальные крестьяне-старожила. Изъ числа коренныхъ жителей состоитъ въ рабочемъ возрастѣ 1.035 (527 м. п.). Грамотныхъ, полуграмотныхъ и учащихся 282 м. п. и 64 ж. п. Хозяйствъ крестьянскихъ (т. е. не считая постороннихъ сельскому обществу жителей волости 430. Во владѣніи крестьянъ до 3.400 дес. земли, въ т. числѣ пахатной 1.680 дес., да луговой до 1.600. Скота крестьяне держатъ сравнительно мало: лошадей 466 (410 рабочихъ), крупнаго рогатаго скота 180, мелкаго скота 155 головъ. Село Тельма не имѣетъ богадѣльни, но обладаетъ довольно значительнымъ капиталомъ (въ 11.350 р.), перешедшимъ въ распоряженіе общества отъ упразднившейся казенной сукон-ной Тельминской фабрики. Изъ процентовъ этого капитала раздаются пособія на мѣстахъ жительства дряхлымъ, недо-статочнымъ крестьянамъ изъ бывшихъ казенно-рабочихъ, въ размѣрѣ отъ 2 р. 50 до 3 р. въ мѣсяцъ <sup>1)</sup>). Между жите-лями с. Тельмы развита выдѣлка простой мебели.

2) Усолъе въ 7 вер. ниже Тельминскаго на Ангартѣ, земного въ сторонѣ отъ Сибирскаго тракта, состоитъ изъ 525 дворовъ, имѣетъ до 4.800 жит. (2.480 м. п.), въ числѣ кото-рыхъ лицъ постороннихъ, т. е. неприписанныхъ къ сельскому обществу 2.060 (до 1.060 м. п.) <sup>2)</sup>; имѣетъ церковь, школу съ 117 учащимися, учрежденную еще въ 1824 году, 2 питей-ныхъ заведенія, 18 лавокъ, 9 кузницъ, 2 мельницы на зем-ныхъ сельскаго общества, пароходную пристань на Ангартѣ, ба-

<sup>1)</sup> О богадѣльняхъ и призрѣніи см. Астыревъ, Матер. I. с. Т. II, выд. 2-й, стр. 175, 179.

<sup>2)</sup> На стр. 371 даны цифры, соответствовавшія переписи 1888 г.

зары и казенныя соляныя варницы. Базарныя сборы въ Усолѣ<sup>1)</sup> значительнѣе чѣмъ въ Тельмѣ, особливо передъ большими праздниками, напримѣръ Рождествомъ, когда на здѣшней базарной площади съѣзжается отъ 200 до 300 воевъ. Въ обычное же время наибольшее скопленіе народа бываетъ по воскресеньямъ. Кромѣ торговли хлѣбомъ здѣсь производится, въ болѣе или менѣе значительномъ размѣрѣ, торговля разными овощами, сѣномъ, домашнею живностью, лѣсной и болотной дичью, деревянной и глиняной посудой, одеждой, обувью и солью. Жители ближайшихъ къ Усоліу селеній предпочитаютъ даже въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ усольскіе базары иркутскимъ. Къ усольскимъ базарамъ тяготеютъ кромѣ своей волости: Мальтинская, Суховская, Бѣльская, Черемховская и Китойское вѣдомство, а въ зимнее время, когда Ангара покрывается льдомъ, ближайшія части Идинской и Усть-Балейской волостей и вѣдомство Боханское. Базарныя вѣсы отдаются церковью, которой они принадлежать, въ аренду за сумму отъ 500 до 700 рублей въ годъ. Казенныя соляныя варницы придаютъ Усоліу нѣкоторое промышленное значеніе. Разсолъ добывается изъ буровыхъ скважинъ и колодцевъ на Варничномъ островѣ Ангары и на лѣвомъ ея берегу; противъ Варничнаго острова соль вываривается на двухъ заводахъ, отдаваемыхъ казною въ арендное содержаніе. Крѣпость разсола отъ  $7\frac{1}{2}$  до  $9\frac{3}{4}\%$ , по Боме; въ настоящее время проводится новая буровая скважина для добычи болѣе крѣпкаго разсола. На обоихъ заводахъ вываривается ежегодно до 300 тысячъ пудовъ соли, для чего употребляется до 200 рабочихъ<sup>2)</sup>. Противъ Усолія, на Спаинномъ островѣ Ангары, есть выселокъ 3) Угольникъ изъ 15 дворовъ съ 72 жит., принадлежащій къ Усольскому сельскому обществу. Въ этомъ обществѣ считается 540 дворовъ, 700 жилыхъ строеній, около

<sup>1)</sup> О базарахъ см. Личковъ, Матер. I. с. Т. II, вып. 4-й, стр. 250.

<sup>2)</sup> Обручевъ, Матер. I. с. Т. II, в. 1-я стр. 61. Подробности о залежи соли изложены на стр. 371—377 нашихъ добавленій.

2.800 жит. об. п. (1.450 м. п.), въ числѣ кореннаго населенія, не считая постороннихъ, живущихъ въ Усольѣ, т. е. не приписанныхъ къ сельскому обществу; въ рабочемъ возрастѣ 1.360 об. п. (700 м. п.). Грамотныхъ, полуграмотныхъ и учащихся 323 м. п. и 67 ж. п.; хозяйствъ 686. Во владѣніи общества только 1.550 дес. земли, въ т. числѣ пахатной 1.380 дес. Скота Усольскіе крестьяне при отсутствіи пастуховъ держатъ только: лошадей 470 (450 рабочихъ), крупнаго рогатаго 310, мелкаго скота до 300 головъ. 4) дер. Верхн. Жилкина, на правомъ берегу Ангарты, въ  $2\frac{1}{2}$  вер. отъ Тельмы, съ 80 жит. 5) дер. Нижн. Жилкина, въ  $\frac{1}{2}$  отъ предыдущей и 3 вер. отъ Тельмы, также на пр. бер. Ангарты, съ 1 питейнымъ заведеніемъ, 3 кузницами и 275 жит. 6) дер. Ружниковъ, въ 1 вер. отъ Тельмы на Спасскомъ острову Ангарты, съ 110 жит. 7) дер. Бархатова, въ 10 вер. отъ Тельмы на правомъ же берегу Ангарты, съ 145 жит. Всѣ 4 селенія образуютъ одно сельское общество. (Жилкинское), состоящее съ заимками изъ 110 дворовъ, 140 жилыхъ строеній, 113 хозяйствъ, 700 д. об. п. (360 м. п.), въ т. ч. старо-поселенцевъ 9, новоселовъ 31, остальные старожилы. Земель во владѣніи крестьянъ сельскаго общества 2.500 дес., въ т. числѣ пахатной 1.700, луговой 730. Крестьяне держатъ скота: лошадей 470 (420 рабочихъ), крупнаго рогатаго 20, мелкаго скота 830 головъ. Объ остальныхъ селеніяхъ волости, расположенныхъ вдали отъ Сибирскаго тракта въ восточнѣйшей рѣки Китоя, а именно о 8) Больше-Еланскомъ 9) Больше-Жилкинѣ, находящихся на р. Картагонѣ (въ пр. Китоя) въ 16 и 20 вер. отъ Тельмы и о 10) Кулѣ, расположенномъ на ключѣ Черномъ, впадающемъ въ Картагонъ въ 22 вер. отъ Тельмы уже было упомянуто выше. Остается намъ только привести общія свѣдѣнія объ экономическомъ положеніи Тельминской волости <sup>1)</sup>.

<sup>1)</sup> Матер. I. с. Т. II, 82—105.

Въ Тельминской волости, по переписи 1887—88 годовъ, было 1110 дворовъ, 1420 жилыхъ строеній. Наличныхъ жителей, приписанныхъ къ волости, было 6015 об. п. (3140 м. п.), (между ними ссыльно-поселенцевъ 370 (18 м. п.), новоселовъ 1140 (640 м. п.), да постороннихъ постоянно проживающихъ въ селеніяхъ волости до 342 (1750 м. п.), а всего 9435 об. п. Первые, т.-е. приписанные къ волости, составляли до 1190 хозяйствъ (въ томъ числѣ 820 хозяйствъ) и между ними было лицъ въ рабочемъ возрастѣ 2965 (1535 м. п.). Приписное населеніе послѣ ревизіи въ 30 лѣтъ уменьшилось на 7%. Уменьшеніе это объясняется уничтоженіемъ въ 1861 г. Тельминской казенной фабрики, съ отчисленіемъ отъ нея потомковъ каторжныхъ обязательно причислявшихся къ фабрике и попавшихъ въ ревизію; между тѣмъ по закрытіи фабрики обязательно причисленнымъ къ ней крестьянамъ было предоставлено право селиться и причисляться куда угодно, чѣмъ многіе и воспользовались, такъ-что изъ 1652 душъ об. п. государственныхъ крестьянъ, приписанныхъ по ревизіи къ Тельминской фабрикѣ, осталось нынѣ въ Тельмѣ только 1127 д. об. п. (убыль на 32%). По остальнымъ же селеніямъ волости есть прибавь населенія на 1%, и эта незначительность прироста объясняется тѣмъ, что, по закрытіи фабрики, многіе крестьяне другихъ селеній, работавшіе на фабрикѣ, не находя прежнихъ средствъ существованія на мѣстѣ, переселились въ другія мѣстности <sup>1)</sup>. Изъ приведеннаго интереснаго факта мы въ правѣ вывести прямое заключеніе, что емкость волостной территоріи для населенія, вслѣдствіе закрытія фабрики, сразу уменьшилась.

Въ числѣ 1190 наличныхъ хозяйствъ приписнаго населенія было: съ 1 работникомъ 760 (изъ нихъ 170 имѣли подростковъ), съ 2-мя — 240, съ 3-мя и болѣе — 68. Остальныя

<sup>1)</sup> См. Астиревъ, Матер. I с. Т. II, вып. 2-й, стр. 96 и 98.

122 хозяйства не имѣли взрослыхъ работниковъ, но въ 76 изъ нихъ были подростки (полуроботники). Въ числѣ кореннаго населенія волости грамотныхъ, полуграмотныхъ и учащихся 508 мужч. и 57 женщинъ. Въ Тельминской волости по р. Ангарѣ распространены зобы въ селеніяхъ Жилкиныхъ и Усольѣ. Въ послѣднемъ въ три года изъ 166 чело-вѣкъ военной команды заболѣло зобомъ 66 <sup>1)</sup>).

Земель въ непосредственномъ пользованіи сельскаго на-селенія, кромѣ лѣсовъ, 17.450 дес., т. е. по  $5\frac{2}{3}$  дес. на душу м. п., болѣе 11 на взрослого работника и  $14\frac{1}{2}$  на хозяйство. Такимъ образомъ Тельминская волость принадле-житъ къ числу самыхъ малоземельныхъ въ губерніи и по-мѣрно, что закрытіе въ ней фабрики должно было произвести иммиграцію части ея населенія. Пахатныхъ земель въ волости 11340 десят., но подъ дѣйствительными запашками состоятъ 34% этихъ земель, т. е. 2 дес. на душу м. п., 4 дес. на работника, 5 на хозяйство. На каждыя 100 дес. посѣва засѣ-вается: рожью 64 дес. (50 озимою и 14 ярицею), 14 овсомъ, 13 пшеницею, 4 ячменемъ. Поля въ волости уже болѣе или менѣе правильно унавоживаются <sup>2)</sup>). Чистый сборъ хлѣбовъ: пшеницы 37, ржи 42, овса 45 пуд. съ десят. каз. мѣры. Лѣтнее хозяйство въ Тельминской волости мало развито; въ запашкахъ волости размѣщены не болѣе 6% всѣхъ ея дворовъ <sup>3)</sup>). Въ Тельминской волости (въ с. Жилкинахъ и Бар-датовѣ) начальство пыталось вводить общественныя запашки, но онѣ не удались, не смотря на удачный выборъ земли, и были брошены крестьянами. Покосной земли въ волости 3250 дес., что составитъ около  $4\frac{1}{2}$  дес. на хозяйство, т. е. еще менѣе чѣмъ въ Мальтинской волости. Сравнительно недостаточное количество луговъ заставило жителей глав-ныхъ селеній волости окружать ихъ, по примѣру бурятъ,

<sup>1)</sup> Астиревъ, Матер. I. с. Т. II, вып. 2-й, стр. 71.

<sup>2)</sup> Козловъ, Матер. I. с. Т. II, вып. 4-й, стр. 46, 53 и 78.

<sup>3)</sup> Астиревъ, Матер. I. с. Т. II, вып. 2-й, стр. 139.

унавоженными лугами, «утугами». Подъ такими утугами в волости 285 десятинъ. Но и это далеко недостаточно, и жителямъ Тельминской волости приходится арендовать покосы инородцевъ—преимущественно у Курхутскаго и Чечеловскаго родовъ Китайскаго вѣдомствъ, и въ сѣверной половинѣ Суховской волости, которая взамятъ отдаваемыхъ ею въ аренду покосовъ въ свою очередь арендуетъ ихъ у инородцевъ Китайскаго вѣдомства. Количество арендуемыхъ такимъ образомъ покосовъ въ вѣдѣніи волости составляетъ на каждые 10 дес. собственныхъ покосовъ 32 дес. Крестьяне волости держатъ скота: лошадей 3080 (рабочихъ 2570), крупнаго рогатаго 2280, мелкаго скота 4800 головъ. Такимъ образомъ рабочихъ лошадей приходится на взрослого работника меньше 3, всѣхъ же лошадей на хозяйство меньше 3, крупнаго рогатаго скота 2, а мелкаго около 4 головъ. Такимъ образомъ по развитію скотоводства волость занимаетъ одно изъ низшихъ мѣстъ въ губерніи.

Лѣсовъ въ межевыхъ дачахъ двухъ волостей—Тельминской и Суховской 56.000 дес., такъ-что лѣсъ крестьянъ этихъ двухъ волостей должны рубить не только въ своихъ дачѣхъ, но и въ дачахъ сосѣднихъ волостей за оброчную плату. Всѣхъ богаче лѣсомъ въ Тельминской волости участокъ Култукскій, гдѣ строевой лѣсъ начинается уже въ 1 вер. отъ селенія (сосна, береза, ель и осина). Въ Б. Еланской дровяной лѣсъ также очень близокъ, но за строевымъ ѣздитъ верстъ за 25 до 30, за Култукъ. Въ Усольско-Жилкинскомъ участкѣ дровянаго лѣса мало за Ангарой, а строевой покупаютъ въ Тельмѣ (куда онъ сплавляется изъ тайги) въ Усть-Балейской волости и въ Биликтуй (за 15 до 20 вер.). Въ Б. Жилкинѣ лѣсу очень много какъ дровянаго, такъ и строеваго (сосна, лиственница, береза и осина). Собственно въ Тельминской дачѣ остался еще дровяной лѣсъ, но строеваго очень мало. Усолье пользуется лѣсомъ изъ казенныхъ лѣсосѣкъ. Лѣсными промыслами занято въ Тельминской

волости 315 хозяйств <sup>1)</sup>. Развитие это обусловливается необходимостью заготовления дровъ на солеваренные заводы Усоля, различныя фабричныя заведенія (напр. фабрику Бѣлоголоваго) и квартиры въ двухъ крупныхъ селеніяхъ волости. Всѣхъ дровъ жители волости заготавливаютъ въ лѣсахъ ежегодно отъ 8800 до 9000 сажень. Между лицами, перерабатывающими древесные матеріалы есть плотники (59 дворовъ), угольщики (6), бондари (16), колесники (29), столяры (10), токари и трубочники (8), санники и тележники (20), корзинщики и метельщики (6), однимъ словомъ кустарные промыслы, перерабатывающіе дерево особенно развиты въ волости. Вообще по развитію промысловъ Тельминская волость стоитъ выше, такъ какъ 66% ея способныхъ работниковъ кромѣ земледѣлія занимается еще и промыслами. Между остальными промыслами можно указать на выдѣлку кожи (10 челов.), сапожный промыселъ (18), перстобитство (8), вязанье сѣтей и неводовъ (8), кирпичный, гончарный и печной промыслы (9), кузнечество (35), хлѣбопеченіе (6), портняжество (13), охота (10), рыболовство (19), извозный промыселъ (220).

Мірскіе доходы Тельминской волости простираются до 4226 р., въ т. числѣ съ питейныхъ заведеній 2210 р., съ базаровъ, лавокъ и вѣсовъ 615 р., съ покосовъ 334 р. Общая сумма сходящихъ съ волости казенныхъ податей болѣе 10.500 р. Волостные расходы простираются до 3950 р., въ т. числѣ на волостнаго писаря и канцелярскіе расходы 2760 р., на врачебную часть 300 р., волостную гоньбу до 220 р., волостнаго старшину и членовъ управленія 250 р. Сельскихъ расходовъ до 4150 р., въ т. числѣ на писарей и канцеляріи 2060 р., квартирную повинность и земскія квартиры 630 р., церкви и духовенства 330 р. Слагая повинности съ волостными и сельскими расходами окажется,

<sup>1)</sup> Стрежневъ, Матер. I. с. Т. I, вып. 4-й, стр. 327, 356.

<sup>2)</sup> Личковъ, Матер. I. с. Т. II, вып. 4-й, стр. 322.



что въ волости съ души м. п. кромѣ натуральной повинности сходить по 5 р. 92 к.

Суховская волость состоитъ изъ 7 сельскихъ обществъ Суховскаго, Зуевского, Жилкинскаго, Мало-Еланскаго, Кытоскаго, Целотскаго и Биликтуйскаго и 8 селеній<sup>1)</sup>. Изъ нихъ 1) село Суховское находится на большомъ Сибирскомъ трактѣ, на лѣв. берегу Ангары, въ 35 вер. отъ Иркутска. Оно состоитъ изъ 43 дворовъ, 35 жилыхъ строеній, имѣетъ церковь, волостное правленіе, почтовую станцію, 2 питейнаго заведенія, 1 лавку, 1 кузницу, 260 жит., изъ которыхъ 50 постороннихъ, а 210 коренныхъ (114 м. п.), изъ коихъ 100 ссыльно-поселенцевъ, 26 новоселовъ, остальные старожила. Хозяйствъ у коренныхъ 58 (у постороннихъ 26), лицъ въ рабочемъ возрастѣ 130 (до 70 м. п.). Земель во владѣніи сельскаго общества до 720 дес., въ томъ числѣ пахатной 280 покосовъ болѣе 400 дес. Скота крестьяне содержатъ: лошадей болѣе 130 (107 рабочихъ), крупнаго рогатаго скота 100, мелкаго также до 100. 2) дер. Зуевская, также на большомъ Сибирскомъ трактѣ и Ангарѣ, въ 7 вер. отъ Суховскаго и въ 28 отъ Иркутска, состоитъ изъ 31 двора, 32 жилыхъ строеній, имѣетъ 160 жит. (болѣе 80 м. п.), въ т. числѣ постороннихъ 8, ссыльно-поселенцевъ 5, новоселовъ 4. Хозяйствъ у коренныхъ жителей 35, лицъ въ рабочемъ возрастѣ 83 (м. п. 40). Земель во владѣніи сельскаго общества 37 дес., въ т. числѣ пахатной 190, луговой 145. Кругомъ селенія расположены утуги (15 дес.). Скота крестьяне содержатъ лошадей 100 (рабочихъ 84), крупнаго рогатаго 65, мелкаго до 200 головъ. 3) Боковская дер. также на Ангарѣ и Сибирскомъ трактѣ, уже только въ 12 вер. отъ Иркутска, съ 21 хозяйствами 55 жителями. 4) Подгородно-Жилкинское также на трактѣ и Ангарѣ уже только въ 5 вер. отъ Иркутска, съ 155 хозяйствами и 695 жителями. Два посѣла

<sup>1)</sup> О селеніяхъ волости см. Матер. I. с. Т. I, сп. нас. м., стр. 8.

нихъ селенія образуютъ одно Подгородно-Жилкинское сельское общество, въ которомъ дворовъ 120, жилыхъ строеній 140, жителей 750, изъ которыхъ 160 постороннихъ и 640 коренныхъ (330 м. п.), въ томъ числѣ ссыльно-поселенцевъ 18, новоселовъ 132 (70 м. п.), остальные старожилы. Хозяйствъ у коренныхъ жителей 144, лицъ въ рабочемъ возрастѣ 325 (163 м. п.). Сельское общество владѣтъ 2150 дес., въ томъ числѣ было пахатной 600 дес., луговой 1476 дес. Селенія общества окружены утугами, подъ которыми 36 дес. Крестьяне сельского общества содержатъ скота: лошадей 300 (278 рабочихъ), крупнаго рогатаго до 300, мелкаго скота до 100 головъ. 5) село Малая Еланка, на рѣчкѣ Вересовкѣ, находится нѣсколько въ сторонѣ отъ большаго Сибирскаго тракта, въ 20 вер. отъ волостнаго селенія и 17 вер. отъ Иркутска; состоитъ изъ 64 дворовъ, 80 жилыхъ строеній, имѣтъ церковь, школу съ 19 учащимися, учр. въ 1888 г., болѣе 400 жит., изъ нихъ коренныхъ 380 (болѣе 200 м. п.), въ т. числѣ ссыльно-поселенцевъ 24, новоселовъ 34. Хозяйствъ у коренныхъ жителей 90, лицъ въ рабочемъ возрастѣ 186 (98 м. п.). Сельское общество владѣтъ 1410 дес. земли, въ т. числѣ пахатной 760, луговой 620 дес. Крестьяне сельского общества содержатъ лошадей 210 (190 рабочихъ), крупнаго рогатаго скота 140, мелкаго скота 60 головъ. Остальныя селенія волости: 6) Китайское и 7) Биликтуйское на р. Катоѣ въ 13 и 15 вер. отъ волостнаго селенія, а также 8) Челота на р. того же имени, въ 30 вер. отъ волостнаго селенія, уже были описаны выше, и здѣсь намъ остается только привести свѣдѣнія объ экономическомъ положеніи всей волости <sup>1)</sup>).

Въ Суховской волости по переписи 1887—88 было 116 дворовъ и 754 жилыхъ строенія. Наличныхъ жителей, приписанныхъ къ волости было 3370 об. п. (1760 м. п.), изъ

<sup>1)</sup> Матер. I. с. Т. I, стр. 98—113.

нихъ ссыльно-поселенцевъ 230 (140 м. п.), новоселовъ 46 (260 м. п.). Постороннихъ проживало въ волости 38 (210 м. п.), такъ-что все населеніе волости составляло 375 об. п. Приписанные къ волости составляли 735 хозяйствъ (посторонніе же до 140), и между ними было лицъ въ рабочемъ возрастѣ 1710 (885 м. п.). Приписное населеніе послѣ X-й ревизіи въ 30-лѣтній періодъ времени увеличилось на  $18\frac{1}{2}\%$ <sup>1)</sup>. Въ числѣ наличныхъ хозяйствъ было: съ работникомъ 446 (въ т. числѣ въ 90 хоз. были еще и подростки), съ 2-мя—132, съ 3-мя и болѣе—45. Въ остальныхъ 112 хозяйствахъ взрослыхъ работниковъ не было, но въ 5 изъ нихъ были подростки. Въ числѣ кореннаго населенія было грамотныхъ, полуграмотныхъ и учащихся 230 м. п. 34 ж. п. Въ Суховской волости по р. Ангартъ распространены зобы въ селеніяхъ Подгородно-Жилкинѣ, а такъ же въ бассейнѣ р. Китоя въ сел. Целотѣ<sup>2)</sup>.

Земель въ непосредственномъ пользованіи сельскаго населенія волости, кромѣ лѣсовъ, 11700 дес., т. е. по 6<sup>2</sup>/<sub>10</sub> десят. на душу м. п., болѣе 13 дес. на работника и 16 на хозяйство, т. е. волость принадлежитъ къ числу сравнительно малоземельныхъ для Иркутской губерніи, но все-таки болѣе многоземельныхъ чѣмъ сосѣдняя Тельминская, гдѣ населеніе было сгущено продолжительнымъ существованіемъ Тельминской фабрики. Пахатныхъ земель въ волости до 5000 дес., изъ коихъ только половина находится подъ дѣйствительными посѣвами, т. е. посѣвовъ приходится не много менѣе 3 дес. на работника и  $3\frac{1}{2}$  на хозяйство. На каждые 100 дес. посѣва высѣвается: ржи 68 дес. (55 озимой и 13 ярицы), овса 17, пшеницы 11 дес., ячменя 2 дес. На поляхъ уже существуетъ до нѣкоторой степени правильная система ихъ унавоживанія. Чистый сборъ хлѣбныхъ ра-

<sup>1)</sup> Астыревъ, Матер. I. с. Т. II, вып. 2-й, стр. 96.

<sup>2)</sup> Астыревъ, тамъ же стр. 11.

<sup>3)</sup> Козловъ, Матер. I. с. Т. II, вып. 4-й, стр. 53 и 78.

и овса по 38 пуд., пшеницы 34 пуд. съ десятины каз. г-ри. Хуторское хозяйство въ Суховской волости весьма развито: только 3% всѣхъ дворовъ волости размѣщено на земляхъ<sup>1)</sup>. Покосной земли въ волости 6300 дес., болѣе 8 дес. на хозяйство, т. е. болѣе чѣмъ въ Тельминской волости. При всемъ томъ и въ Суховской волости есть утugi, хотя въ менѣе значительномъ количествѣ чѣмъ въ сосѣдней волости, а именно они занимаютъ 94 дес. Сверхъ того крестьяне волости арендуютъ еще покосы и виѣ предѣловъ своей волости, такъ-что покосовъ этихъ приходится по 22 дес. на каждыя 100 дес. собственныхъ покосовъ. Крестьяне волости держатъ: лошадей 1870 (рабочихъ 1580), крупнаго рогатаго 1760, мелкаго скота 1950. Такимъ образомъ рабочихъ лошадей приходится на работника менѣе 2-хъ. Всѣхъ лошадей на хозяйство 2½, крупнаго рогатаго скота болѣе 1-хъ, мелкаго менѣе 3-хъ.

Лѣсомъ крестьяне Суховской волости пользуются также въ Тельминской. Въ Подгородно-Жилкинскомъ участкѣ лѣсовъ еще очень много и преимущественно дровяныхъ (сосна, лиственница и береза). За строевымъ лѣсомъ надо ѣхать за Мал. Елань, верстъ за 30, такъ-что выгоднѣе покупать сплавной лѣсъ. Въ Мал. Елани много всякаго лѣса. За Зуева за строевымъ лѣсомъ ѣздить верстъ за 8 на западъ, изъ Сухой верстъ за 6. Впрочемъ Суховская дача вообще богата лѣсомъ (сосна, ель, а березы мало, такъ какъ дача песчана). Китою также богатъ лѣсомъ: до дровянаго верста, до строеваго отъ 6 до 7. Изъ Целоты за лѣсомъ ѣздить къ Китойскимъ бурятамъ, такъ какъ свой лѣсъ бо-матный и плохой. Биликтуй имѣетъ свой дровяной лѣсъ, строевой же покупаетъ у Китойскихъ бурятъ и сплав-лять его по Китою. Лѣсными промыслами въ волости за-мѣняются 260 хозяйствъ. Развитіе лѣсныхъ промысловъ

<sup>1)</sup> Астмевъ, I. с. Т. II, выш. 2-й, стр. 139.

обусловливается потребностью дровъ въ Иркутскѣ, куда сѣднія съ городомъ волости доставляютъ: Суховская 5400 саж. а Смоленская 29300 саж. Жители Суховской волости занимаются также обжиганіемъ угля, смолокурениемъ и дегтярнымъ производствомъ. Между лицами, перерабатывающими древесные матерьялы, есть 3 судостроителя, 28 плотниковъ, 5 колесниковъ, 6 корзинщиковъ и метельщиковъ. Вообще по развитію промысловъ Суховская волость, какъ близкая Иркутску, стоитъ очень высоко; въ ней 83%, всѣхъ взрослыхъ работниковъ, кромѣ земледѣлія и скотоводства, заняты промыслами. Кромѣ уже упомянутой обработки древесныхъ дѣлій въ волости есть кузнецы (15 чел.). Охотою, какъ промысломъ, занимаются 15 человѣкъ, рыбною ловлею 37, возомъ 176 человѣкъ, дворничествомъ 38, торговлею 10.

Мирскіе доходы Суховской волости простираются 4475 р., въ т. числѣ съ питейныхъ заведеній 990 р., перевозовъ 1630 р., съ мельницъ 815 р. и покосовъ 645 р. Общая сумма казенныхъ податей, сходящихся съ волости, свыше 8200 р. Волостные расходы простираются до 3160 р. въ томъ числѣ на волостн. писаря и канцелярскихъ 1800 р., волостнаго старшину и правленіе 240 р., содержаніе училищъ 424 р., врачебную часть 250 р., волостную гонимую 170 р. Сельскихъ расходовъ 4065 р., въ т. числѣ сельскихъ писарямъ и канцеляріямъ 1444 р., квартирныхъ 660 р., церкви и духовенство болѣе 360 р. Слагая повинности волостными и сельскими расходами, мы получимъ кромѣ натуральныхъ повинностей 8 р. 76 коп. съ души м. п.

Намъ остается дополнить еще здѣсь нашъ очеркъ экономическаго положенія населенія, обитающаго на обширной подгорной площади, простирающейся между Саянскимъ горьемъ и теченіемъ Ангары, вдоль Сибирскаго тракта. Оки къ Иркутску, нѣкоторыми необходимыми для сравненія съ другими волостями свѣдѣніями о ближайшей къ Иркутску Смоленской волости, которая была уже нами описана.

выше (см. стр. 147—150). Селенія этой волости, расположенныя на р. Иркутѣ и его притокахъ (Моты, Введенское, Маномовское, Баклаши, Акинино, Смоленское и Ольхинское), были уже описаны выше; мы же приведемъ здѣсь еще нѣкоторыя дополнительныя свѣдѣнія о волости.

Смоленская волость занимаетъ нѣсколько межевыхъ дачъ, совокупное пространство которыхъ достигаетъ 105.000 десятинъ; изъ нихъ около половины (51.000 дес.) занято еще лѣсами. Сверхъ того казакамъ, живущимъ въ предѣлахъ волости, отведено еще 25.000 дес. Волость состоитъ изъ 31 деревни, разбѣгающихся слѣдующимъ образомъ. Деревня Моты, на правомъ берегу Иркуты, въ 35 вер. отъ волостнаго селенія, образуетъ отдѣльное сельское общество. Село Введенское, на лѣв. берегу Иркуты въ 15 вер. отъ волостнаго селенія съ находящимся въ 3 вер. отъ него выселкомъ Баулевскимъ (8 хозяйствъ и 38 жителей), образуетъ второе сельское общество. Деревня Максимовская на лѣвомъ берегу Иркуты, въ 4 вер. отъ волостнаго селенія, образуетъ отдѣльное, третье сельское общество. Четвертое сельское общество состоитъ изъ волостнаго селенія Смоленскаго (расположеннаго въ впаденіи р. Олхи въ Иркутѣ, въ 9 вер. отъ Иркутска) и расположенныхъ на лѣв. берегу Иркуты 3-хъ деревень: Константиновской (2 вер. отъ Смоленскаго, съ 7 хозяйствами и 34 жителями), Акининой (въ 5 вер.) и Баклаши (въ 8 вер.). Село Ольхинское, расположенное въ 10 вер. отъ Смоленскаго, образуетъ отдѣльное, пятое сельское общество. съ перечисленныя селенія были уже описаны нами выше (стр. 147—149).

Неописанными остались селенія остальныхъ сельскихъ обществъ Смоленской волости, расположенныя преимущественно по Ангарту и притоку ея Каѣ. Восемь селеній, расположенныхъ по лѣвому берегу Ангарты и по р. Каѣ, образуютъ Кузьмихинское сельское общество, а именно: 1) по Кузьмихинское, на Ангартѣ, всего только въ 5 вер.

выше Иркутска, состоитъ изъ 70 дворовъ, имѣетъ 84 жилыхъ строеній, церковь, лавку и 2 питейныхъ заведенія. Жителей въ немъ 430 об. п. (220 м. п.), въ томъ числѣ постороннихъ 25. Изъ коренныхъ жителей казаковъ 1, ссыльно-поселенцевъ 3, новоселовъ 37, остальные старожила. Хозяйствъ 75; 2) дер. Титова, на Ангарѣ, въ 3½ вер. отъ Иркутска, съ 6 хозяйствами и 33 жителями; 3) дер. Мелникова, на Каѣ, въ 2-хъ вер. отъ Иркутска, состоитъ изъ 13 дворовъ, съ 55 жителями; 4) дер. Медвѣдева на Каѣ, въ 3 вер. отъ Иркутска, съ 8 двор. и 32 жит. казаковъ; 5) дер. Маркова на Каѣ, въ 10 вер. отъ Иркутска, съ 13 дворами и 140 жителями; 6) дер. Ершова на Ангарѣ, въ 10 вер. отъ Иркутска, изъ 26 дворовъ съ 170 жителями; 7) дер. Грудинина на Ангарѣ, въ 17 вер. отъ Иркутска, состоитъ изъ 44 дворовъ съ 284 жителями и 8) дер. Михалева на Ангарѣ, въ 22 вер. отъ Иркутска, изъ 42 дворовъ съ 334 жителями. Все общество состоитъ изъ 230 дворовъ, 250 хозяйствъ и до 1500 жит. (735 м. п.). Кузнецкое сельское общество владѣетъ 3630 дес. земли, въ числѣ пахатной 1500 дес. Скота крестьяне содержатъ: лошадей 740 (640 рабочихъ), крупнаго рогатаго скота 51, мелкаго скота 170. Семь селеній волости, лежащихъ на лѣвомъ берегу Ангары, составляютъ Разводинское сельское общество, а именно: 1) Село Больше-Разводинское, въ 9 вер. отъ Иркутска, изъ 53 дворовъ; имѣетъ 56 жилыхъ строеній, церковь, 3 питейныхъ заведенія, до 270 жит. об. п.; 2) дер. Мало-Разводинская, въ 7 вер. отъ города, изъ 29 дворами и 170 жит.; 3) дер. Крыжановская, въ 11 вер. отъ города, съ 45 дворами и 290 жителями; 4) дер. Щукина, въ 14 вер. отъ города, съ 32 дворами и 170 жит.; 5) дер. Патроны, въ 18 вер. отъ города, съ 5 дворами и 40 жителями; 6) дер. Пашковская, въ 30 вер. отъ города, съ 16 двор. и 40 жителями и 7) дер. Молодовская, въ 35 вер. отъ города, съ 5-ю дворами и 62 жит. Во всѣхъ

Разводинскомъ сельскомъ обществѣ 185 дворовъ, 216 хозяйствъ, до 1120 жит. (570 м. п.); оно владѣетъ 2600 дес. земли, въ т. числѣ пахатной 1130 дес.; скота общество содержитъ: лошадей 500 (430 рабочихъ), крупнаго рогатаго 490, мелкаго скота 130 головъ. Деревня Новаямская (Пиковариха), въ 9 вер. отъ Иркутска и 18 отъ волостнаго правленія, состоитъ изъ 38 дворовъ съ 16 хозяйствами и 344 жит. (178 м. п.), составляетъ отдѣльное сельское общество, владѣющее 970 дес. земли (280 пахатной), но имѣющее только 80 лошадей и 60 головъ рогатаго скота, такъ какъ жители занимаются болѣе промыслами, чѣмъ сельскими хозяйствами. Два еще меньшихъ селенія, дер. Худяковская, въ 18 вер. отъ Иркутска и 27 отъ Смоленскаго, изъ 15 дворовъ, 16 хозяйствъ и 64 жителей и Меледиха, въ 10 вер. отъ Иркутска и 19 отъ Смоленскаго, состоящая изъ 1 дворовъ крестьянъ-новоселовъ, также представляютъ самостоятельныя общины. Изъ нихъ Худяковская деревня владѣетъ 110 дес. и Меледиха 30 дес. земли усадебной и пашенной и обѣ совсѣмъ не имѣютъ пашень. Отдаленная, въ 14 вер. отъ Иркутска, дер. Савватьевская на р. Одѣ, состоящая изъ 53 дворовъ, 56 хозяйствъ и 330 жит. (174 м. п.), также образуетъ самостоятельное сельское общество, владѣющее 1170 дес. земли и содержащее болѣе 200 лошадей (164 рабочихъ), болѣе 200 штукъ крупнаго рогатаго, 90 мелкаго скота. Наконецъ, самую отдаленную группу менѣе волости образуютъ три ближайшія къ Байкалу селенія: Лиственничное на берегу Байкала, въ 61 вер. отъ Иркутска, изъ 90 хозяйствъ и 410 жит., Никольское на пр. б. Ангары, въ 56 вер. отъ Иркутска, изъ 15 хозяйствъ съ 4 жит. и Тальцинское, также на пр. берегу Ангары, въ 1 вер. отъ Иркутска изъ 32 хозяйствъ и 310 жителей. прочемъ главная масса населенія этихъ селеній состоитъ изъ лицъ, постороннихъ сельской общинѣ, а именно изъ лицъ крестьянскаго сословія. Крестьянъ въ нихъ только 20



дворовъ и 100 д. об. п. (55 м. п.), составляющихъ 24 хозяйства, да изъ нихъ большинство (60 человекъ и 13 хозяйствъ) принадлежить къ другимъ селеніямъ, такъ-что крестьяне коренныя всѣхъ 3 селеній владѣютъ всего только 35 десятинами земли, т. е. могутъ считаться совершенно безземельными.

Переходимъ теперь къ общимъ свѣдѣніямъ о цѣлой Смоленской волости. По переписи 1887—88 въ Смоленской волости было 1110 дворовъ и 1290 строеній. Наличныхъ жителей, приписанныхъ къ сельскимъ обществамъ волости, было 6360 (3130 м. п.), въ томъ числѣ 200 ссыльно-поселенцевъ и 875 новоселовъ; постороннихъ: крестьянъ 130, казаковъ 110 и лицъ, не принадлежащихъ къ сельскимъ сословіямъ 960 об. п., такъ-что все населеніе волости простиралось до 7560 жит. О приростѣ населенія волости за 30-лѣтіе съ времени X-ой ревизіи судить невозможно, такъ какъ волости въ время ревизіи еще совсѣмъ не существовало, а образовалась она уже послѣ ревизіи, вслѣдствіе переселенія въ ея предѣлы штрафныхъ солдатъ изъ Россіи, обращенныхъ сначала въ казачье сословіе, а въ 1871 году въ крестьянъ-собственниковъ, такъ-что въ составъ волости, кромѣ этихъ новоселовъ вошли только крестьяне-старожилы Новоямскаго и Савватьевскаго общества въ числѣ 474 рев. душъ. Сельское населеніе волости составляетъ 1286 хозяйствъ (посторонніе сельскому населенію составляютъ еще 220 хозяйствъ). Взрослыхъ работниковъ въ этихъ хозяйствахъ 3150 (1560 м. п.). Изъ числа хозяйствъ 786 имѣютъ 1 работника (въ 236 изъ нихъ есть еще подростки), 235 хозяйствъ 2 работника, 59 три болѣе работника, а въ 203 совсѣмъ нѣтъ взрослыхъ работниковъ (изъ нихъ, впрочемъ, въ 113 есть подростки, т. е. полуработники). Въ числѣ кореннаго населенія волости грамотныхъ, полуграмотныхъ и учащихся 440 м. п. и 7 женщ.

Такъ какъ земель въ непосредственномъ пользованіи крестьянъ волости, кромѣ лѣсовъ, приходится 17650 доо

то на душу м. п. причитается  $5\frac{1}{3}$  дес., на взрослого работника 11 дес., на хозяйство до 14 дес. Относительно землепользования крестьяне Смоленской волости образуют 9 юридических общинъ, а именно: 1) село Смоленское съ своею деревнею Константиновскою пользуется одною дачею съ Ольхинскимъ сельскимъ обществомъ, причемъ Ольхинское селеніе имѣетъ, впрочемъ, отдѣльныя пашни, покосъ и выгонъ, два первыхъ селенія черезполосны; лѣсомъ же всѣ пользуются сообща; 2) Максимовское общество пользуется одною дачею съ тремя деревнями Смоленскаго общества (Акинино, Баклани, Бутаково), причемъ пашни у всѣхъ селеній черезполосны, полосы общія только у Баклашей и Бутакова, у остальныхъ отдѣльныя, выгонъ у всѣхъ общій; кромѣ с. Максимовскаго лѣсомъ всѣ пользуются сообща; 3) и 4) Введенское и Мотское общества, составляющія отдѣльныя юридическія общины; 5) пять селеній Кузьмихинскаго общества (Кузьмиха, Титово, Ершово, Мельниково, Марково) пользуются сообща двумя межевыми дачами и участкомъ въ третьей, пашни отдѣльныя у Маркова, у остальныхъ черезполосны, покосы отдѣльны у Маркова и Ершова, у остальныхъ общіе, лѣсомъ же пользуются свободно; 6) Двѣ деревни Кузьмихинскаго общества (Грудинина и Михалево) пользуются особою межевою дачею, пашни и выгоны у нихъ отдѣльны, покосы общіе, лѣса свободны; 7) Всѣ селенія Разводинскаго общества, кромѣ 2-хъ нижепоименованныхъ (т. е. 6 селеній), пользуются сообща двумя межевыми дачами. При этомъ черезполосицы въ поляхъ у нихъ почти нѣтъ. Покосы общіе, кромѣ Малой-Разводной, имѣющей отдѣльный покосъ. Выгоны отдѣльны у трехъ селеній, у трехъ остальныхъ общіе, лѣсъ рубятъ на своихъ и чужихъ дачахъ; 8) селеніе Худяковское и 9) Меледиха Разводинскаго общества составляютъ отдѣльныя юридическія общины, владѣющія: первое двумя, второе одною отдѣльными межевыми дачами.

Пахатныхъ земель въ волости 9740 дес., изъ коихъ подъ

дѣйствительными посѣвами только половина <sup>1)</sup>, такъ-что посѣвовъ приходится болѣе 3-хъ на работника и менѣе 4 на хозяйство. На каждыя 100 десятинъ посѣва высѣвается; 74 дес. ржи (72 озимой и 2 ярицы), 19 дес. овса, 4 пшеницы и 2 ячменя. Чистый сборъ хлѣбовъ: ржи 36 пуд., пшеницы 30 пуд., овса 45 пуд. съ десятины. Хуторное хозяйство въ волости совсѣмъ не развито, такъ какъ запоздалъ въ ней вовсе нѣтъ.

Покосной земли въ волости до 9800 дес., т. е. по 7<sup>1</sup>/<sub>2</sub> дес. на хозяйство, угуговъ очень мало, всего только 80 десятинъ (всего болѣе ихъ въ Олхинскомъ селеніи). Крестьяне держатъ: лошадей 3360 (2830 рабочихъ), крупнаго рогатаго скота 2730, мелкаго скота 1100. Такимъ образомъ въ волости приходится менѣе 2 лошадей на работника, а на хозяйство 3, крупнаго рогатаго скота на хозяйство 2 штуки, мелкаго менѣе 1. Такимъ образомъ по развитіи скотоводства Смоленская волость, вмѣстѣ съ сосѣднею Суховскою занимаетъ низшее мѣсто въ губерніи.

Смоленская волость еще очень богата лѣсами, которые впрочемъ значительно вырубаются. По близости къ селеніямъ теперь остался главнымъ образомъ березовый лѣсъ съ рѣдкими экземплярами сосенъ и лиственницъ; сплошные строевые лѣса отстоятъ отъ селеній уже верстъ отъ 15 до 25. Но такъ какъ въ Смоленской волости подъ лѣсомъ находится еще половина ея территоріи, а именно болѣе 50 тыс. дес. земли, да и лѣсомъ крестьяне волости пользуются еще свободно въ сосѣднихъ инородческихъ вѣдомствахъ, то лѣсные промыслы въ волости весьма развиты, тѣмъ болѣе, что развитію этому способствуетъ потребность въ лѣсныхъ матеріалахъ сосѣдняго съ волостью города Иркутска. Не удивительно, что 72 % всѣхъ хозяйствъ (895 хоз. и 1070 работн.)

---

<sup>1)</sup> Козловъ, Матер. 1. с. Т. II, вып. 4-й, стр. 53 и 78.

волости <sup>1)</sup> занято лѣсными промыслами. Изъ числа лицъ, занимающихся лѣсными промыслами, 990 занимаются заготовкой дровъ и лѣса, 54 обжиганіемъ угля, 40 драньемъ корья и глубочными издѣліями. Крестьяне Смоленской волости заготавливаютъ дровъ въ Иркутскъ до 30 тыс. саж. Сверхъ того нѣкоторыя селенія волости занимаются специальными видами лѣсныхъ промысловъ: такъ на примѣръ деревня Бакаши гонитъ высшій сортъ смолы изъ надираемой имъ березы, а жители Лиственичнаго селенія приготавливаютъ изъ добываемой ими смолы варъ для заливки швовъ изготовляемыхъ ими же судовъ.

Вообще же по развитію промысловъ Смоленская волость занимаетъ первое мѣсто въ губерніи, такъ какъ 98% ея взрослыхъ работниковъ занимаются промыслами, изъ которыхъ 80% падаютъ на кустарныя промыслы и 18% на охоту и рыболовство. Охотою въ волости занимаются 117 лицъ, рыболовствомъ 130, сборомъ орѣховъ 20. Изъ остальныхъ ремесленниковъ волости 8 чеботарей и сапожниковъ, 13 пряжъ, 29 обжигающихъ извести, 18 кузнецовъ. Наконецъ извозомъ занимаются до 30, а судоходствомъ 36.

Смоленская волость имѣетъ мірскихъ доходовъ 4870 р.: въ т. числѣ съ питейныхъ заведеній 2490 р., съ каменоловней 550 р., покосовъ 420 р., мельницъ 100 р. Съ волости сходятъ казенныхъ податей 3550 р. Волостныхъ расходовъ 4140 р., въ т. числѣ на писаря, его помощниковъ и канцелярскіе расходы 2200 р., волостную и окружную гоньбу 1750 р. Сельскихъ расходовъ 6370 р., въ т. числѣ на писарей и канцелярскіе расходы 2390 р., на гоньбу 1880 р., на земскіе квартиры 506 р., на церковные расходы 300 р., на сторожей, разсылныхъ, десятниковъ и караульныхъ 565 р. Вообще всѣхъ денежныхъ повинностей (кромя натуральныхъ)

---

<sup>1)</sup> Стрѣжневъ, Матер. I. с. Т. II, вып. 4-й, стр. 327.

съ крестьянъ Смоленской волости сходить по 4 р. 47 к. съ души м. п. <sup>1)</sup>).

Заключая настоящій обзоръ экономического положенія населеній волостей Иркутскаго и Балаганскаго округовъ, лежащихъ на большомъ Сибирскомъ трактѣ, мы считаемъ полезнымъ представить здѣсь и нѣкоторыя общія соображенія, относящіяся до сельскаго населенія всей обширной площади, лежащей между Саянскимъ нагорьемъ и Ангарою въ предѣлахъ упомянутыхъ двухъ округовъ.

Общая масса сельскаго населенія, распространенная на этой площади, составляетъ болѣе 103 тыс. душъ об. п., изъ которыхъ 41 тыс. состоитъ изъ населенія инородческаго и по преимуществу бурятскаго, а 62 тыс. русскаго. Буряты занимаютъ вообще болѣе высокія части долины и подгорья и только одною полосою доходятъ до р. Ангары, русское же населеніе сосредоточивается по преимуществу въ нижнихъ частяхъ долинъ и въ особенности на подгорьяхъ по большому Сибирскому тракту и теченію Ангары. Дачи, отмежеванныя во владѣніе упомянутаго населенія, составляютъ въ своей совокупности 1.755.000 десятинъ, изъ коихъ болѣе 810 дес., т. е. 46% подъ лѣсами. Изъ всѣхъ этихъ отмежеванныхъ земель только 635 тыс. дес. предоставлены русскому населенію, а 1.120.000 инородческому. Такимъ образомъ во владѣніе инородцевъ отмежевано въ Балаганскомъ вѣдомствѣ по 75, въ китойскомъ по 68, въ аларскомъ по 40 дес. на душу м. п., и только въ Тункинскомъ вѣдомствѣ, гдѣ удобныя для обитанія земли находятся только въ стѣсненныхъ горами долинахъ, приходится межевыхъ отводовъ по 20 дес. на душу м. п. Русскимъ же волостямъ отводы сдѣланы въ гораздо меньшемъ размѣрѣ. Только Смоленская волость

---

<sup>1)</sup> Астыревъ Матер. I. с. Т. II, выи. 5-й прилож. къ гл. XIII, таблицы.

имѣть обширный отводъ въ 36 дес. на душу м. п. въ слѣдствіе того, что въ ея пользованіе предоставлены обширныя лѣсныя площади. Затѣмъ двѣ волости (Зиминская и Заларинская) имѣютъ отводы по 26 дес. на душу м. п., три (Мальтинская, Тельминская и Суховская) по 22 до 23 дес., три (Черемховская, Бѣльская и Тункинская) отъ 17 до 18 дес. на душу м. п. Въ непосредственномъ же пользованіи сельскаго населенія, кромѣ лѣсовъ, состоитъ болѣе 430.000 дес., изъ коихъ приходится на долю инородцевъ 230 тыс. десят. И этой землей непосредственнаго пользованія инородцы надѣлены шире чѣмъ русскіе. Такъ въ Аларскомъ вѣдомствѣ земель этихъ приходится по 13 дес. на душу муж. п., въ Балаганскомъ  $11\frac{1}{2}$ , въ Китойскомъ 9, и только въ Тункинскомъ вѣдомствѣ, стѣсненномъ горными хребтами, по  $6\frac{1}{2}$ , при чемъ горные скаты, не входящіе въ межевыя дачи, служатъ весьма удобнымъ дополнительнымъ надѣломъ для кочевниковъ. Въ большинствѣ русскихъ волостей земель дѣйствительнаго пользованія приходится по 8 дес. на душу м. п. Въ Бѣльской и Суховской волостяхъ приходится уже нѣсколько менѣе 7 дес., въ Тельминской, Смоленской и Тункинской менѣе 6 и до 5 дес. Наиболѣе земледѣльческія волости высѣвають по 5 дес. и до  $6\frac{1}{2}$  дес. на работника (Заларинская  $6\frac{1}{2}$ , Черемховская, Зиминская, Бѣльская и Мальтинская отъ 5 до 6), менѣе земледѣльческія и болѣе промышленныя 4 (Тельминская),  $3\frac{3}{4}$  (Тункинская) и 3 дес. на работника (Суховская и Смоленская). Изъ инородческихъ вѣдомствъ наиболѣе земледѣльческія высѣвають по  $5\frac{2}{3}$  (Аларское) и 4 (Балаганское) на работника, а болѣе скотоводческія и звѣроловческія  $2\frac{3}{4}$  (Тункинское) и  $2\frac{1}{2}$  дес. (Китойское) на работника. Въ наиболѣе земледѣльческихъ волостяхъ сильно развито хуторское хозяйство. Такъ въ волостяхъ Заларинской, Черемховской и Зиминской болѣе 40% дворовъ размѣщаются въ займахъ, въ Бѣльской 23%, въ Мальтинской 17% въ болѣе промысло-

выхъ же волостяхъ Тункинской, Тельминской, Суховской и Смоленской займокъ очень мало или ихъ совсѣмъ нѣтъ.

При обиліи луговъ и покосовъ скотоводство на разсматриваемомъ подгорьѣ достаточно развито и въ русскихъ волостяхъ: рабочихъ лошадей повсемѣстно приходится отъ 2 до 3 на взрослого работника, крупнаго же скота (лошадей и рогатаго) въ большинствѣ русскихъ волостей отъ 6 до 7 шт. на хозяйство. Ниже этого количества (отъ 4 до 5) имѣютъ только три ближайшія къ Иркутску волости, а выше (10 штукъ на хозяйство) самая отдаленная Тункинская волость, образующая оазисъ въ горной странѣ посреди инородческаго населенія. Само собою разумѣется, что въ инородческихъ вѣдомствахъ скотоводство несравненно болѣе развито. Тамъ крупнаго скота, лошадей и крупнаго рогатаго приходится отъ 10 до 15 головъ на хозяйство, а кромѣ того разводится еще въ значительномъ количествѣ и мелкаго скота (въ Аларскомъ и Балаганскомъ вѣдомствахъ его приходится по 15 и 16 головъ на хозяйство, между тѣмъ въ пригородныхъ русскихъ волостяхъ его совсѣмъ почти нѣтъ).

Весьма благоприятныя экономическія условія, въ которыхъ обитаетъ сельское населеніе разсматриваемаго пространства, находятъ лучшее свое выраженіе въ сильномъ приростѣ населенія, обусловливаемомъ впрочемъ конечно не однимъ естественнымъ приростомъ, но и приселеніемъ сюда пришлаго населенія. Со времени ревизіи 1857 года до переписи 1887 — 88 г. населеніе 9 русскихъ волостей разсмотрѣнной нами площади возрасло въ 30 лѣтъ на 53%, и частное уменьшеніе приписнаго населенія въ Тельминской волости вслѣдствіе упраздненія казенной фабрики, увольненія лицъ рабочихъ, обязательно къ ней приписанныхъ, и постепеннаго расселенія ихъ изъ мѣстности, въ которой они были искусственно скучены не понизила общаго прироста населенія, что ясно усматривается изъ того, что, если сравнить ревизскія цифры съ цифрами новѣйшей переписи

по всѣмъ тремъ окружающимъ Иркутскъ волостямъ (Тельминской, Суховской и Смоленской, возникшей уже послѣ ревизіи), то приростъ окажется въ 52%, т. е. тоже равнымъ общему приросту населенія во всѣхъ 9 волостяхъ въ совокупности.

Въ иныхъ условіяхъ находится приростъ инородцевъ, численность которыхъ за тоже 30-лѣтіе увеличилась только на 12%, при чемъ Аларское и Балаганское вѣдомство дали увеличеніе только отъ 4 до 6%, Китойское 9% и только Тункинское 21%. Во всякомъ случаѣ нельзя однако же сказать, чтобы инородцы, и особливо буряты, оказывали склонность къ вымиранію. Очевидно только, что не смотря на то, что они по отношенію къ просторному надѣленію землею находятся еще въ лучшемъ положеніи чѣмъ русское населеніе, существуютъ однако же такіа условія, которыя препятствуютъ къ росту и что условія эти менѣе всего ощутительны на земляхъ Тункинскаго вѣдомства.

Есть одно обстоятельство, ставящее естественный приростъ инородческаго населенія въ худшія условія по сравненію съ русскимъ. Это менѣе благоприятная пропорція женскаго пола къ мужскому полу у инородцевъ. Въ то время какъ въ 9 разсмотрѣнныхъ волостяхъ въ русскомъ крестьянскомъ населеніи старожиловъ на каждую 1000 мужчинъ приходится 987 женщинъ (у новоселовъ и ссыльно-поселенцевъ пропорція эта гораздо слабѣе), у инородцевъ на 1000 мужчинъ приходится только 924 женщины, а если сравнивать численность мужчинъ и женщинъ въ рабочемъ возрастѣ, то на 1000 мужчинъ придется только 887 женщинъ (у русскихъ старожиловъ въ рабочемъ возрастѣ существуетъ между численностью половъ совершенное равенство), пропорція не могущая благоприятствовать естественному приросту населенія. У русскихъ новоселовъ и ссыльно-поселенцевъ эти пропорціи конечно еще неблагоприятнѣе, а именно у первыхъ на 1000 мужчинъ приходится 901 женщина, а у вторыхъ только



867, но это обстоятельство ставить инородцевъ въ еще болѣе невыгодныя условія, заставляя эти пришлые элементы населенія искать себѣ женъ между инородческимъ населеніемъ.

При всемъ томъ мы видимъ, что въ Тункинскомъ вѣдомствѣ приростъ населенія значительнѣе, чѣмъ въ остальныхъ. Это объясняется тѣмъ, что, не смотря на болѣе слабое надѣленіе Тункинцевъ отмежеванными земельными угодьями, они находятъ себѣ въ своихъ межевыхъ дачъ широкій просторъ для своей кочевой и охотнической жизни на никому не принадлежащихъ, совсѣмъ незанятыхъ челоѣкомъ горныхъ склонахъ Саянскаго хребта и его отроговъ; наоборотъ въ Аларскомъ и Балаганскомъ вѣдомствахъ отведенныя инородцамъ межевыя дачи, хотя и болѣе обширныя чѣмъ у русскихъ крестьянъ, достигаютъ своего предѣла насыщенія или предѣла емкости для кочеваго населенія, которое вслѣдствіе того пришло въ состояніе, переходное къ осѣдлому, земледѣльческому. Нѣтъ сомнѣнія, что при окончательномъ переходѣ бурята изъ кочевниковъ-скотоводовъ въ осѣдлое земледѣльческое населеніе, емкость ихъ земель для населенія увеличится, но пока переходъ этотъ не закончился, бурятамъ-кочевникамъ и даже полукочевникамъ настолько тѣсно, что населеніе ихъ значительнаго прироста давать не можетъ.

Переходя затѣмъ къ интересному вопросу о томъ, ели въ разсмотрѣнномъ нами пространствѣ, т. е. въ Саянскомъ подгорьѣ между склонами Саяна и Ангаракомъ въ предѣлахъ округовъ Иркутскаго и Балаганскаго, многи земель удобныхъ и способныхъ для прилива русской колонизаціи, на вопросъ этотъ по нашему уразумѣнію въ настоящее время приходится отвѣчать до нѣкоторой степени отрицательно. Въѣ отмежеванныхъ уже въ пользованіе разсмотрѣнныхъ 9 русскихъ волостей и 4 инородческихъ вѣдомствъ свободныхъ еще дачъ, никому не отмежеванныхъ но удобныхъ для заселенія земель осталось не много. Таки площади можно напримѣръ найти въ Балаганскомъ округѣ

по обѣ стороны Оки къ границѣ Нижнеудинскаго округа и между рѣками Кимильтеемъ и Зимой (лѣвые притоки Оки), а въ Иркутскомъ между Китоемъ и Иретью, но площади эти, по сравненіи съ межевыми дачами разсмотрѣнныхъ волостей и вѣдомствъ, не обширны, а въ остальныхъ, болѣе обширныхъ частяхъ округовъ хотя и есть еще обширныя, не предоставленныя ни въ чье владѣніе пространства, но эти пространства по своему гористому положенію, абсолютной высотѣ и климатическимъ условіямъ для заселенія неудобны. Въ предѣлахъ же обмежеванныхъ дачъ въ непосредственномъ пользованіи населенія не находятся только пространства, заросшія лѣсомъ, но заселеніе этихъ пространствъ, сопряженное съ истребленіемъ лѣсовъ, испортило бы климатическія условія страны и перенесло на сѣверную часть Саяна сухія, континентальныя пустыни Монголіи.

Нѣтъ сомнѣнія, однако-же, что кромѣ предоставленія колонизаціи нѣкоторыхъ нынѣ находящихся еще въ южныхъ частяхъ Иркутскаго и Балаганскаго округа свободныхъ, никому не отмежеванныхъ земель, возможно еще привлечь много переселенцевъ въ русскія волости и даже въ породческія вѣдомства, и что путемъ этого процесса заселенія, возможность котораго подтверждается пропорціею новоселовъ и поселенцевъ въ 9 разсмотрѣнныхъ русскихъ волостяхъ (новоселы и поселенцы въ этихъ волостяхъ составляютъ 20% всѣхъ крестьянъ) и произошелъ громадный приростъ населенія этихъ волостей за послѣднее 30-лѣтіе (болѣе 50%, изъ коихъ по всей вѣроятности только 30% можно полагать на естественный приростъ, а 20% на привлеченіе). Приростъ этотъ, повидимому, еще не стѣснилъ нынѣшняго населенія разсмотрѣннаго нами пространства, но мы все-таки полагаемъ, что при нынѣшнихъ экономическихъ условіяхъ народнаго хозяйства едва ли это пространство можетъ вмѣстить двойное противъ нынѣшняго количество населенія; да и то при условіи правильно регулированнаго

и постепеннаго колонизаціоннаго движенія и оставленіи некотораго пространства для естественнаго прироста населенія. Само собою разумѣется, что вызванное проведеніемъ великаго Сибирскаго желѣзнаго пути развитіе промышленности на разсмотрѣнной территоріи, одной изъ лучшихъ въ восточной Сибири, можетъ въ значительной мѣрѣ увеличить еще емкость ея населенія. Но это еще дѣло болѣе или менѣе отдаленнаго будущаго.

**Примѣчаніе 1-ое.** Села Тунка и Шиним, Туранскій и Хангинскій караулы и ихъ окрестности по свѣдѣніямъ, собраннымъ Дубровымъ.

Въ дополненіе къ свѣдѣніямъ о теченіи р. Иркутъ, изложеннымъ на стр. 39—163, посвящается это примѣчаніе. Тунка, Шиним, Туранскій и Хангинскій караулы лежали на пути слѣдованія Дуброва, совершившаго изъ Иркутска поѣздку къ верховьямъ р. Селенги, расположеннымъ въ Монголіи съ цѣлью этнографическихъ изслѣдованій бурятскаго населенія. Прекрасно ознакомившись съ этимъ народомъ въ предѣлахъ Русской Имперіи, Дубровъ преслѣдовалъ цѣль ознакомиться съ бурятами, живущими по Селенгѣ, въ Монголіи съ ея «нетронутою, какъ говоритъ путешественникъ, историческими вѣяніями жизни», и тѣмъ изучить ихъ въ своемъ естественномъ состояніи. Для этого и была снаряжена экспедиція, первые результаты которой опубликованы въ 1884 году <sup>1)</sup>. Такъ какъ цѣль экспедиціи была изслѣдовать главнымъ образомъ этнографію посѣщаемой мѣстности, то повтому мы и находимъ въ отчетѣ Дуброва много драгоценныхъ, новыхъ свѣдѣній, несообщаемыхъ другими путешественниками относительно населенныхъ пунктовъ и быта бурятовъ. Но и въ географическомъ отношеніи Дубровымъ сдѣлано не мало. Имъ дано подробнѣйшее описаніе теченій въ Селенги, Буксой и Дельгирь-Муряна, которыми мы воспользуемся въ своемъ мѣстѣ, въ настоящемъ же описаніи коснемся, придерживаясь маршрута Дуброва, лишь вышеуказанныхъ четырехъ населенныхъ пунктовъ по р. Иркуту и ближайшихъ ихъ окрестностей. Въ этихъ пунктахъ были уже передаваемы въ своемъ мѣстѣ нѣ-

<sup>1)</sup> Дубровъ, Изв. В. Сиб. Отд. И. Р. Геогр. Общ. Т. XV, № 1—2.

которыя географическія свѣдѣнія. Мы не помѣщали тамъ настоящаго описанія съ той цѣлью, чтобы не удлинять главы и сохранить географическую нить. Поэтому, согласно пріему Риттера отводимъ для этнографическихъ свѣдѣній отдѣльное примѣчаніе

С. Тунка <sup>1)</sup>. Какимъ образомъ возникъ этотъ важный населенный пунктъ, на этотъ вопросъ трудно отвѣтить, такъ какъ среди населенія не сохранилось по этому поводу никакихъ свѣданій. Слово Тунка есть навѣрно испорченное монгольское Танха что означаетъ кувшинъ. До появленія русскихъ все теченіе Иркутъ посѣщалось монгольскими кочевниками, стоявшими въ подчиненіи Сайинъ-ноинъ-хана. Эти кочевники считали себя потомками Бука-ноина (см. выше стр. 89—90) и его супруги Буданъ-хатунъ (туманная госпожа), которой легенды приписываютъ замѣчательную красоту. Когда Похабовъ съ казаками разгромилъ вышнѣшній Балаганскій округъ и двинулся на тункинскій край, кочевники, рассчитывая на помощь своего великаго праотца, упорно сопротивлялись вторженцамъ, но, разумѣется, нестройныя ихъ толпы не въ состояніи были противостоять русскимъ. Похабовъ въ 1661—1663 г. изгналъ кочевниковъ изъ широкой долины Иркутъ и построилъ небольшой острожокъ, который разросся въ теченіи 120 лѣтъ въ большое селеніе, носящее нынѣ названіе Тунки.

Какъ извѣстно селеніе это расположено на обоихъ берегахъ р. Иркутъ при устьѣ въ него грязной рч. Тунки. Положеніе селенія крайне выгодно для земледѣлія. Широкая въ данномъ мѣстѣ долина представляетъ прекрасныя, поросшіе богатой травой луга, по пологимъ склонамъ ограничивающихъ ее Тункинскихъ альповъ и Саянскаго хребта расположены тучныя нивы и лѣса. Центръ селенія на протяженіи 5 верстъ занимаютъ казаки и крестьяне, только западная окраина села служитъ пріютомъ обрусѣвшимъ буратамъ. Вдоль всего села зигзагами проходитъ т. н. Милліонная улица съ расположенными по ней мірской избой (въ центрѣ), до шести лавокъ и массой кабаковъ. Интересъ представляетъ мірская изба не только отношеніемъ, что эта, лучшая во всей Тункѣ постройка, принадлежала некогда декабристу графу Толстому, который построилъ этотъ домъ и въ немъ жилъ до возвращенія своего въ Европескую Россію. Старожилы помнятъ графа и передаютъ, что въ заботахъ изъ лѣса, окружавшаго домъ, былъ сдѣланъ роскошный садъ и огородъ, въ которомъ росли «дива», которыя

<sup>1)</sup> См. выше стр. 70.

ность и не выдвигали въ Тункѣ. Зданіе это съ мезониномъ и балкономъ расположено было на холмикѣ, на краю деревни, теперь же оно окружено со всѣхъ сторонъ разросшимся селомъ. Уѣзжая графъ Толстой подарилъ свой домъ тункинской общинѣ. Нынѣ же нѣтъ и признаковъ бывшихъ здѣсь сада и огорода, а само зданіе ободрано и полуразрушено. Кромѣ мірской избы въ Тункѣ имѣются квартира засѣдателя, почтовое отдѣленіе, училище и двѣ церкви. Въ одной изъ послѣднихъ, именно въ казачьей Никольской, хранится образъ, изображающій св. Николая. Образъ этотъ, на которомъ св. Николаю приданы чисто монгольскія черты лица, пользуется знаменитостію потому, что по преданію онъ спасъ Тунку отъ нашествія монголовъ. Происходило это такъ: На Тункинскій острожекъ явились монголы. Немногочисленные казаки не въ состояніи были отразить непріятеля. Тогда старики обратились съ мольбой къ иконѣ св. Николая. На слѣдующій день, когда монголы собирались сдѣлать новое, рѣшительное нападеніе, вдругъ изъ острожка показался человекъ на козлѣ какой-то старецъ съ сѣдой бородой и жезломъ въ рукѣ. Мановеніемъ жезла онъ обратилъ въ бѣгство монголовъ и снова исчезъ, когда пораженные казаки въ благодарности пали ницъ передъ нимъ. Только немногіе успѣли его разглядѣть и найти сходство съ изображеннымъ на хранившейся въ часовнѣ иконѣ св. Николаемъ. Съ тѣхъ поръ икона эта долгое время почиталась; когда же построена была церковь, она изъ часовни была перенесена въ церковь, гдѣ сохраняется и понынѣ.

Какъ уже сказано, населеніе Тунки состоитъ изъ казаковъ, крестьянъ и обрусѣвшихъ бурятъ, которыхъ однако въ бытовомъ отношеніи трудно даже отдѣлить отъ русскихъ. Главнымъ занятіемъ населенія является земледѣліе. Ярица, пшеница, овесъ, рѣдко рожь и ячмень даютъ здѣсь хорошіе урожаи. Кромѣ земледѣлія тункинцы занимаются звѣриннымъ промысломъ, и обмѣниваютъ у монголовъ-уринхайцевъ свой хлѣбъ на кожи, масло, шерсть и прочее сырье. Нужно сказать, что экономическое состояніе Тункинскаго населенія стояло бы весьма высоко, если-бы не пьянство, которому такъ предаются тункинцы. Все богатство населенія погребается въ кабаки. Газета «Сибирь» сообщала, что въ одинъ день новаго года пропито было въ Тункѣ 800 р., а за весь 1882 годъ 40 тысячъ. При такомъ нравственномъ состояніи населенія не мудрено видѣть въ Тункѣ, не смотря на благопріятныя условія и экономическое изобиліе, нищету, лѣнь и неряшливость. Грязь, ободранныя, поискившіяся на бокъ, подгнившія, растрепанныя избы производятъ

удручающее впечатлѣніе и заставляютъ забыть, что подѣ бокон у тункинцевъ превосходный строевой лѣсъ, и при томъ въ изобиліи. Только немного опрятно содержанныхъ домовъ можно встрѣтить во всемъ громадномъ селеніи. Можно только сказать, что тункинцы пока еще «изъ мрака невѣжества, какъ выражается Дубровъ, и не думаютъ выходить». Среди двадцати тысячнаго населенія Иотанину напимѣръ удалось найти одного лишь интеллигентнаго человѣка, и тотъ оказался пріѣзжимъ.

С. Шимки <sup>1)</sup>. Изъ Тунки трактовая дорога въ другое, не менѣе интересное село Шимки ведетъ сперва по лѣвому берегу р. Иркутъ, а затѣмъ переходитъ и на правый, но можно ѣхать и все время по правому берегу черезъ деревушку Нурхай, населенную уже крещеными и вполне обрусѣвшими инородцами Шешоловскаго рода. Инородцы эти усвоили себѣ вполне русскій бытъ, замѣнивъ юрты избами, только въра не успѣла еще въ нихъ утвердиться, они съ большимъ довѣріемъ относятся къ ламамъ чѣмъ къ священникамъ. За этой деревушкой дорога пересѣкаетъ выселокъ Уланъ-горхонъ, расположенный въ котловинѣ между отрогами Саянскаго хребта. Съ сѣвера на югъ протекаетъ по ней небольшая горная рѣка того-же имени, знакомый намъ притокъ Иркуты. Мѣсто, на которомъ стоитъ выселокъ, бугристое, такъ-что постройки расположены на косогорахъ. Населеніе выселка состоитъ изъ шести родственныхъ между собой семействъ, носящихъ одну фамилію Томиловыхъ, происшедшихъ отъ одного тункинскаго крестьянина, который выселился изъ Тунки, сообразивъ выгоды, представляемыя мѣстностью Уланъ-горхона. Въ то время, какъ переселяются сами Томиловы, звѣринный промыселъ былъ тутъ просто на руку, такъ какъ соболи, бѣлки, рыси прямо подходили къ избамъ. И въ земледѣльческомъ отношеніи котловина эта представляла много выгодъ, такъ какъ, защищенная холмами и горами отъ гнетущаго вѣтра Саяна, она изобилуетъ удобными пашнями. Теплый климатъ, отсутствіе суровыхъ вѣтровъ, черноземная почва все это какъ нельзя болѣе благоприятно для земледѣльца. Весь выселокъ и теперь еще окруженъ лѣсомъ, состоящимъ изъ сосны, березы, лиственницы, осины и черемухи. Бураты, которыхъ лѣтнія юрты располагались на мѣстѣ теперешняго выселка, индифферентно относились къ занятію русскими земель и устройству и расчисткѣ пашень, и лишь тогда, когда выселокъ сталъ разрастаться и во

<sup>1)</sup> См. выше стр. 66.

жоронія земли были заняты Томпловыми и, когда наконецъ русскіе стали тѣснить бурятъ, не давая имъ мѣста для устройства юртъ, буряты пробовали выказать протестъ, но Томиловы, располагая большими средствами, полученными ими съ доходовъ земли, и дорожа ея какъ лучшимъ источникомъ благосостоянія, повели дѣло такъ, что въ концѣ концовъ за ними признали земли по Уланъ-горхону и причислили ихъ въ пятидесятыхъ годахъ къ Тункинскому крестьянскому обществу.

Волей-неволей пришлось бурятамъ довольствоваться для постройки своихъ юртъ и воздѣлыванія пашень болотистыми мѣстами и землями, расположенными по крутымъ склонамъ горъ. Выселокъ гнѣво разбогатѣлъ и ведетъ торговлю съ Монголіей тысячъ на сто въ годъ. Это уже больше не избы, которыя составляютъ селеніе, а красивые дома съ бѣлыми трубами и крашеными ставнями. Постройки обнесены заборомъ; на горномъ ручьѣ построены мельницы. Весь выселокъ утопаетъ въ зелени и представляетъ по своему расположенію живописную картину.

Изъ выселка Уланъ-горхонъ дорога въ Шимки идетъ все по тому-же правому берегу. Вся долина отъ Тунки и до Шимковъ находится во владѣніи бурятъ, обрабатывается и по густотѣ населенія занимаетъ послѣ Коймара (къ югу отъ Тунки, у подошвы Тункинскихъ альповъ) и Торской котловины третье мѣсто. Тутъ живутъ Хойготскій, Хонходарскій, Шешоловскій, Чалдарскій, Тертевскій и Куркутскій роды. Первые юрты отъ Тунки расположены въ 5 верстахъ. Окруженные со всѣхъ сторонъ болотами, убогія, ободранныя, безъ всякой огорода юрты эти поставлены въ самыя антисанитарныя условія. Однимъ неряшествомъ и лѣнью бурятъ можно только объяснить подобный выборъ мѣста. Въ пяти верстахъ отъ этихъ юртъ имѣется перевозъ черезъ Иркутъ. Перевозъ этотъ не сдается бурятами съ торговъ, а содержится по найму на деньги, собранныя со всего тункинскаго инородческаго вѣдомства. Наемные буряты получаютъ въ лѣто отъ 70 до 80 рублей и обязаны перевозить начальство и инородцевъ даромъ, прочіе же ѣдущіе платятъ 5 коп., а идущіе пѣшкомъ 1 коп. Карбазъ строится и починяется на общественный счетъ. Неудобство перевоза этого заключается въ томъ, что онъ не можетъ имѣть постоянного пункта, такъ-какъ фарватеръ Иркутъ постоянно мѣняется, въ зависимости отъ частой прибыли водъ, влекущей за собой углубленіе однихъ мѣстъ и занесенія другихъ пескомъ и образованія такимъ образомъ плесей. Это бы еще ничего, но крутизна береговъ Иркутъ и от-



существо хорошихъ спусковъ очень затрудняетъ переправу экипажей, которые приходится иногда буквально переносить на рукахъ. За перевозомъ, по направленію къ Шингамъ, расположенъ миссіонерскій станъ. Стоитъ онъ совершенно одиноко.

Плоскѣ кочевьевъ бурятъ Шешоловскаго рода обнимаетъ и теченіе Бо-горхона и Хара-угуна, правыхъ притоковъ Иркуты. Здѣсь буряты кочуютъ только зимой, такъ какъ болотистая, сырая мѣстность неудобна для лѣтняго жилья. Теченіе Хара-угуна, крайне безпокойное вслѣдствіе сильнаго его паденія до выхода въ долину Иркуты, теряетъ въ долинѣ вполне характеръ теченія горной рѣки. Отъ подошвы Саянскаго хребта его теченіе становится все тише и тише, берега становятся пологими, поросли лѣсомъ, рѣка образуетъ четыре русла, а дно становится песчано-иловатымъ. Рѣка эта интересна и въ томъ отношеніи, что кяхтинскій купецъ Игумновъ когда еще не былъ проведенъ круго-байкальскій трактъ, предлагалъ провести вверхъ по ней дорогу изъ Иркутска черезъ с. Култукъ, Торскую котловину, Тунку, Хара-угунъ въ Ургудейскій каньонъ, оттуда чрезъ Арматское и Санагинское вѣдомство въ Кяхту. Путь этотъ дѣйствительно прамѣ существующаго теперь черезъ Верхнеудинскъ, но представляетъ много неудобствъ. Приходилось подыматься на значительныя высоты и крутизны, что для нагруженной телеги не такъ-то легко. Нѣсколько лѣтъ возили по этомъ пути почту и транспорты, но теперь перестали, только скотогонники пользуются имъ и то зимой, когда Хара-угунъ покрывается льдомъ, можно слѣдовать по руслу, не подымаясь на высокіе берега, но въ это время года путь неудобенъ, вслѣдствіе громадныхъ наледей, дѣлающихъ дорогу опасной, такъ какъ Хара-угунъ покрывается льдомъ не раньше декабря мѣсяца.

Кочевья тѣхъ-же бурятъ распространяются и на р. Хорбятку, правый притокъ того-же Иркуты, выше Хара-угуна. Хорбятка течетъ совершенно параллельно Хара-угуну и носитъ одинъ съ нимъ характеръ. Достигнувъ долины Иркуты, она развѣтвляется на двѣ рукава, изъ которыхъ одинъ наполняется водой только во время паводковъ и носитъ потому названіе *Хурей-хорбятъ* (*хурей* значитъ сухой). Поднимаясь вверхъ по этой рѣкѣ, можно перевалить черезъ Саянскій хребетъ, спустившись по ту сторону въ долину р. Ур-системы Селенги, гдѣ расположены кочевья урянхайцевъ. Торговцами и скотогонами обращено вниманіе и на этотъ путь въ Монголію, но обиліе валуновъ по долинѣ Хорбятки съ одной стороны и болотъ по Ури съ другой препятствуютъ осуществленію цѣли и за-

стали бы предпочитать всё-же таки дорогу через Хангинскій перуль. Однако нужно замѣтить, что зимой по Хорбяткѣ ѣздить и прогоняютъ скоть въ Монголію. Между Хара-угуномъ и Хорбяткой, отстоящихъ другъ отъ друга на 10 верстѣ, кочуютъ Хондарскій родъ и часть Тертеевского. Степь эта (часть долины Иркутъ) дѣлится на двѣ части, носящія названіе Х а й д а г а й - т а л а (степь юса), примыкающая къ Хара-угуну и Х о р б я й - т а л а, ближайшая къ Хорбяткѣ. Населеніе въ этой степи густое. Въ 1883 году введено тутъ родовое управленіе, во главѣ котораго стоитъ русскій шаръ. Для кочевниковъ степь эта представляетъ всё удобства. Ровная, сухая, только кое-гдѣ болотистая степь обильно орошается горными ручьями; въ сѣверной части, какъ наиболѣе возвышенной, она распаивается, въ южной же служитъ для покосовъ. Трава тутъ прекрасная и заставляетъ даже тункинскихъ крестьянъ кортомить, имъ говорить, у бурятъ покосы, за плату не болѣе 1½ рубля въ годъ за десятину.

За Хорбяткой къ западу до р.ч. Кыренъ мѣстность становится лѣсной, послѣ чего она снова становится открытой и заселена инородцами 1-го и 2-го Хойготскаго родовъ. Тутъ-же на берегу р. Кыренъ расположенъ описанный выше дацанъ (стр. 66). Мѣстность, гдѣ кочуютъ Хойготцы, невелика, и потому ихъ лѣтники (*зазимники*) находятся совершенно вблизи отъ зимниковъ (*убымазонсовъ*). Зимни располагаются возлѣ зимниковъ и ничѣмъ отъ нихъ не отгорожены, между тѣмъ какъ лѣтники отъ зимниковъ отдѣляются иногда на десятки верстѣ поскотинной. Подобная пограничная отдѣляетъ кочевья Хойготскаго рода отъ с. Шимковъ. Начинаясь на самомъ склонѣ Саянскаго хребта, она доходитъ до самаго Иркутъ.

Обратимся къ самому селу Шимки. Находясь въ 40 верстахъ отъ Тунки, село это расположено по правому берегу Иркутъ на довольно-таки низменной мѣстности долины и окружено съ сѣвера одошвой Саянскаго хребта, а съ запада его отрогами. Тутъ собственно кончается плп, лучше сказать, начинается долина Иркутъ, какъ какъ выше Шимковъ, какъ извѣстно, Иркутъ протекаетъ среди горъ и скалъ. Такой же жалкій видъ какъ Тунка имѣетъ это село. Оно представляетъ собой бучу полугнилыхъ и полуразрушенныхъ домишекъ; только церковь, миссіонерскій домъ, расположенные на западномъ концѣ, да два дома, принадлежащіе индѣйцамъ имѣютъ порядочный видъ. Село это заслуженно носить свое названіе Шимки (*шимки* значить *щепотка*). Не смотря на

обиліе доброкачественной земли, богатаго рыбнаго и звѣринаго промысла, несмотря на то, что десятки тысячъ скота ежегодно прогоняются черезъ село изъ Монголіи,—всѣ статьи дохода, населеніе живетъ въ нищетѣ и веряшествѣ, и всему виной служить край распространенное среди шимковцевъ пьянство. Населеніе Шимковъ почти исключительно состоитъ изъ казаковъ, къ которымъ присоединились обрусѣвшіе буряты, населяющіе часть села, носящю названіе Шактоятъ. Когда-то село это служило пограничнымъ карауломъ, но съ начала нынѣшняго столѣтія, когда движеніе русскихъ направилось вверхъ по Иркуту къ Турану и Хангинскому караулу, Шимки потеряли свое значеніе какъ таковой. Казаки, отвыкнувъ отъ строевой жизни, не стали хорошими, мирными и селянами, а предаются пьянству и разврату и не умѣютъ пользоваться природными богатствами, которыя заключаются въ землѣ промыслахъ.

Противъ Шимковъ, на лѣвомъ берегу Иркута образовалась большая и прекрасная долина, называемая Елатей и изобилующая плодородными пастбищами и сѣнокосными лугами. Тутъ расположены кочевья Чалдараскаго и Куркутскаго родовъ. Озера, расположенныя по долинѣ и самъ Иркутъ изобилуютъ въ данномъ мѣстѣ рыбными табунами, хариусами, окунями, щуками и т. п., но несмотря на это, рыба въ Шимкахъ представляетъ рѣдкое блюдо. Только одного казака во всемъ селѣ оказался неводъ, вотъ до чего дошла безпечность и лѣнь шимковцевъ. Школы въ селѣ не имѣется.

Въ Шимкахъ съ января 1886 г. производились г-мъ Сенержинскимъ метеорологическія наблюденія. Наблюденія эти сдѣланы надежными съ іюля 1887 г. вслѣдствіе лучшей установки термометра. Они хранятся въ Иркутской обсерваторіи, но до 1889 г. печатаны не были, и только наблюденія Сенержинскаго надъ осадками печатались въ Лѣтопис. Главн. Физичес. Обсерваторіи съ марта 1886 г. В. А. Ошурковъ приводитъ въ матер. по изсл. земледѣлія Иркутской губ. среднія мѣсячныя температуры Шимковъ по 1 годовымъ наблюденіямъ

Январь	— 27,1	Іюль	+ 17,4		
Февраль	— 26,9	Августъ	+ 13,1	Весна	— 2,3
Мартъ	— 9,0	Сентябрь	+ 6,3	Лѣто	+ 14,7
Апрѣль	— 4,1	Октябрь	— 2,1	Осень	— 3,5
Май	+ 6,2	Ноябрь	— 14,8	Зима	— 25,3
Іюнь	+ 13,5	Декабрь	— 21,9	Годъ	— 4°,2

Наблюденія эти интересны потому, что Шимки расположены на высотѣ 800 метровъ, вслѣдствіе чего и климатъ здѣсь значительно суровѣе чѣмъ въ Иркутскѣ, Култукѣ и Черемховѣ. Нѣтъ сомнѣнія, что суровость эта ставитъ и земледѣліе Тункинской волости въ болѣе неблагоприятныя условія по сравненію съ другими волостями Иркутскаго и Балаганскаго округовъ. Такъ въ Иркутскѣ средняя температура 5-мѣсячнаго періода, обуславливающаго прорастаніе и вызрѣваніе хлѣбовъ составляетъ  $+13^{\circ},3$ , въ Черемховѣ даже  $+14^{\circ}$ , а въ Шимкахъ только  $+11^{\circ},3$ . Это различіе климатическихъ условій объясняетъ вполне, почему, какъ въ Тункинской волости, такъ и въ Тункинскомъ вѣдомствѣ посѣвы пшеницы очень ограничены, а озимая рожь почти совсѣмъ не сѣется.

Туранскій караулъ <sup>1)</sup>. Отъ Шимковъ до Туранскаго караула 26 верстъ по тѣлѣжной и ровной дорогѣ, проложенной по правому берегу Иркуты. До р. Зангисановъ тянутся пашни и луга шимковцевъ. Эта площадь пересекается руслами трехъ ничтожныхъ рѣчекъ Тайгурокъ, берущихъ начало у подошвы Саяна и текущихъ какъ бы по рвамъ, склоны которыхъ поросли роскошнымъ кустарникомъ тальника и черемухи. Воды въ рѣчкахъ весьма немного (одна изъ нихъ даже совершенно высыхаетъ въ лѣтнюю пору), цвѣтъ ея бурозелтый, рыбы вовсе нѣтъ. По ихъ верхнимъ теченіямъ кое-гдѣ располагаются мельницы. Вся долина трехъ Тайгурокъ представляетъ собой отличныя пашни съ суглинистой почвой, дающія и безъ удобренія хорошіе сборы съ посѣвовъ. Къ описанной долині принадлежитъ роскошная равнина. Тамхи-баряше, шириной въ двѣ, а длинной въ три версты. Равнина эта, окруженная лѣсомъ, вся распахивается и засѣвается обыкновенно яровымъ и озимымъ хлѣбомъ. Тамхи-баряше въ переводѣ съ монгольскаго значитъ *курить табакъ*, и вотъ почему равнина эта получила такое названіе. На западномъ концѣ ея останавливается всякій ѣдущій изъ Шимковъ. Для небольшого отдыха подъ тѣнью кустовъ березы и черемухи. Тутъ же закуривается и первая трубка. Обычай останавливаться именно на этомъ мѣстѣ заимствованъ у бурятъ, которые тутъ приносятъ жертву своимъ духамъ, прося у нихъ покровительства во время путешествія. Съ этой цѣлью, какъ жертву отъ себя, они привѣшиваютъ къ молодымъ березкамъ лентообразныя кусочки матеріи, а отъ лошадей пучекъ волосъ, выдернувъ предварительно изъ гривы и хвоста. За Тамхи-баряше уже начинается хол-

<sup>1)</sup> См. ниже стр. 62.

мистая мѣстность, покрытая отличнымъ лѣсомъ и называемая Бальдеруны. Она отдѣляется отъ описанной выше равнины ложбиной Ямы. Часть холмиковъ этой мѣстности расчищена отъ лѣса и захлаивается. Въ свою очередь съ запада Бальдеруны отграничиваются узкой ложбиной, по которой протекаетъ небольшой ручей Андріашкинъ-горхонъ, впадающій въ Иркутъ. Съ страннымъ названіемъ этого ручья связано слѣдующее преданіе. Нѣкто, по имени Андріанъ, желая полакомиться барашками, засѣлъ со своими товарищами подъ узенькимъ мостомъ черезъ ручей. Нужно сказать, что этимъ путемъ слѣдовали большія стада барановъ. Когда стадо приблизилось, часть барановъ, не помѣщавшаяся на мосту переходила въ бродъ ручей; изъ этихъ-то барановъ сидѣвшіе подъ мостомъ молодцы схватывали одного, другаго и перекручивали имъ шею. Предсмертный крикъ барановъ заглушался бленіемъ всего стада и не доходилъ до ушей овчаря. Подобное продѣлывали Андріашка не разъ, пока наконецъ хитрый промыселъ его не обнаружился. За этимъ ручьемъ и до рѣки Зангисана мѣстность каменистая, поросшая лѣсомъ и неудобная для обработки.

Оба Зангисана, лежащіе въ 5 верстахъ другъ отъ друга, своими крутыми, обрывистыми берегами и быстрымъ теченіемъ, ворожающимъ большія глыбы, служатъ не малымъ препятствіемъ для путешественника. Ихъ русла устьяны крупнымъ булыжникомъ, такъ что даже ѣзда верхомъ по нимъ затруднительна, уже не говоря объ экипажахъ.

Поднимаясь вверхъ по долину этихъ двухъ рѣкъ, можно прямо перевалить въ Монголію къ верховьямъ р. Ури, на что указываетъ интересный фактъ, что верховья Зангисановъ и р. Хорбятки лежатъ близко другъ отъ друга, но при дальнѣйшемъ теченіи Хорбятка направляется на с.-в., а Зангисаны на с.-з. Перевалъ черезъ Саянскій хребетъ по Зангисанамъ представлялъ бы много удобствъ, если бы не постоянныя осипи, затрудняющія путешествіе. Тутъ не лишне будетъ упомянуть о хорошемъ сѣрномъ горячемъ ключѣ Илхѣ Арашанъ, вытекающемъ вблизи отъ верховьевъ Зангисановъ. Температура источника оказалась по наблюденію Дуброва  $+40^{\circ}$  F. Среди бурятъ и монголовъ этотъ источникъ пользуется большою славой; къ нему стекается множество кочевниковъ, жаждающихъ исцѣленія отъ ревматизма, желудочныхъ и кожныхъ болѣзней. Для этой цѣли самымъ первобытнымъ способомъ устраиваются ванны, именно по теченію источника вырываются ямы. Когда ямы наполняются водой, кочевники раздѣваются и ложатся въ нихъ.

Кто побогаче, тотъ устраиваетъ надъ ямой конусообразный шалашикъ, чтобы защититься отъ сквознаго вѣтра. Во время леченія монголы не пьютъ водки, рыбы не ѣдятъ, а питаются исключительно мясомъ. Съ этой цѣлью они пригоняютъ съ собой рогатый скотъ и овецъ. По близости отъ этого источника расположенъ еще одинъ, но уже холодный источникъ Гужирай-арашанъ. Воду этого источника монголы пьютъ отъ желудочныхъ болѣзней и промываютъ ей больные глаза.

Минеральные источники, какъ думаютъ буряты и монголы, есть особый даръ боговъ и находятся въ вѣдѣніи одного изъ духовъ. Вотъ почему, проѣзжая мимо такого минеральнаго источника, nomads останавливаются для принесенія духу жертвы. Возлѣ источника строятъ обоны (кучи), въ нишахъ которыхъ, обращенныхъ на вѣтъ, ставятся *бурханы* и *маки* (досочки съ вырѣзанными на нихъ молитвами *ом-ма-ни-бад-ме-хомэ*). Въ источникъ же бросаются свиновья пули, мелкія монеты, драгоценные камни. Кусты по близости увѣшиваются разноцвѣтнымъ тряпьемъ. Не только себя но и скотъ свой и лошадей лечатъ nomads минеральной водой и нередко съ большимъ успѣхомъ.

Относительно происхожденія названія Зангисановъ существуетъ слѣдующее любопытное преданіе. На берегу озера Косогола жилъ некогда богатый старикъ. Была у него красивая жена, на которую всѣ заглядывались. Потому старикъ и держалъ ее подъ стропиль прикрытіемъ и жестоко обращался съ ней. Не вытерпѣвъ дурнаго обращенія, красавица, воспользовавшись отсутствіемъ старика, который поѣхалъ осматривать свои табуны, осѣдлала лучшаго коня и умчалась внизъ по р. Иркуту. Вернувшійся къ вечеру мужъ, замѣтивъ отсутствіе жены, поскакалъ вслѣдъ за нею. Красавица услышала уже за собой погоню. Она, изнуренная, голая, къ тому же находясь въ послѣдней стадіи беременности, едва переправилась черезъ пересѣкавшую ея дорогу рѣку. Далеко она уже не могла продолжать путь и, остановившись на берегу, родила мальчика. Тѣмъ временемъ старикъ-мужъ уже подѣлалъ къ рѣкѣ и сталъ переправляться черезъ нее. Но новорожденный мальчикъ спасъ свою мать. Мановеніемъ своей рученки онъ извлекъ сильную прибыль воды въ рѣкѣ, что препятствовало переправившемуся переправиться черезъ нее. Пока мать не оправилась совершенно, вода въ рѣкѣ стояла высоко. Мужъ же, видя невозможность переправиться черезъ рѣку, принужденъ былъ уѣхать домой. Сорока приносила бѣдной матери пищу: куски мяса и ко-

репки мыхыра (*Polygonum viviparum* Pall.). Въ благодарность за спасеніе мать принесла жертву Лу (духу воды) и назвала сына Занглия. Оттуда произошло и названіе рѣки Занглия-усу (усу — вода), что русскіе передѣляли въ Зангисань.

Какъ уже сказано выше, перейдя рѣки Зангисаны, путь изъ Шимковъ прорѣзаетъ пашни туранскихъ казаковъ и достигаетъ наконецъ и самого караула. До начала настоящаго столѣтія караулъ этотъ былъ пограничнымъ, казаки жили въ казармахъ, остатки которыхъ сохранились въ видѣ гнилыхъ, разрушившихся здакій къ западу отъ теперешняго жилья казаковъ. Основаніе настоящаго жилья положено было въ двадцатыхъ годахъ забайкальскими казаками Тюменцевымъ и Пежемскимъ, пришедшими съ семьями отбывать постовую службу на границѣ. Такъ какъ возлѣ казармъ земля была болотиста и неудобна для обработки, казаки выбрали для поселенія возвышенный берегъ р. Хала-угуна (горячая вода). Потомки этихъ то казаковъ и составляютъ теперь населеніе. До 1881 года постройки казачьи имѣли правда весьма непривлекательный видъ, съ этого же года Туранъ заново обстроился и имѣетъ видъ чистенькаго хуторка, свидѣтельствующаго о трудолюбіи, опрятности и изъ году въ годъ улучшающагося экономического положенія небольшой, но тѣсно сплоченной между собой казацкой общины. Отсутствіе обширнаго земледѣлія не вызвало лѣнью населенія, а недостаткомъ удобныхъ для этой цѣли земель, чрезмѣрной высотой мѣстности (2502' абс. выс. по Кропоткину), влекущей за собой позднія заморозки и ранніе инеи, препятствующіе либо всходу, либо вызрѣванію хлѣбовъ. Главный источникъ средствъ у туранцевъ извозъ. Содержа большое количество лошадей, казаки занимаются перевозкой товаровъ въ Монголію, напр. въ Дархаты. Рыбный и звѣринный промыслы, доставка куръ, яицъ, молока и сыру въ Нилову пустынь во время лѣтняго сезона, когда туда собираются для пользованія минеральными водами иногда до 50 человекъ, даютъ имъ кромѣ того не малый доходъ. Осенью казаки заготавливаютъ для скотогоновъ сухари, сторожатъ ихъ стада за 25—30 р. въ мѣсяцъ, продаютъ имъ сѣно и сдаютъ имъ квартиры. Такимъ образомъ туранцы живутъ хоть и не богато но хорошо и, что особенно достойно хвалы, не пьютъ у себя въ выслѣтѣ кабаковъ съ ихъ пагубнымъ вліяніемъ на нравственность. И неудивительно, что въ сравненіи съ жителями Шимковъ туранцы народъ честный, трудолюбивый. Живя въ тѣсной связи съ бурятскимъ населеніемъ, казаки переняли отъ нихъ не только языкъ и обычаи, но даже и нѣкоторые вѣрованія.

Всего окруженъ лѣсомъ. Только съ западной стороны лѣсъ рубленъ и мѣсто занято подъ нашни. Рѣка Хала-угунъ разбивается въ данномъ мѣстѣ на три рукава, которые однако-же снова сливаются въ одно русло незадолго до впаденія въ Иркутъ, богата рыбой и течетъ среди густаго лѣса. Съ запада, юга и юго-востока къ караулу примыкають лѣтники бурятъ Хойтогорьскаго плеса, которыхъ насчитывается до 300 душъ обоего пола. Ближайшія лѣтнія кочевья называются Урдуголь (*передняя рѣка*), расположенныя на ровной, слегка лѣсистой мѣстности, на правомъ берегу Хала-угуна. По другую сторону той-же рѣки находятся кочевья Деде-бори и Додо-бори (*верхніе и нижніе приорки*). На лѣвомъ же берегу Иркутъ расположенъ на довольно болотистой мѣстности улусъ *Бори*, состоящій всего изъ 10 юртъ. На зиму всѣ буряты уходятъ къ р. Ихэ-угуну, которая въ 15 верстахъ отъ Туринскаго караула протекаетъ по широкой равнинѣ, называемой Хойтогорь. Тутъ и располагаются ихъ зимники. Буряты этой мѣстности мало занимаются земледѣіемъ, а преимущественно звѣроловствомъ и скотоводствомъ.

Хангинскій караулъ <sup>1)</sup>, иначе Монды. Двѣ дороги соединяють Туринскій караулъ съ Хангинскимъ. Одна на ю.-з., бродомъ черезъ Хала-угунъ и Иркутъ, по лѣвому берегу этой рѣки до урочища Нурь-Кутула, а оттуда на западъ въ Хангинскій караулъ. Другая же дорога идетъ по правому берегу Хала-угуна въ бродъ черезъ Иркутъ, затѣмъ правымъ берегомъ послѣдняго до того же Нурь-Кутула, откуда уже прямо въ Монды. Кромѣ этихъ двухъ дорогъ есть еще одинъ путь черезъ Нилуу пустынь, Хойтогорь до Нурь-Кутула—это самый длинный, но и самый удобный путь, такъ какъ приходится разъ только переходить Иркутъ въ бродъ. Извовавъ лѣтнія юрты Урдугольскихъ бурятъ, достигается малоизвѣстный правый притокъ Хала-угуна р. Туранъ, берущій начало въ одномъ мѣстѣ съ Зангисанами и текущій по каменистому дну. Вдоль по Турану можно выйти на верховье той же рѣки Ури, системы Селенги. Близкій этотъ путь имѣетъ въ свое неудобство, заключающееся въ каменистости почвы. За Тураномъ дорога въ Хангинскій караулъ проходитъ мимо разрушенныхъ казачьихъ казармъ и заброшенной часовни, около которой расположено русское кладбище, затѣмъ по лѣсистой мѣстности достигаетъ Хала-угуна и Иркутъ, переходить ихъ въ бродъ и направляется по лѣвому

<sup>1)</sup> См. выше стр. 44.



берегу послѣдняго. Въ этомъ мѣстѣ Иркутъ образуетъ нѣсколько островковъ, на которыхъ растетъ рѣдкая въ другихъ мѣстахъ Иркутской губерніи облепиха, которую собираютъ тутъ и русскіе и буряты и сбываютъ ее въ Тунку и Иркутскъ на водочные заводы. Далѣе слѣдуетъ крутой подъемъ хотя и на невысокій дабагъ Комарыкъ. Подъемъ этотъ настолько крутой, что осенью, когда онъ обледенѣлъ, скотогонны спускаютъ по немъ скотъ на веревкѣ. При этомъ нужно замѣтить, что скотъ не сходитъ, а просто скатывается и зачастую переламываетъ себѣ ребра и ноги. За Комарыкомъ идетъ уже спускъ въ Нуръ-Кутулу (вѣрнѣе Нуръ-Хутулу нуръ—озеро, а хутулъ—перевалъ, переправа). Вся равнина Нуръ-Кутула <sup>1)</sup> представляетъ собою болотистую, покрытую кочками мѣстность, среди которой расположено нѣсколько сухихъ бугорковъ, на которыхъ и построены юрты. Въ юртахъ этихъ зимой живутъ барлуки (работніе) и караулятъ скотъ, стоящій тутъ на коромежѣ. Восточная часть этой равнины суха; буряты ее расчищаютъ отъ лѣса и, пользуясь хорошей суглинистой почвой, обрабатываютъ ее подъ пашни, на которой сѣютъ рожь, пшеницу и ячмень, дающія хорошіе урожаи. Вся равнина окружена отличной тайгой, въ которой водится немало дикаго звѣря. Кабаны, лоси, козы поѣдаютъ цѣлыя скирды, почему буряты и стали складывать хлѣбъ на высокихъ подставкахъ, чтобы звѣри не могли достать его. Подставки эти строятся слѣдующимъ образомъ. Нѣсколько столбовъ до 1 саж. длины врываются рядами въ землю, а оконечности устилаются толстыми палками. Западная часть Нуръ-Кутула изобилуетъ цѣлою системой озеръ. За Нуръ-Кутуломъ тянутся все болота. Черезъ нихъ слѣдано нѣчто въ родѣ гати, но гать эта никогда не исправляемая, представляетъ еще больше неудобства и опасности, чѣмъ само болото, и потому предпочитаютъ переправляться прямо черезъ болото, съ кочки на кочку.

Упомянемъ тутъ же о мѣстности Бортой, лежащей въ 7 верстахъ отъ Нуръ-Кутула и служащей границей между землями тунгусскихъ и хангинскихъ бурятъ. Бортой есть сплошное болото, съ трехъ сторонъ оно окружено горами, четвертая же часть, именно сѣверная открыта и примыкаетъ къ берегу р. Иркутъ. Черезъ болото это протекаетъ съ ю.-з. на с.-в. горный ручей, а по срединѣ на пригоркѣ стоятъ три юрты, въ которыхъ живутъ три семейства въ самой ужасной нищетѣ. У каждаго семейства есть по двѣ

<sup>1)</sup> См. выше стр. 61.

лошадь, по двѣ коровы и штукъ пять овецъ. Питаются они почти исключительно чаемъ, къ которому и то только лѣтомъ, прибавить молока. Мясо ѣдятъ они только, когда удастся убить козу, оленя, изюбра, лося или медвѣдя. Добываемые ими рыбчики служатъ имъ обыкновеннымъ предметомъ на чай и соль, причемъ стоимость шры не болѣе 15 коп.

Въ одной верстѣ отъ Борьто находится такая же болотистая мѣстность Шулай. Отъ Борьто Шулай отдѣляется горнымъ переваломъ. Тутъ живутъ въ юртахъ два брата Ухаевы. У одного изъ нихъ построена даже маленькая, низкая избушка съ небольшою печью, лавочками и столиками. Вокругъ избушки дворикъ. Все обдержится чисто и опрятно.

Посѣтивъ и это мѣстечко, Дубровъ поѣхалъ узкимъ горнымъ расщельемъ, въ которомъ грязь и разбросанные острые реберные камни значительно препятствовали движенію. Наконецъ дорога достигла одной изъ подошвъ хребта Хара-дабанъ (см. стр. 61), одного изъ значительнѣйшихъ отроговъ Тункинскихъ альповъ, на который существуетъ нѣсколько подъёмовъ. Одинъ изъ нихъ весьма крутой и носитъ у мѣстнаго населенія названіе Воронинъ-дабанъ воть въ какомъ особому случаю. Въ пятидесятыхъ годахъ каторжники, бывшіе изъ Кары, Нерчинскихъ и Петровскихъ заводовъ, дойдя у с. Култука, направлялись въ Торскую степь; откуда одни перешли въ Монголію, другіе же, поднявшись по Иркуту и спустившись по Окѣ, выходили у с. Зиминскаго на московскій почтовый трактъ. Однажды зашедшій мимо упрямый Хангининъ караулъ урядникъ Воронинъ переловилъ бродягъ, проманившихъ въ лѣсу мимо караула. Скрутивъ имъ руки, Воронинъ, захвативъ съ собою казаковъ, одинъ рѣшился конвоировать бродягъ въ Тунку. Но на пути одному изъ каторжниковъ удалось каки-то развязать себѣ руки и освободить своихъ товарищей. Одна бросилась на Воронина, обезоружила его, отвала у него то, что онъ имѣлъ, и, привязавъ храбраго казака къ дереву и оставивъ его на произволъ судьбы, удалилась. Казакъ былъ отвязанъ лишь къ вечеру проѣзжавшими тутъ бурятами. Все это произошло у послѣдняго спуска съ Хара-дабана, поэтому онъ и мучилъ свое названіе отъ имени казака.

За крутымъ Воронинимъ-дабаномъ слѣдуютъ еще четыре болѣе или менѣе значительныхъ спуска и подъема, пятый же, самый крутой и высокій подъемъ идетъ черезъ главную цѣпь. На Хара-дабанъ и на нигдѣ не видать, только воронкообразная, четырехуголь-

нцы и трехугольныя котловины затрудняютъ значительно. цуѣ. Въ нихъ стекаетъ вода, образуя болота, а иногда даже цѣлыя небольшие озера. На одной изъ вершинъ поставленъ обо (куча), нѣбѣ щій историческую подкладку. Миссіонеръ, проповѣдывавшій въ здѣшней мѣстности христіанскую религію, желая показать безсиліе бурятскихъ духовъ, разрушилъ этотъ обо, но вскорѣ послѣ этого захворалъ и съ трудомъ доѣхалъ до Хангинскаго караула. Буряты приписали болѣзнь миссіонера карающей силѣ своихъ духовъ, снова построили обо и стали его еще больше почитать. Такимъ образомъ здѣшніе буряты еще болѣе убѣдились въ истинѣ своей религіи.

На одномъ изъ послѣднихъ спусковъ дорога проходить по болоту, послѣ чего спускается въ знакомую намъ равнину Шолу сапша ша, черезъ которую протекаетъ ручей того же имени. Не далеко отъ этой мѣстности расположена падь (схитъ) Шабартеи (грязная), по которой разбросано нѣсколько зимнихъ юртъ. Въ срединѣ Шабартеи расположено озеро Холбонуръ. Минувая эту мѣстность и переправившись черезъ гору Дабаниама, дорога достигаетъ ровной и безлѣсной мѣстности, на которой видны остатки разрушенныхъ нынѣ казарменныхъ построекъ. Теперь на этой площади хотятъ устроить постоянное пребываніе миссіонера. Съ этой цѣлью начали строить домъ и церковь. Спустившись съ равнины къ р. Иркуту, переправившись черезъ него въ бродъ и поднявшись на весьма крутой его правый берегъ, дорога постепенно достигаетъ Хангинскаго караула, расположеннаго въ расширенномъ части долины Иркуты, извѣстной среди мѣстнаго населенія подъ именемъ Монды<sup>1)</sup>. Выше и ниже этого мѣста долина Иркуты значительно суживается. Въ Мондахъ помѣщается около 70 бурятскихъ дворовъ. Скажемъ нѣсколько словъ объ исторіи этого караула и присвоеннаго ему названія. Мѣстное названіе Мойгу караула получило отъ скалы, расположенной на лѣвомъ берегу Иркуты у казачьихъ казармъ и носящей названіе Мойгу-байсанъ (байсанъ—скала). Скала эта у бурятъ считается священной и служитъ обиталищемъ мышамъ, пометъ которыхъ, какъ въ данномъ случаѣ, священныхъ звѣрьковъ, употребляется какъ лѣкарство, а валуны конгломератовъ, валяющіеся у подошвы скалы, собираются жителями и хранятся какъ талисманы.

Преданіе говоритъ, что въ мѣстности этой въ былыя времена

<sup>1)</sup> У Потанина («Поѣздка въ Дархаты») мѣстность эта названа Мевотъ. Названіе это оспаривается Дубровицъ I. с. pag. 43.

или китайцы (в.и. другой нагой вибудь народъ, этого сказать на основании научныхъ данныхъ пока еще точно нельзя). Остатки изъ построекъ въ видѣ кучъ камней, сложенныхъ, какъ ясно и теперь еще видно, въ круглыя ограды, расположены на правомъ берегу Иркутъ и носятъ у бурятъ названіе китайскихъ городищъ. Однако наиболѣе положительныя свѣдѣнія указываютъ на то, что жившіе тутъ монголы стояли въ подчиненіи у Сайнъ-ноинъ-хана. Приходили они въ Мойгу только на зиму, а лѣтомъ кочевали по Ури и у береговъ оз. Косогола. Выборъ этой мѣстности для кочевниковъ объясняется выгоднымъ топографическимъ положеніемъ. Со всѣхъ сторонъ, начиная съ Шиле-да-ба-на (пограничная гора) и до Иркутъ до равнины Шабартей мѣстность Хангинскаго караула окружена горами: съ сѣвера отрогами Тункинскихъ альповъ, съ юга Саянскаго хребта. Въ безпорядкѣ столпившіяся горы, образуя узелъ, соединяющій Тункинскіе альпы съ Саяномъ, образуютъ много ущелій, тѣснинъ и котловинъ, особенно удобныхъ для пребыванія въ теченіи зимъ, такъ какъ въ нихъ царствуетъ полное затишье. Лѣтъ и бураны, которымъ подвержено въ сильной степени прибрежье Иркутъ въ данной мѣстности, въ нихъ совершенно отсутствуютъ. Потому эти укромные уголки такъ милы буратамъ и получили отъ нихъ наименованіе *дуламъ-юзаръ*, т. е. теплое мѣсто.

Когда же русскіе заняли всю долину Иркутъ, часть кочевниковъ перешла совершенно въ Монголію, другая же, принявшая русское подданство, была выселена въ Торскую степь, вѣроятно вслѣдствіе политическихъ соображеній, чтобы избавить мѣстность отъ постояннаго перебѣжничковъ. На мѣсто выселенныхъ бурятъ сюда присланы были казаки, построившіе себѣ на лѣвомъ берегу Иркутъ деревянныя изгороди. Казаки защищали границу отъ вторженія орды Сайнъ-ноинъ-хана и препятствовали перебѣгу бурятъ въ Монголію. Послѣ Буринскаго трактата, когда была опредѣлена наша граница съ Монголіей и урегулированы отношенія между подданными обоихъ государствъ, вышло разрѣшеніе селиться бурятамъ вдоль границы, и былъ построенъ рядъ карауловъ и къ исполненію службы на нихъ привлечены были между прочимъ и инородцы, которые успѣли сосредоточить свое пребываніе въ этой мѣстности. Это были кочевники Иркутскаго округа. Извѣстное количество ихъ было вызвано въ караулы, гдѣ они и поселялись въ юртахъ возлѣ казармъ, предназначенныхъ для казаковъ. Буряты приходили въ караулы со своимъ семействомъ и имуществомъ и рѣдко возвращались на родину по отбытіи срока службы, а оставались жить и впредь близъ

карауловъ. Обязанность поселившихся вдоль границы русскихъ бурятъ заключалась въ военномъ осмотрѣ границы, въ наблюдѣ за провозомъ контрабанды, такъ какъ по трактату между монголами и русскими не должно было быть никакихъ торговыхъ сношеній. Имѣя такую власть въ рукахъ, казаки не только что не исполняли своихъ обязанностей, но изъ неисполненія ихъ сдѣлали себѣ источникъ большихъ выгодъ. Торговля сношенія продолжались съ нелегальнаго разрѣшенія казаковъ, получившихъ предвѣдительно объемистую взятку въ видѣ третьей части «выгоняемаго (скотъ) или «вывозимаго» (масло, кожи).

Жители Хангинскаго караула (119 душъ изъ которыхъ 62 мужъ управляются выборнымъ старшиной. Селеніе въ административномъ отношеніи дѣлится на двѣ половины Деде-мойгу и Додо-мойгу (верхняя и нижняя). Границей между ними служитъ скала Мойгу байсанъ. Каждая половина управляется своимъ десятникомъ (Бошко). Подати въ размѣрѣ отъ 12 до 15 руб. съ души вносятъ въ Торскую степную думу.

Экономическое состояніе хангинцевъ сильно пало вслѣдствіи дѣли и праздности населенія. Земледѣіе, рыбный и звѣринный промыслы совершенно запущены. За 15 руб. хангинцы съ конемъ и нимаются въ работники, перевозятъ товары, отправляющіеся въ Монголію, поступаютъ довольно часто въ караульщики и пастухи скота, а съ Октября и по Апрель занимаются перекупомъ бѣлокъ у бурятъ Окнискаго караула.

**Примѣчаніе 2-е. Дополнительные свѣдѣнія о Тункинской волости и Тункинскомъ инородческомъ вѣдомствѣ.**

Въ дополненіе къ свѣдѣніямъ о Тункинской волости и Тункинскомъ инородческомъ вѣдомствѣ, изложеннымъ на стр. 82 и 84 сообщаются здѣсь еще нѣкоторые свѣдѣнія, добытыя превосходными изслѣдованіями статистической партіи, работавшей въ 1887—88 въ трехъ округахъ Иркутской губерніи (Иркутскомъ, Балаганскомъ и Нижнеудинскомъ) по распоряженію генераль-губернатора графа Игнатѣва и относящіяся какъ до землевладѣнія, такъ и до экономическихъ и бытовыхъ особенностей Тункинской волости и Тункинскаго инородческаго вѣдомства.

Тункинская волость русских крестьян состоитъ всего только изъ двухъ сельскихъ обществъ Тункинскаго и Култукскаго<sup>1)</sup>. Первое изъ этихъ обществъ составляютъ крестьяне с. Тунки, Ахалкискихъ выселокъ и дер. Еловки. Они составляютъ одну юридическую общину, владѣющую одною межевою дачею. При всемъ томъ въ землевладѣніи этомъ существуетъ большая иррадица, благодаря тому, что въ с. Тункѣ живетъ много казаковъ. Въ предѣлахъ Тунки и дер. Еловки много инородцевъ, а между крестьянскихъ селеній Тункинскаго общества не только череполосны между собою, но и съ пашнями казаковъ и инородцевъ. Относительно покосовъ крестьяне трехъ селеній общества образуютъ одну общину, но выгонъ у нихъ общій съ казаками и инородцами. Крокъ того часть крестьянъ Тункинскаго общества проживаетъ въ инородческой деревнѣ Талой, а часть въ казачьихъ селеніяхъ Шимковскомъ и Гужирскомъ. Култукское сельское общество состоитъ изъ крестьянъ прибайкальской деревни Култукъ, дер. Тибильтей и небольшихъ поселковъ при станціяхъ кругобайкальскихъ дорогъ: Утуликъ, Муринъ и Снѣжная. Селеніе Култукское имѣетъ три межевыя дачи, состоящими въ единственномъ владѣніи крестьянъ селенія, но крестьяне дер. Тибильтей, хотя имѣютъ особую межевою дачею, но крестьянскія земли въ этой дачѣ череполосны не только съ казачьими, но и съ инородческими.

Казаки, проживающіе въ районѣ волости группируются главнымъ образомъ въ с. Тункинскомъ и Тибильтейскомъ, а также въ казачьихъ поселкахъ Шимковскомъ, Гужирскомъ и въ Туранскомъ уралуѣ. Во владѣніи казаковъ с. Тунки и Тибильтей находятся особыя дачи, но пашни ихъ череполосны съ тункинскими крестьянами и инородцами и выгонъ общій. Гужирскіе казаки владѣютъ собою дачею, но съ ними пользуются въ той же дачѣ землею и проживающіе въ Гужирѣ крестьяне и инородцы. Шимковскіе и Туранскіе казаки владѣютъ отдѣльными дачами.

Общая площадь земель, отведенныхъ какъ тункинскимъ крестьянамъ такъ и казакамъ, простирается до 31.500 дес. (крестьянскихъ 15.500, казачьихъ до 16 тыс.), изъ которыхъ подъ лѣсомъ состоятъ 58%<sup>2)</sup>. Въ Тункинской волости по переписи 1887—88 г. 806 дворовъ, ее составляющихъ, 415 крестьянскихъ и 391 казачьихъ, а жилыхъ строеній 1046 (535 крестьянскихъ и 511 ка-

<sup>1)</sup> О землевладѣніи Тункинск. вол. см. Смирнова въ Матер. по изсл. земледѣл. нас. Иркутск. губ. 1890 г. Т. II, вым. 3, стр. 60—62.

<sup>2)</sup> Матер. I. с. Т. III, вым. 2-й, приложение III, къ гл. VI, стр. 24.

зачинъ). Изъ дворянъ волости менѣе 7% размѣщалось на за-  
вахъ, остальные 93%, въ селеніяхъ, такъ-что, хуторское хозяйст-  
во не представляетъ еще большаго развитія въ волости. Наличи-  
е населеніе волости слагалось кромѣ 2345 крестьянъ (1196 м. п.,  
2160 казаковъ (1095 м. и.) еще и изъ 150 постороннихъ ли-  
слѣдовательно простиралось до 4655 жит. об. п.<sup>1)</sup>. Приписан-  
е населеніе волости со временъ X-й ревизіи въ 30 лѣтъ прирасло  
73%<sup>2)</sup>. Приростъ этотъ представляется тѣмъ болѣе громаднымъ,  
что приселеній въ предѣлы волости въ послѣднее 30-лѣтіе совсѣмъ  
не было. Такъ какъ Тункинская волость изъ всѣхъ волостей губе-  
ни оказывается самою богатою дѣтми и подростками, то си-  
ный приростъ населенія можетъ быть объясненъ большою ро-  
даемостью, а также значительнымъ и постояннымъ перевѣсо-  
рожденій передъ смертностью, что конечно указываетъ на благоп-  
ятныя жизненныя условія въ предѣлахъ волости. Хозяйствъ  
волости 772 (383 крестьянскихъ и 389 казачьихъ). Лицъ въ  
бочемъ возрастѣ: 1079 крестьянъ (544 м. п.) и 1009 казаковъ  
(511 м. п.). Въ числѣ хозяйствъ было: съ 1 работникомъ 525 (т.  
числѣ въ 157 были еще и полуработники), съ 2-ми 157, съ  
и болѣе 52; въ остальныхъ 61 хозяйствахъ совсѣмъ не было взр-  
ныхъ работниковъ, но въ 26 изъ нихъ были подростки. Въ чис-  
жителей было грамотныхъ, полуграмотныхъ и учащихся 311 му-  
и 18 женщинъ. Въ с. Шимкахъ на Иркутѣ между жителями ес-  
зобатне, впрочемъ зобы между населеніемъ волости не имѣю  
большаго развитія.

О количествѣ земель, состоящихъ въ непосредственномъ по-  
зованіи населенія волости, цифры были уже приведены на стр. 6.  
Здѣсь замѣтимъ что изъ 12.200 дес. земли (кромѣ лѣса), состо-  
щихъ въ пользованіи населенія волости, до 6500 принадлежи-  
крестьянамъ и 5700 казакамъ. Въ числѣ этихъ земель усадебн-  
нимаютъ 1365 дес.; такое значительное пространство усадебны-  
земель объясняется развитіемъ *утуговъ*, т. е. удобренныхъ  
говъ (этихъ утуговъ въ волости 870 дес.) въ чертѣ усадебн-  
осѣдлости, и это утужное хозяйство, очень содѣйствующее разви-  
скотоводства, русскіе жители Тункинской волости заимствовали  
окужающихъ ихъ со всѣхъ сторонъ бурятъ. Абсолютная ча-  
пахатныхъ земель въ пользованіи крестьянъ и казаковъ вол-

<sup>1)</sup> Матер. I. с. Т. I, стр. 154.

<sup>2)</sup> О приростѣ населен. см. Астарова въ Матер. I. с. Т. II, ви. 2, стр.  
и 112.

со включеніемъ такъ называемыхъ чертежей или лѣсныхъ росчислѣй, составивать 7670 дес. (у крестьянъ 4600 дес., у казаковъ 3070 дес.), изъ которыхъ, какъ уже было сказано (на стр. 83), только половина состоитъ подъ посѣвами. Лѣсныя рощи въ Тункинской волости обширныя и составляютъ 21%, всѣхъ пахатныхъ земель <sup>1)</sup>, что указываетъ на быстрое хотя конечно только постепенное развитіе земледѣлія, которое отъ переложной системы хозяйства еще не перешло къ трехпольному. На каждыя 100 дес. земли въ Тункинской волости высѣвается рожью 63 дес. (60 дес. и только 3 озимю), пшеницею 15 дес., овсомъ 11, ячменемъ 1 дес. Частный сборъ хлѣбовъ въ волости: овса 55 пуд. съ десятины, пшеницы 48, ржи 40 <sup>2)</sup>.

Покосной земли въ пользованіи жителей волости 2740 дес. (1175 у крестьянъ, 1565 у казаковъ), что составитъ менѣе 4 дес. на хозяйство, что было бы недостаточно для существующаго въ волости значительнаго развитія скотоводства, если бы населеніе и заводило утговы и не арендовало въ значительномъ количествѣ покосовъ въ предѣлахъ волости у инородцевъ Тункинскаго вѣдомства (на каждыя 100 дес. собственныхъ покосовъ крестьяне Тункинской волости арендуютъ въ предѣлахъ волости еще 73 дес., что увеличиваетъ количество покосовъ до 6½ дес. на хозяйство). Тункинское общество имѣетъ покосы <sup>3)</sup>: по р. Козьмѣ высокіе и безъ болотъ и по р. Ахалику — низменные, съ кустарникомъ и небольшими болотами, частью затопляемые. Тибельтское общество имѣетъ покосы по рѣкамъ Иркуту и Тибельту, болѣею частью возвышенныя, поросшіе листовкою и волохотомъ, а меньшею частью болотистыя, съ осокою. Култувское общество имѣетъ покосы по рѣчкамъ Култуку, Талой, Похабнику и Слюдянкѣ, болѣею частью по низкимъ затопляемымъ мѣстамъ; покосы эти въ годы разлива не косятъ, а на другой годъ сѣно на нихъ хорошее. Казаки села Тунки имѣютъ покосы по р.р. Иркуту, Замтуй и Хале-горхону. Покосы эти довольно высокіе, но тогда затопляются и забиваются иломъ. Травы на нихъ болѣею частью питательныя и солончаковыя; на нихъ есть копецъ и осова. Селеніе Гужирское имѣетъ по Иркуту вообще сухіе и ровные покосы, но въ иные годы ихъ затопляетъ и тогда и косить нечего.

<sup>1)</sup> Козловъ въ Матер. I. с. Т. II, вып. 4, стр. 6.

<sup>2)</sup> Козловъ въ Матер. I. с. Т. II, вып. 4, стр. 53, 78.

<sup>3)</sup> Смирновъ въ Матер. I. с. Т. II, вып. 5, стр. 372.



а по р. Алхъ-Нохю покосы сырые и съ мелкимъ лѣсомъ, кочками и болотами. Селеніе Шимковское имѣетъ по р. Талтурк покосы волнистые окруженные лѣсомъ съ преобладаніемъ березники а въ урочищѣ «Яма» покосы ровные, но заливаемые водою и отчасти забиваемые пескомъ. Деревня Туранская имѣетъ по р. Алчакъ покосы ровные, поросшіе пыреемъ и только въ самыхъ низкихъ мѣстахъ осокою. Свѣдѣнія о количествѣ скота въ волости сообщены на стр. 83; здѣсь мы можемъ только замѣтить что, хотя по развитію скотоводства волость занимаетъ высокое мѣсто между волостями Иркутскаго округа, но далеко уступаетъ развитію скотоводства въ сосѣднемъ Тункинскомъ вѣдомствѣ, гдѣ количество скота (на жителя) на 66% болѣе чѣмъ въ волости, между тѣмъ какъ количество запашки (на каждые 10 жителей) какъ разъ на 65% болѣе въ волости чѣмъ въ вѣдомствѣ, что уже конечно зависить не отъ условій климата и почвы а отъ бытовыхъ различій. Подъ лѣсами въ дачахъ Тункинскихъ крестьянъ и казаковъ 18.300 дес. (9300 у крестьянъ, 9000 у казаковъ). Вблизи Тунки лѣса уже мало и онъ мелокъ. За дровами изъ Тунки ѣздить внизъ по Иркуту верстъ за 15, а за строевымъ лѣсомъ вверхъ по Иркуту и Тункѣ верстъ за 30, уже въ бурятскія дачи. Изъ Гужира ѣздить за строевымъ лѣсомъ верстъ за 15 вверхъ по Иркуту и на сѣверъ къ гольцамъ. Изъ Шимкова ѣздить въ бурятскія дачи верстъ за 15. Отъ Тибельтей дровяной лѣсъ отъ 2 до 5 верстъ, а строевой отъ 5 до 7 верстъ во все стороны (лиственница, сосна и береза). Только около Култука на водораздѣлѣ между Иркутомъ и Байкаломъ высокоствольный лѣсъ еще много. Сбыта лѣса и дровъ изъ Тункинской волости совсѣмъ нѣтъ, и лѣсъ идетъ только на мѣстное потребленіе жителей волости <sup>1)</sup>.

Неземледѣльческіе промыслы между населеніемъ волости вообще очень развиты: до 59% всѣхъ взрослыхъ и способныхъ къ труду работниковъ, сверхъ земледѣлія и скотоводства занимаются еще и промыслами <sup>2)</sup>. При обиліи лѣса до 1000 человекъ занимаются собственно лѣсными промыслами <sup>3)</sup>, какъ напримѣръ 2 сполокурениемъ и дегтярнымъ промысломъ, 10 пилвой дровъ, 2 плотничествомъ, 3 судостроеніемъ, 6 дѣланіемъ саней, телегъ, колесъ, 5 бондарствомъ, 3 токарными издѣліями и т. д. Выдѣ

<sup>1)</sup> Смирновъ въ Матер. I. с. Т. II, вып. 8, стр. 405.

<sup>2)</sup> Личковъ въ Матер. I. с. Т. II, вып. 4, стр. 320, 321.

<sup>3)</sup> Стрѣжневъ въ Матер. I. с. Т. II, вып. 4, стр. 327.

ию шлово и кожь занимаются 12 человекъ, обработкою шерсти 4, кузечнымъ промысломъ 41, пичнымъ ремесломъ 7. Но самые различные въ волости промыслы, благодаря обилію лѣсовъ, близости нѣки и присутствію значительной и богатой рыбою рѣки (Иркута): шота и звѣринные промыслы, рыболовство и сборъ кедровыхъ орѣховъ. Охотою и звѣриннымъ промысломъ занимаются въ волости до 120 человекъ, рыболовствомъ болѣе 50, а сборомъ кедровыхъ орѣховъ до 110.

Такъ какъ по количеству охотниковъ и разнообразію звѣринныхъ промысловъ между русскими волостями Иркутскаго округа Тункинская волость занимаетъ безспорно первое мѣсто, то мы считаемъ уместнымъ сообщить о звѣринныхъ промыслахъ нѣкоторыя свѣдѣнія, выходящія свое приложеніе не только къ Тункинской волости, но и ко всей Иркутской губерніи <sup>1)</sup>.

Орудіями звѣринаго промысла во всей губерніи служатъ не только ружье, но и различные снаряды и ловушки. Общеупотребительными между звѣрепромышленниками губерніи ружья — это дешевыя винтовки старой тульской работы, съ которыми здѣшнее населеніе свиклось издавна, легко ими орудуя, легко ихъ покупать и покупая ихъ за дешевую цѣну (отъ 5—8 руб.). Винтовки эти бываютъ разныхъ калибровъ: малопульные для мелкаго, пушнаго звѣри, большаго калибра для крупнаго. Купивъ такую винтовку, промышленникъ пристрѣливаетъ ее и приспособляетъ для своихъ цѣлей: такъ онъ иногда измѣняетъ прицѣлъ (мушку) по своимъ удобствамъ, прицѣливаетъ къ тяжелой винтовкѣ «сошки», а. е. упорки, которыми она поддерживается во время прицѣла и т. п. Порохъ и свинецъ промышленникъ покупаетъ у торговцевъ и получаетъ отъ казны черезъ волостное правленіе.

Изъ снарядовъ для добычи звѣря особенно распространены для крупнаго звѣри «звѣровныя ямы», для мелкаго пушнаго «лазанки». Звѣровныя ямы устраиваются слѣдующимъ образомъ: ямы, въ которыхъ ходитъ звѣрь, перегораживаютъ длинною, выскою изгородью, въ которой въ сторонѣ отъ тропы въ нѣсколькихъ мѣстахъ оставляются промежутки, «воротца». Въ этихъ воротцахъ выкапываются въ землѣ ямы, глубиною въ 1 саж., площадью отъ 1½ до 3 кв. арш. Въ яму вставляется деревянный трубъ, или отѣсные бока этихъ ямъ запираются тыномъ, такъ что каждая яма представляетъ какъ-бы неглубокій колодезь. По-

<sup>1)</sup> Молодыхъ въ Матер. I. с. Т. II, вып. 4, стр. 376—382.

верхъ ямы кладутся очень тонкія жерди, а на нихъ набрасываютъ мохъ, валежникъ и сучья такъ, чтобы поверхность ямы ничѣмъ не отличалась отъ окружающей мѣстности и не бросалась въ глаза звѣрю. Звѣрь, встрѣчая на своемъ пути изгородь, поворачивается и идетъ вдоль изгороди до тѣхъ перъ, пока не встрѣчается въ ней отверстія; устремляясь туда онъ и проваливается въ яму, помещаемую устроившимъ ее промышленникомъ разъ или два въ недѣлю для извлеченія изъ нея добычи. На устройство каждой ямы необходимо 5 рабочихъ дней, и яма оцѣнивается промышленникомъ отъ 3 до 5 руб. Если ямы устроены вблизи жилья, то лѣтомъ они остаются незакрытыми, чтобы въ нихъ не попадали домашніе скотъ, а закрываются онѣ, по мѣстному выраженію «настораживаются», только отъ 1 сент. до весны.

Для добычи мелкихъ, пушныхъ звѣрьковъ устраиваются плашки сдѣланныя на подобіе самыхъ первобытныхъ мышеловокъ. Этимъ доски съ наложеннымъ на нихъ грузомъ, поддерживаемымъ съ одного конца въ наклонномъ положеніи самыми легкими и непрочными подпорками, на перемѣнчѣ которыхъ располагается приманка для бѣлки—кусочъ гриба, для мелкихъ хищниковъ—бѣличье мясо. Звѣрекъ, хватая приманку, стягиваетъ подпорки, доска падаетъ и придавливаетъ его. Чтобы шкурка живаго звѣря при этомъ не портилась, доску съ нижней стороны иногда выдавливаютъ «рытцемъ».

У каждого промышленника бываетъ устроено отъ 1 до 20 ямъ (среднимъ числомъ 5) и отъ 100 до 3000 плашекъ (среднимъ числомъ 400). Иногда промышленники сдаютъ въ аренду свои ряды: по 1 р. за яму или за 100 плашекъ, или продаютъ ихъ: отъ 5 до 6 р. за яму или за 100 плашекъ.

Изъ крупныхъ звѣрей предметами охоты служатъ: сохатый (*Cervus alces* L.), изюбри (*Cervus elaphus* L.), дикіе козы (*Cervus capreolus* L.), дикіе бараны (*Aegoceros sibiricus* Ehr.), кабарга (*Moschus moschiferus* L.), медвѣди (*Ursus arctos* L.), волки (*Canis lupus* L. и *C. alpinus* Pall.), лисицы (*Canis vulpes* L.), рыси (*Felis lynx* L.) и россомаха (*Gulo borealis* Nilss.). Дикія козы встрѣчаются повсемѣстно, какъ вблизи жилищъ мѣстъ, такъ и въ глухой тайгѣ. Сохатые и изюбри въ мѣстахъ, болѣе удаленныхъ отъ селеній. Кабарга и дикіе бараны живутъ въ сильно гористыхъ мѣстностяхъ Тункинскаго и Саянскаго хребтовъ, на крутыхъ утесахъ. Кромѣ звѣровыхъ ямъ на сохатыхъ и кабаргу ставятъ еще и петли, а всѣхъ упомянутыхъ звѣрей въ большомъ ходу и ружейная охота.

Изъ примовъ ружейной охоты весьма употребительны облавы или ягоны, а для травяныхъ стрѣльба ихъ на солонцахъ. Если имѣть естественныхъ солонцовъ, то устраиваютъ и искусственные или такъ называемые «солонки». Для этого раннею весною, при первомъ появленіи земли, она поливается нѣсколько разъ крѣпкимъ растворомъ соли. Вблизи солонцевъ устраивается засадка или «лазъ», отгороженное мѣсто, за которымъ промышленныя сторожатъ иры. Стрѣльба на солонцахъ требуетъ большой осторожности и производится обыкновенно по ночамъ. Въ темныя ночи, когда прилѣ (мушки) не видно, то прицѣливаются по стволу, т. е. по слабому блеску ружейнаго ствола или стрѣляютъ «на слухъ». Медвѣди попадаютъ только случайно при охотѣ за другимъ звѣремъ. Промышляютъ ихъ ружьемъ или петлями, которыя ставятъ имъ ихъ у звѣровыхъ ямъ, куда они приходятъ полакомиться оставшимися въ ямахъ животными. Зимой, замѣтивъ медвѣжьё берлогу, добываютъ медвѣдей оттуда «заломами». За волками не ищутся, а истребляютъ ихъ, въ виду вреда, наносимаго ими скотоводству, бросая имъ отраву (пометы), начиненную стрихниномъ. Также поступаютъ и относительно лисицъ, для которыхъ, впрочемъ, еще ставятъ и капканы.

Изъ мелкихъ звѣрей по количеству добываемыхъ экземпляровъ первое мѣсто принадлежитъ бѣлкѣ (*Sciurus vulgaris* L.). Въ 1888 г. въ Тункинской волости было добыто 2070 бѣлокъ, а въ Тункинскомъ вѣдомствѣ 1435 штукъ. Затѣмъ слѣдуетъ хорекъ (*Mustela sibirica* Pall.), соболь (*Must. zibellina* L.), рѣже горностай (*M. erminea* L.), а также выдра (*Lutra vulgaris* Erichs.) и бурундукъ (*Tamias striatus* L.). Кромѣ ловли этихъ звѣрковъ плашками, на нихъ охотятся и съ ружьемъ и собакой. Преслѣдуемые собакою бѣлка и соболь заскакиваютъ на дерево и убиваются мѣткимъ выстрѣломъ. Соболь часто прячется въ нору, откуда его выпугиваютъ дыномъ. Ловятъ его также и петлями, устраивая ихъ на перекинутыхъ черезъ рѣчку бревнѣхъ. Перебѣгая по бревну, соболь попадаетъ въ петлю, сваливается въ воду и тонетъ.

Изъ птицъ предметами промысла служатъ водныя птицы, рябныя, тетерева и глухари. Кромѣ охоты за ними съ собакою и ружьемъ ставятъ для птицъ и разныя ловушки, какъ напримѣръ и тетерекъ «корчаги». Корчага есть частокоть, огороженный по кругу діаметромъ въ  $\frac{3}{4}$  арш. изъ тонкихъ березовыхъ палочекъ, крѣпкіе концы которыхъ скрѣплены между собою изнутри обручами. Сверху по діаметру такой корчаги кладется перекладина, а

поперекъ ея доска длиною менѣе діаметра корчаги съ свободными концами. Доска эта укрѣплена такъ, что если нажать ее даже слабо съ одного конца, то она принимаетъ вертикальное положеніе, открывая корчагу но при отсутствіи нажима опять приходитъ въ горизонтальное положеніе. На конецъ доски кладется приманка. Привлеченная птица становится на дощечку, своею тяжестью перевертывается и падаетъ въ корчагу, откуда уже вылетѣть не можетъ, такъ какъ дощечка прикрываетъ корчагу, оставляя узкія отверстія только по краямъ. Въ такую корчагу попадаетъ иногда отъ 10 до 20 тетерекъ въ сутки, но, конечно, этотъ способъ лова примѣняютъ только къ птицамъ тяжелымъ и не легко взлетающимъ.

Звѣровыя собаки Иркутской губерніи по внѣшнему виду мало отличаются отъ обыкновенныхъ дворовыхъ собакъ, но острѣе морда и стоячія уши придаютъ имъ нѣкоторое сходство съ волкомъ. Цвѣта ихъ различны, но преобладаютъ сѣрыя разныхъ оттѣнковъ до полного перехода въ черныя. Особой дрессировкѣ собаки не подвергаются, но, бывая съ промышленниками въ тайгѣ съ ранняго возраста, приучаются мало-по-малу къ охотѣ за тѣмъ или другимъ звѣремъ, благодаря прирожденному инстинкту. Прибывъ въ тайгу къ устроенному тамъ «зимовью», охотники оставляютъ въ немъ припасы и лошадей, раннимъ утромъ идутъ осматривать свои ямы и плашки, а къ вечеру возвращаются на зимовье. Но если промышленникъ находитъ слѣды соболя, то онъ проходитъ за нимъ и два дня, не возвращаясь на зимовье, а питаясь захваченной съ собою краюшкой хлѣба. Въ ближнихъ тайгахъ охотятся весной и осенью одиночно, отлучаясь изъ дому отъ 3 до 10 дней.

Таежныя зимовья, устраиваемыя промышленниками въ дальнихъ тайгахъ, верстахъ отъ 80 до 200 отъ своихъ деревень, — это хижины вышиною въ ростъ человѣка при длинѣ и ширинѣ отъ 4½ до 5 арш. Посреди этой хижины сдѣлана каменка для разведенія огня; дымъ выходитъ въ сдѣланное въ стѣнѣ отверстіе. Промыселъ въ дальнихъ тайгахъ начинается въ первыхъ числахъ октября и продолжается въ теченіи 1 до 1½ мѣсяцевъ, пока не настанутъ холода и не выпадетъ глубокой снѣгъ, служащій препятствіемъ промыслу. Весною промыселъ опять начинается съ начала апрѣля. Въ это время гонятъ дикихъ козъ по «насту», тонкой ледяной корѣ, образующейся на рыхломъ весеннемъ снѣгѣ послѣ оттепелей отъ таянія поверхности снѣга на солнечныхъ лучахъ. Охотникъ на лыжахъ легко держится на настѣ и его со-

бака также, а коза на бѣгу проваливается и рѣжетъ себѣ ноги объ ледяную корку, вслѣдствіе чего собака легко настигаетъ ее, а сторожевые охотники, на которыхъ преслѣдующія нагоняютъ ихъ, убиваютъ ихъ даже палками, сберегая выстрѣлы. И не одніе изъ нихъ, а и другіе звѣри, выбѣгая на насть въ это время, подвержены той же участи.

Выходятъ на звѣринные промыслы и артелями отъ 3 до 10 человекъ. Добыча или деньги, за нее вырученныя, дѣлятся между участниками артели поровну, но бывають въ артели и наемные срочные рабочіе, не участвующіе въ дѣлѣхъ, а получающіе поочную плату. Бываетъ, хотя рѣдко, что весь промыселъ производится однимъ хозяиномъ съ посрочными рабочими, но въ такомъ случаѣ хозяинъ при неудачномъ промыслѣ и довольно высокой платѣ рабочимъ (по 35 р. въ мѣсяцъ), рискуетъ остаться при однихъ убыткахъ. Изъ продуктовъ звѣрепромышленности наибольшую цѣнность имѣють шкурки пушныхъ звѣрей (напр. соболей и выдръ по 8 руб., медвѣдей по 10 р., бѣлокъ по 12 коп.), кабаражья шкура (мусыръ) и молодые не отвердѣвшіе рога изюбра (по штучно въ 100 до 200 руб., а на вѣсъ отъ 6 до 12 р. за фунтъ).

Рыболовствомъ въ Тукинской волости и вѣдомствѣ занимаются в. Иркутѣ и во впадающихъ въ него рѣчкахъ и въ озерахъ <sup>1)</sup>. Впадаютъ въ рѣкахъ налимъ, харіусъ, ленокъ и таймень, а въ озерахъ карась и щука. Осенью и весною дѣлають артелью, отъ 15 до 17 человекъ, «заѣздки», т. е. перегораживаютъ рѣку или протоку частоколомъ; въ этихъ заѣздкахъ ставятъ «морды», «фитили», «корыта». «Морды» — это воронкообразныя съ двойными стѣнами изъ березы, сплетенныя изъ таловыхъ или березовыхъ прутьевъ. Морды широкимъ отверстіемъ направляются въ ту сторону, откуда идетъ рыба, которая, не имѣя возможности пройти черезъ частоколъ, попадаетъ въ морду. Фитили приготавливаютъ изъ старыхъ неводовъ и выкутъ изъ мотуза. Ставятъ ихъ, когда ледъ уйдетъ, и стоятъ они до половины мая; позже настаетъ прибыль воды и ихъ уносятъ. Корыта ставятъ осенью, когда рыба идетъ внизъ по рѣкѣ, въ 1 сент. до замерзанія. Корыто становится ниже уровня заѣздки; рыба сбѣгаетъ и при пониженіи ея уровня рыба остается въ корытѣ. Средній уловъ весною съ морды или фитиля около 1 пуда въ день или отъ 20 до 30 пуд. за весну; для артельного заѣздки зимній ловъ еще лучше — пуда 3 на корыто (Шимки). Въ темныя

<sup>1)</sup> Молодыхъ въ Матер. I. с. Т. II, вым. 4, стр. 393—402.

осеннія ночи, когда вода мелка и прозрачна, рыбу «лучать». Для этого на носу лодки прикрѣпляется «коза», т. е. жаревка, въ которой горятъ «смола», листовичныя смолистыя деревья, дающія такой яркій свѣтъ, что въ водѣ, на глубинѣ до 1 саж., все видно. Двое промышленниковъ садятся въ лодку и плаваютъ преимущественно въ тихихъ и не очень глубокихъ мѣстахъ; одинъ изъ рыболововъ управляетъ лодкой, другой высматриваетъ рыбу и бьетъ ее «острогой». Острога эта желѣзная вилка съ тремя или четырьмя заостренными концами, посаженная на длинный и крѣпкій березовый шестъ. Этимъ способомъ добываютъ въ ночь отъ 1 до 4 пудовъ. Лученіе продолжается около мѣсяца, но въ ненастную погоду и въ лунныя ночи лученіе невозможно. Лѣтомъ и осенью ловятъ рыбу неводами. Невода рыболовы вяжутъ сами, длиною они до 30 саж., обходятся они рублей въ 30 каждый (4 пуд. нити 10 руб. и вязка 20 руб.). Въ среднемъ тоня даетъ пуда 3; тонь въ сутки можно закинуть отъ 2 до 3, а такъ какъ неводьба идетъ около мѣсяца, то она даетъ пудовъ 100 на 4 человѣка (Шимки). Впрочемъ такой ловъ не вездѣ; въ Гужирѣ онъ гораздо менѣе. Въ озерахъ неводятъ карасей отъ 1 до 2 мѣшковъ на тоню. Большая часть рыбы потребляется самими промышленниками, но часть ее продается ими такъ, что они съ своего рыболовства зарабатываютъ деньгами рублей 10 въ лѣто.

Весьма видное мѣсто между промыслами Тункинской волости занимаетъ и сборъ кедровыхъ орѣховъ <sup>1)</sup>. Разстояніе отъ Туны до кедровниковъ отъ 10 до 30 верстъ. Промышленники собираются на промыселъ между Успеневымъ и Семеновымъ днями (15 августа и 1 сентября) артелями отъ 4 до 10 человѣкъ, а кто не занимается хлѣбопашествомъ и цѣлыми семьями. Въ артеляхъ есть не мало женщинъ и дѣтей, такъ-что напримѣръ въ Култукѣ количество женщинъ и подростковъ составляетъ 40% всѣхъ лицъ входящихъ въ составъ артелей. Артели берутъ съ собою провизію, которую везутъ на лошадахъ въ вьюкахъ, необходимыхъ въ послѣдствіи для вывоза орѣховъ. Придя на мѣсто, артели разбиваются на группы, состоящія изъ двухъ человѣкъ. Если пришли рано, артели застаютъ еще шишки сырыми и, для того чтобы ихъ сварили, рубятъ кедръ. При своевременномъ же выходѣ сбиваютъ шишки ударами о дерево «колотушками». Эти колотушки состоятъ изъ саженой березовой палки, на которую насаженъ деревянный обру-

<sup>1)</sup> Стрежневъ въ Матер. I. с. Т. II, вын. 4, стр. 363.

бокъ пуда въ полтора вѣсомъ. Одинъ изъ товарищей мѣрно ударитъ о дерево колотушкой, другой подбираетъ валящіеся отъ сотресенія шишки. Въ день въ Тункинской волости собирается отъ 2 до 3 пуд. и даже 4 пуд. на человѣка (въ Смоленской и Черемховской волостяхъ только отъ  $\frac{1}{2}$  до  $1\frac{1}{2}$  пуда). Многіе промышленники для складыванія шишекъ строятъ особые небольшіе крытые амбары: когда шишекъ наберется достаточное количество, ихъ просушиваютъ на солнцѣ и извлекаютъ изъ нихъ орѣхи. Для этого употребляется катокъ длиною отъ 4 до 8 вершковъ или шель съ ручкою и поперечными зарубками въ родѣ употребляемаго при катаніи бѣлья, а также доска съ такими же поперечными зарубками. На доску эту, положенную зарубками сверху, кладутся шишки, валькомъ, котораго зарубки обращены внизъ, либо ударяютъ, либо прокатываютъ по шишкамъ, которыя отъ того разсыпаются, освобождая изъ себя орѣхи. Въ одинъ день человѣкъ «накатываетъ» отъ 7 до 10 пуд. орѣховъ. Затѣмъ орѣхи просѣиваютъ черезъ рѣбное сито, вѣютъ отъ мякины, кладутъ очищенными отъ постороннихъ примѣсей въ мѣшки. Мѣшки эти дѣлятся между членами артели, на чьей доли малолѣтковъ опредѣляются предварительнымъ уголокомъ. Въ Тункинской волости промышленники прямо везутъ свою добычу домой, въ другихъ же мѣстностяхъ, гдѣ кедровники отстоятъ гораздо далѣе отъ селеній (волости Бѣльская, Черемховская и вѣдство Аларское), орѣхи складываются въ артельные амбары и доставляются домой уже только зимнимъ путемъ. Большую часть орѣховъ обмываютъ въ Иркутскѣ, а меньшую продаютъ у себя дома пушникамъ или пріѣзжимъ торговцамъ. Цѣна такой продажи въ Тункѣ и Гужирѣ, на 50 до 60% ниже городской, которая простирается въ урожайные годы отъ 1 р. 50 к. до 2 р., а въ неурожайные отъ 2 р. до 4 р. До настоящаго времени пользованіе кедровниками въ Иркутской губерніи было совершенно свободно. Только случалось, что Култукскіе крестьяне Тункинской волости не допускали къ пользованію своими кедровниками крестьянъ Смоленской волости. Собиратели орѣховъ считаютъ только опаснымъ своимъ врагомъ прожорливую птицу «кедровку», прилетающую стадами въ кедровые леса и встребляющую иногда въ одну ночь орѣхи на большомъ пространствѣ, не оставляя и шишекъ, сбитыхъ промышленниками и оставленныхъ на ночь на землѣ.

Извозный промыселъ также имѣетъ нѣкоторое развитіе въ Тункинской волости, такъ какъ имъ занято до 130 человѣкъ. Развѣтію извоза въ значительной степени способствуетъ все болѣе и



болѣе развивающаяся торговля съ Монголією черезъ Тунку<sup>1)</sup>. Начало этой торговли весьма не давно и совпадаетъ съ открытіемъ лѣтъ 20 тому назадъ свободнаго переѣзда черезъ границу у Мондинскаго караула. Все болѣе и болѣе увеличивалась, ежегодные обороты этой торговли превзошли уже въ 1890 г. сумму въ 500 тыс. рублей. Изъ Монголіи проходятъ въ Россію до 10 тыс. головъ рогатаго скота, перегоняемаго гуртами, до 14 тыс. овецъ, а кромѣ того доставляется изъ Монголіи въ Иркутскъ до 2 тыс. пуд. масла, 3 тыс. пуд. рыбы, сырыя кожи, овечья и верблюжья шерсть. Этимъ же путемъ направляются изъ Иркутска въ Монголію нѣкоторыя мануфактурныя произведенія, особливо ткани.

Тункинская торговля ведется отчасти предпринимателями изъ Барнаульскаго и Минусинскаго округовъ, отчасти Иркутскими и Тункинскими обывателями. Послѣдніе въ настоящее время уже взяли перевѣсъ надъ первыми. Уже давно Иркутскіе мясопромышленники запасались мясомъ въ мѣстности Минусинскаго округа, называемой «Солончаки», куда скотъ былъ пригоняемъ изъ Монголіи, Барнаула и даже изъ Семипалатинской области. Въ началѣ 70-хъ годовъ иркутскій мясопромышленникъ Пачерскій первый прослѣдовалъ съ купленнымъ въ Солончакахъ скотомъ въ Иркутскъ черезъ Монголію. Такъ какъ опытъ удался, то Бійскіе и Минусинскіе купцы, имѣвшіе свои торговныя факторіи въ Монголіи, направили свои табуны по проложенному Пачерскимъ тракту, оказавшемуся весьма удобнымъ какъ по обилію дароваго и хорошаго корма, такъ и по своей безопасности и отсутствію воровства. Барыши, полученные алтайцами, побудили и иркутскихъ и тункинскихъ купцовъ завязать торговныя сношенія съ Монголією. Всѣ она отправляются ежегодно въ Монголію съ своими товарами на выѣздахъ, а осенью заключаютъ свои операціи. Нѣкоторые, какъ напримѣръ иркутскій торговецъ Пачерскій и тункинскій Томиловъ, уже завели факторіи въ Монголіи.

Нынѣ весною для передвиженія товара заготавливаются въ Тункинскихъ деревняхъ волости, а также между бурятами Тункинскаго вѣдомства вьюки, нанимаются рабочіе, а къ концу марта начинается движеніе товара въ Монголію. Въ сентябрѣ же и октябрѣ происходитъ обратное движеніе, въ которомъ главная роль выпадаетъ на движеніе живаго товара—скота. Въ 1888 году главнѣйшіе иркутскіе и тункинскіе торговцы привели въ Монголію 220 вью-

<sup>1)</sup> Лячновъ въ Матер. I. с. Т. II, вым. 4, стр. 248 и т. д.

новъ при 60 рабочихъ. Томиловъ и Пачерскій доставляютъ товаръ въ свои монгольскія факторіи зимою гужомъ. Въ концѣ августа переходятъ изъ Монголіи черезъ Мондинскій караулъ и алтайцы съ своими табунами. Пригнавъ ихъ въ Тункинскій край, они часть своихъ рабочихъ отсылаютъ обратно въ Монголію, а вмѣсто нихъ и для усиленія охраны табуновъ нанимаютъ жителей Тункинской волости. 110 человекъ здѣшной волости, перевозящіе товары и пашіе скотъ при 220 лошадахъ, получаютъ заработка отъ этой торговли до 15 тыс. рублей.

Тункинская волость не имѣетъ большихъ мірскихъ доходовъ <sup>1)</sup>, а именно доходы едва превосходятъ 1020 р., изъ конхъ 550 падаютъ на питейныя заведенія и винныя склады, 280 руб. на рыбныя ловли и 100 руб. на выгоны. Казенныхъ податей съ крестьянъ Тункинской волости сходитъ до 3500 руб., а казаки податей не платятъ, отправляя свои повинности натурою. Волостныхъ расходовъ у крестьянъ волости до 2430 руб., въ томъ числѣ на волостнаго писаря и канцеляріи 1260 руб., на волостную гоньбу 630 р., содержаніе училищъ 244 р., врачебную часть 92 руб.; сельскихъ расходовъ 770 р. Суммируя подати, волостные и сельскіе расходы вычислится, что съ наличной души м. п. крестьянъ Тункинской волости сходитъ по 5 руб. 56 коп., не считая натуральныхъ повинностей.

Во владѣніе Тункинскаго инородческаго вѣдомства отведено значительное количество межевыхъ дачъ (до 70), расположенныхъ въ бассейнахъ Иркутка какъ выше, такъ и ниже крестьянскихъ и казачьихъ дачъ Тункинскаго селенія, а также и по р. Окѣ. Общая площадь, занимаемая землями Тункинскаго инородческаго вѣдомства, простирается до 121.500 десятинъ, т. е. почти вчетверо превышаетъ пространство земель, отведенныхъ крестьянамъ и казакамъ Тункинской волости <sup>2)</sup>. Изъ этой площади около 46% покрыто лѣсами.

Прекрасное изслѣдованіе статистической партіи, работавшей въ 1887—1888 годахъ въ Иркутскомъ округѣ, по распоряженію генералъ-губернатора графа Игнатъева, не коснулось расположенныхъ при 4-хъ пограничныхъ караулахъ (Туранскомъ, Норинъ-Херойскомъ, Мондинскомъ и пр.) бурятскихъ улусовъ, во владѣніи которыхъ состоятъ до 70 особыхъ межевыхъ дачекъ и въ ко-

<sup>1)</sup> Астиревъ, Матер. 1. с. Т. II, вып. 5, прилож. къ гл. XIII, таблица.

<sup>2)</sup> Матер. 1. с. Т. III, вып. 2, прилож. III къ гл. VI, стр. 32.

торныхъ проживаютъ представители 8 родовъ, но далеко не въ полномъ составѣ этихъ родовъ.

Обслѣдованные же 66 улусовъ, а также селенія Тункинскаго вѣдомства отличаются отъ улусовъ и селеній другихъ инородческихъ вѣдомствъ тѣмъ, что въ большей части улусовъ Тункинскаго вѣдомства проживаютъ представители не одного или двухъ родовъ а очень многихъ, иногда всѣхъ 14 родовъ Тункинскаго вѣдомства вслѣдствіе чего по запутанности поземельныхъ отношеній Тункинское вѣдомство занимаетъ одно изъ первыхъ мѣстъ въ губерніи. Роды Тункинскаго вѣдомства носятъ названія: Бадархонскій, Иркутскій, 1-й и 2-й Куркутскіе, Тыртеевскій, 1-й и 2-й Хойготскіе, 1-й, 2-й, 3-й и 4-й Хондогорскіе, Чаддарскій, Шарапхонскій и 1-й и 2-й Шешеловскіе. Изъ 25 межевыхъ дачъ, состоящихъ во владѣніи 66 обслѣдованныхъ улусовъ, только 9 по надписямъ на пашахъ значатся во владѣніи извѣстныхъ родовъ, остальные же 16 дачъ просто значатся во владѣніи <sup>1)</sup> Тункинскаго вѣдомства разныхъ родовъ.

По своему же географическому положенію обслѣдованные улусы населенные пункты Тункинскаго вѣдомства составляютъ 4 группы.

Первую группу, самую восточную, составляютъ 24 улуса, группирующіеся, главнымъ образомъ, около Тункинской степной думы но сюда же должны быть отнесены и ясачные инородцы, проживающіе въ Култукаѣ, Быстринскомъ выселкѣ, Гужирѣ и Тябальтѣ. Кочевые инородцы этой группы принадлежатъ къ родамъ 1 и 2 Куркутскимъ, Тыртеевскому и 1-му Хондогорскому ясачные къ тѣмъ же родамъ, а также къ 2-му и 3-му Хондогорскимъ и къ Бадархонскому. Пашни кочевыхъ инородцевъ этой группы расположены черезполосно другъ съ другомъ, и только проживающіе осѣдло въ русскихъ селеніяхъ ясачные инородцы пользуются пашнями по мѣсту жительства. Относительно пользованія выгонами упомянутые 24 улуса раздѣляются на 5 естественныхъ общинъ. Относительно пользованія покосами и утугами инородцы Тункинскаго вѣдомства группируются уже не по общинамъ, а по родамъ, при чемъ всѣ члены одного и того же рода образуютъ одну покосную общину совершенно независимо отъ мѣста своего жительства; внутри же cadaго рода покосы подвергаются періодическимъ передѣламъ по душамъ. Покосы въ рассматриваемой группѣ

<sup>1)</sup> О землевладѣніи Тункинскаго вѣдомства см. Смирновъ, Матер. I. с. Т. II. вып. 8, стр. 83—88.

расположены по обѣимъ сторонамъ Иркутъ и на его островахъ. Луга преимущественно ровные и слегка волнистые; низменные между ними мѣста заливаются иногда Иркутомъ. Послѣ, такихъ изводненій урожай травъ бываетъ плохъ, но на слѣдующій годъ онъ выше средняго <sup>1)</sup>).

Вторую группу составляютъ 18 улусовъ, расположенныхъ главнымъ образомъ къ с. и с.-в. отъ села Тунки, и преимущественно въ окрѣстной рѣками Тункой и Хобокими межевой дачѣ, въ центрѣ которой расположена русская деревня Талаа; сюда же относятся еще и улусъ Янгарчинскій, а также ясачные инородцы, проживающіе въ дер. Талой и въ Тукуреньскомъ предмѣстьѣ с. Тунки. Кочевые инородцы этой группы принадлежатъ къ родамъ 1, 2, 3 и 4-му Хондогорскимъ, Шарапхонскому и Бадархонскому, асачные по всѣмъ 14 родамъ. Пашни улусовъ и селеній этой группы расположены большею частью черезполосно. Относительно пользованія выпускомъ всѣ улусы, лежащіе въ упомянутой выше межевой дачѣ, въ центрѣ которой расположена дер. Талаа, составляютъ одну общину. Сообща владѣютъ выпускомъ улусы Харликинскій и Тукуреньскій вмѣстѣ съ асачными Тукуреньскаго и Затунинскаго предмѣстій с. Тунки. На русское населеніе дер. Талой (см. выше стр. 82), расположенной въ центрѣ рассматриваемой группы братскихъ улусовъ, инородцы въ послѣднее время стали посягать недружелюбно и даже вошли къ Иркутскому исправнику съ запросомъ, нельзя ли обложить жителей деревни Талой оброкомъ и совсѣмъ выселить съ земель, которыя инородцы считаютъ своими.

Къ третьей группѣ относятся 14 улусовъ, расположенныхъ на востокъ отъ сел. Тунки въ восточной части обширной при-Иркутской инородческой дачи, доходящей по Иркуту до сел. Тунки, а также асачные инородцы дер. Еловской и Тункинскихъ предмѣстій Затунинскаго и Захтуйскаго. Кочевые инородцы этой группы принадлежатъ къ 6 разнымъ родамъ, а асачные къ 11. Пашни улусовъ этой группы расположены большею частью черезполосно между собой, а у асачныхъ черезполосно съ тункинскими, крестьянами и казаками; относительно же пользованія выгонами вся группа распадается на 3 или 4 общины. Еловскіе инородцы пашней пользуются, главнымъ образомъ, въ Тункинско-еловской дачѣ, черезполосно съ крестьянами, а покосы получаютъ въ тѣхъ родахъ, къ которымъ принадлежатъ.

<sup>1)</sup> О покосахъ вѣдомства см. Смирновъ, Матер. I. с. Т. II, кн. 5, стр. 873.

Четвертую группу составляют 8 улусовъ, расположенныхъ в западной части той же дачи, въ восточной части которой расположены улусы третьей группы. Въ улусахъ четвертой группы живутъ представители родовъ Тыртеевскаго, 1 и 2 Хойготскихъ и Чалдарскаго. Пашни Елотскаго улуса расположенъ на пр. берегу Иркутъ по Туранской дорогѣ, Шимковскаго между землями шимковскихъ и туранскихъ казаковъ ближе къ Зангисану; остальные 6 улусовъ тоже по пр. берегу Иркутъ, по дорогѣ изъ Шимовъ въ Тунку, между Шимками и рѣкой Могой горхономъ. Относительно пользованія выгонами 8 улусовъ группы составляютъ 2 общины. Покосы во 2, 3 и 4 группѣ расположены преимущественно по р. Иркуту и его притокамъ. Они разныхъ качествъ: одни пырейные, другіе съ листовникомъ, третьи осочные и болотистые.

Пользованіе лѣсомъ по всему вѣдомству совершенно свободно: каждый рубить лѣсъ, гдѣ хочетъ, не стѣняясь никакими межами. Въ дачахъ инородцевъ Тункинскаго вѣдомства какъ лѣсомъ, такъ и охотою пользуются русскіе крестьяне безпрепятственно, и относительно земель, состоящихъ въ непосредственномъ владѣніи инородцевъ (пашни и покосы) между русскими и бурятами уже происходятъ земельные споры, порождаемые захватами. Къ такимъ спорамъ принадлежитъ начавшійся въ 1875 году 10 лѣтній споръ Еловскихъ крестьянъ съ проживающими въ ихъ селеніи асачными инородцами. Инородцы эти поселились очень давно и дер. Еловеѣ по приглашенію самихъ русскихъ, еще въ то время, когда русскіе переселенцы нуждались не въ земляхъ, а въ товарищахъ и опытныхъ помощникахъ въ борьбѣ съ подавлявшими еще въ то время колонизацію силами природы. Мѣстное начальство оградилъ инородцевъ отъ захватовъ, стараясь предупреждать захваты земель, когда либо состоящихъ въ ихъ пользованіи или отведенныхъ инородцамъ. Впрочемъ нерѣдко захваты происходятъ со стороны инородцевъ, что уже прямо указываетъ на то, что инородческому населенію, при медленно измѣняющихся условіяхъ ея быта въ Тункинской волости, становится тѣсно на занимаемой имъ территоріи.

Опредѣленіе числа населенныхъ пунктовъ въ Тункинскомъ вѣдомствѣ представляется крайне затруднительнымъ, такъ какъ понятіе объ улусѣ въ Тункинскомъ вѣдомствѣ нѣсколько отличается отъ того, что подразумѣвается подъ этимъ названіемъ въ другихъ вѣдомствахъ. Тамъ дѣйствительно улусъ можетъ быть безспори

принять, за одинъ поселокъ, такъ какъ онъ представляетъ собою большую часть компактную группу жилыхъ и нежилыхъ бурятскихъ построекъ, окруженныхъ утугами за общою изгородью; въ Тункинскомъ же вѣдомствѣ улусами называется совокупность домовъ и юртъ, разбросанныхъ иногда на пространствѣ нѣсколькихъ квадратныхъ верстъ съ большими промежутками между отдѣльными улусами, нѣбующими каждое свой утугъ, огороженный особою изгородью. Въ такихъ усадебныхъ осѣдлостяхъ случается, что между крайними дворами одного улуса бываютъ вкраплены дворы другого сосѣдняго (какъ напримѣръ въ мѣстности Коймары), вслѣдствіе чего составленіе списка населенныхъ мѣстъ въ Тункинскомъ вѣдомствѣ встрѣчаетъ трудно одолимыя препятствія <sup>1)</sup>. При всемъ томъ въ Тункинскомъ вѣдомствѣ считаютъ до 136 населенныхъ мѣстъ съ 5-ю и болѣе хозяйствами. Всѣхъ жилыхъ строеній (на 2350 двор.) въ Тункинскомъ вѣдомствѣ 4800, изъ коихъ 49% юртъ и 51 деревянныхъ строеній. Объ устройствѣ бурятскихъ жилищъ уже было говорено выше (см. стр. 341).

О численности инородцевъ Тункинскаго вѣдомства, также какъ и о приростѣ населенія въ 30-лѣтіе послѣ ревизіи 1858 г. (21%), было уже упомянуто выше (стр. 83 и 347). Одною изъ причинъ болѣе слабого прироста населенія въ Тункинскомъ, а тѣмъ болѣе въ другихъ инородческихъ волостяхъ Иркутскаго и Балаганскаго округовъ, по сравненію съ русскими волостями губерніи должно, по нашему мнѣнію, искать какъ въ болѣе слабой тѣмъ въ русскомъ населеніи пропорціи женщинъ, такъ и вообще въ положеніи женщинъ въ домашнемъ очагѣ бурятъ и другихъ сибирскихъ инородцевъ.

Между тѣмъ какъ вообще въ русскомъ населеніи старожиловъ (въ разсмотрѣнныхъ въ этомъ томѣ волостяхъ) на 1000 мужчинъ приходится 987 женщинъ, а въ рабочемъ возрастѣ число женщинъ совершенно равно числу мужчинъ, въ Тункинскомъ вѣдомствѣ приходится вообще на 1000 мужчинъ только 929 женщинъ (въ Китойскомъ ихъ 946, Аларскомъ 922, Балаганскомъ 915), а если принимать въ соображеніе только одинъ рабочій возрастъ, то на 1000 мужчинъ только 912 женщинъ (въ Аларскомъ вѣдомствѣ 900, въ Китойскомъ 881, въ Балаганскомъ 863). Такія численныя отношенія обоихъ половъ между инородческимъ населеніемъ Ир-

<sup>1)</sup> О размѣщеніи бурятъ Тункинск. вѣд. см. Астиревъ, Матер. I. с. Т. II, вып. 2, стр. 48.

кутской губерніи, въ связи съ инородческими условіями семейнаго быта, производить цѣлый рядъ явленій. Недостатокъ невѣсты, при существованіи обычая платить за невѣсту „калымъ“, поднимаетъ цѣну калымовъ и дѣлаетъ бракъ для бѣдныхъ людей недоступнымъ. Хотя также причина препятствуетъ развитію допускаемаго религіею ламантовъ и шаманистовъ многоженства, но она удерживаетъ въ составѣ семьи молодыхъ вдовъ, остающихся принадлежностью семей, заплатившихъ за нихъ калымъ и служащихъ вторыми женами ближайшихъ родственниковъ мужей. Съ другой стороны невольное безбрачіе значительной пропорціи мужчинъ вызываетъ полиандрическую проституцію женщинъ, сдѣлавшихся свободными въ тѣ годы, когда онѣ еще не вышли изъ брачнаго періода, но уже потеряли свою калымную цѣнность. Все это и можетъ не сокращать естественнаго прироста населенія, и сокращеніе это усиливается еще и тѣмъ, что на долю бурятки, по своему хозяйственному строю жизни инородцевъ, выпадаетъ гораздо больше труда, чѣмъ на русскую крестьянку.

Сообщенныя на стр. 83 свѣдѣнія о населеніи Тункинскаго вѣдомства могутъ быть дополнены еще слѣдующими: на 11.700 жителей вѣдомства (6050 м. п.) лицъ въ рабочемъ возрастѣ приходится 6040 (3160 м. п.). Хозяйствъ 2400, въ томъ числѣ имѣющихъ одного работника 1552 (въ 395 изъ нихъ есть еще и подростки имѣющихъ 2 работника 478, три и болѣе 192. Въ 174 хозяйствахъ совсѣмъ нѣтъ взрослыхъ работниковъ, но въ 107 изъ нихъ есть полуработники (подростки) <sup>1)</sup>. Въ числѣ жителей въ 1888 было грамотныхъ 127 муж. и 11 жен., т. е. почти втрое менѣе чѣмъ въ Аларскомъ вѣдомствѣ. О школахъ при Тункинскомъ дацанѣ и о положеніи буддійскаго духовенства было уже говорено выше (стр. 344).

О количествѣ земель, состоящихъ въ непосредственномъ пользованіи инородческаго населенія вѣдомства, свѣдѣнія были уже приведены выше на стр. 83. Здѣсь замѣтимъ, что 38.400 десятинъ этихъ земель составляютъ на душу м. п. 6,4 дес., на взрослого работника 12 дес., на хозяйство 16 дес., что и выражаетъ собой дѣйствительную и вполне удовлетворенную потребность Тункинскихъ бурятъ въ ихъ современномъ экономическомъ положеніи земель. Но если принять въ расчетъ всю совокупность отмежеванныхъ Тункинскому инородческому вѣдомству земель, со включеніемъ

<sup>1)</sup> Матер. I. с. Т. I, стр. 226.

дѣловъ, то земель этихъ окажется по 20 дес. на душу м. п., по 37 дес. на взрослого работника и по 50 на хозяйство.

Въ числѣ земель, состоящихъ въ непосредственномъ пользованіи Тункинскихъ инородцевъ, подъ усадьбою осѣдлостью состоитъ болѣе 6400 дес., т. е. болѣе 1 дес. на душу м. п., 2 дес. на работника. Это объясняется обширностью бурятскихъ луговъ (подъ ними 5600 дес.), на которыхъ въ значительной мѣрѣ ведется обширное развитіе скотоводства у полуосѣдлаго, полупастушескаго еще племени. Изъ 11.300 дес. земли, занимаемыхъ индейцами (около 2 дес. на душу м. п. и 3,6 на взрослого работника), половина состоитъ подъ посѣвами. При этомъ рощисты или крѣпки составляютъ въ Тункинскомъ вѣдомствѣ 40% всѣхъ пахатныхъ земель, и въ этомъ отношеніи Тункинское вѣдомство занимаетъ первое мѣсто въ губерніи, какъ между инородческими вѣдомствами (въ Кытуйскомъ вѣдомствѣ рощисты составляютъ 19%, въ Балаганскомъ 8, въ Аларскомъ 4), такъ и между описанными въ предлагаемомъ томѣ русскими волостями, имѣющими отъ 21% (Тунгусская вол.) до 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>% (Мальтинская). Цифра рощистей Тункинскаго вѣдомства прямо указываетъ на то, что буряты обнаруживаютъ въ высокой степени стремленіе перейти изъ скотоводческаго состоянія въ земледѣльческое. Буряты пограничной съ Монголіей полосы, живущіе около карауловъ, и до сихъ поръ совсѣмъ не занимаются земледѣліемъ, а быть ихъ скотоводческой и даже въ значительной мѣрѣ звѣроловческой, и даже заготовленіе сѣна существуетъ у нихъ только для телятъ и ягнятъ, а взрослый скотъ всю зиму пастется въ горахъ подножнымъ кормомъ. Само собою разумѣется, что, при недавнемъ развитіи въ Тункинскомъ вѣдомствѣ земледѣлія, система хозяйства еще вполне переложная. Изъ пахатныхъ земель на каждыя 100 дес. посѣва засѣваютъ въ Тункинскомъ вѣдомствѣ 70 дес. рожью (въ томъ числѣ 68 ярицею и только 2 ярицею рожью), 18 овсомъ, 6 пшеницею и 6 ячменемъ. Чистый сборъ хлѣбовъ въ вѣдомствѣ составлялъ ржи 45, овса 55, пшеницы 41 пуд. съ десятины <sup>1)</sup>.

Покосной земли въ вѣдомствѣ 15.500 дес., т. е. болѣе 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> дес. на душу м. п. или 6,4 дес. на хозяйство, т. е. на 6% болѣе чѣмъ у русскихъ крестьянъ и казаковъ Тунгинской волости. Если принять въ соображеніе развитіе угуговъ (удобренныхъ покосовъ), а также и то обстоятельство, что буряты подгорной полосы пасутъ

<sup>1)</sup> Козловъ, Матер. 1. с. Т. II, вып. 4, стр. 58, 78.



скомъ пограничномъ районѣ, или лучше сказать въ предѣлахъ Тункинскаго инородческаго вѣдомства, къ тому же имъ опредѣленныя цифры нѣсколько иныя, чѣмъ до сихъ поръ принимавшіяся. Кромѣ того во все время слѣдованія экспедиціи Шмидтомъ произведены были и метеорологическія наблюденія. Поэтому и въ настоящемъ примѣчаніи, желая познакомить читателей съ полученными Шмидтомъ цифрами, приводимъ весь списокъ относящихся къ описанному району широтъ, долготъ и высотъ, а въ заключеніе прилагаемъ таблицу метеорологическихъ наблюденій.

Нельзя не сожалѣть, что результаты этой интересной Саянской экспедиціи, совершенной по инициативѣ Генералъ-Губернатора и Командующаго войсками Иркутскаго военного округа начальникомъ которой былъ подполковникъ Бобырѣ, до сихъ поръ еще цѣлкомъ не опубликованы. Въ предъидущемъ изложеніи мы имѣли случай указывать и сообщать нѣкоторые интересные факты собранные этой экспедиціей, между тѣмъ это были только отрывочные факты, всего же маршрута экспедиціи мы изложить не могли, такъ какъ онъ не сталъ еще достояніемъ печати.

Предлагаемый списокъ поэтому является отрывкомъ трудовъ экспедиціи, отрывкомъ безъ сомнѣнія интереснымъ, значеніе же котораго тогда только можно будетъ оцѣнить, когда появятся необходимыя къ списку коментаріи, т. е. географическое и геологическое описанія пройденнаго экспедиціей пространства. Тѣмъ болѣе, что экспедиція, какъ мы видимъ изъ списка, посѣтила и только мало извѣстныя, но даже почти совсѣмъ не знакомые до тѣхъ уголки Саянскаго нагорья.

### 1) Списокъ астрономическихъ пунктовъ.

Названіе астрономическихъ пунктовъ.	Широта.	Долгота.	Высота въ футахъ.
1. Окинскій миссіонерскій станъ . . . . .	52°41'41,3"	69°21'13,5"	442
Крестъ Окинской церкви . . . . .	41,0"	13,3"	
Крестъ Окинской часовни . . . . .	41,9"	16,1"	

Названіе астрономиче- скихъ пунктовъ.	Широта.	Долгота.	Высота въ футахъ.
Развалины Окинскаго караула. . . . .	55,6"	41,0"	
2. Перевалъ на Монголь- дабанъ . . . . .	52°35'41"	68°28'37,5"	6470
3. Минеральный источ- никъ Хале-угунъ . . . . .	52°35'24"	68°50'21,0"	4910
4. Сліяніе р. Сороки съ Тустукомъ. . . . .	52°20'6"	69°50'58,5"	5110
5. Дозорное озеро въ до- лину Тиссы . . . . .	52°18'30"	68°57'34,5"	5160
6. Восточный пере- валъ, <sup>1)</sup> правый бе- регъ Обонъ гома. . . . .	52°11'27"	68°38'54,0"	6730
7. Норинъ - Хоройская часовня. . . . .	52°6'24,5"	70°2'15,0"	5490
Остатки фундамента Норинъ - Хоройскаго караула. . . . .	52°6'26,4"	70°2'15,0"	
8. Елизаветинс. приискъ	51°58'32"	69°35'25,5"	6690
9. Ишунды . . . . .	51°55'54"	70°18'24,0"	6610
10. Верховье р. Хоретъ.	51°47'44"	69°47'25,5"	7010
11. Торская бурятская дума. . . . .	51°47'21,5"	72°41'15,0"	2300
12. Часовня на скалѣ Ну- ху-дабанъ . . . . .	51°46'45"	70°22'21,0"	6640
13. Село Тунка. . . . .	51°44'41,5"	72°12'28,5"	2490
14. Мовдинскій миссіонер- скій карауль. . . . .	51°40'35,0"	70°39'48,0"	4460
15. Село Шимки. . . . .	51°40'21,5"	71°40'18,0"	2640
16. Урочище Буруктуй. . . . .	51°39'14,5"	71°0,0'21,0"	3530

<sup>1)</sup> Passage Oriental, см. выше стр. 20.

2) СПИСОКЪ ВЫСОТЪ.

Названіе мѣстъ и урочищъ.	Высота зъ футахъ.
<i>Отъ ст. Быстринской до Ниловой пустыни.</i>	
Станція Быстринская . . . . .	2410
Деревня Тибельти, церковь . . . . .	2280
Село Хара-гужиръ, церковь . . . . .	2390
Бычья гора, перевалъ на дорогѣ . . . . .	2920
Вершины сопокъ по обѣ стороны дороги выше перевала на 100 метр.; вершины сопокъ Бычьей горы . . . . .	3250
Мостъ на рѣкѣ Еловкѣ . . . . .	2610
Вершина Шаманской горы . . . . .	3070
Село Тунка, Покровская церковь . . . . .	2490
Русло р. Хорбать (бродъ на пути въ село Шимки).	2570
Село Шимки, церковь . . . . .	2640
Бродъ на р. Записаны . . . . .	2940
Деревня Туранъ, часовня . . . . .	3110
Нилова пустынь, церковь . . . . .	3030
Гора Сайнъ-боинъ, лѣвый берегъ притока Ихэ-угунъ.	3720
Скала Нила у Ниловой пустыни . . . . .	3200
Бурятская Торская дума, часовня . . . . .	2300
Перевалъ между р. Ильчи и р. Быстрой, на боль- шой дорогѣ . . . . .	2500
<i>Отъ с. Тунки по р. Жемчугъ къ Урлудейскому караулу.</i>	
Первый бродъ на р. Жемчугъ при выходѣ ея изъ горъ въ долину р. Иркутъ . . . . .	2660
Третій бродъ на р. Жемчугъ, вверхъ по долиня.	3070
Девятый бродъ на р. Жемчугъ, вверхъ по долиня.	4000

Названіе мѣстъ и урочищъ.	Высота въ футахъ.
Первая терраса праваго нагорнаго берега на р. Жемчугъ у св. бурятскаго дерева . . . . .	5890
Вершина Ургудейскаго гольца, священное обо. . . . .	7480
Мѣсто бывшаго Ургудейскаго караула въ долинѣ р. Ургудей . . . . .	5540
Граница древесной растительности съ южн. стороны Ургудейскаго гольца. . . . .	6620
Граница древесной растительности съ сѣв. стороны Ургудейскаго гольца. . . . .	6880
Пятидесятый бродъ на р. Жемчугъ, въ верховьяхъ его. . . . .	5030
Пятый бродъ на р. Жемчугъ . . . . .	3740
<i>Отъ Ниловой пустыни до Хаминскаго караула.</i>	
Бродъ на р. Иркутъ (12 верстъ выше Турана) . . . . .	3300
Мѣстопосѣвы ржи, пшеницы и овса (на лѣв. берегу Иркуты, 17 верстъ отъ Турана, вверхъ по Иркуту) . . . . .	3670
Торговыи пунктъ при устьѣ р. Буруктуя, 11 вер. выше устья . . . . .	3530
Бродъ на р. Буруктуя, 7 в. выше устья, близъ Буруктуйскихъ озеръ . . . . .	3990
Бродъ на р. Хара-горхонъ . . . . .	4440
Перевалъ на Хара-дабанъ 15 в. отъ астраном. пункта Буруктуя . . . . .	4770
Вершины Хара-дабана выше перевала на 70 метр. . . . .	5000
Перевалъ Буруль-тологой, 15 вер. не доѣзжая Мондъ . . . . .	5290
Бурятскій миссіонерскій станъ, церковь Св. Владимира. . . . .	4460
Рыбачье Нуръ-Кутулъ на лѣвомъ берегу р. Иркуты . . . . .	3420

Названіе мѣстъ и урочищъ.	Высота въ футахъ.
Озеро Саганъ-норъ, 8 в. ниже Мондъ на лѣвомъ берегу Иркутъ. . . . .	4880
Государственный пограничный знакъ на Хангин- скомъ перевалѣ . . . . .	6140
<i>Отъ Хангинскаго караула по Иркуту до истока Оки.</i>	
Урочище Найтоголъ выше Мондъ на 7 в., на прав. берегу Иркутъ. . . . .	4720
Урочище Жехой на прав. берегу Иркутъ, у вост. крайняго подножія Мунку-Сардыка. . . . .	4970
Бродъ на бѣломъ Иркутѣ близъ впаденія его въ Иркутъ у подножія Мунку-Сардыка . . . . .	5250
Вершина Сопки на противоположной сторонѣ ча- совни на Нуху-дабанъ . . . . .	6560
Долина разрыва у подошвы скалы съ часовнею Нуху-дабанъ . . . . .	6370
Часовня Мих. Арханг. на скалѣ Нуху-дабанъ. . . . .	6640
Предѣлъ древесной растительности на горѣ Нуху- дабанъ . . . . .	7020
Подошва столовой вершины горы Нуху-дабанъ . . . . .	7620
Вершина горы Нуху-дабанъ . . . . .	7710
Горизонтъ Бажеевскаго озера . . . . .	7340
Бродъ на Бажей-горхонѣ (притокъ Иркутъ справа). . . . .	7230
Бродъ на Ондалинь-горхонѣ. . . . .	7110
Горизонтъ Окинскаго оз. у истока р. Оки. . . . .	6640
Горизонтъ оз. Сусырѣ-норъ у истока р. Сусырѣ (впадаетъ въ Иркутъ справа). . . . .	6700
Бродъ на верхней Ишундѣ (притокъ Оки справа). . . . .	6330
Горизонтъ р. Оки у устья Жехоя. . . . .	6000
Горизонтъ р. Оки у устья р. Хоретъ. . . . .	5480
Бродъ на р. Окѣ выше часовни Норинъ-Хоройской въ 2 верстахъ . . . . .	5360

Названіе мѣстъ и урочищъ.	Высота въ футахъ.
Перевозъ р. Оки 8 в. выше Норинъ-Хоройской часовни . . . . .	5940
правом. пунктъ въ верховьяхъ р. Оки близъ устья верхней Ишунды . . . . .	6610
путь черезъ р. Оку, ниже истока изъ озера на 1½ версты . . . . .	6450
вершина перевала между Окинскимъ озеромъ и оз. Сусыръ . . . . .	6740
перевалъ между Ондаливъ-горхономъ и Бажей горхономъ; остатки ледниковыхъ сдвиговъ . . . . .	7510
подъи сопки, гдѣ расположена Норинъ-Хорой- ская часовня . . . . .	5200
вершина Норинъ-Хоройская на отдѣльной сопкѣ въ долинѣ р. Оки на правомъ берегу, близъ устья р. Гаргана . . . . .	5490
<i>Путь сверху по р. Хоретъ до Гарганскаго пере- вала черезъ Елизаветинскій пріискъ, въ верховьяхъ притоковъ р. Дуби и внизъ по теченію р. Буксонъ до Норинъ-Хоройской часовни.</i>	
подъ рѣки Хоретъ изъ ущелья, 22 версты выше устья . . . . .	6250
Хоретъ, устье притока Терень-голь . . . . .	6800
Хоретъ, устье притока Монголь-уселга . . . . .	6870
вершина Гарганскаго перевала . . . . .	7100
древ. раст. на Гарганскомъ перевалѣ съ западной стор. . . . .	7680
правом. пунктъ, пирамида у подошвы Гарган- скаго перевала . . . . .	7010
вершина береговыхъ возвышенностей лѣв. берега р. Хоретъ (гольцы) . . . . .	7890

Названіе мѣстъ и урочищъ.	Высота въ футахъ.
Бродъ на р. Силкѣ, въ верховьяхъ ея (притокъ Буксона справа) . . . . .	6650
Устье р. Силки при впаденіи въ р. Буксонъ . .	6480
Перевалъ изъ долины Буксонъ въ верховья притока р. Дибя . . . . .	6980
Астроном. пунктъ, Елизаветинскій пріискъ. . .	6690
Вершина сопки къ югу отъ Елизаветинскаго пріиска.	8110
Долина Буксона, лѣвый берегъ, у содистыхъ озеръ	5970
Устье р. Буксона (притокъ Оки слѣва) . . . .	5400
<i>Отъ Норинъ-Хоройской часовни внизъ по р. Оку до Окинскаго миссіонерскаго стана.</i>	
Въ долинѣ р. Оки, 7 верстъ ниже Норинъ-Хоройской часовни . . . . .	5300
Бродъ на рѣкѣ Каштакъ, близъ впаденія его въ р. Оку . . . . .	5300
Бродъ на р. Хайзасѣ, близъ впаденія въ р. Оку (притокъ справа) . . . . .	5260
Оз. Айлакъ-норъ, на плоской возвышенности праваго нагорнаго берега р. Сороки, выше устья на 8 верстъ. . . . .	5560
Перевалъ Хара-хардынь . . . . .	6490
Перевалъ на тропѣ къ ущелью Каркуй . . . .	6640
Дно ущелья Каркуй при спускѣ съ перевала . .	5350
Перевалъ Урлыкъ-дабанъ, при переходѣ изъ долины Желхой въ долину р. Оки (Желхой прит. Оки справа). . . . .	5600
Устье р. Орлыкъ (притокъ Оки справа) . . . .	4610
Долина Оки противъ устья р. Тиссы . . . . .	4700
Шамхаль-дабанъ, свящ. бурятск. дерево, береговья возвышенности праваго берега Оки. . .	4910
Устье р. Дибя въ Оку . . . . .	4780

Названіе мѣстъ и урочищъ.

Высота въ  
футахъ.

Астроном. пунктъ на сопкѣ при сліяніи р. Тустукуъ и Сороки, 1 $\frac{1}{2}$ в. выше впаденія Сороки въ Оку.	5110
Горна р. Оки, правый берегъ. Бурятскіе лѣтники на серединѣ пути между Сорокою и Гарганомъ.	4880
Окинскій миссіонерскій станъ въ долинѣ лѣваго берега р. Оки, церковь. . . . .	4420
<i>Путь отъ Окинскаго мисс. стана по теченію р. Оки черезъ перевалъ Монголь-дабанъ до минеральныхъ источниковъ въ ущельи Жегона на южномъ склонѣ Саяна.</i>	
Горная Китайская граница на лѣв. берегу р. Оки въ 1 $\frac{1}{4}$ вер. выше церкви . . . . .	4590
Истокъ Цицунуръ въ долинѣ Сенцы . . . . .	4750
Рѣка Утуль-гола, притока Сенцы слѣва . . . . .	4920
Термальный источникъ Хала-угунъ . . . . .	5130
Рѣка р. Буштукуъ въ долинѣ Сенцы . . . . .	4610
Горна Сенцы, сліяніе двухъ притоковъ Дондо-гола и Хойто-гола, образующихъ Сенцу. . . . .	5240
Термальный источникъ Хой-тоголъ (мѣсто ку- пальи) . . . . .	5530
Мѣсто развѣтвленія Дондо-гола на три пади . . . . .	5590
Астроном. пунктъ на перевалѣ Монголь-дабанъ . . . . .	6470
Терм. источникъ въ ущельи Жегона (на южномъ склонѣ Саяна, у спуска съ перевала Монголь- дабанъ). . . . .	5230
Горна гольца къ сѣверу отъ перевала Монголь- дабанъ . . . . .	6990
Вершина Монголь-дабана, каменный обелискъ . . . . .	8410
Южное перевала Монголь-дабанъ, на броду Дондо-гола . . . . .	5830



Названіе мѣстъ и урочищъ.	Высота въ футахъ.
Астроном. пунктъ въ долину р. Сенды близъ минер. источника Хала-угунъ . . . . .	4910
<i>Высоты отъ Окинскаго мисс. стана по теченію р. Тиссы и Саганъ-гола до Тенгизъ-обона. (Восточный перевалъ).</i>	
Прав. берегъ Сенды у ламаитской часовни. . .	4510
Перевалъ изъ долины Сенды въ ущелье Бурятъ-голь.	6090
Бродъ на Бурятголь . . . . .	4690
Долина Тиссы, лѣв. берегъ, улусъ Нижне-Тыргитейскій . . . . .	4860
Долина Тиссы, лѣв. берегъ Нуръ-Столбовой (озеро и юрта) . . . . .	5050
Долина Тиссы, устье лѣв. притока Гужиртей-горхонъ.	5130
Астроном. пунктъ у оз. Доворъ-норъ, южный берегъ; отдѣльная юрта въ лѣсу и столбъ. . .	5160
Перевалъ между Тиссой и Саганъ-голомъ (притокъ справа) . . . . .	5840
Въ ущельѣ Саганъ-гола, 12 верстъ выше впаденія въ р. Тиссу. . . . .	5800
Устье Зунъ-гола, притока Саганъ-гола справа. .	6300
Устье Гужиртея, притока Саганъ-гола . . . . .	6560
Предѣлъ древесн. раст. при подъемѣ въ верховьяхъ Саганъ-гола. . . . .	7030
Высшая точка перевала между Саганъ-голомъ и Обонъ-голомъ (оба притоки Тиссы справа) . .	7840
Астроном. пунктъ на Восточномъ перевалѣ, на прав. берегу Обонъ-гола, противъ Тенгизскаго обона. . . . .	7540
Устье Тыргитея, притока Тиссы слѣва . . . . .	6730
Правый берегъ Тиссы въ 1 верст. выше впаденія въ Оку . . . . .	5110
	4690

3) Списокъ метеорологическихъ наблюдений <sup>1)</sup>.

Мѣсто наблюдения.	Мѣсяцъ и число.	Средне-суточная температура по Цельсию.	Средне-суточная показанія баро- метра въ мм.	Направленіе вѣтра.	Особыя явленія.	Примѣчанія.
Тибельти . . .	Мая 16/28	+10,83	705,0	NW	Облачно, дождь.	
Али-Гульгаръ . . .	» 17/29	+12,97	694,7	W	» »	
Аути . . .	» 18/30	+11,06	695,9	NO	Дождь.	
» . . .	» 19/31	+12,89	695,0	0	»	
Тунка . . .	Мая 20	+ 4,95	698,1	NO	Ясно.	
Юнья . . .	Іюня 1					
Шанхай . . .	» 21/3	+10,17	688,0	0	»	
Аути . . .	» 22/3	+12,18	684,0	NW	Облачно, буря.	
Кара-пустынь . . .	» 23/4	+12,83	678,0	NO	Ясно.	
Аути . . .	» 24/5	+ 5,98	696,0	NO	»	
Шанхай . . .	» 25/6	+11,23	696,1	NO	»	
Аути . . .	» 26/7	+ 7,75	686,4	W	Облачно, дождь.	
» . . .	» 27/8	+11,10	675,0	NO	Ясно.	
» . . .	» 28/9	+ 8,18	650,0	NW	Облачно, дождь.	
Синь-Сянь . . .	» 29/10	+ 4,89	649,4	W	Дождь.	
» . . .	» 30/11	+ 7,53	646,0	W	Дождь, ночью снѣгъ.	
» . . .	» 31/12	+12,08	648,0	NO	Дождь, вечеръ ясный.	
Аути . . .	Іюнь 1/13	+10,82	665,0	0	Ясно.	
» . . .	» 2/14	+16,50	680,0	SO	»	
» . . .	» 3/15	+11,42	670,0	SW	Гроза, дождь.	
» . . .	» 4/16	+14,75	640,0	W	Дождь.	

<sup>1)</sup> Среднія температуры и давленія атмосферы выведены изъ записей въ 7 часовъ утра, 1 пополудни и 9 часовъ вечера.

Мѣсто наблюденія.	Мѣсяцъ и число.	Средне-суточная температура по Цельсiю.	Средне-суточная показанiя баро- метра въ мм.	Направленiе вѣтра.	Особыя явленiя.	Примѣча- нiя.
Мондинск. станъ	Июнь 2/17	+ 9,65	647,2	NO	Ясно.	
» »	» 6/18	+10,02	646,6	NO	»	
» »	» 7/19	+15,22	643,7	SO	Ясно, вечеромъ буря.	
Въ пути . . .	» 8/20	+10,10	637,4	SW	Сильный дождь.	
» » . . .	» 9/21	+10,70	629,9	W	Дождь.	
» » . . .	» 10/22	+ 8,70	596,0	W	»	
» » . . .	» 11/23	+ 9,12	600,0	NW	»	
» » . . .	» 12/24	+ 8,68	621,0	NO	Ясно.	
» » . . .	» 12/25	+ 4,00	585,0	N	Ясно, ночью морозъ и снѣгъ.	
» » . . .	» 14/26	+ 1,87	592,0	N	Дождь и снѣгъ.	
Елизаветинскiй примскъ . .	» 15/27	+ 3,12	572,0	NW	» »	
Елизаветинскiй примскъ . .	» 16/28	+ 6,30	587,0	W	Ясно, снѣгъ, ясно.	
Въ пути . . .	» 17/29	+11,07	615,0	NO	Ясно.	
» » . . .	» 18/30	+12,22	608,0	NO	»	
» » . . .	Июня 19 Июля 1	+11,87	592,0	Q	»	
» » . . .	» 20/1	+17,27	625,0	NW	Дождь.	
Мондинск. станъ	» 21/2	+15,02	639,0	W	Облачно, дождь.	
» »	» 22/4	+15,27	639,9	W	Пасмурно, »	
» »	» 23/5	+13,92	640,4	NW	Облачно, ясно.	
Въ пути . . .	» 24/6	+13,60	596,0	NO	Ясно.	
» » . . .	» 25/7	+15,27	598,0	N	Дождь.	
» » . . .	» 26/8	+11,22	618,0	NW	Сильный дождь.	

Сильный разливъ горныхъ рѣкъ.

Місто назначенія.	Місяць и число.	Средне-суточная температура по Цельсію.	Средне-суточная показанія баро- метра въ мм.	Направленіе вѣтра.	Особія явленія.	Примѣчанія.
Хорошій караулъ	Іюль 27/9	+13,88	615,0	Штиль	Дождь безъ перерыва	Сильный разливъ горныхъ рѣкъ.
Хорошій караулъ	» 28/10	+15,85	613,0	NW	Перемежающ. дождь.	
Хорошій караулъ	» 29/11	+15,00	614,0	W	Дождь безъ перерыва	
Хорошій караулъ	» 30/12	+15,00	616,0	W	» » »	
Хорошій караулъ	Іюль 1/13	+16,47	617,1	NO	Облачно, вечер. ясно	
»	» 2/14	+16,43	623,0	SW	» » »	
»	» 3/15	+14,53	620,0	S	» » дождь	
»	» 4/16	+15,10	635,0	SW	» » »	
»	» 5/17	+15,93	638,0	SO	» » ясно	
Хорошій станъ.	» 6/18	+17,37	637,0	SW	Дождь.	
»	» 7/19	+16,78	630,0	SW	Дождь, гроза.	
»	» 8/20	+16,42	622,0	SW	Дождь безъ перерыва	
»	» 9/21	+11,45	623,3	S	» » »	
»	» 10/22	+11,75	624,4	S	» » »	
»	» 11/23	+13,15	625,0	WNW	Переменно.	
»	» 12/24	+12,00	626,3	NW	»	
Хорошій караулъ	» 13/25	+12,80	621,4	N	Дождь и сухой смерадъ	Съ 13 іюля по- жары въ тайгѣ, солнце и мѣ- сяцъ при без- облачномъ не- бѣ едва видны съ неясными очертаніями.

Мѣсто наблюденія.	Мѣсяцъ и число.	Средне-суточная температура по Цельсию.	Средне-суточная показанія баро- метра въ мм.	Направленіе вѣтра.	Особыя явленія.	Примѣ
Въ пути . . .	Іюль 14/28	+14,00	626,4	NO	Дождь, вечеромъ ясно.	
» » . . .	» 15/27	+19,53	630,0	SO	Пасмурно, мгла.	
» » . . .	» 16/28	+15,30	641,0	S	Туманъ, мгла.	
» » . . .	» 17/29	+18,23	640,3	S	Ясно.	
Окинскій станъ	» 18/30	+16,13	639,7	SO	»	
» »	» 19/31	+14,75	636,0	NW	Ясно, дождь и мгла.	
» »	Іюль 20	+14,53	639,1	N	Дождь, вечер. ясно.	
	Августъ 1					
Въ пути . . .	» 21/2	+13,43	633,0	NO	Ясно.	
» » . . .	» 22/3	+14,77	630,0	NO	»	
» » . . .	» 23/4	+14,73	612,0	NW	Пасмурно, дождь.	
» » . . .	» 24/5	+10,10	599,0	NW	» »	
Монголь-дабанъ	» 25/6	+11,05	593,0	NW	Дождь.	
» »	» 26/7	+15,13	595,0	NW	»	
Въ пути . . .	» 27/8	+13,05	623,1	NO	Ясно.	
» » . . .	» 28/9	+13,03	630,0	NO	»	
» » . . .	» 29/10	+15,23	635,3	N	Дождь.	Въ ночь на 30/11 въ горахъ внѣ
Окинскій станъ	» 30/11	+10,53	637,3	SW	Сильный дождь.	
» »	» 21/12	+11,43	640,1	NW	Дождь безъ перерыва.	
» »	Августа 1/13	+10,40	633,3	W	» » »	
» »	» 2/14	+ 9,29	635,3	W	» » »	
» »	» 3/15	+ 6,53	639,3	NW	» » » ночью ясно.	

Мѣсто наблюденія.	Мѣсяцъ и число.	Средне-суточная температура по Цельсию.	Средне-суточная показаніи баро- метра въ мм.	Направленіе вѣтра.	Особыя явленія.	Примѣчанія.
Алуты . . .	Августа 4/10	+ 5,63	640,0	N	Переменно, ночью снѣгъ.	Ночью моро- зы отъ — 1 до — 7°.
» . . .	» 5/17	+ 7,58	633,0	NO	Облачно.	
» . . .	» 8/18	+ 7,18	627,0	NO	Ясно.	
Большое озеро	» 7/19	+ 7,53	615,6	NW	Ясно, вечер. облачно.	
Алуты . . .	» 8/30	+ 3,98	580,0	NW	Дождь, ночью снѣгъ.	
» . . .	» 9/21	+ 2,88	586,0	W	Облачно, снѣжный буранъ.	
Алуты, перев.	» 10/22	+ 2,60	584,0	N	Снѣгъ, буранъ, пе- ременно.	Гольцы въ полномъ снѣгу.
» . . .	» 11/23	+ 1,86	600,0	N	Снѣгъ, дождь.	
Алуты . . .	» 12/24	+ 5,83	630,0	N	Иней, дождь.	
» . . .	» 13/25	+ 7,82	632,0	N	Облачно, дождь.	
» . . .	» 14/26	+ 9,35	636,0	NO	Дождь, ночью снѣгъ.	
Алутскій станъ	» 15/27	+ 8,21	643,0	NW	Снѣгъ, дождь.	
» . . .	» 16/28	+ 4,92	643,0	NW	» . . .	
» . . .	» 17/29	+ 3,48	642,0	NW	» . . .	
Алуты . . .	» 18/30	+ 4,78	641,0	N	Переменно.	
» . . .	» 19/31	+ 3,45	641,0	N	Облачно.	
» . . .	Августа 20 Сентября 1	+ 2,25	608	NO	Ясно, ночью морозъ — 3°.	
» . . .	» 21/2	+ 7,08	585	NO	Ясно, ночью морозъ — 4°.	
» . . .	» 22/3	+ 12,90	690	NO	Ясно, ночью морозъ — 4°.	
» . . .	» 23/4	+ 8,08	640	SO	Переменно, дождь и снѣгъ.	

Мѣсто наблюденія.	Мѣсяцъ и число.	Средне-суточная температура по Цельсию.	Средне-суточный показаніи баро- метра въ мм.	Направленіе вѣтра.	Особыя явленія.	Примѣч.
Мондинск. станъ	Сентября 24/8	+ 5,93	639	80	Переменно, дождь и снѣгъ.	
Въ пути . . .	» 25/8	+ 5,65	630	SW	Переменно, дождь и снѣгъ.	
» » . . .	» 26/8	+ 9,22	675	SW	Ясно.	
» » . . .	» 27/8	+ 8,13	685	S	»	
С. Шимки . . .	» 28/8	+ 11,32	688	S	»	
» » . . .	» 29/10	+ 8,75	688	SO	»	
Въ пути . . .	» 30/11	+ 13,22	689	0	Облачно.	
С. Тунка . . .	» 31/12	+ 11,52	689	SW	Облачно, ночью снѣгъ.	
Въ пути . . .	Сентября 1/12	+ 9,40	670	W	Облачно вечеромъ бурянь.	
» » . . .	» 2/14	+ 2,68	617	N	Сильный снѣгъ ночью	
Ургудейскій ка- рауль . . .	» 3/15	— 2,77	615	N	Снѣгъ, туманъ.	
Ургудейскій ка- рауль . . .	» 4/16	— 2,66	660	NW	Снѣгъ, ночью — 8°.	
Въ пути . . .	» 5/17	+ 0,22	680	N	Облачно, снѣгъ.	
» » . . .	» 6/18	+ 4,68	685	NO	Ясно.	
С. Тунка . . .	» 7/19	+ 4,95	689	NO	Облачно, вечеромъ ясно.	
» » . . .	» 8/20	+ 6,08	692	NO	Ясно.	
Въ пути . . .	» 9/21	+ 2,57	698	0	Ясно ночью — 3°.	
» » . . .	» 10/22	+ 7,06	700	NW	Облачно, ночью дождь	
С. Култукъ . . .	» 11/23	+ 5,70	720	S	Ясно, ночью морозъ.	
Въ пути . . .	» 12/24	+ 5,42	715	S	Ясно.	
» » . . .	» 13/25	+ 10,22	710	SW	»	
С. Култукъ . . .	» 14/26	+ 4,52	715	N	»	

**Примѣчаніе 4-е. Нижнеудинская пещера, ея окрестности и фауна.**

Часть сѣверо-восточнаго склона Саяна, пересѣкаемая р. Удою, изслѣдана была нами въ дополненіяхъ къ Т. III Землевѣдѣнія, (Алтайско-Саянская система), гдѣ описанъ маршрутъ Гофмана (1843 г.) изъ г. Нижнеудинска черезъ р. Уду и вверхъ по рч. Ру-биной, лѣвому притоку Уды, на р. Бирюсъ и находящіяся тамъ плоты пріиски, причѣмъ теченіе р. Уды осталось въ сторонѣ. Извѣщенное Черскимъ въ 1875 г. <sup>1)</sup> изслѣдованіе находящейся въ этой рѣкѣ пещеры имѣетъ для насъ въ настоящее время тотъ интересъ, что оно знакомитъ, во-первыхъ, съ данными, указывающими на бывшія въ Восточной Сибири значительныя измѣненія климатическихъ условій въ послѣ-третичный періодъ, отразившіяся на составѣ фауны края, во-вторыхъ, съ весьма оригинальными не встрѣчавшимися до сихъ поръ въ другихъ мѣстностяхъ особенностями пещеры и сохраненія въ ней ископаемыхъ остатковъ, гдѣ броситъ другой свѣтъ на геогностическое строеніе прилежащей мѣстности, долженствующее служить поправкою къ свѣдѣніямъ и воззрѣніямъ, изложеннымъ по этому вопросу въ дополненіяхъ къ III-му тому, и наконецъ, знакомитъ съ прилежащимъ рѣкомъ р. Уды, до тѣхъ поръ еще неописаннымъ. Такъ какъ эти данныя послужатъ намъ для нѣкоторыхъ сопоставленій и изображеній при описаніи восточнаго и сѣверо-восточнаго продолженія нагорья, составляющаго специальную цѣль настоящаго тома, этому изложенію ихъ мы посвящаемъ это примѣчаніе.

Нижнеудинская пещера располагается въ разстояніи около 60 вѣстъ южнѣе г. Нижнеудинска, считая по прямому направлевію, отъ отрогъ правого берега р. Уды, не далеко отъ выхода этой рѣки изъ горъ на прилежащую къ нимъ часть высшей террасы

<sup>1)</sup> Черскій, Изв. Сиб. Отд. И. Р. Геогр. Общ. Т. VII, № 2—3, стр. 98—112.



плоской возвышенности. Отверстіе пещеры, обращенное на с.-с.-з. лежитъ на высотѣ, нѣсколько превосходящей 700' надъ уровнемъ рѣки, причемъ къ нему ведетъ настолько крутая и неудобная тропа, что нѣкоторые изъ путешественниковъ - туристовъ возвращались обратно въ Нижнеудинскъ, не дойдя и до половины высоты склона, гдѣ, на уровнѣ отверстія пещеры, тянется темно-сѣрый мелкокристаллическій, вонючій известнякъ, въ видѣ отвѣсной стѣны вдоль сѣверо-восточнаго склона отрога, высшій пунетъ котораго превышаетъ 1500' надъ рѣкою. Въ этомъ известнякѣ, достигающемъ не менѣе 40' мощности, образовалась и вся пещера существованіе которой давно уже извѣстно мѣстнымъ жителямъ. Ея открытіе приписываютъ бродячимъ здѣсь карагасамъ: въ погонѣ за рысью, они наткнулись будто-бы на отверстіе, ведущее въ пещеру, въ которое именно проскользнуло преслѣдуемое животное. Говорятъ, что охотники эти рѣшились осмотрѣть пещеру, розыскать приведшую ихъ сюда добычу; поиски оказались одиозными и породили предположеніе о существованіи другого входа и о чрезмѣрной длинѣ пещеры (до 11 верстъ), сохранившееся до времени ея изслѣдованія Черскимъ, причемъ полагаютъ еще, что пещера должна быть обитаема какими-то маленькими людьми—карликами, основываясь на найденныхъ яко-бы слѣдахъ соотвѣтственнаго размѣра. Повѣріе это, какъ извѣстно, связывается съ пещерами и жителями нѣкоторыхъ мѣстностей Европы (напр. Trou de Sottais въ Бельгіи) и, какъ мы увидимъ ниже, общается по всей вѣроятности и результатами дѣйствія теченій духа въ пещерѣ на слѣды оставленные прежними посѣтителями на рыхлой почвѣ дна коридоровъ. Со времени ея открытія Нижне-удинская пещера имѣла уже многихъ посѣтителей, изъ которыхъ г.г. Харинскій (1813 г.), «Иркутянинъ» (1858 г.) и Пилиновъ (1867 г.) обнаруживали о ней болѣе или менѣе краткія замѣтки. Замѣтки эти напечатаны во-первыхъ, въ газетѣ «Ergänzungen» Jahr. 1816, въ которой пробирный мастеръ Харинскій принимаетъ длину пещеры со всѣми ея развѣтвленіями до 11 верстъ (1), а затѣмъ въ Сибирскомъ Вѣстникѣ 1821 г. въ Иркутскихъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ 1858 г. Но всѣ эти замѣтки имѣли цѣлью только болѣе общее описаніе пещеры производимаго ею впечатлѣнія, что-же касается упоминаемыхъ въ нихъ ископаемыхъ остатковъ, то названіе это, какъ оказывается, примѣнялось къ нѣкоторымъ натевающимъ известковымъ образованиямъ.

Отверстіе пещеры начинается довольно обширнымъ гротомъ, въ котораго только ползкомъ можно проникнуть въ узкій, но высокій и длинный (45 сажень) коридоръ (входный), ведущій въ ю.-ю.-в. къ главной части пещеры. Эта послѣдняя, не обращать вниманія на множество большихъ известковыхъ нѣтъ, обусловившихъ сложность и извилистость проходовъ, является въ видѣ простаго, довольно широкаго (мѣстами болѣе 7 саж.) и высокаго (до 6 саж.) коридора, направляющагося въ общ. на в.-с.-в., слѣдовательно болѣе или менѣе параллельно направленію и самаго отрога, въ которомъ заключается пещера. Главная часть пещеры, измѣряя по прямой линіи, достигаетъ 82 сажень; ближе къ западной, значительно суженной оконечности, играющей роль поэтому какъ бы вѣтви (такъ называемый «Маринъ коридоръ» 15 саж. длины), отъ нея отдѣляется другая узкая и глухая вѣтвь, болѣе 30 саж. длины, направляющаяся вообще къ югу и извѣстная подъ названіемъ Ползучій коридоръ, такъ какъ по ней, на протяженіи 11 саж., необходимо браться «на четверенькахъ». Что же касается широкой восточной оконечности пещеры, то въ настоящее время она является занаванною обвалившеюся толщею глинистаго сланца, покрывающего известнякъ; судя однако по особенностямъ стѣнъ и т. п. можно полагать, что пещера продолжалась прежде далѣе къ востоку и соединялась еще съ другою, нынѣ самостоятельную, названною Черскимъ Малою пещерою, въ отличіе отъ главной Большой. Вѣтвь эта въ общемъ параллельная входному коридору Большой пещеры и открывается въ томъ же утесѣ, въ отстояніи менѣе 40 сажень на в.-с.-в. отъ входа въ Большую пещеру; длина ея достигаетъ 48 сажень при ширинѣ до 3 саж. ближе къ юго-восточному концу, отстоящему отъ восточнаго конца Большой пещеры (какъ видно изъ приложеннаго къ отчету Черского плана) всего лишь на 13 саж. и точно также занаванною обрушившимся глинистымъ сланцемъ, Малая пещера отдѣляется отъ себя въ общемъ почти параллельную ей, очень узкую и низкую вѣтвь, до 24 саж. длины, названною Проклятою дырою и весьма важную въ научномъ отношеніи. Такимъ образомъ, не считая мелкихъ боковыхъ вѣтвей и преградъ, осложняющихъ и удлинняющихъ по коридорамъ, длина Большой пещеры равняется 157 саж., Малой съ Проклятою дырою 72 саж. и, если прибавить къ тому самую меньшую длину обрушившагося коридора, которымъ обѣ пещеры соединялись въ одну (13 саж.), то цифра

общей длины будетъ равняться 218 саженимъ. Если же измѣритъ длину дѣйствительнаго маршрута по всѣмъ частямъ и боковымъ вѣтвямъ пещеры, не считая только обратнаго пути, то длина эта для Большой пещеры возрастаетъ уже до 270 сажени а вмѣстѣ съ Малою и до 342. — Совершенная Черскимъ приблизительно нивелировка пещеръ показала, что уровень дна главной пещеры располагаясь ниже входнаго коридора, понижается постепенно и направленію отъ запада и з.-ю.-з. къ в.-с.-в., т. е. въ направленіе ея длины, такъ-что дно восточной (обрушившейся) оконечности ея лежитъ на 27' ниже конца Мариннаго коридора и на 19' ниже конца Ползучаго, тогда какъ мѣсто входа въ Проклятую дыру располагается еще на 14 футовъ ниже ближайшей оконечности Большой пещеры. Между тѣмъ входной коридоръ послѣдней отличается уровнемъ, превосходящимъ 34 футовъ высоту дна восточной оконечности главной пещеры и на 27' выше средней ея части въ которую коридоръ этотъ открывается на высотѣ до 20', а въ Малую пещеру лежитъ хотя и 20 футами ниже его, но все-таки на 14' выше восточной оконечности Большой пещеры и на 28' выше отверстія Проклятой дыры. Точно также и всѣ другія мелкія боковыя вѣтви лежатъ выше уровня дна главной части пещеры.

Одною изъ важнѣйшихъ особенностей Нижнеудинской пещеры является весьма низкая ея температура, оказавшаяся, по наблюденіямъ Черскаго, постоянною въ большей части пунктовъ и неизмѣнною; къ тому же, какъ мы увидимъ изъ способа сохраненія ископаемыхъ остатковъ, такая температура присуща была ей начиная съ древнихъ временъ послѣдтретичнаго періода. Отчеты проверенныхъ термометровъ, поставленныхъ на полу въ различныхъ мѣстахъ пещеры, производились, хотя и не всегда въ одинаковое время, но во всевозможные часы дня, не исключая полуночи, разсвѣта, съ половины іюля и до послѣднихъ чиселъ августа. Наблюденія эти показали: 1) что Проклятая дыра на половинѣ ея длины имѣетъ неизмѣняющуюся температуру въ  $-4,3^{\circ}$ ; 2) около шурфа во входномъ коридорѣ Большой пещеры, въ разстояніи около 30 саж. отъ отверстія пещеры (входа), термометръ стоялъ неизмѣнно на  $-2,4^{\circ}$ ; 3) около восточной оконечности главной пещеры, какъ равно и въ средней ея трети ртуть не сходилась  $-1,4^{\circ}$ ; 4) въ началѣ западной трети длины температура въ теченіи 8-ми-дневнаго наблюденія всегда равнялась  $-1,0^{\circ}$ ; 5) ближе къ раздѣленію западной части пещеры на Маринну и Ползучую

коридоры термометръ показывалъ— $0,4^{\circ}$ ; 6) одно наблюдение, произведенное въ глубинѣ Ползучаго коридора, дало— $0,2^{\circ}$  и наконецъ, 7) температура въ глубинѣ Маріина коридора, въ теченіи 20 дней наблюдений колебалась уже отъ— $0,2$  до  $+0,4^{\circ}$  Ц. Последнее обстоятельство объясняется тѣмъ, что Маріинъ коридоръ, а также и Ползучій, располагаются всего ближе къ поверхности склона ледни, отдѣляющей западную часть пещернаго утеса отъ сѣверной вершины отрога; къ тому же и потолокъ Маріина коридора является растресканнымъ, вслѣдствіе чего онъ представляетъ собой единственное до сихъ поръ мѣсто въ пещерѣ, гдѣ въ ней проникаетъ незначительное впрочемъ количество воды, а со временемъ можетъ образоваться и новый входъ; вообще же пещера является вполне сухою и ея воздухомъ дышится легко. Во второй половинѣ августа (22-го) Черскаго удивило однако небольшое впрочемъ количество воды, появившееся на днѣ давно покинутой уже имъ раскопки въ западной трети длины Большой пещеры: вложенный ею илъ найденъ уже замерзшимъ съ поверхности. Термометръ показалъ тамъ —  $0,7^{\circ}$ , тогда какъ въ ближайшемъ мѣстѣ постоянного наблюденія температура не измѣнилась противъ прежняго ( $-1,0^{\circ}$  Ц.). Черскій полагаетъ, что вода попала сюда прямо въ толщѣ растресканнаго глинистаго сланца, залегающей подъ ледникомъ и вышла въ раскопку, доведенную до этого сланца. По своимъ очередямъ нѣкоторые наблюденія, произведенныя имъ надъ тѣмъ воздухомъ въ пещерѣ, показали, что узкое входное отверстіе Большой пещеры отличается постояннымъ теченіемъ холоднаго воздуха, между тѣмъ какъ въ разстояніи около 10 сажени отъ него, во входномъ коридорѣ, теченіе это дѣлается уже совершенно нечувствительнымъ, и свѣча, точно также какъ и въ остальныхъ частяхъ пещеры, горитъ уже безъ малѣйшаго колебанія пламени. Тѣмъ не менѣе полное отсутствіе слѣдовъ прежнихъ жителей на рыхломъ и мучнистомъ илѣ входнаго коридора тогда какъ слѣды эти все-таки замѣчались въ нѣкоторыхъ болѣе глубокихъ частяхъ пещеры, мѣстами низведенные уже до весьма низкихъ и неправильныхъ размѣровъ) можетъ быть объяснено лишь положительнымъ дѣйствіемъ медленнаго передвиженія атмосферы, вѣрояно, слѣдовательно, обязана своимъ происхожденіемъ и упомянутой выше сказка о карликахъ. Воздухъ, проникающій изъ во входный коридоръ Большой пещеры, осаждастъ всѣ свои пары уже на протяженіи первыхъ 5 — 6 сажени его длины, въ нижнихъ Ледникомъ, по причинѣ громаднаго количества ледя-

ных сталактитовъ, располагающихся на обѣихъ стѣнахъ этой части коридора на одной горизонтальной плоскости, выше которой и на потолкѣ образованія эти уже не встрѣчаются. Всмотрѣваясь въ столь правильныя и такъ рѣзко ограниченныя сверху полосы ледяныхъ сталактитовъ, кажется, что они образовались образуются отъ просачиванія воды по какой-либо горизонтальной щели или плоскости наслоенія известняка. Такое предположеніе однако не оправдывается ближайшимъ изслѣдованіемъ, такъ какъ ни трещинъ, ни слоистости въ известнякѣ здѣсь нѣтъ ни малѣйшихъ слѣдовъ; между тѣмъ какъ выше линіи сталактитовъ, около потолка, такъ и въ предѣлахъ ихъ образованія, располагается постоянный, никогда не исчезающій слой сгущенныхъ паровъ въ видѣ тумана, изъ котораго именно и нарастаютъ эти ледяныя массы. Остатки этихъ паровъ скопляются нѣсколько далѣе только въ видѣ инея, исчезающаго на 7-й или 8-й сажени отъ воды и отсутствующаго во всей остальной части пещеры, за исключеніемъ конца Маріина коридора, гдѣ ледъ обязанъ уже водѣ, просачивающейся черезъ упомянутыя выше щели въ потолокъ. Громадное количество льда можно видѣть въ Малой пещерѣ, гдѣ онъ является въ видѣ очень красивыхъ и большихъ сталактитовъ какъ по стѣнамъ, напоминая замерзшіе водопады, такъ и на потолкѣ, на полу, въ видѣ кеглеобразныхъ столбовъ, украшающихъ почти половину длины этого пространнаго коридора, тогда какъ далѣе по стѣнамъ его замѣчается лишь иней, исчезающій вполнѣ только въ Проклятой дырѣ, около входа въ которую температура колебалась отъ  $-3,5^{\circ}$  до  $-3,8^{\circ}$ , хотя и въ ледникѣ Большой пещеры въ разстояніи всего лишь четырехъ сажени отъ входнаго отверстія показаніе термометра колебалось между  $-2,0$  и  $-2,3^{\circ}$  Ц. Изъ выше сказаннаго понятно, что Большая пещера быстрыми шагами подвигается къ повышенію въ ней температуры, что на повышеніе это вліяетъ главнымъ образомъ ея западная часть, а не входное отверстіе, наконецъ, что Малая пещера въ своихъ климатическихъ условіяхъ нынѣ независима отъ Большой.

Стѣны Нижнеудинской пещеры вездѣ, гдѣ онѣ не обнаруживаютъ позднѣйшихъ обваловъ, носятъ на себѣ всѣ возможные доказательства размыва водою, какъ-то: горизонтальныя, желобовидныя углубленія, соответствующіе имъ острые или округленныя выступы, террасы и т. п. Въ общемъ гладкая поверхность такихъ стѣнъ покрыта очень тонкою корою натечной углекислой известняковой отъ которой зависитъ мѣстами очень мелкая бугристость и шер-

известность: вообще-же пещера очень бѣдна известковыми сталактитами и сталагмитами, и образование натековъ прекратилось уже давно путемъ полнѣйшаго закрытія тѣхъ трещинъ, посредствомъ которыхъ вода просачивалась на сводъ пещеры. Довольно красивые, хотя и небольшихъ размѣровъ сталактиты можно наблюдать главнымъ образомъ по сѣверной сторонѣ главной части пещеры, между среднею и восточною ея третями и въ глубинѣ Ползучаго коридора, и только въ средней трети, вправо (западнѣе) отъ входнаго коридора, находится единственный сталагмитовый столбикъ, имѣе 3½ футовъ высоты и 11 дюймовъ въ діаметрѣ.

Дно пещеры какъ равно и ея вѣтвей выполнено какъ слоистымъ, такъ и неслоистымъ наносною почвою, достигающею мѣстами (напр. во входномъ коридорѣ Большой пещеры) болѣе 2½ сажени мощности, причемъ ближайшее изслѣдованіе этого наноса показало, что отложеніе его принадлежитъ двумъ періодамъ, не одинаковымъ по древности, не взирая на то, что петрографически мѣле древнѣй наносъ отличается отъ позднѣйшаго только болѣею плотностью, сланцеватостью и видимымъ отсутствіемъ ископаемыхъ остатковъ. Весь наносъ этотъ представляетъ собою тонкопесчаный иль охристо-желтаго цвѣта, жирный на ощупь; по произведеннымъ въ Иркутскѣ опытамъ, матеріалъ этотъ можетъ употребляться съ пользою въ видѣ краски какъ въ натуральномъ, такъ и пережженомъ видѣ (охра), такъ-что современемъ залежи этого ила будутъ эксплуатироваться и для практическихъ цѣлей. По особенностямъ наносной почвы пещеры слѣдуетъ отнести и тотъ фактъ, что въ ней не оказалось ни малѣйшихъ слѣдовъ костей, ни принесенныхъ извнѣ, ни образовавшихся въ самой пещерѣ путемъ обтачиванія кусковъ породъ проточною водою. Геологическое изученіе одного уже входнаго коридора Большой пещеры позволяетъ прослѣдить слѣдующіе главные моменты исторіи образованія и развитія всей пещеры: а) сильный размывъ известняковъ трещинъ въ известнякѣ и превращеніе ихъ въ коридоры пещеры; б) очень тихое, но высокое стояніе воды, изъ которой вышелъ превосходно отмученный, тонко-сланцеватый иль; в) стояніе пещеры, давшее возможность образованію сталагмитовой коры на поверхности ила; г) новое вторженіе воды, размывшее въ значительной степени сланцеватый иль, взломавшее его сталагмитовую кору и наконецъ д) отложеніе неслоистаго ила по всей поверхности пещеры, происшедшаго отъ разрушенія сланцеватаго и вторичное образование пещеры безъ образованія известковыхъ натековъ.

Богѣ древній наносъ, т. е. сланцеватый илъ, сохранился все лучше только во входномъ коридорѣ Большой пещеры, гдѣ толщина его превосходитъ 2 сажени и составляетъ причину того, что дно названнаго коридора располагается такъ высоко надъ дномъ главной части пещеры. Такъ какъ въ свою очередь сланцеватый илъ, вмѣстѣ съ остатками покрывавшей его сталагмитовой коры, уцѣлѣлъ въ этой части пещеры только въ незначительномъ количествѣ, и то въ самыхъ защищенныхъ боковыхъ вѣтвяхъ, то поэтому очевидно, что теченіе воды, размывшее этотъ древнѣйшій осадокъ, должно было направляться именно вдоль главной части пещеры, хотя при современномъ ея состояніи и сихъ поръ нельзя еще указать на отверстіе, черезъ которое проникалъ этотъ потокъ. Во всякомъ случаѣ даже ближайшее изученіе особенностей нынѣшняго входнаго отверстія, приводитъ къ заключенію, что нынѣшнюю, условною впрочемъ доступностью она обязана только позднѣйшимъ обваламъ, тогда какъ въ прежнее время со стороны р. Уды входный коридоръ суживался до значенія щели, черезъ которую, какъ мы увидимъ ниже, не могли попадать въ пещеру древесные стволы, погребенные въ позднѣйшемъ наносѣ, точно также какъ они не могли бы попасть въ нее и въ настоящее время, не взирая на слегка измѣненное узкое и расширенное входное отверстіе. Самымъ правдоподобнымъ предположеніемъ поэтому является мысль, что въ прежнее время съ дневною поверхностью могли сообщаться самыя глубокія части Ползучаго коридора, совершенно выполненныя впоследствии позднѣйшимъ наносомъ, — вопросъ, окончательное рѣшеніе котораго возможно, разумѣется, лишь послѣ совершеннаго удаленія наносной почвы изъ названнаго коридора.

О томъ, что вода, размывшая древнѣйшій наносъ должна была занимать высокій уровень надъ дномъ пещеры, свидѣтельствуетъ столь-же высокое залеганіе позднѣйшаго отложенія, замѣчаемаго даже на высотѣ до 30' надъ дномъ средней части пещеры. Отложеніе это, въ видѣ неслоистаго рыхлаго ила, содержащаго ископаемые остатки какъ растительнаго, такъ и животнаго царства, образуетъ собою господствующую часть наносной почвы Большой пещеры, а въ главной части послѣдней и въ Малой пещерѣ оно развито почти исключительно. Не только въ самомъ наносѣ этого уровня, но и на его поверхности можно находить какъ куски, такъ иногда и цѣлыя стволы деревьевъ лишенныхъ коры и сучьевъ, но изрѣдка съ развѣтвленными тол-

стиги корниани. Такіе стволы, до 5 дюймовъ въ діаметрѣ и иногда около двухъ саженой длины, окрашены охристо-желтымъ цвѣтомъ мюса и въ большей части случаевъ сохранены великолѣпно: хорошо горятъ и подчасъ, по увѣренію работниковъ, употреблявшихся ихъ на подмостки для шурфа во входномъ коридорѣ, представляютъ болѣе значительную твердость и противодѣйствіе то-вору, нежели свѣжее дерево; многіе изъ нихъ однако покрыты рыхлымъ и изветшалымъ слоемъ. Кромѣ вообще мѣстныхъ, двойныхъ деревьевъ встрѣчаются также и куски березовыхъ ство-ловъ, иногда отчасти съ сохраненною корою, хрупкіе куски которой шриваются кромѣ того и отдѣльно изъ того же наноса. Во вход-номъ коридорѣ такіе стволы попадали очевидно уже изъ главной части пещеры, такъ какъ длина ихъ и развѣтвленіе толстыхъ частей корней, дѣлали опыты извлеченія этихъ стволовъ изъ пе-щеры черезъ современное отверстіе и изгибы начальной части поднаго коридора совершенно невычислимыми. Но всего интереснѣе являются остатки млекопитающихъ животныхъ, громадное скоп-леніе которыхъ найдено въ Проклятой дырѣ. Остатки эти замѣ-чательны въ томъ отношеніи, что всѣ найденныя части сохраня-ются при себѣ болѣе или менѣе значительное количество мягкихъ частей въ засохшемъ состояніи, какъ-то: связки, сухожилия, иногда вышцы, сосуды и кожу, куски которой, лишенные шерсти, выры-вались также и отдѣльно отъ костей, а нѣкоторые изъ мелкихъ животныхъ (грызуны, землеройки, въ одномъ случаѣ и соболю), попадались даже совершенно обтянутыми голою кожей, отчасти въ совершенно сплюснутомъ состояніи. Не взирая на такое сохраненіе, въ числѣ вырытыхъ ископаемыхъ нашлись представители какъ вымершей фауны, такъ и животныхъ, отчасти вовсе не свойствен-ныхъ нынѣ Восточной Сибири, отчасти-же удалившихся въ значи-тельно болѣе сѣверныя широты, какъ это мы увидимъ изъ ниже-приведеннаго списка. Такимъ образомъ найдены: 1) *Летучія мыши* (сѣверная, *Vespertilio borealis*), въ томъ числѣ 2) *Ушанъ* до сихъ поръ водящіеся около отверстія пещеры и въ ближайшей части поднаго коридора, но не углубляющіеся далѣе въ пещеру. 3) *Земле-ройка обыкновенная* (*Sorex vulgaris*). 4) *Нижнеудинская собака* (*Canis Nischneudensis*). Это весьма оригинальное и рѣзко охаракте-ризованное животное представляетъ новый видъ изъ подрода, из-дѣльнаго подъ названіемъ Цюнь или Куонъ; не принадлежитъ ли онъ къ вымершимъ животнымъ или же и до сихъ поръ водятся еще какъ въ верховьяхъ р.р. Уды и Барюсы, такъ и въ системѣ



р.р. Китоя, Иркута и Бѣлой, до сихъ поръ нельзя еще рѣши окончательно, такъ какъ живущая въ названныхъ мѣстахъ дие собака никѣмъ еще не изслѣдована и только по аналогіи съ Амурскою и Алтайскою причисляется къ такъ называемой альпійск собакамъ (*Canis alpinus*); отъ этой послѣдней, между тѣмъ, нижеудинская собака отличается слишкомъ рѣзко, чтобы породить какъ либо сомнѣніе относительно ея видовой самостоятельности. 5) *Лисецъ* (*Canis lagopus*). Остатки его, какъ представителя сѣверной фауны, составляютъ одно изъ убѣдительнѣйшихъ доказательствъ бывшаго и въ Сибири пониженія температуры въ послѣдтретичномъ періодѣ, съ чѣмъ совпадаютъ и указанные выше слѣды бывшихъ ледниковъ въ системѣ р.р. Иркута, Китоя и Бѣлой, хотя, какъ мы узнаемъ ниже и какъ видно было уже изъ отсутствія ледниковыхъ отложений на описанной нами части плоской возвышенности, страна не подвергалась такому обледенѣнію, какое имѣло мѣсто напр. въ извѣстныхъ частяхъ Россіи и Европы. Если сохраненіе нѣкоторыхъ мягкихъ частей, напр. нѣбныхъ складокъ, десенъ и т. п. при остаткахъ Нижнеудинской собаки могло бы удивлять наблюдателя, благодаря указанной выше загадочности вопроса о вымершемъ состояніи этого вида, то фактъ, что такіа же мягкіа части найдены и при костяхъ песца, вырытыхъ въ широтахъ, не свойственныхъ нынѣ этому животному (около 54° сѣв. широты), выходитъ уже изъ ряда обыкновенныхъ и можетъ объясниться очевидно лишь тѣмъ обстоятельствомъ, что наденныа части песца попали уже въ мерзлую и съ тѣхъ поръ растаивавшую пещеру. 6) *Лисица* (*Canis vulpes*). 7) *Бурый медведь* (*Ursus arctos*) найденъ въ количествѣ до 60 недѣлимыхъ; по поводу этого животнаго Черскій замѣчаетъ, что на основаніи собраннаго въ Сибири палеонтологическаго матеріала, вопросъ томъ, водился-ли въ Сибири такъ называемый Пещерный медведь рѣшается до сихъ поръ лишь отрицательно. 8) *Росомаха* (*Gulo l. realis*). 9) *Соболь* (*Mustella zibellina*), водившійся нынѣ лишь въ болѣе центральныхъ частяхъ горъ, найденъ въ нѣсколькихъ экземплярахъ (до 10-ти); одинъ въ видѣ почти цѣльнаго скелета, обтканутаго кожей. 10) *Сусликъ* не встрѣчающагося здѣсь уже вида; по зубамъ системѣ онъ представляетъ достаточно рѣзкіа отличія отъ эверманова (*Sperm. Eversmanni*) и американскаго *Sp. Perryi*, водившагося и на сѣверо-востокѣ Сибири. Остатокъ этотъ, вмѣстѣ съ нѣкоторыми другими, сгорѣлъ во время Иркутскаго пожара, и потому ближайшее опредѣленіе его сдѣлалось невозможнымъ. 11) *П*

мы (Argvicolae), найденны въ нѣсколькихъ экземплярахъ, принадлежали той-же участи. 12) *Леммингъ* (Myodes) весьма близкій, можетъ быть и тождественный съ обскимъ (M. obensis); этотъ представитель ледниковой фауны найденъ въ нѣсколькихъ экземплярахъ, въ свою очередь съ уцѣлѣвшими при нихъ мягкими частями, такъ-что въ черепу одного изъ нихъ, черезъ посредство соответственнаго лоскута кожи, прикрѣплялись даже обѣ переднія конечности съ характеристическими ноготками на большихъ пальцахъ. На черепѣ этомъ ясно различаются: губы, разрѣзанныя до самаго носа (rhinarium), снабженнаго продольною бороздкой, сдвинутыя ноздри и возвышенныя складки, на которыхъ выростали усы; въ числѣ этихъ складокъ удобно различаются нѣтъ, для столькихъ же рядовъ щетинокъ, располагавшихся параллельными рядами; точно также замѣчалось и отверстіе для праваго глаза съ присохшимъ къ нему глазнымъ яблокомъ и двѣ бородавки для щетинокъ надъ верхнимъ вѣкомъ, а также складки на вѣбѣ. Кожа, какъ во всѣхъ случаяхъ ея нахожденія въ пещерѣ, отличалась блѣдно-охристо-желтымъ цвѣтомъ пещернаго мѣста. 13) *Заяцъ бѣлый* (Lepus variabilis). 14) *Пишуха* (Lagomys sibericus), одинъ экземпляръ которой найденъ сплюснутымъ и совершенно обтянутымъ кожей. 15) *Сѣверный олень* (Cervus tarandus); въ пещерѣ найдено только нѣсколько костей этого животного, хотя остатки его весьма часто встрѣчаются въ наносахъ въ мѣстѣ описанной нами части высшей террасы плоской возвышенности. 16) *Антилопа Сайга* (Ant. Saiga = Ant. borealis Tscherski). Черепъ стержень этого животного съ частью черепной крышки и уцѣлѣвшимъ при ней кускомъ кожи, представляли замѣчательное и не съ разу объяснимое явленіе, какъ найденные въ странѣ, гдѣ нынѣ сайга вовсе не существуетъ, къ тому-же въ интимнѣйшемъ сообществѣ съ представителями полярной фауны, съ которыми эта степная антилопа не имѣетъ ничего общаго. Съ тѣхъ поръ однако, когда Черскому удалось прослѣдить самымъ постепеннымъ образомъ бывшее распространеніе сайги отъ Западной Сибири, гдѣ остатки ея были найдены вмѣстѣ около Омска, черезъ Красноярскъ и южныя части Минусинскаго Округа до Нижнеудинской пещеры, а затѣмъ и на р. Вилюѣ, откуда имѣется столь-же хорошо сохранившійся ископаемый черепъ, какъ и съ названныхъ мѣстъ по р. Енисею <sup>1)</sup>, — съ тѣхъ поръ на нахожденіе остатковъ

<sup>1)</sup> Протоколы Общ. Естеств. при С.-Пб. Университетѣ, 1886 г.

этого животного въ Восточной Сибири можно смотрѣть во-первыхъ, какъ на доказательство бывшаго въ послѣдникъ періодъ болѣе умѣреннаго климата, нежели современный, на что указываютъ также и извѣстные факты бывшаго болѣе сѣвернаго распространения бѣлой березы <sup>1)</sup>, а во-вторыхъ остатки этой антилопы заставляютъ насъ смотрѣть на фауну Нижнеудинской пещеры, какъ на смѣшанную, въ смыслѣ представителей неоднородныхъ подраздѣленій послѣдней эпохи <sup>2)</sup>, не взирая на то что въ настоящее время они погребены въ слоѣ одного стратиграфическаго уровня и перемѣшаны другъ съ другомъ (см. ниже 17) *Дикій козелъ* неопредѣленнаго вида (*Capra spec. indeterminata*), отличный отъ водящагося нынѣ въ описанныхъ выше альпійскихъ цѣляхъ. Найдены стержни его роговъ, части нижнихъ и верхнихъ челюстей, пастыня и плюсневые кости, нерѣдко съ прикрѣпленными къ нимъ всѣми фалангами, благодаря удѣлѣвшимся связкамъ. Остатки эти точно также сгорѣли ранѣе ближайшаго ихъ опредѣленія. 18) *Кости лошади* (*Equus caballus*) точно также найдены въ пещерѣ, хотя и въ весьма ограниченномъ количествѣ, но къ числу самыхъ оригинальныхъ находокъ принадлежитъ безъ сомнѣнія 19) *Кусокъ кожи вымершаго вида носорога*, — единственны изъ найденныхъ здѣсь остатковъ исчезнувшихъ великановъ послѣдней фауны, такъ какъ въ числѣ костей, вырытыхъ въ пещерѣ, до сихъ поръ не найдены еще ни мамонтъ, ни какой-либо изъ современныхъ ему большихъ быковъ, столь часто находимыхъ въ наносныхъ отложеніяхъ плоской возвышенности, а какъ мы видѣли выше, и въ Тункинской долині. Интересующій насъ кусокъ кожи имѣлъ 300 мил. длины и 142 мил. ширины, при толщинѣ въ 12 мил., съ довольно ровными, мѣстами какъ-бы обветренными, мѣстами-же повидимому выгрызенными поверхностями, причемъ на вообще гладкой верхней (наружной) изъ нихъ замѣчались слѣды царапинъ и углубленій, мѣстами какъ-бы отъ зубовъ животныхъ въ родѣ грызуновъ. Кожа эта, какъ и многіе другіе куски принадлежавшіе медвѣдю, отличалась твердостью, неподатливостью къ сгибанію, полнымъ отсутствіемъ жировыхъ частей, вслѣдствіе чего ея внутренняя поверхность напоминаетъ собою грубую и ворсистую ткань, окрашенную въ свойственный и всѣмъ другимъ остаткамъ охристо-желтый цвѣтъ. Необыкновенная толщина этого

<sup>1)</sup> Шмидтъ, Mémoires de l'Académie Imp. d. sc. de St. Pétersbourg. T. XVIII, № 11 1872.

<sup>2)</sup> Черскій, Рукописныя замѣтки о Сибири.

куска сразу указывала на принадлежность его какому либо толстокожему животному (*Pachydermata*), въ которомъ послѣ поверхностнаго осмотра, еще въ пещерѣ, Черскій склонился скорѣе подозрѣвать кабана, нежели вымершее животное <sup>1)</sup>. Очистка и ближайшее изслѣдованіе верхней поверхности этого лоскута сразу обнаружили однако самые характеристическіе признаки носорожьей кожи, какъ-то: овальныя и вообще округленныя углубленія, на днѣ которыхъ зияють отверстія для волосъ, располагавшихся у этого животнаго не отдѣльно, а пучками отъ 7 и 10 до 33 волосъ въ каждомъ пучкѣ, число которыхъ соотвѣтствовало числу описанныхъ углубленій, точно также, какъ каждое отдѣльное углубленіе соотвѣтствуетъ верхней окружности конической, воронкообразной капсулы, игравшей роль общей для волосъ каждаго изъ пучковъ и весьма хорошо замѣтной на поперечномъ изломѣ кожи, откуда высохшія капсулы эти даже легко добываются въ совершенной цѣлости. Не взирая на эту замѣчательную находку, въ пещерѣ не оказалось ни одной кости, принадлежащей носорогу.

Такимъ образомъ въ составѣ перечисленныхъ ископаемыхъ остатковъ Нижнеудинской пещеры мы видимъ во-первыхъ представителей ледниковой фауны (песецъ, леммингъ, сѣверный олень), кѣмъ степной, болѣе умѣреннаго климата (сайга) и наконецъ луговой и лѣсной, большая часть которыхъ живетъ и въ настоящее время въ той-же мѣстности. Все это, какъ мы замѣчали уже, говоря объ остаткахъ антилопы, доказываетъ, что пещера эта наполнялась трупами животныхъ въ различныя времена послѣдней эпохи, начиная съ ледниковаго ея періода, и что совмѣстное нахожденіе этихъ остатковъ въ настоящее время должно объясниться залеганіемъ ихъ уже на вторичномъ мѣстоахожденіи, другими словами, что представители этихъ различныхъ фаунъ должны были находиться вначалѣ въ соотвѣтствовавшихъ этимъ періодамъ слояхъ наносной почвы пещеры, и только вслѣдствіе позднѣйшаго размыва отложенія эти были уничтожены, а находившіеся въ нихъ остатки перемѣшаны другъ съ другомъ и погребены вмѣстѣ на современномъ ихъ мѣстѣ нахожденія. Такому выводу не противорѣчатъ и условія нахожденія всѣхъ этихъ остат-

<sup>1)</sup> См. его Предварительный отчетъ Изв. Сиб. Отд. И. Р. Геогр. Общ. Т. VI, № 6 и 6-й, гдѣ въ спискѣ ископаемыхъ значится «Sus?». Родовое названіе это взято изъ Археологіи Россіи Уварова, не смотря на позднѣйшую поправку.

вовъ въ пещерѣ. И дѣйствительно, ближайшее изслѣдованіе по этому вопросу склоняетъ къ предположенію, что выполненіе Проклятой дыры имѣло мѣсто въ то время, когда наносы различныхъ древностей, занимавшіе высокій уровень и въ Малой пещерѣ, успѣли превратиться въ разжиженную, кашицеобразную массу отъ дѣйствія воды, проникшей туда въ позднѣйшее время. Такая масса, вмѣстѣ съ увлекаемыми ею ископаемыми остатками, должна была стекать около стѣны Малой пещеры внизъ, по направленію къ отверстию Проклятой дыры и распространяться по этой послѣдней. Только такимъ образомъ и нѣкоторою продолжительностью процесса такого стеканія можно объяснить весьма ясную полировку стѣны въ этомъ мѣстѣ и камней, лежащихъ какъ около отверстия, такъ и въ самомъ отверстіи дыры. Съ этою массою увлекались также и кусочки глинистаго сланца, обрушившагося впоследствии, какъ равно и большіе куски известняка, отпавшіе отъ глыбъ этой породы, преграждавшихъ нѣкоторыя части Проклятой дыры, напр. около перваго ея расширенія. Съ такимъ способомъ выполненія вполне согласуется и характеръ наноса, этой норы, содержащаго ископаемые остатки: кости и куски кожи являются здѣсь перемѣшанными въ самомъ разительномъ безпорядкѣ съ плитками глинистаго сланца и кусками известняка, тогда какъ подъ вліяніемъ сортирующаго дѣйствія воды, размѣщеніе такого содержимаго тончайшаго пылевиднаго ила имѣло бы, разумѣется, совершенно другой характеръ. Вообще-же разрѣшеніе многихъ вопросовъ, касающихся какъ способа, такъ и времени выполненія Нижнеудинской пещеры, требуетъ еще болѣе подробнаго изслѣдованія, главнымъ образомъ въ смыслѣ розысканія бывшаго продолженія ея къ востоку, гдѣ можетъ быть уцѣлѣла часть наноса, уничтоженнаго въ изслѣдованныхъ уже ея коридорахъ.

При этомъ необходимо имѣть въ виду и небольшое, но заваленное отверстіе, найденное Черскимъ въ разстояніи около 60 саж. восточнѣе входа въ Малую пещеру, слѣдовательно еще ниже по теченію Уды. Въ этомъ мѣстѣ со стороны рѣки въ известковую стѣну Пещернаго утеса врѣзывается небольшая долинка, утесистыя стѣны которой представляютъ мѣстами слѣды точно также размытой поверхности, какъ это свойственно знакомымъ намъ частямъ пещеры, гдѣ онѣ не измѣнены позднѣйшими обвалами. Очевидно поэтому, что долинка эта образовалась путемъ обвала бывшаго здѣсь коридора пещеры, а въ глубинѣ долинки, именно

в восточномъ ея концѣ и найдено упомянутое отверстіе, которое удастся быть можетъ проникнуть въ прежнее восточное продолженіе изслѣдованныхъ частей пещеры. Но приближавшіяся сроки отъѣзда и необходимость предварительной очистки этого отверстия не позволяли Черскому отвлекать людей отъ работы, давшей уже богатую коллекцію. Такимъ образомъ слѣдуетъ напомнить, что будущіе изслѣдователи предпримутъ всѣ зависящія отъ нихъ мѣры для подробнаго изученія какъ этого новаго коридора, такъ и для розысковъ другихъ, возможныхъ здѣсь гдѣ либо отверстій, имѣя въ виду очевидную уже здѣсь возможность увѣнчать ихъ поиски весьма интересными и важными для науки данными.

Переходя затѣмъ къ самому Пещерному утесу и долинѣ р. Уды<sup>1)</sup>, мы видимъ, что отрогъ этотъ, хотя и значительно состоящий преимущественно хвойнымъ лѣсомъ, но съ примѣсью березы, встрѣчаемой даже и на высшемъ его пунктѣ (1500' надъ уровнемъ, 3033' абс. высоты), и съ разбѣянными по нему многочисленными пионами («Маринъ корень» у мѣстныхъ жителей), представляетъ тѣмъ не менѣе и достаточно обнаженій, чтобы судить о формахъ, входящихъ въ его составъ. Такимъ образомъ, нижнимъ членомъ развитой здѣсь системы пластовъ является очень тонкий и мелкозернистый, метаморфическій рухляково-глинистый сланецъ и песчаникъ, различныхъ оттѣнковъ краснаго цвѣта, перемежающійся съ сѣро-зелеными и зеленовато-сѣрыми глинистыми сланцами и покрытый тонко-слоистымъ кварцитовиднымъ песчаномъ красновато-сѣраго цвѣта, въ свою очередь перемежающимся прослойками сѣровато-зеленаго глинистаго сланца и простирающимся къверху сѣровато-бѣлый цвѣтъ съ буроватымъ оттѣнкомъ. Поверхъ этого песчаника залегаетъ темно-сѣрый сланецъ, совершенно тождественный со сланцами (сѣровакковыми) хребта Байкальского около оз. Байкала (см. ниже), перемежающійся мѣстами съ сѣрымъ и буровато-сѣрымъ метаморфическимъ песчаникомъ и переходящій къверху въ темный глинистый сланецъ, близкій къ черному, а еще выше въ мало измѣненный глинистый блѣднаго розовато-желтаго и грязнаго оливковаго цвѣта. Сланецъ этотъ, на высотѣ около 700' надъ Удою, образуетъ собою постель вонючему известняку (не болѣе 40' мощности), въ которомъ размыта пещера.

Точно такой-же сланецъ покрываетъ собою известнякъ, и часть его, какъ сказано было выше, обрушилась и расчленила пещеру

<sup>1)</sup> Черскій, I. с. а также Зап. И. Акад. Наукъ, Прилож. 2 къ Т. 59, 1889 г., стр. 43—47.

на отдѣльныя части. Кверху онъ переходитъ въ такой-же сѣрваковный сланецъ (похожій на Онотскій), какъ и залегающій ниже известняка, а наконецъ вся толща эта завершается пластомъ тонкослоистаго песчаника краснаго цвѣта и такого-же глинистаго сланца, образующихъ высшій пунктъ Пещернаго утеса. Отсюда отрогъ этотъ склонается къ югу въ долину р. Унулъ (праваго притока Уды), образование которой могли въ свою очередь уничтожить нѣкоторыя южныя развѣтвленія пещеры точно также, какъ склонъ къ долину Уды пересѣкъ и уничтожилъ сѣверныя продолженія прежнихъ коридоровъ. Вся толща этихъ породъ достигаетъ болѣе 1000' мощности и образуетъ собою склонъ горы, выхода изъ него р. Уды на плоскую возвышенность, т. е. на протяжении верстъ болѣе 16 внизъ по долину. Изгибъ, образуемый пластами на этомъ протяженіи, можно было-бы назвать террасою, такъ какъ въ началѣ, считая снизу вверхъ по рѣкѣ, пласты эти образуютъ видимый наклонъ къ сѣверо-востоку (до 30°) и въ такомъ видѣ появляются изъ подъ уровня рѣки плоской возвышенности; далѣе, въ Пещерномъ утесѣ, они располагаются почти горизонтально, а вслѣдъ затѣмъ опять поднимаются кверху, но съ еще болѣе крутымъ наклономъ (до 55°) въ томъ же направленіи; господствующее простирание этихъ древнѣйшихъ породъ (см. ниже) является съ ю.-в. на с.-з. Въ предѣлахъ этихъ сланцевъ ненаселенная долина р. Уды отличается почти восточнымъ направленіемъ, если не обращать вниманія на ея изгибы въ ближайшихъ окрестностяхъ пещеры, и воспринимается съ правой стороны рѣчки: Большой и Малый Унулъ, Мунгузъ, Уня, Ехъ-Кирби и Шулутѣй-Кирби, а наконецъ Каракорумъ, а съ лѣвой: Аегбъ, Талое озеро, Хурлашиха и Муксуть.

Изъ тѣхъ-же древнѣйшихъ здѣсь породъ состоитъ утесъ лѣваго берега Уды, лежащій въ концѣ описываемаго ея отрѣзка почти насупротивъ устьевъ рѣчекъ Кирби, извѣстный подъ названіемъ Богатыри (Ехѣ-баба, т. е. большой дѣдушка на языкахъ мѣстныхъ бурятъ). Куски растресканной породы этого утеса вѣсели въ одномъ мѣстѣ такъ, что образовались углубленія, соответствующія какъ-бы глазамъ, между которыми оставшіяся куски скалы играютъ роль носа и такимъ образомъ произошла фигура, похожая на лицо человѣка большихъ размѣровъ и съ монгольскимъ типомъ. Высокое расположеніе этой фигуры, давшее названіе утесу, и невозможный къ ней доступъ вслѣдствіе непосредственнаго подмыванія утеса водою, поддерживаютъ эффектъ, про-

исходный фигурой на невооруженные глаза суевѣрныхъ зрителей, разсматривающихъ её обыкновенно съ противоположнаго берега и тягшихъ въ ней окаменѣлаго богатыря. Первая изъ попавшихся зрительныхъ трубокъ убѣждаетъ однако, что весь богатырь этотъ есть просто дѣло случая и не даетъ мѣста даже мысли о произведеніи рукъ древнихъ аборигеновъ. Рабочіе Черскаго, привыкшіе визировать зрительной трубкой во время долговременнаго проживанія во входномъ гротѣ Нижнеудинской пещеры, сейчасъ разубѣдились въ загадочности своего богатыря, очертанія котораго положительно исчезаютъ при взглядѣ на него вооруженнымъ глазомъ.

Сейчасъ-же ниже этого утеса начинается второй отрѣзокъ теченія р. Уды, вступающей уже здѣсь на плоскую возвышенность. Уда принимаетъ въ общемъ почти меридіональное направленіе, на протяженіи болѣе 20 верстъ, послѣ чего образуетъ поворотъ къ западу къ деревнѣ Солонцы (около 10 верстъ), вслѣдствіе чего вся эта часть теченія, начиная съ пещеры, представляетъ собой значительную, какъ-бы прямоугольную излучину, обращенную въ востокъ. Изъ притоковъ на этомъ пространствѣ извѣстны одни лишь правые, какъ-то: Тунгурукъ или Тынгырукъ, впадающій на первомъ поворотѣ рѣки, а нѣсколько ниже его и Уть, а затѣмъ Айрей, ближе къ второму повороту, тогда какъ съ лѣвой стороны впадаютъ только ключъ Куйтъ, уже въ предѣлахъ деревни Солонцы. Въ разстояніи около 10 — 12 верстъ отъ утеса Богатыря, на лѣвомъ берегу Уды располагается крайній южный пунктъ поселеній, деревня Порогъ, обитаемая преимущественно ясачными буратами; здѣсь-же находится и такъ называемая «Инородческая Управа Нижнеудинской земли». Лѣвый берегъ интересующаго насъ отрѣзка Уды низкій, отчасти лѣсистый, отчасти луговой и состоитъ изъ глинистыхъ и слоисто-песчаныхъ наносныхъ отложений съ примѣсью гальки; наносъ этотъ переходитъ мѣстами и на правый берегъ, распространяясь и по долинамъ притоковъ, при чемъ въ долинѣ рч. Коньей, впадающей въ упомянутый выше Уть (правый притокъ Уды) въ суглинистомъ наносѣ, во время рѣдкихъ звѣроловныхъ ямъ, найденъ изрядныхъ размѣровъ коренной зубъ мамонта, доставленный въ Иркутскій Музей Нижнеудинскимъ Окружнымъ Исправникомъ Яровицкимъ, сообщившимъ и нѣкоторые, небезынтересныя свѣдѣнія о свойствахъ почвы, въ которой производились эти земляныя работы. Оказывается, что яма, изъ которой вырытъ зубъ (1 саж. глубины) обнаружила одну лишь



суглинистую почву, въ сосѣднихъ же двухъ подмѣшивалась и галька: въ одной изъ этихъ ямъ, на глубинѣ  $2\frac{1}{2}$  аршинъ, появилась мерзлая почва, — «вѣчная мерзлота», хорошо знакомая мѣстному населенію, между тѣмъ какъ въ другихъ, удаленныхъ на 25 саж. другъ отъ друга, мерзлота не встрѣчена и на глубинѣ 1 сажени, до которой только и достигали эти ямы, — что очевидно зависитъ какъ отъ свойствъ почвы, такъ и расположенія ямъ относительно согрѣвающихъ агентовъ. Что же касается выходовъ коренной породы, то на лѣвомъ берегу этой части Уды, только въ одномъ мѣстѣ, именно, нѣсколько выше устья Кирей, наблюдается незначительный выступъ почти рыхлаго желтовато-бѣлаго песчаника съ охристыми пятнами, относимаго Черскимъ къ прѣсноводной юрѣ, развитой, какъ мы увидимъ ниже, и далѣе какъ по Удѣ, такъ и къ востоку отъ нея, до соединенія съ тѣми же осадками по низовьямъ рр. Оки, Бѣлой, Китоя и Иркуты. Между тѣмъ по правому берегу Уды, начиная съ рч. Уть, берегъ сопровождается обнаженіями изверженной породы (оливиновый діабазъ, по микроскопическому анализу Макерова), продолжающійся въ видѣ плоской возвышенности до деревни Порогъ, около которой поперечный рядъ глыбъ этого діабазы преграждаетъ фарватеръ, образуя порогъ, давшій названіе деревнѣ. Ниже порога и правый берегъ дѣлается наноснымъ, продолжаясь въ такомъ видѣ и на послѣдній отрѣзокъ рѣки (отъ Солонцовъ до г. Нижнеудинска), гдѣ обнаженія группируются на болѣе высокомъ лѣвомъ берегу. На протяженіи этого отрѣзка, достигающаго слишкомъ 25 верстъ длины, Уда принимаетъ съ правой стороны рѣчки: Каторгай, Куркидэй, Ангиль и Муть, тогда какъ съ лѣвой въ нее изливаются: Шелотный, Даргинной и Рубахина, знакомая намъ уже изъ путешествія Гофмана на Вирюсу. Въ разстояніи 10 верстъ ниже деревни Солонцы названной такъ отъ находящихся около нея солончаковыхъ мѣстъ, располагается другая, извѣстная подъ названіемъ Абалакова или Идыкѣнъ, а наконецъ, на томъ же лѣвомъ берегу Уды, дер. Рубахина или Усть-рубахина уже въ виду г. Нижнеудинска. Уда на всемъ этомъ протяженіи является гораздо болѣе широкою и образуетъ ближе къ городу многочисленные острова. Между Солонцами и Абалаковой лѣвый берегъ рѣки обнажаетъ горизонтальные пласты песчаника, относимаго Черскимъ къ юрской системѣ; только около рч. Шелотный слон его обнаруживаютъ легкіе изгибы. Затѣмъ начиная съ Абалаковой и почти до половины дороги къ Нижнеудинску (до устья рч. Ангиль), гдѣ лѣвый берегъ

возвышается до 35 — 42' надъ рѣкою, склоняясь къ ней мѣстами почти отвѣсно, юрскіе пласты появляются уже только на значительной высотѣ этого обрыва, въ которомъ обнажаются красноцвѣтные и зеленоватые рухляковые песчаники, причисляемые Черскимъ къ продолженію тѣхъ же девонскихъ осадковъ, съ которыми мы познакомились отчасти въ промежуткѣ между р.р. Бѣлою и Окою и къ которымъ относятся въ настоящее время, на основаніи отчасти найденныхъ въ нихъ ископаемыхъ остатковъ, отчасти же въ виду непосредственной связи съ такими пластами, красноцвѣтные и зеленые рухляки, песчаники, а также известнякъ какъ Милутинского округа, такъ окрестностей г. Красноярска и деревни Лавинской по р. Бирюсъ, т. е. пласты, древность которыхъ была еще сомнительною во время составленія дополненій къ III-му тому Землеуказанія. Наконецъ съ устья Ангилы господствуютъ уже наносныя отложенія и только ближе къ городу высоты подходятъ къ правому берегу Уды, представляя здѣсь весьма интересное обнаженіе на горѣ, гдѣ на вершинѣ построена небольшая часовня. Нижняя треть высоты обнаженнаго склона образуется выходами известковъ юрскаго песчаника, знакомаго намъ еще со временъ Мана и падающаго на с.-с.-в. подъ незначительнымъ угломъ; средняя треть утеса образуется осыпью, между тѣмъ какъ въ высшей части его обнажается тотъ же оливиновый діабазъ, съ которымъ мы встрѣтились ниже устья рч. Утъ, доказывая, что изверженная порода эта моложе покрываемыхъ ею юрскихъ осадковъ, что до сихъ поръ не встрѣчалось въ другихъ мѣстахъ разлѣгающагося діабазы, считавшагося поэтому древнѣе юры. Оканчивая изложеніе свѣдѣній относящихся къ долинѣ р. Уды, необходимо замѣтить, что оливиновый діабазъ встрѣченъ Черскимъ еще въ нѣсколькихъ другихъ мѣстахъ промежутка между р. р. Удою и Окою и отличается громадною областю распространенія въ восточной Сибири, достигая значительныхъ сѣверныхъ широтъ, о чемъ мы будемъ имѣть случай говорить въ слѣдующемъ примѣчаніи и во 2-омъ выпускѣ нашихъ дополненій.

**Примѣчаніе 5-ое. Большой Сибирскій трактъ отъ ст. Байкало-  
до западной границы Иркутской губ.**

Прежде чѣмъ покинуть юго-западную оконечность Иркутской губ., составившую въ большей своей части предметъ разсмотрѣнія настоящаго выпуска, и перейти уже къ описанію Прибайкалья, и излишне будетъ заглянуть еще разъ въ Нижнеудинскій округъ южная часть котораго составляетъ предметъ изложенія дополненія къ третьему тому Землевѣдѣнія Азіи Риттера. Въ то время, когда составлялись упомянутыя дополненія, наши свѣдѣнія о сѣверной части Нижнеудинскаго Округа были весьма скудны, въ настоящее же время мы имѣемъ три весьма важныхъ труда, касающихся этой части Иркутской губ. Не желая обойти молчаніемъ новѣйшихъ изслѣдованій съ одной стороны и съ другой стороны преслѣдуя въ дополненіяхъ цѣль согласованія географическихъ рамокъ, установленныхъ для нашего труда Риттеромъ, съ административнымъ дѣленіемъ территоріи, гдѣ это возможно сдѣлать, и слишкомъ удаляясь отъ намѣченнаго плана, мы отводимъ настоящее и слѣдующее за нимъ примѣчанія разсмотрѣнію средней части Нижнеудинскаго округа, расчитывая въ этомъ выпускѣ и послѣдующемъ дать географическій очеркъ Иркутской губ.

Одинъ изъ упомянутыхъ выше трудовъ, которымъ мы воспользуемся здѣсь, принадлежитъ Черскому <sup>1)</sup> и заключаетъ описаніе Большаго Сибирскаго тракта. Другимъ <sup>2)</sup>, именно «Отчетомъ объ изслѣдованіи Нижнеудинской пещеры», мы уже воспользовались въ предыдущемъ примѣчаніи, однако и здѣсь будемъ имѣть случай пользоваться имъ для нашихъ описаній. Что же касается третьяго труда, т. е. «Матеріаловъ по изслѣдованію землепользованія и экономического быта населенія Иркутск. губ.», то изложенію свѣдѣній, касающихся въ немъ Нижнеудинскаго окр., посвящено 6-ое примѣчаніе.

Нужно сказать, что южная часть Нижнеудинскаго округа, отъ окружнаго города и до сѣвернаго склона Саяна, пересѣзаемая верхними теченіями рѣкъ Бирюсы, Уды и Ии, представляетъ дикую

---

<sup>1)</sup> Черскій, Геологическое изслѣд. Сибирскаго тракта отъ оз. Байкала до вост. склона Уральскаго хребта. Приложение № 2 къ Т. 59 Зап. И. Акад. Наукъ 1889 г.

<sup>2)</sup> Черскій, Изв. Сиб. Отд. И. Р. Геогр. Общ. Т. VII 1876 г. № 2 и 3.

и почти вовсе незаселенную мѣстность. Все населеніе южной части округа приурочено къ Большому Сибирскому тракту, пересекающему округъ съ с.-з. на ю.-в., и отчасти къ водораздѣлу между Удой и верховьямъ Бирюсы, на пути, соединяющемъ Нижнеудинскъ съ находящимися тамъ пріисками. Поэтому-то по этимъ двумъ направленіямъ мы только и имѣемъ подробныя географическія свѣдѣнія. Такъ какъ по второму направленію мы имѣемъ описанія въ допущеніяхъ, касающихся Алтайско-Саянской системы, то здѣсь мы коснемся лишь Большаго Сибирскаго тракта.

Подлежащій описанію отрѣзокъ Сибирскаго тракта отъ р. Бирюсы и до с. Зиминскаго на Окѣ принадлежитъ къ установленной Черскимъ *высшей террасы*, которая тянется дальше до Байкала и заключается между  $115^{\circ} 20'$  и  $122^{\circ} 50'$  в. д. <sup>1)</sup>. Терраса эта, имѣющая протяженіе въ 700 верстъ, на разстояніи 160 верстъ, между р.р. Удой и Бирюсой представляетъ склонъ къ с.-с.-з., къ слѣдующей за ней *средней террасы*. Средняя высота этой высшей террасы равняется 250,00 саж. или 1.750,0' на ур. ок. Высшія точки ея достигаютъ 2.028,6' абс. выс. Пересекающія террасу рѣки опускаются въ общемъ, какъ уже сказано выше (стр. 368), не ниже 1.415,1', и только долины двухъ рѣкъ врѣзаются глубже, это именно въ Бѣлой (1315,3') и Уды (1315,3'). Самую типическую вслѣдствіе наименьшей расчлененности часть террасы профиль Сибирскаго тракта пересекаетъ между р.р. Окой и Удой, именно между станціями Шебартинской и Худоеланской, гдѣ вмѣстѣ съ тѣмъ располагается и высшій пунктъ террасы (2.028,6'). Нѣсколько дифференцированнымъ является отрѣзокъ террасы между р.р. Окою и Бѣлою, благодаря долинамъ рѣкъ Залари и Унги. Правильность склона отрѣзка между р.р. Удой и Бирюсой, высшія точки котораго понижаются къ Бирюсѣ въ прогрессіи 1.816,5—1.494,5—1.470 и 1.266,3 фут. нарушается тѣмъ обстоятельствомъ, что вслѣдъ за Уковскою горою дорога спускается въ параллельную ей долину р. Топорокъ и слѣдуетъ внизъ по ней на протяженіи 45 верстъ. Таковъ орографическій характеръ сѣверо-западной части высшей террасы.

Скажемъ нѣсколько словъ о геогностическомъ строеніи описываемаго отрѣзка. Наибольшимъ развитіемъ на всемъ протяженіи отрѣзка пользуются юрскіе желтые песчаники и пески, изъ подъ которыхъ только въ двухъ мѣстахъ выступаютъ красноцвѣтные

<sup>1)</sup> О террасахъ на протяженіи всего тракта говорилось выше (стр. 367 и слѣд.).

рухляки и песчаники девонскаго возраста, это именно въ окрестностях ст. Камышетской и между станціями Алзайской и Баеронской. Юрскіе песчаники мѣстами прикрываются изверженной породой, именно оливиновымъ діабазомъ, особенно значительные выходы котораго наблюдаются вблизи Уковской станціи.

Теперь обратимся къ подробному описанію интересующаго насъ отръзка тракта и начнемъ наше описаніе отъ с. Зиминскаго.

Большой Сибирскій трактъ, по пересѣченіи имъ р. Оки, считая отъ Иркутска, поворачиваетъ прямо на сѣверъ, а затѣмъ на с.-с.-з. и направляется къ Кимилтейской станціи, расположенномъ на слѣдующемъ за рч. Зимой притокъ Оки Кимильтею, обладающемъ въ общемъ восточнымъ, или лучше сказать с.-с.-в.-нымъ теченіемъ. На этомъ пространствѣ трактъ, какъ видно на картѣ, придерживается болѣе или менѣе теченія Оки, широкая долина которой выполнена мощнымъ суглинистымъ наносомъ желтаго и буровато-желтаго цвѣта, вскипающимъ отъ кислоты. Рядъ слѣдовъ древнихъ руселъ, а также озеро, при которомъ построена мельница, свидѣтельствуютъ о значительной измѣняемости въ этомъ мѣстѣ ложа Оки. Въ 15 верстахъ отъ Зиминскаго, гдѣ Ока дѣлаетъ излучину на востокъ, трактъ покидаетъ ея берегъ и перерѣзаетъ водораздѣлъ между Зимой, Окой и Кимильтеемъ. Сперва трактъ изъ долины поднимается на ея лѣвый, болѣе низкій берегъ. Подъемъ этотъ на 15-й верстѣ становится уже крутымъ и довольно высокимъ. Склонъ подъема поросъ древесной растительностью и образованъ тѣмъ же желтымъ наносомъ, какой наблюдается въ долинѣ Оки; на 25-й верстѣ наносъ уже принимаетъ красный оттѣнокъ, а около деревни Переводъ виднѣются вдали красныя обнаженія праваго берега Оки. Такимъ образомъ въ данномъ мѣстѣ желтые угленосные слои смѣняются красноцвѣтными девонскими породами <sup>1)</sup>. Отъ деревни Переводъ трактъ по легкой пока-  
тости спускается въ долину рч. Кимильтея.

Для выясненія соотношенія красныхъ и желтыхъ породъ между собой и здѣсь, какъ въ мѣстѣ соприкосновенія площадей ихъ распространія Черскимъ <sup>2)</sup> предпринята была экскурсія по теченію рч. Кимильтею. Конфигурація мѣстности указываетъ на то, что нынѣ узенькая и маловодная рѣчка Кимильтея въ былыя времена изобиловала водами, которые лились съ значительной быстро-

<sup>1)</sup> Подробности объ этихъ породахъ см. выпускъ 2-й нашихъ дополненій.

<sup>2)</sup> Черскій, Изв. Сиб. Отд. И. Р. Геогр. Общ. Т. VII 1876 г. № 2—3, стр. 81—82.

той, разливая не только что правый берегъ своей долины, но принимая участие въ разливѣ лѣваго берега Оки. Рѣчка Кимильтея положила себѣ ложе въ красныхъ рухлякахъ, которые и обнажаются въ лѣвомъ высокомъ берегу. Берегъ этотъ, какъ оказалось изъ наблюдений Черскаго, сложенъ изъ горизонтально напластованныхъ красныхъ рухляковъ и рухляковистыхъ сланцеватыхъ глинъ съ прослойками какъ краснаго, такъ и зеленаго ила, причемъ всѣ эти породы, въ особенности кверху, перемежаются съ красными, зелеными, сѣровато-зелеными песчаниками, содержащими много углекислой извести и множество блестокъ слюды, расположенныхъ на плоскостяхъ наслоев. Песчаникъ этотъ по видимому пригоденъ для выдѣлки жернововъ, такъ какъ Черскій нашелъ изъ него и неоконченный жерновой камень изъ зеленаго песчаника, лежащими въ долинѣ. Неизвѣстно, въ видѣ прослойковъ ли или въ видѣ встрѣчается и добывается здѣсь зеленовато-бѣлая глина. Между растительнымъ слоемъ и красными породами залегаетъ тонкая обточенная галька, принесенная очевидно изъ другихъ близлежащихъ мѣстъ. Къ подножію обнаженій примыкаетъ наносъ желто-бурого и краснаго цвѣта, мѣстами съ галькою и обломками желтыхъ здѣсь коренныхъ породъ. Въ этомъ наносѣ Черскому удалось найти плечевую кость носорога и запястные кости лошади.

Село и почтовая станція Кимильтейское (1400' надъ ок.) расположено на лѣвомъ берегу Кимильтея, верстахъ въ 5 отъ его устья. За этой станціей мѣстность по направленію тракта значительно повышается надъ уровнемъ долины Оки, пересѣкается на 13 верстѣ довольно глубокой долиной Кулутъ и, достигнувъ своей точки (болѣе 400' надъ Кимильтеемъ) около Листвянской станціи, опускается къ долинѣ рч. Ахты, лѣваго притока Оки, уровень которой, какъ и Кулута, нѣсколько превышаетъ высоту Кимильтея. Между обѣими упомянутыми станціями Черскому удалось найти новое доказательство залеганія желтыхъ породъ надъ красными. На 13 верстѣ тракта, на спускѣ въ долину Кулутъ, слѣдовательно гипсометрически выше описанныхъ красныхъ породъ долины Кимильтея, суглинистый наносъ покрываетъ бѣлымъ рыхлымъ пескѣмъ, причемъ можно встрѣтить разбросанными по склону обломки желтаго песчаника. Въ оползнѣ Черскій нашелъ даже маленькіе листочки каменнаго угля. Далѣе, на 13 верстѣ за Листвянской станціей, на спускѣ къ долинѣ рч. Ахты, наблюдается уже въ обнаженіяхъ мѣстами рыхлый желтый песчаникъ съ пропластами бѣлаго и охристаго цвѣта, а также съ

углистыми прослойками. Песчаникъ этотъ тонкослойный и съ выклинивающимися слоями. Еще ниже на спускѣ, около самой рѣки обнажается подобный описанному, но только болѣе бѣлаго цвѣта песчаникъ. Между почти рыхлыми горизонтальными его слоями не вскипающими отъ кислоты, видны два тонкихъ и плотныхъ прослойка сѣраго цвѣта, въ которыхъ кварцевыя зерна соединены известковымъ цементомъ. Итакъ Кимильтейско-Ливинская возвышенность также показываетъ залеганіе красноцвѣтныхъ девонскихъ породъ подъ желтыми песчаниками и что все пространство между Унгой и Кимильтеемъ является въ видѣ большой долины размыва, углубившейся даже до самаго известняка. Красный цвѣтъ наносовъ на этомъ пространствѣ очевидно находится въ зависимости отъ выступовъ красныхъ породъ, которыя легко выветриваются и своими рыхлыми продуктами разрушенія могутъ даже маскировать выступы самой породы. Условія залеганія этихъ красныхъ наносовъ напоминаютъ таковыя по р. Кудѣ, описанныя Чекановскимъ <sup>1)</sup>. У Чекановскаго мы читаемъ: «красные наносы поднимаются до известной высоты на склоны долины р. Куды; они на пути из Иркутска къ ст. Хомутовой ввели пр. Эрмана въ заблужденіе такъ-что онъ полагалъ, что иркутскіе желтые слои лежатъ и красныхъ ленскихъ. Интересно знать въ какихъ условіяхъ отлагался этотъ наносъ? Вверхъ по р. Ордункѣ онъ подходит весьма близко къ ст. Ользоновской, а между тѣмъ по значительно глубже лежащей долинѣ р. Куды онъ подымается сравнительно не высоко на склоны». Черскій <sup>2)</sup> предполагаетъ, не удастся ли и тамъ найти при болѣе благоприятныхъ условіяхъ, т. е. при новыхъ дорожныхъ работахъ, при раскопкахъ и рытвѣ колодцевъ, связь красныхъ наносовъ съ уцѣлѣвшими гдѣ либо подъ иркутскими слоями красныхъ породъ, тѣмъ болѣе, что наносы по р. Ордункѣ не такъ-то удалены отъ области распространенія красныхъ породъ хребта Поворотъ. Вообще объ этихъ наносахъ и красныхъ и желтыхъ породахъ въ бассейнѣ Куды будетъ говорено въ слѣдующей части нашихъ дополненій при описаніи Ангарты и ея притоковъ.

Начиная съ рч. Ахты, мѣстность снова повышается, достигаетъ высшей своей точки между станціями Куйтунской и Тулуновской, а затѣмъ снова понижается черезъ ст. Шерагульскую къ ст. Тулуновской, расположенной на р. Ин, лѣвомъ при-

<sup>1)</sup> Черскій, Изв. I. с. pag. 82.

<sup>2)</sup> Чекановскій, Зап. Сиб. Общ. И. Р. Геогр. Общ. Т. XI выноска къ стр. 296

Оки. Куйтунская, Тулинская и Шерагульская долины <sup>1)</sup> принадлежать къ самымъ глубокимъ на этомъ протяженіи, но ни одна изъ нихъ не углубляется до уровня Іа, а слѣдовательно и Кимильтея.

Между станціями К у и т у н с к о й (1800' н. ок.) и слѣдующей за ней Т у л и н с к о й встрѣчаются вырываемые изъ подъ наноса, куски желтаго песчаника, достаточно свидѣтельствующіе о разлитіи здѣсь осадковъ юрской системы. На 13 верстѣ отъ первой станціи Черскій замѣтилъ на дорогѣ мелкіе куски траппа. По вопросамъ оказалось, что порода эта привозится изъ-за Тулинскій станціи и служитъ для починки дороги. Свернувъ съ почтовой дороги у ст. Тулинской на с.-з., Черскій доѣхалъ до мѣста обилии изверженной породы. Порода эта, какъ оказалось, образуетъ цѣлый холмъ, имѣющій видъ низкой столовой горы, обнаженной съ ю.-ю.-в.-ой и ю.-в.-ой сторонъ. Холмъ (1.800' н. ок.) отъ довольно плоскій, удлинненъ на с.-с.-в. и поросъ, подобно лежащей мѣстности, высокимъ хвойнымъ лѣсомъ. По мнѣнію Черскаго холмъ этотъ связанъ съ возвышенностью, извѣстной подъ названіемъ Нюринскаго хребта. Обнаженные стороны холма, откуда добывается трапповый (діабазовый см. ниже) щебень, ясно показываютъ, что весь холмъ сложенъ изъ этой породы, обладающей, вѣрнымъ образомъ, сферической и концентрически скорлуповатой отдѣльностью; но тутъ же можно наблюдать и столбчатую въ комбинаціи съ вышеуказанными. Очень тонкая скорлуповатость связана со всѣми видами отдѣльности. Шары, эллипсоиды, столбы, ие неправильныя глыбы различныхъ діаметровъ, на которыхъ трескалась порода, обладаютъ концентрически-скорлуповатымъ строеніемъ, такъ-что обнаженная поверхность разрѣза холма является красиво разрисованной различными узорами. Вслѣдствіе паденія подлѣ влияніемъ вывѣтриванія скорлупъ, у подошвы обнаженія лежатъ кучи дресвы, которая и идетъ на починку трапповой дороги. Въ строеніи изверженной породы этой мѣстности Черскому удалось подмѣтить двѣ оригинальныя особенности, это именно: среди окруженныхъ скорлупами сферондовъ или неправильныхъ глыбъ наблюдаются такіе, которыхъ центральная часть распадается еще на двѣ сферы, въ свою очередь окруженные скорлупами; въ встрѣчается отдѣльность ланцетовидная и удлинненно-четыре-

<sup>1)</sup> У Обручева приведенъ анализъ образца бурого угля изъ этой долины. Цифры слѣд. влажн. 7,38%; лет. вѣщ. 37,11; кокса 53,11; золы въ углѣ 5,32, въ коксѣ 9,80; серы 1,22. Теплопроизв. спос. 6.467 ед. т.; уд. в. 1,22. Горн. вѣст. 1891. № 12, стр. 494.



угольная, окруженная параллельно-скорлуповатым поясом и точно также съ двумя сферами въ центральной части, и наконец сферы, слившіяся сосѣдними частями своихъ поверхностей.

Подъ вліяніемъ энергично дѣйствующихъ агентовъ вывѣтриванія траппъ быстро разрушается и превращается въ концы концовъ въ бурю глину, которую можно наблюдать тутъ же. Отношеніе траппа къ нижележащимъ породамъ ни въ холмѣ, ни въ окрестностяхъ (въ этомъ случаѣ по отсутствію обнаженій) наблюдать нельзя, но такъ какъ далѣе, на спускѣ къ Шерагульской долины, снова выступаютъ желтые юрскіе песчаники, то по всѣмъ соображеніямъ весьма правдоподобнымъ является утвержденіе, что и тутъ изверженная порода залегаетъ надъ юрскими осадками.

Выше было уже упомянуто, что Черскій предположительно ставитъ въ связь описанный выше холмъ съ Нюринскимъ хребтомъ, видимымъ на сѣверъ отъ дороги между Шерагульской и Тулуновской станціями. На эту связь указываетъ общее строеніе мѣстности, показывающее, что трапповая толща имѣла здѣсь нѣкогда большое распространеніе и являлась въ видѣ покрова, но подверглась размыву, результатомъ котораго и явились отдѣльные разбросанные холмы. Ближайшее изученіе Нюринскаго хребта должно выяснитъ этотъ вопросъ.

По пересѣченіи рѣки Ии, лѣваго притока Оки въ мѣстѣ, гдѣ расположены село и станція Тулуновское (1576' н. ок.), траппъ сохраняя прежнее направленіе, вступаетъ въ область, гдѣ находится, какъ уже указано выше, высшій гипсометрическій пунктъ всей дороги, начиная съ Оки и до Бирюсы, послѣ чего мѣстность изрытая многими долинами, понижается вообще къ р. Удѣ, уровень которой ниже уровня Кимильтея. Тѣ же желтые песчаники играютъ и здѣсь первенствующую роль въ строеніи мѣстности. Около самаго села Тулуна желтый песчаникъ настолько твердый, что съ успѣхомъ употребляется какъ строительный матеріалъ. Отдѣльные выходы траппа наблюдаются на всемъ протяженіи до Нижнеудинска. Къ сѣверу и югу отъ с. Тулуна по лѣвому берегу Ии, какъ узналъ Черскій отъ мѣстныхъ жителей, добывается дрсва траппа для починки дороги. Выходъ траппа замѣчается и на спускѣ къ Курзанской станціи (1692' н. ок.), гдѣ онъ сильно замаскированъ наносомъ. Въ этомъ несчаомъ наносѣ Черскій наблюдалъ нѣкоторую слоистость, причемъ песчаные пласты оказались наклоненными. Фактъ весьма любопытный, но не позволяющій сдѣлать никакихъ выводовъ, такъ какъ онъ единичный. Жел-

тій песчанникъ за Курзанской станціей становится болѣе рыхлымъ, обнаженіе его наблюдается на 11-й верстѣ за станціей. Охристо-желтаго цвѣта внизу песчанникъ здѣсь является пропласткомъ тоже песчанника, но уже бѣлаго цвѣта. Такой же желтый песчанникъ обнажается и за Шебартинской станціей, расположенной на р. Шебартѣ, лѣв. притокъ Ии, по направленію къ Худосланской станціи (1884' н. ок.), расположенной на рч. Хингуи, прав. притокъ Уды <sup>1)</sup>. Далѣе, близъ Киргитуйской станціи (1662' н. ок.) развиты желтый и бѣлый песчанникъ и конгломераты. Въ послѣднемъ замѣчается мелкая и рѣдкая галька. На одномъ кускѣ конгломерата Черскому удалось замѣтить грубосоранившійся растительный отпечатокъ (стволь), напоминающій таковыя же въ иркутскихъ пластахъ. Какъ на интересный фактъ необходимо указать на то обстоятельство, что около дер. Хингуи (на высотѣ 1.715' н. ок.), расположенной на трактѣ между Худосланской и Киргитуйской станціями, среди плитокъ желтаго песчанника, разбросанныхъ по спуску къ указанной деревнѣ, можно встрѣтить плитки песчанника краснаго цвѣта. По мнѣнію Черского <sup>2)</sup> красный цвѣтъ песчанника вызванъ и здѣсь подземнымъ разломомъ угольныхъ флѣцовъ, подобно тому, какъ это наблюдается по теченію р. Бѣлой (см. выше стр. 329). На спускѣ съ горы за Хингуемъ краснаго цвѣта песчанникъ до того подходитъ по внѣшнему виду къ красному песчаннику девонской системы, что является даже нѣкоторое сомнѣніе, есть ли это дѣйствительно перегорѣлый желтый песчанникъ, тѣмъ болѣе, что на 2-ой верстѣ за Киргитуйской ст. замѣчается наносъ съ краснымъ оттѣнкомъ, но подобное сомнѣніе вскорѣ же разсѣивается, такъ какъ на 23 верстѣ за Хингуемъ, уже гипсометрически ниже, встрѣчается желтый песчанникъ, а наносъ снова принимаетъ желтый цвѣтъ, мощная толща которой тянется до самаго г. Нижнеудинска, около котораго, на послѣдней горѣ, изъ подъ желтаго наноса, выступаетъ знакомый намъ уже съ зеленоватымъ оттѣнкомъ траппъ.

Общее направленіе р. Уды около г. Нижнеудинска сѣверо-западное. Ея правый берегъ высокій и крутой, между тѣмъ какъ лѣвый пологимъ склономъ поднимается въ предгорье Нижнеудинскаго хребта, нивьющаго здѣсь по Гофману 3854' надъ Удою. Хре-

<sup>1)</sup> Между означенными станціями находится водораздѣлъ между системами Амуръ и Енисей.

<sup>2)</sup> Черскій, Изв. I. с. pag. 84.

беть этотъ сопровождается здѣсь Уду и гораздо выше праваго берега ея долины, въ которомъ рѣка промыла два обширныхъ полукружныхъ расширенія, отдѣленныхъ другъ отъ друга горой, подступающей въ видѣ мыса близко къ рѣкѣ, образуя крутой утесъ. Въ сѣверо-западномъ расширеніи долины расположенъ Нижнеудинскъ, а на горѣ, отдѣляющей одну котловину отъ другой, построена маленькая часовня. Гора эта въ геологическомъ отношеніи представляетъ большой интересъ. Нижняя ея треть сложена изъ свѣтлаго, сѣровато-желтаго, неравномѣрно зернистаго и неравномѣрно слоистаго песчаника съ блестками бѣлой слюды, мѣстами съ діагональной слоистостью. Песчаникъ этотъ внизу довольно рыхлый и съ охристыми прослойками; выше онъ становится болѣе плотнымъ. Кверху въ песчаникѣ замѣтны прослойки гальки и онъ самъ принимаетъ разные оттѣнки отъ бѣловато-желтаго до буро-желтаго, заключая пятнышки и тонкіе желѣзистыя прослойки почти чернаго цвѣта. Наклонъ пластовъ на с.-в. 30° подъ угломъ въ 8°. Въ верхней трети утеса обнажается траппъ исключительно съ призматическою отдѣльностью. Вторая треть, или середина утеса представляетъ собою слой соприкосновенія песчаника и траппа. Соприкосновеніе это обозначено измѣненіемъ желтаго цвѣта песчаника въ красный. Какъ та, такъ и другая порода сильно растрескана, такъ что эта часть утеса представляетъ собой осипъ и смѣсь песчаниковыхъ и трапповыхъ глыбъ. Трапповая толща по всей вѣроятности прикрываетъ песчаники по всей длинѣ видимой съ утеса праваго берега, въ пользу чего говоритъ однообразное строеніе его склона, вверху крутаго, а внизу наклоннаго. Подобное же налеганіе траппа на желтомъ песчаникѣ можно наблюдать и въ обнаженіяхъ юго-восточнаго склона утеса, обращеннаго къ ограниченному имъ заливному лугу <sup>1)</sup>.

Расширеніе долины, въ которомъ стоитъ городъ, выполняется двоякимъ наносомъ: 1) болѣе древнимъ, не слоистымъ, состоящимъ изъ отложенія крупныхъ обточенныхъ галекъ <sup>2)</sup> и валуновъ, принесенныхъ съ верхнихъ частей рѣки вмѣстѣ съ пескомъ охристо-желтаго до красно-бурого цвѣта. Мощность этого наноса не менѣе 1½ саж. Лучше всего можно наблюдать его по улицѣ, ведущей въ больницу. Онъ образуетъ родъ возвышенной террасы. 2) Позднѣйшій наносъ состоитъ изъ слоистаго суглинистаго песка.

<sup>1)</sup> Черскій, Зап. I. с. раз. 18.

<sup>2)</sup> Въ числѣ галекъ встрѣчается и траппъ.

Онъ выполняетъ неровности въ размытомъ болѣе древнемъ наносѣ, ни залегающаго непосредственно на коренной породѣ и притомъ на пѣстахъ съ болѣе высокимъ гипсометрическимъ уровнемъ, чѣмъ уровень современной городской долины. Этотъ послѣдній фактъ указываетъ на высокое стояніе воды въ р. Удѣ въ прежнее время.

За дальнѣйшимъ описаніемъ рѣки Уды до пещернаго утеса обращаемъ интересующихся къ предыдущему примѣчанію, къ стр. 535.

Изъ г. Нижнеудинска трактовая дорога, по гористой мѣстности, идущей въ составъ Уковской возвышенности, ведетъ къ Уковской станціи (1600' н. ок.) <sup>1)</sup>, лежащей на рч. Укѣ, лѣвомъ притоцѣ Уды, перейдя предварительно рч. Каменную, впадающую справа въ Укѣ. По послѣдней рѣчкѣ извѣстны со временъ Гофмана и Макаровскаго обнаженія песчаника. Оба названные ученые считали его отличнымъ отъ иркутскаго, причемъ второй высказался въ пользу менѣе древняго его возраста. Ознакомившись со всѣми видоизмѣненіями песчаника въ другихъ мѣстахъ Иркутской губ. и прослѣдивъ непрерывность отложенія этихъ породъ до самаго г. Нижнеудинска, Черскій <sup>2)</sup> не находитъ въ немъ никакого отличительнаго признака и отождествляетъ его съ типичнымъ иркутскимъ песчаникомъ. Здѣсь онъ обладаетъ горизонтальнымъ положеніемъ пластовъ, бѣловато-желтымъ цвѣтомъ, представляетъ пѣстами окристожелтые прослойки и состоитъ изъ зеренъ неравнозначной величины. Песчаникъ этотъ нѣсколько отличается отъ уковского и лавинскаго (см. ниже).

Подобный же песчаникъ обнажается и въ долинѣ рч. Мары (1400' н. ок.) и на подъемѣ съ этой рѣчки на высшую террасу Уковской горы. За упомянутымъ подъемомъ, на высотѣ 1.645', дорога пролегаетъ уже по траппу, съ которымъ мы встрѣтились при описаніи окрестностей Нижнеудинска. Траппъ этотъ видѣлся и въ сторонѣ отъ долины рч. Мары въ видѣ крутаго утеса, возвышающагося надъ площадью, покрытою наносомъ. Итакъ, начиная съ подъема, вся высшая часть Уковской горы на протяженіи почти 15 верстъ сложена изъ траппа, который вѣроятнo распространяется отсюда по Уку до самой Уды, такъ какъ Уковский водонадъ, судя по рисунку и словамъ Миллера и Гельмерсена, посѣтившихъ его, окруженъ призматическими столбами и потому какъ по-

<sup>1)</sup> Начиная съ Уковской ст. трактъ мѣняетъ свое с.-з.-ное направленіе на с.-с.-з.-ное.

<sup>2)</sup> Черскій, Изв. 1. с. pag. 92.

лагаетъ Черскій, образованъ изверженной породой. Только на спускѣ съ Уковской горы, достигающей 1.816,5', на 11 верстѣ отъ станціи, на высотѣ 1.750', траппъ уступаетъ мѣсто осадочнымъ породамъ — песчаникамъ, дѣйствительно отличающимся отъ иркутскихъ.

Образецъ упомянутаго траппа подвергнуть былъ микроскопическому изслѣдованію Макевымъ и оказался оливковымъ діабазомъ. По замѣчанію Иностранцева <sup>1)</sup> діабазъ этотъ представляетъ переходную форму къ плагиоклазовымъ долеритамъ, такъ какъ входящіе въ его составъ плагиоклазы и свѣжіи оливки носятъ вполне типичный характеръ для долерита, между тѣмъ какъ авгитъ по своимъ свойствамъ напоминаетъ таковой изъ діабазовъ. Основная стекловатая масса или вовсе отсутствуетъ или она встрѣчается небольшими хлоритизированными участками. Итакъ оливковый діабазъ Нижнеудинскаго округа, залегая всегда надъ иркутскими песчаниками, по всѣмъ пока извѣстнымъ даннымъ моложе юрской буроугольной формаціи. Точнѣе же опредѣлить возраста нѣтъ пока возможности. Сравненіе уковскаго оливковаго діабазы съ изверженной породой, образующей Ангарскіе пороги, подало мысль Макевому отождествить эти породы, считая ихъ лишь видоизмѣненіями, и такимъ образомъ расширить площадь распространенія оливковаго діабазы, впрочемъ объ этомъ будетъ рѣчь въ слѣдующемъ выпускѣ дополненій при описаніи Ангарскихъ пороговъ.

Мы уже говорили выше, что на спускѣ съ Уковской горы по направленію къ Камышетской станціи (1212' н. ок. и 1.377,6' по опредѣленію Черскаго), оливковый діабазъ быстро уступаетъ мѣсто песчаникамъ желтаго и бѣлаго цвѣта. Песчаники эти рѣзко отличаются отъ Иркутскихъ. Именно они состоятъ <sup>2)</sup> изъ мелкихъ и совершенно обточенныхъ зеренъ, преимущественно сѣроватаго, почти безцвѣтнаго кварца съ матовою поверхностью, слѣпленныхъ очень плотно бѣлымъ глинистымъ цементомъ, окружающимъ почти каждое зерно и отдѣляющимъ его отъ сосѣдняго. Попадаются въ породѣ, хотя и рѣдко, зерна красноватаго цвѣта (роговикъ и сердоликъ); отъ разрушенія этого песчаника образуется бѣлый песокъ, устилающій дорогу. Песчаникъ этотъ возможно сравнить лишь съ песчаникомъ верхняго яруса (5-го у Чекановскаго) иркутской угленосной формаціи, обнаженной въ Капсальскихъ горахъ <sup>3)</sup> и такъ

<sup>1)</sup> Иностранцевъ, Геологія. Т. II, 1887 г., стр. 290—291.

<sup>2)</sup> Чекановскій, Зап. Сиб. Отд. И. Р. Геогр. Общ. Т. XI, стр. 186.

<sup>3)</sup> Чекановскій, l. c. pag. 196.

называемой Точильной горѣ около Ользоновской станціи Якутскаго тракта. Однако и отъ этихъ песчаниковъ онъ отличается обточенностью зеренъ и отсутствіемъ слюды.

Далѣе на 14-ой верстѣ отъ Уковской ст. Черскій замѣчалъ по дорогѣ бѣлые плитки рухляка и рухляковистаго известняка, но коренныхъ обнаженій этихъ породъ ему вовсе не удалось видѣть. На спускѣ въ самую долину рч. Камышетки, лѣваго притока рѣки Топорокъ, замѣчается краснаго цвѣта наносъ, который наблюдается и за станціей на 2-й и 10-й верстахъ тракта, придерживающагося въ данномъ мѣстѣ лѣваго берега р. Топорокъ.

На второй и десятой верстахъ Черскій встрѣтилъ также куски известковистаго песчаника, который ему въ первую поѣздку показался не уковскимъ. Во вторую же поѣздку Черскій вполне убѣдился въ своемъ предположеніи. Песчаникъ этотъ представляетъ лишь нѣсколько измѣненную разновидность того, который ему удалось видѣть затѣмъ въ естественномъ разрѣзѣ. Именно на той же 10-й верстѣ въ сторонѣ отъ тракта, въ разрѣзѣ, изъ котораго добываютъ дрсву для исправленія дороги, онъ видѣлъ горизонтальные слои желтовато-бѣлаго и бѣлаго, почти рухлаго песчаника и глинисто-песчанаго сланца, богатаго слюдой, съ красными полосками и пятнами, а также съ пропластками красной сланцеватой глины, продукты разрушенія которой и придаютъ наносу красноватый оттѣнокъ <sup>1)</sup>. Порода эта очевидно относится къ красноцвѣтнымъ девонскимъ пластамъ.

Далѣе у ст. Замзорской (1042' н. ок. <sup>2)</sup>), расположенной въ устьѣ р. Замзора, лѣваго притока Топорка, наносъ принимаетъ снова желтый цвѣтъ, обличающій и другой характеръ коренной породы. Дѣйствительно, во вторую поѣздку Черскому удалось убѣдиться, что добываемый крестьянами на фундаменты вверхъ по рч. Замзуръ песчаникъ совершенно похожъ на юрскій. Съ этого же мѣста крестьяне привозятъ для своихъ бань «огнеупорные камни», которые оказались при ближайшемъ осмотрѣ діабазомъ, ничѣмъ не отличающимся отъ уковскаго. Нахождение въ данной мѣстности юрскихъ песчаниковъ заставляетъ предположить Черскаго, не разнѣ ли въ сосѣднихъ съ трактомъ возвышенностяхъ юрскіе осадки? Потому на геологической картѣ упомянутаго путешественника все

<sup>1)</sup> Черскій, Зап. I. с. pag. 21.

<sup>2)</sup> Цифры высотъ станцій соотвѣтствуютъ нанесеннымъ на 40-верстную карту Имп. Погран. Пол. Ав. Росс.

пространство до слѣдующей Алзамайской станціи предположительно закрашено цвѣтомъ юрской формаціи. Отсюда, въ сторонѣ отъ тракта, быть можетъ, юрскіе слои переходятъ и на р. Бирюсу (см. ниже).

Отъ Алзамайской ст. <sup>1)</sup> (1030' н. ок.), гдѣ трактъ мѣняетъ свое с.-с.-з-ое направленіе на с.-з-ое, и до Баероновской (1051' н. ок.) мѣстность опять повышается; однако ея высшіе пункты не достигаютъ высотъ уковской возвышенности и едва только приближаются къ гипсометрической высотѣ Тулуновской станціи. Возвышенности эта изрыта долинами рѣчекъ, изъ которыхъ самыя глубокія Никольская, Моховая и наконецъ Баероновская. Всѣ эти рѣчки слѣва впадаютъ въ долину Топорка. На всемъ указанномъ пространствѣ обнажаются уже девонскія породы. На спускѣ къ Никольской долинѣ попадаются куски того же бѣлаго песчаника, который встрѣченъ Черскимъ между Уковской и Камышетской станціями и отнесенъ былъ къ девонской системѣ. Въ песчаникѣ замѣтны иногда сростки зеленовато-бѣлой глины, приче́мъ въ самой долинѣ наносъ принимаетъ красный оттѣнокъ, что позволяетъ думать, что гдѣ-либо здѣсь въ породѣ проходятъ красноцвѣтные прослойки. Между тѣмъ на подъемѣ къ Никольскому селу имѣется обнаженіе сѣровато бѣлаго и желтоватаго песку съ охристыми и шоколаднаго цвѣта пропластками, тонкіе слои котораго представляются изогнутыми и извилистыми. Пески эти натиоминаютъ собою рыхлыя части песчаника нижняго яруса иркутской угленосной формаціи и отчасти покрыты красноватымъ наносомъ <sup>2)</sup>. На 12 верстѣ отъ Алзамайской станціи, на перевалѣ изъ Никольской долины въ Моховую, замѣтны глыбы бѣлаго известковистаго песчаника съ красными сердоликовидными прожилками и гнѣздами. Подобныя же глыбы встрѣчаются и на высшихъ пунктахъ за Разгонною станціей (1271' н. ок.). На десятой верстѣ отъ нея попадаютъ также глыбы сѣраго известняка съ подобными вышеописаннымъ образваніями краснаго аморфнаго кварца. Обѣ эти породы встрѣчаются въ видѣ глыбъ и на спускѣ съ горы къ Баероновской станціи. При этомъ необходимо замѣтить, что песчаникъ, вскипающій отъ кислоты, вполне сходенъ съ уковскимъ, обнаруживаетъ въ составѣ ту же примѣсь черныхъ и красныхъ зернышекъ, но отличается лишь присутствіемъ сердоликовидныхъ прожилковъ. Выѣстъ

<sup>1)</sup> Между Алзамайской и Баероновской станціями находится еще Алашеская (1059' н. ок.), расположенная на лѣвомъ берегу долины рѣки Топорка.

<sup>2)</sup> Черскій, Изв. I. с. pag. 93.

указанными песчаниками тутъ же попадаются въ видѣ глыбъ весьма оригинальный краснобурый кварцитъ съ лоснящеюся поверхностью излома. Кварцитъ этотъ очевидно произошелъ изъ оппавшаго выше песчаника отъ замѣщенія известковаго цемента аморфною кремне-кислотою. Въ породѣ этой замѣчается даже примѣсь рыхлыхъ зернышекъ, свойственныхъ бѣлому песчанику. Гофманъ не свиваетъ въ этомъ мѣстѣ обнаженіе всѣхъ этихъ породъ, но въ иное время тутъ нѣтъ и намека о такомъ.

Между Баероновскою станціею и послѣднею въ предѣлахъ Иркутской губ. Бирюсинской (799' н. ок.), расположенной на правомъ берегу р. Бирюсы, притока Енисея справа, все пространство, играющее роль высшей террасовидной площади праваго берега долины р. Бирюсы, покрыто суглинистымъ наносомъ, изъ подъ котораго нигде не выступаетъ коренная порода. Въ одномъ мѣстѣ, именно на склонѣ къ долинѣ рч. Тайшетъ, нѣсколько въ сторонѣ отъ устья р. Бирюсы, Черскій видѣлъ наносъ съ галькой до 3 дециметровъ въ диаметръ <sup>1)</sup>.

Приѣхавъ въ Бирюсинскую станцію съ цѣлью осмотра и обследования мѣстонахожденія, какъ доносились слухи, цѣлаго скелета мамонта, Черскій тогчасъ же убѣдился въ несправедливости слуховъ. Найденный въ деревни Кульшетъ, расположенной въ 12-ти верстахъ отъ почтовой станціи, бивень оказался единственнымъ остаткомъ этого животнаго и тотъ не достался путешественнику, такъ какъ уже раньше проданъ одному изъ проѣзжихъ. Воспользовавшись пребываніемъ на Бирюсинской станціи, Черскій совершилъ большую экскурсію вверхъ по р. Бирюсѣ. Описанію наблюденій, сдѣланныхъ Черскимъ въ эту экскурсію, мы и посвящаемъ заключительныя строки настоящаго примѣчанія.

На противоположномъ берегу р. Бирюсы, противъ Бирюсинской станціи, нѣсколько ниже находящихся тамъ деревень Конторной и Лавинской, замѣчаются утесы, осмотрѣнные еще въ 1893 году Гофманомъ. Послѣднимъ найденъ былъ здѣсь желтоватый песчаникъ съ сердоликоподобными прожилками и съ присутствіемъ известняка красноватаго цвѣта, содержащаго многочисленные мелкія зерна кварца. Порода эту Гофманъ причисляетъ къ одному уровню съ качинскими около г. Красноярска. По описанію Черскаго <sup>2)</sup> песчаникъ этотъ является цементованнымъ

<sup>1)</sup> Черскій, Изв. I. с. pag. 93.

<sup>2)</sup> Черскій, Изв. I. с. pag. 94.



углекислою известью въ смѣси съ глиною и является то рухляковымъ, то известковымъ, содержащимъ мѣстами даже друзы известковаго шпата, то, наконецъ, скорѣй представляетъ собой песчанистый известнякъ, служащій мѣстнымъ жителямъ для обжига нѣа известки. Кварцевыя зернышки этого песчаника въ нѣкоторыхъ пропласткахъ также совершенно обточены, какъ это можно наблюдать въ бѣломъ глинистомъ и не вскипающемъ отъ кислоты песчаникѣ, описанномъ Черскимъ на спускѣ съ Уковской горы (см. выше). Поэтому образцы того и другаго, несмотря на различіе въ цементѣ, весьма сходны между собой. Далѣе, на правомъ берегу безымяннаго ключика, промыслагавшаго себѣ узкую, но вообще поросшую травой долину въ этомъ утесѣ, наблюдается залеганіе этого песчаника на красномъ рухлякѣ, тонкіе и горизонтальныя слои котораго перемежаются съ рухляковыми же прослойками желтовато-бѣлаго цвѣта. Какому стратиграфическому уровню принадлежатъ эти породы, на этотъ вопросъ Черскій могъ дать лишь нѣсколько общихъ соображеній, такъ какъ по крайнему недовѣрью оцѣнокъ на пути отъ Уковской станицы до Бирюсы, слѣдовало бы для рѣшенія этого вопроса прослѣдить строеніе береговъ рѣки Топорокъ отъ ея верховьевъ и до устья въ Бирюсу или же изучить теченія Уды ниже Нижнеудинска.

Итакъ красный рухлякъ, залегающій въ Лавинскомъ утесѣ подъ песчаникомъ, петрографически сходенъ лишь съ балаганскими породами, а никакъ не съ красными сланцами ниспаго стратиграфическаго уровня, которые наблюдалъ Черскій въ Нижнеудинскомъ хребтѣ. Его горизонтальныя пласты гипсометрически располагаются ниже песчаника на рч. Каменной (см. выше) и это замѣчается какъ здѣсь, такъ и въ тѣхъ мѣстахъ Камышетско-Алзайской долины, гдѣ на присутствіе его указываютъ распросныя свѣдѣнія и красный цвѣтъ наноса. Итакъ этотъ рухлякъ, залегающій такимъ образомъ и ниже Иркутской угленосной толщи, встрѣчающейся на пути къ Нижнеудинску, есть продолженіе балаганско-красноцвѣтной формации девонскаго возраста. Что же касается вышеописаннаго лавинскаго песчаника, причисленнаго къ балаганской формации лишь вслѣдствіе присутствія въ немъ сердоковъ прожилковъ, въ остальныхъ же отношеніяхъ сильно отличающагося отъ красноцвѣтныхъ породъ, то, по мнѣнію Черскаго, вопросъ о его возрастѣ долженъ остаться пока нерѣшеннымъ, хотя, по наблюденіямъ Гофмана, песчаникъ этотъ, встрѣченный однако же только въ видѣ глыбъ на Баероновской горѣ, покрываетъ

нется тамъ сѣрымъ известнякомъ, похожимъ на качинскій, при-  
рывающій и тамъ красные песчаники съ полосками бѣлаго мер-  
меля и красныя песчанистыя глины, покрытыя и перемежающіяся  
съ сѣрымъ известнякомъ, содержащимъ роговникъ и красныя сер-  
дошкородные прожилки, именуемые качинскими пластами и при-  
нимаемые Черскимъ за эквивалентъ балаганскихъ красныхъ по-  
родъ. Связь лавинскаго песчаника съ вышеописаннымъ бѣлымъ  
глинистымъ, найденнымъ на спускѣ съ Уковской горы и около с.  
Никольскаго, за неимѣніемъ достаточнаго количества обнаженій,  
остается неопредѣленной. Также неопредѣленнымъ остается отно-  
шеніе его къ песчанику рч. Каменной, который литологически  
трудно отличить отъ иркутскаго угленоснаго, тѣмъ болѣе, что  
характеристика, данная ему Гофманомъ <sup>1)</sup> (зеленовато-сѣрый и  
тяжело-слоистый) относится по Черскому къ болѣе рѣдкимъ его осо-  
бенностямъ, между тѣмъ какъ большей частью онъ ничѣмъ не  
отличается отъ иркутскаго. Наконецъ, вслѣдствіе осыпаннаго со-  
стоянія подножія Лавинскаго утеса какъ выше, такъ и ниже обна-  
женія по рѣкѣ, нѣтъ возможности выяснить вопроса: не отложился  
и лавинскій песчаникъ на остаткахъ отъ размыва рухляка, ко-  
торый, быть можетъ, и является въ видѣ обнаженія на вышеупо-  
мянутомъ ключикѣ. Принимая во вниманіе, что и верхній ярусъ  
(Чекановскаго) иркутской буроугольной формаци, сложенный  
изъ бѣлыхъ и желтоватыхъ глинистыхъ песчаниковъ, быть можетъ,  
представляетъ самостоятельное, а слѣдовательно менѣе древнее отло-  
женіе, какъ это предположено было самимъ Чекановскимъ <sup>2)</sup>, то и  
въ данномъ случаѣ нельзя безъ палеонтологическаго матеріала  
рѣшить вопроса о возрастѣ лавинскаго песчаника <sup>3)</sup>.

Осмотрѣвъ Лавинскій утесъ, Черскій отправился вверхъ по  
рѣкѣ къ заимкѣ Кочергина, отстоящей отъ почтоваго тракта  
на 30 верстахъ. По дорогѣ Черскій спустился еще разъ въ до-  
лину Бирюсы у протоки, носящей названіе Карагасихи (ниже  
перевала, который образуетъ Бирюса на западъ). Въ высококомъ  
мѣстѣ обнажался почти до самаго уровня рѣки желтый глинистый  
песчаникъ отъ мелко-до среднезернистаго сложенія. Иногда въ

<sup>1)</sup> Гофманъ, Beitr. z. Kenntniss d. Russ. Reiches v. Bär u. Helmersen. Bd. III, p. 43.

<sup>2)</sup> Чекановскій, Изв. Сиб. Огд. И. Р. Георг. Общ. Т. II, № 5, стр. 19, примечаніе.

<sup>3)</sup> Черскій, Изв. I. с. pag. 95.

немъ встрѣчаются глинистые сростки желто-бѣлаго цвѣта и мелкія скопленія между зернами кварца бѣловатой глины, что замѣчается иногда и на иркутскихъ песчаникахъ, съ которыми онъ всею болѣе сходенъ. Верхніе его слои утончаются и принимаютъ буро-желтый цвѣтъ, а еще выше изъ подъ растительнаго слоя видна округленная галька, принадлежащая, какъ будетъ указано ниже, разрыленному конгломерату. Слои песчаника повидимому горизонтальны. Тутъ же, нѣсколько выше по Карагасихѣ, Черскій нашелъ на берегу нѣсколько неокругленныхъ кусковъ желтаго песчаника съ прослойками и пятнами краснаго цвѣта, а также заключающихъ сростки и желваки зеленовато-желтаго и краснаго цвѣта. Къ тому же песчанику этотъ, въ противоположность обнаженному здѣсь коренному, содержитъ разсыянные зерна и прожилки известковаго шпата и вскипаетъ отъ кислоты. Эта порода по всѣмъ признакамъ имѣетъ сходство съ пропластками и слоями, встрѣчающимися въ верхнемъ ярусѣ балаганскихъ красныхъ породъ напр. въ обнаженіяхъ Хашегайскихъ горъ по Унгѣ и въ Усть-Талькинской горѣ по Ангарту, нѣсколько ниже устья Унги <sup>1)</sup>, только съ той разницей, что образующая сростки глина является здѣсь болѣе грубою, а не въ видѣ тончайшаго ила. Будущимъ изслѣдователямъ теченія р. Бирюсы необходимо будетъ принять во вниманіе эту находку Черскаго, постараться найти выходъ этой породы въ данной мѣстности и выяснитъ условія ея залеганія.

Подобный описанному въ обнаженіи у Карагасихи песчаникъ встрѣчается и на высшихъ пунктахъ перевала съ Карагасихи и занимаетъ Кочергина, причѣмъ появляются также и плиты конгломерата преимущественно съ кварцитою галькой <sup>2)</sup>, а на спускѣ въ долину Бирюсы выступаетъ оливиновый діабазъ. Известная порода залегаетъ нѣсколько ниже на томъ же горизонтальномъ песчаникѣ, и площадь ея распространенія велика, такъ какъ, если смотрѣть съ праваго берега, наспротивъ заимки Кочергина, вверхъ по рѣкѣ, береговые уступы являются въ верхней части отвѣсныя (діабазъ), въ нижней пологіе (песчаники), какъ это наблюдается и около Нижнеудинска. При этомъ нужно замѣтить, что, такъ какъ вся мѣстность, прилегающая къ Бирюсѣ вообще плоская и ровная, то по всей вѣроятности покровъ оливиноваго діабазы не подвергался здѣсь размыву.

<sup>1)</sup> Теченія Ангарты и Унга разсмотрѣны въ слѣдующемъ выпускѣ дополненія.

<sup>2)</sup> Кварцитъ очень мелко-зернистый и сѣраго цвѣта.

**Приѣчаніе 6-е. Статистическо-экономическій обзоръ сельскаго населенія въ Нижнеудинскомъ округѣ, обитающаго вдоль Волыаго Сибирскаго тракта. Волости: Алзамайская, Тулуновская, Куйтунская и Кинильтейская и инородческое вѣдомство: Нижнеудинская землица. Городъ Нижнеудинскъ.**

Сельское населеніе Нижнеудинскаго округа состоитъ изъ 6 волостей и одного инородческаго вѣдомства. Двѣ изъ этихъ волостей Братская и Больше-Намырская расположены по р. Ангартъ и нижней части р. Оки и притока ея Ии и будутъ разсмотрѣны нами во второй части этого сочиненія, всѣ же остальные на Большомъ Сибирскомъ трактѣ и пересѣкающихъ его рѣкахъ Бирюсѣ, Удѣ, Иѣ и Окѣ. Эти то четыре волости и инородческая Нижнеудинская землица составляютъ предметъ нашего разсмотрѣнія въ этомъ приѣчаніи.

Земли Алзамайской волости вытянуты узкими полосами вдоль Сибирскаго тракта между границею Енисейской губерніи и Нижнеудинскимъ округомъ, а также вдоль теченія р. Уды, а отчасти и Бирюсы. Крестьянамъ Алзамайской волости отмежеваны межевыхъ дачъ, занимающихъ пространство болѣе 170.000 дес., изъ коихъ 73% состоитъ подъ лѣсомъ.

Алзамайская волость содержитъ въ себѣ 8 сельскихъ обществъ и 23 селеній <sup>1)</sup>. Первое изъ этихъ обществъ Бирюсинское состоитъ изъ с. Бирюсы и дер. Сполишинской. Село Бирюса расположено на прав. берегу р. Бирюсы, на Большомъ Сибирскомъ трактѣ, въ томъ мѣстѣ, гдѣ онъ, перейдя черезъ рѣку, вступаетъ въ предѣлы Иркутской губерніи. Разстояніе Бирюсы отъ Нижнеудинска 156 вер., отъ Алзамайскаго волостнаго правленія 64 вер. Село состоитъ изъ 180 дворовъ, до 250 жилыхъ строеній, имѣетъ церковь, школу съ 47 учащимися, 38 питейныхъ заведеній, 2 лавокъ, 4 кузницы. Жителей въ селеніи 1.064 об. п. (558 м. п.). Другое селеніе общества Сполишинское есть не болѣе какъ деревня, заключающая въ себѣ нынѣ только 2 двора и располо-

<sup>1)</sup> О землевладѣніи въ Алзамайской вол. см. Смирновъ, въ Матеріалахъ къ изслѣд. землепольз. и хоз. быта сельск. нас. Иркутск. г. Т. II, вып. 3-й, стр. 74, 75; о селеніяхъ см. Т. I Списокъ нас. мѣстъ и пр., стр. 23; остальные архивенныя свѣдѣнія Т. I табл. Нижнеуд. окр., стр. 42—81.

женная на р. Бирюсъ, верстахъ въ 7 выше села. Занима эта основана еще въ прошломъ столѣтіи и имѣла до 15 дворовъ, но нынѣ опустѣла вслѣдствіе ухудшившагося проѣзда къ ней. Бирюсинское сельское общество состоитъ изъ 220 дворовъ, размѣщающихся въ 276 жилыхъ строеніяхъ. Жителей въ обществѣ 1.075 об. п. (изъ нихъ 565 м. п.), въ томъ числѣ: постороннихъ 130 (76 м. п.) ссыльно-поселенцевъ 103 (57 м. п.), новоселовъ 110 (62 м. п.) остальные старожилы. Изъ крестьянъ общества въ рабочемъ возрастѣ 482 (243 м. п.). Въ непосредственномъ пользованіи 20 хозяйствъ Бирюсинскаго общества состоитъ болѣе 5.800 дес. земли въ томъ числѣ пахатной болѣе 2.000 дес. Скота крестьяне содержатъ: лошадей 960 (рабочихъ 800), крупнаго рогатаго скота 59 головъ, мелкаго скота 430 головъ.

Второе общество Баероновское состоитъ изъ селъ Баероновскаго, трехъ деревень (Старый и Новый Акульшетъ и Борисово), выселка Разгоннаго и Шелеховой заимки. Село Баероновское расположено на Большомъ Сибирскомъ трактѣ въ 20 вер. ближе села Бирюсы къ окружному городу и волостному селенію при рч. Баеронъ, прав. притокъ Бирюсы. Въ с. Баероновскомъ 136 хозяйствъ, 645 жителей (302 м. п.), церковь, 4 питейныя заведенія, 5 лавокъ, 1 мельница, 8 кузницъ. Новый Акульшетъ въ 3 отъ Баероновки, при пересѣченіи Большаго Сибирскаго тракта рѣчкой Акульшетъ, имѣетъ 86 хозяйствъ и 350 жителей. Старый Акульшетъ расположенъ на р. Бирюсъ въ 12 вер. отъ Бирюсы, при впаденіи въ нее рч. Акульшетъ и имѣетъ 30 хозяйствъ и 150 жителей. Деревня эта была прежде гораздо болѣе значительною, но нынѣ представляется полуразрушенною и запустѣлою вслѣдствіе плохаго качества полей и ограниченности полей. Послѣ возникновенія дер. Лавинской на лѣвомъ берегу Бирюсы (въ Каинскомъ окр.), гдѣ жители Ст. Акульшета имѣли захватныя пашни и покосы. Упадку Ст. Акульшета также много способствовали береговые размывы <sup>1)</sup>. Дер. Борисова, еще нынѣ на Бирюсъ, возникла вслѣдствіе выселенія сюда многихъ жителей изъ Ст. Акульшета, имѣетъ нынѣ уже 30 хозяйствъ и 150 жителей и несравненно лучшіе пашни и покосы чѣмъ въ Ст. Акульшетѣ. Выселокъ Разгонный есть станція Большаго Сибирскаго тракта, находящаяся верстъ на 25 ближе Баероновскаго къ окружному городу и волостному селенію; онъ состоитъ изъ 1

<sup>1)</sup> Астиревъ, Матер. 1. с. Т. II, вып. 2-й, стр. 43.

хозяйствъ и имѣть 115 жителей. Наконецъ, займа Шелеховская съ 10 хозяйствами и 60 жителями расположена въ 36 вер. отъ Баероновскаго, внѣ предѣловъ земель, отведенныхъ сельскому обществу, посреди государственныхъ пустопорожныхъ земель. Въ Баероновскомъ сельскомъ обществѣ 310 дворовъ, 350 жилищъ строеній, до 1.460 д. об. п. (744 м. п.), въ томъ числѣ постороннихъ 60 (24 м. п.), ссыльно-поселенцевъ 114 (57 м. п.), новоселовъ 120 (72 м. п.), остальные старожилы. Изъ крестьянъ общества въ рабочемъ возрастѣ 676 (340 м. п.). Въ непосредствѣннѣ владѣніи 300 хозяйствъ общества, кромѣ дѣсовъ, болѣе 6.000 д., въ томъ числѣ пахатной 3.530. Скота крестьяне содержатъ: лошадей 1.240 (1.010 рабочихъ), крупнаго рогатаго скота 765, мелкаго скота 740.

По отношенію къ пользованію землею Бирюсинское и Баероновское общества составляютъ одну юридическую общину. У Бирюси и Баероновки, у Старога и Новаго Акулышетовъ пашни и выгоны черезполосны; у прочихъ селеній покосы и выгоны отдѣльны. Шелехова займа имѣетъ совершенно отдѣльное отъ всѣхъ селеній пользованіе въ пустопорожныхъ земляхъ, такъ-что пашни лежатъ даже въ предѣлахъ Енисейской губерніи. Покосы этой земли такъ обширны и свободны, что каждый косить гдѣ только захочетъ: «всѣмъ хватаетъ и даже баероновскіе пріѣзжаютъ сюда косить». При этихъ условіяхъ о передѣлахъ покосовъ не можетъ быть и рѣчи.

Третье сельское общество Алзамайское состоитъ изъ села Алзамайскаго и Никольскаго и займа Костаной. Алзамайское расположено на Большомъ Сибирскомъ трактѣ въ 92 вер. отъ Кеудинска на рч. Алзамай, притока р. Топопокъ, прав. притока Бирюсы. Село состоитъ изъ 140 дворовъ, имѣетъ 610 жит. (315 м. п.), церковь, школу съ 37 учащимися, 3 питьевыхъ заведенія, лавка, 2 водяныя мельницы, 4 кузницы. Никольское расположено также на Большомъ Сибирскомъ трактѣ, въ 8 вер. отъ Алзамайскаго далѣе чѣмъ волостное селеніе отъ окружнаго города, на рч. Никольской, также какъ и Алзамай впадающей въ Топопокъ. Въ селеніи 36 дворовъ, 190 жителей, церковь, лавка. Займа Костаной расположена въ 70 вер. отъ Алзамайскаго, по р. Удѣ, состоитъ изъ 16 дворовъ и имѣетъ 100 жителей. Все Алзамайское общество заключаетъ въ себѣ 200 дв., 212 жилищъ строеній и 920 ж. (500 муж. п.), изъ коихъ постороннихъ обществу 80 (41 м. п.), ссыльно-поселенцевъ 62 (36 м. п.), новоселовъ 158 (76 м. п.). Въ

рабочемъ возрастѣ 420 (196 м. п.). 180 хозяйствъ общества владѣютъ непосредственно болѣе чѣмъ 4.000 дес. земли (изъ коихъ болѣе 2 тыс. дес. пашни). Скота крестьяне общества содержатъ 590 лошадей (500 рабочихъ), 420 крупнаго рогатаго скота и 400 мелкаго скота.

Четвертое общество Алгашедское состоитъ изъ деревень Алгашедской, Замзорской и выселка Камышедскаго. Всѣ три селенія находятся на Большомъ Сибирскомъ трактѣ. Алгашедъ на рѣчкѣ того же имени, впадающей въ р. Топорокъ на 25 вер. ближе Алзамайской къ Нижнеудинску, состоитъ изъ 60 хозяйствъ и 240 д. об. п. Дер. Замзоръ, при впаденіи рѣчки того же имени въ Топорокъ на 31 вер. отъ Алзамайской, состоитъ изъ 31 хозяйства и 180 жит. Выселокъ Камышедъ, на рѣчкѣ того же имени, въ 49 вер. отъ Алзамайской, состоитъ изъ 20 хозяйствъ и 80 жителей. Во всемъ же обществѣ 86 дворовъ, 98 жилыхъ строеній, болѣе 500 д. об. п. (262 м. п.). Изъ нихъ постороннихъ обществу 84 (45 м. п.), ссыльно-поселенцевъ 40 (22 м. п.), новоселовъ 94 (54 м. п.). Въ рабочемъ возрастѣ 210 (107 м. п.). 96 хозяйствъ общества имѣютъ въ непосредственномъ владѣніи своемъ 1.350 дес. земли (въ томъ числѣ 370 дес. пахатной). Скота крестьяне содержатъ: 200 лошадей (194 рабочихъ), 220 головъ крупнаго рогатаго и 110 головъ мелкаго скота. Общества Алзамайское и Алгашедское пользуются землями въ одной межевой дачѣ и только заимка Костина имѣетъ весь свой надѣлъ въ дачѣ въ р. Удѣ, отведенной слѣдующему сельскому обществу Мироновскому. Пашни, покосы и выгоны у каждаго селенія обоихъ обществъ отдѣльныя.

Пятое сельское общество, Мироновское, состоитъ изъ села Миронова, деревень Пятаевской, Баянды, Баэрской и еще заимокъ. Всѣ эти селенія расположены по р. Удѣ. Селеніе Мироново въ 120 вер. отъ Алзамайскаго и 170 отъ Нижнеудинска на прав. берегу Уды, состоитъ только изъ 26 хозяйствъ и 10 жителей. Остальные селенія, расположенныя по р. Удѣ верстахъ отъ 12 до 20 отъ Миронова, еще менѣе значительны: Пятаевская на прав. берегу Уды имѣетъ 13 хозяйствъ и 54 д. об. п., Баянда на лѣв. берегу Уды, 5 хозяйствъ и 32 д. об. п., Баэрская также на лѣв. берегу Уды, 17 хозяйствъ и 76 д. об. п., а три заимки менѣе 5 хозяйствъ каждая. Во всемъ сельскомъ обществѣ 65 дворовъ, 66 жилыхъ строеній и 240 д. об. п. (126 м. п.), въ томъ числѣ постороннихъ сельскому обществу 23 (10 м. п.), ссыльно

поселенцевъ 22 (15 м. п.), новоселовъ 13 (6 м. п.), остальные старожили. Въ числѣ крестьянъ въ рабочемъ возрастѣ 130 (65 м. п.); 61 хозяйство общества имѣетъ въ непосредственномъ владѣніи своемъ 1.950 дес. земли (въ томъ числѣ 554 пахатной). Скота крестьяне общества содержатъ 250 лошадей (153 рабочихъ), крупнаго рогатаго 200, а мелкаго скота до 350 головъ. Мироновское общество владѣетъ землями въ особой межевой дачѣ на р. Удѣ, сообща съ заимкой Костиной Алзайскаго общества. Черезъ колосія пахатныхъ земель и покосовъ существуетъ только у селеній Миронова и Баянды, остальные селенія владѣютъ въ межевой дачѣ пашнями и покосами отдѣльно. Только у деревни Питавской, кромѣ отдѣльныхъ покосовъ, есть еще покосы общаго «вольнаго владѣнія» съ заимкой Костиной, въ «среднемъ лугу» на островѣ р. Уды.

Шестое сельское общество Уксское, состоитъ изъ села Укскаго, заимки Бадархонской и деревни Марской. Село Уксское или Уковское расположено на р. Укѣ, притокѣ Уды, на Большомъ Сибирскомъ трактѣ, въ 26 верстахъ отъ Нижнеудинска. Оно состоитъ кромѣ заимокъ изъ 124 дворовъ и 786 жит. (390 м. п.), имѣетъ церковь, церковно-приходскую школу съ 15 учащимися, 3 питейн. заведеніе, 4 лавки и 5 кузницъ. Дер. Марская расположена на р. Марѣ, притокѣ Уды, также на Большомъ Сибирскомъ трактѣ, въ 18 верстахъ отъ города. Она состоитъ кромѣ заимокъ изъ 48 дворовъ и 280 жителей (134 м. п.), имѣетъ 1 школу. Заимка Бадархонская расположена на р. Удѣ. Въ Уксскомъ сельскомъ обществѣ 275 дворовъ, 256 жилыхъ строеній и 1.110 жит. об. п. (545 м. п.), въ томъ числѣ постороннихъ сельскому обществу 100 (48 м. п.), ссыльно-поселенцевъ 34 (18 м. п.), новоселовъ 52 (27 м. п.), остальные старожили. Въ рабочемъ возрастѣ 520 (260 м. п.); 210 хозяйствъ общества владѣютъ непосредственно 4.450 десятинами земли (въ томъ числѣ 2.430 пахатной). Скота крестьяне общества содержатъ: 760 лошадей (700 рабочихъ), 470 крупнаго рогатаго и 850 головъ мелкаго скота. Уковское общество владѣетъ особой межевой дачей, пересекаемой рѣками Укухъ, Марою и Удою. Пашни у Ука и Мары череполосны, но выгонами и покосами оба селенія пользуются особо.

Седьмое общество, Усть-Рубахинское, состоитъ изъ села Усть-Рубахина и деревень Верхне- и Нижне-Абалакской. Усть-Рубахино расположено въ сторонѣ отъ Большаго Сибир-



сваго тракта, въ 7 вер. къ югу отъ Нижнеудинска, при впаденіи рѣчки Рубахиной въ Уду. Оно состоитъ изъ 109 хозяйствъ и 480 д. об. п. (228 м. п.). Деревни Верхне- и Нижне-Абалакскія находятся въ 12 и 13 вер. далѣе (въ 19 и 20 вер. отъ окр. города), первая на ключѣ, вторая на лѣв. бер. Уды. Первая состоитъ изъ 54 хозяйствъ и 207 жит. (112 м. п.), вторая изъ 12 хозяйствъ и 50 жит. (28 м. п.). Въ Усть-Рубахинскомъ обществѣ 174 двора, 170 жилыхъ строеній, 715 жит. об. п. (368 м. п.), въ томъ числѣ постороннихъ 70 (32 м. п.), ссыльно-поселенцевъ 190 (103 м. п.), новоселовъ 133 (70 м. п.), остальные старожилы. Лицъ въ рабочемъ возрастѣ 235 (170 м. п.); 140 хозяйствъ общества владѣютъ непосредственно 2.530 десятинами земли (въ томъ числѣ 1.100 пахатной). Скота крестьяне общества держатъ: 440 лошадей (350 рабочихъ), 190 крупнаго рогатаго скота и 430 головъ мелкаго скота. Общество владѣетъ особой межевой дачей, начинающейся верстахъ въ 7 къ югу отъ окружнаго города и прилегающей къ р. Удѣ. Пашни селеній общества череполосны, но покосы и выгоны у нихъ отдѣльные.

Восьмое общество волости, Шипицынское, состоитъ изъ 4 деревень: Шипицынской, Зайцевской, Бадарановской и Ухарской. Шипицынская дер. находится въ 40 вер. къ с.-в. отъ Нижнеудинска на лѣв. берегу Уды и состоитъ изъ 46 хозяйствъ и 194 жителей (98 м. п.). Дер. Зайцевская, 20 вер. ниже по Удѣ, имѣетъ 14 хозяйствъ и 58 жителей. Дер. Бадарановская, въ 8 верстахъ выше Шипицынской по р. Удѣ на прав. ея берегу, имѣетъ 13 хозяйствъ и 66 жителей. Дер. Ухарская, еще 12 вер. выше на пр. берегу Уды, уже только въ 20 вер. отъ Нижнеудинска, имѣетъ 32 хозяйства и до 140 жителей. Каждое изъ 4 селеній образуетъ особую юридическую общину и каждое изъ этихъ селеній всѣми угодьями, кромѣ лѣса, пользуется особо. Во всемъ обществѣ 98 дворовъ и 96 жилыхъ строеній, 460 жителей (231 м. п.). Изъ нихъ постороннихъ обществу 68 (31 м. п.), ссыльно-поселенцевъ 48 (27 м. п.), казаковъ 23 (11 м. п.), остальные крестьяне изъ казаковъ. Въ рабочемъ возрастѣ 184 (86 м. п.). 90 хозяйствъ общества имѣютъ въ непосредственномъ владѣніи своемъ 3.840 дес. земли (въ томъ числѣ 630 пахатной). Скота крестьяне содержатъ 350 лошадей (220 рабочихъ), 400 головъ крупнаго рогатаго скота и 560 мелкаго. Шипицынское сельское общество единственная мѣстность во всемъ Нижнеудинскомъ округѣ,

которой между мѣстнымъ населеніемъ (вдоль р. Уды) встрѣчаются юби <sup>1)</sup>.

Казакъ дер. Бадарановой Алзайской волости пользуются двумя особыми межевыми дачами, заключающими въ себѣ около 1.500 дес. земли.

Объ экономическомъ положеніи всей Алзайской волости имѣются слѣдующія свѣдѣнія. Въ волости всего 1.335 дворовъ, а жилыхъ построекъ 1.446. 25½% всѣхъ дворовъ волости размѣняется въ заимкахъ <sup>2)</sup>, что указываетъ на достаточное развитіе цѣпскаго хозяйства въ волости. Наличныхъ жителей въ волости 5.910 (3.010 м. п.), а съ постоянными здѣсь проживающими 6.520 (3.320 м. п.). Изъ числа коренныхъ жителей: казаконъ 45 (22 м. п.), ссыльно-поселенцевъ 666 (365 м. п.), новоселовъ 1.060 (560 м. п.), остальные старожилы. По развитію физическихъ недостатковъ Алзайская волость занимаетъ первое мѣсто въ Нижнеудинскомъ уѣздѣ. Въ волости есть сельское общество (Шапицынское см. выше), единственное въ уѣздѣ, въ которомъ развиты зобы. Параллельно съ этимъ идетъ развитіе между крестьянами и діотовъ (ихъ найдено въ волости 19). По числу слѣпыхъ (ихъ въ волости найдено 15 мужч. и 8 женщ.) Алзайская волость, вмѣстѣ съ Братскою, также занимаетъ первое мѣсто въ округѣ <sup>3)</sup>, такъ какъ пропорція слѣпыхъ распространяется до 5,7 на 1.000. Народонаселеніе волости со времени X-ой ревизіи въ 30 лѣтъ приросло на 29%, т. е. какъ разъ пропорцію живущихъ въ волости ссыльно-поселенцевъ и новоселовъ, такъ-что волость, несмотря на свое положеніе на Бѣломъ Сибирскомъ трактѣ и нѣкоторыя въ нее приселенія (новоселы и ссыльно-поселенцы составляютъ въ ней 29% ея населенія) имѣетъ наименьшій приростъ въ Нижнеудинскомъ округѣ. Слабость естественнаго прироста въ волости (котораго со временъ ревизіи 1858 г. совсѣмъ не было) подтверждается и сравнительно съ другими округами меньшею пропорціею подростковъ и дѣтей въ волости. Именно дѣти и подростки м. п. (менѣ 18 лѣтъ) въ Алзайской волости составляютъ 41% всего мужск. населенія, и такая пропорція встрѣчается только въ сѣверной, суровой по климату волости Балаганскаго округа, между тѣмъ какъ во всѣхъ остальныхъ трехъ южныхъ округовъ Иркутской губерніи эта пропор-

<sup>1)</sup> Астиревъ, Матер. I. с. Т. II, вып. 2-й, стр. 71.

<sup>2)</sup> Астиревъ, Матер. I. с. Т. II, вып. 2-й, стр. 139.

<sup>3)</sup> Астиревъ, Матер. I. с. Т. II, вып. 2-й, стр. 71, 74, 97.

ція значительно выше, а именно въ притрактовыхъ волостяхъ Иркутскаго округа 42,5%, въ сѣверныхъ частяхъ Иркутскаго округа, центральной части Балаганскаго, и всѣхъ остальныхъ волостяхъ Нижнеудинскаго округа пропорція эта отъ 43 до 44%, въ Смоленской волости 45%, южныхъ частяхъ Балаганскаго округа 46%, а въ Тункинской волости 48% <sup>1)</sup>. Въ числѣ жителей волости грамотныхъ, полуграмотныхъ и учащихся 277 мужчинъ и 24 женщины.

Хозяйствъ въ Алзамайской волости 1.290, лицъ въ рабочемъ возрастѣ 2.940 (1.470 м. п.). Въ числѣ хозяйствъ было: съ 1 работникомъ 870 (въ томъ числѣ въ 184 хозяйствахъ были еще и подростки), съ 2 работниками 204, съ 3 и болѣе 40. Въ 177 хозяйствахъ совсѣмъ не было взрослыхъ работниковъ, но въ 103 изъ нихъ были уже подростки (полуроботники). Удобныхъ земель въ непосредственномъ пользованіи крестьянъ и казаковъ волости (кромѣ лѣсовъ, составлявшихъ 74% всѣхъ земель отмежеванныхъ волости) было 30.500 дес., т. е. по 9 дес. на душу м. п., по 20 на работника, по 23 на хозяйство.

Пахатныхъ земель въ волости 12.560 дес., изъ нихъ засѣвается 52%, т. е. посѣвовъ приходится 2 дес. на душу м. п., 4½ дес. на взрослого работника, 5 дес. на хозяйство. На каждыя 100 дес. посѣва засѣвается рожью 54 дес. (50 озимю и 4 ярицею), овсомъ 37 дес., пшеницею 5 дес. По отношенію къ пропорціи посѣвовъ овса волость Алзамайская, вмѣстѣ съ Зиминскою Балаганскаго округа, занимаетъ первое мѣсто въ губерніи, что объясняется для Алзамайской волости, повидимому, климатическими и почвенными условіями, а для Зиминской развитіемъ извоза въ единственномъ крупномъ селеніи волости. По отношенію же къ пропорціи посѣвовъ пшеницы Алзамайская волость занимаетъ одно изъ послѣднихъ мѣстъ въ губерніи. Чистый сборъ хлѣбовъ составляетъ: рожь озимой 42 пуд. съ десятины, овса 57, пшеницы 36. Пропорціи лѣсныхъ росчистей къ пашнямъ въ Алзамайской волости наименьшая въ округѣ (7%), несмотря на богатство волостной территоріи еще дѣйственными лѣсами, что доказываетъ, что ростъ земледѣлія на территоріи волости встрѣчаетъ неодолимые пока препятствія въ недостаточной силѣ населенія волости вести борьбу съ непроизводительными имъ еще силами природы <sup>1)</sup>. Почва Алзамайской волости

<sup>1)</sup> Астыревъ, Матер. I. с. Т. II, вып. 2-й, стр. 112.

<sup>2)</sup> Козловъ, Матер. I. с. Т. II, вып. 4-й, стр. 7, 10, 54, 61, 78, 99.

ни, слишкомъ глинистая и болотистая, требуетъ усиленной затраты труда, а именно осушки болотъ и унавоживанья, а затраты эти недостаточно окупаются получаемыми урожаями, между прочимъ и потому, что почва истощается здѣсь скорѣе чѣмъ въ другихъ волостяхъ губерніи, о чемъ можно заключить изъ того, что наибольшая часть залежей оставлена жителями волостей по причинѣ истощенія почвы. Вслѣдствіе всѣхъ этихъ причинъ земледѣліе въ Алзайской волости идетъ менѣе успѣшно, чѣмъ въ другихъ волостяхъ южныхъ округовъ губерніи; хлѣба, производимаго волостью, недостаетъ обыкновенно на потребленіе ея жителей, и хлѣбные магазины волости представляются весьма опустошенными. Это обстоятельство и вызвало здѣсь усилія властей устроить въ волости общественныя запашки, которыя встрѣчали непреодолимое сопротивленіе со стороны населенія вездѣ, гдѣ онѣ предпринимались въ разныхъ частяхъ губерніи. Попыты введенія общественныхъ запашекъ, продолжающіеся понинѣ только въ двухъ волостяхъ губерніи (Алзайской и Тулуновской), не увѣнчались, впрочемъ, и здѣсь нѣкомъ. Во-первыхъ, общественныя запашки въ тѣхъ селеніяхъ волости, гдѣ онѣ еще существуютъ, ведутся на земляхъ, нарочно и того заарендованныхъ, такъ какъ при захватномъ способѣ пользованія землею не было возможности выдѣлать, никого не платя, участка земли къ одному мѣсту для общественной запашки. Вторыхъ, всѣ общественныя запашки производятся здѣсь наемнымъ трудомъ, такъ какъ веденіе работъ на запашкѣ обязательно трудомъ цѣлымъ міромъ крестьяне признаютъ для себя немыслимымъ, а крестьянскія власти невозможнымъ. Сѣмена брали въ хлѣбныхъ магазинахъ, и только при полной ихъ доброкачественности получались при такомъ способѣ организаціи общественныхъ запашекъ нѣкоторыя отъ нихъ, хотя далеко не блестящія, уроды <sup>1)</sup>).

Луговой (покосной) земли въ волости 16.600 дес.; по обилію, ширинѣ пространства покосовъ, которыхъ приходится на хозяйство по 13 десятинъ, Алзайская волость находится въ лучшихъ условіяхъ, но качество покосовъ не всегда удовлетворительно. Въ Бирюсинскомъ и Баероновскомъ обществахъ покосы, расположенные преимущественно по р. Бирюсѣ и на ея островахъ, часто затопляются и въ значительной степени болотисты, а слѣдовательно отчасти поросли осокою (*Carex*), волосцомъ (*Scirpus asi-*

<sup>1)</sup> Личковъ, Матер. I. с. Т. II, вып. 3-й, стр. 258.

cularis) и листовникомъ. Въ обществахъ Алзамайскомъ и Алташескомъ покосы, расположенные по р. Топорокъ, большею частью болотисты и даже кочковаты. Въ Уескомъ обществѣ тѣ покосы, которые расположены по р. Марѣ, болотисты, но покосы по р. Удѣ луговые и хорошіе. Въ обществѣ Усть-Рубахинскомъ большая часть покосовъ расположена по р. Рубахиной и они на  $\frac{1}{3}$  болотисты, но по тѣмъ, которые сухи, растутъ хорошіе травы: пирей, вязиль и листовникъ. Наконецъ въ Шипицынскомъ и Мироновскомъ обществахъ есть прекрасные покосы по р. Удѣ, поросшіе пыреемъ и вязилью, по обилію которыхъ болотистыя и осоковыя мѣста совсѣмъ не косятся. Часть луговъ, впрочемъ, разъ въ 2 или 3 года, затопляется, послѣ чего травы улучшаются <sup>1)</sup>. Утуговъ въ волости почти совсѣмъ нѣтъ, да и при обиліи покосовъ въ нихъ нѣтъ надобности. Скота жители волости содержатъ: лошадей 4.760 (3.860 рабочихъ), крупнаго рогатаго скота 3.230 головъ, мелкаго скота 3.800, въ томъ числѣ овецъ 2.700 штукъ. Такимъ образомъ рабочихъ лошадей приходится на работника по 2,7, всѣхъ же лошадей на хозяйство по 3,7, крупнаго рогатаго скота по 2,4, мелкаго по 3.

Лѣса въ дачахъ Алзамайской волости до 124 тыс. дес.; лѣса отчасти еще имѣютъ характеръ дѣственныхъ лѣсовъ и состоятъ преимущественно изъ сосны и березы <sup>2)</sup>. Вблизи селеній и не далѣе 10 верстъ отъ нихъ находится вездѣ хорошій строевой лѣсъ. Сбыта лѣса нѣтъ совсѣмъ, да и мѣстъ въ немъ годныхъ подросчисти, при его густотѣ и дѣвственности, встрѣчается немного. Само собою разумѣется, что пользованіе лѣсомъ во всей волости совершенно свободное, рубить всякій гдѣ и сколько хочетъ и только въ дачахъ, отмежеванныхъ волости, но и сосѣднихъ пусто-порожныхъ земляхъ, среди которыхъ отмежеванныя крестьянами земли тянутся лишь узкими полосами.

По отношенію къ развитію промысловъ, Алзамайская волость занимаетъ высокое мѣсто, такъ какъ 83% ея взрослыхъ работниковъ, кромѣ земледѣлія и скотоводства, занимаются еще и промыслами <sup>3)</sup>. Больше половины этихъ лицъ, а именно 560 человекъ, занято извозомъ и дворничествомъ, что объясняется тѣмъ, что большая часть волости растянута длинною полосой на 140 верстъ вдоль Сибирскаго тракта. Далѣе, четверть лицъ, занимающихся

<sup>1)</sup> Смирновъ, Матер. I. с. Т. II, ч. 5-я, стр. 379.

<sup>2)</sup> Смирновъ, I. с. стр. 399.

<sup>3)</sup> Личковъ, Матер. I. с. Т. II, вым. 4-й, стр. 328.

промыслами, занимаются охотою и рыбною ловлею. На долю первого изъ этихъ занятій приходится 185 человекъ, на долю второго 87 человекъ. Развитію охоты способствуетъ непосредственная близость лѣсовъ, рыболовства — присутствіе прекрасныхъ, многоядныхъ и обильныхъ рыбоу рѣкъ, вдоль которыхъ растянута земля волости, какъ напримѣръ Уды, Вирюсы, Топорка и др. Наконецъ осталъная четверть лицъ, занимающихся промыслами, занята промысломъ кустарнымъ. Сюда принадлежатъ лѣсные промыслы, которыми въ волости занято 128 человекъ, а именно сидѣю дегтя (18), пилкою и заготовленіемъ лѣсныхъ строевыхъ материаловъ (12), бондарствомъ (15), заготовленіемъ саней, телегъ, колесъ (13). Далѣе слѣдуютъ лица, перерабатывающіе животные продукты: кожевники, башмачники и мѣховщики (146). Наконецъ перерабатывающіе металлическія издѣлія: кузнецы (32).

Общая сумма мірскихъ доходовъ Алзайской волости составляетъ <sup>1)</sup> 3.114 р., въ томъ числѣ съ питейныхъ заведеній 1.745 р., перевозовъ 500 р., лавокъ и вѣсовъ 470 р., мельницъ 333 р. Каменныхъ податей съ волости сходится 9.435 р. Волостныхъ расходовъ 4.000 р., въ томъ числѣ на писаря и канцелярскіе расходы 840 р., волостнаго старшину и правленіе 155 р., содержаніе училища 1.510 р., врачебную часть 300 р. Сельскихъ расходовъ 1.440 р., въ томъ числѣ на писаря и канцелярію 2.180 р., сельскаго старосту и пр. 215 р., земскія квартиры 817 р., церковные расходы 350 р. Суммируя повинности и расходы получится, что повинностей, кромѣ натуральныхъ, въ волости сходится съ души п. около 6 руб.

Территорія Тулуновской волости расположена на Большомъ Сибирскомъ трактѣ отъ Нижнеудинска ближе къ границѣ Балаганскаго округа, преимущественно по обѣимъ сторонамъ р. Ии и ея притокамъ. Территорія эта, состоящая изъ 10 межевыхъ частей, занимаетъ до 230.000 дес. земли, изъ коихъ 65% состоитъ изъ лѣсовъ.

Тулуновская волость состоитъ изъ 9 сельскихъ обществъ, которыя по землевладѣнію составляютъ 7 юридическихъ общинъ.

1) Хингуйское сельское общество состоитъ изъ одного селенія Хингуйскаго. Деревня Хингуй расположена на Большомъ Сибирскомъ трактѣ при рч. Хингуй, въ 31 вер. отъ Нижнеудинска въ направленіи къ Иркутску. Въ Хингуѣ 52 двора, 70 жилищъ

<sup>1)</sup> Астиревъ, Матер. I. с. Т. II, выд. 5-я, стр. 160 и слѣд.

построекъ, 3 питейн. завед., 2 лавки и кузница. Въ сельскомъ обществѣ (съ займками 974 двора, 87 жилыхъ строеній и 320 жит. (177 м. п.), изъ которыхъ постороннихъ 22 (14 м. м.), ссильно-поселенцевъ 32 (17 м. п.), новоселовъ 30 (16 м. п.), остальные старожилы. Изъ крестьянъ общества 150 въ рабочемъ возрастѣ (80 м. п.). По отношенію къ пользованію землею крестьяне образуютъ отдѣльную юридическую общину и владѣютъ одною особою межевою дачею. Въ непосредственномъ пользованіи 62 хозяйствъ общества состоитъ 2.540 дес. земли, въ томъ числѣ пахатной 1.040 дес. Пашни сельскаго общества черезполосны съ пашнями слѣдующаго (Худоеланскаго), выгоны и покосы отдѣльные. Лѣсомъ пользуются въ своей дачѣ. Скота содержатъ: 270 лошадей (240 рабочихъ), крупнаго рогатаго скота болѣе 200 головъ, мелкаго скота 220.

2) Худоеланское общество состоитъ также изъ одного селенія. Село Худоеланское находится на Большомъ Сибирскомъ трактѣ въ 47 вер. отъ Нижнеудинска, т. е. еще далѣе по направленію къ Иркутску, состоитъ изъ 60 дворовъ и имѣетъ церковь, 3 питейныя заведенія, 2 лавки, 2 кузницы. Въ сельскомъ обществѣ (съ займками) 74 двора и 87 жилыхъ строеній. Жителей 360 об. п. (178 м. п.), изъ коихъ постороннихъ 55 (21 м. п.), ссильно-поселенцевъ 12 (6 м. п.), новоселовъ 54 (30 м. п.), остальные старожилы. Изъ крестьянъ общества 152 въ рабочемъ возрастѣ (72 м. п.). По отношенію къ пользованію землею сельское общество образуетъ отдѣльную юридическую общину и владѣетъ одною особою межевою дачею. Въ непосредственномъ пользованіи 67 хозяйствъ общества состоятъ 830 десятинъ, въ томъ числѣ пахатной земли 770 дес. Пашни Худоеланскаго общества черезполосны съ пашнями Хингуйскаго, покосы и выгоны отдѣльные, лѣсъ крестьяне рубятъ только въ своей дачѣ. Скота крестьяне содержатъ: 230 лошадей (210 рабочихъ), крупнаго рогатаго скота 170 головъ, мелкаго скота 280 головъ.

3) Шебартинское общество состоитъ изъ одного селенія. Село Шебарта находится на Большомъ Сибирскомъ трактѣ уже въ 68 вер. отъ Нижнеудинска и состоитъ изъ 110 дворовъ, имѣетъ церковь, 6 питейныхъ заведеній, 5 лавокъ и 3 кузницы. Въ сельскомъ обществѣ (съ займками) 130 дворовъ, 180 жилыхъ строеній, мельница. Жителей 675 (332 м. п.), изъ коихъ постороннихъ 46 (19 м. п.), ссильно-поселенцевъ 28 (14 м. п.), новоселовъ 50 (25 м. п.), остальные старожилы. Изъ крестьянъ 294 въ рабочемъ возрастѣ (142 м. п.). Въ отношеніи къ пользованію землею общество

образуетъ совершенно отдѣльную юридическую общину, пользующуюся отдѣльною межевою дачею. Въ непосредственномъ пользованіи 124 хозяйствъ общества состоятъ, кромѣ лѣса, 3.760 дес. земли, въ т. ч. пахатной 1.860 дес. Скота крестьяне общества содержатъ: 590 лошадей (520 рабочихъ), крупнаго рогатаго скота 390, мелкаго скота болѣе 800 головъ.

4) Трактово-Курзанское общество состоитъ также изъ одного селенія. Деревня Трактовый Курзанъ расположена на Большомъ Сибирскомъ трактѣ, въ 93 вер. отъ Верхнеудинска, въ направленіи къ Иркутску, при рѣчкѣ Курзанѣ. Селеніе это состоитъ изъ 82 дворовъ, имѣетъ 2 питейныхъ заведенія, лавку, 2 мельницы и 2 кузницы. Въ сельскомъ обществѣ съ займами 138 дворовъ. Жителей 526 (264 м. п.), въ томъ числѣ постороннихъ 15 (7 м. п.), ссыльно-поселенцевъ 16 (10 м. п.), новоселовъ 74 (40 м. п.), остальные старожилы. Въ рабочемъ возрастѣ 252 (120 м. п.). По отношенію къ пользованію землею сельское общество образуетъ отдѣльную юридическую общину и владѣетъ особою межевою дачею. Въ непосредственномъ пользованіи 87 хозяйствъ общества состоятъ 2.720 десятинъ, въ томъ числѣ пахатной 1.420 дес. Скота крестьяне держатъ: лошадей 460 (370 рабочихъ), крупнаго рогатаго 340, мелкаго скота 830 головъ.

5) Посторонне-Курзанское общ., 6) Тулуновское, и 7) Перфиловское имѣютъ въ общемъ владѣніи одну межевую дачу. Покосныхъ общинъ здѣсь 4: двѣ въ Посторонне-Курзановскомъ обществѣ (Никитаевская и Заусаевская) и по одной въ остальныхъ обществахъ. Между селомъ Тулунъ и дер. Никитаевой существуетъ череполосица полей и общность выгона. Лѣсомъ въ селеніи трехъ обществъ пользуются совмѣстно въ отведенной имъ дачѣ, но иногда ѣздятъ и въ бурятскія дачи. Въ Посторонне-Курзанскомъ обществѣ, кромѣ займовъ, 7 селеній: дер. Никитаева (иначе Посторонній Курзанъ) на р. Курзанѣ находится въ сторонѣ отъ Большаго Сибирскаго тракта и въ 12 вер. отъ волостнаго селенія Тулунъ, состоитъ изъ 78 хозяйствъ и имѣетъ 254 жителей. Дер. Ермаковская на р. Курзанѣ, въ 2 вер. отъ предшешей, имѣетъ 24 хозяйства и 143 жителя. Дер. Афанасьевская, также на р. Курзанѣ, еще на 2 вер. ближе къ волостному селенію, имѣетъ 25 хозяйствъ и 120 жителей. Дер. Заусаева, еще выше по р. Курзану, находится также въ 3 вер. отъ волостнаго селенія, въ сторонѣ отъ Большаго Сибирскаго тракта; она содержитъ 70 хозяйствъ и 380 жителей. Деревня Ключе-



барминская находится въ 25 вер. отъ волостнаго селенія и Большаго Сибирскаго тракта на р. Іѣ и состоитъ изъ 18 хозяйствъ и 80 жителей. Дер. Бұрухунская, также на р. Іѣ, въ 30 вер. отъ волостнаго селенія, состоитъ изъ 17 хозяйствъ и 74 жителей. Наконецъ, на земляхъ сельскаго общества расположено еще Иннокентьевскій винокуренный заводъ, въ поселкѣ котораго живетъ 43 хозяйствъ и 170 жителей. Все же Покоронне-Курзанское общество состоитъ (съ занимами) изъ 250 дворовъ и 1.270 жителей (620 м. п.), въ томъ числѣ постороннихъ 123 (61 м. п.), ссыльно-поселенцевъ 92 (48 м. п.), новоселовъ 45 (24 м. п.), остальные старожины. Въ рабочемъ возрастѣ изъ крестьянъ общества 550 (м. п. 276). Въ непосредственномъ пользованіи 218 хозяйствъ общества состоитъ 6.800 десят., въ т. числѣ пахатной 4.900. Скота крестьяне общества содержатъ: лошадей 1.290 (830 рабочихъ), крупнаго рогатаго 760, мелкаго скота 2070 головъ. Въ Тулуновскомъ обществѣ одно большое село Тулунъ и нѣсколько отчасти довольно значительныхъ заимокъ (изъ нихъ 4 имѣютъ отъ 14 до 21 хозяйства и отъ 60 до 120 жителей). Село Тулунъ есть одно изъ самыхъ крупныхъ селеній на Большомъ Сибирскомъ трактѣ. Оно расположено въ 119 вер. отъ Нижнеудинска въ направленіи къ Иркутску при р. Ии, имѣетъ 34 дворовъ, до 2.500 жит., церковь, богадѣльню, школу съ 120 учащимися, волостное правленіе, врачебный пунктъ, 2 водиныя мельницы, 15 питейныхъ заведеній, 19 лавокъ, въ т. числѣ два крупныхъ склада бакалейныхъ оптовыхъ товаровъ (Щелгунова и Лелелева), 11 кузницъ, ярмарка, на которую не бываетъ съѣзда, базары. Тулуновскіе базары очень значительны. Предметы торговли на немъ тѣ же, что и въ Черемховѣ; радіусъ ихъ тяготѣній отъ 60—80 верстъ. Въ Тулуновскомъ сельскомъ обществѣ (съ занимами) 480 дворовъ, жителей 2.870 (1.450 м. п.), въ томъ числѣ постороннихъ 600 (310 м. п.), казаковъ 8, ссыльно-поселенцевъ 514 (266 м. п.), новоселовъ 260 (148 м. п.), остальные старожины. Изъ числа крестьянскаго населенія сельскаго общества въ рабочемъ возрастѣ состоитъ 1.144 (545 м. п.). Въ непосредственномъ пользованіи 480 хозяйствъ общества, кромѣ лѣса, состоитъ до 9.500 дес. земли, въ томъ числѣ пахатной 5500 дес. Скота крестьяне содержатъ: лошадей 1.740 (1.350 рабочихъ), крупнаго рогатаго скота 1300, мелкаго скота 2.920. Въ Перфиловскомъ обществѣ кромѣ заимокъ, три деревни: селеніе Перфиловское на р. Минутѣ, въ сторонѣ отъ Сибирскаго тракта, въ 18 вер. къ ю. отъ

Тулуна, съ 102 хозяйствами и 434 жит.; дер. Ниж. Манутъ, при впадении р. Манута въ Ю, въ 13 вер. отъ Тулуна съ 29 хозяйствами и 160 жит.; дер. Верх. Манутъ, въ 1 вер. отъ предшедшей, выше по р. Мануту съ 19 хозяйствами и 96 жителями. Во всемъ сельскомъ обществѣ (съ заимками) 136 дворовъ, 804 жит. (415 м. п.), въ томъ числѣ постороннихъ 94 (49 м. п.), ссыльно-поселенцевъ 113 (53 м. п.), новоселовъ 31 (18 м. п.), остальные старожилы. Въ числѣ крестьянъ общества въ рабочемъ возрастѣ 340 (170 м. п.). Въ непосредственномъ пользованіи 145 хозяйствъ общества (кромя лѣсовъ) состоитъ 4.910 дес., въ томъ числѣ пахатной 3.660. Скота крестьяне содержатъ: лошадей 940 (рабочихъ 670), крупнаго рогатаго скота 730, мелкаго скота до 1.900 головъ.

8) Гадалейское общество состоитъ изъ 3 селеній, владѣющихъ особою межевою дачей. Село Гадалей, въ сторонѣ отъ Большаго Сибирскаго тракта, въ 21 вер. отъ Тулуна, расположено при впадении р. Гадалей въ Ю, имѣетъ церковь, 5 питейн. заведеній, 5 лавокъ, 3 мельницы, 8 кузницъ и состоитъ изъ 147 хозяйствъ и 670 жит. Деревня Мураши или Мурашево, всего только въ 1 вер. отъ Гадалей, состоитъ изъ 137 хозяйствъ и 780 жит. Дер. Бадарская на р. Мал. Манутѣ, расположена въ 17 вер. отъ Тулуна и состоитъ изъ 86 хозяйствъ и 460 жителей. Во всемъ сельскомъ обществѣ 350 дворовъ, 1.960 жителей (м. п. 950), въ т. числѣ постороннихъ 127 (56 м. п.), ссыльно-поселенцевъ 172 (91 м. п.), новоселовъ 210 (105 м. п.), остальные старожилы. Въ числѣ крестьянъ селенія въ рабочемъ возрастѣ 830 (410 м. п.). Въ непосредственномъ пользованіи 345 хозяйствъ общества состоитъ (кромя лѣсовъ) въ 12.050 дес., въ т. числѣ 6.930 пахатной. Въ пашняхъ селеній всѣхъ полосныя нѣтъ; у села и дер. Мурашевой покосы общіе. Скота крестьяне держатъ: лошадей 1.680 (1.410 рабочихъ), крупнаго рогатаго скота 1.550, мелкаго болѣе 4.000 головъ.

9) Общество Шерагульское состоитъ изъ одного селенія и пользуется отдѣльною межевою дачею. Село Шерагульское находится на Большомъ Сибирскомъ трактѣ въ 18 вер. отъ Тулуна, въ направленіи къ Иркутску. Оно состоитъ изъ 324 дворовъ, имѣетъ церковь, 5 лавокъ, 4 питейныя заведенія, 5 мельницъ, 6 кузницъ, 1.430 жителей (680 м. п.), въ числѣ коихъ постороннихъ 42 (77 м. п.), ссыльно-поселенцевъ 40 (18 м. п.), новоселовъ 20 (56 м. п.). Изъ крестьянъ общества въ рабочемъ возрастѣ 310 (318 м. п.). Въ непосредственномъ пользованіи хозяйствъ общества состоитъ (кромя лѣса) 4.000 дес., въ томъ числѣ пахатной 1.800

дес. Скота крестьяне содержатъ: 1.320 лошадей (1.110 рабочихъ), крупнаго рогатаго скота 1.000, мелкаго скота до 2.000 головъ.

Объ экономическомъ положеніи всей Тулуновской волости нѣтъ слѣдующія свѣдѣнія. Въ волости всего 1.960 дворовъ, жилыхъ построекъ 2.250. 26 $\frac{1}{2}$ % всѣхъ дворовъ волости размѣщается въ заимкахъ <sup>1)</sup>, что указываетъ на достаточное развитіе хуторскаго хозяйства въ волости. Наличныхъ жителей 8.910 (4.470 м. п.). Изъ числа коренныхъ жителей: казаковъ 8 (3 м. п.), ссыльно-поселенцевъ 1.014 (523 м. п.), новоселовъ 880 (462 м. п.), остальные старожилы. Кромѣ того въ волости проживаетъ 1.240 постороннихъ лицъ (615 м. п.), такъ-что все населеніе волости простирается до 10.150 об. п. Народонаселеніе волости со времени X-ой ревизіи приросло на 29%, такъ-что волость вслѣдствіе своего положенія на Сибирскомъ трактѣ дала нѣкоторый приростъ населенія главнымъ образомъ вслѣдствіе переселенія въ нее (новоселы и ссыльно-поселенцы составляютъ въ ней 21 $\frac{1}{2}$ % всего населенія); что касается до естественнаго прироста, то онъ оказывается совершенно незначительнымъ. Въ числѣ жителей волости грамотныхъ, полуграмотныхъ и учащихся 337 м. п. и 31 женск. пола. Относительно физическихъ недостатковъ по количеству слѣпыхъ волость занимаетъ одно изъ среднихъ мѣстъ въ уѣздѣ, а именно слѣпыхъ въ волости 20, что составитъ 2 $\frac{1}{2}$ % на 1.000 жителей.

Крестьянскихъ хозяйствъ въ Тулуновской волости 1.790, лицъ въ рабочемъ возрастѣ 4.370 (2.140 м. п.). Въ числѣ хозяйствъ было, съ 1 работн. 1.216 (въ т. числѣ имѣющихъ еще подростковъ 276); съ 2 раб. 287, съ 3 и болѣе 64. Затѣмъ 223 хозяйства совсѣмъ не имѣли работника, но въ 110 изъ нихъ были подростки (полуработники). Удобныхъ земель въ непосредственномъ пользованіи крестьянъ волости (кромѣ лѣсовъ) 51 тыс. дес., т. е. по 11 $\frac{1}{2}$  дес. на душу м. п., по 24 на работника, по 28 $\frac{1}{2}$  на хозяйство.

Пахатныхъ земель въ волости 32 тыс. дес., изъ нихъ засѣвается 52%, такъ-что посѣвовъ приходится до 3 $\frac{3}{4}$  дес. на душу м. п., по 8 на работника, по 9 на хозяйство. На каждыя 100 дес. засѣвается рожью 70 дес. (61 озимого), овсомъ 22 дес., пшеницею 6 дес. Удобреніе полей здѣсь совсѣмъ почти не существуетъ. Чистый сборъ хлѣбовъ составляетъ ржи 56 пуд., овса 60, пшеницы 40 пудовъ съ десятины <sup>2)</sup>. Пропорціи лѣсныхъ рощистей къ пашнѣ въ Тулунов-

<sup>1)</sup> Астиревъ, Матер. I. с. Т. II, вып. 3-й, стр. 139.

<sup>2)</sup> Козловъ, Матер. I. с. Т. II, вып. 4-й, стр. 54, 78.

ской волости наибольшая въ уѣздѣ, а именно 19% и вообще въ отношеніи къ развитію земледѣлія Тулуновская волость стоитъ несравненно выше сосѣдней Алзамайской, такъ-что Тулуновская волость производитъ обыкновенно хлѣба вдвое болѣе, чѣмъ необходимо для потребленія ея жителей. Въ Тулуновской волости былъ только одинъ случай общественной запашки, а именно въ с. Шерагулѣ въ точнѣ такихъ же условіяхъ какъ и въ Алзамайской волости, а именно работою наймомъ. И эта попытка имѣла столь же мало успѣха какъ въ Алзамайской волости.

Луговой земли (покосъ) въ волости 18.200 десятинъ, т. е. болѣе 10 дес. на хозяйство. Самые покосы разнокачественны, (въ Тулуновскомъ обществѣ покосы низменны и перемежаны съ лѣсомъ), но на нихъ растутъ пырей и вязильникъ. Въ Перфильевскомъ обществѣ между рѣками Шерагуломъ и Комоемъ покосы низменные и частью кочковатые, на нихъ растутъ плохія травы, осока и бѣлоголовникъ (*Eriophorum*); зато по р. Іѣ покосы очень хорошіе, луговые. Въ Никитаевскомъ обществѣ покосы большею частью поросли лѣсомъ, но у Заграева они чисты, ровны, поросли листовикомъ и волосцомъ и только отчасти болотистые. Въ обществѣ Шерагульскомъ у самыхъ рѣкъ покосы болотисты, но далѣе отъ нихъ покосы луговые съ хорошими травами (пырей и т. п.). Въ Малейскомъ обществѣ по р. Іѣ покосы хорошіе, луговые. Въ обществѣ Трактово-Курзанскомъ много лѣсныхъ и кочковатыхъ покосовъ, но по р. Даурѣ и ключамъ есть хорошіе пырейные покосы; въ Курзану они болотисты. Въ обществѣ Шебартинскомъ покосы боровные, на нихъ растутъ лопушникъ, прострѣлъ и горчичникъ. Въ Худоеланскомъ обществѣ покосы среди березняковъ высокіе боровные, съ прекрасными травами. Въ Хингуйскомъ обществѣ покосы по березняку мокрые, большею частью съ плохими травами (злотные, зонтичные и т. п.)<sup>1)</sup>. Утуговъ въ волости совсѣмъ нѣтъ. Скота крестьяне волости содержатъ: лошадей 8.700 (6.700 рабочихъ), крупнаго рогатаго скота 6.400 головъ, мелкаго скота 15.000 (т. числѣ 8.400 овецъ и 4.500 свиней). Такимъ образомъ рабочихъ лошадей на взрослого работника приходится болѣе 3-хъ, рабочихъ лошадей на хозяйство до 5, крупнаго рогатаго скота болѣе 1, мелкаго скота болѣе 8 головъ. Отсюда слѣдуетъ, что по развитію скотоводства волость занимаетъ одно изъ высшихъ мѣстъ въ губерніи.

<sup>1)</sup> О покосахъ см. Смирнова, въ Матер. I. с. Т. II, вып. 5-й, стр. 373.

Лѣсовъ въ межевыхъ дачахъ волости до 150 тыс. десятинъ. Лѣса состоятъ изъ сосны, березы, ели, лиственницы, пихты, изрѣдка кедра. Въ западной части волости лѣсъ близь къ селеніямъ и находится въ изобиліи, но сбыта не имѣетъ никакого. Въ восточной части волости лѣса также много, но онъ находится дальше отъ селеній: строевой лѣсъ верстъ за 15. Строевой лѣсъ этотъ имѣетъ нѣкоторый сбытъ въ Тулунѣ: лучшій лѣсъ для продажи рубятъ по верхнему теченію Ия въ бурятскихъ дачахъ, верстъ отъ 70 до 100 и сплавляютъ водою <sup>1)</sup>. Лѣсными промыслами въ волости занимаются до 150 лицъ, въ томъ числѣ смолокуреніемъ и сидловъ дѣла 16, заготовкою древесныхъ матерьяловъ 26, плотничествомъ 70, бондарствомъ 12, изготовленіемъ колесъ 12, столярнымъ ремесломъ 9. Вообще по развитію промысловъ волость занимаетъ довольно высокое мѣсто въ губерніи, такъ какъ до 70% способныхъ работниковъ волости, кромѣ земледѣлія и скотоводства, заняты еще и другими промыслами <sup>2)</sup>. На первомъ планѣ между этими промыслами стоитъ, впрочемъ, извозный, которымъ въ волости занято до 780 человекъ. Изъ кустарныхъ промысловъ развиты въ особенности перерабатывающіе дерево и уже поименованные, 23 занимаются выдѣлкою кожъ и мѣховъ, 8 обработкою шерсти, 8 тканьемъ, 27 кузнечествомъ, 12 хлѣбопеченіемъ, 12 портнымъ ремесломъ. Охотою и звѣриннымъ промысломъ занимается въ волости 60 человекъ. Въ 1888 г. въ волости было добыто только 100 шт. дичи. Рыболовствомъ заняты въ волости до 80 человекъ. Крестьяне эти выѣзжаютъ изъ своихъ селеній на р. Ію и притокъ ея Ихей недѣли на двѣ съ 23 апр., а осенью съ 1 сент. по 1 окт., удаляясь верстъ отъ 50 до 80 отъ своихъ селеній (напр. Бадарскаго, Гадлейскаго). Невода на р. Іѣ длиною отъ 20 до 25 саж. и стоятъ отъ 30 до 40 руб. Ловится преимущественно хариусъ и ленокъ, рѣже таймень и ситъ. На неводъ плавятъ отъ 30 до 50 пуд. рыбы, а на человекъ отъ 8 до 10 руб. На базарѣ въ Тулунѣ она продается по 3 р. 50 коп. за пудъ, слѣдовательно валовой доходъ на человекъ отъ 28 до 35 р., а расходъ отъ 8 до 10 р. (на снасти, припасы и соль), слѣдовательно чистый заработокъ отъ 20 до 28 р. на человекъ мѣсяца въ полтора <sup>3)</sup>.

<sup>1)</sup> Смирновъ, Матер. I. с. Т. II, вып. 5-й, стр. 399.

<sup>2)</sup> Личковъ, Матер. I. с. Т. II, вып. 4-й, стр. 328.

<sup>3)</sup> Молодыхъ, Матер. I. с. Т. II, вып. 4-й, стр. 400.

Мірскіе доходы Тулуновской волости простираются до 6.530 р.<sup>1)</sup>, въ томъ числѣ съ питейныхъ заведеній 3.425 р., съ перевозовъ 1.750 р., базаровъ, лавокъ и вѣсовъ до 600 р., усадебъ 570 р., мельницъ 130 р. Казенныхъ податей съ волости сходитъ 15.360 р. Волостныхъ расходовъ 6.675 р., въ т. ч. на волостнаго писаря, его помощниковъ и канцелярскіе расходы 2250 р., волостнаго старшину и правленіе 275 р., содержанія училищъ 2.100 р., врачебную часть 1.200 р., земскія квартиры 400 р. Сельскихъ расходовъ 7.110 р., въ т. ч. сельск. писарямъ 2.180 р., на сельское управленіе (старостамъ и выборнымъ) 1.070 р., на церкви 800 р., сторожей, разсыльных, караульных, десятниковъ 900 р., земскія квартиры 670, оспопрививаніе 250 р. Слагая подати, волостныя и сельскія расходы, выйдетъ, что съ души м. п. сходитъ всѣхъ денежныхъ повинностей 6 р. 50.

Территорія Куйтунской волости расположена на Большомъ Сибирскомъ трактѣ, а на востокъ доходитъ до р. Оки. Территорія эта занимаетъ 6 межевыхъ дачъ, которыхъ общее пространство до 150 тыс. дес., изъ коихъ 60% подъ лѣсомъ.

Куйтунская волость состоитъ изъ 5 сельскихъ обществъ, образующихъ по землевладѣнію 6 юридическихъ общинъ и содержащихъ 8 селеній. 1) Общество Куйтунское состоитъ изъ одного селенія. Куйтунъ расположенъ на Большомъ Сибирскомъ трактѣ въ 181 вер. отъ Нижнеудинска, состоитъ (съ заниками) изъ 378 дворовъ, 424 строеній, имѣетъ церковь, школу съ 62 учащимися, врачебный пунктъ, волостное правленіе, 10 питейныхъ заведеній, 7 лавокъ, 3 водяныя мельницы въ своихъ дачахъ, 3 кузницы и 1.630 жит. (820 м. п.), въ т. ч. постороннихъ сельскому обществу до 260 (до 120 м. п.), ссыльно-поселенцевъ 700 (373 м. п.), новоселовъ 565 (280 м. п.), остальные старожилы. Изъ крестьянъ общества въ рабочемъ возрастѣ 754 (372 м. п.). Въ непосредственномъ пользованіи Куйтуновскаго общества, образующаго отдѣльную юридическую общину, состоитъ, кромѣ лѣса, 8.420 дес., въ т. ч. пахатной 5.040 дес. Скота крестьяне содержатъ 1.700 лошадей (1.250 рабочихъ), крупнаго рогатаго скота 670, мелкаго скота 2.150 головъ. 2) Общество Тулинское состоитъ изъ одного селенія, составляющаго по землевладѣнію одну юридическую общину. Село Тулинское расположено на Большомъ Сибирскомъ трактѣ, на 21 версту ближе Куйтуна къ Нижнеудинску, на р. Иѣ.

<sup>1)</sup> Астхревъ, Матер. I. с. Т. II, вып. 5-й, стр. 392.

Оно состоитъ съ займами изъ 150 дворовъ, 180 строеній, имѣтъ церковь, 4 лавки, 5 питейн. заведеній, 2 мельницы и 2 кузницы и 530 жителей (275 м. п.). Изъ нихъ постороннихъ обществу 46 (25 м. п.), ссыльно-поселенцевъ 20 (10 м. п.), новоселовъ 76 (34 м. п.), остальные старожилы. Въ числѣ крестьянъ въ рабочемъ возрастѣ 270 (140 м. п.). Въ непосредственномъ пользованіи 115 хозяйствъ общества, кромѣ лѣсовъ, состояло 4.800 дес., въ томъ числѣ пахатной до 2.100 дес. Скота крестьяне содержатъ: лошадей 630 (рабочихъ 450), крупнаго рогатаго скота 450, мелкаго скота 1.150 головъ. 3) Общество Хаихтское состоитъ изъ одного селенія, такъ какъ два выселка этого селенія уже слились съ нимъ, и по своему землевладѣнію составляетъ отдѣльную юридическую общину. Деревня Хаихта находится въ сторонѣ отъ Большаго Сибирскаго тракта, въ 20 вер. къ с.-в. отъ Куйтуна, состоитъ изъ 212 дворовъ и 252 жилыхъ строеній. Оно имѣтъ 830 жит. (420 м. п.), въ т. ч. постороннихъ обществу 64 (33 м. п.), ссыльно-поселенцевъ 52 (33 м. п.), новоселовъ 48 (22 м. п.), остальные старожилы. Изъ крестьянъ въ рабочемъ возрастѣ до 400 (200 м. п.). Въ непосредственномъ пользованіи 163 хозяйствъ общества, кромѣ лѣсовъ, состоитъ земель 5.440 дес., въ т. ч. пахатныхъ 3.040 дес. Скота крестьяне держатъ: лошадей 1.080 (690 рабочихъ), крупнаго рогатаго скота 840, мелкаго 1.570 головъ. 4) Общество Барлукское состоитъ изъ 3 селеній. Село Барлукъ находится въ сторонѣ отъ Большаго Сибирскаго тракта, въ 35 вер. къ с.-с.-в. отъ Куйтуна, близъ впаденія рч. Барлукъ въ Оку. На нынѣшнее возвышенное мѣсто оно перешло въ началѣ нынѣшняго вѣка съ низменнаго берега Оки, разрушившей во время наводненія прежнее селеніе. Барлукъ состоитъ изъ 242 хозяйствъ, имѣтъ церковь и 1.160 жит. (596 м. п.). Дер. Яды, въ 8 вер. отъ Барлука ниже по Окѣ, состоитъ изъ 18 хозяйствъ и имѣтъ 110 жителей. Дер. Заваль иначе Скорописный камень, находится въ 40 вер. отъ Барлука ниже по Окѣ, на лѣвомъ ея берегу и состоитъ изъ 37 хозяйствъ и имѣтъ 180 жителей. Барлукъ и Яды составляютъ по своему землевладѣнію одну юридическую общину, а Заваль другую. Въ всемъ Барлукскомъ сельскомъ обществѣ 330 дворовъ, 400 жилыхъ строеній, 1.450 жит. (750 м. п.), въ томъ числѣ постороннихъ обществу 100 (52 м. п.), ссыльно-поселенцевъ 86 (47 м. п.), новоселовъ 52 (28 м. п.), остальные старожилы. Изъ крестьянъ въ рабочемъ возрастѣ 700 (350 м. п.). Въ непосредственномъ пользованіи 270 хозяйствъ общества состоитъ, кромѣ лѣсовъ, 8.600

и, въ т. числѣ пахатной 4.780. Скота крестьяне содержатъ: лошадей 1.670 (1.220 рабочихъ), крупнаго рогатаго скота 1.300, мелкаго 2.400 головъ. 5) Крестовоздвиженское общество состоитъ изъ 5 селеній, составляющихъ по своему землевладѣнію одну юридическую общину. Всѣ селенія эти расположены въ сто-роизѣ отъ Большаго Сибирскаго тракта по р. Илѣ и населены крестьянами изъ казаковъ и казаками. Пашни тѣхъ и другихъ изрѣзаны, покосами крестьяне и казаки пользуются также обща, но отдѣльно по каждой изъ станицъ. Селенія эти слѣдующія: станица Крестовоздвиженская, въ 20 вер. отъ Куйтуна, состоитъ изъ 26 хозяйствъ и 134 жителей. Станица Преображенская, въ 1 вер. отъ предшешей, изъ 13 хозяйствъ и 70 жителей. Станица Александровская, въ 12 вер. отъ Куйтуна, изъ 4 хозяйствъ и 30 жителей. Станица Петропавловская, въ 35 вер. отъ Куйтуна, съ 15 хозяйствами и 56 жит. Станица Покровская, въ 2 вер. отъ предшешей, съ 8 хозяйствами и 37 жителей. Все Крестовоздвиженское сельское общество состоитъ изъ 99 дворовъ, 140 жилыхъ строеній, въ которыхъ 573 жит. об. п. (37 м. п.). Въ числѣ ихъ постороннихъ лицъ 70 (37 м. п.), крестьянъ другихъ селеній 47 (23 м. п.), казаковъ 230 (117 м. п.), бывшій крестьяне изъ казаковъ. Въ числѣ крестьянъ и казаковъ лицъ въ рабочемъ возрастѣ 227 (107 м. п.). Въ непосредственномъ пользованіи 103 хозяйствъ сельскаго общества находится, кромѣ лѣсовъ, 2.860 дес. земли, въ т. числѣ пахатной до 1.000 дес. Скота крестьяне и казаки общества держатъ: лошадей 1.670 (370 рабочихъ), крупнаго рогатаго скота 380, мелкаго скота 2.400 головъ. Въ районѣ Куйтунской волости расположенъ Александрово-Невскій винокуренный заводъ, въ 38 вер. ю.-с.-з. отъ Куйтуна, на р. Алхѣ. Подъ заводъ этотъ отведена отъ общаго особая межевая дача. Около этого завода поселилось 30 дворовъ крестьянъ и поселенцевъ, образующихъ 60 хозяйствъ съ 150 жит. об. п. (до 150 м. п.). У этого поселка есть особый выгонъ, расположенный на государственныхъ пустопорожнихъ земляхъ, общие покосы и особая пашня.

Объ экономическомъ положеніи цѣлой Куйтунской волости даются слѣдующія свѣдѣнія. Въ волости всего 1.220 дворовъ, а жилищъ построекъ 1.420. 34 1/2% всѣхъ дворовъ размѣщаются въ хуторахъ <sup>1)</sup>, такъ-что по развитію хуторскаго хозяйства волость

<sup>1)</sup> Аспиревъ, Матер. I. с. Т. II, вып. 2-й, стр. 139.



занимает первое мѣсто въ уѣздѣ. Наличныхъ жителей въ волости 4.690 (м. п. 2385), а съ посторонними здѣсь проживающими 5.340 (2.710 м. п.). Изъ числа коренныхъ жителей: казаковъ 230 (117 м. п.), ссыльно-поселенцевъ 246 (150 м. п.), новоселовъ 530 (262 м. п.), остальные старожилы. Народонаселеніе волости со времени X-ой ревизіи въ 30 лѣтъ приросло на 56%<sup>1)</sup>, такъ-что по приросту населеніе волости занимаетъ второе мѣсто между волостями округа. Приростъ этотъ, конечно, до нѣкоторой степени объясняется тѣмъ, что въ волости послѣ X ревизіи были приписаны крестьяне изъ казаковъ, но всѣ эти прибылые элементы, крестьяне изъ казаковъ, ссыльно-поселенцы и новоселы, составляютъ не много болѣе 20% населенія волости, такъ-что на естественный приростъ остается еще очень много. Въ числѣ жителей въ волости грамотныхъ, полу-грамотныхъ и учащихся 350 мужч. и 30 женщ.

Хозяйствъ въ Куйтунской волости 1.000; лицъ въ рабочемъ возрастѣ 2.415 (1.210 м. п.). Въ числѣ хозяйствъ было: съ 1 работникомъ 664 (въ т. ч. въ 140 хозяйствахъ были еще и подростки), съ 2 работниками 190, съ 3-мя и болѣе 32. Въ 117 хозяйствахъ совсѣмъ не было работниковъ, но въ 60 изъ нихъ были подростки. Удобныхъ земель въ непосредственномъ пользованіи крестьянъ и казаковъ волости, кромѣ лѣсовъ, было 31.200 десят., т. е. по 13 дес. на душу м. п., по 26 на работника и 31 на хозяйство.

Пахатныхъ земель въ волости 16.660 дес., изъ коихъ засѣвается 54%<sup>2)</sup>, т. е. посѣвовъ приходится болѣе  $3\frac{3}{4}$  дес. на душу м. п. и  $7\frac{1}{2}$  на взрослого работника, 9 на хозяйство. На каждыя 100 дес. посѣва засѣвается рожью 56 (36 озимую и 20 ярицею), овсомъ 22 дес., пшеницею 17 дес., ячменемъ 4. Посѣвы эти соотвѣтствуютъ среднимъ посѣвамъ въ уѣздѣ. Чистый сборъ хлѣбовъ въ волости составляетъ ржи 56 пуд., овса 63 пуд., пшеницы 52 пуд. съ десятины<sup>3)</sup>. Пропорція лѣсныхъ рощистей къ пашнямъ 11,4, въ сколько ниже средней по уѣзду. По отношенію къ развитію земледѣлія волость стоитъ почти въ тѣхъ же условіяхъ какъ и Туруновская и производитъ хлѣба вдвое болѣе чѣмъ необходимо для потребленія ея жителей. Избытокъ идетъ въ Иркутскъ, Челгу, также на винокуренные заводы Александро-Невскій и Иннокентьевскій.

<sup>1)</sup> Астыревъ, I. с. стр. 96.

<sup>2)</sup> Козловъ, Матер. I. с. Т. II, вып. 4-й, стр. 54, 78.

Луговой (покосной) земли въ волости 14.000 дес., такъ-что по обширности покосовъ (по 14 дес. на хозяйство) волость находится въ лучшихъ условіяхъ. Впрочемъ, луга волости не всегда высокаго качества. Въ Куйтунскомъ обществѣ они низменны, кочковаты, только отчасти поросли преемъ, ирострѣльникомъ и ластовникомъ, въ отчасти и осокою. Въ Тулинскомъ обществѣ луга частью ровные, съ прострѣлою, частью кочковатые, съ осокою. Въ Бардукскомъ обществѣ луга по р. Окѣ и ея притокамъ очень хороши (съ преемъ и вязилемъ). Въ Хахтскомъ обществѣ преобладаютъ луга болотистые и кочковатые невысокаго качества. Въ Крестоводненскомъ обществѣ луга частью по теченію рѣчекъ и ключей мѣшны, а частью дубравныя <sup>1)</sup>. Утуговъ въ волости нѣтъ. Въслѣдствіе обилія луговъ крестьяне волости держатъ достаточное количество скота, а именно лошадей 5.800 (рабочихъ 4.100), крупнаго рогатаго скота 3.680, мелкаго 9.600. Рабочихъ лошадей приходится на работника до 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub>, всѣхъ лошадей на хозяйство до 6, крупнаго рогатаго скота до 4, мелкаго скота до 10. Такимъ образомъ по отношенію къ развитію скотоводства Куйтунская волость имѣетъ несравненно выше Алзайской и даже выше Тулуновской. Лѣса въ межевыхъ дачахъ Куйтунской волости до 90 т. дес. Въ состояніи изъ сосны, березы, затѣмъ ели, лиственницы и осины. Основной лѣсъ растетъ на песчаной почвѣ, березовый на черной, лиственничный на глинѣ, а еловый на пыхунѣ и въ болотныхъ мѣстахъ. Лѣсомъ крестьяне волости пользуются какъ въ своихъ дачахъ, такъ и на пустопорожнихъ государственныхъ земляхъ въ окружающихъ. За строевымъ лѣсомъ ѣздятъ иногда верстъ до 20. Изъ Хахтскаго общества ѣздятъ въ дачи Уянскія и Бардукскія бесплатно <sup>2)</sup>. Лѣснымъ промысломъ крестьяне Куйтунской волости заняты менѣе чѣмъ въ другихъ трактовыхъ волостяхъ Кнеудинскаго округа, а именно ими занято не болѣе 63 человекъ во всей волости. До 9 дворовъ занимаются заготовленіемъ бочковъ, которыхъ доставляется до 800 саж. въ годъ на винокурный заводъ; 16 чел. занимаются смолокурениемъ и дѣланіемъ дегтя, 24 плотничествомъ, 4 столярнымъ дѣломъ, остальные бондарствомъ, заготовленіемъ колесъ, саней и телѣгъ. Вообще же промыслы имѣютъ въ волости посредственное развитіе, такъ какъ только 45%, всѣхъ работниковъ волости занимаются кромѣ земледѣлія

<sup>1)</sup> Смирновъ, Матер. I. с. Т. II, вып. 4-й, стр. 378.

<sup>2)</sup> Смирновъ, Матер. I. с. Т. II, вып. 4-й, стр. 399.

ская, въ 12 вер. отъ Листвянской, на рч. Харинѣ, состоитъ изъ 46 хозяйствъ и 215 жит. Выселокъ Утхутуйскій состоитъ изъ 8 хозяйствъ и 60 жит. Листвянская всѣми угодьями, кромѣ лѣса, пользуется отдѣльно отъ прочихъ селеній; у выселковъ выгоны и покосы отдѣльные, а росчисти есть въ казенныхъ пустопорожнихъ земляхъ. Покосы общества расположены преимущественно по падамъ; травы на нихъ въ сырые годы хороши, но въ сухіе горчичникъ вытѣсняеть другіе травы; строевымъ лѣсомъ селеніе это пользуются преимущественно въ бурятскихъ и казачьихъ дачахъ за оброчную плату. Во всемъ обществѣ дворовъ 194, жилыхъ строеній 255, жителей 880 (450 м. п.), въ т. ч. постороннихъ 66 (30 м. п.), ссыльно-поселенцевъ 22 (9 м. п.), новоселовъ 76 (34 м. п.), остальные старожилы. Въ числѣ коренныхъ жителей въ рабочемъ возрастѣ 425 (205 м. п.). Въ непосредственномъ пользованіи крестьянъ общества, кромѣ лѣсовъ, 6.000 дес. (3.150 пахатной). Крестьяне общества держатъ скота: лошадей 1.080 (740 рабочихъ), крупнаго рогатаго скота 1.060, мелкаго 1.850 головъ.

4) Уянское сельское общество состоитъ изъ 3 селеній. Изъ нихъ село Уянъ находится верст. въ 30 отъ Кимильтея ниже по Оку на лѣвомъ ея берегу. Село имѣетъ церковь, школу, съ 76 учащимися, 10 питейныхъ заведеній, 9 лавокъ, 8 кузницъ, 427 хозяйствъ и 2.240 жителей (1.090 м. п.). Дер. Красный Яръ на р. Окѣ въ 8 вер. отъ Уяна и имѣетъ 38 хозяйствъ 250 жителей. Дер. Усть-Кода, въ 17 вер. отъ Уяна при впаденіи рч. Коды въ Оку имѣетъ 45 хозяйствъ и 260 жит. Во всемъ же сельскомъ обществѣ 61 дворовъ, 710 жилыхъ строеній 2.750 жителей (1.365 м. п.) въ числѣ постороннихъ 246 (122 м. п.), ссыльно-поселенцевъ 10 (54 м. п.), новоселовъ 164 (84 м. п.), остальные старожилы. Въ числѣ крестьянъ въ рабочемъ возрастѣ 1.235 (602 м. п.). Въ непосредственномъ пользованіи 450 хозяйствъ общества состоитъ (кромѣ лѣсовъ) 14.860 дес., въ т. числѣ пахатной 8.950 дес. Скотовъ крестьяне держатъ: лошадей 3.340 (2.300 рабочихъ) крупнаго рогатаго скота 2.220, мелкаго скота 4.400 головъ. Во владѣніи селскаго общества 12 водян. мельницъ. Уянское сельское общество арендуетъ казенно-оброчную статью—Прорвенскую дачу, состоящую изъ 560 дес. за 76 рублей въ годъ.

4) Въ Харчевскомъ сельскомъ обществѣ одно селеніе—деревня Харчевская. Она расположена въ 12 вер. отъ Кимильтея на ручьѣ Сосновскомъ, состоитъ изъ 50 дворовъ, 83 жилыхъ строеній. Жителей въ немъ 360 (180 м. п.), въ т. числѣ постороннихъ 6 (4 м. п.), ссыльно-поселенцевъ

13 (8 м. п.), новоселовъ 30 (15 м. п.), остальные старожилы. Между крестьянами въ рабочемъ возрастѣ 148 (70 м. п.). Въ непосредственномъ пользованіи 43 хозяйствъ сельскаго общества 1.636 дес., въ т. числѣ пахатной 1.236. Скота крестьяне держатъ: лошадей 470 (306 рабочихъ), крупнаго рогатаго скота 325, мелкаго скота 550 головъ. Уянское и Харчевское селенія общества владѣютъ землей въ одной межевой дачѣ, но у дер. Усть-Кодинской есть еще сверхъ того своя особая дачка. Пашни у селеній обоихъ обществъ, кромѣ дер. Усть-Кодинской череполосны, выгонъ общій только у сел. Уяна и дер. Красный Яръ. Только относительно пользованія покосами дер. Харчевская образуетъ одну общину, а всѣ три остальныхъ селенія другую: въ Харчевскомъ селеніи въ общій передѣлъ въ свои покосы идутъ и арендуемыя казенныя оброчныя статьи.

Луга Уянскаго общества расположены по рѣкамъ Окѣ и Кундуку; они большею частью сухіе и хорошаго качества. Луга Харчевскаго общества на половину сухіе, а на половину мокрые; вслѣдствіе поросли осокою, вязиломъ и пр. 5) Буринское сельское общество состоитъ изъ одной деревни Буринской, которая имѣетъ особую межевою дачею и всѣми угодьями пользуется отдѣльно. Дер. Буринская расположена по обоимъ берегамъ р. Бури въ 50 верстахъ отъ Кимильтея. Она состоитъ изъ 53 дворовъ, 67 жилыхъ строеній, имѣетъ 353 жителей (186 м. п.) въ т. числѣ постороннихъ 13 (7 м. п.), ссыльно-поселенцевъ 27 (17 м. п.), новоселовъ 28 (15 м. п.), остальные старожилы. Изъ числа крестьянъ въ рабочемъ возрастѣ 180 (93 м. п.). Въ непосредственномъ пользованіи 59 хозяйствъ общества состоитъ (кромѣ лѣсовъ) 1.720 дес., въ т. числѣ пахатной 975 дес. Луга общества по р. Бурѣ большею частью сухіе и только немногіе изъ нихъ заливаются весенними разливами. Скота крестьяне держатъ: лошадей 374, (250 рабочихъ), крупнаго рогатаго скота 330, мелкаго рогатаго скота 400 головъ.

О цѣлой Кимильтеяской волости имѣются слѣдующія свѣдѣнія. Въ волости 1.610 дворовъ и 2.010 жилыхъ строеній. 23% жилыхъ дворовъ волости размѣщаются въ занькахъ, такъ-что по развитію хуторскаго хозяйства Кимильтеяская волость занимаетъ высокое мѣсто между волостями губерніи. Наличныхъ жителей въ волости 7.139 (3.585 м. п.), а съ посторонними здѣсь проживающими 7.970 (4.015 м. п.). Изъ числа казаковъ, жителей ссыльно-поселенцевъ 700 (373 м. п.), новоселовъ 565 (280 м. п.), остальные старожилы. Народонаселеніе волости со времени X-ой ревизіи

прирасло на 33%<sup>1)</sup>, такъ-что по приросту населенія волости Кимильтейская стоитъ немного выше Тулуновской и Алзамайской, если принять въ соображеніе пропорцію въ населеніи ссильно поселенцевъ и новоселовъ, то на естественный приростъ населенія остается 15%<sup>2)</sup>, т. е. среднимъ числомъ по  $\frac{1}{2}$ % въ годъ. Въ числѣ жителей волости грамотныхъ, полуграмотныхъ и учащихся 590 м. п. и 62 женскаго.

Хозяйствъ въ Кимильтейской волости 1.360, лицъ въ рабочемъ возрастѣ 2.560 (1.760 м. п.). Въ числѣ хозяйствъ было: съ 1 работникомъ 876 (въ т. числѣ въ 235 хозяйствахъ были еще и подростки), съ 2 работниками 298, съ 3 и болѣе 74. Въ 173 хозяйствахъ совсѣмъ не было взрослыхъ работниковъ, но въ 68 изъ нихъ были подростки (полурабочіе). Удобныхъ земель, кромѣ лѣсовъ, въ непосредственномъ пользованіи крестьянъ волости было 37.730 дес., т. е. по 10 дес. на душу м. п., по 21 на работника и по 28 на хозяйство.

Пахатныхъ земель въ волости 22.400 десят., изъ нихъ засѣвается 54%<sup>3)</sup>, такъ-что посѣвовъ приходится по 3 дес. на душу м. п., по 7 дес. на работника, по 9 на хозяйство. На каждыя 100 дес. посѣва засѣвается рожью 45 дес. (17 озимю, 28 ярицею), 28 овсомъ, 17 пшеницею, 3 ячменемъ. Чистый сборъ хлѣбовъ въ волости составляетъ: ржи 56, овса 45 и пшеницы 45 пуд. съ десятины<sup>4)</sup>. Пропорція лѣсныхъ рощицъ и пашни 8%<sup>5)</sup>, т. е. вмѣстѣ съ Алзамайскою волостью самая низшая въ уѣздѣ. Искусственное удобреніе въ волости совсѣмъ не употребляется: «Земля и такъ родитъ», говорятъ здѣшніе крестьяне. Хлѣба волость производитъ гораздо болѣе, чѣмъ необходимо на мѣстное потребленіе, такъ-что ежегодный избытокъ хлѣба по отношенію къ общему его количеству составляетъ 44 %<sup>6)</sup>.

Луговыхъ земель въ волости 15.160 десятинъ, луга хорошаго качества, утговы совсѣмъ нѣтъ. Скота крестьяне держатъ: лошадей 8.700 (6.150 рабочихъ), крупнаго рогатаго скота 7.430, мелкаго скота 12.900 головъ. Рабочихъ лошадей на взрослого работника приходится  $3\frac{1}{2}$ , всѣхъ лошадей на хозяйство  $6\frac{1}{2}$ , крупнаго рогатаго скота  $5\frac{1}{2}$ , мелкаго скота  $9\frac{1}{2}$ .

Лѣсовъ въ пользованіи волости 40 тыс. дес. Лѣса состоятъ изъ

<sup>1)</sup> Астыревъ, Матер. I. с., Т. II, вып. 2-й, стр. 96.

<sup>2)</sup> Козловъ, Матер. I. с. Т. IV, вып. 4-й, стр. 54, 78.

<sup>3)</sup> Смирновъ, Матер. I. с. Т. II, вып. 5-й, стр. 338.

осины, березы, лиственницы и осины. Дровянымъ лѣсомъ почти въ селенія волости пользуются въ своихъ дачахъ по близости, а строевымъ лѣсомъ большинство селеній (кромя Уяна) ѣздятъ въ чужія бурятскія и казачьи дачи верстъ за 20 до 30 частью бревнато, частью съ попенной платой отъ 10 до 15 коп. Сбытъ дровъ существуетъ только мѣстный на кузни. Годныхъ для расчистей гѣсть въ лѣсу не мало. <sup>1)</sup> Лѣсные промыслы въ волости достаточно развиты; ими занято 117 лицъ, въ томъ числѣ сидкою дегтя 12, изготовкою лѣсныхъ матеріаловъ 15, плотничествомъ 71 человекъ. Вообще же по развитію крестьянскихъ промысловъ Кимильтейская волость занимаетъ одно изъ самыхъ высокихъ мѣстъ въ губерніи, такъ какъ 90 % всѣхъ его взрослыхъ работниковъ заняты, сверхъ земледѣлія и скотоводства, еще и промыслами. Между этими промыслами самое первое мѣсто принадлежитъ извозному, такъ какъ этотъ промыселъ занимается въ волости болѣе 830 человекъ, болѣе чѣмъ въ какой либо волости Иркутской губерніи, что объясняется расположеніемъ Кимильтейской волости какъ разъ по срединѣ Большаго Сибирскаго тракта въ Иркутской губерніи. Изъ кустарныхъ промысловъ жители волости занимаются бондарствомъ (8), выдѣлкою колесъ (9), столярнымъ ремесломъ (8), выдѣлкою кожъ (26), мѣховъ (5), шерстобитствомъ (8), гончарнымъ и кирпичнымъ промысломъ (10), кузнечествомъ (84). Наконецъ, нѣкоторое значеніе имѣетъ для жителей волости охота (звѣроловство) и рыбная ловля. Охотою въ волости занято 58 человекъ, рыбною ловлею 62. Рыбная ловля производится, главнымъ образомъ, въ богатой рыбою р. Окѣ. Селенія, дающія наибольшее количество рыбопромышленниковъ: Уинъ, Скорописный камень и Барлукъ. На промыселъ по р. Окѣ крестьяне этихъ селеній, да и вообще крестьянскихъ селеній Кимильтейской и Куйтунской волостей отправляются осенью, между 15 августа и 1 октября, за нѣсколько десятковъ верстъ отъ своихъ селеній въ лодкахъ, поднимаясь, когда приходится плыть противъ теченія, на шестахъ. Назадъ они возвращаются пѣшкомъ, оставляя лодки, невода и наловленную рыбу на храненіе мѣстнымъ бурятамъ, за что каждый промышленникъ платитъ отъ одного до 3 руб. или часть улова. Невода имѣютъ въ длину отъ 30 до 90 саж. Для промысла образуются артели отъ 4 до 7 человекъ, смотря по размѣру невода. За оставленными вещами и рыбою промышленники возвращаются, когда установится санная

<sup>1)</sup> Смирновъ, Матер. I. с. Т. II, вып. 4-й, стр. 399.

дорога. Малосемейные дворы принимают для промысловъ работниковъ за плату рублей по 15 за осень, при готовыхъ харчахъ. Припасы запасаются на человѣка въ мѣсяцъ, по 1½ пуда сухарей, отъ 2 до 3 ковриги ржаного хлѣба, 1 до 5 ф. масла, ½ ф. кирпичнаго чая, а сверхъ того для засолки отъ 1 до 2 пуд. соли. Пойманная рыба дѣлится между участниками поровну, но за наемныхъ рабочихъ получаетъ долю ихъ хозяинъ. Стоимость невода отъ 50 до 100 р., лодки отъ 10 до 20 р. Неводъ, если съ нимъ обращаться бережно, служить отъ 3 до 4 лѣтъ. Ловятся: хариусы, ленки, а рѣже таймени и сига. Наловленную рыбу послѣ лова чистятъ и засаливаютъ. Ловится рыбы отъ 50 до 100 пуд. на неводъ, или отъ 10 до 16 пуд. на человѣка. Валовой доходъ, считая по 3 руб. 50 коп. за пудъ,—отъ 30 до 50 р., расходъ отъ 8 до 16, а чистый заработокъ мѣсяца за полтора отъ 20 р. до 40 на промышленника. Кромѣ такихъ отъѣздовъ на дальніе промыслы жители приокскихъ селеній рыбачатъ и у себя дома или въ недалекомъ разстояніи отъ селеній, а именно верстъ отъ 5 до 15 съ неводомъ. Промышляютъ рыбу на мѣстѣ и сѣтями, лучемъ и мордами. На сѣть попадаетъ отъ 5 до 15 ф., а рѣдко и цѣлый пудъ. При лученіи въ темную ночь рыбакъ можетъ поймать до 1½ пуда. На этихъ ближнихъ ловахъ одинъ промышленникъ въ теченіи года зарабатываетъ рублей 20 <sup>1)</sup>).

Общая сумма мірскихъ доходовъ Кимильтейской волости составляетъ 4.370 р., въ т. ч. съ питейныхъ заведеній 3.340 р., съ усадебъ 380 р., базаровъ, лавокъ и вѣсовъ 305 р., съ перевозовъ 300 р. Казенныхъ податей съ волости сходитъ 13.860 р. Волостныхъ расходовъ 5.000 р., въ т. числѣ на писарей и канцелярскіе расходы 2.140 р., старшинѣ и управленію 240 р.; содержаніе училищъ 2.120, врачебную часть 790 р. Сельскихъ расходовъ по волости 3.480 р., въ т. числѣ на сельскихъ писарей и пр. 1.670 р., на старость и сельск. упр. 170 р., на церковные расходы 480 р., земскія квартиры 590 р. Суммируя повинности и расходы, получаемъ, что повинностей, кромѣ натуральныхъ, сходитъ съ души м. п. 5 р. 50 к.

Недалеко въ сторонѣ, къ югу отъ Большаго Сибирскаго тракта расположено единственное инородческое вѣдомство Нижнеудинскаго округа, извѣстное подъ именемъ Нижнеудинской земли. Землица эта состоитъ изъ двухъ несмежныхъ между собою меж-

<sup>1)</sup> Молодыхъ, Матер. I. с. Т. II, вып. 4-й, стр. 400.

ныхъ дачъ, занимающихъ въ совокупности 90.700 дес. земли и заключающихъ въ себѣ 6 улусовъ, 5 деревень и зимку, населенныхъ бурятами. Одна изъ этихъ дачъ въ 47.300 дес., изъ которыхъ  $\frac{2}{3}$ , состоитъ подъ лѣсомъ, расположена по р. Удѣ и притокамъ ея, а также по оз. Шерагулу (Орику), Кундую и пр. Въ этой дачѣ расположено самое крупное селеніе землицы, Солонцы, на р. Кундуѣ, близъ впаденія ея въ Уду, въ 30 вер. къ ю. отъ Нижнеудинска, состоящее изъ 82 хозяйствъ и 346 жит., а также улусы: Кушунскій, на Кундуѣ, въ 3 вер. отъ Солонцовъ (35 хозяйствъ и 163 жителей); Порогскій, на Удѣ, въ 12 вер. отъ Солонцовъ (32 хозяйства и 142 жителей); Шерагульскій, на Шерагулѣ, въ 27 вер. отъ Солонцовъ (6 дв. и 28 жит.) и Манкуту-булукскій, въ 10 вер. выше послѣдняго, по р. Оралу (или Неоралуту) (22 хозяйства и 90 жит.). Другая дача Нижнеудинской землицы расположена по р. Іѣ и занимаетъ въ себѣ до 43.400 дес., на ней расположены: на р. Іѣ дер. Адонская (21 хозяйство и 130 жит.) и улусы: Евдокимовскій, Шенайскій, Кунугскій и Колыгейскій, на Іѣ, и деревенька Табарсановская на Ихѣ; всѣ эти улусы и деревушки имѣютъ каждая отъ 5 до 18 хозяйствъ.

Каждое изъ селеній и улусовъ пользуются нѣкоторыми изъ своихъ угодій отдѣльно. Пашни черезполосны только у с. Солонцовъ съ смежнымъ Кунгунскимъ улусомъ, отдѣльные выгоны въ первой дачѣ имѣютъ только наиболѣе отдаленныя отъ главнаго селенія улусы Шебартинскій и Манкуту-булукскій. Во второй (Іѣской) дачѣ черезполосныя пашни имѣютъ дер. Адонская, Колыбская и улусы Кушукскій и Шенайскій, послѣдніе улусы пользуются сообща выгонами и покосами, всѣ же остальные поселки Іѣской-дачи отдѣльно. Пользованіе лѣсомъ, въ обѣихъ дачахъ, свободно и даже переходитъ черезъ ихъ границы.

Расселеніе жителей Нижнеудинской землицы до сихъ поръ окончательно не завершилось. Главная причина тому въ томъ, что здѣшніе буряты, находясь въ переходномъ состояніи отъ кочеваго быта къ осѣдлому, подыскиваютъ себѣ и до сихъ поръ удобныя для земледѣлія пространства среди болотъ и тайги, которыми Нижнеудинская земляца изобилуетъ. Повидимому здѣшніе буряты занимали первоначально степныя части территоріи нынѣшней Тулуновской волости, отъ которыхъ ихъ земляца и получила у первыхъ русскихъ переселенцевъ названіе «Степной землицы», но послѣдствіемъ были стѣснены и загнаны въ тайгу и болота по рр.



Иѣ и Удѣ, входящія въ составъ нынѣшней Нижнеудинской земли. Даже еще въ 1860 г. на нынѣшнюю лѣсную землю были выселены 32 бурятскія семьи съ низовьевъ р. Уды, земля которыхъ поступило въ казачье владѣніе. Семьи эти отчасти приселились къ существовавшимъ уже на земляхъ бурятскимъ поселкамъ, отчасти образовали новыя. Такъ 25 лѣтъ тому назадъ часть семей, выйдя изъ улуса Порогъ, образовала новый улусъ Орикъ на рѣкѣ этого имени (верховье Шерагула), но найдя, что хлѣба въ мѣстности по р. Орику вымерзаютъ, а слѣдовательно мѣстность для земледѣлія неудобна, разбрелись по разнымъ улусамъ, и Орикъ окончилъ свое существованіе. Улусъ Шерагульскій также оканчиваетъ свое существованіе. Губительныя горячки истребили большую часть населенія, а остатки его разбредаются. За то улусъ Мункутубуйскій, основанный лѣтъ 40 тому выходцами изъ селенія Порогъ, попалъ на удобное мѣсто и развивается, также какъ недавно основанный улусъ Табарсанскій и заимка Катарбейская. Все населеніе Нижнеудинской земли причисляется къ разряду осѣдлыхъ инородцевъ, но самыя селенія ихъ, называясь то селеніями, то улусами, представляютъ дѣйствительно переходъ отъ полукочевыхъ улусовъ къ осѣдымъ селеніямъ, а жители этихъ представляютъ то почти великорусскій типъ, какъ напр. въ селѣ Солонцы, гдѣ живутъ совершенно по крестьянски, то чисто бурятскій, со всѣми рѣзкими особенностями его быта: лѣтниками, юртами и т. п.

Во всей Нижнеудинской земли 256 дворовъ, 402 жнл. строенія, 1.120 коренныхъ жителей об. п. (585 м. п.), съ посторонними вѣдомству 1.170 (610 м. п.). Народонаселеніе земли со времени X-ой ревизіи въ 30 лѣтъ прирасло на 12 %, но приростъ этотъ объясняется приселеньемъ, такъ-что естественнаго прироста населеніе почти недало за этотъ періодъ. Въ числѣ жителей въ рабочемъ возрастѣ 570 (286 м. п.). Хозяйствъ 238; изъ нихъ съ 1 работникомъ 169, но въ 39 изъ нихъ имѣются подростки, съ 2 работниками 42, съ 3 и болѣе 8. Въ 19 хозяйствахъ совсѣмъ нѣтъ работниковъ, но въ 8 изъ нихъ есть подростки. Въ числѣ жителей грамотныхъ, полуграмотныхъ и учащихся только 23.

Земель въ непосредственномъ пользованіи жителей, кромѣ лѣсовъ, 12.300 дес., т. е. по 21 дес. на душу м. п., по 42 на взрослого работника и по 52 на хозяйство. Пахатныхъ земель 2.670 дес., изъ коихъ засѣвается 53%, такъ-что посѣвовъ приходится по 2 1/2 дес. на душу м. п., по 5 на взрослого работника, по 6 на хозяйство. На каждыя 100 дес. посѣва приходится ржи 70 (62 озимой,

ярицы), 17 овса, 3 пшеницы, 9 ячменя. Чистый сборъ хлѣба: ржи 44, овса 49, пшеницы 38 пуд. съ десятины. Пропорція лѣсныхъ росчистей къ пашнѣ 13½ 0/0, что указываетъ на постепенное развитіе земледѣлія.

Луговыхъ земель болѣе 9.400 дес. Луга по Удѣ, Іѣ и Ихѣю хорошаго качества, поросли пыреемъ, пострѣломъ и горошкомъ. По Іѣ есть и степные луга. Около селенія есть и утуги, составляющіе болѣе 10% усадебныхъ земель. Скота жители Нижнеудинской земли содержатъ: лошадей 1.280 (970 рабочихъ), крупнаго рогатаго скота 1.330, мелкаго 1.700 головъ. Рабочихъ лошадей приходится на работника 3½, всѣхъ лошадей на хозяйство до 5, крупнаго рогатаго скота 5, мелкаго 7 головъ.

Лѣсовъ въ дачахъ земли 67.300 дес. Лѣсъ состоитъ изъ сосны, березы и ели. Лѣса вообще очень много и близко отъ поселковъ, но сбыта ему нѣтъ никакого. Мѣстъ подъ расчистку еще очень много. Промыслы между жителями земли очень развиты, такъ какъ 96% всѣхъ взрослыхъ работниковъ земли заняты, кромѣ земледѣлія и скотоводства, еще и промыслами. Изъ этихъ промысловъ значеніе имѣетъ только звѣроловство и охота, которыми занимается 162 человѣка и рыболовство, которымъ занимаются 25 человѣкъ.

Городъ Нижнеудинскъ (54°55'22" с. ш., 116°41'33" в. д.) расположенъ на пересѣченіи Большаго Сибирскаго тракта р. Удою, на правомъ берегу этой рѣки, въ 481 вер. къ с. з. отъ Иркутска. Рѣка Уда имѣетъ здѣсь 50 саж. ширины, мѣстность живописна, окружена скалистыми горами; на лѣвомъ берегу Уды находится входящая въ составъ города Подгородная слобода. На мѣстѣ нынѣшняго города въ 1652 году возникло Удинское зимовье, а въ 1664 году построенъ Удинскій острогъ для сбора ясака съ бурятъ, изъ которыхъ состояло въ то время исключительно мѣстное населеніе. Хотя острогъ въ 1783 г. былъ объявленъ городомъ подъ именемъ Нижнеудинска, но еще въ 1800 г. въ этомъ городѣ было только 100 жит., а въ 1822 г. при переименованіи Нижнеудинска въ окружный городъ 412 жителей. Кисло это возрастало въ теченіи нынѣшняго вѣка въ слѣдующихъ цифрахъ: въ 1835 г., въ городѣ было уже 800 жителей, въ 1851 г. 1990, въ 1868 г. 3000, въ 1890 г. 4000 (1990 м. п.). Въ числѣ жителей дворянъ 53 (23 м. п.), духовнаго сословія 17 (3 м. п.), купцовъ 22 (12 м. п.), мѣщанъ 3032 (1294 м. п.), крестьянъ 46 (16 м. п.), казаковъ 244 (136 м. п.), военныхъ сословій 305 (270

м. п.), инородцевъ 21 (9 м. п.), ссыльныхъ 258 (190 м. п.). Огромное большинство жителей принадлежит къ православному исповѣданію, но въ городѣ есть до 70 католиковъ, до 70 магометанъ, болѣе 50 евреевъ и 20 шаманствующихъ. Домовъ въ городѣ около 550, почти исключительно деревянныхъ. Церквей въ городѣ 3 (2 каменныхъ), торговыхъ заведеній 50, въ т. числѣ питейныхъ заведеній, погребовъ и винныхъ складовъ 25. Оборота всѣхъ торговыхъ заведеній составлялъ въ 1890 г. свыше 230 тыс. руб. Фабрикъ и заводовъ не было. Въ городѣ есть 3 школы съ 100 учащимися м. п. и 37 ж. п., больница на 20 кроватей, съ числомъ поступленій въ 1890 г. свыше 100 человекъ и смертностью 6%. Городскіе доходы въ 1890 г. простирались до 14 тыс. руб. Городскія земли Нижнеудинска составляютъ 4 тыс. дес., но сверхъ того отведенныхъ за оброкъ мѣщанамъ города до 19.350 дес., въ т. числѣ 15.500 дес. лѣса. Всѣ эти городскія земли образуютъ обширную межевую дачу, пересекаемую Большимъ Сибирскимъ трактомъ и расположенную между Алзайской и Кимильтейской волостями. Въ 1890 у жителей Нижнеудинска подъ посѣвомъ было 2620 десят., съ которыхъ снято ржи 5620 четвертей (въ т. числѣ ярицы 94 четв. г.), овса 5830 четв., пшеницы 600, ячменя 620 четв., картофеля 580 четв. Такимъ образомъ на душу м. п. Нижнеудинскихъ мѣщанъ приходится по 2 дес. пашни, что, при отсутствіи фабрикъ и заводовъ въ городѣ, прямо указываетъ, что населеніе Нижнеудинска занимается по преимуществу земледѣліемъ и самый городъ есть пока ничто иное, какъ крупное земледѣльческое населеніе на Большомъ Сибирскомъ трактѣ.

**Примѣчаніе 7-ое. Саянское нагорье между верховьями рѣкъ  
Оки и Вирюсы.**

Чтобы связать наши дополненія о восточной части Саяна съ дополненіями къ Алтайско-Саянской системѣ, вышедшія въ свѣтъ въ 1877 году, намъ необходимо разсмотрѣть еще одинъ отрѣзокъ интересующаго насъ нагорья, это именно отрѣзокъ, заключенный между верховьями рѣкъ Бирюсы и Оки. Этотъ отрѣзокъ безъ сомнѣнія долженъ имѣть громаднѣйшій интересъ, такъ какъ въ немъ берутъ начало такіа большія рѣки какъ Ія, притокъ Оки, и Уда притокъ Ангары, но къ сожалѣнію наши свѣдѣнія объ этомъ отрѣзкѣ крайне скудны. До снаряженія упомянутой выше Саянской экспедиціи мы объ этой мѣстности почти ничего не знали. Экспедиція, выйдя изъ Окинскаго караула, первая прошла по сѣверному склону Саяна черезъ верховье Іи въ Удинскій караулъ (53°46' с. ш., 114°42' в. д., 4600' н. ок.), расположенный при слияніи рѣкъ Хара-Бурень съ Удой, затѣмъ пошла вверхъ по Удѣ, протекающей здѣсь параллельно Саяну, достигла верховья этой рѣки и, поднявшись по рч. Джелга-Мунго, переправившись черезъ Саянъ въ предѣлы Китайской имперіи черезъ перевалъ Мустагъ-дабанъ. Но къ сожалѣнію мы вовсе не имѣемъ въ печати описанія маршрута Саянской экспедиціи въ данной мѣстности. Линія маршрута на основаніи приложенной къ статьѣ Ячевскаго небольшой карты, нанесена на 40-верстную карту Пограничной полосы Азіатской Россіи, нанесены также и опредѣленные экспедиціей въ данной мѣстности гипсометрическіе пункты. Но къ счастью мы все же въ состояніи хоть нѣсколько словъ сказать объ одномъ мѣстѣ интересующаго насъ отрѣзка Саяна, благодаря во первыхъ замѣтки Крыжина <sup>1)</sup>, переваливавшего черезъ Саянъ на пути отъ р. Бей-кема въ Красноярскъ, а затѣмъ и благодаря напечатанному въ 1888 году предварительному отчету геологической части Саянской экспедиціи, принадлежащему Ячевскому <sup>2)</sup>, отъ котораго мы и заимствуемъ слѣдующее описаніе. Главными вопросами, къ разрѣшенію которыхъ стремится Ячевскій, это вопросъ о геологическомъ составѣ и возрастѣ Саянскаго хребта, вопросъ о характерѣ, распространеніи и эпохи вулканической дѣятельности

<sup>1)</sup> Крыжинъ, Труды Сиб. Экспед. 1864 г. Матем. Отд. стр. 93—94.

<sup>2)</sup> Ячевскій, Изв. В.-Сиб. Отд. И. Р. Геогр. Общ. Т. XIX, 1888 г. № 1.

въ Саянѣ и наконецъ вопросъ о распространеніи и слѣдахъ въ немъ ледниковой дѣятельности. Экспедиція пересѣкла хребетъ въ трехъ пунктахъ. О перевалѣ по дорогѣ изъ Хангинскаго караула къ берегамъ оз. Косогола отчасти уже говорилось выше, отчасти будетъ говорено при описаніи оз. Косогола. О второмъ, т. е. Восточномъ перевалѣ, тоже уже говорилось. Остается здѣсь сказать о третьемъ перевалѣ съ верховьевъ Уды въ долину р. Кирлыгоя.

Поднявшись по правому притоку Уды, рѣкѣ Желга-Мунго, экспедиція, переходя Саянъ, вступила въ проходъ, извѣстный на картахъ подъ именемъ Торосъ-дабанъ или Мустагъ-артъ (6944' н. ок.). Хребетъ здѣсь гораздо шире, чѣмъ въ Восточномъ перевалѣ, гдѣ подъемъ довольно пологій, а спускъ идетъ прямо по долинѣ рѣки Тенгиза; между тѣмъ подъемъ съ южной стороны на Мустагъ-артъ весьма крутой, а спускъ представляетъ почти вертикальную стѣну вышиною въ 1180'. Вдоль хребта текутъ двѣ рѣки: съ сѣверной стороны упомянутая выше Желга-Мунго, а съ южной тоже упомянутый выше Кирлыгой системы р. Бей-кема. Поразительный видъ представляется зрителю, стоящему на высокомъ скатѣ праваго берега Кирлыгоя. Передъ нимъ протягивается въ направленіи съ с.-з. на ю.-в. черная правильно-призматическая масса повидимому съ вершиннымъ угломъ въ 30—40°, поднимающаяся надъ уровнемъ рѣки не менѣе какъ на 2296'. Весь склонъ массива, обращенный къ Кирлыгою, изрытъ неглубокими прямыми рывтинами, а гребень образуетъ правильную зубчатую линію.

Собственно при пересѣченіи Саяна въ данномъ мѣстѣ приходится переходить три перевала. Первый—упомянутый выше Мустагъ-артъ изъ долины Желга-мунго въ долину Кирлыгоя, далѣе югъ, между долинами рѣкъ Киши-кхема и Ташты-кхема второй перевалъ, называемый Салтаеты-артъ (7072') и наконецъ третій между долинами рѣкъ Ташты-кхемомъ и Аксекомъ (7242'). Упомянутые три перевала окружены горами почти одинаковой высоты, сколько возможно судить по глазомерному опредѣленію. Далѣе же перевалы между слѣдующими долинами притоковъ Бей-кема значительно ниже. Такъ перевалъ Манасъ 5510', высота горъ, окружающихъ долину Хамсары 3280—3600'. Такимъ образомъ южная часть граничнаго хребта представляется на протяженіи около 30 верстъ отъ Мустагъ-арта до Ташты-арта мощнымъ массивомъ одинаковой приблизительно высоты. Подобное наблюдается и по разрѣзу черезъ Восточный перевалъ. Тамъ

ширина массива одинаковой высоты тоже от 25 до 30 верстъ. И тамъ весь массивъ перерѣзанъ продольными и поперечными долинами.

Необходимо еще замѣтить, что на перечисленныхъ перевалахъ Ячевскому удавалось находить слѣды ледниковъ, подобно тому какъ и весь сѣверный склонъ Саяна между Восточнымъ переваломъ и Мустагъ-дабаномъ свидѣтельствуетъ въ пользу бывшихъ тамъ ледниковъ. На сѣверномъ склонѣ Ташты-арта и таковомъ же Мустагъ-арта имѣются и нынѣ еще, по свидѣтельству Ячевскаго, небольшія ледяныя поля.

Крыжинъ прошелъ тѣмъ-же переваломъ. Отъ Бейкема онъ достигъ глубокой р. Хамсары, имѣющей однако же не большое паденіе и потому доступную для переправы на плотахъ. Долина Хамсары поросла густымъ хвойнымъ лѣсомъ, но отъ Хамсары и до р. Хатаръ-сука пришлось снова идти по тундрѣ. Достигнувъ упомянутой рѣки, Крыжинъ поднялся по ней на Саянъ, который въ данномъ мѣстѣ имѣетъ уже нѣсколько иной видъ чѣмъ въ верховьяхъ Бейкема: «вмѣсто широкихъ, огромныхъ массъ камней здѣсь возвышаются крутые высокіе пики; безчисленное множество горныхъ ручьевъ течетъ на подобіе водопадовъ подъ глетчерами и составляетъ истоки Хатаръ-сука, Сорука, Ташты-кхема, Киши-кхема и Кирыгоя—правыхъ притоковъ Хамсары». Крыжинъ опредѣлилъ высоту въ двухъ пунктахъ: на водораздѣльномъ хребтѣ между Сорукомъ и Киши-кхемомъ (7330' н. ок.) и затѣмъ на перевалѣ Мустагъ-дабанъ (7400' н. ок.). Высшія точки Саянскаго хребта не превышаютъ въ данной мѣстности 10000' н. ок., такъ какъ нигдѣ Крыжинъ не наблюдалъ снѣговой линіи. Вѣроятно и тутъ такъ и на Мунку-Сардыкѣ снѣговая линія находится на высотѣ отъ 10000 до 11000 фут. н. ок. Спустившись въ долину Джелга-Мунго, Крыжинъ по ней прошелъ 15 верстъ до ея впаденія въ Уду (высота этой мѣстности оказалась 4880' н. ок.), повернулъ вверхъ по Удѣ и достигъ сперва устья р. Хатаны, отстоящей отъ устья Джелга-Мунго въ 10 верстахъ, а затѣмъ, поднявшись по ней, онъ достигъ верховьевъ р. Морхой, откуда по очень удобному проходу онъ дошелъ до р.р. Камышкинъ-Огоя и Беселъ системы Бирюсы; по этой послѣдней уже не трудно было ему добраться до Бирюсинскихъ пріисковъ.

Вотъ и все, что мы пока можемъ сказать объ этомъ интересномъ отрѣзкѣ.



## Приложеніе къ 1-ой части.

Списокъ высотъ, относящихся къ описанному району, по вычисленіямъ начальника Саянской экспедиціи подполковника Бобыря <sup>1)</sup>.

Названіе мѣстъ и урочищъ.	Высота въ футахъ.
<i>Отъ перевала Мустагъ-дабанъ до Окинскаго караула.</i>	
Долина Джелга-Мунго вблизи спуска съ Мустагъ-арта . . . . .	5740
Долина р. Уды у устья р. Джелга-Мунго . . . .	4620
Долина р. Уды въ 4 <sup>1/2</sup> верстахъ выше рч. Хонда.	4580
Долина р. Уды у выхода изъ ущелья рч. Нян-дарма . . . . .	4500
Долина р. Уды у р. Сорлыгой . . . . .	4370
Перевалъ между рч. Сардагой и Тазой черезъ горы гѣв. берега р. Уды . . . . .	6290
Окинскій караулъ . . . . .	3030
Долина Хара-Бурень вблизи рѣчки Хара-Нохой. . .	3190
Долина Хара-Бурень у устья р. Дугульма . . . .	3500
Долина Хара-Дургумжа въ ур. Саганъ-Шолута . . .	3760
Долина Хара-Дургумжа у рч. Бельгиръ-Джалга . . .	4020
Перевалъ на перевалѣ Дургумжа . . . . .	5540
Перевалъ Дургумжа между системами р. Уды и Ин.	5660
Долина р. Одокъ-Сойникъ у устья рч. Хара-Угунъ.	5330
Перевалъ Арчкуль . . . . .	4940
Перевалъ Садъ-дабанъ (между рѣками Утхумъ и Іа).	5650
Перевалъ черезъ р. Хи-аю, у ея впаденія въ р. Ію.	4540
<sup>1)</sup> Бобырь, Зап. Военно-Топограф. Отд. Генер. Штаба. XLIV, Приложение VIII.	



Названіе мѣстъ и урочищъ.	Высота въ футахъ.
Р. Іа, у впаденія руч. Бугуте . . . . .	4810
Перевалъ Курукты-дабанъ (между рѣками Іа и Хойтъ-Аха) . . . . .	5380
Озеро Курукты . . . . .	5300
Р. Хойтъ-Аха въ 3 верст. выше устья рч. Тыр- гитой . . . . .	4850
Р. Аро-Сойлыкъ въ 3 верст. выше впаденія въ р. Хойтъ-Аху . . . . .	5620
Предѣлъ распротр. древесн. раст. на перевалѣ. Унугунъ-Хоншоръ со стороны рч. Аро-Сойлыкъ.	6590
Перевалъ Унугунъ-Хоншоръ (между рѣками Хойтъ- Ахой и Окой) . . . . .	7200
Предѣлъ распротр. древесн. раст. на перевалѣ Унугунъ-Хоншоръ въ сторонѣ рч. Убуръ-Сой- лыкъ . . . . .	6810
<i>Между Мондинскимъ миссіонерскимъ станомъ и переваломъ Тенгизъ-дабанъ.</i>	
Урочище Садзай-Буса, за р. Аирханъ, прит. р. Иркута . . . . .	4740
Сліяніе р.р. Бѣлаго и Чернаго Иркутовъ . . . . .	5180
Предѣлъ распротр. осины на Нуху-дабанѣ . . . . .	5970
Первая вершина Нуху-дабана . . . . .	6410
Нуху-дабанская часовня . . . . .	6400
Предѣлъ распротр. древесн. раст. на Нуху- дабанѣ . . . . .	6990
Высшая точка перевала Нуху-дабана. . . . .	7450
Р. Ока у астроном. пункта вблизи р. Ишунды . . . . .	6170
Астрономическій пунктъ у р. Ишунды . . . . .	6340
Предѣлъ распротр. березы въ дол. Оки . . . . .	5850
Ока у Норинъ-Хоройскаго караула . . . . .	5250
Р. Хайгасъ, въ долину Оки . . . . .	4960
Устье р. Буксоа . . . . .	5100

Названіе мѣстъ и урочищъ.	Высота въ футахъ.
Р. Баштакъ въ долині Оки . . . . .	5050
Сліяніе р.р. Тустука и Сороки . . . . .	4950
Бродъ черезъ Сороку въ дол. Оки. . . . .	4950
Урочище Хара-нуръ-голь въ дол. Оки . . . . .	4940
Ур. Хужартей-Уга . . . . .	4770
Р. Ока у брода Кундулунъ-Омонъ . . . . .	4720
Р. Дибн въ 100 саж. отъ устья . . . . .	4720
Ока у брода передъ р. Орликъ. . . . .	4700
Устье р. Орликъ. . . . .	4510
Ока противъ устья Тиссы. . . . .	4570
Окинскій мисс. станъ . . . . .	4340
Дол. Оки въ урочищѣ Ери-урдо-желга . . . . .	4390
Перевалъ Бурятъ-дабанъ . . . . .	5880
Тисса у. руч. Жаглокъ . . . . .	4600
Тисса противъ руч. Сара-ханръ. . . . .	4920
Оа. Дозоръ-норъ у истока Тиссы . . . . .	5010
Терраса дол. р. Цаганъ-голь у распада Хойтогой- той-желга и пред. распротр. осины и березы. . . . .	5720
Р. Цаганъ-голь противъ р. Зунъ-голь . . . . .	6170
Р. Цаганъ-голь противъ р. Гужиртай . . . . .	6370
Пред. распр. древ. раст. на перевалѣ между р.р. Цаганъ-голомъ и Обо-голомъ. . . . .	6850
Альпійское оз. на перевалѣ . . . . .	7390
Перевалъ между р.р. Цаганъ-голомъ и Обо-голомъ. . . . .	7500
Астроном. пунктъ на прав. берегу р. Обо-гола . . . . .	6750
Перевалъ Тенгизъ-дабанъ. . . . .	6940
<i>Отъ р. Сороки до Вознесенскаго винокур. завода.</i>	
Дол. р. Тустукъ у юртъ на прав. берегу рѣки . . . . .	5000
Дол. р. Тустукъ, противъ распада Гунзугей . . . . .	5180
Дол. р. Тустукъ противъ ущелья Хохюръ . . . . .	5930
Перевалъ Бото-голь (Батынъ-дабанъ). . . . .	7460
Р. Батынъ-голь противъ распада Дабани-желга. . . . .	5500
Р. Хончинъ, у устья рч. Жоотей . . . . .	4830

Названіе мѣстъ и урочищъ.	Высота въ футахъ.
Р. Урикъ въ 1 верстѣ ниже сліянія р.р. Хончинъ и Хорожь . . . . .	3410
Р. Урикъ у 1-аго брода за рч. Ионхорма . . .	3200
Р. Урикъ у рч. Заголь-Шулбугунъ . . . . .	2880
Р. Урикъ у устья р. Хоя-голь . . . . .	2660
Р. Урикъ у горы Доде-Уготе . . . . .	2400
Р. Урикъ противъ распада Палашанъ . . . . .	2340
Р. Урикъ у займки Гужиръ . . . . .	2260
Займка на рч. Иолхой, прав. прит. Урика . . .	2120
Переваль черезъ холмы Углай . . . . .	2700
Переваль черезъ Шолутскіе холмы . . . . .	2870
Юрты на руч. Абиъ, притокъ Бѣлой . . . . .	1830
Вознесенскій винокур. заводъ . . . . .	1760
<i>Отъ ст. Быстринской до Мондинскаго мисс. стана.</i>	
Быстринская станція . . . . .	2370
Р. Иркутъ при устьѣ р. 3-й Тибельти . . . . .	2310
Торская котловина у улуса Хякту. . . . .	2310
Торская степная дума . . . . .	2360
Село Хара-Гужиръ . . . . .	2440
Переваль черезъ Бычью гору . . . . .	2940
С. Тунка . . . . .	2500
Р. Иркутъ у Жимыгитской переправы . . . . .	2470
Р. Хорбятъ (пересѣченіе дорогой). . . . .	2560
С. Шимки . . . . .	2600
Р. Большой Зангисанъ. . . . .	3060
Туранскій караулъ . . . . .	2920
Ур. Нуръ-Кутуль. . . . .	3460
Долина р. Бортой у юртъ . . . . .	3420
3-й бродъ черезъ руч. Боректуй (Бортой) . . .	4270
Хара-дабанъ . . . . .	5310
Оз. Холбо-нуръ . . . . .	4880
Мондинскій мисс. станъ . . . . .	4510
Обо-сарамъ у пограничныхъ обо . . . . .	6110

**B.**

Бага-Тымекинъ, р. 283.  
Бадайнское, с. 341, 433, 437.  
Бадарановская, дер. 562.  
Бадарская, д. 571.  
Бадархонская, землка. 561.  
Бадархонский, родъ. 498, 499.  
Ваероновская, рч. 552.  
Ваероновское, с. 558.  
Ваероновское, с. общ. 558—559.  
Ваероновская, станція. 542, 552.  
Важеевское, оз. 510.  
Важей-горхонъ, р. 510.  
Важиръ, р. 408.  
Важирская, дер. 409.  
Вайкинский, клучъ. 108.  
Вавлаши, дер. 148, 453.  
Валаганский, округ. 465.  
Валаганское, инородч. вѣд. 407, 415—417, 460—464.  
Валаганская, инородч. дума. 408.  
Валангиртуй, р. 334.  
Валдуйская, падь. 876.  
Вальдеруны, мѣстность. 476.  
Варлунъ, с. 576.  
Варлунское, с. общ. 576.  
Варолдаевский, родъ. 411.  
Варунъ-Вугутый. 69.  
Варунъ-Вугутыйский, голецъ. 165.  
Варунъ-хухей. 106.  
Вартохай, рч. 182.  
Вархатова, дер. 388, 443.  
Ваушевский, выселокъ. 453.  
Вахтаевый, улусъ. 413.  
Ваэская, дер. 560.  
Ваянды, дер. 560.  
Вей-Кемъ, р. 592.  
Вересовый, островъ. 154.  
Вилинтуйма, р. 296.  
Вилинтуймское, с. 307, 449.  
Вилюнекъ, рч. 35.  
Виротъ, рч. 412.  
Вирюса, р. 541, 552, 553, 591.  
Вирюса, с. 557.  
Вирюсинская, станція. 553.  
Вирюсинское, с. общ. 557—558, 559.  
Вишехинъ, рч. 110, 111.  
Вишехинский, голецъ. 111.  
Вогатыри, утесъ. 536.

Вогдашна, р. 187, 188, 331.  
Во-горхонъ, р. 69, 472.  
Вогрой-желга, рч. 254.  
Воднакъ, рч. 297.  
Воже, оз. 323.  
Возовская, дер. 448.  
Волдожъ, 296.  
Вольшая Глубоная, р. 143.  
Вольшая Быстрая, р. 110, 114.  
116, 126.  
Вольшая Завара, р. 143.  
Вольшая Медвѣжья, р. 144.  
Вольше-Еленское, с. 307, 448.  
Вольше-Жилкина, дер. 448.  
Вольше-Разводниковое, с. 457.  
Вольшой Булукъ, р. 186, 187.  
Вольшой Жедой, р. 296.  
Вольшой Кутулникъ, р. 389.  
Вольшой Нарынъ, р. 332.  
Вольшой Сарамъ, котловина. 109.  
Вольшой Сиверъ, гора. 109.  
Вольшой Тымелникъ, р. 286.  
Вольшой Укулъ, рч. 586.  
Вольшой Хонголкой, р. 228.  
Ворикова, дер. 558.  
Ворохалоулъ, рч. 50.  
Ворохтуй, рч. 61.  
Ворохтуйское, оз. 61.  
Вортой, мѣстность. 480.  
Восунъ, голецъ. 118.  
Восунский, ключъ. 112.  
Вотуголъ, р. 257, 260, 276, 277, 311.  
Вотугольскій, голецъ. 256.  
Вотуголь-зунъ-желга, рч. 260, 263.  
Во-шаманъ, см. Во-горхонъ.  
Вутута, р. 43.  
Вутута. 59.  
Вударикъ, р. 36.  
Вукасъ-нуръ, оз. 27.  
Вукомя, р. 512.  
Вукоунъ, см. Вукусунъ.  
Вукусунъ, рч. 12.  
Вудай. 337, 339.  
Вуданъ, см. Вудай.  
Вулгунъ-болдожъ, рч. 176.  
Вулукъ, р. 44, 244, 290.  
Вулутскій, родъ. 408.  
Вургень-желга, рч. 107.  
Вуретская, дер. 484.  
Вуринская, дер. 583.  
Вуруновое, с. общ. 583.  
Вурлицкий, порогъ. 143.  
Вурунтуй, р. 509.  
Вурунтуй, урочище. 507.  
Вурунтуйскія, озера. 509.  
Вурундуи, рч. 296.  
Вурунъ-гологой, переваль. 509.  
Вурухтаи, р. 311.  
Вурухтунская, дер. 570.  
Вура, рч. 583.

Вурятъ-голъ, р. 514.  
Бутайскій, участокъ Иканатскаго рода.  
413.  
Бухай-хардыкъ, гора. 92.  
Буха-ноинъ-хыптыкъ, мѣстность. 90.  
Буштукъ, р. 513.  
Быкотская, дер. 412.  
Быкотскій, родъ. 412.  
Быстрая, см. Большая Быстрая.  
Быстрая (прит. Битоя), р. 289, 291, 314.  
Быстриновская, станция. 119, 508.  
Быстриновое, голцы. 113.  
Быстриновое, оз. 114, 126.  
Бычьа, гора. 97, 98, 508.  
Бѣлая, р. 309, 310, 317, 341.  
Бѣлоопытка, р. 176.  
Бѣлый Ирнукъ. 40, 42, 250, 510.  
Бѣльская, вол. 352, 461.  
Бѣльские, альпы. 255.  
Бѣльское, с. 340.

## В.

Введенское, с. 146, 148, 154, 453.  
Введенское, с. общ. 457.  
Введенщина, см. Введенское.  
Вересовая, р. 365.  
Верхне-Абалайская, дер. 562.  
Верхне-Булайское, селеніе. 426.  
Верхнее, озеро. 222.  
Верхне-Жилкина, дер. 443.  
Верхне-Зиминская, дер. 411.  
Верхне-Мателеева, дер. 412.  
Верхне-Окинское, селеніе. 411.  
Верхний Архутъ, р. 294.  
Верхний Вибой, р. 332.  
Верхний Ишунъ, р. 9.  
Верхний Китой, р. 288, 291.  
Верхний Манутъ, дер. 571.  
Верхний Мойготъ, рч. 141.  
Верхний Таргавай, кл. 310.  
Верхний Хандагайтуй, рч. 69.  
Верхний Хокуръ-горхонъ, р. 60.  
Верхний Хужуртѣй-голъ, р. 199.  
Верхнія Моты, рч. 147, 152.  
Верхняя Тибельти, р. 105, 108, 11.  
Верхняя Хороу-желга, р. 311.  
Вершинскій, улусъ. 412.  
Вѣземная, р. 136, 139.  
Виллюйа, р. 99, 102, 105, 173.  
Воздвиженская, вершина. 234.  
Вознесенскій, винокур. зав. 357.  
Воронина, сопка. 98, 100.  
Воронинъ-дабанъ, гора. 481.  
Восточный, переваль. 20, 507, 519, 590.  
Выгузова, рч. 144.

Г.

Гагриловы лавки, гора. 98.  
 Гагариновская, дер. 328.  
 Гадалей, с. 571.  
 Гадалейское, с. общ. 571.  
 Гагирь-Амань, известность. 254.  
 Ганой. 312.  
 Гарганский, перевал. 511, 518.  
 Гаргань, рч. 10, 13, 255.  
 Гаримъ, 291.  
 Гаринъ-голь. 294.  
 Гжой, р. 321.  
 Голодный Сарань, см. Большой Са-  
 рань.  
 Головиновская, дер. 433.  
 Головиновская, станция. 419.  
 Голуметь, р. 323, 252.  
 Голуметское, с. 352, 390.  
 Голышиха, см. Больш. Быстрая.  
 Горшечница, рч. 180.  
 Гротауха, р. 144.  
 Гудинина, дер. 454, 457.  
 Густо-Громкая, р. 180.  
 Гузай-Арашанъ. 477.  
 Гузирское, с. 103, 172, 485, 506, 515.  
 Гузирей-горхонъ. 514.  
 Гузирь, см. Гузирское с.  
 Гулосный, сарань. 182.  
 Гурбанъ-Вельчиръ, см. Гурбунъ-биль-  
 чиръ.  
 Гурбунъ-бильчиръ, р. 33.  
 Гурей, р. 137.  
 Гуръ, кичъ. 143.  
 Гурьское, селеніе. 424, 427. /  
 Гурь-бурская, налучина. 135. 136.  
 Гурь-буръ. 137.

Д.

Дани-ама, гора. 482.  
 Дани-желга, р. 32.  
 Даниъ, хреб. 108.  
 Дарма, рч. 33, 34.  
 Дашинъ, кл. 99.  
 Демонъ, рч. 7, 312, 314, 315, 317, 318.  
 Демна, рч. 144.  
 Дебори, кочевья. 479.  
 Дига-Мунго, р. 591, 592, 593.  
 Деборъ, р. 249.  
 Дибулдунъ, р. 16, 24.  
 Диг, р. 12, 15, 512.  
 Дебори, кочевья. 479.  
 Дигное, оз. 45, 507, 514, 519.  
 Дигъ-норъ, см. Доворное оз.  
 Дигное, оз. 339.

Домашняя, гора. 153.  
 Дондоголь, р. 518.  
 Доржой, р. 299.  
 Дранца, рч. 181.  
 Дубинский, улусъ. 409.  
 Дулганъ гора. 111.  
 Дучонъ, оз. 244, 245.

Е.

Евдокимовский, улусъ. 587.  
 Ейсый, родъ. 409.  
 Еланъ, хреб. 98.  
 Елатей, часть долины Иркута. 474.  
 Елизаветинский, приискъ. 507, 512,  
 515.  
 Еловская, дер.:  
 1) Вѣльской вол. 356.  
 2) Тункинской вол. 485.  
 Еловка, р.  
 1) Притокъ Иркута. 97, 98, 100,  
 508.  
 2) Притокъ Кытая. 304.  
 3) Притокъ Ангари. 365.  
 Еловский, хреб. 69, 97.  
 Елотский, улусъ. 500.  
 Ельничное, оз. 339.  
 Ендотъ, рч. 323.  
 Ерма, р. 310.  
 Ермановская, дер. 569.  
 Ерханцаъ, см. Ерханцыгъ.  
 Ерханцыгъ, дол. Въземной. 106, 139.  
 Ершова, дер. 454.  
 Елки, р. 593.  
 Ехе-булунъ, см. Вѣлая.  
 Ехе-голь, рч. 298, 294.  
 Ехе-Кирби, рч. 536.  
 Ехе-Ургудей-Хойта-Хардыгъ, го-  
 лець. 93.  
 Ехой, см. Жехой.  
 Ехой-енинъ-норъ, см. Жехой.

Ж.

Жагдонъ, рч. 254.  
 Жаглыгъ, см. Жаглокъ.  
 Жегонъ, р. 513.  
 Жедой, р. 173.  
 Жедонъ, гора. 109.  
 Желхой, р. 512.  
 Жемчугъ, р. 69, 87, 508, 509.  
 Жерголанта, р. 50, 241.  
 Жехой, рч. 9, 58.

Жехой, урочище. 510.  
Жохей-хамръ, р. 59.

### З.

Забайкальская, дорога. 108.  
Забалгарская, дер. 411.  
Заваль, дер. 576.  
Займа Алибера. 260.  
Займанъ, быстрина. 101.  
Зайцевская, дер. 562.  
Завтуй, р. 69, 98.  
Завудейское, улус. 418.  
Залара, р. 365.  
Залариновое, вол. 418—423, 461.  
Замарайна, рч. 29.  
Замвора, рч. 551.  
Замворская, дер. 560.  
Замворская, станция. 551.  
Зангеевский, родъ. 414.  
Зангисаны, р. 65, 476, 508.  
Заусаева, дер. 569.  
Захребетная, рч. 310.  
Заппындыкъ, кл. 240.  
Звѣровъ, кл. 100.  
Зима, р. 465.  
Зиминская, вол. 403—407, 461.  
Зиминская, станция. 38.  
Зиминское, с. 403, 542.  
Зимовная, рч. 310.  
Зодѣ, р. 259, 311.  
Зонъ-Муринъ, р. 94, 96, 98, 102, 105, 107.  
Зубногокъ, рч. 140.  
Зубногоновскій, порогъ. 141.  
Зугулунтѣй-желга, рч. 254.  
Зуевская, дер. 448.  
Зунъ-Вугутый, рч. 69, 70.  
Зунгарскій, родъ. 412.  
Зунъ-голъ, р. 514.  
Зунъ-хухѣй, рч. 105.  
Зырзузунъ, отрогъ. 181, 189, 140.

### И.

Игинтскій, улусъ. 411.  
Игумновскій, трактъ. 114, 116.  
Игинтскій 1-й, родъ. 412, 413.  
Игинтскій 2-й, родъ. 409.  
Илійскій, выселокъ. 581.  
Ильхе-Арашанъ, кл. 476.  
Ильтѣй-дабанъ, 9, 251, 252.  
Ильтѣй-дабанъ-желга, р. 253.  
Ильчи, рч. 117, 128.

Ильчи, р., прит. Вайкала. 208.  
Ильчинская, долина. 116, 238, 240.  
Ильчинскій ключикъ, см. Ильчи (1).  
Ильчинско-Выстриновская, площадь. 116.  
Ильчинско-Мотское, ущелье. 181.  
Ильчиръ, оз. 235, 241, 242.  
Ильчирный Ирхутъ, р. 40, 235, 240, 248, 288.  
Илѣ, рч. 31.  
Ингисейская, долины. 101.  
Ингорга, р. 69.  
Инионентевскій, винокур. зав. 570.  
Иретоное, с. 353.  
Иреть, р. 322, 327, 465.  
Ирку-Гарганъ, р. 249, 250.  
Ирхутъ, р. 6, 39—163, 235, 249, 508.  
Ирхутный Ильчи, см. Ильчи.  
Ирхутскій, округъ. 465.  
Ирленна, р. 315, 331.  
Ихѣ-голъ, рч. 35.  
Ихѣ-горхонъ, рч. 10.  
Ихѣ-жуганъ, кл. 127.  
Ихѣ-жугановская, шивера. 127.  
Ихѣ-угунъ, р. 63, 159, 231, 278, 280.  
Ишунды, р. 507, 510.

### К.

Калбой, р. 327.  
Каменная, р. 365.  
Каменная, с. 387.  
Каменная, рч. 549, 554.  
Каменный балаганъ, см. Шулунъ-ноло.  
Каменистая, рч. 200.  
Камышедъ, выселокъ. 560.  
Камышетва, рч. 551.  
Камышетовая, станция. 542, 550.  
Камышинъ-Огой, р. 593.  
Канге-ула, см. Янгутъ.  
Канча, см. Ханшинъ.  
Капсальскія, горы. 550.  
Карагасиха, протока Удм. 555.  
Караморумъ, рч. 536.  
Каргунайскій, улусъ. 409.  
Карлуй, ущелье. 512.  
Картагонъ, р. 296.  
Карыновская, дер. 411.  
Касьяновская, дер. 433, 434.  
Каторжанна, рч. 147, 152.  
Каторжанскій-камень. 152.  
Кашина, рч. 144.  
Каштанъ, р. 13, 254, 512.  
Кая, р. 150.  
Кекурская, дер. 424, 427.

Киньтей, рч. 411, 465, 542, 580.  
Киньтей, с. 580.  
Киньтейская, вол. 580—586.  
Киньтейское, с. общ. 580.  
Киньтейская, станція. 542, 543.  
Киргизская, станція. 547.  
Киргиз, р. 592, 593.  
Киргизина, рч. 144.  
Киргиз, р. 6, 176, 177, 227, 284, 235, 287—309, 317, 465.  
Киргизия, р. 177, 179, 180, 294.  
Киргизия, альп. 163, 184.  
Киргизское, вв. 305.—306, 460, 461, 463.  
Киргизское, с. 307, 449.  
Киргизия, р. 592, 593.  
Киргизина, дер. 570.  
Киргиз, рч. 582.  
Киргизский, источн. 76.  
Киргизский, улус. 587.  
Киргизская, дер. 587.  
Киргизская, см. Толта.  
Киргиз-дабань, 480.  
Киргизовская, дер. 453.  
Киргизская, дер. 553.  
Киргиз, дер. 36.  
Киргиз, дер. 388.  
Киргизская, станция 419.  
Киргиз, пивера. 143.  
Киргиз, оз. 58.  
Киргизская, ханга, р. 47.  
Киргиз, занка. 557.  
Киргиз, с. 388.  
Киргизина, занка. 555, 556.  
Киргизова, занка. 433.  
Киргизский, см. Хангильский.  
Киргиз-камень, утес. 152.  
Киргиз-яр, тераса. 100, 107.  
Киргиз-яр, дер. 582.  
Киргизовская, станция. 577.  
Киргизовское, с. общ. 577.  
Киргизина, рч. 143.  
Киргиз, оз. 323.  
Киргизовская, дер. 454.  
Киргиз, рч. 96.  
Киргиз-дабань, рч. 96.  
Киргизское, с. 453.  
Киргизское, с. общ. 453, 457.  
Киргиз, р. 365.  
Киргиз, р. 144, 151.  
Киргизская, вол. 575, 580.  
Киргизская, станция. 544, 545.  
Киргизское, с. 575.  
Киргизское, с. общ. 575.  
Киргизский, мнсь. 135.  
Киргизская, рч. 105.  
Киргиз, рч. 98.  
Киргизское, селение. 357.  
Киргиз, ключ. 144.  
Киргизский, хреб. 106, 118, 130.

Кулиция, пивера. 138.  
Култуз, 443, 458, 485, 520.  
Култуновское, с. 307.  
Култуновский-Ильч, р. 117.  
Култуз, рч. 543.  
Кулметский, род. 408, 409.  
Кулмет, дер. 553.  
Кул-горхон, рч. 105.  
Кулдуз, рч. 587.  
Кулдуз-убурз, голец. 245.  
Кулдуз, р. 339.  
Кулдузский, улус. 587.  
Курга, р. 327.  
Кургуз, р. 297.  
Курганская, станция. 546.  
Курганский, улус. 414.  
Курганские—повороты, пелучины, Иржуа. 104.  
Курганский, род. 498.  
Курсава, рч. 176.  
Култуз, 62.  
Култуз, гора. 109.  
Кулдуз, рч. 365.  
Кулдузское, с. 419.  
Кухей-Кулдуз. 49.  
Кушунский, улус. 587.  
Кырен, пелучность. 66.  
Кырен, рч. 473.

## Л.

Лавиновская, дер. 553.  
Лавиновское, селение. 455.  
Лавиновская, дер. 581.  
Лавиновская, станция. 543.  
Лавиновское, с. общ. 581.  
Лавинов, дер. 433, 434.

## М.

Макаровская, дер. 425.  
Мамонцовская, дер. 453.  
Мамонцовское, с. общ. 457.  
Мамонцовщина, дер. 148, 155.  
Малая Выстрая, р. 109, 116, 118, 119, 123.  
Малая Вѣлая, р. 7, 186.  
Малая Глубокая, р. 143.  
Малая Еланка, см. Мало-Еланское.  
Малая Завара, р. 143.  
Малая Ила, р. 31.  
Малая Медвѣжья, р. 144.



Малаттэй хардынь, верш. 245.  
 Мало-Еланское, с. 307, 449.  
 Мало-Разводисная, дер. 457.  
 Малый Вотуголь, р. 277.  
 Малый Вудинь, рч. 186.  
 Малый, Жедой, р. 296.  
 Малый Кунтулинъ, р. 339.  
 Малый Нарынъ, р. 332.  
 Малый Тымелинъ, р. 286, 287.  
 Малый Хонгодой, р. 227.  
 Мальта, см. Мальтинское с.  
 Мальтинская, вол. 481—488, 461.  
 Мальтинское, с. 337, 339, 433.  
 Манея, переваль 592.  
 Мануту-булузовый, улусъ. 587.  
 Мара, рч. 561 (?).  
 Маргасанъ, рч. 107, 110.  
 Маркова, дер. 150, 454.  
 Марская, дер. 561.  
 Мартъ, р. 108, 110, 112.  
 Мартовская, степь. 108.  
 Мартовский, хреб. 108.  
 Мартышкина, падь. 154.  
 Медвѣдова, дер. 454.  
 Меледиха, дер. 455, 457.  
 Мельникова, дер. 454.  
 Миддендорфа, голоць. 21.  
 Миддендорфа, ледникъ. 23.  
 Микроново, с. 560.  
 Мироновское, с. общ. 560—561.  
 Михалева, дер. 454, 457.  
 Могой-горхонъ, р. 500.  
 Мойгановая, дер. 353, 361.  
 Мойготы, рч. 140.  
 Мойготский, порогъ. 141.  
 Мойгу-байсанъ, скала. 482, 484.  
 Молодовская, дер. 454.  
 Монголь-дабанъ. 507, 513.  
 Монгольжикъ, утесъ. 16, 17.  
 Мондиновъ, караулъ, см. Хангинскій  
 караулъ.  
 Мондинскій, миссионерскій станъ. 509,  
 515, 516, 520.  
 Монды, см. Хангинскій караулъ.  
 Морхой, р. 593.  
 Мотская, дер. 131, 147, 324, 424, 427,  
 453.  
 Мотская, излучина Иркут. 146, 147,  
 Мотская, станція. 147.  
 Мотское, расширеніе дол. Иркут. 147,  
 152.  
 Мотское, с. общ. 457.  
 Моты, см. Мотское.  
 Моховая, рч. 552.  
 Муксуть, рч. 536.  
 Мунгуу, рч. 536.  
 Мунгуль, кл. 12.  
 Мунгуль-дабанъ, голоць. 12.  
 Мунку-Будуль, кл. 240, 287.  
 Мунку-засоу, см. Мунку-Сардынь.

Мунку-Саганъ-Хардынь, голоць. 7,  
 203, 213, 215, 218.  
 Мунку-Сардынь, голоць. 2, 55.  
 Мурашево, см. Мураши.  
 Мураши, дер. 571.  
 Мурунъ, см. Хара-Мурунъ.  
 Мурунъ, посалокъ. 485.  
 Муромцева, рч. 144.  
 Муруевскій, родъ. 408, 409.  
 Мустагъ-артъ, см. Мустагъ-дабанъ.  
 Мустагъ-дабанъ, переваль, 591, 592  
 593.  
 Мыгетъ, рч. 365.

## Н.

Найтоголъ, урочище. 510.  
 Налетагунъ, рч. 323.  
 Нарангуновъ, улусъ. 413.  
 Нены, выселокъ. 424, 426.  
 Нижне-Абалавская, дер. 426.  
 Нижне-Булайская, дер. 340, 356.  
 Нижнее, оз. 223.  
 Нижне-Жилина, дер. 443.  
 Нижне-Тыргитейскій, улусъ. 514.  
 Нижнеудинскъ, г. 547, 589—590.  
 Нижнеудинская, землица. 586—588.  
 Нижнеудинская, пещера. 521—538.  
 Нижнеудинскій, округъ. 465.  
 Нижнеудинскій, хребетъ. 547.  
 Нижний Вибой, рч. 332, 333.  
 Нижний Ихэ-нуганъ, рч. 127.  
 Нижний Ишунъ, р. 9.  
 Нижний Китой, р. 289.  
 Нижний Кунтулинъ, р. 339.  
 Нижний Манутъ, дер. 571.  
 Нижний Таргазай, кл. 310.  
 Нижний Хандагайтуй, рч. 69.  
 Нижний Хоуръ-горхонъ, р. 60.  
 Нижняя Моты, рч. 147.  
 Нижняя Тибельти, р. 105, 118.  
 Нижняя Хорой-желта, р. 311.  
 Никитаева, дер. 269.  
 Никольская, рч. 552, 559.  
 Никольское, с. 455, 552, 559.  
 Никутовскій, улусъ. 408.  
 Ниланъ-сарамъ, котловина. 183, 38.  
 Ниланъ-сарамскій, голоць. 184.  
 Нилова, пустынь. 63, 156, 282, 500  
 515.  
 Новоямская, дер. 455.  
 Новый Ажульметъ. 555.  
 Новоръ, часть Саяна. 45.  
 Норинъ-харе, рч. 12.  
 Норинъ-Хоройская, часовня. 507.  
 Норинъ-Хоройскій, караулъ. 18,  
 507, 517.

Юркин-Хоройское, расширение дол.  
Иркут. 12.  
Юсть, рч. 3, 65.  
Юстьский, родъ. 413.  
Нузу-дабанъ, см. Нузу-дабанъ.  
Нузутский, улусъ. 407.  
Нурай-хулъ, мѣстность. 61.  
Нуръ-Бутулъ, урочище. 61, 480, 509.  
Нурхай, дер. 470.  
Нузу-дабанъ, голецъ. 2, 9, 40, 282, 507, 510.  
Обо-норъ, оз. 333.  
Юркинскій, хреб. 545, 546.

## О.

Обо-голь, р. 45, 47, 514.  
Обо-горхонъ, см. Обо-голь.  
Обо-голь, см. Обо-голь.  
Обо-сарамъ, отрогъ. 46.  
Обо, р. 8—39, 277, 510, 511, 512, 513, 592.  
Ойский, миссионерскій станъ. 506, 513, 517, 518, 519.  
Ойский, караулъ. 15, 30, 507.  
Ойское, оз. 8, 510.  
Ойсь, родъ. 408, 413.  
Ойзовская, станция. 551.  
Ойское, дер. 149, 453.  
Ойсь, родъ. 408.  
Ойкинъ-горхонъ, кл. 40, 99, 510.  
Ойъ, р. 7, 190, 331.  
Ойскій, хреб. 5.  
Ойъ, р. 588.  
Ойъ, улусъ. 588.  
Ойъ, р. 512.  
Ой-Шокомуръ, р. 285.  
Ойцева, дер. 328.  
Ой, р. 189, 190, 219, 220, 317, 329, 330.  
Ойнинскій, водопадъ. 198.  
Ойнинскій, голецъ. 7.  
Ойнинъ-гурбунъ-биячиръ, мѣстность. 202.  
Ойровскій, родъ. 414.  
Ой-норъ, см. Ойское оз.  
Ой. 294.

## П.

Панюкова, дер.  
1) на р. Нрети. 328.  
2) на р. Ангартъ. 412.  
Панюны, дер. 454.  
Панюновская, дер. 454.  
Панюнова, дер. 328.  
Панюндъ, дер. 542.

Перфиловское, с. 570.  
Перфиловское, с. общ. 569, 570.  
Песчаная, гора. 117.  
Петропавловская, станция. 577.  
Питаевская, дер. 560.  
Поворотъ, хреб. 544.  
Подгорно-Жилинское, дер. 448.  
Подгородная, слобода. 589.  
Поджумойскій, улусъ. 106.  
Подпорожная, дер. 144.  
Помровская, станция. 577.  
Половинная, дер. 438, 434.  
Порогъ, дер. 537.  
Порогскій, улусъ. 587.  
Посторонне-Кураанское, с. общ. 569, 570.  
Преображенское, станция. 577.  
Провофьевская, дер. 427.

## Р.

Разводниное, с. общ. 454, 457.  
Разгонная, станция. 552.  
Разгонный, выселокъ. 558.  
Разсоха, рч. 181.  
Рубакина, дер. 538.  
Ружникова, дер. 443.

## С.

Савватеевскій, выселокъ. 305.  
Савватьевская, дер. 456.  
Саганъ-голь, р. 514.  
Саганъ-норъ, оз. 510.  
Саганъ-нугунъ, кл. 187, 139.  
Саганъ-угунъ. 99, 105, 172.  
Саганъ-угуномскій, горы. проходъ. 172.  
Саганъ-халръ. 49.  
Саганъ-харъ, р. 218, 219, 220, 221, 222.  
Саганъ-хужиръ, р. 409.  
Саганъ-шолотай, хреб. 92.  
Саганъ-шулуунъ, утесъ. 90.  
Саганъ-шулутай, см. Саганъ-шолотай.  
Сайлоуъ, кл. 30.  
Сайнъ-боинъ, гора. 508.  
Салтаеты-артъ, переваль. 592.  
Самарта, р. 289, 291.  
Самсалтай, рч. 173.  
Сарты, дер. 420.  
Сасалтуй, рч. 99.  
Сахаръ, рч. 92.  
Саянъ, хреб. 44, 86, 107.  
Саянское, подгорье. 464.  
Священная, песчаная гора. 159.  
Сенца, р. 15, 17, 30, 513, 514.

Серебрянка, рч. 127.  
 Силва, р. 512.  
 Сноропский, камень, см. Заваль.  
 Слюдянка, рч. 316.  
 Смоленская, дер. 148, 453.  
 Смоленская, вол. 452—459, 461, 462, 463.  
 Смоленское, с. общ. 457.  
 Смоленщина, см. Смоленская дер.  
 Снѣговая, вершина. 234.  
 Снѣжная, р. 115, 116.  
 Снѣжная, станція, см. Снѣжинская.  
 Снѣжинская, станція. 116, 485.  
 Снѣжинский, улусъ. 116.  
 Снѣжныя, горы см. Ильтѣй-дабанъ.  
 Согонъ, р. 115.  
 Солгонъ, см. Согонъ.  
 Соловцы, дер. 537, 538, 587.  
 Оорожа, р. 14, 277, 507, 512, 513, 517.  
 Сосновскій, руч. 582.  
 Сполишинское, селеніе. 557.  
 Спусовая, рч. 114.  
 Средне-уудайская, дер. 356.  
 Средне-тузейскій, родъ. 408.  
 Средній Иркутъ, р. 40.  
 Средній Ишунъ, р. 9.  
 Средній Кнтой, р. 289, 291.  
 Среднія Моты, рч. 147.  
 Средняя Тибельти, р. 105, 108, 110, 117.  
 Старый Ажульшетъ, дер. 558.  
 Старо-Перезовская, дер. 581.  
 Старо-Перезовское, с. общ. 581.  
 Степная, балагакская дума. 408.  
 Страшный, бродъ. 190, 196.  
 Сусерь-норъ, оз. 8, 40, 249, 510.  
 Сусерь-норъ, см. Сусерь-норъ.  
 Суховская, вол. 438, 446, 448—452, 461, 462, 463.  
 Суховское, с. 448.

## Т.

Табарсановская, дер. 587.  
 Табуновская, дер. 424, 426.  
 Тагархай, рч. 166, 256, 277, 311.  
 Тагархайское, улусы. 166.  
 Тагинская, дер. 410.  
 Тагинский, родъ. 410.  
 Таженга, р. 235.  
 Тайтурна, рч. 340, 475, 488.  
 Тайтурское, с. 432.  
 Тайшетъ, рч. 553.  
 Таланцакъ, р. 105.  
 Талаа, дер. 499.  
 Талаа, рч. 10, 69.  
 Талов, оз. 536.

Талый, кл. 324.  
 Тальская, вершина. 76.  
 Тальцинское, с. 455.  
 Тальянъ, рч. 297.  
 Тамли-бараше, равнина. 475.  
 Тангутъ, р. 408.  
 Тапновская, дер. 427.  
 Таратуй, см. Урта.  
 Тарва, рч. 286.  
 Ташты-аргъ, переваль. 592, 593.  
 Ташты-икемъ, р. 592.  
 Тельма, с. 365, 440.  
 Тельминская, вол. 438, 440—447, 461, 462, 463.  
 Тенгизъ, р. 20.  
 Теплый, нисъ. 135, 143.  
 Терень-голъ, р. 511.  
 Тесса, см. Тисса.  
 Тибельти, дер. 102, 103, 508, 515.  
 Тибельтинская, см. Тибельти.  
 Тибельтинско-Выстрижское, служеб. дол. Иркут. 116, 118.  
 Тисса, р. 15, 19, 512, 514.  
 Титова, дер. 454.  
 Той, 49.  
 Толта, р. 69, 237, 249, 283, 287.  
 Топоронъ, р. 541, 551, 554, 559.  
 Тора, управа. 103.  
 Торосъ-дабанъ, см. Мустагъ-аргъ.  
 Торская, бурятская дума. 507, 508.  
 Торская, котловина. 102.  
 Тоосливая, гора. 118.  
 Тоохильная, гора. 551.  
 Трайтово-Курванское, с. общ. 569.  
 Трайтовый Курванъ, дер. 569.  
 Троицкий, винокур. зав. 420.  
 Туглу-хоше, р. 254.  
 Туготый, рч. 99, 102.  
 Тузуренский, улусъ. 499.  
 Тузуренское, предѣстье. 499.  
 Тулиновская, ст. 545.  
 Тулиновское, с. 575.  
 Тулиновское, с. общ. 575.  
 Тулта, см. Толта.  
 Тултуй, р. 110, 119, 120.  
 Тулунъ, с. 570.  
 Тулуновская, вол. 567—575.  
 Тулуновская, станція. 544, 546.  
 Тулуновское, с. общ. 569, 570.  
 Тулунтай, рч. 122.  
 Тулусуна, рч. 108.  
 Тультерь, см. Толта.  
 Тунна, р. 69.  
 Тунна, с. 70, 78, 79, 469—493, 507, 508, 515, 520.  
 Тунинъ-икинъ-хердыкъ, 164.  
 Тунинъ-нуръ, оз. 240, 241.  
 Тунинская, вол. 461, 462, 463.  
 Тунинская, котловина. 68, 69.

киновная, изгород. управа, см. Тера.  
киновное, альп. 5, 44, 84, 106,  
106, 163, 164, 228.  
киновный, отрог. 68.  
киновное, изгород. вид. 461—464,  
497—506.  
ранъ, дер. 508.  
ранский, караул. 62, 473—479.  
руть, р. 277, 512.  
рутай, рч. 96.  
рутай, рч. 35.  
рута, р. 239, 249, 278, 279, 283.  
рутай, р. 514.  
рутовский, родъ. 410.  
рутовский, родъ. 498, 500.  
ру-Джоборъ, р. 241.

## У.

у-Затхаса, р. 290.  
у-Хонгдой, р. 281, 279.  
у-Хонгдой, выселокъ. 442.  
у-Хонгдой, рч. 189, 380.  
у-Хонгдой, р. 521, 565, 548, 547, 591.  
у-Хонгдой, караул. 594.  
у-Хонгдой, с. 340, 341, 342, 432.  
у-Хонгдой, рч. 192, 380.  
у-Хонгдой, гора. 191.  
у-Хонгдой, рч. 549.  
у-Хонгдой, возвышенность. 549.  
у-Хонгдой, гора. 541.  
у-Хонгдой, станция. 542, 549.  
у-Хонгдой, водопадъ. 549.  
у-Хонгдой, с. 561.  
у-Хонгдой, с. общ. 561.  
у-Хонгдой, выселокъ. 470.  
у-Хонгдой, рч. 69.  
у-Хонгдой, гора. 215.  
у-Хонгдой, гора. 112, 113.  
у-Хонгдой, см. Нильтай-дабанъ.  
у-Хонгдой, гора. 168.  
у-Хонгдой, уступ. 280.  
у-Хонгдой, рч. 99.  
у-Хонгдой, рч. 88.  
у-Хонгдой, р. 364.  
у-Хонгдой-байсанъ, гора. 98, 101.  
у-Хонгдой Малый, рч. 536.  
у-Хонгдой-Хардынь, гора. 110, 177,  
245.  
у-Хонгдой-Хардынь, см. Уаушнь-  
Хардынь.  
у-Хонгдой, рч. 566.  
у-Хонгдой, рч. 93.  
у-Хонгдой, гора. 509.  
у-Хонгдой, караул. 94, 509, 520.  
у-Хонгдой, кочевья. 479.

Урдуголь, рч. 201.  
Урду-Она, р. 31, 83.  
Урны, р. 7, 256, 311, 312, 321.  
Урны-дабанъ. 512.  
Урта. 49.  
Утой-желга, рч. 32.  
Урюмъ-Ханъ, 50.  
Урюмъ-Ханъ, греб. 5.  
Усооль, с. 441.  
Усооль, солес. зав. 371.  
Усть-Кода, дер. 582.  
Усть-Рубахино, с. 561.  
Усть-Рубахиновое, с. общ. 561—563.  
Усть-Тальнинская, гора. 556.  
Усть-Ханхоронский, улу. 408.  
Уту-желга, р. 96.  
Уту-желга, см. Уту-желга.  
Утуль-голь, р. 518.  
Утуль, рч. 113, 114.  
Утуль-Ханъ, станция. 485.  
Утуль-Ханъ, выселокъ. 582.  
Ухаровая, дер. 582.  
Ухтуйская, дер. 404.  
Ушаранга, р. 234, 236, 289, 290.  
Ушанъ, с. 582.  
Ушановое, с. общ. 582.

## Х.

Хагархай, см. Татархай.  
Ханхта, дер. 576.  
Ханхтоное, с. общ. 576.  
Хайдагай-гала, степь. 478.  
Хайзаоз, р. 512.  
Хайремъ, рч. 59, 69, 89, 187.  
Хайремский, холм. 76.  
Хайринъ, р. 59.  
Хайта, р. 389, 352, 357.  
Хайтинское, дер. 357.  
Халагдугорская, гора. 109.  
Хала-угунъ, р. 76, 478, 507, 513, 514.  
Хале-горхонъ, рч. 69.  
Халмаганъ, рч. 295.  
Халу-угунъ, см. Хала-угунъ.  
Хамаръ-дабанъ. 114.  
Хамаръ-дабановая, дорога. 114.  
Хамаръ-дабанский, гора. 113, 114.  
Хамарово, верста. 114.  
Хамсара, р. 592, 593.  
Ханхора, рч. 408.  
Ханхоронский, родъ. 408.  
Ханга, р. 45.  
Ханга-ула, см. Янгитъ.  
Хангинский, караул. 43, 44, 59, 255,  
479, 507.  
Хангинский, перевал. 510.  
Хангинский, родъ. 414.

Ханжирская, дер. 409.  
 Ханшинъ, рч. 7.  
 Хара-байсенъ, гора. 98, 101.  
 Хара-будунъ, рч. 241.  
 Хара-горхонъ, рч. 509.  
 Харагуширъ, рч. 14.  
 Харагуширъ, см. Гуширское селеніе.  
 Харагунъ. 105.  
 Хара-дабанъ. 61, 481, 509.  
 Харадусса, р. 28, 30.  
 Хара-желгой, рч. 61.  
 Хара-Муринъ, р. 115.  
 Харандашинъ-барунъ-желга, рч. 258, 276.  
 Харандашинъ-нанъ-желга, рч. 258.  
 Харандашинъ-хардынъ, гора. 257.  
 Хара-норъ, см. Хара-нуръ.  
 Хара-нуръ, оз. 27, 44, 60.  
 Хара-нурскій, участокъ, Иканатск. рода. 412.  
 Харантулъ, гора. 334.  
 Харанутскій, родъ. 411.  
 Хара-толгой, гора. 254.  
 Хара-угунъ, р. 472.  
 Хара-хардынъ. 21, 512.  
 Харганта, рч. 109, 119, 120.  
 Харгунъ-толгой. см. Тальская вершина.  
 Хапсагай-байсанъ. 98, 100.  
 Харе, см. Харотъ.  
 Харемъ, см. Хайремъ.  
 Харимъ-голъ, р. 200.  
 Харинская, дер. 581.  
 Харлискій, улусъ. 499.  
 Хардынъ, кл. 43.  
 Харотъ, рч. 10.  
 Харонъ. 99, 100.  
 Хартэй-желга, кл. 259.  
 Харчевская, дер. 582.  
 Харчевское, с. общ. 582.  
 Харъ, см. Харотъ.  
 Хатана, р. 593.  
 Хатаръ-сунъ, р. 593.  
 Хашегайскія, горы. 556.  
 Хашиголъ, рч. 257, 258, 311.  
 Хашигольскій, голецъ. 256.  
 Хиеушна, рч. 27.  
 Хингуй, дер. 547, 567.  
 Хингуй, рч. 547.  
 Хингуиское, с. общ. 567—568.  
 Хира-горхонъ, рч. 180.  
 Хирбай-иорчунъ, горн. уступъ, 91.  
 Хобонъ, р. 70, 99, 100.  
 Хобонскій, голецъ. 168.  
 Хойготскій, родъ. 500.  
 Хойта-Она, р. 33.  
 Хойтагольское, оз. 280.  
 Хойтаголъ, 513.  
 Хойши, см. Хойшинскій хребетъ.  
 Хойшинскій, хребетъ. 5, 84.  
 Холбу, рч. 311.

Холбо-нуръ, оз. 482.  
 Холмогойское, с. 420.  
 Холмогойское, с. общ. 420.  
 Холмушинская, дер. 432.  
 Холтогонъ, р. 257.  
 Хонгодой, р. 159, 228, 232.  
 Хонгодой-Мидяна, р. 159.  
 Хондогорскій, родъ. 498, 499.  
 Хорбай-тала, степь. 473.  
 Хорбатка, р. 69, 472, 508.  
 Хорбаты, см. Хорбатка.  
 Хорекъ, см. Хорокъ.  
 Хорекъ. 58.  
 Хоретъ, р. 507, 511.  
 Хоронъ, р. 253, 254, 256, 311, 312.  
 Хоронъ дудынъ. 250.  
 Хоротскій, родъ. 410.  
 Хорошенькая, мѣдная наковальня, верн. 93.  
 Хоя. 321.  
 Худоеланская, станція. 541, 547.  
 Худоеланское, с. 568.  
 Худоеланское, с. общ. 568.  
 Худяновская, дер. 455, 457.  
 Хужиртэй-голъ, р. 194, 330.  
 Хурей-Хобонъ, р. 70, 85, 99, 100.  
 Хурей-Хорбатъ, р. 472.  
 Хурлашиха, рч. 536.  
 Хутулъ. 99, 100.  
 Хуху-молосса, р. 49.  
 Хыдырей. 311.  
 Хыдырей. 297.  
 Хынъ-герге. 69, 70, 167.  
 Хэликъ. 110.

## Ц.

Цаганъ-голъ, см. Саганъ-голъ. 20.  
 Целота, дер. 307, 449.  
 Целота, рч. 296.  
 Цыцынуръ, ул. 513.

## Ч.

Чалдарскій, родъ. 500.  
 Черемховская, вол. 423—431, 481.  
 Черемховская, образцовая ферма. 5.  
 Черемховское, с. 389, 424.  
 Черемшанна, рч. 296.  
 Чернушка. 109.  
 Черный Ирнутъ, см. Ильчиринъ кутъ.

### III.

Шабартей, падь. 482.  
 Шабартуй. 99.  
 Шавоты, часть с. Шинковъ. 474.  
 Шаваши, рч. 180.  
 Шалотомий, улусъ. 412, 413.  
 Шамаши. 98, 131, 144, 147, 151.  
 Шаманская, гора. 508.  
 Шань. 27.  
 Шарагуль, р. 322, 327.  
 Шарапономий, родъ. 499.  
 Шарасулъ, рч. 296.  
 Шаротский, родъ. 410.  
 Шебарта, рч. 547.  
 Шебарта, с. 568.  
 Шебартиновская, станція. 541, 547.  
 Шебартиновское, с. общ. 568.  
 Шелехова, гора. 98.  
 Шелеховская, запика. 559.  
 Шолунъ-Сатлаша, см. Шулунъ-Сатлаша.  
 Шемайский, улусъ. 587.  
 Шерагуль, оз. 587.  
 Шерагульская, станція. 544, 546.  
 Шерагульский, улусъ. 587.  
 Шерагульское, с. 571.  
 Шерагульское, с. общ. 571—572.  
 Шерхолуй, р. 69.  
 Шиботомий, голецъ. 115.  
 Шивера, Теплаго мыса. 143.  
 Шига, рч. 7.  
 Шиле-дабанъ, 483.  
 Шинки, с. 66, 478—475, 485, 507, 508, 515, 520.  
 Шинковский, улусъ. 500.  
 Шинки, см. Шинки.  
 Шинцынская, дер. 562.  
 Шинцынское, с. общ. 562, 563.

Шиншинъ, р. 20.  
 Шоломуръ, р. 240, 285.  
 Шолу-саншапа, разина. 60, 482.  
 Шубутуй, рч. 145.  
 Шулай, истовость. 481.  
 Шулу-журга, р. 9.  
 Шулунъ-Саншапа, см. Шолунъ-Саншапа.  
 Шулунъ-хонолохо, группа гранитныхъ глыбъ. 200.  
 Шулутей-Жирби, рч. 536.  
 Шулу-ургушинъ рч. 96.  
 Шулу-ургушинъ-дабанъ, гора. 96.  
 Шумиха, рч. 144.

### III.

Шумина, дер. 454.

### Э.

Эргинъ-Таргажъ-Тайга. 34, 256.

### Я.

Яды, дер. 576.  
 Янгитъ. 49, 50, 51.  
 Янгитъ-дабанъ-горхонъ, рч. 51.  
 Янгитъ-ула, см. Янгитъ.  
 Янгорта, см. Янгорта.  
 Янгута, рч. 35.  
 Ясашиная, дер. 805.



ЗЕМЛЕВѢДѢНІЕ

А З І И

КАРЛА РИТТЕРА.

ГЕОГРАФІЯ СТРАНЪ,  
ВХОДЯЩИХЪ ВЪ СОСТАВЪ АЗИАТСКОЙ РОССІИ  
или ПОГРАНИЧНЫХЪ СЪ НЕЮ.

ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ; ОЗЕРО БАЙКАЛЪ И ПРИБАЙКАЛЬСКІЯ  
СТРАНЫ, ЗАБАЙКАЛЬЕ И СТЕПЬ ГОБИ.

ПОВѢЙШІЯ СВѢДѢНІЯ ОБЪ ЭТИХЪ СТРАНАХЪ (1832—1894 г.).  
СЛУЖАЩІЯ ПОСЛѢДУЮЩИМИ ВЫПУСКАМИ КЪ РУССКОМУ ТЕКСТУ  
РИТТЕРА, ИЗДАННОМУ ПОДЪ ПРИВЕДЕННЫМЪ ЗАГЛАВІЕМЪ ВЪ  
1879 ГОДУ.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

1895.





**ЗЕМЛЕВѢДѢНІЕ**

**А      З      І      И**

**КАРЛА РИТТЕРА.**

---

**ГЕОГРАФІЯ СТРАНЪ,**

**ВХОДЯЩИХЪ ВЪ СОСТАВЪ АЗІАТСКОЙ РОССІИ  
ИЛИ ПОГРАНИЧНЫХЪ СЪ НЕЮ.**

**ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ; ОЗЕРО БАЙКАЛЬ И ПРИБАЙКАЛЬСКІЯ  
СТРАНЫ, ЗАБАЙКАЛЬЕ И СТЕПЬ ГОБИ.**

---

**СВѢДѢНІЯ ОБЪ ЭТИХЪ СТРАНАХЪ (1832—1894 г.),  
ПОЛУЧЕННЫЯ ПОСЛѢДУЮЩИМИ ВЫПУСКАМИ КЪ РУССКОМУ ТѢКСТУ  
РИТТЕРА, ИЗДАННОМУ ПОДЪ ПРИВЕДЕННЫМЪ ЗАГЛАВІЕМЪ ВЪ  
1879 ГОДУ.**

---

**С.-ПЕТЕРБУРГЪ.**

---

**1895.**

---

Типографія В. Безобразова и К°. (В. О., 8 л., № 45).

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

Общее обозрѣніе Байкальскихъ горъ и Байкальскаго озера. Сѣверо-западный берегъ Байкала отъ юго-западной оконечности озера до устья Верхней Ангары. Хребты Приморскій и Онотскій.

---

СОСТАВИЛИ

по порученію Императорскаго Русскаго Географическаго Общества:

П. Семеновъ, И. Д. Черскій и Г. Г. ф. Петцъ.

---



## ОГЛАВЛЕНИЕ 2-ой части.

	Страница.
Предисловіе. . . . .	V — VI

### II.

Общее обозрѣніе Байкальскихъ горъ и Байкальскаго озера. Сѣверо-западный берегъ Байкала и сопровождающіе его хребты: Ошотскій и Приморскій.

Связь Тункинской долины съ Байкальской.	2— 19
Общее обозрѣніе Байкала и окружающихъ его горъ . . . . .	19— 59
Сѣверо-западный берегъ Байкала и его горы.	59—615
Юго-западная оконечность Байкальской долины . . . . .	60—144
а) Горы между ю.-з. оконечностью Байкала и истокомъ Ангара . . . . .	68
б) Берегъ Байкала отъ с. Култука до истока р. Ангара . . . . .	99
в) Рѣка Ангара отъ ея истока до устья р. Иркутъ въ г. Иркутскѣ . . . . .	126
Берегъ Байкала отъ истока р. Ангара до Ольхонскихъ воротъ . . . . .	144—393
а) Берегъ Байкала отъ истока Ангара до устья р. Голоустной . . . . .	149
б) Система р. Голоустной и описаніе маршрутовъ, исходящихъ изъ долины этой рѣки . . . . .	185—232
Отъ устья Нижняго Качергата до дер. Тарбѣевой, расположенной въ среднемъ теченіи Голоустной . . . . .	202
Маршрутъ Чекановскаго изъ дер. Тарбѣевой вверхъ по долинѣ Урулкина на р. Ушаковку системы р. Ангара . . . . .	210

- Маршрутъ Чекановскаго отъ дер. Тарбѣевой по р. Окорлику въ долину р. Куяды системы р. Куды . . . . . 217
- Маршрутъ Черскаго отъ д. Тарбѣевой вверхъ по долинѣ р. Голоустной до ея верховьевъ . . 220
- Долины рр. Морской Колесмы и Илга, лѣвыхъ притоковъ средняго теченія р. Голоустной 225
- в) Берегъ Байкала отъ р. Голоустной до устья р. Б. Бугульдейки . . . . . 232
- г) Система р. Большой Бугульдейки и описаніе маршрутовъ, исходящихъ изъ ея долины . . 259—291
- Маршрутъ Черскаго по низовью Б. Бугульдейки и по р. Куртуну, первому правому притоку этой рѣки. . . . . 260
- Долина Б. Бугульдейки между устьями рр. Куртуна и Хара-жерги, т. е. до границы между ея верхнимъ и нижнимъ теченіями . . . . 270
- Маршрутъ Чекановскаго по долинѣ р. Кедусы и переваль черезъ Онотскій хребетъ на рѣчки Цекюрты системы р. Лены и р. Муринъ системы Ангара. Ангарско-Ленскій водораздѣлъ 275
- Переваль черезъ Онотскій хребетъ съ долины рч. Алтанъ-хара черезъ верховья р. Турунги въ долину р. Ады, системы р. Лены . . . . 280
- Верхняя часть теченія р. Бугульдейки и переваль черезъ Онотскій хребетъ съ верховьевъ этой рѣки на р. М. Манзурку (Унгуру по Обручеву) 282
- д) Берегъ Байкала отъ устья р. Б. Бугульдейки до впаденія р. Анги. . . . . 291
- е) Система р. Анги и описаніе касающихся ея маршрутовъ . . . . . 302—342
- Маршруты Чекановскаго въ бассейнѣ р. Анги; его изслѣдованія въ Приморскомъ хребтѣ и переваль черезъ Онотъ въ систему р. Манзурки 307
- Маршрутъ Обручева черезъ Онотскій и Приморскій хребты, съ системы р. Унгуры (М. Манзурка) въ систему р. Сармы . . . . . 315
- Экскурсія Черскаго съ долины Боро-елгай на р. Ангу и Таржиранскія озера; переваль черезъ

Приморскій хребетъ въ промежуткѣ между Бугульдейкою и Ангою. . . . .	326
ж) Долина Харбагуры и Хара-жерги, какъ соединительная вѣтвь между долинами рѣкъ: Анги и Большой Бугульдейки, и относительная древность хребтовъ Онотскаго и Приморскаго . . .	342
з) Сѣверо-восточная часть прибрежной полосы горъ, отъ р. Анги до меридіана Ольхонскихъ воротъ. Юго-западная оконечность Малаго моря	355—382
Берегъ Байкала отъ устья р. Анги до Ольхонскихъ воротъ и маршрутъ Черскаго отъ Уланъ-нура до долины рч. Хушилху . . . .	356
Юго-западный или материковый берегъ Ольхонскихъ воротъ, отъ мыса Крестъ до мыса Уланъ-хадай . . . . .	373
и) Заливъ Хушилху или юго-западная оконечность Малаго моря, отъ мыса Уланъ-хадай до дельты р. Сармы. . . . .	382
Островъ Ольхонъ. . . . .	393—465
а) Плаваніе вдоль юго-восточнаго берега острова Ольхона . . . . .	408
б) Сѣверо-западный берегъ Ольхона и ближайшіе къ нему острова . . . . .	423
в) Юго-западная оконечность острова Ольхона, какъ сѣв.-восточн. берегъ Ольхонскихъ воротъ	449
г) Горныя породы, встрѣчающіяся на островѣ Ольхонѣ, по изслѣдованіямъ Обручева. . . .	456
Берегъ Байкала отъ р. Сармы до Заминскаго мыса или сѣверо-западный берегъ Малаго моря. Общее обозрѣніе Малаго моря и Ольхонскихъ воротъ. . .	465—508
а) Плаваніе вдоль сѣверо-западнаго берега Малаго моря и экскурсіи по нѣкоторымъ долинамъ Приморскаго хребта. . . . .	467
б) Общее обозрѣніе Малаго моря и Ольхонскихъ воротъ; вопросъ о происхожденіи этихъ частей Байкала . . . . .	485
Примѣчаніе. О древностяхъ, извѣстныхъ въ районѣ Ольхонскаго вѣдомства. . . . .	492



- 5) Прибрежныя горы Байкала отъ Замы до Онгурёна и описаніе маршрутовъ изъ Онгурёнской долины въ систему р. Лены и къ верховьямъ этой рѣки. . . 508—549
    - а) Берегъ Байкала отъ долины Замы до рч. Онгурёна и экскурсія къ вершинѣ горы Саганъ-хада . 509
    - б) Маршруты Меглицкаго и Черскаго изъ Онгурёна на р. Лену, до долины р. Манзурки . . 520
    - в) Экскурсія Черскаго изъ Онгурёна въ систему рч. Илги, впадающей въ Байкаль . . . . . 530
    - г) Маршрутъ Черскаго изъ долины Онгурёна черезъ верховья рч. Илги къ источникамъ р. Лены. Верхнее теченіе Лены . . . . . 537
  - 6) Берегъ Байкала отъ устья Онгурёна до мыса Котельниковскаго (мысъ Горычихъ ключей). . . . . 549—594
    - а) Отъ устья Онгурёна до Заворотнаго мыса и перевалъ съ мыса Покойниковъ на р. Лену . 549
    - в) Отъ Заворотнаго мыса до мыса Котельниковскаго . 575
  - 7) Берегъ Байкала отъ Котельниковскаго мыса до сѣверо-восточной оконечности озера. . 594—602
  - 8) Свѣдѣнія о сѣверо-западномъ склонѣ Прибайкальскихъ горъ въ промежуткѣ между верхнимъ теченіемъ Лены и сѣверо-восточною оконечностью Байкала. Система р. Киренги. . . . . 602—615
- Примѣчаніе. О количествѣ золота, добываемаго на пріискахъ сѣверо-западнаго берега Байкала. . . 615—
- Алфавитный указатель . . . . . 619

## ПРЕДИСЛОВІЕ.

Въ предисловіи къ предшедшей части настоящаго изданія (Озеро Байкаль и Прибайкальскія страны, Забайкалье и степь Гоби) выражали мы надежду, представивъ въ настоящей части общее описаніе Байкала и подробное всего сѣверо-западнаго побережья, включить еще въ эту часть и описаніе всей остальной части Иркутской губерніи, къ сѣверу отъ большого сибирскаго тракта, съ теченіями Ангары и Верхней Лены. Но обиліе имѣвшихся матеріаловъ вынудило насъ включить въ эту часть только общее описаніе Байкала и подробное описаніе сѣверо-западнаго побережья съ его береговыми хребтами: Онотскимъ и Приморскимъ, и обширнымъ прибрежнымъ островомъ Ольхономъ, а изъ описанія остальной части Иркутской губерніи, а именно изъ отрѣзка плоской возвышенности, прилегающей съ сѣверо-запада къ Байкальскимъ береговымъ хребтамъ составить отдѣльный томъ.

Предлежащая часть почти всецѣло принадлежитъ И. Д. Черскому, такъ какъ къ его тексту (до 36 листовъ) пришлось дополнить не болѣе 4 печатныхъ листовъ. Капитальный трудъ Черскаго представляетъ тѣмъ болѣе интереса, что онъ издерживаетъ всѣ сдѣланныя имъ самимъ, во время его продолжительнаго пребыванія въ краѣ и многочисленныхъ походовъ въ Прибайкальѣ, наблюденія, никогда не появлявшаяся въ печати въ окончательно систематизированномъ и обработанномъ (совмѣстно съ наблюденіями предшедшихъ путешественниковъ и изслѣдователей) видѣ, и весь этотъ драгоценный матеріалъ пропалъ бы безъ пользы для географической

науки въ необработанныхъ рукописныхъ запискахъ талантливаго изслѣдователя, еслибы мы не пригласили его къ дѣтельному участию въ настоящемъ изданіи.

Въ послѣдующей части участіе Черскаго уже будетъ совершенно незначительно, такъ какъ для этой части имѣется всего только его текста на одинъ печатный листъ, между тѣмъ какъ, по обилію накопившихся матерьяловъ о сѣверной половинѣ Иркутской губерніи, послѣдующая часть будетъ имѣть почти одинаковый объемъ съ подлежащей.

Забайкалье и степь Гоби займутъ во всякомъ случаѣ не менѣе двухъ частей, такъ какъ для нихъ имѣется не только много матерьяла, уже разработаннаго Черскимъ, но и еще много другихъ неисчерпанныхъ Черскимъ матерьяловъ; а для разработки никѣмъ еще нетронутыхъ свѣдѣній о степи Гоби намъ удалось заручиться участіемъ талантливаго новѣйшаго изслѣдователя этой интересной области В. А. Обручева только что возвратившагося изъ своего обширнаго путешествія. Этимъ и закончится весь циклъ предпринятыхъ дополненій къ небольшому тому изданію Риттера, объемъ котораго показываетъ только, какъ много сдѣлала исключительно русская географическая наука, въ теченіи болѣе полувѣка, для познанія этой части Азіатской Россіи и странъ съ не сопредѣльныхъ.

П. Семеновъ.

## II.

**ДРУГОЕ ОБОЗРѢНІЕ БАЙКАЛЬСКИХЪ ГОРЪ И БАЙКАЛЬ-  
СКАГО ОЗЕРА; СѢВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БЕРЕГЪ ОТЪ ЮГО-  
ЗАПАДНОЙ ОКОНЕЧНОСТИ ОЗЕРА ДО УСТЬЯ ВЕРХНЕЙ  
АНГАРЫ; ХРЕБТЫ ПРИМОРСКІЙ И ОНОТСКІЙ.**

(Дополненіе къ § 51 Риттера) <sup>1)</sup>.

---

Описаніе горной страны въ системахъ р.р. Иркута, Ки-  
и Бѣлой приблизило насъ, такимъ образомъ, почти къ  
иридіану юго-западной оконечности озера Байкала, обозрѣ-  
и долины котораго и сопровождающихъ её горъ мы посвя-  
емъ настоящее изложеніе. Теченіе Иркута отъ слиянія его  
ховьевъ до ущелья является для насъ въ особенностн  
чительнымъ въ этомъ отношеніи. И дѣйствительно, пред-  
вивъ возможность ознакомиться съ прилежащими склонами  
инскихъ альповъ съ одной стороны, и съ восточнымъ  
долженіемъ Саяна съ другой, рѣка эта привела насъ къ мѣ-  
, откуда самъ Иркутъ поворачиваетъ къ сѣверу, пересѣкая  
комымъ намъ уже ущельемъ понизившуюся здѣсь часть  
инской цѣпи, между тѣмъ какъ оставленная имъ такимъ  
азомъ долина придерживается въ общемъ прежняго, во-

---

<sup>1)</sup> Риттеръ, Землевѣд. Азіа. Вост. Сибирь: оз. Байкаль, Прибайкалье,  
Байкаль и степь Гоби. Переводъ. 1879 г.

сточнаго направленія и продолжается прямо къ Байкалу, до ближайшей оконечности котораго остается всего лишь 19 верстъ. Продолженіе это обнаруживаетъ самымъ нагляднымъ образомъ связь между Тункинскою долиною и Байкаломъ, какъ равно и между сопровождающими ихъ горными дѣ-  
пями, представляя, такъ сказать, естественный входъ въ бассейнъ озера со стороны юго-западной его оконечности. Настоящее изложеніе мы начнемъ поэтому съ подробнаго описанія названнаго отрѣзка долины, значеніе котораго еще увеличилось съ тѣхъ поръ, какъ ближайшее изслѣдованіе мѣстности показало, что въ прежнее время Иркутъ долженъ былъ изливаться по этой долинѣ прямо въ Байкалъ и лишь впоследствии успѣлъ проложить себѣ путь въ ущелье, принадлежавшее самостоятельному лѣвому притоку Ангары. Такъ какъ долина эта занята съ одной стороны ключемъ Ильчи, впадающимъ въ Иркутъ, а съ другой системою рч. Култучной, изливающейся въ Байкалъ около села Култукъ, то по-  
этому интересующій насъ отрѣзокъ Тункинско-Байкальской долины мы будемъ называть для краткости Ильчинско-Култукскимъ.

## СВЯЗЬ ТУНКИНСКОЙ ДОЛИНЫ СЪ БАЙКАЛЬСКОЮ И ПРЕЖ- НЕЕ ПРЯМОЕ СОЕДИНЕНІЕ ОРОШАЮЩИХЪ ИХЪ ВОДЪ.

Длина Ильчинско-Култукской долины, т. е. промежутка между мѣстомъ поворота Иркутъ въ ущелье юго-западною оконечностью озера Байкала, равняется все-  
лишь 19 верстамъ, если считать по прямому направленію з.-с.-з. на в.-ю.-в., причемъ ширина этой части долины сравнительно съ знакомыми намъ ея расширеніями на западѣ (Торская и Тункинская котловины), значительно меньше, хотя и неодинакова, смотря по мѣсту и по высотѣ, на которой мы будемъ её разсматривать, что зависитъ отъ совмѣстныхъ склоновъ долины и непараллельности этихъ

Горы, ограничивающія эту долину съ сѣвера, составляютъ непосредственное продолженіе Тункинской цѣпи, которая, какъ мы видѣли выше, понизилась и потеряла альпійскій характеръ еще въ предѣлахъ Торской котловины, идовательно въ нѣсколькихъ десяткахъ верстъ на западъ въ пересѣкающаго ихъ ущелья Иркута. Съ южной стороны, въ свою очередь, долина ограничивается столь-же непосредственнымъ продолженіемъ Саяна, переходящаго здѣсь уже въ такъ называемый Хамаръ-дабанскій краѣ или хребтъ, отъ имени извѣстной высшей его точки, съ которою части мы познакомились уже выше, пересѣкая эти горы вверхъ по долинѣ рч. Тибельти (см. также ниже). Высота северной окраины нашей долины не превышаетъ 3600' н. ок., т. е. немногимъ развѣ болѣе 2000' надъ уровнемъ Байкала (361' абс. выс.), причемъ ближайшія къ долинѣ точки достигаютъ всего лишь 1300—1500' надъ озеромъ, тогда какъ высшіе пункты Саяна, значительно удаленные къ югу, какъ увидимъ ниже, превосходятъ уже 7300' н. ок., и 5763' надъ Байкаломъ.

Почти на половинѣ своей длины Ильчинско-Култукская долина раздѣляется на двѣ части поперечнымъ отрогомъ, направляющимся отъ сѣверныхъ горъ къ южнымъ и получившимъ названіе Шаманскаго, отъ имени мѣста (гора Шаманка), которому его пересѣкаетъ Тункинская дорога. Вообще этотъ отрогъ сливается непосредственно съ горами сѣвернаго берега долины, достигаетъ въ предѣлахъ послѣдней высоты надъ Байкаломъ и около южнаго берега долины сѣкается узкимъ (10—15 сажень), короткимъ, но глубокимъ ущельемъ, извѣстнымъ подъ названіемъ Ильчинскаго щели. Шаманскій отрогъ, съ его довольно плоскою и пологой поверхностью, имѣетъ такимъ образомъ видъ узкаго, пологого и террасовиднаго мыса, сравнительно невысокаго (345' надъ долиною), относительно прилегающихъ къ нему высотъ, круто опускающагося къ Ильчинскому ущелью

(щеки), и потому нельзя согласиться съ воззрѣніемъ Меглицкаго, смотрящаго на него, какъ на связь Хамарь-дабанской цѣпи, т. е. Саяна, съ горами сѣверо-западнаго берега Байкальской долины <sup>1)</sup>, въ особенности потому, что взглядъ этотъ былъ результатомъ не подробнаго изученія орографическаго характера мѣстности, а послѣдствіемъ недостаточнаго знакомства съ геогностическимъ строеніемъ ущелья Иркута, въ то время еще неописаннаго. Предполагалось поэтому, что воды, отложившія красноцвѣтные песчаники около знакомой намъ деревни Моты на Иркутѣ, вдавались гораздо значительнѣе къ югу и еще въ тотъ отдаленный геологическій періодъ отдѣляли собою восточную оконечность Тункинскихъ альповъ, уже самостоятельныхъ, отъ прибайкальскихъ горъ, какъ вѣтви Хамарь-дабанскаго крыжа; между тѣмъ переданныя выше какъ орографическія, такъ и геогностическія свѣдѣнія объ ущельѣ Иркута и частяхъ склона горъ, прилежащихъ къ высшей террасѣ плоской возвышенности, не даютъ уже мѣста такому предположенію, доказывая, какъ мы и увидимъ ниже, какъ существованіе, такъ и непрерывность этихъ цѣпей даже въ періодъ отложенія болѣе глубокихъ и древнихъ пластовъ системы, къ которой относятся песчаники окрестностей с. Моты.

Во всякомъ случаѣ Шаманскій отрогъ раздѣляетъ собой нѣкоторой степени Ильчинско-Култукскую долину на двѣ части, изъ которыхъ западную Черскій называетъ Ильчинскою, а восточную Култукскою; обѣ онѣ соединяются упомянутымъ выше ущельемъ (Ильчинскія щеки). Въ гидрографическомъ отношеніи долина эта только отчасти принадлежитъ системѣ водъ Иркута: только западная треть Ильчинской части занята небольшимъ ключикомъ, извѣстнымъ по названію Иркутнаго Ильчи и впадающимъ въ Иркутъ съ правой стороны, нѣсколько выше входа его въ ущелье, чемъ мы уже говорили въ своемъ мѣстѣ. Ключъ этотъ

---

<sup>1)</sup> Меглицкій, Горн. Журн. 1855 г. Ч. II, кн. IV, стр. 14—15.

уть начало изъ болотистой части дна долины, возвышенной всего лишь на 20 футовъ надъ Иркутомъ (397' надъ Байкаломъ). Изъ тѣхъ же болотъ начинается тутъ же и другой ручеекъ, называемый Култучнымъ Ильчи, текущій въ диаметрально противоположномъ направленіи. Воспринявъ сейчасъ же ниже истока правое свое верховье, затѣмъ нѣсколько далѣе безымянный лѣвый притокъ, берущій начало въ сѣверной части западнаго склона Шаманскаго отрога и слѣдующій сначала на западъ, какъ-бы къ Иркуту, а затѣмъ уже къ югу, т. е. къ устью, наконецъ, соединившись съ правымъ притокомъ, извѣстнымъ подъ названіемъ Бориктуй, Култучный Ильчи направляется къ Ильчинскимъ скаламъ и, пройдя ихъ, изливается съ правой стороны въ р. Култучную. Эта послѣдняя занимаетъ собою всю восточную часть Ильчинско-Култукской долины и впадаетъ, какъ сказано выше, въ юго-западную оконечность Байкала. Такимъ образомъ, современный водораздѣлъ между Байкаломъ, въ тѣхъ Култучнаго Ильчи, и Иркутомъ располагается всего лишь на высотѣ около 20' надъ послѣднимъ, такъ-что, если вообразить ущелье Иркутъ запруженнымъ настолько, чтобы уровень рѣки поднялся на 3 или 4 сажени выше нормальнаго, Иркутъ направился бы прямо къ Байкалу черезъ Ильчинскія щеки и долину р. Култучной.

Послѣ приведенныхъ здѣсь болѣе общихъ свѣдѣній, перейдемъ къ нѣкоторымъ подробностямъ топографіи каждой изъ двухъ частей Ильчинско-Култукской долины, такъ какъ именно эти имѣютъ весьма важное значеніе для разоблаченія доисторическаго прошедшаго этой мѣстности и исторіи ея современной конфигураціи.

Если не обращать вниманія на вообще плоскія возвышенія дна западнаго, т. е. Ильчинскаго отрѣзка долины, не превышающія 300' надъ самыми глубокими ея частями, и если руководствоваться только склономъ высшихъ горъ, ограничивающихъ долину, то ширина ея дос-



тигаеть около двухъ верстѣ уже въ окрестностяхъ Шаманскаго отрога. Между тѣмъ ближе къ Иркуту, вслѣдствіе постепеннаго поворота склона южныхъ горъ на юго-западъ по направленію къ долинамъ знакомыхъ намъ уже р.р. Быстрыхъ, ширина эта почти удваивается, послѣ чего уже только на лѣвомъ берегу устья р. Малой Быстрой и на лѣвомъ берегу Иркута, поворачивающаго къ ущелью, долины суживаются къ западу описаннымъ уже выше Тибельтинско-Быстринскимъ суженіемъ, которымъ именно интересующі насъ отрѣзокъ Ильчинско-Култукской долины отдѣляется отъ Торской котловины, пріобрѣтая треугольное очертаніе съ вершиною, обращенною въ сторону Шаманскаго отрога. Смотри на мѣстность такъ, какъ это было сказано, т. е. не обращая вниманія на болѣе низкія и плоскія возвышенія дна, легко увидѣть, что общія низовья долинъ р.р. Быстрыхъ направляются на сѣверо-востокъ, т. е. въ сторону Шаманскаго отрога, а следовательно и Байкала, а не на сѣверо-западъ и даже западъ, какъ это свойственно современнымъ русламъ низовьевъ этихъ рѣкъ, поворачивающихъ къ Иркуту среди соотвѣтственно направленныхъ, болѣе низкихъ возвышенностей, сопровождающихъ нынѣ эти русла. Что же касается этихъ болѣе низкихъ возвышенностей, то самое значительное изъ нихъ извѣстно подъ названіемъ Ильчинской гривки. Начинаясь узкою полоскою около Шаманскаго отрога и примыкая къ склонамъ южныхъ горъ, т. е. Саяна, въ роли террасовиднаго предгорья она расширяется постепенно къ западу, образуетъ южный берегъ теченія обоихъ Ильчи съ одной стороны, и правый берегъ низовьевъ Большой Быстрой, и потому, начинаясь на меридіанѣ послѣдней, Ильчинская гривка удлиняется сколько дугообразно на сѣверо-западъ, вытягивается въ суженнаго мыса, почти упирающагося въ правый берегъ повернушагося къ ущелью Иркута, между устьями въ р.р. Большой Быстрой и Иркутнаго Ильчи такимъ образомъ, что, если бы въ настоящее время теченіе Иркута и Бы-

вернуть къ Байкалу, то мысовидная часть Ильчинской гривки должна была бы уничтожиться и округлиться въ сѣверо-восточную сторону. На поверхности Ильчинской гривки встречаются мѣстами русловидныя углубленія, частью сухія, частью занятыя незначительными ключиками. Такъ напр. со склона южныхъ горъ, къ которымъ именно, какъ сказано выше, примыкаетъ это террасовидное возвышеніе, находится довольно широкая русловидная ложбина, направляющаяся со стороны выхода изъ горъ рѣкъ Быстрыхъ и слѣдующая параллельно этому склону съ юго-запада на сѣверозападъ и востокъ, слѣдовательно къ Шаманскому отрогу, къ низовьямъ Бориктуя, въ который изливается и ключикъ, занимающій нынѣ нижнюю часть этой ложбины. Другая такая мысовидная долина углубляется въ поверхность гривки сѣвернѣе Тункинской дороги и занята въ своихъ низовьяхъ однимъ источникомъ Култучнаго Ильчи, причемъ необходимо замѣтить, что въ юго-западномъ своемъ продолженіи описанныя ложбины широко открываются на высотѣ террасаго праваго берега современныхъ низовьевъ Большой Быстрой и обрѣзываются ихъ крутымъ склономъ, не смотря на то что дно этихъ старыхъ руселъ понижается къ системѣ Култучной рѣки Култучной, т. е. къ Ильчи.

Вторая затѣмъ, такая же въ общемъ по величинѣ, какъ Ильчинская гривка, плоская возвышенность примыкаетъ своимъ южнымъ основаніемъ къ западному склону сѣверной части Шаманскаго отрога и занимаетъ все пространство между лѣвыми берегами Култучнаго Ильчи и его лѣваго безымяннаго притока. Наконецъ, слѣдуетъ еще упомянуть о такихъ возвышенныхъ площадяхъ, располагающихся около сѣверныхъ горъ, по правому берегу Иркутнаго Ильчи и въ промежуткѣ между низовьями р.р. Быстрыхъ. Среди всѣхъ этихъ возвышенностей, играющихъ, какъ сказано выше, роль террасовидныхъ площадей, проложены ложбины всей современной гидрографической сѣти долинъ, углубленные мѣстами до

280 футовъ; изъ нихъ самую узкою является долина Култучнаго Ильчи, а наибольшая ширина свойственна р.р. Быстрымъ. Какъ склоны горъ, такъ и большая часть всей долины, за исключеніемъ заливныхъ луговъ рѣкъ и нѣкоторыхъ болотистыхъ кочковатыхъ площадокъ, поросли болѣе или менѣе густымъ смѣшаннымъ лѣсомъ, мѣшающимъ видѣть описанныя нами подробности конфигураціи при осмотрѣ мѣстности съ Тункинской дороги, которая, пересѣвши низовья р.р. Быстрыхъ, поднимается на среднюю часть Ильчинской гривки, послѣ чего слѣдуетъ спускъ въ долину Култучнаго Ильчи, переѣздъ на его лѣвый берегъ и наконецъ подъемъ на Шаманскій отрогъ, на перевалѣ черезъ который около дороги, можно было видѣть жертвенную кучу хвороста сложенную бурятами, а въ первой половинѣ семидесятыхъ годовъ нашего столѣтія на вѣтви одного изъ большихъ деревьевъ, нависшей надъ дорогою черезъ перевалъ, привѣшенъ была баранья лопатка съ монгольскими на ней надписями. Вотъ почему съ дороги этой не видны ни долина Иркутскаго Ильчи, ни входъ Иркутска въ ущелье, а, слѣдуя по ней, нельзя ознакомиться и съ другими самыми важными топографическими особенностями мѣстности, такъ-что по нѣкоторыхъ условіяхъ, въ особенности проѣздомъ въ лѣтнее время, когда листва деревьевъ еще болѣе маскируетъ видъ въ сторону отъ дороги, можно даже не подозрѣвать существованія Ильчинскихъ щекъ, а Шаманскій отрогъ является какъ бы водораздѣломъ между описанными системами водъ. Вотъ почему прежніе путешественники, довольствуясь одною лишь Тункинскою дорогою, не придавали особеннаго значенія этой мѣстности и почти умалчивали о ней.

Гораздо болѣе простыми, но не менѣе важными для нашихъ цѣлей, являются топографическія особенности восточной части Ильчинско-Култучской долины, занятой р. Култучною, верхнее теченіе которой, до сихъ поръ никѣмъ еще не посѣщенное, орошаетъ сѣверо-восточный склонъ

анскаго отрога. Вслѣдъ за небольшимъ расширеніемъ (до 100 саж.), располагающимся непосредственно около названнаго отрога, долина суживается до 100 саж. и только на протяженіи послѣднихъ четырехъ верстъ длины, по направленію къ Байкалу, начинаетъ постепенно расширяться, достигая почти 2 верстъ ширины вблизи озера, гдѣ она открывается на Култукскую прибрежную низменность. Высокіе склоны большей части этого отрѣзка долины отличаются отъ отсутствіемъ предгорій и возвышаются весьма круто и мгновенно, такъ-что только ближе къ озеру, на лѣвомъ берегу долины, замѣчаются террасовидныя и холмистыя возвышенія, благодаря которымъ крутизна его дѣлается умѣреннѣе. Лѣвый, т. е. сѣверный склонъ долины пересѣкается нѣсколькими мелкими долинками, вообще параллельными другъ другу и перпендикулярными къ направленію главной; долинки эти отчасти пологія, отчасти же занимаются незначительными лѣвыми прирѣзками Култучной, изъ которыхъ самый многоводный носить названіе Тигунчиха. Что же касается разобщающихъ ихъ поперечныхъ, то они представляютъ топографическія особенности, въ высшей степени важныя для геологіи этой мѣстности, чтобы не обращать на нихъ должнаго вниманія, хотя проѣзжая по дорогѣ, во время экскурсій въ сторону и цѣлаго ряда восхожденій, особенно эти вовсе не замѣтны и даже не подозрѣвались путешественниками, не имѣвшими возможности располагать достаточнымъ количествомъ времени для подробнаго изученія лежащихъ горъ. При длинѣ этихъ параллельныхъ отрѣзковъ около одной версты, они отличаются почти одинаковою высотой (болѣе 800' надъ Байкаломъ). Ихъ южныя, свободныя оконечности круто опускаются къ долинѣ Култучной, между тѣмъ верхняя поверхность, притупленно-гребневидная, иногда довольно плоская, является въ общемъ почти горизонтальною и примыкаетъ сѣвѣрною частью къ общему склону главныхъ точекъ главной цѣпи горъ, вслѣдствіе чего каждый изъ этихъ отрѣзковъ, рассматриваемый въ профили, образуетъ собою

высокій, достаточно правильно очерченный, террасовидный уступъ относительно высшихъ горъ этого берега Ильчинско-Култукской долины, тогда какъ сумма всѣхъ этихъ отроговъ изображаетъ собою высокую и пространную террасу, расчлененную долинками всѣхъ лѣвыхъ притоковъ р. Култучной. Что же касается южнаго берега интересующей насъ части долины, то онъ не представляетъ непрерывной и настолько выразительной высокой террасы, хотя слѣды ея мѣстами, въ особенности ближе къ Байкалу, въ свою очередь могутъ быть замѣчены (см. ниже); въ противоположность лѣвому, берегъ этотъ является вовсе не расчлененнымъ, такъ какъ въ него врѣзывается только одинъ правый притокъ, именно, Малый Борикуй, и то около восточнаго склона южной части Шаманскаго отрога, черезъ ущелье котораго (Ильчинскіе щели), какъ сказано выше, пробивается затѣмъ второй правый притокъ Култучной, Ильчй, знакомый намъ уже изъ описанія западнаго отрѣзка долины.

Первымъ изъ писателей, затронувшихъ вопросъ о томъ, что топографическія особенности этой мѣстности требуютъ сравнительно лишь небольшого возвышенія уровня Иркутска для того, чтобы воды его направились къ Байкалу, былъ Башкевичъ <sup>1)</sup>, которому мы обязаны и первыми свѣдѣніями объ ущелистой части долины Иркутска (см. выше); но вопросъ этотъ затронуть имъ въ смыслѣ возможности искусственно направлять воды Иркутска въ Байкалъ для практическихъ цѣлей. Что же касается современной конфигураціи и гидрографическихъ условій мѣстности, то на нихъ Башкевичъ смотрѣлъ какъ на результатъ древнѣйшихъ явленій, и потому Ильчинско-Култукскій водораздѣлъ былъ, по его мнѣнію, вполне достаточнымъ для того, чтобы Иркутскъ отклонился отъ прямого и сравнительно низменнаго пути къ озеру и, повернувшись подъ прямымъ угломъ къ первоначальному теченію, направи-

---

<sup>1)</sup> Башкевичъ, Зап. Сиб. Отд. Геогр. Общ. 1856 г. Кн. I.

мысли въ столь-же древнее и потому готовое ущелье. Вопреки такому воззрѣнію Кропоткинъ <sup>1)</sup>, осмотрѣвъ нѣкоторую часть этой мѣстности проѣздомъ въ Тунку и на р. Оку, впервые высказалъ мысль, что Иркутъ въ прежнее время могъ изливаться въ Байкалъ и только впослѣдствіи проложилъ свой путь по ущелью, занимаемому имъ въ настоящее время. Не располагая временемъ заняться подробнымъ изслѣдованіемъ мѣстности, мнѣніе это Кропоткинъ основываетъ впрочемъ лишь на такихъ соображеніяхъ, что поворотъ этой реки въ ущелье изъ болѣе широкой долины представляется естественнымъ, что обнаженные части склоновъ долины р. Култучной расположены высоко надъ уровнемъ ничтожныхъ водъ этой рѣки, что въ пользу его мнѣнія говоритъ болотистость пораздѣла между Иркутнымъ и Култучнымъ Ильчи и присутствіе на этой рѣкѣ крупной гальки кристаллическихъ породъ. Затѣмъ мѣстность эта изслѣдовалась нѣсколько болѣе подробно Чекановскимъ <sup>2)</sup>. Путешественникъ этотъ показалъ, что вся Ильчинская гривка и возвышеніе между низовьями р. Быстрыхъ состоитъ изъ наноса съ крупною галькою; онъ говоритъ даже, что наносное отложеніе, въ которое вѣхались и углубились низовья р. Быстрыхъ, должно было образоваться изъ прежнихъ осадковъ этихъ рѣкъ. Тѣмъ не менѣе, принимая во вниманіе пересилившее вліяніе топографическихъ условій, замѣченныхъ имъ на самомъ низшемъ гипсометрическомъ уровнѣ долины, Чекановскій дѣлаетъ нѣкоторыя возраженія противъ изложенной гипотезы Кропоткина. Онъ говоритъ, что Иркутъ, устремляясь къ Байкалу, долженъ былъ, разумѣется, увлекать съ собою и воды р. Быстрыхъ, которыя, направляясь въ сторону, почти противоположную современному теченію ихъ низовьевъ, должны были

<sup>1)</sup> Кропоткинъ, Зап. Сиб. Отд. И. Р. Геогр. Общ. 1867 г. Т. IX, стр. 4—7.

<sup>2)</sup> Чекановскій, Зап. В.-Сиб. Отд. И. Р. Геогр. Общ. Т. XI, 1874 г.

бы роковымъ образомъ подмывать описанный выше узкій мысъ Ильчинской гривки. Мысъ этотъ въ такомъ случаѣ, имѣлъ бы видъ широкой, крутой и округленной стѣны, тогда какъ въ дѣйствительности онъ съуженъ, направляется въ сторону нынѣшняго теченія Быстрой и понижается въ этомъ направленіи. Кромѣ того Чекановскій замѣчаетъ, что трудно вообразить, какимъ образомъ Иркутъ, промывшій себѣ столь широкую долину, могъ обнаружить такое незначительное вліяніе на узкія Ильчинскія щеки, пробивающія Шаманскій отрогъ, къ тому-же, слѣдовало бы ожидать, что рѣка, теряя около этого ущелья скорость и силу теченія, должна была бы отлагать несомую ею гальку гдѣ либо выше Ильчинскихъ щекъ, чего однако незамѣчено, точно также какъ въ Ильчинской долинѣ не наблюдались Чекановскимъ и террасы. На вопросы эти и сомнѣнія отвѣтили наконецъ изслѣдованія Черскаго, отъ котораго мы заимствовали какъ изложенныя выше топографическія свѣдѣнія, такъ и нижеслѣдующіе геогностическія и геологическія данныя. Посѣтивъ эту мѣстность разъ въ 1876 г. <sup>1)</sup>, а затѣмъ въ 1879 <sup>2)</sup>, путешественникъ этотъ убѣдился во-первыхъ, что какъ сѣверныя горы Ильчинско-Култукской долины, т. е. восточное продолженіе Тункинской цѣпи,—такъ и южныя, какъ продолженіе Саяна, образуются тѣми-же древнѣйшими кристаллическими породами, съ которыми мы постоянно встрѣчались въ описанной уже въ первой части горной страны, а также въ ущельи Иркутъ, и которыя онъ относитъ къ лаврентьевской системѣ пластовъ. Здѣсь найдена также перемежаемость роговообманковыхъ и слюдяныхъ полевошпатовыхъ породъ съ криста-

---

<sup>1)</sup> Черскій, Изв. Сиб. Отд. И. Р. Геогр. Общ. Т. VII, № 4 и 5.

<sup>2)</sup> Черскій, Изв. В.-Сиб. Отд. И. Р. Геогр. Общ. Т. XI, № 1 и 2, стр. 52 и слѣд. См. также: Зап. В.-Сиб. Отд. И. Р. Геогр. Общ., Т. XII и Зап. И. Р. Геогр. Общ. По общ. географіи Т. XV съ геологіей того Байкала.

известнякомъ, обыкновенно въ состояніи переход-  
нѣ къ известково-байкалитовому гнейсу, причемъ полево-  
шатовны преобладаютъ въ горахъ сѣвернаго берега долины,  
известковыя въ южныхъ. Породы той-же системы слагаютъ  
и Шаманскій отрогъ, на южномъ концѣ котораго,  
именно въ западной части Ильчинскихъ щекъ, обнажается  
известково-байкалитовая порода; кромѣ того гранитовидная  
порода вмѣстѣ съ кристаллическимъ известнякомъ найдена  
и въ возвышенномъ и вытянутомъ въ восточномъ на-  
правленіи холмѣ, входящемъ въ составъ сѣверо-западной  
части Ильчинской гривки, со стороны низовья Большой Бы-  
строй, не говоря уже объ упоминавшемся выше выходѣ головъ  
этихъ же породъ на правомъ берегу Иркута, ниже впаденія  
въ него Ильчи. Если прибавить къ тому же, что около сѣ-  
веро-западной оконечности той же Ильчинской гривки Чер-  
ному удалось найти выходъ той же базальтовой лавы, съ  
которою мы ознакомились выше на противоположномъ берегу  
Иркута, передъ входомъ въ ущелье, и что лава эта известна  
уже въ низовьяхъ долины Култучной и около юго-западной  
оконечности Байкала (см. ниже), то сказаннымъ исчерпывается  
речень болѣе древнихъ породъ, входящихъ въ составъ  
Ильчинско-Култукской долины и образующихъ ложе покры-  
тое ея наноснымъ отложеніямъ. Простираніе пластовъ  
въ свою очередь такое-же, (з.-с.-з.), какое господ-  
ствуетъ какъ въ Тункинскихъ альпахъ и Саянѣ, такъ и въ  
окрестностяхъ Иркута, изъ чего видно, что западная часть Ильчин-  
ско-Култукской долины пересѣкаетъ эти пласты въ діагональ-  
номъ направленіи. Но самыя интересныя данныя обнару-  
жены отъ изслѣдованія наносныхъ отложеній интересующей  
долины. Крупная и великолѣпно обточенная галька съ  
диаметрами до 3-хъ дециметровъ въ діаметрѣ представляетъ  
себѣ древнее и всего болѣе распространенное отложеніе  
Ильчинской части долины. Неслоистый и весьма мощный  
песокъ этотъ имѣетъ ясно выраженные признаки наноса гор-



ныхъ рѣкъ и, судя по породамъ, составляющимъ эти гальки (въ числѣ которыхъ найдены и лавовыя), какъ равно и по образу распространенія, обязанъ своимъ происхожденіемъ водамъ р. Быстрыхъ и Иркута. Изъ этого наноса, какъ показало ближайшее изслѣдованіе, состоятъ всѣ описанныя выше плоскія возвышенія, начиная съ низовьевъ Быстрыхъ, черезъ Ильчинскую гривку и до самаго западнаго склона Шаманскаго отрога, причемъ оказывается, что въ сѣверо-западной части Ильчинской гривки высота, до которой достигаетъ этотъ осадокъ (295' надъ Иркутомъ, т. е. 672' надъ Байкаломъ), превосходитъ уже высоту самаго Шаманскаго отрога. Но еще болѣе интереснымъ является фактъ, что тотъ же наносъ найденъ Черскимъ еще и на террасовидныхъ уступахъ сѣверныхъ горъ этой долины, напр. ближе къ входу Иркута въ ущелье, на высотѣ до 324' надъ рѣкою (701' надъ Байкаломъ), слѣдовательно на 88 футовъ выше Шаманскаго отрога, причемъ на склонахъ южныхъ горъ, ближе къ названному отрогу, найдены еще уступы на высотѣ отъ 759' до 803' надъ Байкаломъ, и потому соответствующей высшей террасѣ, которая описана нами на лѣвомъ берегу р. Култучной, т. е. въ восточной половинѣ долины. Всѣ эти данныя доказываютъ безспорно, что въ періодъ отложенія описаннаго наноса съ галькою вода со стороны Иркута и Быстрыхъ направлялась къ Шаманскому отрогу, причемъ занимаемый ею уровень замѣтно превосходилъ высоту послѣдняго, такъ какъ и дно Ильчинской долины, выполненное наносомъ этихъ водъ до столь значительной высоты, располагалось выше отрога. Очевидно, что такого рода явленія не могли бы имѣть мѣста, если бы нынѣшнее ущелье Иркута сообщалось въ то время съ долиною и отводило собою накапливающуюся въ ней воду, а потому понятно, что все сказанное могло происходить при условіяхъ отсутствія связи между ущельемъ и нынѣшнюю насъ частью Ильчинско-Култукской долины. Но

и изолирующій элементъ находится здѣсь, такъ сказать, въ рукою: онъ состоитъ безспорно въ изліяніи описанной лавы, найденной какъ разъ передъ входомъ въ ущелье, по обѣ стороны его, причемъ на лѣвомъ берегу Иркута осадки этой лавовой преграды до сихъ поръ сохранили еще высоту въ 880' надъ уровнемъ прервавшей его въ послѣдствіи реки. Къ южной сторонѣ этой вулканической запруды, на лѣвомъ берегу Иркута, прилегаютъ и остатки описанныхъ выше, по всей вѣроятности третичныхъ (міоценовыхъ) пластовъ, содержащихъ въ себѣ гальки той-же лавы и отличающіяся значительнымъ наклономъ (до 60°) слоевъ, на головахъ которыхъ, какъ сказано выше, залегають тотъ-же наносъ съ галькою, изъ котораго состоитъ Ильчинская гривка. Занесеніе лавы, преградившее доступъ къ ущелью, имѣло место поэтому въ періодъ, предшествовавшій отложенію названныхъ третичныхъ пластовъ, характеръ которыхъ къ тому значительно отличается отъ наноса съ гальками, уподобясь скорѣе озернымъ или озерно-рѣчнымъ осадкамъ, нежели отложенію горныхъ рѣкъ, какимъ именно является настоящее послѣтретичное образованіе Ильчинской гривки и другихъ ей подобныхъ возвышеній интересующей насъ долины. Все вышесказанное вмѣстѣ съ данными, переданными выше при описаніи теченія Иркута отъ его верховья до поворота въ ущелье, послужило Черскому основаніемъ слѣдующихъ выводовъ относительно физико-географическихъ преобразованій, имѣвшихъ мѣсто въ описываемой мѣстности, и обусловившихъ наконецъ современныя топографическія ея особенности. Не говоря о болѣе древнемъ періодѣ развитія долины Иркута, къ которому относится образованіе Ильчинско-Култукской долины съ Шаманскимъ отрогомъ и первоначальное ея соединеніе съ ущельемъ, къ чему будемъ имѣть случай возвратиться въ своемъ мѣстѣ, мы отличаетъ слѣдующія стадіи позднѣйшаго развитія долины. 1) Закрытіе ущелья извергнутою лавою. 2) Раз-

мывъ нѣкоторой части этой лавы и отложеніе третичныхъ осадковъ, прикинувшихъ къ ущелью, къ южному склону ущелья-шей всетаки преграды, отъ которой заимствованъ и матеріалъ для лавовой гальки, заключенной въ этихъ, повидимому озерныхъ осадкахъ. 3) Размывъ третичныхъ пластовъ и нѣкоторой части лавы водами Иркутъ и Быстрыхъ, направлявшимися къ Байкалу и выполнившими Ильчинскую долину послѣтритичнымъ наносомъ съ галькою до высоты, замѣтно превосходившей Шаманскій отрогъ; направлявшееся къ сѣверо-востоку теченіе низовьевъ р. Большой Быстрой окружало въ соотвѣтственномъ направленіи и подмывавшійся ею склонъ горъ праваго берега, на мѣстѣ перехода его въ склонъ южнаго (тоже праваго) берега Ильчинско-Култукской долины. Наконецъ 4) въ періодъ высшаго стоянія водъ въ Ильчинско-Култукской долинѣ (см. также ниже) размытъ коснулся и лавовой стѣны, преграждавшей до тѣхъ поръ доступъ къ ущелью. Былъ очевидно періодъ, когда, не смотря на главное теченіе водъ Иркутъ къ Байкалу, часть ихъ начала изливаться и въ ущелье, постепенно размывая и углубляя запруженный прежде проходъ въ него и понижая уровень водъ, скопившихся въ Ильчинско-Култукской долине. Доказательствомъ тому, что значительная часть водъ Иркутъ направлялась въ Байкалъ еще и въ то время, когда наносъ валунами былъ размытъ уже до уровня высшихъ наносовъ современной Ильчинской гривки, служатъ описанные выше остатки руселъ р. Большой Быстрой, направляющіеся въ сторону Шаманскаго отрога, — обстоятельство, служащее вмѣстѣ съ тѣмъ указаніемъ и на то, что названный отрогъ долженъ былъ соотвѣтственно размываться перерѣзывающими Ильчинскими щеками, иначе въ то время онъ игралъ бы уже роль преграды, достаточной для препятствія размыва и сноса послѣтритичной толщи галекъ въ этомъ направленіи. Съ тѣхъ поръ однако, по мѣрѣ происшедшаго пониженія уровня водъ отъ соотвѣтственнаго

бленія входа въ ущелье, перевѣсъ склоняется на сторону послѣдняго: русло Иркутъ углубляется въ его современномъ направленіи, увлекая роковымъ образомъ и теченія р.р. Быстрыхъ; послѣдними моментами дѣйствія стока водъ въ противоположныхъ направленіяхъ является образованіе долинъ обонхъ Ильчи, изъ которыхъ Иркутный, врѣзываясь въ древній наносъ совмѣстно съ повернувшимися къ сѣверо-западу низовьями Большой Быстрой, создаютъ заостренное, мысовидное удлинненіе современной оконечности Ильчинской гривки, принявшей поэтому сѣверо-западное же направленіе, тогда какъ почвенныя воды до сихъ поръ еще поддерживаютъ существованіе и сильное размывающее дѣйствіе Култучнаго Ильчи, присоединившагося къ р. Култучной.

Такимъ образомъ дѣлается понятнымъ происхожденіе даже рѣзчайшихъ особенностей современныхъ топографическихъ и гидрографическихъ условій описанной мѣстности. Но къ сказанному, въ заключеніе, необходимо указать еще на одно явленіе, дополняющее обрисованную выше картину доисторическаго прошлаго интересующей насъ долины. При описаніи средняго течения Иркутъ мы ознакомились уже съ мощными толщами констаго песчанаго наноса, поднимающагося напр. въ Еловомъ отрогѣ до высоты 1157' надъ Тункинскою долиною, причемъ оказалось, что озерное отложеніе это, въ которомъ Черскій находилъ кости вымершихъ послѣтретичныхъ млекопитающихъ животныхъ, покрываетъ собою рѣчной наносъ галькою и потому моложе его. Тѣ же пески прослѣжены и черезъ Торскую котловину до Тибельтинско-Быстриннаго суженія долины Иркутъ, гдѣ, напр. на водораздѣлѣ между низовьями р.р. Нижн. Тибельти и Малой Быстрой, по наблюденіямъ Черскаго, залегаютъ на высотѣ 1103' надъ Байкаломъ (726' надъ Иркутомъ), къ тому же въ такихъ условіяхъ, которыя не допускаютъ сомнѣнія въ томъ, какъ осадокъ этотъ, такъ и отлагавшія его воды должны распространяться и на Ильчинскую долину. Водамъ

этимъ можно приписать поэтому образованіе высшихъ террасъ (до 803' надъ Байкаломъ) на склонахъ горъ этой части долины, тогда какъ на востокъ отъ Шаманскаго отрога, плоскости размывающаго ихъ дѣйствія соотвѣтствуетъ описанная выше расчлененная терраса лѣваго берега долины р. Култучной, какъ достигающая и даже значительно превышающая 800' надъ современною поверхностью Байкала. И дѣйствительно, произведенное въ 1879 г. изслѣдованіе послѣдней <sup>1)</sup> обнаружило, что на небольшихъ, второстепенныхъ уступахъ верхней поверхности этой высокой террасы видѣлись мѣстами параллельныя какъ между собою, такъ и въ долинѣ Култучной грядки, состоящія изъ галекъ и обточенныхъ валуновъ, съ характеромъ прибрежнаго, прибойнаго отложенія. Такія грядки, найденныя Черскимъ на высотахъ отъ 586—618 и до 928 футовъ надъ уровнемъ озера, окончательно убѣждаютъ насъ въ дѣйствительномъ значеніи этого высшаго уступа, обрисовывая вполнѣ новую картину, въ нѣе новый фазисъ въ очерченной выше исторіи развитія Ильчинско-Култучской долины, онѣ связываютъ ее еще тѣнѣе съ доисторическимъ прошедшимъ самого Байкала, такъ какъ высшія террасы эти, объяснимыя лишь дѣйствіемъ отвѣтственно высокаго уровня стоячихъ (озерныхъ), а не проточныхъ (рѣчныхъ) водъ, непосредственно переходятъ на склоны горъ, окружающихъ юго-западную оконечность озера, какъ мы увидимъ при подробномъ описаніи послѣдней. Периодъ отложенія рѣчнаго наноса, образующаго Ильчинскія гривку и другія сосѣднія ей возвышенія, долженъ былъ сниться такимъ образомъ затопленіемъ этой мѣстности водою послѣдтретичнаго Байкала до высоты не менѣе 928' надъ современнымъ уровнемъ, распространявшимися поэтому на всю западную часть долины р. Иркуты, почти до самаго верховья послѣдняго, и отлагавшими знакомые намъ

<sup>1)</sup> Черскій, Изв. В. Сиб. Отд. И. Р. Геогр. Общ. Т. XI, № 1 и стр. 60.

в Тункинской и Торской котловинѣ. Періодъ этотъ, обнаруживавшій когда-то съ еще большею наглядностью географическое единство долинъ Иркутъ и Байкала, а вмѣстѣ съ тѣмъ и сопровождающихъ ихъ горныхъ цѣпей, совпадалъ очевидно съ началомъ размыва лавовой преграды около входа въ современное ущелье; вѣрнѣе, его водами начался этотъ размывъ, отклонившій впослѣдствіи Иркутъ отъ Байкала. Въ это время, какъ мы увидимъ ниже, Байкалъ долженъ былъ имѣть два истока: одинъ черезъ современное ущелье называвшійся рѣка, а другой—Ангарскій.

Наконецъ, что касается вопроса объ искусственномъ поворотѣ теченія Иркутъ опять въ Байкалъ, то возможность и исполнимость такой работы не подлежитъ никакому сомнѣнію, но въ настоящее время разумѣется такая работа нецелесообразна и практическія выгоды отъ нея могутъ вырѣдиться лишь въ весьма отдаленномъ будущемъ, съ развитіемъ экономическихъ условій на западѣ и ю.-в. отъ этой конечности Байкала.

## ОБЩЕЕ ОБОЗРѢНІЕ БАЙКАЛА И ОКРУЖАЮЩИХЪ ЕГО ГОРЪ.

Озеро Байкалъ (Море у мѣстнаго русскаго населенія, Далай-норъ у бурятъ, см. ниже) располагается около подножія сѣверо-восточнаго продолженія Саяна лежащаго за нимъ высокаго плоскогорья, ограничиваясь съ северо-запада сравнительно узкою полосой горъ (40 — 100 м.) отдѣляющихъ его отъ высшей террасы плоской возвышенности (см. выше) и прерванныхъ единственнымъ нынѣшнимъ (Ангара, Нижняя Ангара), черезъ посредство котораго озеро связывается съ Енисеемъ и Ледовитымъ океаномъ. Согласно астрономическимъ опредѣленіямъ Шварца <sup>1)</sup>,

<sup>1)</sup> Шварцъ, Труды Сиб. Экспеди. И. Р. Геогр. Общ. Математ. отдѣл. Спб. 1864 г.

озеро это лежитъ между  $51^{\circ}29'$  (станція Мурино) и  $55^{\circ}50'$  (Душкочанъ) сѣв. широты и  $121^{\circ}25'$  (село Култукъ) и  $127^{\circ}32'$  вост. долготы отъ Ферро, при чемъ поверхность его, какъ показали результаты Сибирской нивелировки 1875—76 г. <sup>1)</sup> располагается на высотѣ 1651' (475,9 метр.) н. ок. Длина озера, измѣряя по средней его линіи, нѣсколько превышаетъ 600 верстъ, при наибольшей ширинѣ около 80 верстъ; длина береговой линіи, по измѣренію Черскаго, равняется 1748 верстамъ, изъ которыхъ 788 падаютъ на сѣверо-западный и 960 на юго-восточный берегъ. Что же касается площади, занимаемой поверхностью Байкала, то она равняется 34.975 кв. километр. и потому замѣтно больше площади напр. всей Московской губ. Если сравнивать величину Байкала съ самыми большими изъ извѣстныхъ въ мірѣ прѣсноводныхъ бассейновъ, то онъ займетъ въ ихъ ряду только шестое мѣсто, такъ какъ площади озеръ: Нѣнца (83.900 кв. кил.) Вермонта (81.000 кв. кил.), Мичигана (57.000 кв. кил.), Гурона (52.000 кв. кил.) и даже Танганайки (39.000 кв. кил.) значительно превосходятъ такіе же размѣры Байкала (34.975 кв. кил.), тогда какъ Эри (24000 кв. мил.), Виннипег (25.000), Медвѣжье (21.000), Ладожское (19.000), Онтарио (16.200), Онежское (9.000), Венеръ (5.000), Веттернъ (1.900), Женевское (580), Боденское (540) <sup>2)</sup> и друг. остаются позади. И только въ такомъ случаѣ, если поставить Байкалъ въ ряду альпійскихъ озеръ, лежащихъ высоко надъ уровнемъ океана среди горъ, вершины которыхъ болѣе или менѣе приближаются къ линіи вѣчнаго снѣга, Байкалъ нашъ займетъ первое мѣсто среди ему подобныхъ, между тѣмъ какъ въ чрезвычайной глубинѣ своей (4503' см. ниже) онъ не имѣетъ до сихъ поръ соперника. Во всякомъ случаѣ, принимая въ соображеніе необыкновенную глубину Байкальскаго озера, можно полагать, что по кубическому объему своихъ водъ Байкалъ

<sup>1)</sup> Зап. И. Р. Георг. Общ. по Общей Географіи Т. XV № 1. 1885 г.

<sup>2)</sup> А. Geistbeck, Die Seen d. Deutschen Alpen. Leipzig. 1885.

Байкальское озеро займетъ первое мѣсто въ ряду прѣсноводныхъ озеръ земнаго шара.

Вытягиваясь, какъ сказано выше, вообще съ юго-запада на сѣверо-востокъ, Байкаль изгибается слегка дугообразно въ вогнутость, обращенною на сѣверо-западъ такъ, что хорда этого изгиба равняется 567 верстамъ. Приблизительно между  $42^{\circ}58'$  и  $53^{\circ}55'$  сѣв. широты, на протяженіи одной полосы, нагональной направленію долины озера, располагаются острова Ольхонъ, около сѣверо-западнаго берега, отклоняясь пою длинною осью (71 верста) на в.-с.-в., а на юго-восточномъ берегу (выше  $53^{\circ}26'$  сѣв. шир.) большой полуостровъ Святой Носъ, вдающійся верстъ на 30 въ озеро, части какъ бы на встрѣчу Ольхону, не подступая однако ему ближе чѣмъ на 46 верстъ; ими Байкаль раздѣляется какъ бы на двѣ части: сѣверо-восточную, меньшую, занимающую 284 версты въ длину, и юго-западную, болѣе длинную (316 верстъ). Эта послѣдняя, въ свою очередь, между  $52^{\circ}31'$  и  $52^{\circ}24'$  сѣв. широты, а  $123^{\circ}41'$  и  $124^{\circ}13'$  вост. долготы, гдѣ съ с.-з. въ озеро впадаетъ р. Бугульма, а съ ю.-в. располагается устье Селенги, представляетъ узженіе до 20 верстъ (самое узкое мѣсто озера), благодаря которому оно раздѣляется на двѣ части, отличныя какъ по ширинѣ, такъ и по направленію. Такимъ образомъ, въ очеркѣ Байкала можно различать слѣдующія три части, имѣющія, какъ мы увидимъ ниже, нѣкоторую связь и съ исторіею образованія этой долины <sup>1)</sup>. 1) Юго-западная часть, начиная отъ соотвѣтственной оконечности озера, гдѣ оно суживается до 8 верстъ и гдѣ располагается деревня Култукъ ( $43^{\circ}5''$  сѣв. шир. и  $121^{\circ}25'$  вост. долг.), до упомянутаго узженія въ предѣлахъ устья р. Селенги. Начиная съ Култука, часть эта, расширяясь до 37 верстъ, направляется дуго-

<sup>1)</sup> Черскій, Зап. В. Сиб. Отд. И. Р. Геогр. Общ. Т. XII. 1886. и Зап. И. Р. Геогр. Общ. по общей географіи Т. XVI съ геологич. картою.



образно сначала съ запада на востокъ (около 50 верстъ) затѣмъ на с.-в. (столько же), а наконецъ на с.-с.-в. къ суженію, отдѣляющему её отъ слѣдующей части Байкала. Въ разстояніи 75 верстъ отъ юго-западной оконечности, въ этой части озера располагается его истокъ, — быстрая, широкая и многоводная Ангара съ селомъ Лиственничнымъ на восточномъ берегу бухты истока ( $51^{\circ}48'$  сѣв. шир  $122^{\circ}29'9''$  вост. долг.). 2) Средняя часть, длиною 191 верстъ, отличается в.-с.-в. направлениемъ до  $126^{\circ}41'$  вост. долг., гдѣ, около южнаго берега Святого Носа, она оканчивается округленнымъ концомъ, известнымъ подъ названіемъ Баргузинскаго залива. Ограничиваясь съ сѣверо-запада сначала материкомъ, затѣмъ юго-восточнымъ берегомъ Ольхона, а наконецъ южнымъ берегомъ Святого Носа и достигая около 49 верстъ наибольшей ширины, часть эта широко открывается на с.-с.-в. между названнымъ полуостровомъ Ольхономъ (46 верстъ), соединяясь здѣсь съ сѣверо-восточной частью озера, съ которою она сообщается еще и черезъ средство очень узкаго пролива (до 2 верстъ), отдѣляющаго юго-западный конецъ Ольхона отъ материка ( $124^{\circ}24'$  вост. долг.) и известнаго подъ именемъ Ольхонскихъ проливовъ. Наконецъ 3) Сѣверо-восточная часть озера, до 284 верстъ длины и 68 верстъ наибольшей ширины (несколько сѣвернѣе Святого Носа), отличается с.-с.-в. направлениемъ, въ которомъ она довольно постепенно суживается къ усѣченной сѣверо-восточной оконечности Байкала, достигающей 25 верстъ ширины. Къ югу между тѣмъ часть озера раздѣляется на три вѣтви: а) главную и самую широкую (46 верстъ), отдѣляющую восточный берегъ Ольхона отъ склона Св. Носа и соединяющую ее со среднею частью озера; б) юго-западную, до 73 верстъ длины и болѣе 25 верстъ наибольшей ширины; вѣтвь эта отдѣляетъ сѣверо-западный берегъ Ольхона отъ материка и известна подъ именемъ Малаго моря (Нарынъ-Далай у бурятъ) и въ

передъ соединяется съ среднею частью Байкала посредствомъ упомянутыхъ выше Ольхонскихъ Воротъ (Амьнъ урартъ); наконецъ, в) южная или юго-восточная вѣтвь до 36 верстъ длины и около 16 верстъ ширины, образуетъ собою Ивиркускій заливъ, называемый всего чаще Курбу-инъ или Кургуликъ, отдѣляющій восточный берегъ Св. Оса отъ материка.

Всѣхъ *притоковъ Байкала*, включая и ключи, протекущіе все-таки въ самостоятельныхъ долинахъ, Черскій считываетъ 336; они распредѣляются такимъ образомъ, что на юго-восточномъ берегу озера ихъ 202, на сѣверо-западномъ только 126 и на островѣ Ольхонѣ 8. Такая неравномѣрность въ распредѣленіи водъ объясняется небольшою шириною сѣверо-западныхъ горъ долины. Главныхъ притоковъ только три, причемъ всѣ они принадлежатъ юго-восточному берегу, какъ-то: р. Селенга, собирающая воды съ громадной площади высокаго плоскогорья, называемая, какъ сказано выше, на границѣ между юго-западною и среднею частями озера; такъ называемое Среднее устье этой рѣки, по опредѣленію Шварца, располагается подъ  $52^{\circ}24'$  сѣв. шир. и  $124^{\circ}13'$  вост. долг.; р. Баргузинъ, берущая начало въ окраинныхъ горахъ высокаго плоскогорья и впадающая въ восточную оконечность средней части озера, т. е. въ Баргузинскій заливъ, около  $53^{\circ}26'$  сѣв. шир.  $126^{\circ}41'$  вост. долг.; рѣка эта придерживается юго-западнаго направленія и потому на всемъ протяженіи теченія не удаляется значительно отъ озера, наконецъ, Верхняя Ангара беретъ начало съ окраинныхъ же горъ плоскогорья и впадаетъ въ сѣверо-восточную оконечность Байкала; восточное, или такъ называемое Дагарское ея устье располагается подъ  $55^{\circ}42'$  сѣв. шир. и  $127^{\circ}32'$  вост. долг. Кромѣ этихъ изъ числа болѣе значительныхъ притоковъ озера назовемъ еще слѣдующіе: знакомая намъ уже р. Култучная притокомъ Ильчи, изливающаяся въ юго-западную око-

нечность Байкала, за тѣмъ по юго-восточному берегу озера, между Култучною и Селенгою впадаютъ: Слюдянка, Безымянная, Утуликъ, до системы верховьевъ котораго привелъ насъ описанный выше маршрутъ Чекановскаго по рч. Тибельтѣ, Согзонѣ или Солзонѣ, Мѹринѣ или Хара-Мѹринѣ, устье котораго лежитъ подъ  $51^{\circ}29'$  сѣв. шир. и  $122^{\circ}2'$  вост. долг., Снѣжная, Выдренная, Переѣмная съ устьемъ подъ  $51^{\circ}35'$  сѣв. шир. и  $122^{\circ}50'$  вост. долг. Мншиха, Дысовская, Мантуриха (Мантурикѣнъ), Култучная 2-я, а затѣмъ Абрамиха, Тѣлбузиха и Большая Рѣчка (обыкновенно просто «Рѣчка»), впадающія въ большую лагуну, извѣстную подъ названіемъ Соръ или Прорва, лежащую нѣсколько южнѣ Посольскаго монастыря ( $52^{\circ}1'3''$  с. ш. и  $123^{\circ}49'6''$  в. д.). Далѣе, между Селенгою и Баргузиномъ, слѣдовательно въ среднюю часть озера, впадаютъ рѣки: Сухая, Таланка, Кика, Турка Максимиха и Духовская, наконецъ, между Баргузиномъ и Верхнею Ангарою отличаются сравнительно большою многоводностью: Малый Чивыркѹй, впадающій въ южную оконечность Чивыркуйскаго залива черезъ посредство оз. Соръ, лежащаго на перешейкѣ Святаго Носа, Большой Чивыркѹй съ устьемъ подъ  $53^{\circ}49'$  сѣв. шир. и  $126^{\circ}54'$  вост. долг. Большая Черемшанка, Сосновка, Тѣрпулики Давши, Большая, Кабанья, Урбикѣнъ, Шангѣнгѣ или Лабзиха, Томпуда или Смолиха (нерѣдко неправильно «Тампула») съ устьемъ подъ  $55^{\circ}7'$  сѣв. шир. и  $127^{\circ}24'$  вост. долг., Ширигли или Ташириха, Бирей и Фролий. На сѣверо-западномъ же берегу Байкала, между юго-западною оконечностью и истокомъ Ангары, болѣе замѣчательны Ангѣсалики и Половинная, далѣе, между Ангарою и началомъ средней части озера: Голоустная съ устьемъ около  $52^{\circ}1'$  с. ш. и  $123^{\circ}3'$  долг. и Большая Бугульдейка впадающая подъ  $52^{\circ}31'$  сѣв. шир. и  $123^{\circ}41'$  вост. долг., затѣмъ, между послѣднею и Малымъ Моремъ, р. Ангѣ

конецъ, начиная съ Малаго Моря до Верхней Ангары: Сорма съ устьемъ, расположеннымъ насупротивъ Ольхонскихъ Веротъ, около  $53^{\circ}6'$  сѣв. шир. и  $124^{\circ}24'$  вост. долг., Бурма и Збгдукъ (всѣ вливаются въ Малое Море), Онгурёнъ съ устьемъ около  $53^{\circ}38'$  сѣв. шир. и  $125^{\circ}8'$  вост. долг., Илга, Ледяная, Елѣхина съ устьемъ около  $54^{\circ}32'$  сѣв. шир. и  $126^{\circ}12'$  вост. долг. (мысъ), Коврижка или Мулеканъ, Котельниковская, Горемыка около  $55^{\circ}21'$  сѣв. шир. и  $126^{\circ}51'$  вост. долг. (деревня), Рель, Слюдяная и Кѣтики или Тья.

Горы, опоясывающія долину Байкала, вообще не превосходятъ по видимому 6087' абс. выс., т. е. 4500' надъ уровнемъ озера, къ которому онѣ примыкаютъ непосредственно и почти непосредственно, за исключеніемъ значительнаго растяженія южнаго берега юго-западной части долины, снабженнаго низменнымъ прибрежіемъ до 12 верстъ ширины, а также дельты: р. Селенги, низменная поверхность которой достигаетъ 43 верстъ наибольшей ширины, считая отъ озера до горъ, затѣмъ Баргузина, Верхней Ангары, укоротившей озеро на 36 верстъ и другихъ меньшихъ притоковъ. Высота же надъ поверхностью озера почти равняется такимъ образомъ его наибольшей глубинѣ. Изъ предшествовавшихъ изложеній мы видѣли, что Тункинская цѣпь горъ переходитъ непосредственно въ сѣверныя горы Ильчинско-Култукской долины, а слѣдовательно и юго западной части озера, тогда какъ соответственное продолженіе Саяна переходитъ въ горы южнаго берега Байкала; точно также въ сѣверо-восточной оконечности озера горы эти переходятъ въ берега Верхне-ангарской долины, продолжаясь вверхъ по теченію послѣдней на в.-с.-в. и ограничивая большія озеро-подобныя расширения этой долины, вполне аналогичной Тункинской (т. е. Ангары). Долина Верхней Ангары находится поэтому въ томъ же отношеніи къ Байкальской, какъ и долина Иртыша выше поворота этой рѣки въ ущелье: всѣ онѣ лежатъ въ продолженіи другъ друга.

Сѣверо-западные горы Байкальской долины («Байкальскій хребетъ» прежнихъ географовъ) <sup>1)</sup> состоятъ изъ двухъ параллельныхъ цѣпей, какъ это впервые доказано Чекановскимъ <sup>2)</sup> и прослѣжено далѣе Черскимъ, изъ отчетъ котораго мы заимствуемъ это обозрѣнiе <sup>3)</sup>. Болѣе высокою изъ нихъ является хребетъ Приморскій. Онъ образуетъ прибрежную цѣпь на всемъ протяженiи названнаго берега за исключенiемъ отрѣзка горъ съ другимъ характеромъ (см. ниже), лежащаго на юго-востокъ отъ линiи, соединяющей устьи Большой Бугульдейки съ юго-западною оконечностью Малаго Моря и включающаго въ себѣ островъ Ольхонъ. Начинается съ западной части Торской котловины (долина Иркута см. выше), гдѣ цѣпь эта потеряла альпійскій характеръ, она понижается къ пересѣкающему еѣ истоку р. Ангары, около котораго высота ея ниспадаетъ до 656' надъ озеромъ и еще менѣе; отсюда она опять постепенно возвышается къ сѣверо-востоку, приобрѣтая альпійскую наружность только въ сѣверо-восточной части Байкала, за рч. Илгою. Приморскій хребетъ служитъ водораздѣломъ между мелкими притоками озера и водами, изливающимися въ Ангару, а отчасти и въ Лену и глубоко перерѣзывается болѣе значительными реками системы Байкала, какъ-то: Голоустною, Большою Бугульдейкою, Ангою и Сармою, верхнiя теченiя которыхъ располагаются вдоль его сѣверо-западнаго подножiя, или какъ напр. р. Бугульдейки, проложены въ юго-восточномъ склѣбѣ другого, параллельнаго ему, но нѣсколько болѣе низкаго хребта. Этому послѣднему присвоено названiе хребта Онотскаго (или просто Онотъ), подъ которымъ у мѣстныхъ жителей онъ извѣстенъ впрочемъ лишь въ промежуткѣ между Ангарою, — вѣрнѣе даже между Голоустною и Сармою. Имя этакая сѣверо-западнымъ подножiемъ къ высшей тер-

<sup>1)</sup> Меглицкiй, Горн. Журн. I. с.

<sup>2)</sup> Чекановскiй, Зап. В. Сиб. Отд. И. Р. Геогр. Общ. Т. XI.

<sup>3)</sup> Черскiй, Зап. В. Сиб. Отд. И. Р. Геогр. Общ. Т. XII.

плоской возвышенности и широко прерываясь въ предѣлахъ долины р. Ангара, онъ возвышается какъ къ юго-западу, такъ и въ промежуткѣ между Ангарою и нижнемъ теченіемъ Иркуты, онъ фигурируетъ въ лицѣ хребта Еловаго, а далѣе переходитъ въ знакомую намъ уже цѣпь Китайскихъ альпъ, — такъ и къ сѣверо-востоку, гдѣ онъ осматрѣнъ только въ 125°30' вост. долготы. Въ нѣсколькихъ верстахъ восточнѣе этого меридіана Оготъ, не представляющій нигдѣ альпійской конфигураціи, пересѣкается р. Леною, берущею начало между Приморскимъ хребтомъ, въ продольной долинѣ, и протекающею верстъ съ 20 на с.-в., въ разстояніи отъ 11 до 4 верстъ отъ береговой линіи Байкала, послѣ чего уже эта поворачивается на с.-с.-з. къ ущелью, а затѣмъ на с.-с.-з. до выхода изъ Оготскаго хребта на плоскую возвышенность. Тотъ же хребетъ (Оготскій) пересѣкается еще Ванай, лѣвымъ притокомъ Лены, берущимъ начало въ продольной долинѣ съ главною своею рѣкою, а также двумя другими лѣвыми притоками Ваная (Ванайскій Ючикъ и Пранькина Падь), верховья которыхъ соединены съ источниками р. Илги, впадающей въ Байкалъ, концы далѣе къ юго-западу, кромѣ долины Ангара, Оготъ, въ видѣ хребта Еловаго, перерѣзываютъ еще: рч. Олху, лѣвый притокъ Иркуты и самъ Иркутъ ниже ущелья, тогда какъ остальные изъ извѣстныхъ рѣчекъ берутъ только начало на сѣверо-западномъ склонѣ Оготскаго хребта.

Что же касается упомянутой выше части горъ, лежащей къ юго-востоку отъ линіи, соединяющей устье Б. Бугульдейки съ юго-западною оконечностью Малаго Моря, то она представляетъ собою площадь, высшіе пункты которой не превышаютъ 1917' на материкѣ, а на Ольхонѣ 2500' надъ уровнемъ моря. Площадь эта примыкаетъ къ юго-восточному склону Приморскаго хребта, отдѣляясь отъ него рядомъ продольныхъ долинъ, и расчленяется такими-же долинами на параллельныя грады, принимающія въ рѣдку альпійскій характеръ, хотя

и въ маломъ масштабѣ. Омываясь съ юго-востока Байкаломъ къ которому она опускается крутымъ утесистымъ склономъ описываемая площадь прерывается, какъ съ юго-запада, такъ и съ сѣверо-востока, а отчасти и сѣверо-запада (Малое Мор-  
водами озера, узкимъ проливомъ которыхъ (Ольхонскія В-  
рота) она раздѣляется еще на двѣ части: юго-западную и  
материковую и сѣверо-восточную, т. е. островъ Ольхонъ  
причемъ первая почти вполнѣ параллельна Приморской  
хребту, а вторая (Ольхонъ) отклоняется сначала нѣсколь-  
ко къ востоку, но затѣмъ поворачиваетъ дугообразно опять къ  
сѣверо-востоку. Вся эта площадь не имѣетъ такимъ образомъ  
цѣльнаго характера, а является напротивъ какъ бы от-  
дѣленнымъ отрѣзкомъ горъ, продолжавшихся прежде по мѣст-  
занятому современною долиною Байкала. Къ этой категоріи  
горъ, которую Черскій называетъ Внутрибайкальскими  
можно отнести съ орографической точки зрѣнія, и всѣ бл-  
жайшія къ береговой линіи озера высокія, террасовидныя по-  
лосы, а также террасовидныя предгорья (см. ниже), какъ на-  
ходясь на сѣверо-западномъ берегу озера, въ промежуткѣ между  
Котельниковскою и Слюдяною, а на юго-восточномъ ме-  
жду Киккою и Баргузиномъ, затѣмъ сѣвернѣе р. Сосновки и т. д.  
Къ нимъ, съ той-же точки зрѣнія, относятся и всѣ свѣ-  
дѣнія *острова*, которыхъ, кромѣ Ольхона, Черскій насчи-  
тываетъ 26: одинъ въ юго-западной части озера, между Го-  
устною и Бугульдейкою, 13 въ Маломъ морѣ, одинъ ме-  
жду р. Рель и Слюдяною, шесть около юго-восточнаго  
берега въ Чивыркуйскомъ заливѣ, четыре въ видѣ груп-  
пъ около сѣверо-западнаго берега Святаго Носа (Ушканья  
острова) и одинъ на сѣверо-востокъ отъ р. Тунки, причемъ  
принимались въ расчетъ нѣкоторые незначительные, состо-  
ящіе изъ розсыпи, какъ равно и наносные острова дельты. Со-  
общеніе же можно отнести и полуостровъ Святой Носъ, который  
представляетъ собою въ сущности самый высокій (4000' надъ  
уровнемъ) скалистый островъ, связанный съ материкомъ не-  
высокимъ и узкимъ, наноснымъ перешейкомъ.

Юго-восточный берег долины Байкала образуетъ Забайкальскій хребетъ, раздѣленный долинами р.р. Селенги и Баргузина на три части, ограничивающія соименныя отрѣзки озера, именно: юго-западную или Хамаръ-дабанскую, среднюю или Селенгинско-Баргузинскую и сѣверо-восточную или Баргузинско-Ангарскую. Хамаръ-дабанская часть (Хамаръ-дабанскій хребетъ на картѣ Шварца), какъ непосредственное продолженіе Саяна, играетъ роль ближайшаго окраиннаго хребта располагающагося за нимъ высокаго плоскогорья. Она достигаетъ самыхъ значительныхъ высотъ въ юго-западной своей части и средней, гдѣ приобретаетъ даже альпійскій характеръ, послѣ чего постепенно понижается къ Селенгѣ, черезъ посредство которой высокое плоскогорье сообщается съ долиною Байкала точно также, какъ плоская возвышенность проникаетъ въ нее съ сѣверо-запада по долинѣ Итанцы.

Селенгинско-Баргузинская часть въ свою очередь непосредственно примыкаетъ къ высокому плоскогорью. Она сравнительно самая низкая (до 2624' надъ озеромъ) и пересекается еще широкою долиною рч. Кики, верховья которой вполнѣ открыты къ долинѣ Итанцы, правому приходу низовьевъ Селенги, вслѣдствіе чего названная часть хребта подраздѣляется на два отрѣзка: юго-западный или Селенгинскій и сѣверо-восточный или Кикинско-Баргузинскій, отъ котораго отдѣляется еще собственно Баргузинскій хребетъ, какъ орографическая вѣтвь Забайкальскаго хребта. Этотъ слѣдуетъ вверхъ по лѣвому берегу долины р. Баргузина и вмѣстѣ съ нею удаляется отъ Байкала къ сѣверо-востоку, окаймляя собою на столько же отодвинувшееся отъ озера высокое плоскогорье.

Наконецъ, сѣверо-восточная часть Забайкальскаго хребта Баргузинско-Ангарская, достигаетъ опять самыхъ значительныхъ мѣстныхъ высотъ и въ разстояніи около 75 верстъ отъ устья Баргузина, считая по Байкалу, а болѣе 40



версть, считая вверхъ по правому берегу Баргузина, принимаетъ уже альпійскій характеръ, причемъ однако зазубренный гребень, при взглядѣ на него съ озера, мѣстами исчезаетъ въ особенности въ средней части длины, уступая мѣсто вѣточнымъ и тупымъ формамъ вершинъ. Баргузинско-Ангарская часть этихъ горъ, въ своемъ сѣверо-восточномъ продолженіи, переходитъ столь-же непосредственно въ горы лѣваго берега долины Верхней Ангары, какъ Хамарь-дабанская часть (къ западу) въ Саянъ.

Склоны Байкальской долины, образуемые новыми горами, отличаются неодинаковымъ характеромъ. Они весьма короткіе и потому крутые въ большей части длины сѣверо-западнаго берега, тогда какъ на юго-восточномъ они отличаются гораздо большею длиною и пологостію, хотя пологость эта маскируется мѣстами, со стороны береговой линіи, отвѣсными утесами, которыми обрѣзывается и озеру такой, иногда въ сущности даже очень пологій склонъ горъ.

Склоны эти изрѣзаны упомянутымъ выше громаднымъ числомъ долинъ притоковъ озера, (не считая совершенно сухихъ или занятыхъ лишь періодическими водами), расчленяются соответственно значительное количество второстепенныхъ роговъ, вдающихся болѣе или менѣе глубоко въ озеро и разующихъ собою мысы, значительная часть которыхъ является и независимою отъ упомянутыхъ долинъ и отроговъ, обнаруживая, какъ мы увидимъ ниже, прямую связь съ мывающимъ дѣйствіемъ Байкальскихъ волнъ. Всѣхъ мысовъ съ извѣстными названіями Черскій насчитываетъ 174 <sup>1)</sup>, изъ которыхъ 101 принадлежатъ сѣверо-западному берегу, а юго-восточному, не считая еще болѣе 30 мысовъ на островѣ Ольхонѣ. Изъ нихъ, какъ на болѣе важные въ географическомъ отношеніи, слѣдуетъ указать на сѣверо-зап.

<sup>1)</sup> Черскій, Изв. В. Сиб. Отд. И. Р. Геогр. Общ. Т. XII, № 4, стр. 66.

вѣкъ берегу озера, считая съ юго-запада на сѣверо-востокъ: 1) Ангасольскій, названный неправильно Сосновымъ въ источникахъ, которыми пользовался Риттеръ, 2) Голобовый, 3) Половинный, на лѣв. берегу устья соименной рѣки, 4) Толстый, ограничивающій бухту истока Шары съ запада и 5) Березовый (у Риттера Лиственичій), ограничивающій её съ востока; далѣе 6) Соболевъ (у Риттера неправильно Соболинный), 7) Большой Радильный, 8) Голоустный или Голоустенскій, образованный дельтою соименной рѣки, 9) Хомутовскій, 10) Голокольный (ихъ собственно нѣсколько, расположенныхъ рядомъ, среди ихъ лежитъ и 11) Песчаный), а наконецъ 12) Бугульдейскій на границѣ юго-западной части озера со среднею. Далѣе 13) Хатъй, 14) Борогайскій и Крестовскій, 15) Ангинскій на сѣверо-восточномъ берегу бухты устья р. Анги, 16) Уланъ-нуръ и 17) Крестъ около входа въ Ольхонскія Ворота, ограничивающіяся къ сѣверо-западу красивымъ мысомъ 18) Анъ-хадаъй. Далѣе, уже въ Маломъ морѣ: 19) Сармъскій (дельта р. Сармы), 20—22) три Курминскіе, Арұлъ, т. е. крайній изъ двухъ Заминскихъ мысовъ, лежащихъ на сѣверо-восточной границѣ Малаго моря; 23) Утұ-хапсагаъй, 24) Элигёй или Ильгинскій (у р. Илги), 25) Кочериковскій и 26) Хыръ-ху-мъ или Рытный, весьма священный для бурятъ (см. выше); далѣе 27) Голый или Шартла, съ котораго собственно, а не съ Заворотнаго, какъ полагали прежде, берегъ принимаетъ направленіе на с.-с.-в., 28) Покойники, 29) Солонцовый (Хужиръ или Хужиртѣ) Большой и 30) Малый, 31) Заворотный, (у Риттера неправильно «Голо-Заворотникъ»), названный такъ отъ маленькой бухты около юго-западнаго основанія, весьма круто врѣзывающейся въ извилистый берегъ и заворачивающейся вдоль береговой черты; 32) Елѣхинъ, 33) Черемшаскій, 34) Хйбе-

лень, 36) Котельниковскій (Горячій мысъ у Раттера) съ горячимъ ключемъ (см. ниже), 37) Лѹдаръ иногда Горемыкинскій, хотя онъ располагается на с.-с.-в. отъ устья р. Рель, затѣмъ 38) Котиковскій и 39) Курла въ предѣлахъ с.-в.-й оконечности Байкала. Между тѣмъ, на юго-восточномъ берегу отличаются: 1) Шаманскій мысъ, вдающійся въ юго-западную оконечность Байкала между устьями р.р. Бугучной и Похабихи, далѣе 2) Безъимянный, 3) Утуликскій, затѣмъ 4) Мурунскій, 5) Снѣжинскій, 6) Аносовскій, между которыми располагаются самыя южныя пункты береговой линіи озера; за ними: 7) Мишинскій, 8) Ивановскій, 9) Мысовской и 10) Матурихинъ или Лихановскій, отъ котораго начинается болшая площадь дельты р. Селенги съ мысомъ 11) Средняе устья, составляющимъ, вмѣстѣ съ упомянутымъ выше Бугучдейскимъ, границу между юго-западною и среднею частями Байкала. Далѣе, мысы: 12) Сухой, 13) Бакланій, 14) Тонкій, 15) Гремячій, 16) Лиственичный и 17) Толстый 4-й—обусловливаютъ соотвѣтственное направление берега средней части озера до устья Баргузина, тогда какъ 18) Нижнее Изголовье Святаго Носа ограничиваетъ оконечность средней части озера съ сѣвера. Между Верхнимъ изголовьемъ того же полуострова и мысомъ Кедровки вдается Чивыркуйскій заливъ, послѣ чего, за р. Сосновкою, мысами 21) Валуканъ и 22) Чернымъ начинается суженіе сѣверо-восточной части озера, значительная извилистость берега которой обуславливается затѣмъ мысами: 23) Кабаньимъ, 24) Бираканъ, 25) Урбиканъ, 26) Понгонъ, 27) Шудинъ-Ногонъ, 28) Омогачанъ, 29) Оргоконъ (около бухты р. Упуды), 30) Турали, 31) Хаманъ-Китъ (у Георгия Раттера неправильно: Хаманъ-риль), 32) Тукаларагданъ. Аяя (на сѣверномъ берегу бухты р. Фролихи, не въ такомъ разстояніи отъ сѣверо-восточной оконечности Байкала).

Между такими мысами располагается соответственное число бухтъ, извѣстныхъ у русскаго населенія подъ неправильнымъ названіемъ «*убы*». Обиліемъ бухтъ, названіе которыхъ заимствуется обыкновенно отъ впадающихъ въ нихъ рѣкъ, въ особенности отличается сѣверо-восточная часть Байкала, именно юго-восточный ея берегъ, а также Малое море и Чивыркуйскій заливъ.

Къ самымъ живописнымъ и глубоко вдающимся въ берега горы принадлежатъ бухты названныхъ двухъ послѣднихъ частей и Ольхонскихъ Воротъ, а также Ая и Фролиха, а также къ сѣверо-восточной оконечности озера. Къ числу бухтъ, превышающихъ 10 верстъ въ длину и называемыхъ бухтами, относятся: Большой Соръ и Нижній Соръ на западной окраинѣ Селенгинской дельты, около сѣвернаго берега которой располагались еще: Верхній и Глухой соры, но они уничтожены землетрясеніемъ конца 1861 г., во время котораго значительная часть площади дельты превратилась въ озеро Байкала (Кударинскій провалъ см. ниже); далѣе Ланной-Соръ или Чивыркуйскій Соръ, располагается на восточномъ берегу Святаго Носа, а наконецъ Таларъ около сѣверо-восточной оконечности Байкала, въ дельтѣ Верхней Ангарты.

Глубина озера и особенности его дна была подвергнута тщательному и точному изученію лишь въ концѣ шестидесятыхъ и началѣ семидесятыхъ годовъ текущаго столѣтія, тогда же до тѣхъ поръ имѣлись только отрывочныя или не вполне точныя свѣдѣнія по этому вопросу. Такимъ образомъ въ литературныхъ источникахъ, современныхъ Риттеру, наибольшая изъ извѣстныхъ цифръ глубины не превосходила 700'; профили, сообщаемомъ Клапротомъ, оказываются уже глубинами достигающія 5600' на линіи между истокомъ Ангарты и Селенгой, но тамъ не переданы данныя, по которымъ составленъ профиль. Затѣмъ въ 1855 г., во время прибрежнаго плаванія по Байкалу, Радде произвелъ нѣсколько из-

мѣреній глубины, впрочемъ не болѣе какъ въ одновѣрномъ разстояніи отъ береговой линіи, причемъ обнаруживались цифры, не превосходящія 700'. Тому-же естествоиспытателю мы обязаны и однимъ измѣреніемъ въ сѣверо-восточной части Малаго моря, показавшимъ такую глубину, равную 207 футамъ <sup>1)</sup>. Далѣе въ 1859 г. производились первые болѣе правильные промѣры дна Байкала отъ одного берега до противоположнаго, для предполагаемой укладки телеграфнаго кабеля между сѣверо-западнымъ берегомъ, именно, мысомъ Большой Бугульдейки и Среднимъ устьемъ Селенги, слѣдовательно почти въ самой узкой части Байкала, на границѣ юго-западной его части со среднею. Промѣры, произведенные лейтенантомъ Кононовымъ, показали здѣсь наибольшую глубину, равную 1470' <sup>2)</sup> но въ другихъ мѣстахъ, ближе къ истоку Ангары, обнаружены и гораздо болѣе значительную глубину. Такъ напр. въ нѣсколькихъ, параллельныхъ другъ другу линіяхъ, проводимыхъ должно быть въ роли опыта отъ сѣверо-западнаго берега, въ промежуткѣ между мысами Березовымъ (около Лиственичнаго) и Кадильнымъ, въ нѣсколькихъ верстахъ отъ береговой линіи, найдена глубина: противъ Березоваго мыса 540', противъ Сытаго 1171', противъ зимовья, лежащаго далеко отъ долинки, называемой Солонцовою падию 420' а за Кадильнымъ мысомъ 4220' и 4812'. Продолженіе промѣра противъ той-же Солонцовой пади обнаружило такую глубину, для которой бичева длиною въ 4900 футовъ оказалась недостаточною, а наибольшая глубина должна была равняться 5621' (803 саж.). Однако лотъ, употреблявшій Кононовымъ для промѣровъ, вѣсилъ 1 пудъ, а вся бичева 1 пудовъ; между тѣмъ извѣстно, что при большихъ глубинахъ

<sup>1)</sup> Pадде, Beiträge z. Kenntniss d. Russischen Reiches v. Baer u. Helmersen B. XXIII. 1861.

<sup>2)</sup> Кононовъ, Зап. Сиб. Отд. И. Р. Геогр. Общ., кн. VI. 1862; Кононовъ, С.-Петербургскія Вѣдомости за 1860 г. № 36.

если весь размотанной бичевы вмѣстѣ съ грузиломъ становится значительнымъ и переходитъ уже за крайній предѣлъ чувствительности въ мышцахъ, измѣренія такимъ снарядомъ допускаютъ уже крупныя ошибки. Во всякомъ случаѣ, измѣренія Кононова впервые показали съ достаточною достоверностью, что дно Байкала должно располагаться ниже уровня океана. Наконецъ къ 1867 г. относятся первые опыты измѣренія глубины озера Дыбовскимъ и Годлевскимъ, продолжавшагося затѣмъ въ 1871 и 1876 г.г. съ помощью прибора изобрѣтеннаго названными изслѣдователями для этой цѣли<sup>1)</sup>. Измѣренія эти, совершавшіяся главнымъ образомъ въ зоологическую цѣль, относятся лишь къ юго-западной части озера и даютъ пять полныхъ болѣе или менѣе поперечныхъ профилей дна и нѣсколько доведенныхъ только за мѣру наибольшей глубины озера. Такимъ образомъ первый профиль, считая съ юго-западной оконечности Байкала, пересекаетъ послѣднюю діагонально отъ устья рч. Слюдянки на юго-востокъ къ устью рч. Безъимянной, наeminавшемся уже выше, сомненномъ мѣстѣ. Обнаруживъ явный уступъ сѣверо-западнаго склона долины на глубинѣ 606', поперечный разрѣзъ этотъ показываетъ, что дно озера раздѣляется здѣсь значительнымъ возвышеніемъ въ двѣ продольныя ложбины, которыя, по мнѣнію Черскаго<sup>2)</sup>, принадлежатъ продолженію долинъ Култучной съ одной стороны, а Похабики и Слюдянки съ другой, тогда какъ возвышающее ихъ возвышеніе соответствуетъ подводному продолженію Шаманскаго мыса. Наибольшая глубина сѣверной изъ этихъ ложбинъ равняется 2119' (646 метр.), а южной 197' (670 метр.), но такъ какъ послѣдній пунктъ, принадлежащій упомянутому діагональному направленію профили, находится отъ оконечности озера на разстояніе почти въ 2

<sup>1)</sup> Дыбовскій и Годлевскій, Изв. Сиб. Отд. И. Р. Геогр. Общ. Т. I № 1—2; Т. VIII № 3—4.

<sup>2)</sup> Черскій, Изв. В.-Сиб. Отд. И. Р. Геогр. Общ. Т. XII № 2 и 3-й.

раза больше, нежели первый пунеть, то правдоподобно, что при поперечномъ разрѣзѣ и здѣсь, какъ и въ другихъ мѣстахъ, наибольшая глубина должна бы располагаться ближе къ сѣверному берегу. Подводный отрогъ, раздѣляющій обѣ эти ложбины, возвышается на 925' надъ дномъ сѣверной ложбины, слѣдовательно на глубинѣ 1194'. Вторая линія промѣровъ, проведенная въ болѣе поперечномъ направленіи (съ с.-с.-з. на ю.-ю.-в.) и въ разстояніи до 11 верстъ къ востоку отъ юго-западной оконечности, направляется отъ восточныхъ окрестностей рч. Ангасолки къ устью той-же р. Безъимянной. Этотъ профиль изображаетъ дно озера уже въ видѣ простой долины, безъ малѣйшаго слѣда прежнихъ двухъ ложбинъ; ширина ея достигаетъ 13 верстъ, наибольшая глубина равняется 4077', располагаясь всего лишь въ разстояніи 4 или 5 верстъ отъ сѣвернаго берега. Третья профиль удалена на 43 версты отъ юго-западной оконечности озера, пересѣкая его въ поперечномъ и меридіональномъ направленіи отъ мыса р. Половинной до устья рѣки Муринъ. Наибольшая глубина оказалась равною 4447' (1356 метр.) и расположенною точно такъ въ сѣверной части долины, обнаруживающей ближе къ регамъ террасовидные уступы. Четвертая линія промѣровъ, точно также меридіональная, проведена отъ западныхъ окрестностей истока р. Ангары къ устью р. Выдринной, а ширина Байкала достигаетъ уже около 38 верстъ. Наибольшая глубина и здѣсь располагается ближе къ сѣверному берегу, но возрастаетъ до 4503' (1373 метр.). Затѣмъ, почти на половинѣ разстоянія между мысомъ Березовымъ (къ востоку отъ Ангары) и мысомъ Кадильнымъ, промѣрена глубина озера по линіи отъ устья рч. Черной по направленію къ устью Переемной (на ю.-в.-омъ берегу), глубина около 12 верстъ, и такая-же другая отъ мыса Кадильнаго по направленію къ мысу Мышьяку. Обѣ линіи эти обнаружили во-первыхъ такую-же крутую сѣверо-западнаго склона дна, какъ и въ предшествова-

учаяхъ; наибольшая глубина располагалась въ нихъ на двенадцатой верстѣ отъ берега и оказалась меньшею, нежели по линіи Ангарско-Выдринной, такъ какъ насупротивъ Черной она равняется 4461' (1360 метр.), а насупротивъ дельнаго 4034' (1230 метр.). Затѣмъ послѣдняя линія измѣровъ, пятая изъ полныхъ, а седьмая если считать предшествующія, проложена діагонально къ направленію течения, почти съ точностью съ з. на в., отъ мыса Головиной до Посольскаго монастыря, лежащаго въ пределахъ дельты Селенги, около лагуны Большой Соръ, следовательно по длинѣ болѣе 45 верстѣ. По этой линіи наибольшая глубина найдена на 15 верстѣ отъ сѣверо-западнаго берега или на 10-й, считая въ поперечномъ къ теченію направленіи, и оказалась равною всего лишь 3805' (1160 метр.). Отсюда дно начало замѣтно подыматься такъ, что на 28-й верстѣ глубина уменьшилась до 197' (60 метр.); затѣмъ, понизившись опять, впрочемъ только до 1528' (466 метр.), слѣдовательно до глубины, почти въ два раза меньшей, энергично повышается по направленію къ дельтѣ, образуя затѣмъ очень мелководную площадь до 4 верстѣ ширины. Наконецъ, на границѣ между юго-западною и среднею частями Байкала встрѣчаемъ упомянутую уже выше глубину, ниспадающую по измѣреніямъ Кононова до 1470'.

Такимъ образомъ оказывается, что наибольшая глубина юго-западной части Байкала располагается на меридіанѣ истока Ангары и достигаетъ 4503', такъ-что дно озера опускается поэтому на 2942' (болѣе 420 саж.) подъ уровень океана, на которомъ поверхность Байкала возвышается на 1561'. Изъ того изъ этихъ трудовъ Дыбовскаго и Годлевскаго видно во-первыхъ, что полоса наибольшей глубины, расположенная ближе къ сѣверо-западному берегу, сопровождается вообще параллельно, почти въ одномъ и томъ же направленіи, причѣмъ отъ меридіана Ангары дно озера возвышается по направленію какъ къ западу, такъ и сѣверо-



востоку. Во-вторыхъ, что на линіи между Голоустною и Посольскимъ бассейнь озера раздѣленъ значительнымъ поднятіемъ дна на двѣ части и что, судя по линіямъ отъ Кадильнаго мыса и Черной рѣчки, поднятіе это должно продолжаться до 60 верстъ къ юго-западу. Тѣмъ не менѣе оно вполне исчезаетъ уже на меридіанѣ истока Ангары, мыса Половинной и Ангасолки и потому не состоитъ въ связи съ обнаруженнымъ около самой юго-западной оконечности точно также, какъ возвышеніе это не встрѣчено и къ сѣверо-востоку, между Бугульдейкою и Среднимъ устьемъ Селенги. Замѣтимъ здѣсь же, что о существованіи такого подводнаго хребта гласило распространенное между байкальскими «корабельщиками» преданіе, что кому-то изъ нихъ, опустившему якорь на глубину 30 сажень и отдавшемуся въ такомъ видѣ на произволъ разыгравшейся бури, удалось стати на якорь почти на половинѣ разстоянія отъ двухъ противуположныхъ береговъ, зацѣпившись очевидно за такое возвышеніе дна, хотя никто изъ нихъ не могъ указать нынѣ мѣсто этого происшествія. Произведенныя Дыбовскимъ и Голевскимъ кромѣ того многія измѣренія глубины около береговъ, при ловлѣ ими ракообразныхъ и другихъ представителей фауны озера, дали въ свою очередь матеріалъ для выясненія нѣкоторыхъ подробностей конфигураціи дна. Оказалось, что полоса дна, прилегающая непосредственно къ берегу озера, представляетъ значительное разнообразіе въ топографическомъ отношеніи. Въ общихъ чертахъ она является продолженіемъ рельефа береговъ, нисходящихъ въ характерными имъ формами подъ уровень воды. Такимъ образомъ они замѣтили, что пологому берегу соответствуетъ слабое и равномерное пониженіе дна въ близкихъ къ нему предѣлахъ; крутымъ долинамъ — желобовидныя его углубленія и утесистымъ склонамъ — террасовидныя уступы дна, такъ для болѣе нагляднаго представленія всѣхъ этихъ особенностей, достаточно вообразить, что въ полосѣ этой мы

лю съ берегомъ, затопленнымъ до извѣстной высоты водою, потому мы встрѣчаемъ здѣсь повтореніе и продолженіе тѣхъ свойственныхъ ему особенностей. вмѣстѣ съ такимъ разнообразіемъ рельефа въ этой полосѣ дна встрѣчаются и тѣми разнообразныя его качества: песчанныя, болѣе или менѣе обширныя пространства располагаются по отлогимъ берегамъ заливовъ и бухтъ и вблизи песчаныхъ уступовъ (валовъ) берега, выполняя собою и промежутки между скалистыми глыбами и валунами, которые, въ свою очередь,стилаютъ или только береговую террасу, или сплошнымъ скалистымъ полемъ простираются далеко въ озеро. Весьма рѣдко валуны смѣняются плитами или выступами коренной породы, спускающимися то отвѣсными стѣнами, то наклонными террасами въ глубь озера. Нѣкоторые изъ такихъ скалистыхъ уступовъ лежатъ въ недалекомъ разстояніи отъ береговъ, на глубинахъ, еще доступныхъ глазу: въ такихъ мѣстахъ рѣзкое пониженіе дна производитъ глубокое впечатленіе на наблюдателя, такъ какъ глазъ, скользя по болѣе или менѣе ясно представляющимся ему предметамъ, мгновенно теряетъ ихъ изъ виду и, погружаясь внезапно въ таинственную тьму глубин, считаетъ мѣста эти бездонными пропастями, тогда какъ дѣйствительная высота такихъ уступовъ превышаетъ 5—10 саженей. За прибрежною полосою дна, толщина которой не вездѣ одинакова (среднимъ числомъ  $1\frac{1}{2}$ — $2\frac{1}{2}$  версты), начинается другая съ мало-измѣнчивою конфигураціею дна и однороднымъ покрывающимъ его матеріаломъ. Полоса эта простирается между прилегающими къ ней скалами равномерно и слабо волнообразно и покрыта толстымъ пластомъ ила, изглаживающимъ всѣ неровности и изгибы почвы: это такъ сказать педагогическая часть дна, противоположность вышеописанной прибрежной. Объемъ осадковъ этимъ свойственно немалое количество потонувшихъ пней, колоды и цѣлыхъ стволовъ, количество которыхъ увеличивается вблизи устьевъ рѣчекъ и крутыхъ склоновъ

прибрежныхъ горъ и уступовъ. Съ нахожденіемъ такихъ стволовъ, прислонившихся къ крутымъ склонамъ подводныхъ террасовидныхъ уступовъ и стоящихъ поэтому почти отвѣсно, связано быть можетъ и преданіе о цѣлыхъ лѣсахъ, затопленныхъ будто водами Байкала и стоящихъ еще на корню.

Произведенныя тѣми же изслѣдователями *наблюдения над температурою воды Байкала* въ различныя времена года на различныхъ глубинахъ озера привели къ весьма интереснымъ выводамъ. Они показали, что температура поверхности озеръ и около береговъ колеблется въ весьма ограниченныхъ предѣлахъ, не превосходящихъ  $10^{\circ}$  Ц. съ наибольшею температурою  $+14^{\circ}_{,5}$ , причемъ, какъ удостовѣряютъ среднія введенныя для каждаго мѣсяца, температура эта достигаетъ своего максимума ( $+12^{\circ}_{,4}$ ) въ Сентябрѣ. Но, вмѣстѣ съ увеличеніемъ глубины, колебанія эти уменьшаются, такъ-же напр. на глубинѣ 328' (100 метр.) разница между самою низкою и самою высокою температурою года равняется  $2^{\circ}_{,5}$ , а на 492' (150 метр.) только  $1^{\circ}_{,0}$ . Ниже этихъ предѣловъ круглый годъ наблюдается уже одна и таже, постоянная температура, равная  $+3^{\circ}_{,5}$  Ц., какъ видно изъ наблюдений, совершавшихся даже на глубинѣ 4329 футовъ (1320 метр., т. е.  $618\frac{1}{2}$  сажень).

Подробности, касающіяся такихъ явленій на Байкалѣ, какъ колебаніе уровня воды, выдѣленіе изъ его дна газовъ, замерзаніе совершающагося обыкновенно въ концѣ декабря или въ первыхъ числахъ января, особенности льда, вскрытіе озера отъ льда (въ маѣ) и т. п. читатель найдетъ въ заключительныхъ главахъ описанія. Тамъ же будутъ переданы свѣдѣнія, относящіяся къ его климату и фаунѣ, которая, въ противоположность мнѣніямъ прежнихъ изслѣдователей, оказалась весьма богатою, а также объ утилизаціи водъ Байкала и населенныхъ мѣстахъ его побережія. Теперь-же въ заключеніе этого параграфа, мы перейдемъ, во-первыхъ, къ даннымъ, относящимся къ различнымъ названіямъ озера и связаннымъ

нихъ преданіямъ аборигеновъ, а затѣмъ, приведемъ перечень тѣхъ главныхъ литературныхъ и картографическихъ матеріаловъ, которыми мы будемъ пользоваться при подробномъ описаніи мѣстности.

*Названія Байкала* неодинаковы у различныхъ народовъ, населяющихъ его окрестности или соприкасавшихся съ нимъ прежде. У русскаго народонаселенія Байкаль называется или обыкновенно Моремъ, изрѣдка Байкальскимъ моремъ или просто Байкаломъ. Препрежне названіе Святое море вышло изъ употребленія <sup>1)</sup>; что же касается понятія объ образованіи озера путемъ провала мѣстности, то оно до сихъ поръ сохраняется еще у мѣстныхъ жителей, — воззрѣніе, осложненное еще у нѣкоторыхъ мнѣніемъ, что провалъ этотъ образовался на продолженіи прежняго, якобы непрерывнаго теченія р. Ангары, раздѣлившейся такимъ образомъ на Верхнюю и Нижнюю. Бураты называютъ Байкаль обыкновенно Далай, безъ прибавленія нуръ и нуръ, означающихъ озеро <sup>2)</sup>. У тунгусовъ озеро это известно подъ именемъ Лямъ, у Китайцевъ: Пе-хай т. е. Черное море или Бей-хай <sup>3)</sup>. Слово Байкаль производятъ также обыкновенно отъ якутскаго Байя-халъ <sup>4)</sup>, полагая, согласно гипотезѣ Шлетцера, что озеромъ этимъ владѣли сначала якуты, оттѣсненные впоследствии бурятами. Названіе это означаетъ богатое озеро и перешло въ такомъ случаѣ къ монголамъ, именовавшимъ его Байгомъ или Байкь-халъ <sup>5)</sup>, хотя, въ свою очередь, существуютъ попытки произведенія слова Байкаль и отъ бурятскаго или монгольскаго

<sup>1)</sup> Черскій, Изв. В.-Сиб. Отд. И. Р. Геогр. Общ. Т. XII. № 4 и 5, стр. 62.

<sup>2)</sup> Черскій. I. с.

<sup>3)</sup> Риттеръ, Землепѣд. Аз. Вост. Сибирь: оз. Байкаль, Прибайкальскія страны и т. д. Переводъ 1879 г. стр. 5.

<sup>4)</sup> У Реклю (Земля и Люди Т. VI. Спб. 1883 г.) оно произносится Бай-Хай.

<sup>5)</sup> Stackenberg, Hydrographie В. II. S.-Peterb. 1844, гдѣ говорится, что у татаръ оно производится отъ Бай-каль (Будь богатъ)? Соб-

«Байнъ-галъ», какъ это мы встрѣчаемъ у Щукина <sup>1)</sup>, хотъ слово это означаетъ только *богатый огонь*, а никакъ не *бы огонь*, такъ какъ *былз* на бурятскомъ языкѣ означаетъ *байн* или просто *би* и потому произносилось бы *байнэ-гали* или *би-гали*. О происхожденіи названія Байкаль отъ *былз огонь* упоминаетъ и Штубендорфъ, не приводя однако соотвѣствующихъ монгольскихъ словъ. Что-же касается возможнаго употребленія монгольскаго слова *байнз*, т. е. богатый, то оно относилось бы скорѣе къ *юлз* (рѣка), нежели къ *галз* (огонь), такъ какъ извѣстно, что было время, когда Байкаль упоминали какъ рѣка, неимѣющая бродовъ (лѣтописъ Санангъ Сэцэнъ откуда доставленъ былъ Чингисъ-хану ястребъ, въ знакъ благодарности <sup>2)</sup>).

Въ официальныхъ бумагахъ, какъ Забайкальскіе буряты («Байгаль далай-инъ урдъ бэйе-инъ монголъ-буряты» т. е. кочующіе на южной сторонѣ Байкала монголы буряты), такъ и живущіе на его сѣверо-западной сторонѣ («Байгаль далай-инъ хойту бэйе-инъ буряты» называютъ озеро Байгаль далай <sup>3)</sup>).

Буряты, по свойственному имъ мировоззрѣнію, относятся съ почтеніемъ къ каждой водѣ, даже къ рѣчной, и приносятъ жертвы завѣдывающимъ этими водами духамъ (см. ниже). Столь-же громадное и грозное скопленіе воды, какъ Байкаль, доставляющее многимъ изъ нихъ, кромѣ страха, еще и пищу насущный, въ видѣ рыбы, прибрежные буряты называютъ даже матерью (*иби*) и ставятъ озеро, по его значенію для нихъ, наравнѣ съ землею (*улунз* на Ольхонскомъ нарѣчѣ).

---

ственно Бай-руль (или *юль*) означаетъ богатое озеро на тюркскомъ языкѣ, и Щукинъ производитъ современное названіе озера изъ тюрскаго, полагая, что племя это обитало здѣсь раньше монголовъ.

<sup>1)</sup> Щукинъ, Жур. Мин. Внутр. Дѣлъ. 1848 г. Ч. XXIII, стр. 10.

<sup>2)</sup> Черскій, Рукописныя замѣтки.

<sup>3)</sup> Стуковъ, Памятная книжка Иркутск. губерніи за 1881 г. Иркутск. Статистич. Комитета, стр. 163.

и робомъ или громомъ (*тынгирь*), восклицая во время жертвоприношеній по шаманскому обычаю: Тынгирь бабай (*бабай* — отецъ), улугунъ ехё (*ехё* — бабушка) далай иби (*иби* — мать) <sup>1)</sup>. Къ тому-же Байкалъ освященъ у нихъ многочисленными преданіями какъ историческаго, такъ и мнѣологическаго характера. Такимъ образомъ нѣкоторыя легенды, напр. Забайкальскихъ (*хоринскихъ*) бурятъ, указываютъ на Байкалъ, именно на юго-западную его оконечность, какъ на колыбель своего племени, въ лицѣ трехъ малютокъ (Булагатъ, Хоридой и Экэрйтъ), происшедшихъ изъ пѣны взволнованнаго озера и брошенныхъ имъ на Култукское побережіе: Булагатъ считается впослѣдствіи родоначальникомъ Балаганскихъ бурятъ, а Хоридой, размноживъ свое поколѣніе сперва на Алхонѣ, переходитъ въ Забайкалье и даетъ начало Хоринскихъ бурятъ <sup>2)</sup>. Историкъ Миллеръ <sup>3)</sup>, передаетъ, какъ известно <sup>4)</sup>, народное монгольское преданіе, согласно которому Чингисъ-Ханъ располагалъ свой станъ на островѣ Алхонѣ, гдѣ будто уцѣлѣлъ и оставленный имъ большой котелъ съ котломъ и лежащею въ послѣднемъ лошадиною ногою. Самъ Миллеръ не могъ однако провѣрить это преданіе свидѣтельствомъ бурятъ; о Чингисъ-Ханѣ ничего не слышали и Ольхонскіе буряты, съ которыми путешествовалъ и описывалъ Черскій (I. с.); тѣмъ не менѣе, по словамъ Стучкова (I. с. pag. 165), у Хоринскихъ бурятъ, преданіе это сохранилось, а Кириловъ <sup>5)</sup> нашелъ у бурятъ, живу-

<sup>1)</sup> Черскій I. с.

<sup>2)</sup> Стучковъ, Памятная книжка Иркутск. губерніи I. с. Сравни варианты этой легенды у Потанина. Очерки Сѣв.-Зап. Монголіи; Этнографическіе матеріалы, выпускъ IV, 1883 г., стр. 821—824.

<sup>3)</sup> Maller. Sibirische Geschichte въ Sammlung. Russ. Gesch. T. VII. 761.

<sup>4)</sup> Риттеръ, I. с.

<sup>5)</sup> Кириловъ, Рукописныя замѣтки врача о Баргузинскомъ округѣ Иркутск.

щихъ въ долину р. Баргузина, еще болѣе интересное преданіе, обличающее вмѣстѣ съ тѣмъ и взглядъ на нѣкоторые геологическія преобразованія долины озера. Согласно этой легендѣ, Чингисъ-Ханъ перешелъ на Ольхонъ по перешейку соединявшему въ то время этотъ островъ со Святымъ Носомъ и раздѣлявшимъ, очевидно, Байкальскую долину на двѣ части, — чисто индуктивное возрѣніе, къ которому пришли и геологи <sup>1)</sup>. Ольхонъ, какъ объ этомъ повѣствуетъ еще Клапротъ <sup>2)</sup>, считается мѣстопребываніемъ адскаго божества именуемаго этимъ ученымъ Бегдози. Название это, не вѣстное Ольхонскимъ бурятамъ <sup>1)</sup>, исправляется повидимому показаніемъ Стукова (l. c.), согласно которому Хоринскіе буряты считаютъ Байкаль любимымъ мѣстомъ такъ называемыхъ онгѣновъ, т. е. тѣней предковъ, а Бэгдзѣ (есть-ли это «Бегдози?»), повелитель онгоновъ, жилъ между прочимъ и на Ольхонѣ. Два мѣста на этомъ островѣ, именованная Ижимэй (высшій пунктъ) на юго-восточномъ берегу и Пещерный мысъ на сѣверо-западномъ, считаются особыми священными у современныхъ ольхонскихъ и приольхонскихъ бурятъ. Согласно записанному Черскимъ <sup>3)</sup> ихъ преданію объ этихъ святилищахъ, между монголами, заселявшими прежде какъ побережіе Байкала, такъ Ольхонъ, и исповѣдовавшими ламайскую вѣру, жилъ, въ видѣ исключенія, шаманъ Нагрѣ-бѣ (бо-шаманъ) съ женою Загрѣ-хата на столько могучій, что пользовался полнымъ уваженіемъ одного изъ небожителей («житель грома» — какъ переводятъ буряты), извѣстнаго подъ названіемъ Угутѣ-нойнъ. Слѣдній, задумавъ переселить монголовъ за Байкаль, спросилъ о такомъ предположеніи шаману, который предложилъ оставить его на Ольхонѣ.

<sup>1)</sup> Черскій, Рукописныя замѣтки о Сибири.

<sup>2)</sup> Клапротъ, Description du Lac Baical въ Nouv. Annales des Voyages, T. XXVII.

<sup>3)</sup> Черскій, l. c.

Благосклонный Угутъ не только изъявилъ на это согла-  
се, но далъ еще шаману гору Ижимэй вмѣсто дворца, а  
дѣти, которыхъ не было у Нагрё, — орла, до сихъ поръ  
у бурятами; самъ-же Угутъ поселился на противупо-  
ложной сторонѣ Ольхона, въ пещерномъ мысѣ. Чтоже ка-  
сается монголовъ, то они на другой день проснулись уже  
на Байкалѣ, оставивъ послѣ себя каменные стѣны, маяки  
и т. п. (см. ниже). Съ тѣхъ поръ названный мѣста острова  
считаются священными и, если въ теченіи даннаго луннаго  
мѣсяца умираетъ кто-либо изъ бурятъ Ольхонскаго вѣдом-  
ства, то ни около Ижимэя, ни около Пещернаго мыса, ни  
изъ жителей не смѣютъ ни проходить, ни проплывать  
туда до слѣдующаго новолунія. Сказаніе о томъ, что на  
островѣ находится безсмертный медвѣдь, прикованный къ  
каменному цѣпью, Черскій слышалъ уже изъ другаго источника.  
Ольхонскіе боги считаются тѣмъ не менѣе очень смирен-  
ными, въ сравненіи съ сосѣдними, материковыми, прожи-  
вающими въ верховьяхъ рѣчки Хыръ-Хушунъ (Рытая падь),  
живущей въ Байкалѣ на упомянутомъ выше соименномъ  
островѣ (въ 47 верстахъ на с.-в. отъ Ольхона). Это два брата,  
Азрѣ и Алмѣ, бывшіе небожители («жители  
неба»), сыновья тэгрія (небожителя) Ухуръ: за малѣйшее  
нарушеніе какой-либо изъ требуемыхъ ими формальностей  
они посылаютъ всевозможныя бѣдствія, между прочимъ и  
нападаютъ съ с.-з., которыми якобы сносятся въ Байкалѣ  
и стада коровъ и овецъ. Долину эту буряты могутъ  
использовать только на ея устьѣ, по тропѣ, ведущей изъ юртъ  
Онгурѣя въ улусъ на мысѣ Покойниковъ; они пасутъ  
свои стада на Хыръ-Хушунскомъ мысѣ; о томъ однако,  
какъ углубиться въ горы вверхъ по этой долинѣ, они бо-  
юсь даже подумать и никто изъ нихъ не идетъ туда даже  
выпасать убѣжавшій скотъ. Въ случаѣ смерти кого-либо  
изъ окрестныхъ бурятъ, сообщеніе между Онгурѣномъ и По-  
койниками прерывается до слѣдующаго новолунія, такъ какъ



въ то время нельзя и оплывать Хырѣ-Хушунѣ, еслибы кто вздумалъ путешествовать въ лодкѣхъ. Чтоже касается женщинъ, то онѣ и въ обыкновенное время не могутъ приближаться къ Хырѣ-Хушуну: рѣчка Хейремъ со стороны Онгурѣна (сѣ.-з.), а рч. Анютка со стороны Покойниковъ (сѣ.-в.) составляютъ границу, перешагнуть которую не смѣетъ ни одна бурятка, вслѣдствіе чего имъ предоставляется одинъ лишь водный путь между этими названными долинами; поэтому и свадебныя шествія между пунктами совершаются лишь въ лодкѣхъ<sup>1)</sup>

Кромѣ того изъ священныхъ мѣстъ на Байкалѣ извѣстны еще: долина Сагднѣ-Забднѣ къ юго-западу, а утесъ въ бухтѣ Ая къ востоку отъ устья р. Анги,—пункты, гдѣ на скалахъ находятся открытыя Агапитовымъ рисунки и гіероглифы древнихъ аборигеновъ (см. ниже). Затѣмъ весь острый, повидимому недоступный пикъ въ верховьяхъ р. Кудалды, на юго-восточномъ берегу сѣверо-восточной части озера (43 версты къ с.-в. отъ Святаго Носа); тотъ же пикъ на томъ-же берегу Байкала, называемый Хаман-котъ и знакомый уже Риттеру изъ описанія Георга (см. ниже). Чтоже касается Шаманскаго камня въ истокѣ Анги («гранитная скала» — «Шаманка» у Риттера), считаемаго мѣстомъ пребыванія эмнйкѣ-сагднѣ-нойна, т. е. неимѣннаго бѣлаго божества, то вмѣстѣ съ удаленіемъ бурятъ отъ этой мѣстности, заселенной нынѣ только русскими, пренебреженіе ея значенія для бурятъ начинаетъ повидимому уменьшаться и даже забываться настолько, что послѣдніе изъ путешественниковъ (напр. Черскій) не могли узнать о ней ничего, указывающаго на усугубленное предпочтеніе этой скалы, въ сравненіи съ другими. Точно также не удалось узнать о современномъ значеніи для нихъ Шаманскаго камня на юго-западной оконечности озера, какъ равно не извѣстно до сихъ поръ, почему и кѣмъ именно извѣстенъ полуостровъ Байкала названъ Святымъ Носомъ, въ ообщ.

<sup>1)</sup> Черскій, Изв. В.-Сиб. Отд. И. Р. Геогр. Общ. Т. XII, № 1.

ности, что никто изъ путешественниковъ не сообщалъ ни буратскаго, ни тунгусскаго его названія.

Мы говорили уже по поводу жителей долины Иркутъ (Тунки), въ какой значительной мѣрѣ крестьяне усваиваютъ различныя буратскія вѣрованія и легенды: въ цитированной выше статьѣ Черскаго читатель можетъ найти цѣлый рядъ весьма наглядныхъ фактовъ, относящихся къ этому вопросу. Неудивительно поэтому, что и въ средѣ русскаго народонаселенія мы находимъ крайне мистическій взглядъ на озеро Байкаль, на всѣ замѣчаемыя на немъ явленія. Они, по весьма точному выраженію Щукина <sup>1)</sup>, смотрятъ на Байкаль какъ на существо живое, одушевленное, съ характеромъ честолюбивымъ, своеправнымъ и мстительнымъ, и если не считаютъ его божествомъ, то все-таки очевидно какимъ либо духомъ. Въ почему, въ прежнее время, по сообщенію Щукина, на Байкальскихъ берегахъ черезъ Байкаль открыто налагались такіе условия, какъ напр.: не называть его озеромъ, а непременно озеромъ, не отзываться о немъ презрительно, не произносить бранныхъ словъ и т. п.; несоблюденіе такихъ условій вело неизбѣжною бурей или какимъ-либо другимъ несчастіемъ. Въ настоящее время, въ средѣ простолюдиновъ, дѣло шло лишь настолько, что прежнія «условія» перестали ими, при случаѣ, только въ видѣ благоразумныхъ предостереженій, цѣлесообразность которыхъ сознается ими однако настолько глубоко, что относительно лицъ въ извѣстной степени имъ подчиненныхъ, такіе совѣты опять переходятъ въ условія, даже въ приказы, къ которымъ мѣстами приносятся еще: не свистѣть и ничѣмъ не осквернять воду Байкальскаго моря, не будучи поставленнымъ въ абсолютную необходимость избѣгнуть такого случая <sup>2)</sup>.

Изъ картографическихъ матеріаловъ, знакомыхъ еще

<sup>1)</sup> Щукинъ, Журн. Мин. Внутр. Дѣлъ 1848. Ч. XXIII, стр. 397.

<sup>2)</sup> Черскій, Рукописныя замѣтки о Сибири.

Риттеру, можно упомянуть здѣсь лишь о картѣ Байкала, снято въ 1766 г. губернаторомъ Фрауендорфомъ и считаемою первою съемкою этого озера, а также о съемкѣ штурмана Пушкарева, сопровождавшаго экспедицію Георги. Съемка эта (11 верстъ въ дюймѣ), начатая въ 1772 и оконченная въ 1773 г. слѣдовательно 115 лѣтъ тому назадъ, озаглавлена *«Карта Байкала моря»* хранится въ архивѣ Имп. Академіи Наукъ въ С.-Петербургѣ и отличается подробностью и точностью въ отдѣльных частяхъ, какъ напр. относительно устья Верней Ангары, озера Фролихи, острововъ и нѣкоторыхъ бухтъ въ Чивыркуйскомъ заливѣ. Менѣе точною въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ но болѣе подробною въ другихъ, является *Карта Байкала моря-озера, или Ангарскаго провала, въ Иркутской губерніи состоящаго, со всеми его окружностями, который математическими измѣреніями оконченъ и приведенъ въ совершенную извѣстность въ 1806 году* (масштабъ 30 верстъ въ дюймѣ), хранящаяся въ архивѣ И. Р. Географическаго Общества. Самую подробною изъ рукописныхъ картъ озера слѣдуетъ считать одну съемку Байкала, совершенную въ 1849 — 50 г. топографами Крутиковымъ и Карликовымъ, подъ руководствомъ г. Ахте. Съемка совершалась въ масштабахъ до 1 версты въ дюймѣ, но составлена въ размѣрѣ 5 верстъ въ дюймѣ. Она совершалась зимою и потому должна была неизбежно гнѣшиться въ незамѣтныхъ въ такое время, подробностяхъ береговой линіи, къ тому же холодное время могло способствовать нѣкоторой поспѣшности въ работѣ, чѣмъ по всей вѣроятности объясняется неточность въ очертаніи многихъ бухтъ, глубоко вдающихся въ материкъ и снятыхъ очевидно съ отдаленія во время перехода съ одного мыса на другой<sup>1)</sup>. По этой картѣ была составлена впоследствии *Karte der südlichen Hälfte des Baikal von Kultuk bis zum Norden der Halbinsel Swjatoj-Noss* (20 верстъ въ дюймѣ).

<sup>1)</sup> Черскій, Отчеты объ изслѣдованіи Байкала см. ниже.

ны путешествія Меглицкаго по Байкалу въ 1852 г. Карта эта, дополненная матеріалами, относящимися къ верховьямъ Лены, появилась въ печати въ видѣ геогностической карты при отчетахъ Меглицкаго, какъ на русскомъ языкѣ (Торн. Журн. 1855. № 4), такъ и на нѣмецкомъ (Verhandlungen d. Mineralog. Gesellschaft zu St. Petersburg. 1855 — 56), только въ значительно уменьшенномъ масштабѣ, вслѣдствіе чего уменьшилась и точность очертанія береговой линіи. Этими матеріалами, вмѣстѣ съ нѣкоторыми позднѣйшими маршрутами по притокамъ озера, пользовался затѣмъ и астрономъ Шварцъ для изображенія Байкала на его *Картѣ рѣкъ и областей Амура, южной части Лены и Енисея и острова Сахалина, составленной на основаніи изысканій Сибирской Экспедиціи И. Р. Географическаго Общества. ИБ. 1864 г.* въ масштабѣ 40 верстъ въ дюймѣ. Эта до сихъ поръ единственная болѣе подробная карта названныхъ частей Восточной Сибири, захватывающая къ тому-же значительную часть Монголіи, укрѣплена многочисленными пунктами произведенныхъ членами экспедиціи астрономическихъ наблюденій широты и долготы мѣста, определенныхъ также въ различныхъ мѣстахъ на берегу Байкала <sup>1)</sup>, вслѣдствіе чего озеро на этой картѣ можно считать ориентированнымъ совершенно; зато частности очертаній береговъ и извилистость береговой линіи Байкала страдаютъ на ней совершенно произвольными изгибами, такъ-что на мѣстѣ южныхъ мысовъ означены глубокія бухты и обратно <sup>2)</sup>. Затѣмъ, на фонѣ сборнаго листа къ той-же картѣ Шварца, составленнаго: *Карта южной половины Восточной Сибири, Монголіи, Маньчжуріи и Сахалина*, въ масштабѣ 160 верстъ въ дюймѣ, составлена Кропоткинскимъ *Орографическая карта 1875 г.*, приложенная къ его Очерку орографіи Вос-

<sup>1)</sup> Списки этихъ пунктовъ см. Труды Сибирск. экспедиціи, Математ. Отдѣлъ. Сиб. 1864 г.

<sup>2)</sup> Сравни Изв. Сиб. Отд. Геогр. Общ. Т. XII, № 2 и 3-й.

точной Сибири въ Запискахъ И. Р. Географич. Общества <sup>1)</sup>, трудъ, о которомъ будетъ сказано въ своемъ мѣстѣ. Въ свою очередь, появившаяся въ 1874 г. *Геоморфическая карта некоторыхъ частей Иркутскаго, Верхотурскаго и Балаганскаго округовъ Иркутской губерніи*, составленная Чекановскимъ въ масштабѣ 10 верстъ въ дюймѣ (Записки Сибирскаго Отдѣла И. Р. Географич. Общества 1874 г. Т. XI), хотя захватываетъ собою только некоторые части сѣверо-западнаго побережія Байкала отъ истока Ангары до Ольхонскихъ воротъ, тѣмъ не менѣе включаетъ въ себѣ неизвѣстныя до тѣхъ поръ части Приморскаго и Онотскаго хребтовъ, вмѣстѣ съ сѣтью изрѣзывающихъ ихъ рѣчекъ, нѣкоторая часть которыхъ снята или рекогносцирована самимъ Чекановскимъ. Какъ на представляющій особый интересъ съ геологической точки зрѣнія слѣдуетъ указать на двѣ карты Черскаго. *Геоморфическая карта береговой полосы озера Байкала*, составленная въ 1880 г. въ масштабѣ 40 верстъ въ дюймѣ (Извѣст. И. с. Т. XII № 1 и 3-й) включаетъ въ себѣ весь имѣвшійся до тѣхъ поръ картографическій матеріалъ, дополненный самимъ авторомъ и приведенный въ масштабъ съ возможною точностью. *Геологическая карта береговой полосы озера Байкала въ масштабѣ 10 верстъ въ дюймѣ*, изданная въ 1886 г. на средства И. Р. Географическаго и Минералогическаго Обществъ. Подробность этой карты соответствуетъ ея масштабѣ, и потому она принадлежитъ къ самымъ полнымъ изъ имѣвшихся до тѣхъ поръ матеріаловъ относительно интересующаго насъ озера, и только слѣдуетъ сожалѣть, что въ обстоятельствамъ, не зависѣвшихъ отъ автора, карта начерчена безъ градусной сѣти. Наконецъ въ настоящее время Главнымъ штабомъ издана *Карта пограничной полосы Россійскихъ владѣній въ Азіи въ масштабѣ 40 верстъ въ дюймѣ* захватывающая какъ Байкалъ, такъ и всю интересующую

<sup>1)</sup> По общей географіи. Т. V. 1874 г.

на въ горную страну. Карта эта составлена на основаніи всѣхъ новѣйшихъ пріобрѣтеній въ области географіи и пользуются значительно возросшимъ уже количествомъ астрономическихъ пунктовъ. Такимъ образомъ очевидно, что карта эта, въ предѣлахъ захватываемаго ею района, самая совершенная и цѣлесообразная для ориентировки въ описываемой нами горной мѣстности <sup>1)</sup>).

Литературные источники, къ перечню которыхъ мы приступаемъ, представляютъ собою труды только тѣхъ авторовъ, которые совершили болѣе или менѣе обширныя путешествія и изслѣдованія по Байкалу, его притокамъ и ограничивающимъ его горамъ, или-же высказали какія либо предположенія о происхожденіи или преобразованіяхъ этой долины и сопредѣльныхъ съ ней горъ; что-же касается остальныхъ источниковъ, то ихъ читатель найдетъ въ ссылкахъ къ соответственнымъ мѣстамъ изложеній, какъ это дѣлалось въ предшествовавшихъ главахъ. Такимъ образомъ изъ болѣе раннихъ сочиненій, имѣвшихся въ распоряженіи Риттера и относящихся ко времени классическихъ путешествій академиковъ Палласа и Георги, невозможно и въ настоящее время не указать на сочиненіе послѣдняго изъ названныхъ меныихъ: *Georgi J. G. Bemerkungen einer Reise im Russischen Reiche im Jahre 1772. St. Petersburg. 1775. 2 B-de*, такъ какъ образцовый трудъ этотъ далъ самое подробное и точное изъ имѣвшихся до послѣднихъ временъ описаній Байкала, окружающихъ его горъ и притоковъ. Экспедиція Георги, какъ известно, осмотрѣла сѣверо-западный берегъ озера отъ его стока до устья Верхней Ангарты, съ значительною частью пролива Ольхона, и юго-восточный берегъ, отъ Верхней Ангарты до устья р. Селенги, впрочемъ не строго придержи-

---

<sup>1)</sup> Въ настоящее время готовится къ печати 15-ти верстная карта Байкала, въ которую однако-же войдутъ лишь мѣстности, прилегающія къ линии Сибирской жел. дор.

ваясь береговой линіи, вслѣдствіе чего нѣкоторыя части озера, напр. Малое Море, Чивыркуйскій заливъ и т. п., какъ равно мѣста, описывавшіяся не самимъ Георги, а его спутникомъ Лебедевымъ, страдаютъ неполнотою а иногда и сбивчивостью. Юго-западная часть Байкала, отъ Селенги до истока Ангары, осталась непосѣщенною и описана въ трудѣ Георги по распроснымъ свѣдѣніямъ.

*Геденштромъ, Отрывки о Сибири. СПб. 1830 г.* заключаютъ нѣкоторыя свѣдѣнія объ озерѣ, Кругобайкальской дорогѣ, и т. п., а также воззрѣнія на образованіе Байкала и его подземную связь съ нѣкоторыми рѣками.

*Турчаниновъ, Flora baicalensi-dahurica.* Трудъ этотъ появившійся въ печати въ теченіи 15 лѣтъ, съ 1842 и въ 1856 года, есть достояніе *Bulletin de la Soc. Imp. des naturalistes de Moscou* и содержитъ подробное описаніе флоры части Саянскаго хребта, примыкающей къ Прибайкалью, сѣверо-западнаго Прибайкалья и Забайкальской области.

*Erman, A. Reise um die Erde. Berlin. 1833—38—43 и Ueber die geognostischen Verhältnisse von Nord Asien etc. въ Archiv für wissenschaftl. Kunde v. Russland v. A. Erman. B. III. 1843,* только путешествовавшего еще въ то время, когда вышелъ въ свѣтъ соотвѣтственный томъ трудовъ Риттера, не могли уже служить ему литературою. Будучи лично знакомымъ только съ незначительною частью сѣверо-западнаго берега озера между истокомъ Ангары и р. Голоустною, Эрманъ основываетъ взглядъ свой на Байкалъ только на данныхъ, собранныхъ какъ къ сѣверо-западу, такъ въ долинѣ Иркутка и въ Забайкальской области. Взглядъ этотъ, какъ и всѣхъ остальныхъ изъ приводимыхъ здѣсь трудовъ, будетъ изложенъ въ своемъ мѣстѣ.

*Гумбольдтъ, A. Asie centrale. Paris 1843 г.* Взгляды и изображенія этого ученаго основаны только на имѣвшихся литературныхъ данныхъ и распросныхъ свѣдѣніяхъ, такъ какъ самъ онъ не имѣлъ возможности видѣть Байкалъ лично.

Гофманъ, О золотыхъ промыслахъ Восточной Сибири. Горн. Журналъ 1844 г. Ч. IV. *Reise nach den Goldwäschern Ost-Sibiriens* въ *Beiträge zur Kenntniss d. Russ. Reiches v. Baer und Helmersen. B. XII. 1847.* Гофманъ ознакомился только съ теченіемъ р. Ангары отъ Иркутска до истока и частью берега озера на протяженіи до 25 верстъ къ востоку отъ названнаго истока.

Н. Шукшинъ, Море или озеро Байкалъ. Журналъ Министерства Внутр. Дѣлъ 1848 г. Ч. XXIII. Какъ житель Иркутска онъ посѣщалъ нѣкоторые мѣста Байкала какъ равно и пути, ведущіе къ Забайкалью, и собиралъ о немъ свѣдѣнія, относящіяся и къ возрѣніямъ на образованіе озера.

Мелицкий, Отчетъ о занятіяхъ за лѣто 1852 г. Горн. Журналъ 1853. № 4. *Geognostische Skizzen von Ost-Sibirien* въ *Verhandlungen d. mineralog. Gesellschaft zu St. Petersburg. Jahrg. 1856.* Онъ проплылъ въ лодкѣ вдоль сѣверо-западнаго берега Байкала отъ его юго-западной оконечности до Онгурѣнъ (за Малымъ Моремъ) и ознакомился отчасти противоположнымъ берегомъ юго-западной части долины озера отъ села Култука до Селенги, съ хребтомъ Хамаръ-дабаснымъ по рч. Слюдянкѣ и Быстрой (системы Иркута). Кроме того онъ пересѣкъ сѣверо-западные горы Байкальской долины: по Кругобайкальской дорогѣ, отъ Култука къ долинамъ долины Иркута, по р. Ангарѣ и по тропѣ, ведущей съ устья рч. Онгурѣнъ на р. Чанчеръ, лѣвый притокъ того же теченія р. Лены.

Гумбольдтъ, А. *Kosmos. B. 4. Stuttgart und Tübingen. 1858 г.* (см. выше).

Штукенбергъ, Кругобайкальская дорога съ картою и промѣрами. Журналъ Главн. Управленія Путей Сообщенія 1858—59 г. Авторъ собралъ всѣ данныя, добытыя изслѣдованіемъ различныхъ проектированныхъ дорогъ, ведущихъ изъ Иркутска къ Баянъ-Тула и самъ участвовалъ въ экспедиціи 1838 г.



для осмотра и изслѣдованія этихъ путей. Въ статьѣ имѣются описанія, а также профили инструментальной нивелировки по линіямъ, пересекающимъ Хамарь-дабанскій хребетъ въ четырехъ мѣстахъ, въ промежуткѣ между юго-западною оконечностью озера и Селенгою.

*Radde, Berichte über Reisen im Süden von Ost-Sibirien etc. Beiträge z. Kenntniss d. Russ. Reiches. Bd. XXIII. St. Petersb. 1861.* Сочиненіе, на которое мы неоднократно уже ссылались выше, содержитъ между прочимъ и дневникъ путешествія этого натуралиста по берегамъ Байкала, со многими орографическими, ботаническими, зоологическими и этнографическими свѣдѣніями. Придерживаясь вообще маршрута Георга, Радде доплылъ только до Туркинского термального источника, гдѣ долженъ былъ окончить путешествіе по причинѣ болѣзни.

*Труды Сибирской Экспедиціи Имп. Русскаго Географическаго Общества. Математическій Отдѣлъ. Составленъ астрономомъ экспедиціи Л. Шварцемъ. Спб. 1864 г.* Сочиненіе это содержитъ между прочимъ перечни астрономически опредѣленныхъ пунктовъ въ интересующей насъ мѣстности и описаніе маршрутовъ какъ по нѣкоторымъ частямъ Байкала такъ и его притоковъ, а также матеріаловъ, на основаніи которыхъ составлена упомянутая выше карта.

*Поляковъ, Отчетъ о поѣздкѣ въ Восточный Саянъ. Приложение къ отчету Сиб. Отд. И. Р. Геогр. Общ. за 1868 г.* Совершилъ плаваніе вдоль сѣверо-западнаго берега Байкала отъ истока Ангары до с. Култукъ.

*Орловъ, Объ измѣненіи уровня Байкала. Изв. Сиб. Отд. И. Р. Геогр. Общ. Т. I, № 2. 1870 г.* Наблюденія, относящіяся главнымъ образомъ къ юго-западной части озера и слѣдамъ, указывающимъ на пониженіе уровня его воды.

*Дыбовскій и Годлевскій, Этюды у ю.-з-й оконечности Байкала и о совершенныхъ измѣреніяхъ глубины озера.* Труды на которыя мы ссылались уже выше.

*Миллеръ, Ф. Нивелировка отъ г. Иркутска до Байкала. Отчетъ Сиб. Отд. И. Р. Геогр. Общ. за 1871 г.* Инструментальная нивелировка произведена была по двумъ линиямъ, такъ-то: до истока р. Ангара, по тракту около долины этой рѣки, и до юго-западной оконечности озера черезъ сѣверо-западные горы, по пересѣкающей ихъ части Кругобайкальскаго тракта. Средняя высота озера надъ Ангарию около Троицкаго перевоза въ Иркутскѣ, получилась въ 88' (26,8 метра).

*Лопатинъ, И. Краткій отчетъ о дѣйствіяхъ Витимской экспедиціи. Зап. Сиб. Отд. И. Р. Геогр. Общ. Т. IX и X. 1867 г.* Лопатинъ посѣтилъ значительную часть долины Баргузинъ, откуда перешелъ въ систему р. Витима, вѣснаго притока р. Лены. Богатый геогностическими данными маршрутъ этотъ только въ послѣднее время подвергся значительной обработкѣ и уже печатается.

*Чекановскій, Геологическое изслѣдованіе въ Иркутской губерніи. Зап. Сиб. Отд. И. Р. Геогр. Общ. Т. XI. 1874 г.* Мологъ этотъ искрестилъ значительною сѣтью маршрутовъ возвышенность, прилежащую къ сѣверо-западному кону Байкальскихъ горъ и первый показалъ существованіе двухъ параллельныхъ хребтовъ: Онотскаго и Приморскаго, въ мѣстѣ описывавшагося прежде одного Байкальскаго <sup>1)</sup>. Онотскій хребетъ пересѣченъ имъ въ восьми мѣстахъ, а именно: по низовьямъ Иркуты и Олхи (прав. притокъ Иркуты), затѣмъ двумя маршрутами, исходящими изъ средняго теченія р. Голоустной и четырьмя съ р. Большой Бугульки. Приморскій же хребетъ пересѣченъ имъ по рр. Бу-

---

<sup>1)</sup> Краткій очеркъ орографіи Иркутской губерніи. Отчетъ Сиб. Отд. И. Р. Геогр. Общ. за 1869 г. Липинскаго, составленный на основаніи топографическихъ матеріаловъ, появился уже послѣ поѣздки и сообщенія Чекановскаго о существованіи этихъ двухъ хребтовъ, поименованныхъ на этомъ основаніи и у Липинскаго.

гульдейкъ, Ангѣ и отчасти съ верховьевъ р. Анги на пути къ вершинѣ гольца Харгойскаго около Малаго Моря. Что же касается самого Байкала, то Чекановскій ознакомился съ нимъ отчасти на сѣверо-западномъ берегу, въ промежуткѣ между истокомъ Ангарты и устьемъ р. Голоустной, далѣе, между устьемъ Бугульдейки и Малымъ моремъ, затѣмъ около юго-западной оконечности озера (Култукъ, Слюдянка, Хамардабанъ) и по юго-восточному берегу по р. Муринъ, а также по почтовому тракту отъ Култука до р. Переѣмной, гдѣ онъ обращалъ вниманіе впрочемъ на наносныя отложения. О его наблюденіяхъ на пути отъ Байкала къ Тункѣ и Мунку-Сардыку мы говорили уже въ своемъ мѣстѣ, точно также мы будемъ ссылаться при случаѣ и на другія статьи Чекановскаго, не имѣющія прямого отношенія къ Байкалу.

*Кропоткинъ, Отчетъ объ Олекминско-Витимской экспедиціи. Зап. И. Р. Геогр. Общ. Сиб. Т. III. 1873. Общий очеркъ орографіи Восточной Сибири Зап. И. Р. Геогр. Общ. Т. V. 1875.* Авторъ пересѣкъ сѣверо-восточное продолженіе интересующей насъ горной страны съ р. Леною черезъ Витимъ (правый притокъ послѣдней) и въ предѣлахъ его системы до г. Читы, лежащаго уже въ системѣ водъ Амура. Личное его знакомство съ Байкаломъ ограничивалось лишь посѣщеніемъ пещеръ по рч. Кадильной <sup>1)</sup> и окрестностей юго-западной оконечности озера, на пути въ Тунку и на р. Оку <sup>2)</sup>, съ которыми мы ознакомились выше. Многочисленныя барометрическія наблюденія, произведенныя самимъ авторомъ, а также сопоставленіе всѣхъ такихъ наблюденій произведенныхъ прежними путешественниками въ Сибири, вмѣстѣ съ тщательнымъ знакомствомъ съ литературою и картографическими матеріалами, послужили ему основаніемъ къ обобщенію всѣхъ орографическихъ данныхъ

<sup>1)</sup> Отчетъ Сиб. Отд. И. Р. Геогр. Общ. за 1865 г.

<sup>2)</sup> Зап. Сиб. Отд. И. Р. Геогр. Общ. Т. IX и X.

весьма талантливому очерку ихъ, въ которомъ въ конфигураціи описываемаго нагорья впервые различаются и строго опредѣляются такія формы, какъ высокое плоскогорье, окраинные хребты его, окраинная полоса горъ и плоская возвышенность.

Пишемъ, *O. Neue Probleme der vergleichenden Erdkunde.* 1876. Взгляды, основанныя не на личныхъ наблюденіяхъ автора.

Краморевъ, *Списокъ точекъ, определенныхъ при нивелированіи отъ г. Иркутска до озера Байкала въ 1876 г.* Изв. Сиб. Отд. Геогр. Общ. Т. IX. № 3—4. Краморевъ проводилъ нивелировку на одномъ изъ нѣсколькихъ нивелировочныхъ участковъ, которыми, по инициативѣ И. Р. Географическаго Общества, Байкалъ связанъ съ уровнемъ океана. Высота поверхности озера надъ Ангараю, около Троицкаго моста въ Иркутскѣ, оказалась равною 90,88' (27,616 метра).

Черскій, *Предварительный отчетъ о геологическомъ изслѣданіи береговой полосы озера Байкала. Годъ первый. 1877.* В. Сиб. Отд. И. Р. Геогр. Общ. Т. IX. № 1 и 2. *Отчетъ за 1878 г.* Извѣстія I. с. Т. IX. № 5—6. *Отчетъ за 1879 г.* Извѣстія I. с. Т. XI. № 1—2. *Отчетъ за 1880 г.* Извѣстія I. с. Т. XII. № 2 и 3. Нѣкоторые примѣчанія къ описанію Байкала К. Риттера. Извѣстія I. с. Т. XII. № 5. 1882 г. Къ вопросу о слѣдахъ древнихъ ледниковъ въ восточной Сибири. Тамъ же. Геологическая экскурсія на восточное плоскогорье и берегъ Байкала отъ р. Селенги до устья Куки. Извѣстія I. с. Т. XIII. № 1—2. Естественно-историческія наблюденія и замѣтки на пути отъ г. Иркутска до села Преображенскаго на р. Нижней Тунгускѣ. Извѣстія I. с. Т. XVI, № 1, 2 и 3. 1886 г. Подробный отчетъ о геологическомъ изслѣдованіи береговой полосы озера Байкала. В. Сиб. Отд. И. Р. Геогр. Общ. Т. XII. 1886 г. О результатахъ изслѣдованія оз. Байкала (краткій текстъ къ геологической картѣ въ масштабѣ 10 верстъ въ дюймѣ) въ

*Зап. И. Р. Геогр. Общ. Т. XV. № 3. Сиб. 1886 г.* Начавъ изслѣдованіе озера въ 1877 г., Черскій изучилъ часть юго-восточнаго берега Байкала отъ юго-западной его оконечности до устья р. Баргузинъ, причемъ съ р. Селенги онъ вышелъ на р. Кикю по Баргузинскому тракту, пролегающему вдали отъ озера, оставивъ въ то время часть береговой линіи отъ Селенги до Кики неосмотрѣнною. Въ 1878 г. имъ изслѣдована остальная часть юго-восточнаго берега отъ устья Баргузина до сѣверо-восточной оконечности, а 1879 г. посвященъ былъ на изученіе сѣверо-западныхъ горъ и берега озера отъ Култука до рч. Онгурѣнъ вмѣстѣ съ островомъ Ольхономъ. Затѣмъ въ 1880 г. онъ проплылъ отъ Онгурѣна до устья Верхней Ангары, а наконецъ, въ 1881 г. осмотрѣнъ былъ послѣдній оставшійся съ 1877 года, отрезокъ береговой линіи между Селенгинскою дельтою и устьемъ р. Кики и изслѣдована значительная часть системы р. Селенги до Монгольской границы. Кромѣ изслѣдованія побережья смотря по необходимости и возможности, дѣлались имъ болѣе или менѣе отдаленныя экскурсіи въ прибрежныя горы, и особенности частныя и отдаленныя въ горахъ сѣверо-западнаго берега озера, пересѣченныхъ этими маршрутами и многихъ мѣстахъ.

*Кириловъ, Путѣвка въ Нижнеангарскъ Баргузинскаго округа на Байкаль. Изв. Сиб. Отд. И. Р. Геогр. Общ. Т. XVII. № 1 и 2, 1886 г.* Авторъ, врачъ, описываетъ нѣкѣмъ еще неизслѣдованную до сихъ поръ дорогу, ведущую съ верхняго теченія р. Баргузина на одинъ изъ лѣвыхъ притоковъ средней части Верхней Ангары, на устьѣ которой онъ прежде изучалъ рыболовство.

*Обручевъ, Геологическія изслѣдованія въ Иркутской губ. 1889 г. Изв. Сиб. Отд. И. Р. Геогр. Общ. Т. XXI, № 1 и 4, а также: Оро-геологическія наблюденія на островѣ Ольхонъ и въ западномъ Прибайкальѣ. Горн. Журн. 1890 г. № 12 и Мѣсторожденія бурого угля въ Иркутской губ.*

*Горн. Журн.* 1891 г. № 12. По распоряженію Иркутскаго Горнаго Управленія авторъ совершилъ рядъ поѣздокъ по Иркутской губ. для изслѣдованія мѣсторожденій полезныхъ ископаемыхъ. Имъ посѣщены для этой цѣли Нижняя Ангара, Ока, Бѣлая, Онотскій и Приморскій хребты, островъ Ольхонъ и юго-западная часть Прибайкалья.

Окончивъ этимъ перечень главнѣйшей литературы, которую мы будемъ пользоваться при послѣдующихъ изложеніяхъ, перейдемъ къ подробному описанію интересующаго насъ озераго бассейна.

Имѣя въ виду какъ обширность описываемой площади и богатство накопившагося матеріала, такъ и подраздѣленіе Риттера на главы, мы раздѣлимъ наше изложеніе на три части, при чемъ въ первую часть какъ второе дополненіе къ § 51 Землеустройства Риттера войдутъ свѣдѣнія о сѣверо-западномъ берегѣ Байкала отъ юго-западной его оконечности и до устья рѣки Ангары. Остальныя же двѣ части составятъ дополненія §§ 52 и 53.

#### СѢВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БЕРЕГЪ БАЙКАЛА И ЕГО ГОРЫ.

Сѣверо-западные горы долины Байкала, какъ мы видѣли выше, составляютъ непосредственное продолженіе горъ, сопровождавшихъ сѣверный (лѣвый) берегъ средняго теченія Иркута, пересѣченное только ущельемъ этой рѣки, повернувшей тутъ къ сѣверу. Горы эти мы прослѣдили и вдоль Ильинско-Култукской долины, служившей прежде мѣстомъ прямого сообщенія Иркутска съ Байкаломъ, причемъ восточная часть этой долины, занятая нынѣ теченіемъ р. Култучной, привела насъ до площади, опоясывающей юго-западную оконечность озера. Такъ какъ площадь эта, такъ сказать, окончательно раздвигаетъ и обособляетъ собою горы обоеихъ береговъ озера, то поэтому изложеніе наше мы начнемъ съ описанія ближайшей оконечности Байкала, послѣ чего уже перейдемъ къ его сѣверо-западнымъ горамъ.

### 1) Юго-западная оконечность Байкальской долины.

Долину р. Култучной, принявшую почти юго-восточное направление (в.-ю.-в.), мы покинули въ томъ мѣстѣ, гдѣ она, постепенно расширяясь (до 2 верстъ), значительно приближается къ берегу Байкала (до 2-хъ же верстъ). Подножъ горъ праваго (южнаго) берега долины, т. е. продолженъ Саяна, извѣстнаго здѣсь вообще подъ названіемъ Хамар-дабанскаго хребта, — если бы его продолжить прямолинейно къ озеру, соединилось бы прямо и непосредственно съ упомянутымъ выше Шаманскимъ мысомъ, вдающимся въ Байкалъ около праваго берега устья р. Култучной. Это мѣшаетъ однако значительная вырѣзка, образуемая расширившеюся книзу долиною рч. Талой (Талая), впадающей въ низовья Култучной съ правой стороны и воспринимающей еще правую, небольшую вѣтвь, называемую Тальгой или К-урга, тогда какъ мѣсто, гдѣ Талая соединяется съ Култучною, носить названіе Казанкѣвой. Такимъ образомъ долина рч. Талой раздѣляетъ соответствующую часть склона названныхъ горъ на двѣ части, вѣрнѣе на два отрога изъ которыхъ первый, располагающійся между Култучною и Талою, извѣстенъ подъ названіемъ Тальской гривы и оканчивается крутымъ склономъ въ разстояніи около 2 верстъ отъ береговой линіи озера. Второй отрогъ между тѣмъ, располагается между правымъ берегомъ рч. Талой и долиною ближайшей къ устью Култучной рч. Похабики, омывающей отрогъ съ юго-восточной стороны. Отрогъ этотъ въ своей вышей ю.-з-й части носить названіе Похабинской гривы, тогда какъ сѣверо-восточная, значительно суженная его часть понижается въ видѣ цѣпи низкихъ и тупыхъ коническихъ и холмовидныхъ вершинъ на в.-с.-в., образуя собою гряды Шаманскаго мыса. Эта послѣдняя, какъ сказано выше, вдается скалистою оконечностью въ Байкалъ.

между устьями Култучной съ Талою и Похабики и раздѣ-  
 лить прибрежную площадь оконечности озера на двѣ части:  
 сѣверную или Култукскую, самую обширную и лежащую  
 на прямомъ продолженіи долины Култучной, и южную, мень-  
 шую или Похабинскую, въ которой берегъ оконечности  
 озера, тупой и сѣуженный до 7 верстъ, бухтовидно перехо-  
 дитъ въ южную береговую линію, окаймляясь соотвѣтственно  
 возвысившимися высокими горами. Насколько низовья долины  
 Талой способствовали расширенію долины Култучной съ  
 сѣверной стороны, на столько, въ свою очередь, долина ни-  
 зовьевъ рч. Мыдзянки, впадающей почти въ самый сѣ-  
 верный уголъ оконечности озера, расширяетъ ее съ сѣверной  
 стороны. Долина этого небольшого ручья (до 4 верстъ длины)  
 располагается на мѣстѣ перехода горъ лѣваго (сѣвернаго)  
 берега долины Култучной въ береговыя горы Байкала и на  
 мѣстѣ поворота ихъ (вѣрнѣе ихъ основанія) отъ прежняго,  
 юго-восточнаго направленія въ восточное. Она беретъ  
 начало двумя вѣтвями въ болѣе высокой части склона этихъ  
 горъ, называемой Култучною горою, на которую поды-  
 мается Кругобайкальская дорога,—затѣмъ пересѣкаетъ собою  
 южную оконечность знакомой намъ уже кыской террасы  
 западнаго берега долины Култучной и, поворачивая къ юго-  
 востоку, изливается въ Байкаль уже по низменной площади  
 прибрежья, въ разстояніи болѣе трехъ верстъ къ сѣверу  
 отъ устья р. Култучной. Такимъ образомъ достигается рас-  
 ширеніе низовьевъ долины Култучной и переходъ стѣсняв-  
 шихъ ее горъ въ прибрежныя цѣпи Байкала,—этимъ путемъ  
 соединяется и низменная площадь юго-западной оконеч-  
 ности послѣдняго. Склоны этихъ горъ, за исключеніемъ грады  
 Манскаго мыса, опускаются въ сторону озера и низовьевъ  
 лежащихъ долинъ довольно круто, до нѣкоторой степени  
 отвѣсивидно, причемъ самою интересною особенностью въ  
 устройствѣ ихъ нельзя не считать того обстоятельства, что на  
 нихъ, какъ показали изслѣдованія Черскаго, наблюдаются



террасовидные уступы, замѣчаемые не только со стороны озера, но и вдающіеся въ бухтовидно расширенныя низовыя открывающихся здѣсь долинъ, не исключая Похабихи и слѣдующей за нею р. Слюдянки, причемъ высота этихъ уступовъ достигаетъ 346'—434' и даже значительно превосходитъ 861' надъ уровнемъ Байкала. Ясно поэтому, что въ числѣ этихъ уступовъ находятся и соответствующіе знакомой намъ уже высшей террасѣ лѣваго берега долины р. Култучной и подобнымъ же, распространяющимся и далѣе къ западу, въ Ильчинскую долину, до входа Иркутъ въ ущелье, а обстоятельство это стоитъ въ прямой связи съ указаннымъ выше соответственнo высокимъ стояніемъ водъ Байкала въ то время когда онъ затоплялъ собою и Тункинскую долину. Подробности строенія этихъ горъ будутъ изложены въ своемъ мѣстѣ при описаніи совершенныхъ по нимъ маршрутовъ, такъ какъ большая часть ихъ, какъ расположенныхъ южнѣе долины р. Култучной, принадлежитъ уже къ горамъ юго-восточнаго берега озера. Теперь замѣтимъ только, что всѣ онѣ состоятъ изъ тѣхъ же, древнѣйшихъ, кристаллическихъ, полевошпатовыхъ породъ и известняковъ, съ которыми мы постоянно встрѣчались въ интересующей насъ горной странѣ, причемъ въ общемъ, сохраняется и тоже простираніе породъ (з.с.-з.) какое сопровождало насъ въ долинѣ Иркутъ, и потому пласты эти пересѣкаютъ долину оконечности озера въ діагональномъ направленіи и только долина р. Култучной проложена по нимъ совершенно продольно. Въ составѣ лѣваго берега и возвышеній этой долины, слѣдовательно, ея высокой террасы, видны Черскимъ видоизмѣненія обыкновеннаго роговообманковаго и хлоритоваго гнейсовъ (изрѣдка съ блестками графита), переходящихъ въ очковый гнейсъ, въ слюдяный, хлоритовый и роговообманковый сланцы, при чемъ всѣ эти породы представляютъ тѣсную связь съ описывавшеюся Черновскимъ въ такъ называемомъ утесѣ Спикюшка (теперь берегъ Култучной въ 5 верстахъ отъ Байкала), гдѣ пла-

падаютъ на сѣверъ и с.-с.-в., обнаруживая и отвѣсное по-  
ложение. Кромѣ того, около восточнаго конца высшей тер-  
расы, ближе къ долинѣ Мыдьянки, на высотѣ 475' надъ  
озеромъ, Черскій нашелъ выступъ лавы, интересной въ томъ  
отношеніи, что въ ней наблюдается и стекловидное видоизмѣ-  
неніе, не попадавшееся до сихъ поръ въ Иркутской губер-  
нии. Плохіе выходы базальта извѣстны еще со временъ Че-  
пановскаго и на низменной части лѣваго берега низовьевъ  
Култучной около дороги, ведущей въ Тунку; глыбы той же  
породы описываются тѣмъ же авторомъ и по низовьямъ  
Мыдьянки.

Склоны всѣхъ этихъ горъ, какъ равно и видимыя съ  
берега высшія ихъ точки, покрыты болѣе или менѣе густымъ  
лиственнымъ лѣсомъ (лиственничнымъ), къ которому на болѣе  
высокихъ и освѣщенныхъ мѣстахъ подмѣшивается бѣлая бе-  
реза, придавая такимъ мѣстамъ болѣе мирный, уютный ха-  
рактеръ. Въ общемъ горы эти придаютъ оконечности озера  
очень живописную наружность, не взирая на отсутствие  
высокихъ и остроконечныхъ вершинъ, видящихся только  
въ отдаленіи на юго-востокъ (в.-ю.-в.) въ системахъ р.р.  
Сѣвѣрной, Выдренной и др. (Снѣжинскіе гольцы см. ниже).  
То же касается низменной площади, прилегающей къ юго-  
западной оконечности озера, и обрамленной описанными го-  
рами, то она всего болѣе возвышается въ сѣверной своей  
части (болѣе 20' надъ озеромъ), ближе къ устью Мыдьянки  
и вдоль лѣваго берега долины Култучной, тогда какъ къ югу  
и ю.-з., къ низовьямъ и устью послѣдней, она лишь немно-  
го превышаетъ уровень Байкала и отдѣлена отъ береговой  
линии валомъ изъ песка и гальки, по которому проложена и  
почтовая дорога. На западъ отъ этого вала, образовавшагося  
прибоя волнъ, располагаются болотистыя и торфянистыя  
низовья Култучной, отношеніе которыхъ къ мѣсту  
впаденія этой рѣки въ озеро и къ упомянутому прибойному  
валу, заставляютъ полагать, что дѣйствіемъ того же прибоя

устье рѣчки должно было постепенно отклоняться къ югу, гдѣ нынѣ оно совершенно прижато къ скалистой градѣ Шаманскаго мыса <sup>1)</sup>. Къ долину рч. Талой мѣстность опять возвышается и получаетъ свойства, пригодныя для развитія земледѣлія. Изслѣдованіе наноснаго отложенія, слагающаго всю эту низменную площадь, показало, что въ составъ его болѣе высокой, сѣверной части входитъ болѣе крупный матеріаль (галыки, валуны и мало обточенные продукты растрескиванія скаль), покрытый суглинистымъ и глинистымъ отложеніями, преобладающими, вмѣстѣ съ пескомъ, въ южной части низменности. Осадки эти образовались очевидно подвліяніемъ совокупнаго дѣйствія наносовъ со стороны долины Култучной и Байкала, а также растрескиванія скаль около подножія сосѣднихъ горъ; что же касается предполагавшагося участка древнихъ ледниковъ, то Черскій, подробно разобравъ всѣ основанія, на которыхъ удерживалось это мнѣніе и лично ознакомившись съ этою мѣстностью, считаетъ абсолютно невозможнымъ примѣнять эту теорію къ явленіямъ наблюдавшимся около Байкала <sup>2)</sup>

На высшей части описываемой площади, между устьемъ Мыдланки и пониженіемъ къ устью р. Култучной, располагается вдоль берега Байкала село Култукъ, состоящее изъ 65 дворовъ съ 433 жителями (214 мужч.). Изъ жителей 22 постороннихъ, остальные крестьяне—старожины. В селеніи находится одна церковь, почтовая и телеграфическія станціи, а также отдѣленіе таможенной заставы, 1 аптека, 1 заведеніе, 2 лавки, 2 водяныя мельницы, 2 кузницы, 82 жилыхъ постройки. Въ непосредственномъ владѣніи крестьянъ селенія 750 дес. земли, въ т. числѣ пахатной 190 дес., покосовъ 470 дес. Слово Култукъ означаетъ у мѣстныхъ жителей бур-

<sup>1)</sup> Чекановскій, Зап. Сиб. Отд. И. Р. Геогр. Общ. Т. XI, стр. 10.

<sup>2)</sup> Черскій, Зап. Сиб. Отд. И. Р. Геогр. Общ. Т. XII.

иное окончаніе каждаго залива или озера, вслѣдствіе чего названіе это примѣняется еще, какъ мы увидимъ ниже, и къ другимъ частямъ Байкала, въ настоящемъ же случаѣ интересующее насъ село, по выраженію прибайкальцевъ, «расположено въ самомъ култукѣ моря». Хлѣбопашество въ Култукѣ мало развито; на все село, какъ замѣчаетъ Поляковъ<sup>1)</sup>, засѣвается до 50 десятинъ разнаго хлѣба, ярицы, яса, ячменя и пшеницы; поля нерѣдко удобряются навозомъ, но урожаи плохіе: хлѣба не всегда вызрѣваютъ или ихъ прибиваетъ морозами. Засѣваются также овощи: огурцы, капуста, рѣпа, рѣдька и картофель, — послѣдній въ особенномъ количествѣ. О скотоводствѣ слѣдуетъ замѣтить, что скота у жителей селенія: лошадей 227 (201 рабочихъ), 245 оленяго скота и 150 мелкаго. Самый богатый изъ хозяевъ имѣетъ до 15—20 лошадей и 15 головъ скота. Култукское селеніе принадлежитъ къ Тункинской волости.

Кромѣ того жители занимаются еще рыболовствомъ, звѣринымъ промысломъ (бѣлка, соболь, изюбрь, лось, козуля, лѣсъ, кабанъ и т. п.), собираніемъ кедровыхъ орѣховъ, рубкою и сплавомъ строеваго лѣса, а иногда извозомъ. Рыболовля совершается обыкновенно весною, для чего имѣется несколько большихъ артельныхъ неводовъ; но мѣстность эта, напротивъ, нѣкоторымъ другимъ частямъ Байкала, въ которыхъ будетъ сказано въ своемъ мѣстѣ, не отличается изобиліемъ рыбы. Нѣкоторыя свѣдѣнія о соболинномъ промыслѣ будутъ переданы при описаніи рѣкъ ю.-в.-го берега Байкала. Указанная выше разносторонность занятій жителей, въ ограниченномъ земледѣліи, вообще не особенно хорошо поддерживаетъ жизнь «култучанъ», въ особенности потому, что неудачи различныхъ отраслей ихъ промысла совпадаютъ иногда и съ неурожаями посѣвовъ. Съ Култукомъ связаны имена многихъ ученыхъ и путешественниковъ; нѣкоторые изъ нихъ, какъ напр. Дыбовскій, Годлевскій, а отчасти и Чеканов-

<sup>1)</sup> Поляковъ, Отчетъ Сиб. Отд. И. Р. Геогр. Общ. за 1868 г.

скій, избирали село это мѣстомъ постоянного жительства и теченіи нѣсколькихъ лѣтъ. Здѣсь Ксенжопольскимъ произведены полныя метеорологическія наблюденія въ продолженіи трехъ лѣтъ, а именно съ мая 1869 по іюль 1872. Результаты этихъ наблюденій, обнаруженныхъ академикомъ Вильдомъ <sup>1)</sup>, для температуры воздуха были слѣдующіе въ средних температурахъ за мѣсяцы и времена года:

Январь . . .	—19,9	Іюль . . .	+13,8
Февраль . . .	—18,0	Августъ . . .	+13,0
Мартъ . . .	— 9,7	Сентябрь . . .	+ 8,6
Апрѣль . . .	— 2,2	Октябрь . . .	+ 2,1
Май . . .	+ 5,4	Ноябрь . . .	— 6,8
Іюнь . . .	+10,8	Декабрь . . .	—15,0
<hr/>			
Зима . . .	—17,7	Разность между	
Весна . . .	— 2,2	теплѣйшимъ и	
Лѣто . . .	+12,5	холоднѣйш.мѣс.	33,7
Осень . . .	+ 1,3	Ср. тем. 5 мѣс.	
Годовая темп.	— 1,5	растит. періода	10,3.

Изъ приведенныхъ цифръ мы видимъ, что если по средней годовой температурѣ Култукъ занимаетъ среднее положеніе между Иркутскомъ и Нерчинскимъ Заводомъ, то и разницѣ между теплѣйшимъ и холоднѣйшимъ мѣсяцами представляетъ болѣе умѣренный климатъ чѣмъ въ Нерчинскомъ Заводѣ (гдѣ эта разница составляетъ 47,8°) и даже въ Иркутскѣ (гдѣ эта разница составляетъ 38,7°). За то холодное лѣто (+12°,5) и низкая средняя температура мѣсячнаго растительнаго періода (+10,3°) уже не даютъ возможности къ безпрепятственному развитію земледѣлія.

Ботаникъ Турчаниновъ также не мало экскурсировалъ въ окрестностяхъ Култука. Изъ указываемыхъ въ его

<sup>1)</sup> Вильдъ, О темпер. воздуха въ Россійской Импер. Спб. 1882, ССХХІ—ССХХІІ.

спескомъ сочиненіи <sup>1)</sup> 46 растеній изъ Култука и сосѣдней р. Выдренки, болѣе 40% принадлежить къ обыкновеннымъ европейскимъ видамъ, а именно: *Ranunculus aquatilis* L., *R. flammula* L., *R. lanuginosa* L., *Actaea spicata* L., *Stellaria uliginosa* Murr., *Drosera rotundifolia* L., *D. longifolia* L., *Valeriana officinalis* L., *Cirsium heterophyllum* All., *Lemna trisulca* L., *Scheuchzeria palustris* L., *Platanthera viridis* Lind., *Corallorhiza innata* R. Br., *Iuncus alpinus* Vill., *Carex pilulifera* L., *Festuca rubra* L., *Rhynchospora alba* Vahl., *Milium effusum* L., *Polypodium phegopteris* L. Замѣчательно, что всѣ эти европейскіе типы, растущіе вмѣстѣ съ тѣмъ и въ разсматриваемомъ отдаленномъ уголку Сибири, растенія или водныя или болотныя, и только одно растетъ въ сырыхъ лѣсахъ. Одно изъ здѣшнихъ растеній *Bupleurum aureum* Fisch. есть растеніе общее Сибири и Европейской Россіи. Есть еще здѣсь и растенія полярно-альпійскаго типа, т. е. такіа, которыя встрѣчаются и въ полярной зонѣ стараго, а нѣкоторыя и новаго свѣта и въ альпійской зонѣ горныхъ странъ. Сюда относятся *Cerastium trigynum* Vill., *Astragalus oroboides* Hor., *Gibbaldia procumbens* L., *Koenigia islandica* L., *Eriophorum Chamissonis* C. A. Mey., *Alopecurus alpinus* L., *Cinna latifolia* Briseb. Есть еще и растенія полярно-сибирскаго типа, переходящія въ полярную Америку, какъ напр. *Mertensia dentulata* G. Don., *Pteris argentea* Gm., *Polystichum fragrans* Led. Есть обще-сибирскіе типы, какъ напр. *Corydalis impatiens* Fisch., *Orobanche ammophila* C. A. Mey., *Salix berberifolia* Pall. Есть растенія, характерныя для Алтайско-Саянскаго горья, какъ-то: *Cardamine tenuifolia* Turcz., *Hypericum ascyron* L., *Sanguisorba alpina* Bge., *Nardosmia saxatilis* Turcz., *Aronicum altaicum* Dc., *Crepis Bungei* C. A. Mey., *Chinospermum Redowskii* C. A. Mey. Наконецъ есть и пустынные растенія, переходящія отсюда въ Амурскій бассейнъ какъ *Carex Meyeriana* Kth. и даже растенія повидимому со-

<sup>1)</sup> Turczaninow, Flora baicalensi dahurica.

вершенно эндемическія для здѣшной мѣстности, какъ напр. *Eranthis sibirica* DC., *Anemone baicalensis* Turcz., *Waldsteinia sibirica* Trattin. О фаунѣ жесткокрылыхъ насекомыхъ (Coleoptera) окрестностей Култука мы также имѣемъ нѣкоторые свѣдѣнія<sup>1)</sup>. Изъ 83 извѣстныхъ намъ изъ этой мѣстности видовъ 77% принадлежатъ въ европейскимъ формамъ. Затѣмъ здѣсь встрѣчаются обще-сибирскія формы, какъ напр. *Carabus Schönherri* Fisch. (переходящій и въ Европ. Россію до Волги), *Melandrya rufipes* Gebl., *Luperus altaicus* Mhm., восточно-сибирскія: *Elaphrus sibiricus* Mots., *Carabus odoratus* Mots., *C. canaliculatus* Ad., *Nebria catenulata* Fisch., *Corymbites laevicollis* Mhm., *Denticollis variabilis* Esch., *Podabrus angusticollis* Mots., *Melandrya mongolica* Sols., *Harmonia 12 maculata* Gebl. Есть восточно-сибирскіе виды, переходящіе въ бассейнъ Амура, какъ напр. *Amara Solskyi* Heyd., *Philonthus addendus* Sh., *Denticollis cinerea* Cand. Наконецъ въ Кулукѣ водятся и нѣкоторые эндемическіе (мѣстные) виды, какъ напр. *Pterostichus fulvescens* Mots., *Encephalus Solskyi* Heyd., *Lathridius attenuatus* Heyd., *Orchesia fusiformis* Sols.

А) Горы между юго-западною оконечностью Байкала и истокомъ р. Ангарты.

Одного взгляда на карту достаточно для того, чтобы увидѣть, что площадь, ограничивающая часть берега Байкала отъ юго-западной его оконечности до истока р. Ангарты имѣетъ видъ треугольника, обращеннаго вершиною къ сѣверу и ограниченнаго: съ сѣверо-запада теченіемъ Иркуты отъ входа его въ ущелье до устья, съ юга береговою линіею озера и съ сѣверо-востока долиною Ангарты до устья въ Иркутку около города Иркутска, гдѣ располагается вершина этой площади, заслуживающей названіе Иркутско-байкальской.

<sup>1)</sup> L. v. Heyden, Catalog d. Coleopteren v. Sibirien. Berlin, 1880—81.

кальскаго треугольника <sup>1)</sup>). Наибольшая ширина этого пространства, между крайнимъ пунктомъ излучины ущелья Иркутъ около знакомаго уже Зыркузуна и выходомъ Ангарты изъ озера (съ запада на востокъ) достигаетъ 100 верстъ, тогда какъ длина, вѣрнѣе высота треугольника (съ ю.-ю.-в. на с.-с.-з.), отъ береговой линіи Байкала до низовья Иркутъ почти не превышаетъ 60 верстъ, считая по прямому и горизонтальному направленію.

Сообразно съ указанными границами, нашъ треугольникъ крошится водами слѣдующихъ системъ: а) въ западной части правыми притоками ущелистой и нижней части теченія Иркутъ, изъ которыхъ р. Олха, знакомая намъ только на ея устьѣ (см. выше), является самымъ значительнымъ. Достигающая 50 верстъ длины, она перерѣзываетъ мѣстность почти съ точностью по меридіану, начиная съ весьма близкаго расстоянія (до 5 верстъ) отъ береговой линіи Байкала, и раздѣляетъ описываемый треугольникъ по его высотѣ, на двѣ половины: западную, вообще нѣсколько болѣе узкую, и восточную. Около 20 верстъ нижняго теченія этой рѣки известны еще со временъ Чекановскаго и нанесены имъ на упоминавшуюся уже неоднократно его геогностическую карту, тогда какъ остальная часть долины, за исключеніемъ около 10 верстъ самаго верхняго теченія, до сихъ поръ никѣмъ еще не посѣщеннаго, описана и изображена на картѣ Черского, отъ котораго мы и заимствуемъ передаваемые здѣсь свѣдѣнія. По рассказамъ мѣстныхъ жителей, верховья Олхи, называемой еще Большою Олкою, должны располагаться въ истоки незначительнаго (около 5 верстъ) притока Байкала, — Шабартуя (см. ниже) съ одной стороны и верховья рч. Половинной съ другой, слѣдовательно, около 8-ми верстъ южнѣе знакомаго уже Черскому, незначительнаго праваго притока, ключа, вытекающаго изъ котловина Мостки. Нѣсколько выше этого ключа рѣчка при-

<sup>1)</sup> Черскій, Рукописныя замѣтки о Сибири.



нимаетъ съ лѣвой стороны вѣтвь около 17 верстъ длины, приходящую съ запада и извѣстную подъ именемъ Средней Олхи, вслѣдствіе чего въ томъ мѣстѣ, гдѣ Черскій встрѣтилъ Олху, около 1 версты ниже устья Мостковъ, она достигаетъ уже около 3 саженой ширины, довольно многоводна и переливается съ шумомъ черезъ обломки скалъ стѣснившихъ её утесовъ, образуя порогъ. Верстъ съ 15 ниже порога Олха круто поворачиваетъ къ западу и версты двѣ спустя опять къ сѣверу, образуя излучину, въ восточный конецъ которой, т. е. съ правой стороны, впадаетъ небольшой Смоленскій ключикъ, а въ западный, съ лѣвой стороны, сначала ключъ Рассоха, а за ней Малая Олха до 18 верстъ длины, протекающая съ запада, гдѣ съ развѣтвленіями ея долины мы встрѣтимся на линіи почтоваго тракта. Отсюда, на протяженіи почти 27 верстъ, до впаденія въ Иркутъ, Олха принимаетъ только незначительные ключи, протекающіе впрочемъ въ довольно широкихъ долинахъ, какъ-то: Левинскій, Гончураева, Мольты и Кукюртъ съ правой стороны, а Фонталка (испорченное отъ Фонтанка), Безъимянная (устье почти насупротивъ Мольты), Ханчѣнь, Медвѣжья (выше Кукюрты), Широкая, Тункинская и Глубокая (ниже Кукюрты) съ лѣвой стороны, причемъ четыре послѣднія долины заняты только періодическими водами. Ниже устья Малой Олхи, а въ особенности ниже Фонталки, начиная съ Безъимянной и Мольты, долина Олхи значительно расширяется и принимаетъ луговой характеръ, а въ 7 верстахъ выше устья въ Иркутъ, въ ней построена деревня Олхинская; тогда какъ около впаденія въ Иркутъ расположено село Смоленское; свѣдѣнія объ обоихъ селеніяхъ были нами сообщены въ предшедшей части (стр. 149). На востокъ отъ Олхи, слѣдовательно въ восточной половинѣ тунго-гольника, орошеніе мѣстности производится системами лѣвыхъ притоковъ Ангары. Изъ нихъ главнѣйшую роль играетъ рч. Курмъ, протекающая болѣе въ восточномъ направленіи.

ти которой: Хёя (25 верстъ длины вмѣстѣ съ Курмою, 16 верстъ безъ ней), Шинихта (13 верстъ), незначительный Дабатъ, а затѣмъ рч. Ола (15 верстъ длины), впадающая въ Курму ближе къ ея устью, занимаютъ почти все пространство между Олкою и Ангарию, причемъ верховья Хе и располагаются вблизи отъ источниковъ рч. Кам (прав. притокъ низовьевъ Иркуты см. выше) и недалеко отъ праваго берега Кукурта; вѣтви верховьевъ Шинихты лежатъ вблизи источниковъ Кукурта (лѣвая) и недалеко отъ Смоленскаго ключа; нѣтъ неизслѣдованный еще Дабатъ долженъ брать начало недалеко отъ средней части теченія рч. Половинной (см. ниже), а наконецъ Ола беретъ начало всего южнѣе, недалеко отъ рч. Ланки, впадающей въ Ангару съ лѣв. стороны, верстахъ въ 14 ниже выхода ея изъ Байкала. Наконецъ, южная полоса мѣстности занята весьма короткими, причемъ и незначительными притоками Байкала (см. ниже), изъ которыхъ особеннаго вниманія заслуживаютъ: Ангалька, до 10 верстъ длины съ устьемъ въ 8 верстахъ восточнѣе устья Мыдланки (около Култука) и самая значительная, рч. Половинная, около 27 верстъ длины, впадающая въ началѣ второй (восточной) половины длины интересующей части береговой линіи озера. Верховья этой, очень мало изслѣдованной еще рѣчки, должны располагаться, какъ сказано выше, недалеко отъ источниковъ Большой Олхи и Шатруа, послѣ чего она направляется сначала на сѣверо-востокъ, гдѣ, въ точкѣ, извѣстной подъ названіемъ Этапъ, въ разстояніи верстъ съ 11 отъ верховьевъ, рѣчка эта встрѣчается маршрутомъ Черскаго. Отсюда Половинная поворачиваетъ къ востоку, а затѣмъ къ югу и въ такомъ вообще направленіи достигаетъ Байкала, гдѣ её изучали Меглицкій, Яковъ и Черскій.

Если провести мысленно линію отъ р. Иркуты около мѣстности Введенской (въ 24 верстахъ отъ Иркутска), черезъ Олху (13 верстъ на в.-ю.-в. отъ Введенской) и далѣе

на юго-востокъ къ ближайшимъ сѣвернымъ окрестностямъ устья рч. Ланки въ Ангару, то болѣе двухъ третей площади нашего треугольника, лежащія къ юго-западу отъ этой линіи за исключеніемъ значительно понизившагося восточнаго угла составляютъ высокую часть описываемой мѣстности, тогда какъ остальная входитъ въ составъ плоской возвышенности, примыкающей къ Байкальскимъ горамъ.

Рельефъ высокой части этой не вездѣ еще изслѣдованной площади, является нѣсколько болѣе сложнымъ, нежели знакомое уже намъ ея западное продолженіе въ предѣлахъ пересѣченія ущельемъ Иркута, и потому относительно ея орографическаго типа, какъ мы увидимъ ниже, существовали неодногласныя показанія и мнѣнія. Начало ея изученія положено по единственной здѣсь дорогѣ, ведущей изъ Иркутска въ Бутукъ къ юго-западной оконечности озера (89 верстъ) и пересѣкающей западную часть треугольника по всей его длинѣ. Эта часть Кругобайкальскаго тракта является весьма поучительною для нашей цѣли, такъ какъ по ней именно совершена инструментальная нивелировка Миллеромъ (I. с. см. выше). Подробные результаты этого труда не были еще обнародованы производителемъ работы, но такъ-какъ рукописно его профилемъ пользовался Черскій въ своихъ отчетахъ (I. с.), то мы и заимствуемъ описаніе рельефа изъ статей этого путешественника, чтобы представить полное сѣченіе какъ горъ по этой линіи, такъ и части примыкающей къ нимъ плоской возвышенности, съ которой мы и начнемъ этотъ первый поперечный разрѣзъ мѣстности.

Переваливъ Кайскую гору (203' надъ Байкаломъ) лежащую между Ангарою около Иркутска и низовьемъ р. Кзвпадающей въ Иркутъ, дорога слѣдуетъ вверхъ по низменности праваго берега Иркута до ближайшихъ южныхъ окрестностей станціи Введенской (24 версты отъ Иркутска) о селѣ Введенскомъ см. въ предшедшей части стр. 14. спускаясь почти на 2' ниже уровня Байкала. Отсюда тра

пересѣкаетъ такъ называемую Еловую гору или Еловый хребетъ, достигающій здѣсь нѣсколько болѣе 1104' надъ озеромъ (2665' абс. высота). Хребетъ этотъ, въ которомъ Черскій видитъ менѣе рѣзко обособленный здѣсь эквивалентъ хребта Онотскаго, отдѣляетъ собою Введенскую низменность отъ болѣе высокой (до 260' н. Байк.) Мотской (см. Ч. I, стр. 148), занятой системою рѣчекъ Мотъ. Затѣмъ, отъ станціи Мотской (20 верстъ отъ Веденской, 260' н. Байк.), расположенной почти съ точностью на половинѣ всего протяженія Иркутско-Култукской дороги, путь пролегаетъ по самой высокой части мѣстности (восточное продолженіе Тунгусской цѣпи, западное продолженіе Приморскаго хребта). Профиль этой части рисуетъ её въ видѣ возвышенія почвы, расчлененнаго многими долинами, причемъ однако высшія точки не превосходятъ 1767' надъ Байкаломъ (3328' абс. высоты), а дно самыхъ глубокихъ долинъ не опускается ниже 1400' той-же относительной высоты. И дѣйствительно, уже первый подъѣмъ изъ Мотской станціи ведетъ на такъ называемую Осиновую гору, возвышающуюся на 1488' н. Байк.; съ нея путешественникъ спускается въ Поперечный злобокъ, т. е. широкое углубленіе съ волнистымъ дномъ, асимметрическій уровень котораго колеблется между 1120 и 1270' н. Байк. Злобокъ ограничивается съ южной стороны Подкаменной горою (1642' н. Байк.), между которою и слѣдующею затѣмъ Глубоковскою горою (1626' н. Байк.) снова въ свою очередь углубляется, но такъ, что долины, хотя болѣе глубоки около двухъ названныхъ горъ, не врѣзываются однако и до 1310' н. Байк., а высшій пунктъ промежутка не достигаетъ 1500' н. Байк. Спускъ съ Глубоковской горы ведетъ въ долину Круглую (на профилѣ не вѣрно: «Большая Глубокая») съ расположенною въ ней Больше-Глубоковскою или Кругло-Глубоковскою почтовою станціею (1413' н. Байк., 22 версты отъ Мотской). Переездъ изъ станціи въ сосѣднюю долину рч. Большой Глу-

бокой (системы верховьев Зазары) не достигает 1500' н. Байк., а сама долина названной рѣчки, гдѣ прежде располагалась упраздненная нынѣ станція, не врѣзывается глубже 1260' н. Байк. Далѣе, гора Ворота, возвысившись до 1561 н. Байк. и представляя на своей широкой вершинѣ рядъ незначительныхъ, волнообразныхъ перекатовъ, отдѣляетъ долину Б. Глубокой отъ Малой Глубокой, дно которой является низшимъ гипсометрическимъ пунктомъ по всему протяженію дороги черезъ высокую часть мѣстности, не опускающемся впрочемъ ниже 1100' надъ Байкаломъ. Наконецъ, между М. Глубокою и Байкаломъ (болѣе 13 вер.) располагается высшая часть горъ. Она включаетъ въ себя сначала Мотскую гриву, нѣсколько превышающую 1500' н. Б., за ней неглубокая долинка, Большая Вересовка, на высотѣ 1430', далѣе гора Б. Вересовка, достигающая почти 1700', затѣмъ, отдѣленный отъ нея долиною Малой Вересовки, дно которой опускается нѣсколько ниже 1400', располагается высшій пунктъ всей дороги,—гора Сонки, 1767' н. Байк. (3328' абс. высоты). Съ него дорога опускается сначала почти до высоты 1300', т. е. въ долину лѣвой или Малой Ангасолки, затѣмъ, спустя переваль менѣе 100' высоты надъ названною рѣчкою, переходитъ въ долину правой или Большой Ангасолки (около 1260' н. Байк.), а наконецъ, съ вершины сосѣдней горы Култучной (1394' н. Байк.), въ разстояніи 5 верстъ отъ Култука, слѣдуетъ длинный и крутой спускъ къ долинѣ Мыдьянки и Байкалу. Если прибавить къ сказанному, что долины на восточной сторонѣ тракта принадлежать системамъ Малой и Средней Олх. отчасти Байкалу (Ангасолки), тогда какъ съ западной и приводятъ къ Иркуту, то станетъ очевиднымъ, что перекладываемый почтовою дорогою западный отрѣзокъ высокой части нашего треугольника является въ видѣ отрога съ своимъ восточнымъ направлениемъ, омываемого Иркутомъ и Олой, а дорога придерживается въ общемъ водораздѣльнаго грѣ

того отрога, который названъ Черскимъ Култукскимъ въ имени этой части Кругобайкальского тракта <sup>1)</sup>). Замѣтъ, что около дороги черезъ гору Сопки возвышаются еще вообще тупыя вершины того же отрога, достигающія повидимому не менѣе 2000' н. Байк. (3561' абс. высоты), переходя къ рельефу восточной части, пользуясь барометрическою велирировкою, произведенною Черскимъ.

Маршруты этого путешественника восточнѣе долины Олки обнаружили тамъ существованіе другого отрога, въ цѣль параллельнаго Култукскому, но съ болѣе меридіональнѣе направленіемъ.

Тропа, по которой слѣдовалъ Черскій къ среднему теченію рч. Половинной, ведетъ изъ деревни Олки, расположенной почти на той-же высотѣ, какъ и ст. Введенская (только 2' ниже Байкала), и направляется сначала на востокъ и юго-востокъ, пересѣкая Тимошкину и Винокуренинскую долины («пади») праваго берега Олки, послѣ чего, въ состояніи около 4 верстъ отъ деревни, поворачиваетъ вообще на югу, подымаясь на гребень сѣверной оконечности описываемаго отрога. Здѣсь тропа ведетъ сначала около склона къ лѣвому берегу Кучегуристой пади системы рч. Каи, водораздѣлъ между послѣднею и Олкою достигаетъ уже 1125' н. Байк., а затѣмъ черезъ такъ называемое Среднее озеро, т. е. небольшое углубленіе почвы, въ которомъ собирается нѣкоторое количество воды. Спусти 4 версты отъ упомянутого поворота къ югу, она проходитъ мимо Кривой пади системы р. Каи и въ 1½ верстахъ дальше достигаетъ водораздѣла между нею и Кукюртомъ (прав. притокъ Олки) на высотѣ 1125' н. Байк. Версты съ двѣ дальше, на высотѣ 1009', находится водораздѣлъ между тѣмъ же Кукюртомъ и лѣвою вѣтвей рч. Хей, системы р. Курмы (притокъ Ангары), откуда начинается пониженіе отрога до 1009' н. Байк.

---

<sup>1)</sup> Черскій, Рукописныя замѣтки о Сибири.

недалеко отъ Малиноваго озера. Пониженіе это составляетъ вмѣстѣ съ тѣмъ и низшій пунктъ отрога на пути къ р. Половинной (системы Байкала), южнѣе котораго начнется длинный волнистый, но пологій подъемъ. Такимъ образомъ, спустя  $1\frac{1}{2}$  версты, тропа подымается до высоты 1125', проходитъ черезъ пониженіе гребня (1046') къ мѣсту гдѣ Кукюртскому склону къ р. Олхѣ противопоставляется сухая вѣтвь р. Шинихты, притока Курмы ( $1\frac{1}{2}$  версты отъ ближайшаго перевала); около  $2\frac{1}{2}$  верстъ далѣе, близъ верховьевъ Кукюрта, мѣстность возвышается до 1261' н. Б., а затѣмъ, спустя еще такое-же протяженіе, тропа достигаетъ высшаго пункта отрога, 1676' н. Байк., т. е. 3237 абс. высоты. Съ него тропа ведетъ въ долину Смоленскаго ключика (1257' н. Байк.), впадающаго въ Олху (см. выше), послѣ чего мѣстность опять возвышается до 1374 н. Байк. и въ такомъ видѣ продолжается до верховьевъ Шинихты (2 версты) и до ближайшаго лѣваго притока Половинной ( $2\frac{1}{2}$  версты), уровень которой, около 6 верстъ отъ верховьевъ Шинихты, въ точкѣ верхняго теченія, называемой Этаномъ, равняется 695' н. Байк. Широкая долина Половинной направляется здѣсь съ ю.-ю.-з. на с.-с.-з. въ этомъ направленіи понижаются и прорѣзанныя ею горы, достигающія на ея правомъ берегу по видимому не болѣе 1200' н. Байкаломъ. Старый снѣгъ (3-го мая 1879 г.), лежавшій здѣсь еще столь мощною толщею, что всаднику, сидя на лошади, доводилось нерѣдко бороздить ногами по фирнообразной поверхности, не позволилъ Черскому спуститься внизъ по р. Половинной, чтобы осмотрѣть ея оригинально изогнутую долину (см. выше); онъ возвратился къ этому въ Олхинскую деревню, слѣдуя по западному склону того же отрога, черезъ Смоленскій ключикъ и внизъ по теченію упомянутой выше рч. Мольты. Уровень долины Олхи между устьями Ханчина и Безъимянной, опредѣленъ имъ 403' надъ Байкаломъ.

Описанный отрогъ, который Черскій называетъ Олхин-  
скимъ, отличается такимъ образомъ отъ Култукскаго нѣ-  
маленькою меньшею высотой отдѣльныхъ точекъ, но вмѣстѣ съ  
тѣмъ и незначительнымъ расчлененіемъ его, почти плоскаго  
полюсья, вслѣдствіе чего, вмѣсто многочисленныхъ, хотя и до-  
вольно тупыхъ возвышеній и вершинъ, выдающихся въ Кул-  
тукскомъ отрогѣ отъ 300 до 600' надъ уровнемъ долинъ,  
онъ представляетъ собственно лишь четыре главныхъ возвы-  
шенія: Хейско-Кукюртское (1253' н. Байк.), Смолен-  
ское (1676' н. Байк.), Шинихтинское (до 1400') и  
Половинное (до 1200' н. Байк.), раздѣленные углубле-  
ніями: Малиноваго озера, Смоленскаго ключика и р. Поло-  
винною.

Между послѣднею и р. Олхою мѣстность опять возвы-  
шается до болѣе 1600' н. Байк., представляя соединитель-  
ное звено Олхинскаго отрога съ Култукскимъ.  
Черскій пересѣкъ эту часть горъ по такъ называемой Да-  
вшаевской дорожкѣ. Тропа эта ведетъ сначала по  
склонамъ нѣсколькихъ долинокъ верховьевъ лѣвыхъ притоковъ  
Половинной и поварачиваетъ къ западу, мимо утеса Три  
Мешка (см. ниже), не поднимаясь выше 1553' н. Байк.,  
тѣмъ, черезъ розсыпь, носящую названіе Кареты, и  
доходя до Калтуса (1257'), въ котловину Мостки (1163'  
н. Байк.). Котловина эта, окружаясь округленными вершинами,  
достигающими до 1600' н. Байк. (3161' абс. высоты),  
сбрасываетъ свои воды уже въ Олху, какъ сказано выше, не-  
далеко отъ устья Средней Олхи и выше Порога, около ко-  
торого уровень Большой Олхи оказался равнымъ 891' н.  
Байк., слѣдовательно, почти на 892' надъ Олхинскою де-  
ревней.

Мѣстность на востокъ отъ меридіана Этапа на р. Половинной  
дохода р. Ангара изъ Байкала, т. е. восточная часть  
нашего треугольника, никѣмъ еще не пересѣ-  
на въ поперечномъ направленіи, и потому о ея рельефѣ



можно судить лишь по осмотру со стороны озера, Ангара и системы р. Курмы. Поляковъ первый обратилъ вниманіе на конфигурацію этой части горъ <sup>1)</sup>, во время плаванія совершеннаго имъ отъ села Лиственичнаго (около выхода Ангара) до Култука. Берегъ, говоритъ Поляковъ, во всѣхъ своихъ точкахъ одинаково возвышается надъ уровнемъ Байкала. Онъ полагалъ даже, что высота его составляетъ и то же время уровень всего сѣверо-западнаго плоскогорья, принимая подъ этимъ названіемъ плоскую возвышенность, окаймляющую интересующую насъ горную страну съ сѣверо-запада, къ тому же распространилъ это воззрѣніе и на западную часть горъ треугольника. Одна изъ береговыхъ вершинъ продолжаетъ Поляковъ, средняя по высотѣ между всѣми другими, лежащая въ 25 верстахъ къ западу отъ с. Лиственичнаго, около мыса Березоваго, дала высоту въ 2267' надъ океаномъ (т. е. 924' н. Байк., уровень котораго определялся въ то время въ 1343'). При этомъ онъ указываетъ, что цифра эта довольно близко подходитъ къ высотѣ Габовской станціи, считавшейся и тогда же по высотѣ 2770' н. ок., т. е. 1430' н. Байк. и Мотской горы (гривы?), высота которой опредѣлена была въ 2705', т. е. 1362' н. Байк. и что разница между этими цифрами можетъ зависѣть и отъ того, что точка на Березовомъ мысѣ не была высшимъ пунктомъ мыса. Взглядъ Полякова, оспаривавшій Венюковымъ, считавшимъ эту часть горъ хребтомъ <sup>2)</sup>, принятъ былъ впоследствии и Кропоткинымъ въ его Очеркѣ орографии Восточной Сибири (I. с.), съ тѣмъ однако различіемъ, что, рассматривая всю высокую часть описываемаго треугольника какъ форму одного орографическаго типа, онъ считалъ не плоскою возвышенностью, а частью высокаго плоскогорья.

---

<sup>1)</sup> Поляковъ, Отчетъ Сиб. Отд. И. Р. Геогр. Общ. за 1868 г., стр. 111.

<sup>2)</sup> Венюковъ, Изв. И. Р. Геогр. Общ. Сиб. Т. V, 1869, стр. 44.

предложенную здѣсь между предполагавшеюся имъ полоскою альпійскихъ цѣпей (см. ниже). Наконецъ, болѣе подробныя данныя для разъясненія этого вопроса, мы находимъ у Черскаго. Онъ говоритъ, что съ Толстаго мыса, ограничивающаго устье выхода Ангарты съ западной стороны, весьма удобно обозрѣвается весь отрѣзокъ береговыхъ горъ Байкала почти отъ самаго Култука съ мысами: Березовымъ, Шумихи, Половинной, Маритуй, Крутой губы и наконецъ Ангасольскимъ, за которымъ только и скрывается Култукъ. Видъ этотъ въ высшей степени поучителенъ въ томъ отношеніи, что вся восточная часть интересующихъ насъ горъ действительно является весьма типическимъ высокимъ плоскогорьемъ, обрѣзаннымъ къ Байкалу крутымъ склономъ, вслѣдствіе чего всѣ названные мысы въ профилѣ оказываются расовидными. Высота этого плоскогорья хотя повидимому и превышаетъ 1200' н. Байкаломъ, во всякомъ случаѣ достаточно отличается уже отъ плоской возвышенности, средняя высота высшей террасы которой равняется, какъ сказано выше (система Бѣлой и Кыта), всего лишь 159' н. Байк., даже высшіе пункты не превосходятъ уровня озера болѣе чѣмъ на 468'. Тотъ-же взглядъ съ Толстаго мыса обнаруживаетъ однако, что вдали, надъ Крутогубскимъ и Ангасольскимъ мысами рисуется болѣе высокая часть горъ съ выдающимися на ней двумя вершинами. Это очевидно Култукукъ и связанная съ нимъ южная часть Олхинскаго, слѣдовательно высшая часть этой мѣстности, которая, во всякомъ случаѣ, какъ объ этомъ свидѣлствуютъ данныя инструментальной нивелировки, почти настолько-же превышаетъ высоту плоской восточной части горъ, насколько послѣдняя превышаетъ собою плоскую возвышенность. Кромѣ того между Березовымъ мысомъ и долиною Пылочки наблюдается угловатая вершина, значительно нарушающая прямолинейность контура верхней поверхности плоскогорья, доказывая, что правильность этой поверхности можетъ нарушаться и въ

другихъ, невидимыхъ отсюда мѣстахъ, болѣе или менѣе обособленными возвышеніями почвы. Къ сожалѣнію однако Черскому не представилась возможность осмотрѣть эту часть горъ съ другихъ, болѣе высокихъ пунктовъ. Небольшая экскурсія и восхождение по долинѣ рч. Большаго Баранчука (см. ниже), лежащей между Толстымъ мысомъ и Ангарами, убѣдилъ его, что и здѣсь высота горъ должна превосходить 1000' н. Байк., но пунктъ этотъ, поросшій лѣсомъ, оказался неудобнымъ для обзорѣнія; что-же касается восточнаго угла этихъ горъ, примыкающаго непосредственно къ Ангари, то, по мѣрѣ приближенія къ послѣдней, онѣ понижаются до 700'—574 и даже 377' н. Байк., сливаясь только здѣсь именно съ уровнемъ плоской возвышенности и то лишь съ болѣе высокими ея точками.

Обозрѣвая рельефъ нашего треугольника на основаніи вышеприведенныхъ данныхъ, въ высокой его части слѣдуетъ отличать: во-первыхъ, отрѣзокъ хребта, расположенный между ущельемъ Иркуты и р. Половинною. Онъ составляетъ безспорное продолженіе Тункинской цепи горъ; сѣверный склонъ его расчленяется на два почти меридіональных отрога: Култукскій и Олхинскій, которые далеко выдвигаются къ сѣверу, занимая не нѣ трехъ четвертей длины и двѣ западныя трети ширины мѣстности. Восточный изъ этихъ двухъ отроговъ, т. е. Олхинскій, представляетъ уже до нѣкоторой степени какъ переходную форму къ болѣе низкому и плоскому типу горъ. На востокъ-же отъ этого отрога прибрежныя горы суживаются до того, что занимаютъ собою только южную треть, а на востокъ даже четверть меридіональной длины треугольника и принимаютъ уже видъ отрѣзка плоскогорья. Отрѣзокъ представляется такимъ образомъ террасовиднымъ относительно своихъ частей Олхинскаго и Култукскаго отроговъ, т. е. сѣвернаго восточнаго продолженія прерванной имъ Тункинской цепи, играя роль какъ бы длиннаго, террасовиднаго мыса

дущаго отъ названной цѣпи къ востоку, къ Ангартъ, видѣраясь между Байкаломъ и плоскою возвышенностью. Главный интересъ этой террасовидной оконечности состоитъ однако въ томъ, что часть ея верхней поверхности, хотя и сѣуженная, окаймляетъ собою и южный, т. е. Байкальскій склонъ самого хребта, продолжаясь и до Ангасольскаго мыса включительно, слѣдовательно до того именно пункта, въ которомъ почти теряется восточный конецъ знакомой намъ уже высокой террасы лѣваго берега р. Култучной, прерванный долиною рч. Мыдьянки, спадающей въ сѣверный уголъ юго-западной оконечности озера. Такая связь этихъ террасовидныхъ поверхностей указываетъ на сомнѣнію Черскаго, на то, что воды, которымъ обязана своимъ происхожденіемъ высшая терраса Ильчинско-Култукской долины, распространяющаяся и на горы, окружающія оконечность озера до праваго берега долины Слюдянки включительно, могли покрывать собою и только-что описанную, восточную часть сѣверныхъ прибрежныхъ горъ <sup>1)</sup>. Окончательное рѣшеніе этого вопроса, въ смыслѣ степени и границъ такого заключенія, предстоитъ разумѣется еще будущему, въ настоящее же время нельзя не замѣтить, что правдоподобности такого явленія не противурѣчаютъ ни строеніе этихъ горъ (см. выше), ни неполное совпаденіе барометрическихъ цифръ вышесказанныхъ, определенныхъ для Култукской террасы (928' н. Байк.) съ продолженіемъ отъ Ангасольскаго мыса къ Ангартъ (около 1000' н. Байк.), такъ какъ первая изъ цифръ означаетъ только уровень высшаго изъ найденныхъ Черскимъ уступовъ этой террасы. Между тѣмъ, за этимъ уступомъ начинается еще нѣсколькими довольно пологій подъемъ на ограничивающій террасу склонъ высшихъ горъ, никакъ не указывающій на вертикальные предѣлы, до которыхъ могла здѣсь еще достигать вода, жившая на террасѣ описанныя выше грядки валуновъ и галекъ, а слоистые пески, которые мы изучили нѣсколько западнѣе устья р.р. Быстрыхъ, залегаютъ уже значительно выше

<sup>1)</sup> Черскій, Рукописныя замѣтки о Сибири.

этихъ валунныхъ грядокъ (1103' н. Байк.). Сказанное относится равнымъ образомъ и къ явленіямъ, съ которыми мы ознакомимся въ долині Мыллянки, теперь-же, для дополненія свѣдѣній нашихъ о рельефѣ сѣверо-восточной части треугольника, обратимся къ маршруту Черскаго въ системахъ р. Кан и Курмы. Изъ знакомой намъ уже Олхинской деревни онъ направился къ юго-востоку черезъ водораздѣлъ, отдѣляющій р. Олху отъ р. Кан. Водораздѣлъ этотъ около сѣверной оконечности Олхинскаго отрога достигаетъ 577' н. Байк.; съ него тропа спускается въ долину верховьевъ рч. Кан, берущей начало верстахъ въ 16—17 отъ устья въ Иркутъ и около 5 верстъ отъ Олхинской деревни. Источники этой рѣчки располагаются на днѣ значительнаго расширенія долины, на высотѣ 442' н. Байк. и состоятъ изъ двухъ, близкихъ другъ отъ друга, подземныхъ, незамерзающихъ зимой ключей, и третьяго, средняго, вытекающаго изъ упомянутой выше Кривой пади. Отсюда тропа слѣдуетъ къ востоку въ долину, извѣстную подъ именемъ Волчья голова, поднимается на болѣе высокую часть мѣстности, достигающую 774' н. Байк., и переходитъ къ юго-востоку въ долину Долга падь, принадлежащую уже системѣ рч. Хей, лѣвой вѣтви Курмы. Хей пересѣкается тропкою на высотѣ 442' н. Байк. послѣ чего слѣдуетъ перевалъ (809' н. Байк.) въ долину Смородинную, принадлежащую той-же Хей и лежащую на высотѣ 442' н. Байк. Наконецъ, спустя еще два перевала, изъ которыхъ первый (къ правой вѣтви той-же Хей) превышаетъ 592', а второй 735' н. Байк., Черскій спустился въ Черемховой долині на рѣчку Шинихту (407' н. Байк.) а по ней на Курму до устья въ Ангарту. Изъ всѣхъ приведенныхъ выше высотъ этого маршрута очевидно, что Черскій пересѣкалъ здѣсь полосу, переходную между террасовидною восточною частью горъ нашего треугольника и примыкающей къ ней съ сѣверо-восточной стороны, начиная почти съ лѣваго берега долины р. Хей, а также по всѣмъ низовьямъ Ку-

Вся высокая часть описываемаго треугольника, какъ равно и нѣкоторая, въ особенности центральная часть плоской возвышенности, покрыта густымъ, почти дѣвственнымъ лѣсомъ, преимущественно лиственничнымъ (Larix), хотя высота мѣстности и не выходитъ за предѣлы вертикальнаго распространения бѣлой березы, попадающей въ одиночныхъ экземплярахъ на различныхъ высотахъ хребта и его отроговъ. Култукскій отрогъ, впрочемъ въ сторонѣ отъ почтовой дороги (между нею и Иркутомъ), богатъ и кедровникомъ, орѣхи котораго собираются жителями какъ Култука, такъ и другихъ упоминавшихся деревень. Въ болѣе низкихъ мѣстахъ произрастаетъ и сосна. Лѣса эти рѣдѣютъ, нерѣдко и вовсе исчезаютъ уже по окраинамъ плоской возвышенности и по низовьямъ всѣхъ упомянутыхъ болѣе значительныхъ ея рѣкъ, такъ какъ они вырубаются жителями, сплавающими бревна и дрова въ Иркутскъ, а во многихъ мѣстахъ уступаютъ мѣсто папнямъ, сѣновоснымъ лугамъ и березникамъ. Той-же участи подвергаются и многія мѣста склона этихъ горъ къ Байкалу, такъ какъ на нихъ вырубаютъ строительный лѣсъ не только Култукскіе и Лиственниченскіе, но даже и Тункинскіе крестьяне для доставки въ городъ, хотя эта работа сопряжена здѣсь съ немалыми затрудненіями. Не легко во-первыхъ спустить срубленное дерево съ горныхъ скатовъ на воду: для этого выбираютъ по возможности болѣе равномерный хотя и крутой склонъ или долину, съ котораго или по которой и спускаютъ бревно, иногда раскалывающееся при паденіи. Еще труднѣе иногда сплотить плотъ на водахъ Байкала, такъ какъ волненіе разбиваетъ самыя крѣпкія связи въ плотяхъ. Поляковъ (1. с.) видѣлъ крестьянъ (4-хъ), которые въ продолженіи четырехъ мѣсяцевъ спустили только 200 шт. лѣсинъ, но не нашли еще возможности связать ихъ такъ, чтобы не разбило волнами; болѣе опытные однако заготавливаютъ обыкновенно лѣсъ еще до вскрытія озера, а затѣмъ въ маѣ, вслѣдъ за льдомъ, плывутъ чтобы сплотить его и сплавить, пользуясь обыкновенно

восточному склону южной, распространяясь до линии, которую мы отдѣлили высокую часть треугольника отъ плоской возвышенности (Введенская и Олхинская деревни, верховья Кан, Шинихты и рч. Ланка), и выклинивается по направленію къ Ангарту. Полоса эта обнимаетъ собою такимъ образомъ только сѣверныя конечныя части Култукскаго и Олхинскаго отроговъ (въ области Еловаго хребта) и состоитъ изъ породъ и сланцевъ эквивалентныхъ развитымъ напр. около Нижнеудинской пещеры и по низовьямъ Китоа, слѣдовательно древнѣе девонскихъ (силурійскихъ или гуронскихъ согласно Черскому<sup>1)</sup>), именно, изъ сѣровакковаго сланца, кварцита, краснаго песчаника и покрывающаго его известняка. Наконецъ, плоская возвышенность, въ предѣлахъ треугольника, образуется юрскими прѣсноводными осадками, слѣдовательно, продолженіемъ тѣхъ же отложеній, съ которыми мы встрѣчались въ низовьяхъ р.р. Уды, Оки, Бѣлой, Китоа и Иркуты. Такъ какъ кромѣ этихъ общихъ свѣдѣній, изслѣдованія Черскаго даютъ еще нѣкоторыя небезынтересныя для насъ данныя, касающіяся вопроса о происхожденіи современной конфигураціи этихъ горъ и т. п., поэтому, не вникая въ петрографическія подробности, передаваемые въ его отчетахъ, считаемъ не лишнимъ заимствовать нѣкоторыя частности, имѣющія болѣе общій интересъ, распредѣляя ихъ по направленіямъ указанныхъ выше маршрутовъ, въ особенности потому, что знакомство съ этими частностями послужитъ намъ для болѣе сознательнаго взгляда на нѣкоторые выводы, съ которыми ознакомимся впослѣдствіи. Такимъ образомъ, пересѣкая мѣстность по почтовой дорогѣ, мы видимъ, что глыбы изверженной породы низовьевъ Мыдьянки, называемой Чекановскимъ долеритомъ, попадаютъ и на 3-й верстѣ отъ с. Култука, уже на склонахъ горы Култучной, которая, впрочемъ состоитъ изъ ро-

---

<sup>1)</sup> Черскій, О результатахъ изслѣдованія озера Байкала съ геол. картою.

роговообманковаго гнейса, падающаго на ю.-ю.-з. до ю.-з. подъ угломъ въ  $45^{\circ}$ , слѣдовательно также какъ и по Иркуту. На 4-й верстѣ подъема на ту-же гору, на высотѣ около 1128' н. Байк., около дороги можно видѣть, затѣмъ, весьма интересное явленіе, состоящее въ томъ, что нѣкоторыя изъ большихъ гнейсовыхъ глыбъ отличаются такимъ же оглаженнымъ и отчасти округленнымъ состояніемъ, какое свойственно каменнымъ массамъ, подвергавшимся дѣйствию прибою морскихъ или озерныхъ волнъ. Такъ какъ глыбы эти располагаются такъ сказать на линіи продолженія вышей террасы долины Култучной, хотя и нѣсколько выше найденныхъ на послѣдней грядкѣ валуновъ, поэтому Черскій приписываетъ это явленіе дѣйствию тѣхъ же силъ, которыя затопляли и Ильчинско-Култукскую долину. Такихъ глыбъ могло быть здѣсь гораздо большее количество, но положеніе почтовой дороги, сопровождавшееся въ этомъ мѣстѣ еще взрывами большихъ камней порохомъ, должно было убавить ихъ значительно и измѣнить ихъ первоначальное, болѣе правильное положеніе. Весьма интересны также и нѣкоторыя особенности конфигураціи, замѣчаемыя на первыхъ 10 верстахъ за Глубоковскою станціею. Уже на первой верстѣ за станціею, на подъемѣ на ближайшую гору, на правой сторонѣ дороги, располагаются низкіе бугры въ нѣсколько метровъ длиною; одинъ изъ нихъ принимаетъ валообразную форму вытягиваясь съ сѣвера на югъ. Исследование ихъ показало однако, что они состоятъ изъ коренной породы (роговообманковаго гнейса), мѣстами растресканнаго и превращеннаго въ розсыпь. Вообще такіе-же бугры можно встрѣтить около дороги еще на второй верстѣ и на шестой, гдѣ встрѣчается, входящій въ составъ этого бугра обнаруживаетъ ясное положеніе пластовъ на ю.-з.  $15^{\circ}$ , а затѣмъ къ концу девятой и самомъ началѣ десятой версты. Но тутъ-же (почти на половинѣ 10-й версты), въ противоположность упомянутымъ выше, буграмъ, по правой сторонѣ дороги наблюдается довольно высокій и уединенный утесъ Камень, давшій назва-



каютъ по дорогѣ въ видѣ ручейковъ, обремененныхъ передвижаемыми ими продуктами разрушенія и выполняютъ такую полужидкою массою всѣ встрѣчающіяся на пути углубленія. Къ подобнымъ же заключеніямъ приводятъ и верховья Подкаменной долины, хотя она представляетъ и нѣкоторыя особенности: ограничиваясь съ лѣвой стороны Камнемъ, а съ правой, кромѣ общаго хотя и пологого повышенія мѣстности, еще упомянутымъ выше бугромъ въ самомъ началѣ 10-й версты, долина эта вполне открыта къ западу, т. е. къ почтовой дорогѣ, на лѣвой сторонѣ которой поверхность представляетъ уже противоположный наклонъ, къ долинѣ, принадлежащей правымъ притокамъ Иркуты (Малой Зазарѣ?). Очевидно по этому, что здѣсь имѣло мѣсто извѣстное въ природѣ соединеніе верховьевъ двухъ долинъ почти діаметральныхъ противоположныхъ направленій (въ р. Олху и ущелье Иркуты),—явленіе, достигаемое размывомъ гребня, раздѣлявшата эти верховья. Въ настоящемъ случаѣ процессъ этого разрушенія является настолько полнымъ, что на мѣстѣ бывшихъ гребней, придававшихъ въ извѣстное время очевидно альпійскую конфигурацію мѣстности, разтѣзжаютъ нынѣ почтовые тройками, обращая любопытные взоры на возвышающійся сторонѣ отъ дороги мрачный утесъ Камень <sup>1)</sup>. Наконецъ, спускъ съ горы Осиновой къ Мотской низменности, дороги усыпанной обломками гнейса, входящаго въ составъ этой горы и переходящаго мѣстами въ такъ называемый очивый гнейсъ, можно видѣть уже въ нѣкоторомъ отдаленіи утеса, называемый Красный камень. Утесъ этотъ располагается на правомъ берегу долины Каторжанки, впадающей въ рч. Нижнія Моты съ правой стороны, и состоитъ уже изъ краснаго песчаника, точно также, какъ знакомая намъ гора Шаманка, лежащая почти насупротивъ его, на лѣвомъ берегу Иркуты (см. выше). Вверхъ по долинѣ той-же Каторжанки

<sup>1)</sup> Черскій, Рукописныя замѣтки о Сибири.

на правомъ берегу, слѣдовательно въ нѣсколькихъ верстахъ восточнѣе отъ почтовой дороги, находится и такъ называемый Баторжанскій Камень, въ которомъ крутопадающіе пласты гнейса выступаютъ изъ подъ краснаго песчаника, осыпавшаго ихъ очевидно несогласно <sup>1)</sup>. Что-же касается южной части тракта до Иркутска, то въ предѣлахъ Еловинскаго хребта дорога пересѣкаетъ сначала продолженіе краснаго песчаника Краснаго Камня, затѣмъ вступаетъ на известнякъ, а за Введенскою, пролегаетъ по песчаной почвѣ долины Иркуты, а затѣмъ Каи, проложенныхъ въ пластахъ песчаника юрской эпохи, изъ котораго возвышаются и Кайская гора.

Южно такъ-же изъ частныхъ, передаваемыхъ Черскимъ описаній его маршрутовъ по системѣ р.р. Олхи и Половинной, достойны замѣчанія нѣкоторые наблюденія пути черезъ водораздѣлъ между названными рѣками. Въ предѣлахъ, гдѣ тропа, поворачивая южнѣе Смоленскаго ключа въ верховьяхъ Олхи, пересѣкаетъ нѣкоторые ключи лѣваго притока Половинной, впадающихъ выше Этапа, мы нашли уже объ утесѣ, извѣстномъ подъ названіемъ Тришанка. Это разрушенная и осыпавшаяся, уединенная скала, состоящая изъ сіенито-гранита, часть котораго обладала совершенно развитою, сферическою, отчасти эллипсоидальною формою. Разрушеніе скалы совершилось такимъ образомъ, что отъ нея уцѣлѣли четыре, болѣе или менѣе эллипсоидныя глыбы, лежащія другъ на другѣ такимъ образомъ, что между ними, достигающіе нѣсколькихъ кубическихъ аршинъ, остаются въ восходящемъ направленіи. Верхнюю изъ этихъ глыбъ, проѣзжавшимъ здѣсь промышленникамъ удалось сбросить для забавы, тогда какъ остальные три, лежащія на скалистомъ пьедесталѣ, сохранились и до настоящаго времени. Но всего болѣе интересною является безспорно

---

<sup>1)</sup> Черскій, Отчетъ за 1877 г. Изв. Сиб. Отд. Т. IX, № 1 и 2.

котловина Мостки (1163' н. Байк.), принадлежащая, как сказано выше, системѣ р. Олхи. Котловина эта, имѣющая около 3 версты въ длину, считая съ востока на западъ, болѣе версты въ ширину, располагается среди высшихъ чекъ южной части Олхинскаго отрога, состоящихъ изъ сѣніто-гранита, порфировиднаго отъ крупныхъ (до 20 м) таблицъ полеваго шпата. Отдѣляясь съ востока невысокимъ (1553' н. Байк., 390' надъ дномъ котловины) переваломъ системы водъ р. Половинной, она открывается къ западу, долину Олхи, въ которую впадаетъ и ручей, собирающій воду изъ болотистаго дна котловины. Склоны ея, какъ равнины нѣсколькихъ долинъ, открывающихся въ котловину какъ съ сѣверной, такъ и съ южной стороны, вообще довольно пологі, почти совершенно поростають мхомъ и лѣсомъ и показаются террасовидно, обнаруживая, напр. около сѣвернаго берега, громадныя, иногда нагроможденныя другъ на друга оглаженныя глыбы сѣніто-гранита. Ближайшій осмотръ этихъ глыбъ заставляетъ смотрѣть на нихъ какъ на розсыпь мелкихъ листовъ котловины, оглаженную волненіемъ озерной воды, наполнявшей прежде этотъ бассейнъ и оставившей террасовидныя уступы до высоты 288' надъ дномъ бассейна, и такія-же оглаженныя глыбы находились также и на высотѣ 386' на утесистомъ отрогѣ сѣверныхъ горъ, направляющійся къ Олхѣ и образующемъ суженіе русла послѣдней и порожистое, о которомъ сказано было выше. Дно котловины является въ видѣ болотистой и кочковатой тундры, по которой разсѣяны тонкія и остросереберныя плитки бураго угля, найденныя въ одномъ мѣстѣ около сѣвернаго берега и подъ растительнымъ покровомъ, но въ видѣ такихъ же разсѣянныхъ плитокъ. Такія-же плитки угля попадаются и въ руслѣ значительнаго ручейка, берущаго начало въ долину сѣвернаго склона и протекающаго по почвѣ изъ довольно яркой, блѣдно-охристо-желтой глины. Такой образъ нахождения угля приводитъ Черскаго къ заключенію, что минералъ этотъ яв-

образовалъ собою пласть, обнаженный въ послѣдствіи размывъ и подмытъ, въ слѣдствіе чего онъ подвергся осыданію и разбился въ куски. Что-же касается состава пластовъ, которыхъ онъ принадлежалъ, то съ ними можно ознакомиться въ развѣ путемъ раскопки, такъ какъ въ слѣдствіе поверхностнаго теченія ручейка, прорѣзывающаго только растительный покровъ, онъ не даетъ здѣсь никакихъ обнаженій. Впрочемъ, подробное изслѣдованіе нѣмъ еще не посѣщенной западной части котловины и верховьевъ Олхи (выше порога) не можетъ доставить болѣе данныхъ относительно этихъ пластовъ, относимыхъ Черскимъ (предположительно) къ третичной эпохѣ, по сравненію ихъ съ такими-же, развитыми на восточномъ берегу Байкала (см. ниже). Черскій не могъ принять болѣе подробнаго изслѣдованія этого вопроса, такъ какъ еще въ системѣ Половинной лошадь его заболѣла и начала ложиться, а въ котловинѣ, куда путешественники были только къ ночи, она уже и не вставала. На слѣдующій день они воспользовались случаемъ кое-какъ увести её изъ котловины, гдѣ вовсе не было еще травы (20 мая 1879 г.) На слѣдующій день прошли пѣшкомъ, спускаясь внизъ по р. Олхѣ. Во всякомъ случаѣ, нахожденіе угленосныхъ осадковъ въ данной котловинѣ имѣетъ важное значеніе, какъ фактъ, говорящій на соотвѣтственную древность образованія долины системы р. Олхи; будущимъ изслѣдователямъ предстоитъ отъ того рѣшить вопросъ и объ отношеніи водъ, вытекающихъ эту котловину, къ долинѣ Половинной и къ Бай-

О строеніи горъ въ системѣ средней и нижней частей теченія р. Олхи знакомятъ насъ три главныхъ группы Черскаго <sup>1)</sup>.

Первый изъ нихъ, считая съ запада къ востоку, ведетъ

---

<sup>1)</sup> Черскій, Изв. I. с.; Отчетъ за 1869 г. и Рукописныя замѣтки о

изъ знакомой намъ котловины Мостки, придерживаясь все болѣе горъ лѣваго берега Олхи. Хотя одинъ изъ небольшихъ правыхъ притоковъ рѣки, впадающихъ ниже Смоленскаго ключика, именно Гончураева падь, вноситъ уже кусъ блѣднокраснаго, мелкозернистаго кварцита, указывая на близость начала развитія породъ, причисляемыхъ Черскимъ къ нижнесилурійской (или гуронской) эпохѣ, тѣмъ не менѣе склоны долины Олхи состоятъ здѣсь еще изъ гранитовидныхъ образований лаврентьевской системы, съ сѣвѣрною границею которой, по этой рѣкѣ, путешественникъ встрѣчается лишь въ пяти верстахъ ниже устья Смоленскаго ключика, на перевалѣ съ лѣваго берега Олхи (ниже Каменнаго брода) долину рч. Фонталки (см. выше). Тутъ попадаются кусъ аспидносѣраго и аспидночернаго кварцита и такого же кристаллическаго сланца, причемъ найденъ обломокъ кварцита, указывающій на то, что онъ произошелъ отъ метаморфизма углистаго известняка, обладавшаго оолитовымъ строеніемъ (икряный камень). Строеніе это является здѣсь однако не измѣненнымъ, что только представшая впослѣдствіи возможность изученія цѣлаго ряда переходовъ отъ типическаго оолита къ такимъ, гдѣ вмѣсто конкрецій остались только плоскія и удлиненныя пластинчатыя формы съ блестящею поверхностью, позволила разоблачить значеніе и генезисъ этой оригинальной породы <sup>1)</sup>. Въ самой долинѣ Фонталки гдѣ ея пересѣкаетъ тропа, какъ равно и на перевалѣ съ низовьевъ на рч. Безъимянную (лѣв. притокъ Олхи, см. выше) изъ подъ растительнаго слоя выдаются кусъ плитки буровато-сѣрыхъ и темно-сѣрыхъ видоизмѣненій кварцита, причемъ на спускѣ въ названную долину появляются песчаникъ и краснаго цвѣта, какъ мотскій по р. Ирпе. Слѣдуя внизъ по Безъимянной, на лѣвомъ берегу долины въ склонѣ горъ обнажается однако темный, зеленовато-

---

<sup>1)</sup> Черскій, Изв. I. с.; Отчетъ за 1880 годъ.

песчаникъ, въ состояніи переходномъ къ глинистому сланцу, мелкозернистый съ блестками серебристой слюды. Массы этой породы, вполне тождественной съ нѣкоторыми измѣненіями сланцевъ, съ которыми мы встрѣтимся въ востокѣ Онотскомъ на востокъ отъ р. Ангары, замѣтно падаютъ на с.-с.-з. Они должны къ тому же покрываться краснымъ песчаникомъ, такъ какъ, если съ долины Олхи (куда ведетъ тропа съ Безымянной) повернуть вверхъ по слѣдующей долинѣ, занятой рч. Ханчѣнъ или Ханшѣнъ, то около устья въ нее Сухой пѣди (лѣвая вѣтвь Ханчина на 4 верстахъ отъ почтоваго тракта) красный песчаникъ, выходящій сюда непосредственно съ системы рѣчекъ Моты и Иркуты, точно также падаетъ на с.-с.-з., при чемъ онъ прорывается здѣсь весьма отчетливо известнякомъ. Эта породная порода образуетъ собою верхній членъ всей толщи древнихъ сланцевъ и названа Черскимъ верхнимъ известнякомъ, въ отличіе отъ другихъ ярусовъ его, съ которыми мы ознакомимся въ восточномъ продолженіи Онотскаго рѣчья; въ видѣ кусковъ и отдѣльныхъ глыбъ известнякъ попадается по всему поросшему склону лѣваго берега долины Олхи, до выхода ея на плоскую возвышенность около устья Олхинской.

Второй изъ маршрутовъ Черскаго, ведущій съ р. Полоной (Этапъ см. выше) черезъ верхнюю часть теченія Юленскаго ключика и рч. Мольту въ долину Олхи, по западному склону Олхинскаго, отрога а заходя по правому берегу Олхи, отодвигаетъ границу лаврентьевской породы еще болѣе къ югу. Уже на правомъ берегу Смоленскаго ключика обнажается осыпанный впрочемъ глинистый сланецъ оливково-желтаго цвѣта, похожій на Онотскій и описанный нами въ первой части около Нижнеудинскихъ пещеръ. Онъ залегаетъ здѣсь на сіенито-гранитѣ; далѣе, отдораздѣляя между названною долиною и верховьями рч. Олхи (прав. притокъ Олхи, см. выше), и до лѣваго берега

долины послѣдней, изъ подъ растительнаго покрова выдаются только куски песчаника, нерѣдко кварцитовиднаго, какъ красного, такъ и красновато-желтаго цвѣта, хотя маршрутъ, пролежавшій въ 4—5 верстахъ восточнѣе этого мѣста, указываетъ, какъ мы увидимъ ниже, что среди песчаника этого залегаетъ еще пропластокъ аспидно-чернаго, кристаллическаго известняка. Нижняя часть долины ключа Мольты проложена почти на самой границѣ между краснымъ песчаникомъ, переходящимъ сюда со стороны упомянутыхъ выше долинъ Безымянной и Ханчина, слѣдовательно и со стороны Иркута. Ниже устья Мольты и до ближайшихъ окрестностей устья Кукюрта, въ склонѣ праваго берега долины Олхи обнажается верхній известнякъ; впрочемъ въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ слоистость замѣтна, пласты его лежатъ повидимому совершенно горизонтально. Обстоятельство это Черскій объясняетъ тѣмъ, что мы имѣемъ здѣсь дѣло съ осевою частью такъ называемой синклинальной складки, соотвѣтствуя такой же, но болѣе пологой складкѣ по Иркуту, ниже Мольты, и что, какъ въ сторону Мольты, такъ и Кукюрта, пласты этой породы должны подыматься кверху. И дѣйствительно, около устья Кукюрта въ утесахъ появляется неясно слоистый, впрочемъ бѣлый и перлово-сѣрый кварцитъ, подчиненный красному песчанику, залегающему подъ известнякомъ, а на осыпи наблюдается и красный песчаникъ, соотвѣтствуя кому же второму выходу по Иркуту, причемъ въ небольшихъ выступахъ замѣчается далѣе и сѣверный наклонъ ея на востокъ. Наконецъ, начиная съ долинки Кочневой, склоны горъ состоятъ опять изъ того же известняка и продолжаютъ такъ до деревни Олхинской, т. е. до начала плоской возвышенности, гдѣ уже развитъ юрскій песчаникъ, какъ и по Иркуту.

Чтоже касается третьяго маршрута, то онъ проходитъ почти черезъ ту же точку (нѣсколько восточнѣе) долины Иденскаго ключика, но оттуда отворачиваетъ вдоль

высокой водораздѣльной части Олхинскаго отрога до его сѣверной оконечности (около той же Олхинской деревни). Изъ этого маршрута мы заимствовали приведенныя выше топографическія данныя; между тѣмъ какъ въ геогностическомъ отношеніи онъ доказываетъ, что породы, пересѣченныя даннымъ маршрутомъ, продолжаются въ той же послѣдовательности къ сѣверо-востоку, а на высшемъ пунктѣ тропы пересѣкаетъ узкую впрочемъ полосу чернаго, мелкозернистаго, мучяго известняка, о которомъ мы упомянули выше.

Небольшая деревня Олхинская <sup>1)</sup> располагается на лѣвомъ (отчасти и на правомъ) берегу соименной рѣки, при впадѣніи ея изъ горъ на плоскую возвышенность; главное занятіе жителей хлѣбопашество, къ которому они присоединяютъ еще звѣринный промыселъ. Въ большую воду нѣкоторые изъ нихъ занимаются кромѣ того и сплавкою строительнаго лѣса, что впрочемъ сопряжено съ значительными затрудненіями вслѣдствіе маловодности Олхи. Для этого срубленный лѣсъ спускаютъ отдѣльными бревнами въ рѣку, позвѣсивъ имъ плыть въ такомъ видѣ до самаго устья Олхи въ Иркутскѣ, гдѣ рѣка загоразивается съ поверхности цѣпью плавучихъ другъ съ другомъ жердей, способныхъ задерживать плывшія къ ней бревна. Многія изъ послѣднихъ, на пути къ устью, задерживаются извилинами рѣки и прибываютъ къ берегу, вслѣдствіе чего снаряжается еще нѣсколько человекъ, обязанности которыхъ лежитъ осмотръ рѣки и отталкиваніе лѣса отъ берега. Собранный такимъ образомъ лѣсъ сплоченъ уже на устьѣ Олхи (въ деревнѣ Смоленской) и сплавленъ по Иркуту въ Иркутскъ. Олхинскимъ крестьянамъ принадлежитъ также и каменоломня, находящаяся вблизи деревни, на лѣвомъ берегу рѣки. Здѣсь добываютъ и обжигаютъ известнякъ, употребляя его для цемента, такъ какъ порода эта согласно химическому анализу Шамарина и Маюрова <sup>2)</sup>,

<sup>1)</sup> Свидѣнія объ этой деревнѣ см. Ч. I, стр. 149.

<sup>2)</sup> Изв. Сиб. Отд. Т. VIII, № 3 и 4, стр. 144.



содержитъ столь значительную примѣсь глины и магнезій, что её можно бы назвать мергелевымъ доломитомъ или горько-земисто-мергелевымъ известнякомъ.

Отъ деревни Олхинской можно считать начало нижняго теченія р. Олхи. Этотъ незначительный отрѣзокъ (до 6 верстъ) посѣщенъ Чекановскимъ, проѣхавшимъ отъ д. Олхинской до Смоленской, т. е. до Иркута, по правому берегу долины Олхи. Какъ видно изъ его геогностической карты на которой означенъ этотъ маршрутъ, юрскій песчаникъ сопровождаетъ эту долину почти до ея устья, тогда какъ на лѣвому берегу долины тѣ же осадки продолжаются только на 5 верстъ ниже Олхинской деревни, послѣ чего смѣняются наносною низменностью, связывающею низовье Олхи съ долиною Иркута. На правомъ берегу Олхи около ея устья можно видѣть хорошій разрѣзъ наносныхъ осадковъ, состоящихъ изъ довольно мощнаго слоисто-песчанаго отложенія покрытаго лёссовиднымъ суглинкомъ.

Изъ той же Олхинской деревни Черскій вышелъ и въ систему р. Курмы, внизъ по которой онъ спустился на лѣвому берегу р. Ангара, въ разстояніи 32 верстъ отъ Байкала. На этомъ пути сначала пересѣкается узкая оконечность Олхинскаго отрога, отдѣляющая р. Олху отъ верховья р. Каи. Известнякъ, слагающій эту оконечность, наблюдается еще и около слиянія источниковъ р. Каи, изъ которыхъ только средній, всего болѣе удаленный къ югу, вытекая въ такъ называемой Кривой падѣ, вѣдряется уже въ область развитія краснаго песчаника, тогда какъ вся остальная часть долины Каи, до впаденія ея въ Иркутъ, проложена уже юрскомъ песчаникомъ. Тотъ же песчаникъ встрѣченъ Черскимъ и по всему остальному протяженію этой тропы начиная отъ Каи, т. е. по р. Хей, въ низовьяхъ Шинихты и по Курмѣ до Ангара, а юго-восточное направленіе этого маршрута убѣждаетъ, что болѣе древніе осадки, входящіе въ составъ Олхинскаго отрога, прерываются здѣсь по линіи, почти

пендикулярной къ ихъ простиранию и замѣняются юрскими отложениями. Къ сожалѣнію Черскій не могъ достать въ то время проводника, знакомаго съ системою Шинихты, одна изъ вѣтвей которой, извѣстная подъ именемъ Дабатъ, должна, какъ говорятъ, отличаться весьма утесистою долиною. Почти также ему не удалось посѣтить и рѣчки Олы, праваго притока низовьевъ Курмы, протекающаго почти параллельно р. Ангартъ. Въ руслѣ устья Олы онъ видѣлъ однако массу полевошпатоваго порфира, столь же характеристичную, какъ мы увидимъ ниже, для юрскаго конгломерата юго Байкала, а около самаго устья Олы, въ правомъ берегу Курмы, замѣчаются и флечы буроугольного въ юрскомъ пластанкѣ.

Вышеизложеннымъ исчерпываются свѣдѣнія, имѣющіяся въ особенностяхъ площади, занятой интересующимъ насъ треугольникомъ; поэтому мы перейдемъ къ изложенію данныхъ, относящихся во первыхъ къ южной границѣ этой площади, т. е. къ омывающей её части Байкала, а въ послѣдствіи послѣдимъ теченіе р. Ангарты (до устья въ нее Иркутка), къ долины, ограничивающей нашъ треугольникъ съ востока.

Берегъ Байкала отъ с. Култука до истока р. Ангарты.

Плаваніе отъ юго-западной оконечности Байкала до истока Ангарты, вдоль сѣвернаго берега этой части озера, совершили только: Меглицкій (1852 г.), Поляковъ (1867 г.) и Черскій (1879 г.), какъ это видно и изъ приложеннаго выше перечня главнѣйшихъ литературныхъ источниковъ. Такъ какъ Меглицкій передаетъ въ своемъ отчетѣ однѣ лишь геогностическія данныя и то лишь въ самыхъ общихъ чертахъ, то по нему, заимствовавъ отъ Полякова передаваемые имъ краткія графическія свѣдѣнія, мы будемъ придерживаться описанія Черскаго, подробно изслѣдовавшаго прибрежье Байкала.

По наблюденіямъ этого путешественника, интересующая

насъ часть берега Байкала направляется въ общемъ на в.-с.-в. и достигаетъ всего лишь 75 верстъ (а считая по всѣмъ извилинамъ 80 верстъ) въ длину, а не 90, какъ это считалось нѣкоторыми путешественниками (Поляковъ) и мѣстными жителями. Кромѣ того, въ противоположность картѣ Шварца, на которой береговая линія озера на этомъ протяженіи образуетъ болѣе шести бухтъ, глубоко вдающихся въ материкъ, въ дѣйствительности берегъ представляетъ здѣсь настолько мало извилинъ, что, напр. въ масштабѣ 40 верстъ въ дюймѣ, онъ принимаетъ почти прямолинейное очертаніе, обнаруживая лишь двѣ главные выемки: одну западную, большую (до 50 верстъ въ хордѣ), но очень плоскую, ограниченную съ запада Ангасольскимъ, а съ востока Толстымъ мысомъ, и другую, значительно меньшую, но болѣе глубоко врѣзанную въ сторону истока Ангары. Въ предѣлахъ этихъ двухъ главныхъ выемокъ, въ особенности западной, располагается много второстепенныхъ, небольшихъ и вообще плоскихъ бухточекъ, обуславливающихъ волнообразный изгибъ береговой линіи. Обращенный къ Байкалу склонъ горы, по замѣчанію Полякова, имѣетъ видъ стѣны, во многихъ мѣстахъ разрушающейся, образующей крутые скаты, разрывной расщелинами и бороздами вообще весьма узкими; въ другихъ же мѣстахъ склонъ этотъ поднимается почти вертикально надъ водами озера, или же на немъ торчатъ утесы въ формѣ колоколенъ и башенъ, причемъ подножіе его располагается настолько близко отъ воды, что около берега нѣтъ непрерывной тропы ни для лошади, ни для пѣшехода, вслѣдствіе чего между Култукомъ и с. Лиственичнымъ (около истока р. Ангары) лѣтомъ сообщаются лишь въ лодкахъ, зимою по льду замерзшаго Байкала. Поляковъ обращаетъ также вниманіе на короткость и значительный наклонъ устьевъ долинъ, пересѣкающихъ этотъ склонъ, такъ-что рѣчка въ собственномъ смыслѣ можно назвать только Половинка, кромѣ которой онъ упоминаетъ еще: Харбатуй, Ангасоль.

Чиринтуй, Пыловку и Баранчукъ. Хотя склонъ этотъ представляетъ не мало обнаженныхъ утесовъ, тѣмъ не менѣе, сравнительно со многими другими частями сѣверо-западнаго и юго-восточнаго береговъ озера его, по замѣчанію Черскаго, нельзя еще назвать скалистымъ, такъ какъ обнаженія всего чаще встрѣчаются лишь ближе къ основанію склона, поросшаго обыкновенно или лѣсомъ, или травой; въ послѣднемъ случаѣ склонъ, обращенный къ югу, пріобрѣтаетъ особенную цѣнность для звѣропромышленниковъ, такъ какъ на немъ всего чаще встрѣчаются серны, олени (изюбры) и другая дичь; такіе склоны носятъ у нихъ даже особенное названіе, именно: морянъ у прибайкальскихъ жителей, а у бурятъ обитателей долины Иркутъ. Точно также и долины, несмотря на ихъ короткость и незначительную ширину, не отличаются ни утесистостью склоновъ, ни каменистостью дна, поросшаго обыкновенно растительностью, такъ какъ размывающая сила протекающихъ въ нихъ ключей оказывается еще недостаточною нерѣдко даже для того, чтобы предохранить берега отъ покрывающей ихъ травы, вслѣдствіе чего и ключамъ этимъ нельзя примѣнять и названія горныхъ потоковъ, съ которыми мы будемъ имѣть случай ознакомиться въ другихъ частяхъ Байкала. Не представляя мѣсть скольконибудь удобныхъ для поселеній, берегъ этотъ дѣйствительно пустынный, но онъ не даетъ еще понятія о красотѣ мрачной и дикой природы многихъ частей Прибайкальскихъ горъ, такъ какъ и его растительность, какъ замѣчаетъ и Поляковъ, носитъ угрюмаго горнаго характера. Гладкіе, время отъ времени обнаруживающіеся супесчаные скаты заростають ксерофитною; многія долинки привѣтливо отгѣняются бѣлою березою; на каменистыхъ скатахъ и выше въ долинахъ размѣщается ельничница, къ которой уже на возвышенностяхъ примѣшивается кедръ, образующій, какъ сказано выше, значительную часть лѣсной растительности высшихъ пунктовъ мѣстности. Болѣе чистыя части склоновъ и нѣкоторыхъ долинъ

даже выкашиваются жителями какъ Култука, такъ и Лиственнаго, и собранное такимъ образомъ сѣно вывозится уже виною, по льду; впрочемъ количество мѣстъ, удобныхъ для этой цѣли, весьма незначительно.

. Такъ какъ въ 1879 г. юго-западная оконечность Байкала вскрылась отъ льда только въ послѣднихъ числахъ мая, поэтому плаваніе отъ Култука до с. Лиственнаго Черскій могъ начать только 4-го іюня <sup>1)</sup>. Миновавъ болотистое устье знакомой намъ уже рч. Мыдланки и оставивъ въ сторонѣ лѣвый склонъ ея долины, гдѣ, по почтовому тракту мы видѣли пласты роговообманковаго гнейса, падающіе на ю.-ю.-з., лодка приблизилась къ склону горы лишь за кладбищемъ с. Култука, расположеннымъ на невысокомъ и узкомъ наносномъ прибрежьи, за устьемъ Мыдланки. Отъ этой рѣчки, какъ сказано при общемъ обзорѣ озера, начинается первая линія промѣровъ глубины Байкала, совершенныхъ Дыбовскимъ и Годлевскимъ. Линія эта направляется на ю.-в., къ устью рч. Безымянной, о которой будетъ сказано въ своемъ мѣстѣ. Оказалось, что въ разстояніи 1 версты отъ Мыдланки, на глубинѣ 590', располагается террасовидный уступъ, круто опускающійся къ юго-востоку до глубины 2119' (646 метр.), гдѣ, слѣдовательно, дно озера лежитъ уже на 558' ниже уровня океана. Затѣмъ, въ разстояніи 4 версты и 109 сажени, дно возвышается такъ, что глубина ниспадаетъ до 1194' (364 метр.), послѣ чего, только спустя болѣе четырехъ верстъ, т. е. въ разстояніи 8 верстъ и 451 сажени располагается наибольшая глубина, достигающая по этой линіи впрочемъ только 2197' (670 метр.), такъ что дно Байкала опускается здѣсь уже на 636' ниже поверхности океана. Далѣе подъемъ дна къ устью рч. Безымянной идетъ двумя террасовидными уступами изъ которыхъ первый лежитъ на глубинѣ 1837', а второй 1341'. Отсюда бер

---

<sup>1)</sup> Черскій, Рукописныя замѣтки о Сибири.

направляется почти съ точностью прямолинейно на востокъ, къ Ангасольскій мысъ, расположенный въ 8 верстахъ отъ восточной оконечности озера закрываетъ собою дальнѣйшее продолженіе крутого склона береговыхъ горъ. Сейчасъ за кладбищемъ располагаются двѣ незначительныя и сухія долинки: Смоляная и Сосновая, а за ними, вслѣдъ за небольшимъ террасовиднымъ выступомъ береговой линіи, открывается и третья. Эта послѣдняя извѣстна подъ названіемъ Тарбаганъи, несмотря на то, что ни въ настоящее время, ни въ болѣе далекое, насколько помнятъ мѣстные жители, «тарбаганы» т. е. байбаки (*Arctomys bobac*) здѣсь не были находимы и не водятся вовсе. Долинка эта интересна еще въ томъ отношеніи, что она открывается не на уровнѣ современныхъ водъ озера, а на высотѣ около 20' надъ нимъ, обрѣзываясь крутымъ террасовиднымъ склономъ къ Байкалу. Очевидно потому, что воды этой долинки прекратили свое размывающее дѣйствіе и изсякли еще въ то время, когда уровень Байкала располагался на высотѣ ихъ устья, т. е. на 20' выше современного; съ тѣхъ поръ поверхность озера понижалась все больше и больше, тогда какъ долинка, не успѣвая соответственно углублять свое устье, осталась на прежней высотѣ, какъ вполнѣ задержанная въ развитіи, вѣрнѣе, какъ замершая долина. За Тарбаганьей находится еще другая, меньшая долинка съ такими же особенностями устья. Брусьеровидный крутой склонъ горъ продолжается все въ прежнемъ направленіи, не представляя никакихъ террасовидныхъ уступовъ и видимыхъ его высшихъ точекъ, гдѣ собственно и слѣдуетъ ожидать восточное продолженіе берега долины р. Култучной (около 928' надъ Байкаломъ), съ которою мы ознакомились выше; съ этого времени появлялись мало обнаженные выступы изъ порфиризованнаго гнейса, переходящаго мѣстами въ слюдянистый и хлоритовый гнейсы, а также въ сіенито-гранито-гнейсы, только сейчасъ же за упомянутою долинкою можно видѣть болѣе его обнаженіе: тонкослоистая, почти сланцеватая

порода эта обнаруживает здѣсь ясное паденіе пластовъ на с.-с.-в. и до с.-в., съ наклономъ въ  $40^{\circ}$  и болѣе. По направленію къ слѣдующему мысовидному выступу слоистость утолщается, затѣмъ почти совершенно исчезаетъ, вмѣстѣ съ тѣмъ порода растрескивается на болѣе крупныя, неправильныя куски (отдѣльность). На этомъ мыскѣ открывается еще одна долинка съ террасовиднымъ уступомъ на устьѣ. Спустя еще два мысовидныхъ выступа, изъ которыхъ западный отличается скалистостью и западнымъ наклономъ обнаженныхъ въ немъ пластовъ роговообманковаго гнейса (паденіе на западъ), а въ восточномъ слоистость въ породѣ почти совсѣмъ исчезаетъ, путешественникъ приближается къ Ангасольскому мысу (8 верстъ отъ Мыдьянки). Онъ образуется отвѣсными довольно мрачными утесами, въ которыхъ обнажается темная, зеленовато-сѣрая, очень мелкозернистая порода, перемежающаяся съ красноватымъ сіенито-гранитомъ, переходящимъ мѣстами въ слоистое видоизмѣненіе, причемъ возможно опредѣлить очень крутой наклонъ слоевъ на с.-в.  $30^{\circ}$ , съ простираниемъ пластовъ на з.-с.  $30^{\circ}$ . Но ближе къ Ангасольской бухтѣ, которая, какъ и всѣ вообще бухты именуется мѣстными жителями гу бою, простирание пластовъ роговообманковаго гнейса дѣлается почти меридіональнымъ (отъ с.-з.  $20^{\circ}$  до с.-в.  $20^{\circ}$ ), съ соответственнымъ паденіемъ сначала на западъ, а затѣмъ на востокъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ порода обнаруживаетъ нѣкоторыя небезынтересныя особенности, знакомство съ которыми послужитъ намъ для уясненія болѣе сложныхъ явленій, съ какими мы будемъ встрѣчаться нерѣдко и въ другихъ частяхъ побережья Букала. Гнейсъ этотъ дѣлается здѣсь полосатымъ, причемъ темныя прослойки его отличаются мелкозернистостью, мѣстами доходящею до афанитоваго сложенія; кромѣ того въ породѣ замѣчается множество миниатюрныхъ сдвиговъ, разрывовъ, перемѣщеній этихъ темныхъ прослоекъ, куски которыхъ въ такомъ видѣ напоминаютъ собою включенія, находя-

и изверженныхъ породахъ, несмотря на самое очевидное происхожденіе ихъ изъ слоистой толщи вслѣдствіе растаженія, разрывовъ и перемѣщеній, сопровождавшихъ процессъ образованія складокъ. Замѣчательно также, что промежутки между раздвинутыми кусками разорванныхъ темныхъ прослоекъ, какъ равно и всѣ щели, по которымъ имѣло мѣсто перемѣщеніе сдвинутыхъ частей, выполнены тою же массою, изъ которой состоятъ сѣрые прослойки гнейса и заполнены ею такъ совершенно, что нельзя отличить границы между болѣе древнимъ и позднѣйшимъ образованіями. Сейчасъ же далѣе слоистость породы нѣсколько маскируется. Въ Ангасолской губѣ располагается устье рч. Ангасолки, названіе которой слѣдуетъ производить, по всей вѣроятности, отъ буратскаго слова *амасо*, т. е. лодка. Она состоитъ изъ двухъ входящихся вѣтвей, между которыми возвышается островершинная вершина разобщающаго ихъ отрога. Лѣвая нѣкогда посѣщавшаяся еще вѣтвь рѣчки, приходитъ съ сѣвера и ю.-з., что же касается правой, достигающей болѣе 10 верстъ длины, то съ обоими верховьями ея, извѣстными подъ названіемъ Большой и Малой Ангасолокъ, мы ознакомились уже по пересѣкающему ихъ почтовому тракту, слѣдовательно, на сѣверо-западъ отъ устья. Лѣвый берегъ лѣвой Ангасолки, около общаго ихъ устья въ Байкалѣ, снабженъ террасою, которая, по барометрическому измѣренію Черскаго, возвышается на 225' надъ уровнемъ озера; на ней лежатъ мѣстами большія глыбы бѣлаго гранита. Кромѣ того, со стороны Байкала наблюдается еще два террасовидные уступа, изъ которыхъ высшій, болѣе ясно развитый, не превышаетъ 10' надъ поверхностью озера. Отъ ближайшихъ восточныхъ местностей устья рч. Ангасолки начинается линія промѣра глубины озера, произведеннаго Дыбовскимъ и Годлевскимъ въ направленію къ ю.-ю.-в., къ устью рч. Безымянной, по которой оканчивалась и линія отъ устья Мыдлани. Профиль дна не обнаруживаетъ уже здѣсь ни малѣйшаго



слѣда того продольнаго возвышенія, какое замѣтно было по линіи отъ Мыдьянки. Наибольшая глубина оказалась равною 4077' (1243 метра) и располагается въ разстояніи всего лишь 4 версты и 109 сажень отъ описываемаго, т. е. сѣверо-восточнаго берега озера. Дно Байкала такимъ образомъ опускается здѣсь уже на 2516' ниже уровня океана, къ тому же настолько быстро, что въ разстояніи 470 сажень отъ берега, гдѣ глубина равняется 2296', она лежитъ уже на 736' подъ поверхностью моря.

Отъ устья Ангасолки берегъ Байкала поворачиваетъ вообще на в.-с.-в., причемъ начинается та длинная (до 50 версты), хотя и плоская выемка въ береговой линіи озера, которая ограничивается съ востока Толстымъ мысомъ, про который мы говорили выше при общемъ обозрѣніи описываемой части берега. На протяженіи около 7 версты отъ названнаго устья располагается рядъ небольшихъ и плоскихъ бухточекъ и цѣлый рядъ почти отвѣсныхъ довольно высокихъ утесовъ, придающихъ побережью болѣе живописный и грозный видъ; здѣсь, вслѣдъ за рѣчкою Харбатуй, съ построеннымъ на берегу ея балаганомъ наблюдается также одна долина, открывающаяся къ озеру на высотѣ около 20', какъ Тарбаганія. Тотъ же роговообманковый гнейсъ съ свойствами ему измѣненіями, какъ въ строеніи, такъ и сложеніи мѣстами весьма извилисто-слоистый, сохраняетъ на всемъ этомъ протяженіи почти меридіональное простираніе пластовъ съ преобладающимъ паденіемъ слоевъ на з.-ю. 20°, а иногда и противоположнымъ, причемъ наклонъ пластовъ измѣняется отъ отвѣснаго до 30°. Затѣмъ, на протяженіи слѣдующихъ 4 версты, путешественникъ вступаетъ въ сложную бухтовидную выемку ограниченную съ востока мысомъ Столбы. Выемка эта начинается Крутою губою, — названіе, имѣющее впрочемъ лишь относительное значеніе. Бухтѣ этой принадлежитъ склонъ, называемый Гладкій убѣръ или моротъ, и расположенный въ области мѣстнаго пониженія берега.

горъ со стороны озера до половины видимой ихъ высоты; склонъ этотъ пересекается узкою, целевидною долиною, съ шумящимъ въ ней ключемъ, за которымъ, далѣе, открывается уже болѣе широкая долина рч. Чиринтуй или Зиринтуй, впадающей въ Крутую губу. За сосѣднею, небольшою бухточку находится еще другая, Малая Крутая губа съ соименнымъ ручьемъ, а за ней рч. Малый, Средній и Большой Шаражелгаи, изъ которыхъ двѣ послѣднiе располагаются въ особенной, довольно пространной доли, ограниченной съ востока мысомъ Столбы. Склонъ горъ состоитъ въ общемъ изъ той же породы (роговообманковый гнейсъ), которая сопровождала путешественника съ самаго начала Мыдьянки: она и здѣсь переходитъ какъ въ гранитоидное состоянiе, иногда даже порфировидное (очковый сіепо-гранитъ и такой же гнейсъ, напр. въ Крутой губѣ, между нею и М. Шаражелгаемъ, а также между Среднимъ Шаражелгаемъ и Столбами), а также въ хлоритовый и слюдо-хлоритовый сланцы (между Крутою и Малою Крутою губами), между тѣмъ какъ въ мысовидномъ выступѣ между Шаражелгаемъ и Среднимъ въ гнейсѣ этомъ можно видѣть три тонкихъ прослойки байкалитоваго (пироксеноваго) известняка. Что же касается положенiя пластовъ, т. е. стратиграфическихъ условiй породъ, то вслѣдъ за описанною выше, Ангасольско-Крутогубскою неправильностью въ простирани (почти меридiональное) слѣдуетъ небольшая полоса измѣненности слоевъ, за которою начинается другая неправильность (Шаражелгайская), состоящая въ томъ, что еще далѣе Малаго Шаражелгая пласты обнаруживаютъ уже отклоненiе на в.-с.-в. а паденiе на (с.-с.-в.), послѣ чего она переходитъ на з.-в. съ паденiемъ на сѣверъ. Но къ сожалѣнiю связь такихъ отклоненiй съ нормальнымъ простираниемъ (с.-с.-в.), опредѣлявшимся какъ по ущелью Иркуты и по почвенному тракту, такъ равно между Мыдьянкою и Ангасольскою (также ниже), не могла быть подвергнута ближайшему

изслѣдованію. За Среднимъ Шаражелгаемъ, въ небольшомъ утесѣ можно видѣть еще съ большею наглядностью, нежели около Ангасолки, результаты разрывовъ и перемѣщеній темныхъ полосокъ рогообманковаго гнейса и превращенія этихъ фрагментовъ въ ложныя включенія, срисованныя Черскимъ въ его отчетѣ за 1879 г. Паденіе переходитъ въ с.-з. 30°

Мысъ Столбы вдается довольно значительно въ Байкалъ если смотрѣть на него съ западной стороны, т. е. съ Шаражелгайской бухты; онъ скалистый и принадлежитъ сравнительно къ самымъ живописнымъ въ этой мѣстности. Для того, чтобы составить возможно наглядное представленіе особенностей и конфигураціи этого мыса, необходимо замѣтить, что подъ названіемъ террасовидныхъ мысовъ и такихъ же отроговъ горъ Черскій описываетъ формы, которыя въ продольномъ разрѣзѣ имѣютъ очертаніе террасъ, причемъ онѣ отдѣляются всегда отъ склона сравнительно болѣе высокими горъ. Мысъ такой (или отрогъ) долженъ имѣть по томъ болѣе или менѣе брустверовидный, крутой или пологій, иногда и неправильный склонъ своей свободной оконечности, и болѣе или менѣе горизонтальную, плоскую, иногда даже округленную или гребневидную верхнюю поверхность, которая въ известномъ разстояніи отъ свободной оконечности мыса должна примыкать къ болѣе или менѣе крутому склону болѣе высокихъ горъ.

Изъ цѣлаго ряда такихъ, параллельныхъ другъ другу отроговъ состоитъ напр. знакомая намъ уже высокая терраса лѣваго берега долины р. Култучной, благодаря описанію выше расчлененію ея поперечными долинками; съ такими же, но отдѣльно стоящими мысами и отрогами, мы будемъ имѣть случай неоднократно встрѣчаться около Байкала. Ближайшее изслѣдованіе геогностическаго строенія и положенія пластовъ въ такихъ мѣстахъ и отрогахъ, въ связи съ изученіемъ тѣхъ же особенностей склона горъ, къ которымъ они примыкаютъ, привело Черскаго къ заключенію,

что современные особенности этихъ формъ зависятъ отъ раз-  
нѣвающего дѣйствія стоячихъ (озерныхъ или морскихъ) или  
проточныхъ (рѣчныхъ) водъ, достигавшихъ въ извѣстное  
время уровня верхней поверхности такихъ мысовъ или отро-  
говъ и дѣйствовавшихъ на нее нивелирующимъ образомъ,  
по закону образованія всѣхъ террасъ вообще. Въ рѣчныхъ  
и озерныхъ долинахъ поэтому такіе мысы встрѣчаются нерѣдко  
на мѣстахъ крутыхъ поворотовъ рѣкъ; верхняя ихъ поверх-  
ность образовала собою прежнее дно рѣки, которая въ то  
время протекала здѣсь по прямому направленію и лишь  
въ послѣдствіи, встрѣтивъ на днѣ трещиноватость породы во-  
звѣдъ менѣе растресканной части послѣдней, произвела из-  
мѣненіе, послѣ чего, по мѣрѣ углубленія долины въ новомъ  
направленіи, образовался террасовидный мысъ на вогнутой  
сторонѣ извилины, какъ это мы видѣли въ ущелистой части  
Крута. Что же касается береговъ большихъ озеръ и морей,  
то около нихъ мысы этой категоріи при извѣстныхъ условіяхъ  
трещиноватости, т. е. отдѣльности породъ, могутъ образоваться  
въ оконечности любого горнаго отрога, лишь бы онъ по-  
вышался до нѣкоторой высоты водою и подвергался дѣйствию  
достаточной силы прибоя волнъ. Послѣ всего вышесказаннаго  
намъ будетъ вполне понятнымъ и достаточно рельефно изоб-  
ражающимъ сущность явленія слѣдующее выраженіе Черскаго,  
власно которому мы съ Столбы производимъ впечатлѣніе  
террасовиднаго мыса съ гребневидною верхнею поверхностью,  
состоящую изъ нѣсколькихъ члененно въ послѣдствіи на нѣсколько вершинъ, изъ ко-  
рыхъ двѣ, ближайшія къ озеру, а въ особенности вторая,  
отъ Байкала, всего болѣе обособлены и приняли ко-  
неческую форму. Обыкновенный (слюдной) гнейсъ переме-  
жается здѣсь съ роговообманковымъ, переходя въ неясно  
кварцевую и почти гранитовидную породу, въ которой на-  
ходится не мало ложныхъ включеній, къ тому же въ болѣе  
большомъ масштабѣ, нежели описанныя выше, и потому напоми-  
нющая дѣйствительныя включенія въ изверженныхъ породахъ.

Обстоятельство это могло служить одною изъ причинъ почему большую часть этихъ сіенито-гранитовъ, тѣсно связанныхъ съ роговообманковымъ гнейсомъ, Меглицкій причислялъ къ изверженнымъ гранитамъ, проникшимъ, по его мнѣнію, черезъ толщи гнейса отъ самаго Култука до устья рч. Половинной, хотя путешественникъ этотъ и не упоминаетъ о какихъ либо включеніяхъ, сдѣлавшихся извѣстными только со времени изслѣдованій Черскаго, точно также, какъ Меглицкому не былъ извѣстенъ и описанный выше известнякъ около Шаражелгая. Такая же волнообразность береговой линіи, продолжается и на сѣверо-востокъ отъ Столбовъ до р. Половинной, т. е. на протяженіи болѣе 18 верстъ, считая по прямому направленію. Въ разстояніи около 3 верстъ за Столбами располагается долина рч. Шабартуѣ (*шабартэ* или *табартэй* означаетъ по бурятски: грязно, болотисто); на ея правомъ берегу находится небольшой мысовидный выступъ въ видѣ террасы до 40' высоты. Верховья этой рѣчки, какъ передавали жители Олхинской деревни, располагаются вблизи отъ источниковъ р. Большой Олхи. Въ промежуткѣ между Шабартуемъ и Колокольнымъ мысомъ (2 версты), Черскій сдѣлалъ восхожденіе на склонъ береговыхъ горъ. Склонъ этотъ крутой, но поросшій травой и смѣшаннымъ лѣсомъ, обнаруживаетъ въ нижней своей части одни лишь продукты разрушенія породъ, преимущественно мелкіе, и только на высотѣ 405' надъ Байкаломъ начинаются отвѣсные утесы той же полуслоистой и порфировидной породы съ которою мы ознакомились около Столбовъ. Утесы эти Черскій обошелъ восточнѣе, по крутому, недоступному и поросшему склону, недалеко отъ праваго берега небольшой, сухой долинки, направляющей къ Байкалу. Такимъ образомъ скоро достигнутъ былъ ближайшій къ озеру высшій пунктъ 1229' н. Байк., но къ сожалѣнію древесная растительность не позволяетъ обозрѣвать съ него прилежащую съ сѣверомъ мѣстность. Верховья упомянутой выше сухой долинки интересны

въ томъ отношеніи, что на высотѣ 1162' надъ озеромъ они начинаются почти горизонтальною и гладкою площадкою: поросшая къ сожалѣнію растительностью площадка эта на-  
поминаетъ собою какъ бы слѣды бывшей здѣсь когда то  
лотины, разрушенной въ послѣдствіи дѣйствіемъ какъ атмо-  
сферныхъ агентовъ (сравни Подкаменную гору по почтовому  
тракту), такъ, быть можетъ, и озерными водами, потому что  
она располагается еще почти съ точностью (на 34' выше)  
на уровнѣ оглаженныхъ глыбъ на горѣ Култучной (см. выше),  
видовательно въ предѣлахъ высшей изъ Байкальскихъ  
террасъ.

Названіе Колокольныхъ мысовъ относится къ нѣ-  
большимъ сряду, мысовиднымъ выступамъ береговыхъ горъ,  
преимущественно утесистымъ, хотя и не вполне соответствующимъ  
тому названію, въ слѣдствіе чего можно даже полагать, что  
въ прежнее время скалы эти отличались гораздо большею  
густою зазубренности и столбовидными или башневидными  
формами, съ тѣхъ поръ уже разрушившимися. Среди отвѣс-  
ныхъ утесовъ перваго изъ нихъ, ближайшаго къ Шабартую,  
располагается глубокая, но сухая долина. Роговообманковый  
гнейсъ обнаруживаетъ наклонъ пластовъ на з.-ю.-з. до ю.-з.  
въ угломъ до 40°. Въ немъ замѣчаются двѣ кварцевыя жилы  
крупнозернистыми полевошпатово-кварцевыми зальбан-  
ами; толщина жилъ достигаетъ 1½ — 2 аршинъ, паденіе  
къ противоположное наклону пластовъ гнейса, который,  
часть же за упомянутую долинкою переходитъ въ неясно-  
истое, и массивное видоизмѣненіе, причемъ, какъ всего  
небываешь на описываемомъ пространствѣ, переходъ этотъ со-  
вмѣщенъ съ уменьшеніемъ количества роговой обманки, отчего  
скала принимаетъ блѣловатый цвѣтъ. Мѣстами же, гдѣ сло-  
истость болѣе замѣтна, наблюдается и противоположное пре-  
жнему паденіе. Слѣдующій мысъ, за долинкою съ ключемъ,  
также совершенно снабженъ башневиднымъ утесомъ, хотя и не  
такъ живописнымъ; онъ состоитъ изъ сіенито-гранита блѣд-

наго мясокраснаго цвѣта; пластоватая отдѣльность, падавшая ясно на востокъ, переходитъ здѣсь въ крупную, неправильную, иногда даже параллелепипедальную. Нѣсколько далѣе слоистость опять появляется и обнаруживаетъ затѣмъ нормальное простираніе на з.-с.-з. съ паденіемъ какъ на с.-с.-в., такъ и противоположнымъ, измѣняющимся до з.-ю.  $30^{\circ}$ . Въ породахъ этихъ и здѣсь нерѣдки ложныя включенія.—Спусти двѣ долинки съ протекающими въ нихъ ключами, путешественникъ достигаетъ небольшой бухты, — Моритуйской, въ которую впадаетъ и соименная рѣчка. Долина рч. Моритуй имѣетъ около 50 сажень ширины на устьѣ, но размѣры маловоднаго ключа очень незначительны; съ лѣвой стороны долины находится терраса около 14' высоты надъ Байкаломъ, въ склонѣ которой обнажается порфировидное видоизмѣненіе тѣхъ же породъ, переходящее далѣе въ гнейсы. За Моритуйскою бухтою слѣдуетъ другая съ нѣсколькими (3) впадающими въ нее ключами. Отсюда положеніе пластовъ гнейса опять измѣняется, принимая почти меридиальное простираніе при западномъ или восточномъ паденіи прерываясь мѣстами значительною извилистостью. Мысль, отдѣляющій эту бухту отъ слѣдующей, извѣстной подъ названіемъ Сѣнной губы, состоитъ изъ мѣстнаго массивнаго видоизмѣненія той-же породы. На восточной его сторонѣ гдѣ утесъ непосредственно омывается водою, Черскимъ сдѣлана засѣчка для обозначенія высоты стоянія воды въ Байкалѣ (8-го іюня ст. стиля). Засѣчка эта изображаетъ собою горизонтальную черту, выбитую на утесѣ помощью долота, на высотѣ двухъ метровъ надъ найденнымъ въ то время уровнемъ озера. Около черты этой означеніе такимъ же образомъ и годъ (1879), въ которомъ она сдѣлана.

Въ Сѣнную губу въ свою очередь впадаетъ нѣсколько ключей, долины которыхъ именуются Сѣнными, по всей вероятности потому, что нѣкоторыя изъ нихъ иногда вытекаютъ култускими жителями; первые два изъ нихъ отъ

нятся на террасѣ до 7' высоты надъ Байкаломъ. Извилистость слоевъ гнейса доходитъ до того, что около долины первой Сѣнной можно видѣть небольшую складку пластовъ, лежащую горизонтально и даже нѣсколько нагнутую вершиною внизъ; далѣе паденіе все западное. Сейчасъ же за восточнымъ мысомъ Сѣнной начинается бухта р. Половинной довольно глубоко врѣзанная въ береговую линію сравнительно въ ширину этой губы и потому она считается удобною для влечиванія бревенъ и для стоянки плотовъ подъ прикрытіемъ восточнаго или лѣваго мыса. Мысъ этотъ всего болѣе известенъ въ Байкаль, носить названіе Половиннаго и принадлежитъ къ террасовидному типу, хотя не образцово развитому, и не очень высокій. Въ бухтѣ и располагается рѣч. Половинной, съ среднимъ теченіемъ которой мы уже ознакомились выше. Рѣчка эта и ея бухта имѣютъ значеніе и для рыболововъ. На ней строятъ такъ называемыя пѣзки, а весною ловятъ рыбу и неводами. Согласно Полозову, уловъ на ней нерѣдко простирается до 20 лодокъ рыбы, цѣнность которыхъ доходитъ до 800 рублей. Выше теченію Половинной Олхинскіе крестьяне дѣлаютъ звѣриные ямы для ловли изюбровъ, сернъ и т. п.; въ одну изъ такихъ ямъ, въ 1879 г., какъ сообщаетъ Черскій, попалъ альпійская собака (*Canis alpinus?*), но къ сожалѣнію, этотъ этого малоизслѣдованнаго животнаго былъ выброшенъ и уничтоженъ прежде, нежели Черскій успѣлъ посѣтить эту местность, составляющую восточную границу распространенаго названнаго животнаго около Байкала. Въ западной части горы обнажаются видоизмѣненія того-же роговообманковаго мѣла, переходящаго мѣстами почти въ афанитъ; что же касается восточной части, то въ мысѣ Половинномъ для гнейса залегаетъ пластъ кристаллическаго известняка, разбѣянными въ немъ зернами пироксена; кромѣ того известнягъ этотъ, упоминаемый уже и Меглицкимъ, содержитъ не малое количество небольшихъ гнѣздовидныхъ



образованийъ, состоящихъ изъ зернистой гранитовидной смѣси минераловъ (полевоѣ шпаты, кварцъ, пироксенъ, иногда и слюда). Въ предѣлахъ всей бухты съ мысомъ Половиннымъ включительно, пласты сохраняютъ еще почти меридіональное простирание (паденіе на западъ до з.-ю.  $15^{\circ}$ ), появившееся съ восточныхъ окрестностей Моритуйской бухты, но сейчасъ же за мысомъ Половиннымъ, даже на его восточной сторонѣ, паденіе пластовъ переходитъ уже въ южное и юго-юго-западное, причемъ въ гнейсѣ замѣчаются и жилы грюштейна, не представляющія однако видимыхъ признаковъ изверженнаго ихъ происхожденія.

За Половиннымъ мысомъ слѣдуетъ довольно пространная бухта (до 4 верстъ въ хордѣ) — Ивановская губа; въ нее, не считая сухихъ долинокъ, впадаютъ четыре ключа, изъ которыхъ второй называется р.ч. Пономаревой, а четвертый Ивановкою, причемъ долины ихъ принадлежатъ къ самымъ широкимъ. Развитыя въ этой бухтѣ видоизмѣненія рогово-обманковаго гнейса, нерѣдко разрушающіеся въ дресву и глину, смѣняются въ Ивановскомъ мысѣ бѣлымъ и желтоватымъ кристаллическимъ известнякомъ съ вкрапленными въ немъ минералами. Изъ числа послѣднихъ Черскій упоминаетъ: байкалитъ, иногда въ кристаллахъ до 10 и 30 миллим. длины, слюду довольно крупными агрегатами и известковый шпатъ въ видѣ прожилокъ. Паденіе не вездѣ ясныхъ слоевъ этихъ породъ на ю.-з. 30 до ю.-ю.-з. Известнякъ этотъ уцѣлѣлъ только около оконечности мыса, образуя собою низшую часть отрога, тогда какъ гребень и высшая часть состоитъ изъ роговообманковаго гнейса, падающаго вполне согласно съ известнякомъ (на ю.-ю.-з.). Названная полевошпатовая порода выходитъ поэтому и на восточную сторону Ивановскаго мыса, называемаго иногда Шумихинскимъ, такъ какъ за нимъ предполагается Шумихинская губа. На поворотѣ этого мыса дно Байкала отличается скалистостью. Оно об-

звѣтается большими, плоскими скалами, расчлененными глубокими щелями и промоинами, состоящими повидимому изъ того-же роговообманковаго гнейса. Дно это опускается въ сторону осевой части Байкала отвѣсными уступами, террасовидно, причемъ высшія части верхней поверхности этой затопленной террасы вполне лишены наносныхъ осадковъ и покрываются глыбами лишь очень тонкимъ слоемъ воды ( $0,1 - 0,2$  метра), образуя весьма опасное мѣсто для плавающихъ здѣсь плотовъ и лодокъ. Черскій оплывалъ эти подводныя скалы со стороны ихъ южнаго склона, въ разстояніи нѣсколькихъ десятковъ футовъ отъ берега и могъ испытать всю силу эффекта, производимаго на путешественниковъ то мгновеннымъ появленіемъ ихъ подъ самымъ дномъ лодки, то столь-же быстро смѣною ихъ чернѣющею глубиною озера. Определеніе вертикальныхъ и горизонтальныхъ размѣровъ, а также размѣщенія и степени расчлененія этихъ скалъ, какъ равно точные промѣры толщины покрывающаго ихъ нынѣ слоя воды, свѣдѣнія съ нанесеніемъ всѣхъ этихъ данныхъ на подробную карту этого подводнаго террасовиднаго мыса, представляло немаловажный интересъ для будущихъ изслѣдователей. Пользуясь этимъ матеріаломъ, они могли бы оцѣнить со временемъ возможные измѣненія какъ этихъ скалъ отъ дѣйствія на нихъ прибою волнъ, такъ и высоты стоянія поверхности озера. Но, вслѣдствіе неисправности со стороны заведеннаго договореннаго поставщика, путь изъ Култука до истиннаго Черскій долженъ былъ совершить въ маленькомъ, полуизгнившемъ стружкѣ (челнокѣ), едва поднимавшемъ его и одного гребца и имѣвшемъ всего лишь  $0,1$  метра высоты (т. е. высоты надъ уровнемъ воды). Поэтому, несмотря на желаніе, онъ не могъ подвергнуть ближайшему осмотру всю площадь подводныхъ скалъ, въ особенности потому, что незначительныя морщинки, покрывавшія въ то время поверхность Байкала, являлись уже небезопасными волнами для такого челнока.

Сосѣдная бухта получила упомянутое выше названіе отъ изливающихся въ нее двухъ рѣчекъ, вѣрнѣе ключей, именуемыхъ Шумихами, по всей вѣроятности вслѣдствіе издаваемого ими весною шума. Шумиха 2-я отдѣлена отъ 1-й небольшимъ мыскомъ и отличается сравнительно болѣе широкою долиною и расположеннымъ за нею болѣе выдающимся мыскомъ. Во всѣхъ скалистыхъ выступахъ наблюдается все тотъ же роговообманковый гнейсъ, но паденіе его здѣсь измѣняется отъ з.-ю.-з. до з.-с.-з. съ неодинаковою крутизною наклона (до  $55^{\circ}$ ). Въ бухтѣ этой 8-го іюня Черскій встрѣтилъ еще не мало плавающихъ льдинъ. На поверхности воды Байкала, около берега, наблюдалась кромѣ того тонкая плѣнка желтаго пылевиднаго налёта, покрывавшаго въ различныхъ мѣстахъ по нѣскольку квадратныхъ сажень. Явленіе это извѣстно у мѣстныхъ жителей подъ названіемъ *цвѣтенія Байкала* («море цвѣтеть»). Оно было знакомо еще академику Георги (1772 г.), писавшему о подобномъ состояніи воды слѣдующее. «Въ іюлѣ наступаетъ цвѣтеніе. Въ текущемъ году это критическое состояніе имѣло мѣсто между 8 и 28 числами. Цвѣтъ въ изобиліи носился по водѣ и казался совершенно желтою мелкою пылью; если его помѣстить въ стаканъ, то скоро показывается зеленое облочко. Воздухъ при вдыханіи былъ въ это время не особенно освѣжительнымъ, вода также была не вполне хороша, но еще годна къ употребленію. 20-го іюля въ одну бухту вѣтеръ принесъ такое количество этого, такъ называемыхъ цвѣта, что его можно было собирать. При сравнительно сильномъ увеличеніи желтыя тѣльца казались подобными плохой носной пыли, облака ея выдѣлялись изъ самой воды, оба вещества не раздѣлялись.»<sup>1)</sup> Явленіе «цвѣтенія моря» должно было ускользнуть отъ вниманія путешествовавшего впоследствии

---

<sup>1)</sup> Георги, I. с. В. I. pag. 150.

ствіи натуралиста Радде, и потому въ его сочиненіи мы не находимъ личныхъ его наблюденій надъ веществомъ, называемымъ аборигенами морскимъ цвѣтомъ; что-же касается сказаннаго имъ по этому вопросу, то на объясненіе это можно смотрѣть скорѣе какъ на желаніе поставить на болѣе реальную почву явленіе, мистицизмъ котораго не достаточно разъясненъ описаніемъ академика Георги. И дѣйствительно, у Радде мы читаемъ <sup>1)</sup>, что «нитевидныя, тонко развѣтвленныя водоросли покрываютъ большую часть погруженныхъ въ воду скалъ; легко подвижныя, они колеблются и волнуются и придаютъ спокойной поверхности воды пріятный зеленый цвѣтъ; они, заключають Радде, производять явленіе такъ называемаго цвѣтенія моря, продолжающагося отъ 3 до 4 недѣль; въ нѣкоторое лѣто это цвѣтеніе было особенно сильное.»

Между тѣмъ ежегодныя распросы во время четырехлѣтняго плаванія Черскаго по Байкалу, выполнѣ согласуются съ показаніемъ Георги въ томъ, что морскимъ цвѣтомъ жители называютъ именно ту желтую пыль, которая собирается во многихъ мѣстахъ на поверхности озера и прибивается волнами къ берегу, какъ это имѣло мѣсто и въ мѣстахъ Шумиха. Взятыя Черскимъ образцы этой пыли были подвергнуты Агапитовымъ микроскопическому изслѣдованію <sup>2)</sup>. При этомъ оказалось, что вещество, обусловливающее «цвѣтеніе моря,» есть ничто иное какъ цвѣточная пыль (цвѣтъ) хвойныхъ деревьевъ (сосны и кедра), преимущественно сосны, цвѣтеніе которыхъ обыкновенно приходится въ половинѣ мая и въ іюнѣ, но такъ какъ по берегамъ Байкала цвѣтеніе бываетъ для многихъ растений значительно раньше и не въ одинаковое время, смотря по положенію дан-

<sup>1)</sup> Радде, 1. с. pag. 188.

<sup>2)</sup> Агапитовъ, Изв. Сиб. Отд. И. Р. Геогр. Общ. 1878 г. Т. IX, № 3—4, стр. 99.

наго склона горъ или долины, то неудивительно поэтому, что пробираясь по лѣсной чащѣ въ сѣверо-восточной части озера, Черскій однажды, даже въ іюлѣ мѣсяцѣ, былъ почти осыпанъ цвѣточной пылью кедроваго сланца. Такъ называемое «цвѣтеніе моря» объясняется поэтому теперь весьма просто. Извѣстно, что у хвойныхъ деревьевъ масса образующейся цвѣточной пыли такъ велика, что иногда она покрываетъ собою почву лѣса цѣлымъ слоемъ и разносится вѣтромъ на далекія разстоянія, производя мѣстами явленіе, называемое «сѣрнымъ дождемъ»; таже цвѣтневая пыль падаетъ и въ воду Байкала, собираясь и накапливаясь затѣмъ около береговой линіи подъ видомъ описаннаго выше сѣрно-желтаго налета. Чтоже касается замѣчанія Георги, что въ этотъ періодъ времени даже вода была не очень вкусна, хотя и годна для питья, то оно, по мнѣнію Черскаго, можетъ относиться лишь къ мѣстамъ, переполненнымъ этою пылью, но никакъ не ко всей поверхности и массѣ воды Байкала.

Бухта Шумихи ограничивается съ востока Березовымъ мысомъ, отъ котораго до Толстаго мыса остается немногимъ болѣе 6 верстъ. Березовый мысъ образуется утесомъ, непосредственно омываемымъ водою; не вполне ясно слоистость обнаруживаетъ въ немъ паденіе гнейса, измѣняющееся отъ ю.-ю.-з. до ю.-ю.-в.; сейчасъ же за нимъ располагается другой, низменный и террасовидный мысъ того же названія не превышающій 10' надъ озеромъ, съ двумя впадающими здѣсь ключами. Поросшій склонъ горъ представляетъ здѣсь лишь небольшіе выступы той-же коренной породы и пересѣкается сначала Березовымъ ключемъ устья котораго располагается на небольшомъ мысовидномъ выступѣ, а затѣмъ еще четырьмя ключами, изъ которыхъ третій носить названіе рч. Пылочки. Въ довольно широкой и луговой (на устьѣ) долинѣ этой рѣчки дѣлалась попытка основать осѣдлое поселеніе. По словамъ Полякова

с.) это былъ ссыльный поселенецъ, построившій здѣсь домъ, амбары, баню и конюшню. Жилъ онъ звѣринымъ промысломъ, доставлялъ лѣсъ въ Иркутскъ, разводилъ картофель, который, какъ и вездѣ около Байкала, родился отлично. Онъ былъ одинъ съ женою, прожилъ здѣсь 15 лѣтъ и умеръ; вслѣдовать же его пустынное убѣжище никто не рѣшился. Во времена Черскаго на устьѣ Пыловки, гдѣ сохранилась еще часть построекъ умершаго поселенца, а отчасти и на м. Баранчукъ (см. ниже), проживалъ тунгусъ съ женою, принадлежавшій Голоустенскимъ тунгусамъ (см. ниже), но ушедшійся отсюда вслѣдствіе нѣкоторыхъ семейныхъ раздоровъ. Вездѣ, гдѣ только гнейсъ не теряетъ слоистости, постираніе его оказывается з.-с.-з. съ паденіемъ на ю.-ю.-з., тогда какъ пластоватая отдѣльность отличается противуположнымъ наклономъ. Толстый мысъ (1-й Толстый, называемый иногда Бакланымъ) представляетъ собою выступъ береговыхъ горъ, всего болѣе вдающійся въ озеро, и образуетъ юго-западную границу начинающейся за нимъ Ангарской бухты. Съ оконечности этого мыса, какъ сказано выше, въ общемъ описаніи этихъ горъ, открывается весьма поучительный видъ на склонъ Байкальской долины, такъ какъ тогда можно видѣть всѣ главные мысы до Ангасольскаго почти совершенно: всѣ они, за исключеніемъ Половиннаго, являются высокими (см. выше) и довольно длинными, образцово-террасовыми мысами. Поляковъ точно также восходилъ на одну изъ такихъ «береговыхъ вершинъ» около Березоваго мыса, измѣрилъ высоту ея барометрически. По вычисленію Кропачева, принимавшаго уровень Байкала равнымъ 1343', высота этой точки оказалось 2267' надъ океаномъ, т. е. 924' надъ озеромъ, слѣдовательно, равною той высотѣ террасы юго-западнаго берега р. Култучной и юго-западной оконечности озера (см. н. Б.), на которой Черскій находилъ грядки обточенныхъ валуновъ и гальки. Къ такому-же типу относится и 2-й мысъ, понизившаяся оконечность котораго, какъ

передавали Черскому, должна образовать довольно длинную подводную гряду. На этой оконечности и около ней можно видѣть, что среди роговообманковаго гнейса, содержащаго прослоекъ криптокристаллическаго грюнштейна, залегаетъ пропластокъ бѣлаго кристаллическаго известняка. Паденіе пластовъ, на южномъ склонѣ мыса ю.-ю.-з.-ое, переходитъ къ востоку въ противоположное (на с.-с.-в.); мѣстами пласты отличаются почти отвѣснымъ положеніемъ.

Отъ Толстаго мыса береговая линія озера направляется почти на сѣверо-востокъ къ истоку Ангары (15 верстъ отъ Толстаго). Она образуетъ собою сѣверо-западный берегъ Ангарской бухты, ограниченной съ востока, вѣрнѣе съ в.-с.-в., Березовымъ мысомъ (2-й Березовый, см. ниже), съ которымъ мы познакомимся лишь въ слѣдующей главѣ, такъ какъ онъ лежитъ уже внѣ предѣловъ описываемаго треугольника, т. е. восточнѣе истока озера. Ангарская бухта представляетъ собою самую значительную изъ описанныхъ нами выемокъ береговой линіи Байкала, — можно сказать даже самую значительную изъ бухтъ юго-западной части озера. Она достигаетъ нѣсколько болѣе 16 верстъ въ длину, считая по хордѣ отъ Толстаго мыса на в.-с.-в., къ Березовому и 22 версты въ окружности, причемъ врѣзывается въ береговыя горы на нѣсколько болѣе 4 версты, всего глубже въ концѣ третьей четверти окружности, считая отъ Толстаго мыса, гдѣ именно располагается единственный истокъ Байкала — рѣка Ангара. Мы прослѣдимъ теперь особенности самаго длиннаго, сѣверо-западнаго берега этой бухты, чтобы войти затѣмъ въ р. Ангару, какъ ограничивающую нашъ треугольникъ съ в.-с.-в. стороны. На протяжении 7 верстъ, отъ Толстаго мыса до рч. Большой Барчукъ располагаются лишь незначительныя бухтовидныя неровности береговой линіи, какъ-то: Каторжанская Варначя съ соименнымъ ключемъ, затѣмъ, спустя кланьи утесы, Медвѣжья губа и еще небольшо-

булочка съ ключемъ, всѣдъ за которою начинается уже болѣе значительная губа Баранчукъ, занимал почти съ точностью среднее положеніе между Толстымъ мысомъ и истокомъ Ангара. На всемъ этомъ протяженіи развитъ все тотъ-же роговообманковый гнейсъ, и только паденіе пластовъ его около Каторжанки измѣняется въ ю.-ю.-з., а за Медвѣжьей переходитъ опять въ с.-с.-в. Вблизи Баранчука, въ породѣ этой найдена узкая (до 30 миллим.) выклинивающаяся щель, совершенно выполненная брекчіею, имѣющею видъ кристаллической породы; ближайшее изслѣдованіе показало, что брекчія эта состоитъ изъ почти вовсе неокругленныхъ кусковъ и осколковъ видоизмѣненій сосѣдней коренной породы, слѣпленныхъ сѣрозеленымъ цементомъ, похожимъ на хлоритовую породу; цементъ этотъ содержитъ не мало углекислыхъ солей и обезцвѣчивается отъ соляной кислоты, послѣ чего только ясно обнаруживаются его обломочные элементы. Такія брекчіи, какъ извѣстно, могутъ образоваться отъ тренія стѣнокъ трещинъ во время изгибанія пластовъ въ складки, но въ образованіи нѣкоторыхъ изъ нихъ можетъ принимать участіе и протекающая по трещинамъ вода, вліяя на большую или меньшую степень округленія граней обломковъ.

Остановившись на устьѣ Большаго Баранчука, Черскій (10-го іюня) сдѣлалъ небольшую экскурсію вверхъ по его широкой долинѣ. Сначала онъ смотрѣлъ горы лѣваго берега низовьевъ рѣчки, между устьемъ и первымъ лѣвымъ притокомъ Баранчука. На высотѣ 222' надъ Байкаломъ онъ встрѣтилъ здѣсь весьма отчетливый террасовидный уступъ, послѣ чего, прослѣдовавъ по гребню отрога, достигъ высшаго пункта, расположеннаго около склона къ названному притоку. Высота его оказалась равною 830' н. Байк. Спустившись затѣмъ въ главную долину, направляющуюся въ общ. свѣдѣн. съ в.-с.-в. на з.-ю.-з. онъ пошелъ вверхъ по ея лѣвому берегу. Сейчасъ же выше упоминавшагося уже перваго (т. е. нижняго) лѣваго притока, склонъ долины обнаруживаетъ



террасу около 20' высоты. Съ полъ версты выше Баранчукъ принимаетъ второй лѣвый притокъ, а пройдя еще столько же, долина его составляется изъ двухъ вѣтвей: правой, слѣдующей съ ю.-ю.-з. и лѣвой съ запада; на правомъ берегу замѣчаются какія-то постройки, безъ всякихъ признаковъ ихъ обитаемости. Слѣдуя вверхъ по лѣвой вѣтви, вслѣдъ за двумя лѣвыми-же притоками рѣчки, долина значительно суживается и принимаетъ болѣе крутой наклонъ; около суженія построено звѣропромышленниками небольшое зимовье (избушка) и такъ называемый лабазъ. Лабазъ представляетъ собою подмости, подвѣшенные и укрѣпленные къ дереву на высотѣ около 1½ сажений; на нихъ садится промышленникъ, подстерегающій ночью медвѣдя, котораго заманиваютъ сюда какою либо падалью и убиваютъ, не боясь нападенія звѣря въ случаѣ промаха или несмертельной раны. Отсюда путешественникъ поднялся на довольно крутой гребень отрога, отдѣляющаго послѣдній изъ упомянутыхъ лѣвыхъ притоковъ отъ суженной главной вѣтви Баранчука. По этому скалистому гребню онъ достигъ ближайшаго высшаго пункта въ 1033' надъ озеромъ, откуда можно было видѣть, что болѣе высокія горы, напр. на правомъ берегу долины, превышаютъ этотъ пунктъ повидимому не болѣе какъ на 40 — 50'; палатка, стоявшая на устьѣ Баранчука, какъ равно и село Лиственичное, лежащее къ востоку отъ истока р. Ангара, виднѣлись отсюда на в.-с. 15°. Вся долина на протяжении этихъ нѣсколькихъ верстъ отличается вообще мрачною наружностью, какъ плохо освѣщаемая солнцемъ и порослая растительностью, свойственною сѣвернымъ склонамъ горъ. Какъ въ розсыпяхъ, такъ и въ плохихъ выступахъ вездѣ обнѣживается тотъ же роговообманковый гнейсъ и его видоизмѣненія; въ скалистыхъ мѣстахъ отрога, по которому достигнутъ высшій пунктъ, гнейсъ этотъ содержитъ еще и мелкія зерна пироксена; паденіе пластовъ его оказалось с.-с.-в. Въ выносимой Баранчукомъ галькѣ, какъ и во всѣхъ

других рѣчкахъ описываемой части берега Байкала, не найдено никакихъ породъ, указывающихъ на присутствіе какихъ либо отложений, менѣе древнихъ нежели лаврентьевскихъ. Довольно сильное волненіе Байкала (съ с.-в.) заставило путешественника провести ночь въ той-же долинь и только утромъ 11-го іюня можно было двинуться въ дальнѣйшій путь, по направленію къ истоку Ангары. Бухта Большаго Баранчука продолжается почти на 4 версты къ с.-в., до мыса Моринной. Въ ней, кромѣ Баранчука, впадаютъ еще четыре ключа, изъ которыхъ второй называется Тѣльной, третій Залавки, а четвертый Моринная, и чемъ сухая долинка западнѣе Тѣльной открывается на высотѣ до 10' надъ уровнемъ озера, по типу знакомой намъ Тарбаганьей долины. Въ обнаженіяхъ все тотъ-же гнейсъ, переходящій на югъ и ю.-ю.-з., а въ одномъ мѣстѣ и на с.-в., и извилистой слоистости. Ближе къ Б. Баранчуку въ покровѣ появляется не мало ложныхъ включеній, причемъ гнейсъ является богаче полевымъ шпатомъ, слоистость маскируется породами теряется почти совершенно. Склоны нерѣдко покрываютъ травой, образуя такъ называемые моряны (см. стр. 101). Такое же строеніе горъ продолжается и за губою Моринною почти до половины слѣдующей губы Бабушки, названной такъ отъ впадающей въ нее соименной рѣчки (ключъ).

Отъ долины Бабушки до истока Ангары остается всего лишь 5 верстъ, на протяженіи которыхъ склонъ горъ перемѣняется лишь двумя главными долинками: Щель, а за ней Малый Баранчукъ, располагающійся въ 2 верстахъ отъ Ангары. Горы эти, образующія какъ бы мысъ этого берега истока, замѣтны уже съ Толстаго мыса, но въ бухтѣ Бабушки они обрисовываются въ особенности рельефно: вытягиваясь значительно въ сторону Ангары и достигая по видимому не болѣе 500' высоты, высшій пунктъ этого хребта отдѣляется съ сѣверо-запада отъ нѣскольکو болѣе вы-

сокой части горъ пологою, но достаточно рѣзко выраженно сѣдловиною. Придерживаясь классификаціи, принятой Черскимъ для выраженія различныхъ особенностей конфигураціи мысовъ, оконечность этого отрога можно назвать для краткости горообразнымъ мысомъ. Типъ этотъ достигается образованіемъ болѣе или менѣе глубокой сѣдловины въ нѣ которомъ отдаленіи отъ оконечности, вслѣдствіе чего частъ эта обособляется до нѣкоторой степени, уподобляясь отдѣльной горѣ. Но постепенное углубленіе сѣдловины доходить иногда до того, что она возвышается всего лишь на нѣсколько футовъ надъ уровнемъ озера, тогда какъ высокая оконечность мыса кажется съ нѣкотораго отдаленія какъ бы настоящимъ островомъ, въ который она нерѣдко преобразовывается въ послѣдствіи; такимъ образомъ появляются сначала формы горообразныхъ мысовъ съ болѣе или менѣе явною склонностью къ острововидному типу, а наконецъ появляются и острововидные мысы.<sup>1)</sup> Съ такими мысами и переходами ихъ въ острова мы будемъ имѣть случай неоднократно встрѣчаться какъ на Байкалѣ, такъ и въ нѣкоторыхъ нынѣ сухихъ уже или рѣчныхъ долинахъ (Забайкальская область).

Утесы описываемой части побережья бѣлѣются уже отдаленія, указывая на измѣнившійся отчасти составъ горъ. И дѣйствительно, уже на половинѣ разстоянія между Бушскою и Щелью среди того же гнейса и его видоизмѣненій обнажается кристаллическій известнякъ гнейса. Обнаженіе это, описанное и срисованное Черскимъ въ его отчетѣ за 1880 г.<sup>2)</sup> является въ видѣ несогласнаго залеганія известняка на названной полевошпатовой породѣ; но залеганіе такое Черскій объясняетъ не разновременностью от-

---

<sup>1)</sup> Черскій, Рукописныя Записки о Сибири.

<sup>2)</sup> Черскій, Изв. З.-Сиб. Отд. И. Р. Геогр. Общ. Т. XII № 2, фиг. 3.

женія этихъ пластовъ, а сжиманіемъ складки послѣ постиг-  
аго ихъ предварительно размыва. Доказательствомъ такому  
разрѣнію служить то обстоятельство, что въ восточной части  
того же обнаженія обѣ породы перемежаются другъ съ  
другомъ вполне согласно, образуя террасу до 20' высоты.  
Далѣе, спустя совершенно поросшій склонъ горъ между  
Целью и долиною Малаго Баранчука, начинается  
рядъ невысокихъ, но многочисленныхъ утесовъ, въ кото-  
рыхъ сначала обнажается тотъ же гнейсъ, переходящій  
въ роговообманковый, то даже въ хлоритовый сланцы или  
въ почти неслоистый грюнштейнъ, а затѣмъ кристал-  
лическій известнякъ съ гнѣздовидными образованіями, какъ  
то Половинной, а мѣстами какъ бы съ ложными включе-  
ніями, въ родѣ попадавшихся въ гнейсѣ. Порода эта про-  
издается до самой Ангары и только со стороны послѣдней  
ограничивается роговообманковымъ гнейсомъ. Ближайшій къ озеру  
пунктъ этого мыса, около такъ называемой Кара-  
лени (прежній сторожевой постъ Листвениченской таможен-  
ной заставы), по барометрическому измѣренію Черскаго,  
оказался равнымъ 409' надъ Байк. (1878 г.). Онъ состоитъ  
изъ того-же известняка (или доломита? — образцы погибли  
между ихъ опредѣленія) съ расположенною въ немъ пла-  
стовою жилою кварца. Положеніе пластовъ на всемъ этомъ  
пространствѣ (отъ долины Бабушки) уклоняется отъ нормаль-  
наго: сначала простираніе почти меридіональное (паденіе отъ  
с.-в. до востока), затѣмъ слѣдуетъ извилистость слоевъ съ  
простираніемъ на с.-с.-в., а наконецъ на с.-в. Мысъ этотъ, от-  
граничивающій лѣвый берегъ истока Ангары отъ Байкала и обра-  
щающій юго-восточный уголъ описываемой треугольной пло-  
щади Прибайкалья, называется иногда Баранчукомъ. у  
русскихъ, между тѣмъ, онъ упоминается подъ названіемъ Ан-  
гарскаго мыса. Отъ него направляется линія промѣра дна  
озера, по направленію къ р. Выдренной, давшая наибольшую  
цифру глубины Байкала (4503' см. выше). Дождь по-

мѣшалъ ближайшему изслѣдованію нѣкоторыхъ геогностическихъ частныхъ въ промежуткѣ между Малымъ Баранчукомъ и Ангарою; для этой цѣли предполагалась другая, не состоявшаяся впрочемъ, экскурсія. Теперь-же необходимо было переплыть около истока Ангары въ с. Лиственичное (11-го іюня 1879 г.), гдѣ путешественника выжидала уже его собственная лодка (10 арш. длины) съ тремя гребцами, для дальнѣйшаго плаванія по Байкалу. Но для того чтобы попасть въ Лиственичное, нельзя плыть прямо съ мыса лѣваго берега Ангары, а необходимо объѣхать ея истокъ, направляясь дугообразно вглубь Байкала, на разстояніе окомъ  $\frac{3}{4}$  версты отъ рѣки, такъ какъ по направленію къ послѣдней въ этомъ районѣ вода озера устремляется уже съ достаточною силою для того, чтобы увлечь лодку въ истокъ и раздробить её о многочисленные камни, коль скоро плывецъ не достаточно знакомъ фарватеръ этого опаснаго мѣста.

В) Рѣка Ангара отъ ея истока до устья р. Иркутъ въ Иркутскѣ.

Направленіе этой части Ангары въ общемъ почти точною сѣверо-западное и лишь съ незначительными отклоненіями отъ прямой линіи до самаго Иркутска, въ предѣлахъ котораго только она образуетъ болѣе значительный изгибъ къ с.-в. и принимаетъ тамъ Иркутъ. Ширина рѣки около истока почти равняется верстѣ; ниже Ангара расширяется еще болѣе, въ особенности въ предѣлахъ развитія на ней острововъ.

Значительная быстрота теченія рѣки указывала уже сама собою на соотвѣтственный, слѣдовательно, не малый наклонъ ея дна, оцѣнить который съ надлежащею точностью удалось лишь въ семидесятыхъ годахъ во время производства упомянутой уже выше нивелировки Сибирскаго почтового тракта.

Въ прежнее время, какъ извѣстно, Иркутскъ считали лежащимъ 60-ю сажениами ниже Байкала, <sup>1)</sup>—условіе, при которомъ средній наклонъ русла рѣки долженъ былъ-бы равняться почти сажени на каждую версту. Современемъ, однако, благодаря барометрическимъ наблюденіямъ, произведеннымъ Щукинымъ, Фусомъ, Бунге, Меглицкимъ и Гофманомъ уровень Ангары по средней, вычисленной по этимъ даннымъ Кропоткинмъ <sup>2)</sup>, низведенъ до 92,4' ниже Байкала, послѣ чего, знакомая намъ уже нивелировка Миллера отъ Иркутска до с. Култука уменьшила эту цифру до 88'. <sup>3)</sup> Наконецъ въ 1878 г. <sup>4)</sup> обнародованы результаты нивелировки Краморева, одного изъ членовъ нивелировочной экспедиціи по Сибирскому тракту.

Изъ весьма подробныхъ и точныхъ данныхъ нивелировки Краморева мы знаемъ, что поверхность Байкала превосходитъ уровень Ангары около Троицкаго перевоза (Иркутскъ) 90,380' (27,616 метра), вслѣдствіе чего средній наклонъ поверхности рѣки равняется почти 1,45' на каждую версту.

Кромѣ того нивелировка эта, производившаяся главнымъ образомъ по почтовой дорогѣ, пролегающей по правому берегу Ангары, даетъ для уровня рѣки въ различныхъ мѣстахъ слѣдующія 18 цифръ, вычисленныхъ къ ея поверхности около того же Троицкаго перевоза: а) около деревни Большой Разводной или Разводинской, въ разстояніи 8,58 верстъ отъ Амурскихъ воротъ г. Иркутска, 10,391' (3,168 метр.); б) отъ деревни Щукиной, въ 14,59 вер. отъ тѣхъ же воротъ, 4,799 м.); в) противъ перваго верстового столба за стѣной Патронной, въ 18,28 верстахъ отъ города (счетъ

<sup>1)</sup> Sievers, Sibirische Briefe 1796.

<sup>2)</sup> Кропоткинъ, Зап. И. Р. Геогр. Общ. Т. III. 1873. Сборникъ выт. т. I.

<sup>3)</sup> Кропоткинъ, I. с.

<sup>4)</sup> Краморовъ, Изв. Сиб. Отд. И. Р. Геогр. Общ. Т. IX № 3—4, 113.

все отъ Амурскихъ воротъ)—20,<sup>625</sup>' (6,<sup>288</sup> м.); г) при устьѣ рч. Верхней Уладовой, въ 24,<sup>69</sup> верстахъ отъ города, 28,<sup>634</sup> (8,<sup>730</sup> м.); д) около заимки крестьянина Пайсова, въ 28,<sup>35</sup> верстахъ отъ Иркутска, 35,<sup>385</sup>' (10,<sup>788</sup> м.); е) у деревни Молодаго, въ 35,<sup>23</sup> верст. отъ города, 40,<sup>992</sup>' (12,<sup>498</sup> м.); ж) около Тальцинской фабрики въ 44,<sup>5</sup> верст. отъ Иркутска, 53,<sup>238</sup> (16,<sup>257</sup> м.); и) при устьѣ рч. Черной, около  $\frac{3}{4}$  версты выше предшествовавшаго пункта, 53,<sup>471</sup>' (16,<sup>803</sup> м.); i) около 8-го верстового столба за Фабрикою, въ разстояніи 53 версты отъ города, 72,<sup>485</sup>' (22,<sup>099</sup> м.); к) противъ 10-го верстового столба за Фабрикою, слѣдовательно, спустя 2 версты, 76,<sup>322</sup> (23,<sup>332</sup> м.); л) далѣе, спустя 376 метра, 76,<sup>709</sup>' (23,<sup>387</sup> м.); м) противъ телеграфнаго столба № 194, спустя 500 метровъ отъ предшествовавшаго пункта, 78,<sup>01</sup>' (23,<sup>784</sup> м.); н) спустя еще 308 метровъ, 78,<sup>932</sup>' (24,<sup>008</sup> м.); о) противъ церкви села Никольскаго (Никольская пристань), въ 59,<sup>39</sup> верстахъ отъ Иркутска, 85,<sup>795</sup>' (26,<sup>157</sup> м.); п) противъ заимки Шамшурина, т. е. спустя нѣсколько болѣе 1,<sup>5</sup> версты 87,<sup>381</sup>'; р) противъ Шаманскаго камня, т. е. скалы располагающейся почти въ самомъ мѣстѣ истока, менѣе версты выше предшествовавшаго пункта, 88,<sup>819</sup>' (27,<sup>079</sup> м.); с) спустя еще 302 метра, 89,<sup>177</sup>' (27,<sup>249</sup> м.); наконецъ т) при выходѣ рѣки изъ Байкала, т. е. въ разстояніи 62 версты отъ Амурскихъ воротъ въ Иркутскъ, 90,<sup>126</sup>' (27,<sup>447</sup> м.); тогда какъ уровень Байкала, какъ сказано выше, опредѣленъ въ 90,<sup>390</sup>' (27,<sup>618</sup> м.) надъ Троицкимъ перевозомъ.

Изъ всѣхъ цифръ этихъ очевидно, что при общемъ наклонѣ поверхности Ангарты, недостигающемъ полутора фута на одну версту, паденіе интересующаго насъ отръзка рѣки отличается не вездѣ одинаковою силою. Такимъ образомъ на протяженіи первыхъ 27 версты выше г. Иркутска, до Молодаго, средній наклонъ равняется 1,<sup>8</sup> на версту и потому больше, нежели въ остальной верхней части течения, гдѣ наклонъ достигаетъ только 1,<sup>16</sup>; не смотря на то, что

значительное паденіе свойственно одному участку, именно той верхней части рѣки, въ промежуткѣ между селомъ Никольскимъ и Тальцинскою фабрикою, гдѣ, на протяженіи около 15 верстъ, средній наклонъ достигаетъ 2,2' на версту, тогда какъ между Байкаломъ и Никольскимъ онъ равняется только 1,44', приближаясь слѣдовательно къ среднему паденію всей рѣки до Иркутска. Глубина главнаго фарватера достигаетъ 3 и 5 сажень, причемъ, даже въ самыхъ мелкихъ мѣстахъ, онъ все-таки доступенъ какъ для большихъ рыбопромышленныхъ судовъ, такъ и для рѣчныхъ пароходовъ. Обстоятельство это при быстротѣ, обусловленной столь значительнымъ паденіемъ русла, дѣлаетъ плаваніе внизъ по рѣкѣ весьма удобнымъ и до того скорымъ, что простая лодка можетъ достигнуть Иркутска въ 6 часовъ, хотя плаваніе это требуетъ вмѣстѣ съ тѣмъ осторожности и хорошаго знакомства съ фарватеромъ, во избѣжаніе опасностей на меляхъ,стринахъ, а въ особенности при самомъ входѣ изъ Байкала въ Анггару. Входъ этотъ, на протяженіи около полуверсты, преграждается грядою подводныхъ камней, часть которыхъ выдается мѣстами и надъ поверхностью рѣки. Одинъ изъ такихъ камней отличается отъ всѣхъ прочихъ размѣрами, достигаящими нѣсколькихъ кубическихъ сажень и расположеніемъ почти по срединѣ рѣки, нѣсколько ближе къ ея лѣвому берегу. Скала эта около 7 сажень въ окружности, выдающаяся надъ водою всего лишь на сажень, знакома местнымъ жителямъ подъ названіемъ Шаманскаго камня. Она, какъ извѣстно еще изъ болѣе древней литературы, <sup>1)</sup> была почитаема ламами и шаманами какъ мѣсто-пребыванія *Санг-саганъ-ноина*, т. е. непобѣдимаго блага божества, которому они и приносили жертвы на этомъ камнѣ. Говорятъ также, что буряты, въ нѣкоторыхъ крайнихъ случаяхъ,

<sup>1)</sup> Klaproth, Description du lac. Baical trad. d. Russe въ Nouv. Ann. Voyages. Т. XXVII.



приводились къ присягѣ на этомъ камнѣ. Въ настоящее время, однако, когда бурятское населеніе совершенно оттѣснено какъ отъ истока Ангары, такъ отъ всего интересующаго насъ теченія ея, когда ихъ нѣтъ уже почти вкругъ всей юго-западной части Байкала, все выше сказанное переходитъ уже въ область преданій. Пребайкальскіе буряты, перечисляя Черскому мѣста, считаемыя ими священными, даже не упомянули о Шаманскомъ камнѣ, переходящемъ, по всей вѣроятности, уже въ категорію почти обыкновенныхъ скалъ, которымъ, какъ извѣстно, буряты нерѣдко приносятъ жертвы. По своему расположенію на границѣ двухъ различныхъ водныхъ областей (озерной и рѣчной), завѣдуемыхъ по ихъ воззрѣнію и различными духами (божествами), камень этотъ, впрочемъ, могъ бы производить всегда особенное впечатлѣніе на путешественника-шаманиста, входящаго изъ Байкала въ Ангару, даже въ то время, если бы онъ не былъ знакомъ со связаннымъ съ нимъ преданіемъ, но ничтожная величина его въ сравненіи съ шириною истока Ангары, какъ равно и бѣлый цвѣтъ обнаженнаго въ немъ известняка, дѣлаютъ камень иногда даже незамѣтнымъ, въ особенности при нѣкоторыхъ условіяхъ освѣщенія. Не зирая на то, среди нѣкоторой части русскаго, впрочемъ повидимому только Иркутскаго населенія, до сихъ поръ еще можно слышать мнѣніе, придающее крайне преувеличенное значеніе Шаманскому камню въ дѣлѣ задерживанія притока воды изъ озера въ Ангару. По ихъ мнѣнію судьба г. Иркутска связана съ цѣлостью этого камня, отъ разрушенія котораго предполагается наводненіе, способное затопить весь городъ!—Порогъ, образуемый описанною грядою камней, проплываетъ съ мѣстными лодчанами и ближе къ правому берегу истока доступенъ какъ для большихъ рыбопромышленныхъ судовъ, такъ и для рѣчныхъ пароходовъ, тогда какъ около лѣваго берега, гдѣ дно рѣки гораздо глаже, но зато мельче, спускаются лодки и плоты. Порогъ этотъ, во всякомъ случаѣ, не призна-

лежитъ еще къ большимъ и на столько опаснымъ, какими изобилуетъ Ангара ниже г. Иркутска, или Иркутъ въ знакомъ намъ ущельѣ, и его никакъ нельзя сравнивать съ водопадомъ, какъ это дѣлалось нѣкоторыми прежними писателями; напротивъ, благодаря болѣе равномерному распределенію камней, онъ относится скорѣе къ высшей степени развитія быстринь, называемыхъ въ Сибири шиверами. Кроме того, на пути къ Иркутску, имѣются еще рядъ незначительныхъ впрочемъ быстринь.

Описываемый отрѣзокъ Ангара отличается бѣдностью лѣсныхъ притоковъ, изъ которыхъ заслуживаютъ вниманія только: Ланка, болѣе 10 верстъ длины, съ устьемъ въ 14 верстахъ отъ Байкала, затѣмъ рч. Курма, и наконецъ Иркутъ. За то съ правой стороны въ нее изливаются многочисленные ключи и рѣчки, какъ-то: Банныя, именовавшаяся во времена Палласа Окарамыкомъ, съ устьемъ около села Никольскаго (Никольская застава или пристань), Распѣиха, Никулиха, Большая и Черная, впадающія всѣ выше устья Ланки; затѣмъ Тальца, на устьѣ которой построена упомянутая выше Тальцинская стеклянная фабрика, Грязнуха, Бурдугусъ, Бартанова и Карлодокъ, изливающимися выше устья р. Курмы, и наконецъ двѣ Уладовы, Еловка, нѣсколько небольшихъ ключковъ съ названіями, не вошедшими въ литературу, и Ушаковка, впадающая уже въ предѣлахъ г. Иркутска. Эта послѣдняя представляетъ собою самый значительный правый притокъ (около 60 верстъ длины), берущій начало на юго-востоку изъ Оногскаго хребта. Съ ея теченіемъ, какъ равно и съ другими изъ названныхъ рѣчекъ, которые были описаны нами либо изъ путешественниковъ, мы ознакомимся впоследствии. Затѣмъ, по величинѣ, слѣдуютъ: Большая, Корамъ и Тальца, превышающія 20 верстъ въ длину.

Еще со временъ путешественниковъ истекшаго столѣтія,

сочиненіями которыхъ пользовался и Риттеръ <sup>1)</sup>), было извѣстно, что мѣстность, окружающая долину Ангары, вообще не высокая и только ближе къ Байкалу, выше устья рч. Банной (Озаралыкъ Палласа), т. е. почти въ  $2\frac{1}{2}$  верстахъ отъ истока, горы замѣтно возвышаются, стѣсняя собою русло рѣки. Тоже подтвердили и всѣ послѣдующіе изслѣдователи (Гессъ, Эрманъ, Гофманъ, Макеровскій, Меглицкій, Чекановскій, Черскій), изъ которыхъ Меглицкій указалъ на постепенный переходъ очертаній этихъ горъ въ контуры болѣе низкихъ частей мѣстности, лежащей къ сѣверу и с.-з. отъ нихъ. Обстоятельство это, по замѣчанію Черскаго <sup>2)</sup>), обнаруживается впрочемъ лишь тогда, если обращать вниманіе не на болѣе рѣзкія различія гипсометрическихъ уровней вблизи отъ рѣки, а смотрѣть вдаль, по направленію верховьевъ правыхъ притоковъ, иначе мы увидимъ, что долины послѣднихъ, въ особенности ближе къ Байкалу, значительно удаляютъ склонъ горъ, который затѣмъ приближается къ рѣкѣ, какъ бы мгновенно вырастая около дороги. Черскимъ же произведены и барометрическія измѣренія этихъ горъ по обѣ стороны рѣки, отъ Байкала до широты устья рч. Ланки. Изъ этихъ наблюденій (см. ниже) оказывается, что высота ближайшихъ пунктовъ по лѣвому берегу Ангары колеблется отъ 574 до 377' надъ уровнемъ озера, а на правомъ берегу отъ 887 до 1432' н. Байк., въ нѣкоторомъ отдаленіи отъ рѣки. Такая высота, очевидно, достаточно уже выходитъ за предѣлы какъ средней цифры высоты высшей террасы плоской возвышенности (189' надъ Байкаломъ), такъ даже и извѣстнаго для этихъ поръ ея гипсометрическаго максимума (467' н. Байк. см. выше), между тѣмъ какъ ниже Ланки и до Иркутска высота мѣстности колеблется отъ 370 до 83' и менѣе надъ озеромъ. Поэтому Черскій принимаетъ, что въ предѣлахъ теченія Ангары высшая терраса плоской возвышенности распро-

---

<sup>1)</sup> Риттеръ, Землеуѣдѣніе Азіи.

<sup>2)</sup> Черскій, Рукописныя замѣтки о Сибири.

спускается отъ Иркутска къ югу и юго-востоку до широты устья рч. Ланки или до Тальцинской фабрики, гдѣ она примыкаетъ къ горамъ, вѣрнѣе довольно постепенно сливается съ прилежащимъ ихъ склономъ, и только по самому руслу Ангарты и ближайшимъ частямъ склоновъ ея долины возвышенность эта соединяется съ Байкаломъ.

Такимъ образомъ, ширина полосы горъ, пересекаемыхъ рѣкою при выходѣ ея изъ Байкала, не превосходитъ 15 верстъ, причемъ на всемъ этомъ протяженіи горы почти непосредственно примыкають къ лѣвому берегу Ангарты, тогда какъ къ правому онѣ подступаютъ и стѣсняють рѣку только на первыхъ двухъ верстахъ отъ озера, гдѣ и почтовая дорога проложена уже по террасовидному уступу, высотой до 30' и 40' надъ уровнемъ рѣки.

Къ столь же отдаленнымъ временамъ относятся и первыя свѣдѣнія о *геоморфическомъ строеніи* описываемой части долины Ангарты. Самое обстоятельное изъ этихъ свѣдѣній принадлежитъ академику Гессу <sup>1)</sup>, отчетомъ котораго пользовался К. Риттеръ. Онъ сообщаетъ, что на пути отъ Иркутска къ Байкалу сначала развитъ мелкозернистый песчаникъ съ распространѣніемъ съ запада на востокъ и паденіемъ къ сѣверу; южнѣе, на югъ отъ Иркутска, залегаетъ конгломератъ изъ гранита, кварца, валуновъ полевого шпата, скрѣпленныхъ мелкимъ песчаникомъ, имѣющимъ съ верхнимъ песчаникомъ «одинаковое напластованіе». Но къ истоку Ангарты конгломератъ сѣняется гранитомъ, который и перерѣзывается рѣкою; южнѣе, у самаго озера онъ переходитъ въ гнейсовый гранитъ съ распространѣніемъ отъ востока къ западу или отъ с.-в. къ ю.-з.

Свѣдѣнія эти упущены были изъ виду Эрманомъ, полагавшимъ, что конгломератъ по Ангартѣ достигаетъ Байкала, но нашли затѣмъ въ общемъ полнѣйшее подтвержденіе въ

---

<sup>1)</sup> Leonhards Zeitschrift für Mineralogie 1827, Th. II, p. 321—348, и Журн. Горн. 1828, ч. III.

наблюденіяхъ всѣхъ послѣдующихъ путешественниковъ, о которыхъ мы упомянули выше. Гофманъ и Макировскій съ точностью обозначили мѣсто выхода полевошпатовыхъ породъ, именно, южнѣ села Никольскаго (выше устья рч. Банной), т. е. въ  $2\frac{1}{2}$  верстахъ отъ истока, и отличили въ нихъ гнейсогранитъ, переходящій въ сіенитъ, причемъ обѣ породы прерываются діоритомъ (грюнштейномъ), по ихъ мнѣнію изверженнымъ. Песчаникъ этотъ и конгломератъ они, какъ и Эрманъ и Меглицкій, относили къ каменноугольной формации, основываясь, впрочемъ, на одномъ лишь присутствіи въ немъ флечовъ бурога угля. Чекановскій, на основаніи найденныхъ имъ ископаемыхъ остатковъ, отнесъ осадки эти къ прѣсноводной юрѣ. Онъ первый распространилъ изслѣдованіе и на большую часть длины лѣваго берега рѣки, гдѣ юрскіе осадки на его картѣ распространяются къ югу до рч. Ланки и тамъ смѣняются полевошпатовыми породами, полоса которыхъ на лѣвомъ берегу отличается поэтому гораздо большею шириною (15 верстъ), нежели на правомъ ( $2\frac{1}{2}$  версты); полоса эта впрочемъ осталась имъ неизслѣдованною.

Но самый интересный вопросъ геологіи, именно, какъ относились юрскія воды къ мѣсту современнаго истока Ангары, даже вопросъ о томъ, представляютъ ли упомянутыя выше полевошпатовыя породы образованіе болѣе древнее, нежели юрскій песчаникъ,—оставался неразрѣшеннымъ, такъ какъ Гофманъ, основываясь, впрочемъ, не на фактическихъ данныхъ, полагалъ, что прибайкальскій гнейсъ могъ произойти отъ дѣйствія на него изверженнаго зеленого камня.—Чекановскому, между тѣмъ, не удалось поставить этотъ вопросъ на болѣе прочную почву, въ особенности потому, что нѣкоторые недоразумѣнія располагали его принять ту же гипотезу, и подтвердивъ ее стратиграфическими наблюденіями. Въ такомъ состояніи находились свѣдѣнія наши въ этомъ отношеніи, когда Черскій предпринялъ изслѣдованіе Ангарской долины.

обращая, главнымъ образомъ, вниманіе на пересѣкаемую ею часть горъ и начавъ съ лѣваго берега рѣки. Берегъ этотъ на протяженіи первыхъ 5 верстъ отъ истока круто опускается къ рѣкѣ, пересѣкаясь тремя сухими долинами, изъ которыхъ первая, ближайшая къ истоку, называется Устьяновскою, а третья отличается тѣмъ, что устье ея открывается на высотѣ около 28' надъ рѣкою. Вслѣдъ за доломитомъ мыса лѣваго берега истока, гдѣ, около знакомой намъ уже Караулки, мысъ этотъ достигаетъ 409' надъ ур. Байк., въ обнаженіяхъ вообще поросшаго растительнымъ покровомъ склона наблюдается все тотъ же роговообманковый гнейсъ, который распространенъ и по берегу Байкала. Изогнутые его слои падаютъ то на ю.-ю.-в., то на с.-с.-в. Судя по обломкамъ, покрывающимъ склонъ, порода эта продолжается и за Устьяновскою долиною, переходя мѣстами въ сіенито-гранитъ и измѣняя цвѣтъ отъ сѣраго до краснаго; далѣе неясная слоистость является до того изогнутою, что мѣстами слои лежатъ почти горизонтально, и только за третьею долинкою обнаруживается наклонъ пластовъ на с.-з.  $15^{\circ}$  до  $60^{\circ}$ , на с.-з., затѣмъ ю.-в. и в.-ю.-в. до  $30^{\circ}$ . Изъ гнейса состоитъ и ближайшій высшій пунктъ горъ, на который поднялся Черскій: это былъ параллельный Ангарту гребневидный отрогъ до 564' надъ озеромъ, образующій правый берегъ вѣтви долины Сосновой, которая открывается въ Ангарту насупротивъ перваго сѣ острова, на 6-й верстѣ отъ истока. Не взирая на такой составъ отрога, къ его основанію и до высоты 5—6 футовъ со стороны Ангарты примыкаютъ въ нѣсколькихъ мѣстахъ уцѣлѣвшіе отъ размыва части конгломерата, перемежающагося съ прослойками песчаника. Галька этой породы, рѣдко достигающая 0,1 метр. въ діаметръ, состоитъ изъ гнейсовъ и гранитовидныхъ породъ, безъ видимой примѣси порфира, цементъ же, какъ равно и песчаникъ, отличаются зеленоватымъ цвѣтомъ и содержатъ неясные, впрочемъ, отпечатки растений. Стратиграфическое положеніе пластовъ оказалось

неопредѣлимымъ. Устье долины Сосновой проложено въ гнейсѣ, изъ котораго состоитъ и высшій пунктъ водораздѣльнаго отрога между нею и долиною Гробихи, впадающей нѣсколько ниже того же острова, выше котораго встрѣчены первые выходы описанной обломочной породы. Но ближе къ Гробихѣ, со стороны Ангары, опять наблюдается такой-же конгломератъ съ песчаникомъ; онъ содержитъ здѣсь примѣсь плохо обточенныхъ элементовъ и тонкій пропластокъ бурого угля, причемъ цвѣтъ его переходитъ мѣстами и въ сѣрожелтый. Паденіе пластовъ измѣняется отъ южнаго до ю.-ю.-в. съ наклономъ въ  $30^{\circ}$ . Таже порода съ преобладаніемъ песчаника наблюдается и на обоихъ берегахъ низовьевъ долины Гробихи, ниже которой пласты ея наклонены на ю.-ю.-з. подъ угломъ  $45^{\circ}$  и содержатъ прослойки глинистаго сланца; въ нихъ Черскій нашелъ отпечатки юрскаго папоротника (*Asplenium withbiense*), а въ составѣ гальки конгломерата найдены кроме того и куски глинистаго сланца въ родѣ описаннаго выше на Смоленскомъ Ключикѣ (системѣ Олхи), или-же развиты около Байкала восточнѣе истока и въ Онотскомъ хребтѣ (сѣвернѣе). Юрскій песчаникъ, измѣняясь въ цвѣтъ отъ темноты зеленовато-сѣраго до сѣро-желтаго и буро-желтаго, перемежаясь мѣстами съ конгломератомъ и воспринимая иногда флещи бурого угля (напр. около долины Холодной, въ видѣ Тальцинской фабрики), сопровождаетъ уже путешествіе отсюда до самаго Иркутска, по направленію къ которому пласты его принимаютъ горизонтальное положеніе. Въ томъ, однако, что кристаллическія породы развиты еще въ сторонѣ отъ Ангары, убѣждаетъ экскурсія Черскаго вверхъ по упомянутой выше долинѣ рѣчки Ланки, впадающей съ лѣвой стороны нѣсколько выше Тальцинской фабрики. Низовья этой довольно широкой долины, на протяженіи болѣе 3 верстъ, обнажены пластами одного лишь темнаго зеленовато-сѣраго песчаника, прослойками конгломерата и наклономъ слоевъ на ю.-в. Замѣтно въ эту долину, принимающую названіе Прямой Ланки,

падасть ея лѣвая вѣтвь вообще съ сѣвера, называемая Кривою Ланкою. По обѣимъ сторонамъ устья этой послѣдней обнажается уже неяснослоистый роговообманковый гнейсъ, развитый съ основанія до высшихъ пунктовъ береговыхъ горъ, гдѣ на лѣвомъ берегу низовьевъ этой долины Черскій нашель еще пластъ кристаллическаго известняка съ кварцевыми жилами, причѣмъ неяснослоистая порода эта обнаруживаетъ наклонъ пластовъ повидимому на сѣверъ. Въ верхнемъ теченіи долина Кривой Ланки расширяется и въ расширеніе это открываются оба ея верховья: правое и лѣвое. Вообще попизившіяся горы въ этомъ мѣстѣ отличаются неодинаковыми топографическими и петрографическими особенностями, именно: горы праваго берега выше (около 45°) и круче опускаются къ долинѣ, обнажая неяснослоистый гнейсъ, между тѣмъ какъ на склонѣ болѣе низкихъ, многихъ и поросшихъ горъ лѣваго верховья и лѣвой стороны расширенія, отдѣляющихъ его отъ Ангары, Черскій ходилъ только куски юрскаго песчаника и конгломерата. Уже обломочныя породы образуютъ собою и дно долины, такъ какъ онѣ встрѣчены здѣсь шурфами золотоискателей (1877 г.). Въ наносѣ, покрывающемъ это дно, найдено золото, но въ количествѣ, не оплачивающемъ выработку; все золото находится вполне освобожденнымъ отъ коренной породы и потому не позволяло судить съ достовѣрностью о его мѣсторожденіи, особенно потому, что, какъ мы увидимъ ниже, металлъ въ содержится около Байкала не только въ древнѣйшихъ кристаллическихъ породахъ, но и въ юрскомъ конгломератѣ.

Въ противоположность такой ширинѣ полосы кристаллическихъ породъ (до 15 верстъ), къ западу отъ русла Ангары, на правомъ ея берегу онѣ, какъ сказано выше, распространяются только на 2½ версты внизъ отъ истока, именно до праваго берега низовьевъ рч. Банной, ниже устья которой располагается с. Никольское. Пространство это образуется главнымъ склономъ горъ, расчлененнымъ долиною Медвѣжьей



падъ на два отрога. Изъ нихъ южный, т. е. ограничивающій Медвѣжью съ лѣвой стороны, извѣстенъ подъ названіемъ Бѣлый камень, отъ бѣлющаго на его ближайшей вершинѣ утеса. Между тѣмъ сосѣдній, сѣверный отрогъ отдѣляетъ Медвѣжью падъ отъ долины рч. Банной. Поросшіе смѣшаннымъ лѣсомъ отроги эти склоняются своими оконечностями къ Ангарту, около которой они опоясаны террасовидными уступами, вообще круто или почти отвѣсно опускающимися къ рѣкѣ. Сѣверный уступъ, т. е. между Банною и Медвѣжьей въ низовьяхъ которой построена заимка Шамшуринъ, возвышается всего лишь около 30' надъ Ангарию, тогда какъ около склона отрога Бѣлаго камня, уступъ этотъ представляетъ уже настоящую террасовидную площадь, болѣе или менѣе покатую къ водѣ. Площадь эта опоясываетъ собою весь правый берегъ истока рѣки, переходя и на ближайшую часть берега Байкала, гдѣ она достигаетъ болѣе 40' высоты; и на ней, со стороны озера, построена Таможенная застава. По обоимъ названнымъ уступамъ пролегаетъ почтовая дорога къ селу Лиственичному, избѣгая съузившагося здѣсь прибрежія рѣки, которая въ высокую воду непосредственно омываетъ собою скалистыя основанія ихъ склоновъ. Въ неясныхъ и осыпанныхъ обнаженіяхъ около дороги, какъ равно въ болѣе поучительныхъ утесахъ около уровня рѣки, въ предѣлахъ этихъ уступовъ, обнаруживаются именно тѣ полевошпатовыя породы, о которыхъ сказано было выше.

По замѣчанію Черскаго всѣ онѣ, какъ массивныя, такъ и слоистыя, относятся къ видоизмѣненіямъ толщи рожего обманковаго гнейса, переходящаго мѣстами въ сіенито-гранитъ и воспринимающаго пироксенъ, причемъ иногда попадаются здѣсь и ложныя включенія, съ которыми мы ознакомились по пути отъ Култука. Ближе къ Байкалу пласты гнейса падаютъ на с.-з. Восхожденіе на отрогъ Бѣлаго камня обнаруживаетъ сначала тѣже породы, въ болѣе совершенныхъ выступахъ которыхъ пласты падали очень круто на ю.-ю.-з., но ближайшіе

вершина, давшая названіе отрогу, обнажаетъ кристаллическій доломитъ, содержащій пироксенъ. Вершина эта достигаетъ, въ опредѣленіи Черскаго, 430' надъ Байкаломъ. Она является короткимъ гребнемъ, отдѣленнымъ отъ болѣе высокой части трога сѣдловиною. Съ нея открывается красивый видъ на потокъ ангары съ бѣлѣющимъ среди него Шаманскимъ камнемъ. На з.-ю.-з. (вѣрнѣе з.-ю.  $30^{\circ}$ ) отсюда виднѣется мысъ лѣваго берега истока (гдѣ караулка), въ которомъ залегаетъ кристаллическій доломитъ, а обстоятельство это, при отсутствіи этой породы ниже по теченію рѣки до самой Ланки, заставляетъ полагать, что доломитъ Бѣлаго камня составляетъ самое продолженіе доломита караулки, и что, не взирая на ступенчатые изгибы и неправильности въ направленіи пластовъ, наблюдаемыхъ здѣсь въ отдѣльныхъ выходахъ и обнаженіяхъ, господствующимъ простираніемъ слѣдуетъ считать здѣсь, т. е. истока Ангары, в.-с.  $30^{\circ}$  — з.-ю.  $30^{\circ}$  или в.-с.-в., хотя состороны караулки, около с. Лиственичнаго, оно, какъ мы увидимъ ниже, выходитъ въ з.-с.-з. до с.-з. Далѣе, на пути отъ Бѣлаго камня высшей точкѣ этого отрога, въ плоскихъ выступахъ можно виднѣется (паденіе повидимому ю.-ю.-з.), а такъ-же и довольно значительный выходъ синеватаго кварца, тонкая плитковатость котораго указываетъ какъ бы на наклонъ слоевъ вообще къ сѣверу, а иногда и къ западу; наконецъ по достиженіи высшаго пункта (высота его была опредѣлена въ 899' надъ озеромъ). Шаманскій камень видѣнъ былъ отсюда на з.-ю.  $20^{\circ}$ . Къ югу отъ восточнаго отрога склоняется къ такъ называемой Каменной падди (падъ, какъ сказано выше, означаетъ долину), принадлежащей уже Байкалу; долина эта выходитъ на прилегающую къ отрогу террасу лѣваго берега истока, но самая высокая ея часть поворачиваетъ къ югу, изливая воды незнакомаго ручейка въ Байкалъ. На правомъ берегу этой долины находится упомянутая выше таможня, къ которой мы перейдемъ при дальнѣйшемъ описаніи берега озера и восточнаго берега Ангарской бухты, теперь-же перейдемъ къ берегу

рѣки ниже устья рч. Банной. Начиная съ праваго берега низовьевъ этой долины и до Тальцинской фабрики кристаллическія породы смѣняются юрскимъ конгломератомъ, развитымъ и вверхъ по рч. Банной, какъ это мы увидимъ при описаніи маршрута Черскаго съ р. Голоустной. Утесъ конгломерата можно видѣть и около почтоваго тракта нѣскольکو южнѣе Тальцинской фабрики (такъ называемый Черный камень), ниже которой конгломератъ уходитъ подъ уровень рѣки, покрываясь желтоватымъ песчаникомъ.

Конгломератъ этотъ отличается отъ развитаго на лѣвомъ берегу Ангары до рч. Ланки только тѣмъ, что онъ не бѣденъ гальками полевошпатоваго порфира, переходящаго съ вернѣе Ланки и на противоположную сторону рѣки, какъ это мы видѣли въ системѣ Курмы. Въ немъ точно также попадаются и куски глинистаго сланца, въ особенности вдалека отъ дороги (напр. на рч. Большой, см. ниже) и кварцы принадлежащихъ толщъ породъ, относимыхъ Черскимъ къ силурійской или гуронской системѣ. Конгломератъ, тѣмъ не менѣе, не образуетъ собою здѣсь нижняго или же средняго яруса юрскихъ осадковъ, какъ это предполагали прежде (Меглицкій, Чекановскій), но въ роли прибрежнаго отложения онъ сначала перемежается съ болѣе мелкими породами разрушенія, а затѣмъ и переходитъ въ песчаникъ развитый далѣе до Иркутска, гдѣ Чекановскимъ найдены этихъ пластахъ отпечатки юрскихъ растений.

Основываясь такимъ образомъ на нахожденіи въ горахъ юрскаго конгломерата различныхъ видоизмѣненій гранитовидныхъ, такъ и гнейсовидныхъ породъ, а также сланцевъ, принадлежащихъ пластамъ силурійскаго возраста, которыхъ, по Иркуту, мы въ свою очередь видѣли гальку заимствованную изъ прилежащихъ гнейсовъ, можно уже заключить, что послѣдніе и здѣсь принадлежатъ къ самой молодой и древнѣйшей толщѣ породъ, непокидавшей насъ начиная съ меридіановъ Мунку-Сардыка и р. Оки, чему

в востокѣ мы найдемъ еще нагляднѣйшія доказательства. Поэтому Черскій заключаетъ, что на мѣстѣ современнаго стока р. Ангары древнѣйшія гнейсовыя горы съуживались въ до-юрское время до  $2\frac{1}{2}$  верстъ и въ такомъ видѣ омылись озерными водами юрскаго періода. Проложенная въ этихъ осадкахъ долина Ангары представляетъ на интересующемъ насъ протяженіи нѣсколько озеровидныхъ расширеній значительныхъ размѣровъ, мѣстами съ весьма отчетливо выраженными террасами, возвышающимися отъ 35 до 40' надъ современнымъ уровнемъ рѣки. Въ этихъ террасахъ, какъ равно и на обнаженныхъ склонахъ долины вообще, можно видѣть, что на различныхъ уровняхъ надъ горизонтомъ рѣки юрскіе слои покрываются болѣе или менѣе толстымъ (до 10 и болѣе футовъ) слоемъ довольно крупной и мелкой гальки, въ которой, около Иркутска, Черскій добылъ остатки мамонта (*Elephas primigenius*); кромѣ того слой этотъ покрывается еще вообще довольно тонкимъ (менѣе 10') покровомъ глины, носящаго всѣ признаки наземнаго отложенія, извѣстнаго подъ названіемъ лёсса. Въ этомъ послѣднемъ, кромѣ ископаемыхъ раковинъ, Черскій находилъ около города многочисленные остатки вымершихъ и современныхъ имъ нынѣ живущихъ млекопитающихъ, какъ-то: мамонтъ, носорогъ, два вымершихъ быковъ (*B. priscus* et *primigenius*), сѣверный олень и т. п. Такимъ образомъ, фауна наносовъ какъ Ангара, такъ и Иркутъ (см. выше) принадлежитъ одному и тому же постплиоценовому періоду, а обстоятельство это не согласуется съ воззрѣніями Меглицкаго (*loc. cit.*) на время образованія этой долины. По мнѣнію этого геолога, основанному, впрочемъ, на весьма недостаточномъ количествѣ данныхъ, верховье р. Ангары составляло прежде теченіе р. Ангары, тогда какъ Байкалъ оставался безъ стока, на мѣстѣ современной верхней части Ангары (между Иркутскомъ и Байкаломъ) существовалъ незначительный правый притокъ Ангары въ видѣ ручейка съ верховьями, отступающими въ

сторону нынѣшняго истока озера, гдѣ горы достигали сравнительно незначительной высоты. Тѣмъ временемъ воды Байкала, уровень которыхъ, по мнѣнію Меглицкаго, превышалъ современную ихъ поверхность всего лишь на 10 футовъ воспользовались низшимъ мѣстомъ прибрежныхъ горъ и проникли въ русло упомянутаго праваго притока Иркута. Такимъ образомъ, подъ вліяніемъ сильнаго напора воды со стороны озера и чрезвычайной быстротѣ, съ которою она устремилась въ сторону нынѣшняго устья Иркута, должны были произойти всѣ особенности описываемаго отрѣзка долины Ангара, а такъ какъ образованіе его Меглицкій относитъ къ современному отдѣлу послѣдтретичной эпохи, то поэтому въ наносахъ этой части рѣки, въ противоположность отложеніямъ Иркута, не хожденіе костей вымершихъ млекопитающихъ животныхъ не предполагалось. Послѣ всѣхъ вышеизложенныхъ свѣдѣній можно однако, что, не взирая даже на отрицательный характеръ палеонтологическихъ находокъ, гипотеза эта лишена также и геогностическихъ данныхъ, такъ какъ строеніе Ангарской долины не даетъ еще прямыхъ указаній для сужденія ни о способѣ, ни о времени ея возникновенія и только изученіе такихъ подробностей состава байкальскихъ горъ съ которыми Меглицкій не успѣлъ ознакомиться, бросаетъ какъ мы увидимъ ниже, нѣкоторый свѣтъ на этотъ вопросъ.

По мѣрѣ удаленія отъ Байкала исчезаютъ и густые хвойные лѣса отступая въ сторону отъ долины, къ верховьямъ или верхнимъ теченіямъ притоковъ Ангара, хотя по лѣвому берегу рѣки лѣса эти продолжаютъ гораздо болѣе къ сѣверу именно до окрестностей устья Курмы. Въмѣсто нихъ появляется березнякъ и вообще лиственные пролѣски, луга, мѣста, удобныя для хлѣбопашества, съ которыми связаны поселенія. Эти послѣднія болѣе обильны и распространены на правомъ берегу рѣки южнѣе, нежели на лѣвомъ. Такимъ образомъ, кромѣ упомянутой выше заимки Шамри на, около долины Медвѣжьей, по правому берегу А

Ангары располагаются: а) село Никольское (или пристань, въ прежнее время «застава»); въ немъ находится церковь во имя Николая Чудотворца, къ которой въ соотвѣтственный праздникъ (9-го мая) ежегодно стекается масса поклонниковъ, предпринимая отдаленныя пѣшеходныя шествія по обѣту; б) Тальцинское село или фабрика устьѣ рч. Тальцы; въ немъ стеклянный заводъ, суконная фабрика и почтовая станція; в) заимка Молодаго; г) заимка Лесневича; д) деревня Пашкова или Пашкѣ, около устья ключа Бартанова; е) заимка Лосева; ж) деревня Патроновская или Патроны, нѣсколько ниже устья р. Еловки; з) дер. Щукина; и) Крыжановская или Крыжановщина; і) Большая Разводная (село Разводинское) и наконецъ к) Малая Разводная. Между селами, на лѣвомъ берегу Ангара, считая сверху внизъ по теченію, располагаются только: а) Михалѣва ниже устья р. Курмы; б) Грудѣнина почти на одной широтѣ съ Патронами; в) Ершова; г) село Кузьмѣха; д) Титова; е) Царь-дѣвица. Кромѣ хлѣбопашества многіе жители занимаются еще гужевымъ промысломъ («тягольщики», т. е. занимающіе вверхъ по Ангарѣ рыбопромышленныя суда при помощи извѣстнаго числа лошадей), сплавомъ лѣса и дровъ, также рыбнымъ промысломъ (такъ называемые «плавальщики»). Строевой лѣсъ рубятъ преимущественно на лѣвомъ берегу Ангара, выше устья р. Курмы, спуская его съ крутого склона на заливную часть долины, какъ въ описанной въ описанной прибрежія Байкала.

Всѣ эти селенія принадлежатъ къ составу Смоленской волости, о которой см. Часть I, стр. 452—455.

## 2) Берегъ Байкала отъ истока р. Ангары до Ольхонскихъ воротъ.

Часть горъ, сопровождающихъ сѣверно-западный берегъ Байкала, отъ выхода изъ него Ангары до острова Ольхонъ занимаетъ полосу болѣе 160 верстъ въ длину, измѣряя по прямому направленію (съ юго-запада на с.-в.) и отъ 60 до 90 верстъ ширины, считая до болѣе или менѣе параллельной Байкалу системы долинъ (р. Куды, притока Ангары и р. Манзурки системы р. Лены), ограничивающихъ эту полосу съ сѣверо-запада и почти съ точностью отдѣляющихъ ее отъ плоской возвышенности. При общемъ обзорѣ Байкала мы говорили уже, что въ составъ этой полосы входятъ хребты: Приморскій, лежащій ближе къ озеру, болѣе высокій и пересѣкаемый истокомъ Ангары, а въ сѣверо-западу, параллельный ему, но болѣе низкій, Онотскій, теряющійся недоходя до праваго берега Ангары. Кроме того, какъ сказано выше, въ промежуткѣ между устьемъ Большой Бугульдейки и Ольхонскими воротами Приморскій хребетъ отдѣляется отъ Байкала еще своеобразною полосой горъ, обратившею на себя вниманіе многихъ изслѣдователей (Георги, Чекановскій, Черскій) и причисленною Черскимъ къ разряду внутри-байкальскихъ горъ (см. ниже).

Рѣки, отводящія воду съ этихъ горъ, принадлежатъ тремъ главнымъ системамъ долинъ, именно: Байкала, Ангары и Лены. Не вдаваясь въ частности, съ которыми мы ознакомимся при спеціальному описаніи маршрутовъ бывшихъ путешественниковъ, перечислимъ и вкратцѣ опишемъ нѣкоторые изъ главныхъ рѣкъ, которыми болѣе или менѣе определяются границы названныхъ хребтовъ. Этимъ значителенъ облегчится возможность ориентироваться при подробномъ описаніи мѣстности, такъ какъ въ долинахъ этихъ рѣкъ мы будемъ имѣть, такъ сказать, знакомыя намъ уже станціи. Наче-

съ системы Байкала, которой принадлежать три главные рѣки: Голоустная, Большая Бугульдейка и Анга.

Голоустная отличается довольно оригинальнымъ направлениемъ долины, достигающей 86 верстъ длины, и впадающей въ озеро въ разстояніи 40 верстъ отъ истока Ангары, считая по прямому направленію. Рѣка эта весьма отчетливо подраздѣляется на три части: верхнюю, среднюю и нижнюю. Верховья ея располагаются въ разстояніи около 75 верстъ на с.-в. отъ истока Ангары (счесть по прямому направленію) и всего лишь въ 2—3 верстахъ отъ береговой линіи озера. Отсюда верхняя часть Голоустной, на протяженіи около 19 верстъ, слѣдуетъ вообще с.-с.-з-му направленію, до устья праваго притока, извѣстнаго подъ названіемъ Зонгутъ. Здѣсь именно начинается среднее теченіе рѣки. Длина это около 42 верстъ, направленіе юго-западное, вслѣдствіе чего долина этой части рѣки пролегаетъ здѣсь параллельно береговой линіи Байкала, въ разстояніи отъ нея на 18—22 версты. Теченіе это (т. е. среднее) важно для насъ въ томъ отношеніи, что имъ опредѣляется здѣсь граница между Приморскимъ хребтомъ, образующимъ лѣвый берегъ долины и Сихотскимъ, слѣдующимъ по ея правому берегу. Наконецъ, нижнее теченіе Голоустной отличается юго-восточнымъ направлениемъ, слѣдовательно почти съ точностью противоположнымъ верхнему, и достигаетъ около 25 верстъ длины, считая съ главными изгибами. Такимъ образомъ верхнее теченіе этой рѣки проложено въ с.-з-мъ склонѣ Приморскаго хребта, тогда какъ нижнее пересѣкаетъ тотъ же хребетъ диаметрально въ противоположномъ направленіи. Изъ числа притоковъ Голоустной упомянемъ теперь только о Нижнемъ Качергатѣ, верховья котораго располагаются верстахъ въ 20 на с.-в. отъ истока Ангары. Рѣчка эта достигаетъ болѣе 20 верстъ въ длину, отличается въ общемъ сѣверо-восточнымъ направлениемъ, слѣдовательно, параллельнымъ Байкалу, протекая отъ него въ разстояніи отъ 10 до 15



версть, и изливается въ нижнюю часть теченія Голоустной съ правой стороны. Въ орографическомъ отношеніи долина Нижняго Качергата играетъ роль средняго теченія Голоустной: она отдѣляетъ нѣсколько сѣзвившійся здѣсь Приморскій хребетъ отъ Онотскаго.

Рѣка Большая Бугульдейка (у бурятъ Тья) впадаетъ въ Байкалъ въ разстояніи до 60 верстъ на сѣверо-востокъ (с.-с.-в.) отъ устья Голоустной. Достигая около 50 верстъ длины, она беретъ начало около осевой линіи Онотскаго хребта и отличается въ общемъ почти южнымъ направлениемъ. Верхняя часть теченія рѣки, до 31 версты в длину, направляется почти съ точностью къ югу и только на протяженіи послѣднихъ 6 верстъ, между устьями рч. Хара-жерги (съ лѣвой стороны) и Тұрунги (съ правой), поворачивается къ юго-западу. Нижняя часть рѣки, между тѣмъ начиная съ устья упомянутой рч. Турунги, направляется на ю.-ю.-в. и, принявъ съ правой стороны рч. Куртунъ, въ 10 верстахъ отъ Байкала, пересѣкаетъ собою Приморскій хребетъ. Изъ притоковъ Бугульдейки для нашей цѣли важны теперь лишь Куртунъ и Хара-жерга. Куртунъ принадлежитъ къ самымъ длиннымъ притокамъ (до 35 верстъ) и интересенъ въ томъ отношеніи, что его правый притокъ, вѣстный подъ названіемъ Хоготъ, беретъ начало въ томъ же озеровидномъ расширеніи долины, въ которомъ лежатъ истоки рч. Зонгутъ, впадающей въ Голоустную въ томъ мѣстѣ гдѣ ея верхнее теченіе переходитъ въ среднее. Поэтому черезъ посредство Зонгута и Хогота, средняя часть долины Голоустной связывается съ долиною Куртуна, передавая и роль границы между интересующими насъ хребтами. Благодаря дугообразному изгибу линіи, образуемой долинами Хогота и Куртуна съ выпуклостью, обращенною къ сѣверу и вслѣдствіе значительнаго поворота низовьевъ Куртуна къ юго-востоку, Приморскій хребетъ измѣняется здѣсь въ ширину сначала отъ 13 до 18 верстъ, а затѣмъ, на мѣстѣ пере-

ченія его Бугульдейкою, суживается до 10 и менѣе верстъ. Путешественникъ, достигшій устья Куртуна, встрѣчаетъ однако на противоположномъ, т. е. лѣвомъ берегу Бугульдейки крутой и почти нерасчлененный склонъ Приморскаго хребта, поворачивающій почти къ сѣверу, вверхъ по долинѣ этой долины, образующей острый уголъ съ низовьемъ Куртуна, и такъ продолжающійся до начала верхняго теченія Бугульдейки, идѣть только вверхъ по упомянутой рч. Хара-жергѣ («Хара» — бурная, «жерга» исковерканное бурятское слово *желма* или *жалма*, т. е. долина) можно видѣть, довольно широкую долину, отворачивающую отъ главной рѣки почти къ востоку. Это весьма интересная сквозная долина, соединяющая Бугульдейку съ долиною р. Анги, приблизившейся къ этому месту на разстояніе всего лишь пяти верстъ (см. ниже). Увеличившаяся здѣсь такимъ образомъ ширина хребта Приморскаго достигаетъ уже 24 верстъ, считая по прямому намеренію.

Рѣка Анга (по бурятски Ахта) имѣетъ не менѣе 70 верстъ въ длину и впадаетъ въ Байкалъ въ 40 верстахъ къ с.-з. отъ Большой Бугульдейки. Ея верховья располагаются въ 27 верстахъ на с.-с.-з. отъ устья и около 25 верстъ отъ береговой линіи озера, считая по ближайшему и прямому разстоянію. По изгибу долины Анга нѣсколько напоминаетъ долину Голоустную. И дѣйствительно, верхняя часть рѣки, называемая Большою Ангою, точно также направляется съ с.-з. на с.-з., только длина ея развѣ немногимъ превышаетъ 10 верстъ; затѣмъ средняя часть, около 32 верстъ длины, въ некоторой степени параллельна Байкалу, направляясь въ нижней половинѣ длины на ю.-з., а въ нижней на ю.-ю.-з., т. е. параллельно теченію Б. Бугульдейки, отъ которой она отдѣляется здѣсь сначала на 7, а затѣмъ и на 5 верстъ; наконецъ, почти съ широты знакомой намъ уже долины Хара-жерги, Анга поворачиваетъ на в.-ю.-в. къ Байкалу, соответствующее нижнему теченію Голоустной, но длина этой части

равняется не менѣе 28 верстъ, въ противоположность короткому верхнему отрѣзку рѣки. Этою, нижнею частью Анга пересѣкаетъ Приморскій хребетъ, сѣверо-западное подножіе котораго, на мѣстѣ перехода верхней части Анги въ среднюю, удаляется отъ Байкала почти на 35 верстъ ближайшаго разстоянія. Изъ притоковъ Анги упомянемъ здѣсь сначала о незначительной рч. Харбагурѣ, берущей начало въ означенной выше сквозной долинѣ Хара-жерги, но протекающей въ діаметрально противоположную сторону, т. е. къ правому берегу Анги, а затѣмъ еще о двухъ рѣчкахъ, именно, о Еланцѣ (на картѣ Черскаго, по ошибкѣ «Еланка») и Уланѣ Бургасѣ. Широкія долины ихъ, Еланцы съ правой, а Уланѣ-Бургаса съ лѣвой стороны, достигая около 15 верстъ длины, сходятся къ Ангѣ съ совершенно противоположныхъ сторонъ, съ с.-в. и ю.-з., располагаясь верстъ около 10-ти отъ береговой линіи озера. Они принадлежатъ къ системѣ долинъ (см. ниже), отдѣляющихъ здѣсь юго-восточный склонъ Приморскаго хребта отъ примыкающей къ нему полосы внутрибайкальскихъ горъ.

Такимъ образомъ линія такихъ долинъ, какъ Нижній Качергатъ, средняя часть Голоустной, Здигуть, Хоготъ и Бугтунъ, часть Большой Бугульдейки, сквозная долина Харажерги и Харбагуры, а наконецъ среднее теченіе р. Анги отдѣляетъ хребетъ Приморскій отъ Онотскаго; точно такъ же другая линія долинъ, именно Куды и Манзурки, расположенная къ сѣверо-западу отъ первой, сопровождаетъ сѣверо-западное подножіе хребта Онотскаго, отдѣляя его отъ продолженія той-же плоской возвышенности, съ которою встрѣчались по Олѣ, Бѣлой, Китою, Иркуту и встрѣтались по Ангарѣ и Ленѣ.

Рѣка Куды (см. ниже) ограничиваетъ интересующую насъ полосу горъ впрочемъ только на протяженіи немногимъ болѣе 50 верстъ и то своею нижнею частью, такъ какъ верхнее теченіе располагается сѣвернѣе и внѣ описываемой

линіи долинъ. Остальныя затѣмъ около 60 верстъ орошаются лѣвымъ притокомъ Куды — Мурино́мъ, слѣдующимъ тому же, юго-западному, направленію и его маленькимъ притокомъ — Баендаемъ. Что же касается сѣверо-восточной части этой линіи, то она занята системою р. Манзурки, лѣваго притока р. Лены, причемъ верхняя, т. е. юго-западная часть этого отрѣзка орошается Куданцею, лѣвымъ притокомъ Манзурки, протекающей только на южной или сѣверо-восточной части долины. Лѣвые притоки Мурина и Куды, какъ равно южныя вѣтви Куданцы и Манзурки, собираютъ воды съ сѣверо-западнаго склона Онотскаго хребта, называемаго иногда и просто Оното́мъ.

Съ подробностями какъ особенностей этихъ хребтовъ, такъ гидрографической ихъ сѣти мы ознакомимся при послѣдовательномъ описаніи маршрутовъ изслѣдовавшихъ ихъ путешественниковъ, въ особенности потому, что почти всѣ маршруты эти исходятъ отъ береговой линіи Байкала, которою мы и займемся въ нижеслѣдующемъ параграфѣ, начавъ описаніе съ праваго берега истока Ангары. Кромѣ упомянутыхъ выше изслѣдователей, проѣзжавшихъ къ Байкалу по правому берегу Ангары (см. выше), берегъ описываемой части озера изслѣдовалъ еще Радде (*loc. cit.*) въ 1855 г., изъ отчетовъ котораго мы будемъ въ свою очередь заимствовать необходимыя свѣдѣнія, придерживаясь впрочемъ описанія Черскаго, какъ наиболѣе подробнаго въ орографическомъ отношеніи.

Берегъ Байкала отъ истока Ангары до устья р. Голоустной.

Отъ праваго берега истока Ангары берегъ Байкала, на протяженіи 5 верстъ, поворачиваетъ дугообразно къ юго-востоку, къ мысу Березовому (2-й Березовый), и образуетъ бою короткую, сѣверо-восточную сторону Ангарской бухты, съ болѣе длинною, сѣверо-западною частью которой мы ознакомились уже выше, на пути отъ Толстаго мыса къ

Ангарѣ. Поросшія преобладающимъ хвойнымъ лѣсомъ горы сохраняютъ тотъ-же характеръ, какъ и со стороны Ангара; главный ихъ вряжъ, вообще довольно плоскій и лѣсистый, не достигающій 1000' н. Байк., тянется параллельно лѣвому берегу рч. Банной, съ запада на востокъ, обращая въ сторону озера склонъ, расчлененный небольшими долинками на отроги (см. ниже). Терраса, съ которою мы ознакомились уже на правомъ берегу истока, переходитъ непосредственно оттуда на эту часть побережія, гдѣ на высотѣ ея, около 39' надъ озеромъ, построена Таможенная рогатка, а нѣсколько ниже за нею, около долины Каменной, и зданіе таможи.

Каменная долинка, о которой мы говорили уже выше, является здѣсь первою, считая отъ истока. За нею дорога суживается, проходя около утесистаго склона и спускается сейчасъ же на нѣсколько расширившееся побережье, отъ 10 до 5' надъ озеромъ. Здѣсь именно и располагается село Лиственичное, бывшее во времена Георги еще деревней и почтовою станціею, но возросшее нынѣ до значенія села съ населеніемъ въ 201 муж. и 208 женск. пола, 94 дворами, церковью и пароходною пристанью, которая, по опредѣленію астронома Шварца, лежитъ подъ  $51^{\circ}50'$  сѣв. ш. и  $122^{\circ}31'5''$  вост. долготы <sup>1)</sup>.

Благодаря узкому побережью всѣ дома построены въ одинъ рядъ, отодвигаясь къ склону горъ и оставляя впереди лишь одну набережную, играющую роль какъ дороги, такъ и единственной улицы; нѣкоторые дома расположены до того близко къ скалистой части склона, что въ семидесятыхъ годахъ упавшимъ съ утеса камнемъ повредило часть крышъ одной изъ построекъ. Въ предѣлахъ села, сейчасъ же за Каменною, замѣчается еще другая долинка, съ неизвѣстнымъ въ литературѣ названіемъ, а за нею третья, Сигитинская, столь же незначительная (менѣе 2 версты) и

<sup>1)</sup> Труды Сибирск. Экспедиціи. Матем. отдѣлъ.

названные выше. Четвертая долина, Крестовка, открывается въ юго-восточномъ концѣ села, около пароходной пристани, она принадлежитъ къ самымъ значительнымъ (до 5 верстъ длины) въ этой части Ангарской бухты и занята ключомъ того-же имени. Широкая долина эта отличается весьма пространною террасою на правомъ берегу ея низовья, направляющагося на ю.-ю.-з. <sup>1)</sup>. Терраса эта достигаетъ повидимому не менѣе 60' высоты надъ озеромъ и постепенно суживается, слѣдуя вверхъ по долинѣ, по мѣрѣ чего расширяется до послѣдней, а съ версту выше, правый берегъ ея ограничивается уже склономъ отрога съ лѣсистымъ, тупо округленнымъ и потому довольно широкимъ гребнемъ, высота котораго вначалѣ измѣняется отъ 700 до 820' н. Байк. Еще выше, нижняя часть теченія Крестовки поворачиваетъ къ сѣверо-востоку, къ ея верховьямъ, а гребень слѣдуетъ къ с.-з., къ своей высшей точкѣ, достигающей, по опредѣленію Черскаго, 80' н. Байк., располагаясь между нею и Сиротинскою долиною. Верховья этой послѣдней расположены на склонѣ упомянутого выше главнаго кряжа, переходящаго въ востокъ къ правый берегъ Крестовки, едва достигая около 1000' надъ Байкаломъ. Ниже Крестовки, на протяженіи послѣднихъ 2 верстъ до мыса Березоваго, побережіе пріобрѣтаетъ луговой характеръ, распространяющійся и на низовья послѣднихъ двухъ долинъ: Большой и Малой Черемшановъ, слѣдъ за которыми располагается уже Березовый мысъ, омывающій Ангарскую бухту съ востока. Гористый мысъ этотъ снабженъ низменною оконечностью, на которой построено зимовье; зеленый растительный покровъ этой послѣдней носитъ еще на себѣ остатки тѣхъ, по всей вѣроятности, многочисленныхъ прежде березъ, которыя, контрастируя съ голымъ лѣсомъ гористыхъ частей побережія, дали название этому мысу. Произведенное Черскимъ изслѣдованіе геогно-

<sup>1)</sup> Черскій, Рукописныя замѣтки.

стическаго строенія этой части Ангарской бухты, во-первых, подтвердило показанія прежнихъ изслѣдователей, что около всего этого берега развиты полевошпатовыя породы какъ слоистыя (роговообманковый гнейсъ), такъ и массивныя (сіенито-гранитъ и т. п.), подобно тому какъ и около праваго берега истока Ангары, приче́мъ породы эти развиты и до ближайшихъ высшихъ пунктовъ, и вездѣ, гдѣ положеніе пластовъ могло быть опредѣлено, онѣ находилъ простираніе с.-з.-ое съ паденіемъ на ю.-з., въ  $50^{\circ}$  и до отвѣснаго. Но къ самымъ интереснымъ явленіямъ принадлежитъ безспорно открытое Черскимъ залеганіе юрскихъ осадковъ поверхъ этихъ кристаллическихъ породъ. И дѣйствительно, около верховьевъ Сиротинской долинки, на высотѣ 906' надъ Байкаломъ, онъ встрѣтилъ хорошо обнаженный конгломератъ съ тонкими прослойками желтоватаго песчаника, благодаря которымъ можно было опредѣлить паденіе пластовъ на ю.-ю.-з., съ наклономъ до  $50^{\circ}$ . Гальки конгломерата состоятъ изъ мѣстныхъ полевошпатовыхъ породъ, но въ нихъ была не малая примѣсь и порфировыхъ галекъ, не взирая на отсутствіе этой породы въ прилежащихъ горахъ. Въ верхнихъ пластахъ конгломерата галька отличалась малыми размѣрами, но въ нижнихъ она достигала иногда болѣе 0,4 метра (около  $\frac{3}{4}$  аршина) слѣдовательно, достигала здѣсь гораздо большей величины нежели въ конгломератѣ около Ангары внизъ по ея теченію. Что же касается вопроса о дѣйствительной принадлежности этихъ пластовъ юрскому періоду, то достаточно замѣтить, что обнаженіе это располагается уже на склонѣ къ системѣ рч. Банной, проложенной здѣсь въ томъ же конгломератѣ (см. также ниже), а рѣчка эта, какъ мы видѣли выше, составляетъ южную границу развитія юры по р. Ангарѣ. Верховья рч. Крестовки въ свою очередь проложены въ конгломератѣ, и потому воды ея выносятъ между прочимъ и порфировую гальку, которую Черскій находилъ и въ описанныхъ выше террасѣ праваго берега низовьевъ этой долины.

кимъ образомъ, юрскіе осадки и здѣсь подходятъ весьма близко къ Байкалу (около 2 верстъ), къ тому же положеніе нѣ доказываетъ, что даже въ этотъ, сравнительно весьма древній періодъ, гнейсовыя горы въ описываемомъ мѣстѣ не могли отличаться не только значительною шириною, какъ мы видѣли это и около истока Ангарты, но вмѣстѣ съ тѣмъ не достигали и значительной высоты сравнительно напр. съ ихъ западнымъ или восточнымъ продолженіемъ (см. ниже).

За Березовымъ мысомъ берегъ Байкала поворачиваетъ вообще на в.-с.-в., на протяженіи до 20 верстъ по прямому направленію, до мыса, извѣстнаго подъ названіемъ Соболевъ отстой (см. ниже), причемъ на первыхъ четырехъ верстахъ до Сытаго мыса онъ представляетъ лишь незначительную извилистость и только далѣе образуетъ рядъ болѣе глубокихъ выемокъ. Вслѣдъ за Березовымъ мысомъ начинается утесъ, непосредственно омываемый водою, и пересѣченный долиною мысовая падь съ небольшимъ ключомъ. Такіе-же, хотя вѣрѣко отвѣсныя, но невысокіе утесы окружаютъ собою и всю бухточку, называемую Крутою губою, въ глубинѣ которой открывается долинка на высотѣ около 40' надъ озеромъ, а около самаго Сытаго мыса, другая, Абукуева падь, на высотѣ около 10' (какъ Тарбаганья около Култува). Мѣстами и здѣсь скалы омываются непосредственно водою въ такихъ случаяхъ, какъ обыкновенно на Байкалѣ, около снованія ихъ можно видѣть довольно широкую и прямолинейную сѣрую кайму, на высотѣ отъ 0,125 до 0,2 метра (около 8 вершковъ) надъ уровнемъ озера, измѣняющуюся смотря во времени наблюденія.

Кайма эта состоитъ изъ засохшихъ водорослей и обязана своимъ происхожденіемъ выпему стоянію воды въ Байкалѣ, въ этомъ мѣсто обыкновенно въ концѣ лѣта, когда въ горѣ окончится таяніе снѣга. Вотъ почему весной высота черты надъ уровнемъ озера обыкновенно самая значи-



тельная, тогда какъ лѣтомъ Радде <sup>1)</sup> наблюдалъ постепенное приближеніе ея къ горизонту воды. Утесы эти, преграждающіе путь по берегу озера, могутъ быть объѣзжаемы весною въ бродъ, такъ-что отъ с. Лиственичнаго до Голоустной имѣется верховое сообщеніе, хотя и не совсѣмъ удобное, такъ какъ, во-первыхъ, иногда необходимо ѣхать по полосѣ прибойнаго матеріала («карга» у мѣстныхъ жителей), состоящей изъ выбрасываемыхъ волнами, нерѣдко весьма крупныхъ галекъ, непоросшихъ еще растительностью, а во-вторыхъ, во время волненія объѣздъ утесовъ, непосредственно омываемыхъ водою, затрудняется по мѣрѣ усиленія волнъ и дѣлается окончательно невозможнымъ. На нѣкоторыхъ утесахъ можно видѣть болѣе или менѣе значительно подмытыхъ основаніе и размытыя отчасти щели, которыхъ прежде должно было быть большее количество, а съ тѣхъ поръ нѣкоторыя изъ нависшихъ частей скалъ могли уже обвалиться. Поэтому, должно-быть, Крутая губа носить еще названіе Мелыя пещеры, въ противоположность Большимъ, расположеннымъ далѣе къ с.-в. (см. ниже). На всемъ этомъ протяженіи обнажается все тотъ-же роговообманковый гнейсъ переходами мѣстами въ пироксеновый (байкалитовый) и дѣлится видоизмѣненія, причемъ въ двухъ мѣстахъ можно видѣть переслаиваніе его съ тонкими прослойками кристаллическаго известняка. Мѣстами онъ переходитъ въ полумассивное массивное видоизмѣненіе, очковое отъ соотвѣтственныхъ особенностей вкрапленныхъ въ немъ зеренъ и агрегатовъ леваго шпата. Положеніе пластовъ то-же, что и около с. Лиственичнаго (паденіе ю.-з. до ю.-ю.-з.).

Береговую выемку отъ Сытаго мыса до Соболева стоя (16 верстъ) можно считать одною пространною бухтою всего глубже (до 3 верстъ) вдающеюся въ побережье въ стояніи болѣе 10 верстъ отъ Сытаго, гдѣ въ нее открыва-

<sup>1)</sup> Радде, 1. с. см. также Вѣстникъ И. Р. Геогр. Общ. СПб. 1887 г. XXI, стр. 111.

долины рѣчекъ Коты (см. ниже). Въ частности-же здѣсь можно различать цѣлый рядъ малыхъ бухтъ, какъ-то: а) Средняя 1-я сейчасъ же за Сытымъ, съ сухою долиною, открывающаяся на высотѣ до 14' надъ озеромъ и двумя другими, съ журчащими по нимъ ручейками; б) Смородова съ именною долиною, расположенною сейчасъ-же за скалистымъ мысомъ Средней 1-й; в) Средняя 2-я съ долиною и самомъ мысѣ и побережіемъ, образующимъ террасовидную площадь отъ 7 до 18' высоты; г) Солонцовая съ долиною Медвѣжьею на мысѣ, отдѣляющемъ еѣ отъ бухты Средней: Солонцовая бухта окаймляется террасою отъ 18 до 100' высоты и кромѣ Медвѣжьей пади, принимаетъ въ себя еще рч. Солонцовую, съ устьемъ на террасѣ до 18' высоты, Глубокую падь, Шишелову и иную значительную по длинѣ (около 5 верстъ) Черную рѣчку, впадающую уже вблизи Чернаго мыса, ограничивающаго эту бухту съ с.-в.; между долиною Солонцовою и Чернымъ мысомъ поросшій склонъ горъ смѣняется утесами, рѣдко непосредственно омываемыми водою и съ многими щербками, какъ въ Крутой губѣ, вслѣдствіе чего мѣстность носитъ также названіе Большихъ пещеръ. Наконецъ, за Чернымъ мысомъ слѣдуетъ самая большая д) бухта Котовъ, болѣе 7 верстъ въ длину по хордѣ и до 2 верстъ въ ширину по береговую линію; она ограничена съ с.-в. упомянутымъ выше мысомъ, извѣстнымъ подъ названіемъ Соборный отстой, замѣтнымъ еще съ отдаленія (см. ниже). На Соборномъ хвойный лѣсъ, придающій болѣе мрачный характеръ мѣстностямъ Чернаго мыса, продолжается и на западную часть склона бухты Котовъ, пересѣкаемаго долиною 2-й Глубокой, а за нею, спусти утесъ Два брата и другою, называемою Жилищемъ, не взирая на ея ненаселенность. Сейчасъ же за Жилищемъ, въ самую глубокую часть бухты, открываются долины двухъ рѣчекъ: Большіе и Малые Коты, отделенныя другъ отъ друга лишь весьма узкимъ отрогомъ;

начиная съ этихъ долинъ, характеръ склона горъ измѣняется лѣсъ рѣдѣетъ, обнаруживая значительную примѣсь березы въ особенности по долинамъ, а мѣстами и вовсе исчезаетъ а крутой, нерѣдко утесистый склонъ пересѣкается цѣлымъ рядомъ долинокъ, какъ-то: Малая Варначья (Каторжанка), сухая, съ устьемъ на высотѣ около 15' надъ озеромъ, Большая Варначья съ такою же террасою на лѣвомъ берегу, Третья и Четвертая Варначьи, съ устьемъ на высотѣ около 30' надъ Байкаломъ, затѣмъ Малая и Большая Сѣнная или Сѣннѣшки, а за ними спустя рядъ весьма живописныхъ утесовъ, еще небольшая долина открывающаяся столь же высоко на склонѣ горъ какъ Варначья; наконецъ уже слѣдуетъ нѣсколько болѣе пологій, а затѣмъ и длинный склонъ, опускающійся сначала болѣе высокою террасою, а затѣмъ болѣе низкою, но длиною, къ Соболеву мысу. Горы на протяженіи всей этой сложной бухты, считая отъ мыса Сытаго до Соболева отстоя, не вышаются къ сѣверо-востоку, хотя и незначительно, сохраняя плоскіе или плоскоокругленные контуры и массивность от недостатка расчлененія, вслѣдствіе чего они отчасти напоминаютъ собою плоскую возвышенность. Осмотръ нѣкоторыхъ ближайшихъ высшихъ пунктовъ произведенъ до сихъ поръ только Черскимъ (14-го іюня 1879 г.) и то въ слѣдующихъ мѣстахъ бухты. Въ губѣ 1-й Средней сейчасъ же за Сытагомъ, произведенное имъ восхожденіе до высоты 132' надъ озеромъ показало, что болѣе отдаленныя высоты достигаютъ по видимому не болѣе 1500' н. Байк., хотя поросшіе лѣсомъ гребни не позволяютъ сдѣлать осмотра болѣе обширнаго района мѣстности (см. ниже, Кадильная); экскурсія на высоты праваго берега долины Солонцовой довела тогда до 997' н. Байк., такъ какъ дождь помѣшалъ дальнѣйшее изслѣдованіе; тѣмъ не менѣе точекъ, превосходящихъ 1500' той-же относительной высоты не предполагается и по этой линіи. Далѣе, высшій пунктъ узкаго гребня лѣваго берега

долины Большихъ Котовъ достигаетъ всего лишь 690', тогда какъ отрогъ, ограничивающій долину Малыхъ Котовъ съ лѣвой стороны, возвышается до 1129'; наконецъ въ верховьяхъ рѣки Варначей Черскій достигалъ до высоты 1259' н. м., хотя болѣе отдаленные высшіе пункты могли превышать еще эту цифру на нѣсколько сотъ футовъ.

Отъ упомянутаго выше Чернаго мыса начинается первая изъ произведенныхъ Дыбовскимъ и Годлевскимъ геологическихъ линій промѣровъ глубины Байкала. Оказалось, что дно опускается здѣсь столь-же круто къ югу, какъ и на меридианѣ истока Ангары (см. выше) и уже въ разстояніи 400 метровъ, т. е. 470 саж. отъ береговой линіи, опускается на 1935,<sub>2</sub>' подъ уровень воды, слѣдовательно на 374' ниже поверхности океана; что же касается наибольшей глубины, то она оказалась равною 4460,<sub>8</sub>', т. е. только на 42,<sub>5</sub>' меньше полученной на меридианѣ истока Ангары, располагаясь въ томъ-же близкомъ разстояніи отъ описываемаго берега, именно въ 9 верстахъ и 326 саженьяхъ.

Строеніе этихъ горъ, въ особенности въ восточной части, представляетъ высокій интересъ для воспроизведенія геологическихъ моментовъ доисторическаго прошлаго этой страны, еще усиливающійся, какъ мы увидимъ ниже, по приближенію къ долиנѣ р. Голоустной. Между мысомъ 1-ю и 2-ю Среднею горы состоятъ еще изъ видоизмѣненнаго (верѣдко порфировиднаго) знакомаго намъ уже роговикового гнейса съ пропласткомъ байкалитоваго известняка (въ бухтѣ Смородовой), причѣмъ паденіе пластовъ съ с.-с.-з. переходитъ ближе къ 2-й Средней въ с.-в.; да и до долины Большой Варначей господствуетъ почти массивное, а иногда и совершенно массивное, очковое видоизмѣненное того-же гнейса («Байкальскій гнейсъ и гранитъ», по отчасти на финляндскій). Тамъ не менѣе въ долинѣ Солонцовой можно видѣть уже многочисленныя порфировидныя гальки юрскаго конгломерата, а на устьяхъ рѣчекъ Ко-

товъ появляются и глыбы этой породы. Ближайшее изслѣдованіе обнаружило, что поверхъ названной полевошпатовой породы, на высотѣ отъ 869' (лѣвый берегъ Малыхъ Котовъ) до 452' (лѣвый берегъ Малой Варначьей), залегаетъ уже мощная толща юрскаго конгломерата, образующаго всѣ высшіе пункты отроговъ, начиная съ праваго берега Малыхъ Котовъ. Къ тому же экскурсіи Черскаго вверхъ по названнымъ долинамъ (на востокъ отъ Большихъ Котовъ) показали, что по мѣрѣ удаленія отъ Байкала, плоскость залеганія юры постепенно, но довольно быстро, понижается, приближаясь къ уровню дна долинъ и озера, а въ разстояніи около 2—3 верстъ отъ устья скрывается уже подъ этимъ горизонтомъ. Наконецъ, на отрогѣ, ограничивающемъ устье долины Большой Варначьей съ правой стороны, конгломератъ залегая сначала на высотѣ 452' надъ озеромъ, къ которому обращена сіенитовая (сіенито-гранитъ) оконечность этой скалы быстро опускается оттуда до самаго уровня Байкала и продолжается такимъ образомъ къ сѣверо-востоку, какъ мы увидимъ ниже, болѣе чѣмъ на 6 верстъ до ближайшихъ окрестностей долины рч. Нижней, причемъ утесы долинъ, пересекающихъ эту мѣстность, убѣждаютъ въ полнѣйшемъ отсутствіи коренныхъ выходовъ полевошпатовыхъ породъ на этомъ протяжении, даже въ берегахъ той-же Большой Варначьей. Кроме мелкой и преобладающей здѣсь крупной гальки, конгломератъ этотъ, въ особенности ближе къ плоскости его залеганія поверхъ кристаллическихъ породъ, весьма богатъ валунами, достигающими болѣе  $\frac{3}{4}$  аршина въ діаметрѣ и перемѣшанными съ болѣе мелкимъ матеріаломъ въ томъ разномѣрномъ безпорядкѣ, въ какомъ они размѣщаются обыкновенно въ отложеніяхъ весьма быстрыхъ водъ, напр. горныхъ потоковъ. Кроме преобладающихъ въ составѣ гальки и валуновъ мѣстныхъ кристаллическихъ полевошпатовыхъ породъ, въ немъ наблюдается много и порфіровыхъ; вся галька и валуны являются обыкновенно великолѣпно обточенными, за исклю-

и сравнительно весьма рѣдкихъ экземпляровъ, попадающихся лишь ближе къ мѣсту соприкосновенія конгломерата съ коренною породою. Около праваго берега долины Большой Варначей, со стороны Байкала, можно видѣть пластовую отдѣльность этого конгломерата, падающую круто (45°) на ю.-з., причемъ ближайшій осмотръ этихъ, весьма ровныхъ и плоскостей обнаруживаетъ, что ими пересечены даже многія гальки конгломерата. Обстоятельство это ввело въ заблужденіе Гофмана (*loc. cit.*), сдѣлавшаго экскурсію изъ с. Лиственичнаго до ближайшихъ окрестностей Большой Варначей. Онъ полагалъ, что пласты конгломерата находятся крутымъ наклономъ къ юго-западу, принявъ очевидно треснувшія гальки за плоскія. Между тѣмъ, гдѣ среди конгломерата встрѣчаются прослойки песчаника, какъ напр. въ верховьяхъ 3-й Варначей, на высотѣ 1052' надъ озеромъ (см. также ниже), тамъ наклонъ пластовъ (ю.-з.-й) не превышаетъ 10—15°, подтверждая воззрѣніе Меглицкаго, высказанное имъ впрочемъ только въ самыхъ общихъ чертахъ. Около той-же долины на каргѣ (прибойный валъ см. выше) Черскій видѣлъ не мало кусковъ буреаго угля, выброшеннаго очевидно волнами Байкала изъ флеса, лежащаго ниже уровня его воды; въ томъ однако, что конгломератовая толща спускается здѣсь еще глубоко въ долину, можно убѣдиться оплывая напр. небольшой мысовидный выступъ береговой линіи за Варначьими долинами. Благодаря извѣстной прозрачности Байкальской воды, позволяющей даже на глубинѣ нѣсколькихъ саженей различать подробности устройства дна, можно видѣть, что тамъ расположена плоская подводная терраса до 50 саженей ширины и состоящая изъ того же конгломерата; терраса эта, прикрытая наносными образованіями, отвѣсно опускается къ юго-западу, сменяясь чернѣющею бездною озера. На устьѣ долины Большихъ Котовъ построены не только стеклянныя заводы купцомъ Сибиряковымъ, ра-

ботающій, впрочемъ только зимою и то непостоянно. Лѣтомъ онъ не работаетъ и въ немъ живетъ лишь одинъ сторожъ, ведущій вполне отшельничью жизнь, получая время отъ времени провіантъ изъ села Лиственичнаго. Въ сосѣдней съ нимъ долиной Малыхъ Котовъ, верстахъ въ двухъ выше устья, вырабатывалось нѣкогда золото. Пріискъ этотъ принадлежалъ купцу Бѣлоголовому и былъ заброшенъ, а во времена путешествія Радде разрабатывался уже другой, въ долину Большой Сѣнной, гдѣ расположена также и зимняя почтовая станція, неправильно называемая Кадильной. Пріискъ на Малыхъ Котахъ, оставленный Бѣлоголовымъ также, какъ и на Сѣнной, дѣйствовалъ вторично въ 1879 г., но и этотъ разъ получились неудовлетворительные результаты. Въ томъ, что золото находится здѣсь въ самомъ конгломератѣ нельзя и сомнѣваться послѣ того, какъ Черскій получилъ видимые слѣды этого металла путемъ амальгамации нѣкоторой части конгломератоваго цемента, взятаго имъ прямо изъ утеса около долины Малой Варначей; къ тому же включенію приводитъ уже и то обстоятельство, что вся долина, какъ Сѣнной, такъ и Малыхъ Котовъ, за исключеніемъ устья послѣдней, проложена именно въ этой породѣ. Остается поэтому только вопросъ о томъ: оплодотворенъ-ли юрскіе песчаники самостоятельно, или-же на него слѣдуетъ смотрѣть какъ на золотоносный наносъ юрскаго періода, въ которомъ золото заимствовано изъ болѣе древнихъ полевошпатовыхъ породъ?

Въ этомъ отношеніи ни одинъ изъ путешественниковъ не могъ пріискать положительныхъ данныхъ и только мнѣніе Стрезнева, разрабатывавшаго пріискъ на Малыхъ Котахъ въ 1879 г., склоняется въ пользу послѣдняго изъ предположеній, такъ какъ по его словамъ одинъ изъ кусочковъ золота оказался выросшимъ въ полевошпатовую, гранитовидную породу <sup>1)</sup>.

<sup>1)</sup> Черскій, Рукописныя замѣтки о Сибири.

Отъ того, что мысъ Соболевъ отстой отличается террасовиднымъ склономъ и низменною, наносною оконечностью, мы говорили уже выше. Мысъ этотъ, лишенный древесной растительности, неправильно назывался въ литературѣ Соболинымъ<sup>1)</sup>, тогда какъ названіе его происходитъ отъ фамиліи Соболевъ, — крестьянина, имѣвшаго здѣсь когда-то стоянку, хотя никакихъ подробностей объ этомъ Черскому не удалось собрать. Подобно мысу Березовому (около Ангарской бухты), Соболевъ отстой принадлежитъ къ точкамъ, всего болѣе выступающимъ къ юго-востоку, на пути отъ истока Ангары къ р. Голоустной, даже къ сѣверо-восточной оконечности озера. За нимъ путешественникъ вступаетъ въ обширную (болѣе 6 верстъ въ хордѣ), но довольно плоскую бухту, разсѣченную на двѣ неравныя части мысовиднымъ выступомъ съ рѣчки Нижней. Съ сѣверо-востока горизонтъ зрѣнія прерывается мысомъ Кадильнымъ, похожимъ отчасти на Соболевъ. Ближайшая, большая часть этой бухты, не имѣющей никакого названія, именуется нѣкоторыми Нижнею губою и сохраняетъ тотъ же характеръ какъ и окрестности долинъ Варначьихъ. Въ ней именно, а не западнѣе Соболева мыса, какъ сказано у Риттера, располагается отвѣсный и живописный Чайчій утесъ, извѣстный уже въ древнѣйшей литературѣ озера, такъ какъ названіе его мы находимъ уже у Гергеля. Непосредственно омываемая водою и достигающая въ высоты надъ озеромъ, скала эта сверху до низу образуетъ продолженіе той-же конгломератовой толщи, которая сопровождаетъ путешественника непрерывно, начиная съ правого берега Большой Варначьей; но обѣ стороны утеса являются небольшія сухія долинки (Чаячьи) съ весьма крутымъ паденіемъ къ озеру, причемъ первая изъ нихъ (ю.-з.-я) поднимается на террасу до 28' надъ Байкаломъ, какъ равно и вторая съ нею, Соболева долинка. По отрогу пра-

<sup>1)</sup> Риттеръ, Землеустройство Азіи. Прибайкалье, Забайкалье и степь. Переводъ 1879 г. стр. 13.



ваго берега первой Чаячьей долинки Черскій сдѣлалъ восхожденіе на высшій пунктъ прибрежныхъ горъ. На пути этомъ, въ ближайшихъ утесахъ, онъ видѣлъ въ конгломератѣ три прослойка песчаника, положеніе которыхъ весьма мало отклонялось отъ горизонтальнаго, не смотря на то, что отдѣльность и здѣсь столь-же круто, а мѣстами и отвѣсно падала вообще къ югу; въ одномъ мѣстѣ встрѣчена и діагональная слоистость. Цѣлой системы такихъ трещинъ, разбивающихъ самыя плотныя и твердыя скалы на части, и подмывающаго дѣйствія Байкальскихъ волнъ, превращающихъ эти куски современемъ въ валуны и гальки, Черскій считаетъ вполне достаточнымъ для образованія такихъ отвѣсныхъ и величавыхъ утесовъ, и потому въ существованіи ихъ онъ не видитъ доказательства какихъ либо внезапныхъ переверотовъ въ родѣ напр. провала, какъ это полагали многіе изъ прежнихъ путешественниковъ, въ томъ числѣ и Радде <sup>1)</sup>. Затѣмъ на высотѣ 211' надъ озеромъ найденъ террасовидный уступъ, а на высотѣ 423' другой такой-же. Высшая точка отрога опредѣлена въ 596' надъ озеромъ: она входитъ въ составъ узкаго, округленнаго и почти горизонтальнаго гребня, слагающаго на с.-з.  $10^0$  къ болѣе высокимъ частямъ горъ отдѣляющаго Чаячью долину отъ Соболевой. Гребень этотъ является поэтому террасовиднымъ; что-же касается болѣе высокой гряды, къ склону которой онъ примыкаетъ, то онъ по видимому, одинаковой высоты съ высшими точками на меридіанѣ долинъ Варначьихъ. Гребень самого Чаячьаго утеса въ одномъ мѣстѣ нѣсколько превышаетъ 730' н. м. въ числѣ вообще довольно крупной гальки попадаются иногда валуны до 1 арш. въ діаметрѣ, причемъ изрѣдка встрѣчаются и гальки глинистаго сланца, замѣченныя еще Меглицкимъ. Гребень этотъ отдѣляетъ собою лѣвую вѣтвь первой Чаячьей долинки отъ верховьевъ второй Чаячьей, которая

<sup>1)</sup> Радде, l. с. а также Вѣстникъ И. Р. Геогр. Общ. 1857, № 2

раздается сначала къ востоку, а затѣмъ поворачивается дугообразно къ югу, къ Байкалу, гдѣ она обрѣзывается крутымъ скальнымъ утесомъ на почти такой-же высотѣ, какъ и первая.

У самаго основанія Чаячьяго утеса можно видѣть слой зеленовато-бѣлаго песчаника около аршина толщины, наклоненный на с.-з.  $23^{\circ}$  подъ угломъ до  $40^{\circ}$ , а на восточной сторонѣ скалы, среди конгломерата, прослоекъ песчаника, наклоненный на ю.-з.  $15^{\circ}$  до  $25^{\circ}$ ; явленія эти, однако, въ виду назаннаго выше, почти горизонтальнаго положенія пластовъ вообще слѣдуетъ разсматривать только какъ мѣстныя отклоненія отъ нормы и сдвиги. Во время путешествія Черскаго въ 1879 г., какъ равно и его особой экскурсіи къ р. Головинской въ 1878 г., ни въ этомъ утесѣ, ни въ другихъ на этомъ же пути, онъ не встрѣчалъ гнѣздящихся чаекъ, которыя встрѣчались здѣсь еще въ изобиліи въ пятидесятихъ годахъ, о чемъ свидѣтельствуетъ Радде. Точно также въ этой вообще юго-западной части Байкала Черскій не встрѣчалъ и баклановъ, повидимому переселившихся въ сѣверную часть озера.

Начиная со второй Чаячьей долинки, склонъ горъ является болѣе пологимъ и почти совершенно поросшимъ травою, продолжаясь въ такомъ видѣ до устья долины Нижней. Уже къ послѣдней на склонѣ этомъ замѣчается незначительная сухая и порослая растительностью ложбинка, которую Черскій, для краткости, называетъ Несогласною <sup>1)</sup>, потому что она, какъ мы увидимъ ниже, проложена почти на этой линіи несогласнаго напластованія породъ двухъ различныхъ формацій.

И дѣйствительно, восходя вверхъ по этой долинкѣ, можно замѣтить, что на ея правомъ, т. е. западномъ склонѣ, изъ-подъ травы видѣются куски и выступы знакомаго намъ уже конгломерата, тогда какъ по лѣвому берегу замѣчаются одни

<sup>1)</sup> Черскій, Рукописныя замѣтки.

лишь выходы темнаго, зеленовато-сѣраго глинистаго сланца продолжающагося и до устья долины Нижней, называемой обыкновенно Нижняя падь. Исслѣдованіе этой довольно широкой долины произведено Черскимъ, начиная с устья до водораздѣльныхъ горъ въ ея верховьяхъ. По обѣимъ сторонамъ низовьевъ и устья, со стороны Байкала, въ обнаженіяхъ выступаетъ темно-зеленовато-сѣрый глинистый сланецъ, цвѣтъ котораго измѣняется мѣстами до красноватаго и желто-бурого, причемъ мѣстами онъ переходитъ почти въ кварцитъ. Простираніе пластовъ оказалось в.-с.-в. до с.-в. съ наклономъ къ сѣверу до  $45^{\circ}$  и болѣе, хотя, со стороны Байкала можно видѣть, что пласты эти образовали здѣсь прежде перегибъ съ паденіемъ на ю.-ю.-в., т. е. складку размытую впоследствии водами озера, такъ что отъ нея осталось нынѣ только сѣверное крыло и самое начало перегиба т. е. антиклинальной складки. Сейчасъ же выше по долине наклонъ пластовъ сланца переходитъ въ противоположный т. е. ю.-ю.-в.-й до ю.-в.-го, образуя такимъ образомъ такъ называемый синклинальный изгибъ и вмѣстѣ съ тѣмъ начало (южное крыло) другой складки. Но и эта складка оказывается поврежденною: она лишена своего сѣвернаго крыла, вмѣсто котораго, въ разстояніи версты отъ Байкала, путешественникъ встрѣчаетъ уже юрскій конгломератъ, образующій склоны долины съ верху до низу. Цѣлый рядъ экспедицій на склоны низовьевъ долины, въ значительной части поросшіе растительностью, показали, что по правому берегу Нижней падь глинистый сланецъ развитъ до высоты 420' надъ озеромъ, гдѣ, на головахъ его, залегаетъ конгломератъ, образующій и высшія точки отрога (692' н. Байк.), а на лѣвомъ берегу низовьевъ сланецъ покрывается конгломератомъ на высотѣ отъ 832' до 861', тогда какъ конгломератъ достигаетъ точекъ, возвышающихся до 970' надъ озеромъ, причемъ, въ составѣ его галекъ можно находить и куски глинистаго сланца, хотя здѣсь еще они вообще рѣдки (см. ...)

Вслѣдъ за исчезновеніемъ глинистаго сланца, въ разстояніи около  $1\frac{1}{4}$  в., отъ Байкала, длина рч. Нижней воспринимаетъ лѣвую, узкую и сухую вѣтвь, тогда какъ ширина главной долины, слѣдующей въ общемъ ю.-в.-му направленію, достигаетъ здѣсь повидимому около 70 саженой. Около устья главной вѣтви, на ея правомъ берегу, склонъ отрога представляетъ весьма живописную группу уединенныхъ, т. е. обломанныхъ скалъ до нѣсколькихъ (около 5-ти) саженой вышины; одна изъ нихъ въ особенности напоминаетъ собою величавое зданіе съ нѣсколькими на немъ башнями, изъ которыхъ одна какъ-бы трехъ-этажная. Скалы эти состоятъ изъ конгломерата и представляютъ собою остатки болѣе плотныхъ частей этой породы, уцѣлѣвшіе отъ размыва. Для того, чтобы видѣть ихъ слѣдуетъ однако уклониться въ сторону тропы ведущей вверхъ по долинѣ Нижней, такъ какъ густой лиственный лѣсъ, которымъ порастаетъ склонъ и бока долины, закрываетъ эти причудливыя скалы отъ глазъ путешественника до того, что о существованіи ихъ въ этой долине не зналъ даже одинъ изъ частыхъ посѣтителей Нижней долины, гдѣ крестьяне с. Лиственичнаго занимались вырубкою лѣса.

Начиная съ этихъ живописныхъ скалъ, склоны долины Нижней порастаютъ растительностью; рѣчка, достигавшая устья на устьѣ около  $1\frac{1}{2}$  сажени ширины, суживается еще значительно и съ версту выше (около  $2\frac{1}{4}$  версты отъ устья) исчезаетъ совершенно, вѣрнѣе, въ этомъ мѣстѣ какъ-бы беретъ начало изъ нѣсколькихъ ключиковъ, не смотря на то, что долина ея продолжается вверхъ въ прежнемъ видѣ, сохраняя борозду русла, хотя сухую и поросшую мхомъ. Спустя однако съ полверсты, въ руслѣ этомъ опять появляется ручеекъ, а въ разстояніи 5-ти верстъ отъ озера, она составляется изъ двухъ вѣтвей: правой, болѣе широкой и лѣвой, болѣе узкой, слѣдующей съ сѣвера. Направившись по этой послѣдней, еще болѣе сужившейся къ верховью,

и пройдя около  $1\frac{3}{4}$  версты, Черскій достигъ водораздѣльнаго пункта, расположеннаго поэтому почти въ 7 верстахъ отъ Байкала и возвышающагося на 2000' надъ озеромъ. Отсюда начинается уже склонъ къ одному изъ правыхъ притоковъ р. Нижняго-Качергата, именно къ долину Шелоргуръ (см. ниже), системы р. Голоустной, но довольно густая древесная растительность мѣшала болѣе подробному осмотру мѣстности лежащей къ сѣверу отъ этого пункта. Съ западной стороны сюда же подходит и правое верховье Нижней, на правомъ берегу котораго можно видѣть вершину, превышающую пунктъ наблюденія повидимому на 280', слѣдовательно, достигающую около 2280' надъ озеромъ. На всемъ описанномъ протяженіи долины, отъ живописныхъ скалъ до водораздѣльныхъ высотъ включительно, вездѣ, гдѣ только изъ подъ травы можно было видѣть выходы коренной породы, таковою былъ всегдѣ тотъ же конгломератъ, переходящій слѣдовательно и въ систему р. Нижняго-Качергата (см. ниже).

Такимъ образомъ, на меридіанѣ верховьевъ долины Нижней прибрежныя горы (часть Приморскаго хребта, называемая также Морскою гривой) замѣтно уже высились, сравнительно съ лежащими ближе къ Ангарту, и онѣ въ общемъ напоминаютъ собою почти такое-же террасовидное пониженіе въ сторону названной рѣки, съ какими мы ознакомились на западѣ отъ ея истока, хотя здѣсь и не отличаются столь образцовой горизонтальностью ихъ верхнихъ контуровъ, какая наблюдается въ тѣхъ горахъ напр. при взглядѣ на нихъ съ Толстаго мыса. Замѣтно въ заключеніе, что на лѣвомъ берегу устья долины Нижней на высотѣ около 900' надъ озеромъ, замѣчается небольшая террасовидная площадка, прослѣдимъ за дальнѣйшимъ теченіемъ Черскаго по направленію къ устью р. Голоустной.

Сѣверо-восточная, меньшая часть описываемой бухты, т. е. между устьемъ Нижней и мысомъ Кадильнымъ, называется Мухоръ-елгайскою губою, отъ имени на-

ея въ ней узкой, сухой и очень крутой долинки — Мухорь-елгай, что означает короткая (мухорь) долина (какая у прибайкальскихъ, жемай у тункинскихъ бурятъ). Судя по особенностямъ устья этой долинки, можно полагать, что она открывалась прежде на высотѣ около 28' надъ поверхностью Байкала, какъ напр. Варначья, Соболева и Чаячья, а затѣмъ успѣла себя промыть въ этомъ склонѣ узкое и глубокое русло до современного уровня озера; террасою до высоты 20' высоты сопровождается и весь склонъ горы, вызывая на соответственное стояніе воды въ Байкалѣ. Въ скалахъ въ общемъ поросшаго ската наблюдается продолжение пластовъ того же глинистаго сланца, а въ томъ, что порода эта на высшихъ точкахъ горы и здѣсь покрывается юрою, убѣждаютъ насъ куски и глыбы конгломерата, лежащіе въ сухомъ руслѣ Мухорь-елгай. Паденіе пластовъ сланца, сначала ю.-ю.-в.-е, переходитъ далѣе въ с.-с.-з.-е.

Выше мы говорили уже о нѣкоторомъ сходствѣ Кадильнаго мыса съ Соболевымъ: въ профилѣ его точно такъ же наблюдается высшій террасовидный уступъ и низшій; только послѣдній кажется болѣе длиннымъ и болѣе низменнымъ; онъ точно также значительно вдается въ озеро, закрывая собою видъ на Голоустную, тогда какъ съ него начинается уже болѣе значительный поворотъ береговой линіи Байкала къ с.-в. На этомъ мысѣ, еще во времена плаванія на немъ, располагалась станція Кадильная, перенесенная въ долину рч. Сѣнной (см. выше), но до сихъ поръ сохранившая прежнее, несоответствующее ей нынѣ, названіе.

На западной сторонѣ его низменной части, вслѣдъ за обрывнымъ валомъ галекъ, замѣчается небольшое озерко, болѣе прежде болѣе обширные размѣры, судя по окружающей его болотистой и низменной каймѣ. На оконечности находится устье рч. Большой Кадильной, обыкновенно высыхающей въ низовьяхъ. Рѣчка эта, вѣрнѣе ручей, достигаютій 1-й сажени ширины, имѣетъ около 10

версть длины и протекает по довольно широкой и красиво долине, слѣдующей въ общемъ юго-восточному направленію но съ дугообразнымъ изгибомъ къ юго-западу и принимая мѣстами восточное направленіе. По ней 19-го іюня 1879 Черскій сдѣлалъ экскурсію, посѣтивъ и высшій пунктъ водораздѣльныхъ горъ. Многія части нижней половины теченія рѣчки отличаются сочною и густою травою, изукрашенною почти всѣми изъ лучшихъ представителей сибирской флоры такъ какъ пурпурная и желтая лиліи (*Lilium tenuifolium* et *Heimerocallis flava*) растутъ уже на склонѣ самаго мыса, въ болѣе глубокихъ частяхъ долины красуются многочисленные тролліусы и большіе кусты сараны (*L. martagon*). Около самаго выхода долины изъ горъ на низменную часть мыса, въ упомянутой выше болѣе высокой террасѣ послѣ него, обнажается свѣтлый известнякъ отъ плотнаго до мелкозернистаго сложенія съ весьма неясною слоистостію, обнаживающею мѣстами ю.-в.-ый наклонъ пластовъ (прав. берега долины); выше по долине, порода эта видимо покрывается продолженіемъ того же глинистаго сланца, съ которымъ мы ознакомились въ окрестностяхъ Нижней пѣды, падающей точно также на с.-с.-з. даже на с.-з.  $35^{\circ}$ . Этимъ, очевидно, опредѣляется уже роль известняка низовьевъ Кадильной: онъ выступаетъ здѣсь на осевой части той складки, съ свѣтлымъ западнымъ крыломъ которой, уцѣлѣвшимъ отъ размыва, мы ознакомились на устьѣ Нижней. Такая роль его подтверждается еще и тѣмъ обстоятельствомъ, что въ восточной части Кадильнаго мыса выходы глинистаго сланца найдены Черскимъ лежащими и южнѣе того же известняка. Еще въ долине Б. Кадильной мы встрѣчаемся и съ противоположнымъ наклономъ слоевъ глинистаго сланца, (т. е. на ю.-в.), слѣдовательно съ продолженіемъ той-же синклинальной складки, какъ и въ соответствующемъ мѣстѣ долины рч. Иней, послѣ чего пласты перегибаются здѣсь опять на с.-з. до с.-з., образуя складку, въ которой известнякъ уже

показывается на дневную поверхность. Съ полъ-версты выше, въ разстояніи около 6 верстъ отъ устья, склоны долины вдругъ покрываются галькою, послѣ чего оказывается, что глинистый сланецъ вполнѣ вытѣсняется здѣсь конгломератомъ, опустившимся и подъ уровень дна долины на ея обоихъ берегахъ. Кромѣ галекъ кристаллическихъ породъ въ составѣ конгломерата находится здѣсь громадное количество кусковъ и обломковъ того же глинистаго сланца, къ которому онъ прилегаётъ, какъ убѣдительнѣйшее доказательство позднѣйшаго вложенія этой обломочной толщи и болѣе древняго возраста сланца. Но и самъ образъ залеганія конгломерата въ долину Кадильной является весьма интереснымъ и поучительнымъ. Вся его масса выполняетъ здѣсь собою древнюю долину въ глинистомъ сланцѣ и направлявшуюся въ общемъ поперечно современной Кадильной, въ сторону р. Нижней. Воззрѣніе это подтверждается тѣмъ обстоятельствомъ, что съ версту выше, конгломератъ на обоихъ берегахъ Кадильной опять сѣняется глинистымъ сланцемъ, падающимъ на югъ и ю.-в. до  $45^{\circ}$  и образующимъ всю видимую высоту береговыхъ склоновъ. Ближе къ верховьямъ долина значительно суживается, образуя дугообразный изгибъ къ западу вокругъ подножія высшихъ пунктовъ ея лѣваго берега, а русло болѣе глубоко врѣзывается въ дно, поросшее кустарникомъ и лѣсомъ. Послѣ выпавшаго вдругъ дождя съ градомъ, съ высоты 943' надъ озеромъ, Черскій началъ восхождение на вершину лѣваго берега долины. Сначала онъ достигъ ясно выраженной террасы на высотѣ около 76' надъ уровнемъ долины; въ предѣлахъ вертикальнаго развитія того же глинистаго сланца, выше, на склонѣ замѣчены были еще два уступа, изъ которыхъ высшій расположенъ на высотѣ 1112' надъ озеромъ. Здѣсь же глинистый сланецъ смѣняется известнякомъ, вообще такимъ же, какъ на устьѣ долины Кадильной. Слѣдуя вверхъ по крутому склону горы, на высотѣ 1302' н. оз. путешественникъ достигъ еще одинъ террасовидный уступъ, выше котораго



располагается известковая вершинка, на которой anerонидъ показалъ 1474' надъ Байкаломъ. Тотъ же известнякъ, къ сожалѣнію не слоистый, продолжается еще до слѣдующаго уступа, т. е. до высоты 1785' н. оз. тогда какъ выше онъ опять смѣняется глинистымъ сланцемъ, изъ котораго состоитъ и плоско округленная вершина, т. е. высшій пунктъ горы, поросшій лѣсомъ только съ южной и восточной стороны. Высота этой точки оказалась равною 2332' надъ Байкаломъ, между тѣмъ какъ горы праваго берега долины, какъ видно было во время восхожденія, не превосходятъ кажется 2017'. Къ юго-западу отъ точки наблюденія, т. е. въ сторону истока Ангары, виднѣются отсюда лѣсистые гребни пяти болѣе или менѣе параллельныхъ отроговъ, слѣдующихъ къ Байкалу: это очевидно часть болѣе низкаго отрѣзка Приморскаго хребта, пересѣченная описанными выше долинами (Нижняя, Сѣнная, М. и Б. Коты и Черная). Къ сѣверу, между тѣмъ, и къ сѣверо-западу, за склономъ въ долину Нижняго Качергана (системы Голоустной), разстилается чернѣющая густымъ хвойнымъ лѣсомъ часть плоской возвышенности въ предѣлахъ верховьевъ рч. Большой, праваго притока Ангары (см. ниже). Высшій пунктъ этотъ (2332' н. Байк.), достигая такимъ образомъ 3893' абсолютной высоты, превышаетъ средній уровень высшей террасы плоской возвышенности (1750' абс. выс. см. выше) на 2143' и даже высшую изъ извѣстныхъ ея точекъ (2028' абс. выс.) на 1865'.

Съ мыса Большой Кадильной начинается вторая изъ двухъ неполныхъ линій промѣровъ глубины Байкала, направляющаяся на ю.-ю.-в. Въ разстояніи всего лишь 1640' отъ береговой линіи глубина оказалась уже равною 984'. спусти 3280' она достигла уже 2624', а еще 3280' далѣе опустилось уже на 3640'; наибольшая глубина найдена въ разстояніи 34440' отъ берега и равняется 4034,4' слѣдственно на 426,4' менѣе, нежели по такой же линіи отъ мыса Черной рѣчки (см. выше).

Отъ мыса Б. Кадильной береговая линія озера, какъ равно и низменная часть побережя, направляются почти прямолинейно на в.-с.-в., на протяженіи около 3 верстъ, послѣ чего уже начинается поворотъ къ слѣдующей бухтѣ, такъ-что вся эта мѣстность является собственно въ видѣ одного, широко усѣченного мыса, юго-западный уголъ котораго, болѣе низменный, принадлежит Большой Кадильной, а сѣверо-восточный, болѣе высокій (до 18'), извѣстенъ подъ названіемъ Малаго Кадильнаго мыса, отъ имени открывающейся около него долины. Хотя на низменной части мыса наблюдаются, какъ сказано было выше, осыпанные выходы глинистаго сланца, смѣняющіеся наноснымъ отложеніемъ, въ склонѣ горъ выступаетъ все тотъ же известнякъ, продолжаясь и на устьѣ долины Малой Кадильной, передъ сторою бѣлѣтся и уединенный утесикъ этой породы въ видѣ монумента; довольно живописные известковые утесы видѣются и на лѣвомъ берегу низовьевъ этой долины, образующей высокую, отчасти зазубренную стѣпу, довольно острые вершины которой придаютъ уже нѣсколько другой характеръ ландшафту. Вверхъ по этой долинѣ Черскій углублялся не болѣе чѣмъ на 4 версты, но и вся длина ея только немногимъ превышаетъ это разстояніе. Нижняя часть долины, нѣсколько мѣе версты въ длину, считая отъ ея выхода на низменную часть мыса, окружена высокими, бѣлѣющими скалами. Особенности на лѣвомъ склонѣ, въ высшей части котораго онѣ образуютъ отвѣсныя утесы, возвышающіеся надъ пологою, осыпанною частью склона. Выше долина образуется изъ двухъ вѣтвей: правой, слѣдующей съ з.-с.-з. и лѣвой съ с.-с.-з. Въ скалистой оконечности отрога, разобщающей эти вѣтви, со стороны лѣваго берега правой изъ нихъ замѣчается небольшое отверстіе пещеры, расположенное на высотѣ, довольно легко доступной съ уровня дна долины. Произведенный Черскимъ осмотръ ея показалъ, что и низкая щель эта проходима всего лишь на протя-

женіи отъ 6 до 7 саженой. Гладкость стѣнъ пещерки доказываетъ, что она подвергалась продолжительному дѣйствію проточной воды, составляя очевидно часть болѣе длинной, недоступной отсюда системы щелей. На днѣ пещеры залегаетъ тонкій слой наноса, состоящаго изъ угловатыхъ кусковъ известняка и известковой пыли, въ которой найдены и обломки сталактита, попавшіе сюда очевидно изъ другихъ частей пещеры, такъ какъ здѣсь нигдѣ не было и слѣдовъ этихъ натечныхъ образованій. Найденные въ этомъ наносѣ остатки животныхъ принадлежать, по опредѣленію Черскаго<sup>1)</sup> летучимъ мышамъ и птицамъ, при чемъ нашелся и коренной зубъ лошади; сохраненіе этихъ остатковъ располагаетъ считать отложеніе пещерки новѣйшимъ образованіемъ. Кроме этой пещеры, въ долинѣ находится еще нѣсколько другихъ не посѣщенныхъ Черскимъ, но осмотрѣнныхъ въ 1865 Кротопкинымъ<sup>2)</sup>.

Въ долинѣ этой, ошибочно называемой имъ «Ново-Кадильною» (слѣдуетъ читать Малая Кадильная), Кротопкинъ упоминаетъ о пяти пещерахъ. Въ лѣвой вѣтви онъ видѣлъ, на высотѣ около 150—180' надъ уровнемъ долины, только одну съ легко доступнымъ, большимъ четырехъ-угольнымъ отверстіемъ. Вначалѣ довольно высокая пещера эта постепенно суживается и оканчивается узкимъ каналомъ, въ которомъ едва можно помѣститься двоимъ. Пещера эта служила жилищемъ для лисицъ и не представляла ничего замѣчательнаго. Гораздо болѣе интересными казались автору пещеры въ правой долинѣ, къ тому же ихъ видно было много по горамъ, иногда на очень большой, трудно доступной высотѣ. Самая большая находится на лѣвой сторонѣ долины, располагаясь гораздо выше только что описанной. Высотѣ

---

<sup>1)</sup> Черскій, Рукописныя замѣтки о Сибири.

<sup>2)</sup> Кротопкинъ, Отчетъ Сиб. Отд. И. Р. Геогр. Общ. за 1865 г. стр. 99.

ей входа позволяет въ немъ стоять слегка нагнувшись, но дальше пещера суживается, становится ниже и тянется въ такомъ видѣ сажени три, послѣ чего опять становится шире и выше. Пройдя 7 сажений, считая отъ входа, вступаютъ въ главную часть пещеры, освѣщенную сверху широкимъ отверстіемъ. Она почти четырехугольная и имѣетъ 15 шаговъ въ длину и 8 въ ширину; стѣны почти отвѣсны, дно усыпано «черноземомъ» съ пескомъ. Отъ пещеры вверхъ идетъ родъ наклонной трубы, выходящей въ короткую галерею, открытую съ двухъ концовъ. Стѣны пещеры обвѣшаны сталактитами, накопившимися вдоль ихъ вершка въ 3 — 4 толщиною. Во время отрытія этой пещеры, какъ говорятъ, дно ея было совершенно гладкое, въ настоящее-же время оно оказалось совершенно изрытымъ кладонскателями, которые, на сколько могъ звать Кропоткинъ, нашли здѣсь только семь человѣческихъ скелетовъ, отличавшихся будто-бы размѣрами, значительно превосходящими обыкновенные. Обстоятельство это не подтвердилось однако Кропоткинымъ, которому удалось найти въ пещерѣ три черепа и достаточное количество другихъ костей; лишь изъ этихъ череповъ лежалъ уже добытымъ на камнѣ, а въ пещерѣ, вмѣстѣ съ двумя берцовыми костями, другой скелетъ зарытымъ въ очень рыхломъ, недавно копанномъ черноземѣ. Кромѣ того Кропоткинъ нашелъ въ боковой щели пещеры кусокъ шила, выдѣланнаго изъ кости, похожаго на те, которые и теперь употребляются въ Сибири при шиваніи кожъ, — затѣмъ, позвонки большой рыбы и кусокъ козьихъ роговъ, очень свѣжихъ и занесенныхъ сюда очевидно недавно. Къ сожалѣнію однако ни одна изъ этихъ находокъ не сохранилась въ музей г. Иркутска, а болѣе тщательный осмотръ напр. костянаго шила былъ бы весьма желателенъ, такъ и вообще болѣе подробное изслѣдованіе почвы и содержимаго этихъ пещеръ, такъ какъ съ нимъ, кромѣ общихъ зоологическихъ и антропологическихъ вопросовъ, связанъ еще весьма важный, чисто-мѣстный вопросъ: о времени

появленія въ Байкалѣ тюленей, ископаемые остатки которыхъ до сихъ поръ еще никѣмъ не найдены въ Прибайкалѣ. Найденные черепа человѣка, по замѣчанію Кропоткина, точно также не обнаруживаютъ особенной древности и ничто еще не доказываетъ, чтобы они принадлежали древнимъ обитателямъ пещеры. Одинъ изъ этихъ череповъ носить на себѣ явные признаки насильственной смерти: онъ разсѣченъ въ двухъ мѣстахъ острымъ орудіемъ. Кому принадлежатъ найденные черепа и какъ попали они въ пещеру, остается нерѣшеннымъ. Третья пещера находится въ правой долинкѣ, трудно доступна, но не глубока; надъ нею есть еще четвертая, поглубже. Въ эту послѣднюю необходимо спускаться сверху на веревкѣ; одинъ изъ Голоустенскихъ крестьянъ, бывшій въ этой пещерѣ, рассказывалъ Кропоткину, что она довольно велика, никакихъ костей въ ней нѣтъ, а нашли только часть птичьяго пера съ очень широкимъ опахаломъ. Кромѣ того, насупротивъ описанной выше, большей пещеры, по лѣвой сторонѣ долины, есть еще пятая, глубиною до 2½ сажень, но въ ней не найдено ничего интереснаго.

Осмотрѣвъ упомянутую выше пещерку, Черскій направился вверхъ по лѣвой вѣтви Малой Кадильной. На протяжении около  $\frac{3}{4}$  версты она придерживается почти меридиональнаго направленія, а выше опять юго-восточнаго, причѣмъ къ верховьямъ долина расширяется. Склоны здѣсь покрыты растительностью, тѣмъ не менѣе видно, что вся долина проложена въ одномъ лишь известнякѣ. Изученіе условій положенія и направленія пластовъ этой породы указываетъ однако, что мы имѣемъ здѣсь дѣло не съ утолщеніемъ известняка, а съ измѣненіемъ направленія этихъ поднятыхъ слоевъ. И дѣйствительно вмѣсто прежняго, сѣверо-восточнаго или-же в.-с.-в. простиранія, послѣднее перемѣняется здѣсь въ сѣверное и с.-с.-з., съ соотвѣтственнымъ паденіемъ пластовъ на западъ до 30°, такъ-что только

лѣвомъ берегу устья Малой Кадильной можно наблюдать еще наклонъ слоевъ на ю.-в.  $37^{\circ}$ .

Съ оконечности Кадильнаго мыса открывается красивый видъ на слѣдующую за нимъ, довольно живописную и обширную бухту, которую, для краткости, Черскій называетъ Улунтуйско-Голоустенскою, отъ имени ея двухъ отдѣльных частей: западной или Улунтуйской и восточной или Голоустенской. Общая длина бухты, считая по ея хордѣ, около 11 верстъ, изъ которыхъ 5 верстъ приходится на Улунтуйскую, которая къ тому-же всего болѣе вдается въ материкъ (болѣе 2 верстъ). Прибрежныя горы отличаются здѣсь повидимому тою же высотой, какъ и верховьяхъ Б. Кадильной, но въ промежуткахъ между расчленяющими ихъ долинами оканчиваются обособленными болѣе или менѣе заостренными вершинами. Вершины эти отдѣляются другъ отъ друга плоскими сѣдловинами и поразяютъ лѣсомъ точно также, какъ и весь, вообще крутой, наклонъ ихъ къ Байкалу, а потому эта часть горъ крайне далека еще отъ альпійскаго типа, хотя характеръ ихъ на столько же удаляется и отъ горъ, сопровождавшихъ путешественника отъ Култукъ. За мысомъ Кадильной берегъ западной части Улунтуйской бухты слѣдуетъ въ общемъ на с.-с.-в., послѣ чего уже поворачиваетъ къ востоку къ Ушканьему мысу, отдѣляющему эту бухту отъ Голоустенской. Крутой наклонъ горъ опускается къ озеру около основанія почти отменной террасою до  $35'$  высоты, сопровождающею узкое побережіе на протяженіи почти четырехъ верстъ. На уровнѣ этой террасы открываются и устья нѣкоторыхъ изъ первыхъ трехъ сухихъ долинокъ, пересекающихъ склонъ горъ. Этою долиною, вмѣстѣ съ которою побережіе нѣсколько расширяется, является Бѣлозерцова падь; за нею слѣдуетъ незначительная долинка, называемая Большіе ямки, сейчасъ же далѣе Улунтуй, расположенная въ самой глубокой части бухты, и Ушканья долина. От-

рогъ лѣваго берега послѣдней, кромѣ высшаго, притупленнаго пункта, снабженъ еще болѣе низкою, плоско округленною вершиною, расположенною почти на половинѣ высоты склона, и образуетъ собою Ушканій мысъ, около котораго берегъ весьма плавно переходитъ въ соответственную часть Голоустенской бухты.

Геогностическое строеніе горъ Улунтуйской бухты знакомитъ насъ съ отношеніемъ известняка Кадильной къ нѣкоторымъ другимъ, связаннымъ съ нимъ породамъ. Въ западной части Улунтуйской бухты наблюдается выходъ волнообразно изогнутыхъ слоевъ известняка, поверхъ котораго залегаетъ пропластокъ глинистаго сланца, въ свою очередь покрытый пластомъ такого же вообще известняка съ неяснымъ наклономъ слоевъ вообще къ сѣверу. Въ предѣлахъ упомянутой выше террасы можно видѣть только одно наносное образованіе, интересное въ томъ отношеніи, что оно состоитъ изъ неслоистыхъ продуктовъ разрушенія, среди которыхъ болѣе крупный матеріалъ является почти вовсе необточеннымъ и перемѣшаннымъ въ безпорядкѣ съ мелкими кусками мѣстныхъ породъ. Наносъ этотъ слагаетъ собою всю видимую часть террасы, а ближайшее изслѣдованіе показываетъ, что онъ примыкаетъ къ крутому склону горъ, въ которомъ порода является весьма растресканною, и сверху даже переходитъ, вѣрнѣе сливается съ детритусомъ, покрывающимъ поверхность этого склона. Очевидно поэтому, что отложеніе это образовалось изъ осыпей съ крутаго склона горъ и подъ вліяніемъ бывшаго въ свое время, болѣе высокаго стоянія воды въ Байкалѣ, преобразовано въ террасу.

Въ томъ, что пласты известняка, повернувшіе въ предѣлахъ Кадильнаго мыса къ сѣверу (см. выше), опять принимаютъ сѣверо-восточное простираніе, убѣждаютъ обнаженія въ болѣе глубокой части бухты, именно въ долинахъ Байерцовой и Улунтуѣ, гдѣ, кромѣ того, располагается и берущая имъ, почти опрокинутая складка (антиклинальная).

значительно поврежденнымъ юго-восточнымъ крыломъ. Складка эта опредѣляется не только горнымъ компасомъ, которымъ, напр. по долинь Улунтуя можно обнаружить сначала ю.-в.-е, а выше, т. е. далѣе отъ устья и с.-з.-е паденіе до  $75^{\circ}$ ; перегибъ этотъ наблюдается весьма хорошо, можно сказать, даже еще лучше, съ отдаленія, напр. съ западной части бухты. Оттуда видно, во-первыхъ, что на склонѣ горъ лѣваго берега Бѣлозерцовой пѣди пласты болѣе поднимаются со дна долины сначала почти отвѣсно вверхъ, даже слегка наклоняясь (опрокидываясь) къ сѣверу, послѣ чего, около высшихъ точекъ склона горъ, они образуютъ довольно плавный перегибъ по направленію къ озеру, т. е. съ паденіемъ къ с.-з. Перегибъ этотъ, прерванный здѣсь склономъ отрога, замѣчается съ достаточною отчетливостью на высотахъ лѣваго берега слѣдующей затѣмъ долины Улунтуя, гдѣ можно видѣть какъ самую вершину складки (антиклинальную точку), такъ и ея юго-восточное крыло съ наклонъ пластовъ къ Байкалу, т. е. къ юго-востоку. Въ разстояніи около 2-хъ верстъ отъ озера, на правомъ берегу Улунтуя, Черскій видѣлъ утесъ, обособленная, столбовидная часть котораго живо напоминаетъ собою статую человѣка съ складистою бородою; глаза, носъ и лобъ обрисовываются на ней весьма рельефно, благодаря соотвѣтственному растрескиванію породы и выпаденію отдѣлившихся кусковъ. Кромѣ упомянутой складки, со стороны береговой линіи озера, слѣдовательно южнѣ этого перегиба пластовъ, можно наблюдать значительно размытое впрочемъ начало сѣверо-западнаго крыла другой, болѣе южной складки, въ которой участвуютъ къ тому же болѣе глубокія части этой системы породъ. Обнаженіе это, составляющее, по всей вѣроятности, продолженіе въ некоторой части перемежаемости известняка съ глинистымъ сланцемъ, упомянутой выше въ западной части бухты, наблюдается уже въ самой восточной ея оконечности, даже на мѣстѣ перехода ея въ Голоустенскую бухту, т. е. сейчасъ же



за Ушканьимъ мысомъ. Оно обнаруживаетъ перемежаемость двухъ прослойковъ глинистаго сланца, болѣе 10' толщины, съ тремя прослойками сѣроватобѣлаго кварцита и однимъ известняка, съ общимъ паденіемъ слоевъ на с.-з. и наклонъ до 50°.

Въ заключеніе объ Улунтуйской бухтѣ скажемъ еще, что и въ промежуткѣ между долинами Бѣлозерцовой и Улунтуйской, высоко на склонѣ горъ (106' надъ озеромъ), открывается нѣсколько небольшихъ и сухихъ, вымершихъ долинокъ съ устьями, обрѣзанными склономъ террасы, на высотѣ которой по этимъ ложбинамъ протекали еще размывавшія ихъ нѣкогда воды. Долинки эти поучительны въ томъ отношеніи, что наблюдателю, стоящему на высотѣ ихъ устья, кажется, какъ будто онъ находится на самомъ уровнѣ Байкала или же на днѣ параллельной ему долины, въ которую съ одной стороны открываются сухія побочныя вѣтви, снабженныя еще собственными террасами, достигающими 14' высоты. Но иллюзія эта исчезаетъ сейчасъ же, коль скоро путешественникъ повернется лицомъ къ озеру: мнимымъ уровнемъ Байкала или же кажущимся дномъ главной долины, является пологіе склоны верхней поверхности террасы; на немъ прекращаются упомянутыя вымершія долинки и оканчиваются разобщающіе ихъ отроги, тогда какъ омывавшій ихъ нѣкогда Байкалъ волнуется уже на 106' ниже, работая надъ образованіемъ другой такой же террасы. Въ Улунтуйской бухтѣ добывалась прежде серебросвинцовая руда, оказавшаяся неблагодежною; она заключалась очевидно въ известнякѣ и выработывалась около уровня озера, но бывшій у Черскаго проводникъ не могъ ему показать этихъ обвалившихся уже ямъ.

Отъ Ушканьяго мыса, какъ сказано выше, начинается собственно Голоустенская бухта, ограниченная съ востока соименнымъ мысомъ съ расположенною на немъ деревню, которая виднѣется уже съ Кадильнаго мыса. Въ пределахъ этой бухты, болѣе полого врывающейся въ прибре-

зіе, нежели Улунтуйская, и съ болѣе длиннымъ сѣверо-западнымъ плечомъ, горы замѣтно понижаются, психодя по-видимому до 800' падъ озеромъ и отличаются лишь волнообразнымъ очертаніемъ контуровъ высшихъ пунктовъ. Основаніе ихъ болѣе или менѣе крутого склона сопровождается невысокимъ и довольно узкимъ прибрежіемъ, поросшимъ въ с.-з.-й части бухты столь же мощными лиственницами, какъ и береговныя горы. Возвышаясь перѣдко террасою отъ 17 до болѣе 20', прибрежье это выдается мѣстами въ озеро, образуя тутъ мысообразные выступы, а въ началѣ бухты, за Ушканьимъ мысомъ, на немъ находится солончаковое, болотистое мѣсто, называемое Синими солонцами потому, что почва здѣсь, благодаря продуктамъ разрушенія глинистаго сланца, покрывается синевато-сѣрою глиною. Если не обращать вниманія на незначительныя, сухія ложбинки и на одну такую же долину съ весьма живописными утесиками на ея лѣвомъ берегу, а также на другую, расположенную ближе къ деревнѣ и называемую Крестъ, то самую значительную долиною, пересекающею склонъ этихъ горъ почти на половинѣ разстоянія между мысомъ Ушканьимъ и Голоустною, является долина Озеркѣ, названная такъ отъ находящагося въ ея верховьяхъ небольшого и высыхающаго озера (см. ниже). Въ склонѣ упомянутой выше прибрежной террасы, сейчасъ же за Синими солонцами, наблюдается перемежаемость двухъ прослойковъ кварцита съ тремя глинисто-сланцевыми и двумя известковыми съ наклономъ пластовъ, измѣняющимся отъ з.-с.-з. до с.-з., тогда какъ даже въ той же террасѣ обнажается одно лишь наносное отложение, нижніе слои котораго состоятъ изъ хорошо окатаннаго матеріала, тогда какъ въ верхнихъ попадаетъ множе-ство остросребренныхъ кусковъ мѣстныхъ породъ, попавшихъ въ видѣ осыпи, съ прилежащихъ склоновъ горъ. Въ живописныхъ утесахъ Сухой долинки, о которой сказано выше, выступаетъ сѣровато-бѣлый кварцитъ, сильно вски-

пающий отъ кислоты, но всего болѣе интересными въ геологическомъ отношеніи являются окрестности устья долины Озерко, по которой Черскій сдѣлалъ экскурсію до котловины, давшей названіе этой пади.

По обѣ стороны устья этой довольно широкой и очень пологой долины отъ склона береговыхъ горъ Байкала отдѣляется по одному короткому террасовидному отрогу, не достигающему до береговой линіи озера и не превышающему по выдому 130' надъ уровнемъ послѣдняго. Осмотръ значительнаго поросшаго растительностью отрога праваго берега устья Озерка обнаружилъ, что основная часть состоитъ уже не изъ сланцевъ, съ которыми мы имѣли дѣло, начиная съ окрестностей устья долины Нижней, а изъ кристаллическихъ полевошпатовыхъ породъ, покинутыхъ нами еще на правомъ берегу долины Большой Варначей, гдѣ породы эти смѣшались юрскимъ конгломератомъ. И дѣйствительно, склонъ этотъ покрытъ сначала осыпью хлоритово - роговообманковатого гнейса, не весьма ясно слоистаго и порфировиднаго от чечевицеобразныхъ или округленныхъ зеренъ и скопленій полевого шпата до 20 миллиметр. въ діаметрѣ. Поверхъ этой породы, не представляющей здѣсь еще выходовъ, достаточныхъ для опредѣленія положенія ея пластовъ, залегаетъ столь же плохо обнаженный, мелкозернистый, иногда почти плотный доломитовый известнякъ, совершенно отличный отъ сѣраго или темносѣраго известняка Кадильнаго мыса и Улутуйской бухты: цвѣтъ его измѣняется отъ желтовато-бѣлаго до блѣдно-желтаго, красноватаго и тѣльно-краснаго, причемъ отъ примѣси многочисленныхъ листочковъ зеленаго хлорита, онъ переходитъ мѣстами въ хлоритовый известнякъ весьма красивой наружности, въ особенности въ тѣльно-красныхъ видоизмѣненіяхъ. Наконецъ, поверхъ этой, не встречающейся до сихъ поръ породы залегаетъ уже знакомая намъ сѣровато-бѣлый кварцитъ, къ сожалѣнію неясно слоистый и точно также осыпанный. Неудовлетворитель-

этого обнаженія возмѣщается утесами лѣваго берега устья  
и низовья той же долины. Со стороны Байкала тамъ точно  
также наблюдается узкая полоса того же гнейса, въ видѣ  
вышедшаго здѣсь когда-то низкаго отрога, параллельнаго со-  
временному Байкалу и пересѣченнаго долиною Озерка въ  
поперечномъ направленіи, причемъ простираніе пластовъ  
гнейса (с.-з.) является діагональнымъ къ направленію занимае-  
мой имъ полосы, съ паденіемъ слоевъ на с.-в. до с.-в. 37—30°.  
Поверхъ этой древнѣйшей породы, на высотѣ 90' надъ уров-  
немъ озера, залегаетъ доломитовый известнякъ, какъ и на  
правомъ берегу долины; но здѣсь замѣтно съ полною доста-  
точною отчетливостью, что порода эта залегаетъ на гнейсѣ  
несогласно, выполняя въ немъ перовности и покрывая сѣве-  
ро-западный склонъ гнейсоваго отрога, вмѣстѣ съ которымъ,  
т. е. со склономъ, известнякъ опускается и къ уровню до-  
лины Озерка, точно также, какъ юрскій конгломератъ въ  
планахъ Котовъ, Варначей и Нижней. Паденіе пластовъ  
известняка (почти с.-з.) въ свою очередь несогласное съ на-  
правленіемъ слоевъ гнейса (с.-в.). Поверхъ известняка и полною  
согласно съ нимъ, залегаетъ: сѣровато-бѣлый кварцитъ, обра-  
зующій на высотѣ горъ этого берега долины замѣтный вол-  
нообразный изгибъ въ видѣ двухъ небольшихъ синеклиналь-  
ныхъ изгибовъ и лежащаго между ними антиклинальнаго;  
кромѣ того, глинистый сланецъ и темно-сѣрый известнякъ, какъ  
и въ Кадильномъ,—однимъ словомъ, здѣсь обнажается знако-  
мая намъ уже перемежаемость съ примѣсью новаго члена,  
именно, красноватаго, иногда хлоритоваго известняка, играю-  
щаго роль низшаго стратиграфическаго уровня, или такъ  
называемаго лежащаго бока всей толщи сланцевъ. Долина  
Озерка, на протяженіи менѣе 2 верстъ отъ устья, отличается  
сѣверо-восточнымъ направленіемъ, довольно значительною шири-  
ною и не бѣдною травяною растительностью, смѣняющеюся  
уже къ склонамъ долины лѣсомъ. Затѣмъ долина преграж-  
дается низкимъ (около 150') узкимъ и пологимъ отрогомъ,

отдѣлившимся отъ горъ ея праваго берега почти въ поперечномъ направленіи и сѣзизвшивмъ долину до 2 саженой. По этому короткому, впрочемъ, ущелью Черскій прошелъ вверхъ, на сѣверо-западъ и достигъ сейчасъ же бассейна, занимаемаго небольшимъ, высыхающимъ лѣтомъ озеркомъ, отъ котораго произошло названіе всей долины. Бассейнъ этотъ представляетъ собою долину, слѣдующую съ запада на востокъ, къ ущелью, по направленію къ которому она сѣзизвшивается. Длина его достигаетъ 100 саженой, при наибольшей ширинѣ въ западной части около 60 саж. Съ южной стороны онъ ограничивается отрогомъ, отдѣляющимъ его отъ нижней части долины, а съ остальныхъ сторонъ болѣе высокими горами къ южному склону послѣднихъ примыкаетъ еще невысокая террасовидная площадь, расширяющаяся къ востоку и сѣзизвшившая собою соотвѣтственную часть бассейна, который принимаетъ такимъ образомъ неправильное треугольное очертаніе. Въ немъ именно, по веснамъ, скопляется вода, въполняя плоское дно до незначительной впрочемъ глубины. Высыхая такъ скоро, что напр. 22-го іюня 1879 г. Черскій могъ пройти вдоль средней линіи бассейна сухою ногою. Въ сѣверо-западный уголъ этого расширенія открывается долина, слѣдующая на в.-ю.-в. и в.-ю.  $15^{\circ}$ , такъ-что бассейнъ нашъ является какъ бы продолженіемъ ея, повернувшись болѣе къ востоку и расширеннымъ, благодаря небольшой линіи, впадающей въ юго-западный его уголъ, въ видѣ притока, высохшаго нынѣ притока. Кромѣ того, и въ восточномъ концѣ бассейна, насупротивъ ущелья, впадаетъ еще третья долина, слѣдующая ю.-ю.-з.-му направленію и состоящая изъ двухъ верховьевъ. Изъ двухъ же вѣтвей составляется и упомянутая выше, сѣверо-западная долина, причемъ ниже соединенія этихъ верховьевъ, долина эта сѣзизвшивается поднимившимися съ обѣихъ сторонъ известковыми утесами, въ которыхъ располагается еще вполне уединенный остатокъ этой породы, въ видѣ отдѣльно стоящей скалы. Вся она

ная система короткихъ долинъ промѣта въ перемежаемости глинистаго и слюдяно-глинистаго сланца съ кварцитомъ и сѣрымъ известнякомъ, пласты которыхъ наклонены здѣсь уже на ю.-в. до 45 и 50°, а мѣстами и почти отвѣсно. Отроги, сгущающіе эти долины, состоятъ изъ известняка и кварцита, а бассейнъ озера промѣтъ въ почти листоватомъ глинистомъ сланцѣ, весьма удобно разрушаемомъ; въ образованіи низовьевъ долины Озера не могли не участвовать и воды Байкала, въ періодъ ихъ болѣе высокаго стоянія. Высота бассейна Озера надъ поверхностью Байкала, по барометрическому измѣренію, оказалась равною болѣе 400', цифра, которую Черскій считаетъ слишкомъ преувеличенною.

Въ промежуткѣ между устьемъ Озера и мысомъ Голоустной, гдѣ, какъ сказано выше, прибрежныя горы понижаются до 800' и нѣсколько менѣе, склонъ ихъ образуется продолженіемъ того же гнейсоваго отрога, съ поперечнымъ разрывомъ котораго насъ ознакомило низовье только что описанной долины. Но около небольшой долины, называемой Крестъ, нѣкоторая часть по длинѣ склона обнаруживаетъ одну лишь розсыпь темно-сѣраго и зеленовато-сѣраго, кварцитовиднаго песчаника, мѣстами какъ бы переходящаго въ такой же глинистый сланецъ, причемъ рождается не разрѣшенный до сихъ поръ вопросъ: есть ли это осыпь съ высшихъ частей горы или же порода эта перегибается здѣсь черезъ гнейсовый отрогъ на склонъ Байкальской долины, или же, наконецъ, мы имѣемъ здѣсь дѣло съ перерывомъ членимости гнейса, выполненнымъ обломочною породою? Точно также и еще ближе къ мысу р. Голоустной, почти около самой деревни, около основанія гнейсоваго склона наблюдается тотъ же сланецъ и въ такомъ же непоучительномъ состояніи; гнейсъ между тѣмъ отличается неясною слоистостью, мѣстами съ наклономъ пластовъ какъ бы на востокъ до 60°.

Голоустный мысъ представляетъ собою одну лишь

дельту соименной рѣки, достигающую болѣе 4 верстъ ширины и вдающуюся въ Байкаль довольно правильно окруженною оконечностью болѣе чѣмъ на  $1\frac{1}{2}$  версты, образуя собою и сѣверо-восточный берегъ описанный нами Голоустенской бухты. Поэтому мысъ этотъ отличается низменностью и болотистою, безлѣсною почвою, а со стороны озера окруженъ пробойнымъ валомъ гальки, возвышающимся мѣстами отъ 3 до 5' надъ уровнемъ Байкала. Въ различныхъ частяхъ окружности мыса откываются устья рѣки, разбивающіяся здѣсь на четыре рукава. На юго-западной сторонѣ мыса около его основанія, слѣдовательно, около описанныхъ выше горъ, переходящихъ въ правый берегъ долины рѣки, располагается деревня Голоустная, вытянутая около самого берега озера, хотя нѣкоторыя отдѣльныя постройки стоятъ уже и около долины Крестъ. Деревня, состоящая въ Тугутуевской волости, насчитываетъ 33 двора и 172 жителя, въ числѣ которыхъ 84 мужскаго пола; по опредѣленію астронома Шварца деревня эта лежитъ подъ  $52^{\circ}1'$  сѣв. шир. и  $123^{\circ}3'$  вост. долготы слѣдовательно, на  $0^{\circ}11'$  сѣвернѣе с. Лиственичнаго. Во времена Георги (1772 г.), какъ извѣстно изъ сообщенія сопровождавшаго эту экспедицію студента Лебедева, вмѣсто деревни здѣсь располагалось только зимовье, построенное между двумя изъ рукавовъ устья рѣки и служившее мѣстомъ жительства перевозчиковъ черезъ Байкаль. Для этихъ послѣднихъ была построена и часовня. Интересно, что согласно Лебедеву, около этого зимовья горы должны были близко подходить къ берегу, слѣдовательно и къ одному изъ рукавовъ, между которыми располагалось поселеніе; между тѣмъ какъ въ настоящее время ни одно изъ устьевъ рѣки не подходить близко къ горамъ. Нѣсколько выше, вверхъ по долинѣ Голоустной, находится также и бурятскій улусъ въблизи котораго Радде встрѣтилъ первые экземпляры бальзамическаго тополя, растущаго здѣсь въ числѣ около сотни индивидуумовъ въ дикомъ состояніи. Кромѣ хлѣбопашества и скотоводства

ства, жители занимаются также и рыбною ловлею, отчасти также и звѣринымъ промысломъ, въ особенности весною (охота на тленей см. ниже) и осенью (бѣлка). Рыбу (преимущественно хариусъ) ловятъ какъ неводами въ озерѣ, такъ и заѣздками въ рѣкѣ. Скотоводство страдаетъ иногда отъ дикихъ звѣрей изъ того, что напр. въ 1878 г., въ бытность Черскаго, медвѣдь напалъ единовременно семь или шесть коровъ, пасшихся въ Ушканьей долинѣ. Отъ Голоустненскаго мыса начинается послѣдняя линія промѣровъ глубины Байкала, произведенная Рыбовскимъ и Годлевскимъ, по направленію къ с. Посольскому, лежащему уже въ предѣлахъ дельты р. Селенги. Наибольшая глубина озера по этой линіи оказалась равною 804,8' (1160 метр.), слѣдовательно, на 229,6' менѣе глубины по линіи отъ Кадильнаго мыса, на 656' менѣе нежели по линіи отъ мыса Черной рѣчки и на 698,5' менѣе наибольшей глубины Байкала (4503,3'), такъ-что средній наклонъ озера на этомъ протяженіи, т. е. къ линіи отъ истока Ангарты, опредѣляется по этимъ цифрамъ болѣе чѣмъ 12' на каждую версту.

Окончивъ описаніе берега озера отъ истока Ангарты до устья р. Голоустной, перейдемъ къ ознакомленію съ теченіемъ послѣдней и ея притоковъ; а такъ какъ система этой рѣки изслѣдована уже по многимъ направленіямъ, къ тому-же долины ея начинаются многіе маршруты, пересѣкающіе Приморскій, такъ и Онотскій хребты, поэтому описанію этой системы мы посвящаемъ отдѣльный параграфъ.

Система р. Голоустной и описаніе маршрутовъ, исходящихъ изъ долины этой рѣки.

Съ большею частью нижняго теченія Голоустной ознакомить насъ прежде всего: 1) маршрутъ Черскаго изъ дер. Голоустной въ долину Нижняго Качерта и вверхъ по ней въ систему правыхъ при-



токовъ р. Ангарты, именно рч. Большой и Баяной, откуда онъ вышелъ въ село Лиственничное. Экскурсію эту, какъ и всѣ остальные въ системѣ Голоустной, онъ совершилъ въ маѣ 1878 г. Сначала путь, т. е. тропа, по которой лѣтомъ возможно только сообщеніе верхомъ, придерживается правому берегу долины Голоустной, поперечникъ которой скоро суживается до 1 версты при общемъ направленіи на ю.-ю.-в. Довольно крутой склонъ горъ этого берега, въ противоположность такому-же лѣвому, порастаетъ только скудною травой, древесная же растительность, какъ обыкновенно вблизи жилаго мѣста, давно уже истреблена. Склонъ этотъ вмѣстѣ съ тѣмъ и достаточно скалистъ, чтобы, пользуясь имъ, развѣдывать внутреннее строеніе береговыхъ горъ. Оказывается, что въ ближайшихъ окрестностяхъ деревни и въ предѣлахъ ближайшей къ ней Стрекаловской долины, долины Голоустной пересѣкаетъ сѣверо-восточное продолженіе той-же узкой полосы неясно слоистаго хлоритово-роговообманковатого очкового гнейса, съ которымъ мы ознакомились еще въ окрестностяхъ Озерка, и который, какъ мы увидимъ ниже, продолжается и на соотвѣтственную часть низовьевъ лѣваго берега рѣки. Но, начиная уже съ лѣваго берега верховья Стрекаловской падушки («падѹшки» — по мѣстному выраженію есть уменьшительное отъ слова «падѣ», т. е. долина), мы встрѣчаемъ и здѣсь, въ сущности ту же-пережаемость сланцевъ, какъ на Озеркѣ, а именно: блѣдно-желтый, тонкослойный и мелкокристаллическій доломитовый известнякъ, залегающій непосредственно на гнейсѣ; порода эта покрывается затѣмъ слюдяно-глинистымъ сланцемъ, переходящимъ мѣстами въ темносѣрый кварцитовидный сланецъ, а затѣмъ, въ свою очередь, покрывается зеленоватымъ сѣровато-бѣлымъ кварцитомъ, образующимъ и высшія пикеты этихъ горъ (748' надъ Байк.), въ разстояніи болѣе 2 в. выше деревни. Положеніе пластовъ здѣсь, однако, измѣняется въ томъ отношеніи, что слои этихъ сланцевъ падаютъ

на в.-с.  $30^{\circ}$ , съ наклономъ отъ  $30$  до  $40^{\circ}$ , слѣдовательно, вообще въ сторону долины Голоустной, заставляя полагать, что занятое ею мѣсто освобождалось уже отъ полевошпатовыхъ породъ еще въ періодъ, предшествовавшій отложенію сланцевъ (см. ниже). Высшій пунктъ этотъ располагается уже на устьѣ праваго берега долины Харахаихи, принадлежащей первому, незначительному впрочемъ, правому притоку Голоустной; кварцитъ обнажается уже и на лѣвомъ берегу Харахаихи, опускаясь подъ уровень дна долины; какъ въ этомъ, такъ и въ залегающемъ подъ нимъ сланцѣ наблюдаются мѣстами тонкія, но многочисленныя прожилки и жилы кварца, содержащаго иногда скопленія листочковъ хлорита.

Выше Харахаихи, какъ склопъ, такъ и долина постепенно покрываются древесною растительностью, благодаря которой, по всей вѣроятности, не видно было здѣсь и выходовъ сѣраго известняка, какъ непремѣннаго члена этой перемежаемости. Отъѣхавъ верстъ съ 5, считая отъ Байкала, въ мѣстности, называсмой Ключами, располагается бузунскій улусъ, около котораго, въ склонѣ того-же (праваго) берега долины, выступать уже одинъ лишь слюдяноподобный сланецъ съ паденіемъ пластовъ на в.-ю.  $30^{\circ}$  до в. и наклономъ  $30^{\circ}$ . Долина Голоустной образуетъ далѣе довольно значительную излучину, съ выпуклостью, обращенною къ сѣверо-востоку: въ нижній уголъ этой выпуклости вливается рч. Черемшанка, а въ верхній, т. е. версты съ 4, выше, Угловая, — все незначительныя лѣвыя притоки бузуна. Насупротивъ устья Черемшанки, въ мѣстности, покрытой мелкимъ лѣсомъ и кустарникомъ, построена таможенная застава, около 7-ми верстъ отъ Байкала. Застава учреждена здѣсь имѣя въ виду удобный путь по долине Голоустной для провоза товаровъ, неоплаченныхъ установленною пошлиною, не только въ сторону Иркутска, но и на Иркутскій трактъ, хотя, по замѣчанію Черскаго, цѣлесообразность этого сторожеваго поста уничтожается тѣмъ обстоя-

тельствомъ, что онъ удобно объѣзжается по многимъ притокамъ Байкала, лежащимъ западнѣ Голоустной, какъ напр. по рч. Нижней, по Котамъ и т. п., откуда можно пошатъ какъ въ долину Нижняго Качергата, такъ и на рч. Большую ведущую къ Ангартъ. Впрочемъ, контрабанда принадлежитъ еще къ крайне рѣдкимъ явленіямъ въ Восточной Сибири, если не причислять къ ней золото, вывозимое тайнымъ образомъ съ пріисковъ. Около заставы въ склонѣ праваго берега главной долины обнажается тотъ же сланецъ, но пласты его падаютъ уже весьма правильно на ю.-в. съ наклономъ до  $60^{\circ}$ . Ближе къ долинѣ Угловой тропа переходитъ въ бродъ на лѣвый берегъ Голоустной, ширина которой достигаетъ здѣсь нѣсколькихъ сажень; слюдяно-глинистый сланецъ перемежаясь мѣстами съ сѣро-зеленымъ средне- и мелкозернистымъ кварцитомъ, сохраняютъ тоже ю.-в. паденіе слоевно, но наклонъ ихъ увеличивается до отвѣснаго положенія и даже опрокинутаго. Головы пластовъ сланца образуютъ собою дно долины Угловой, промытой въ низовьяхъ вдоль простирания породъ и снабженной конечною террасою, благодаря тому, что Голоустная успѣла углубить свою долину почти на 14' ниже устья названнаго притока. Выше устья Угловой тропы придерживается все лѣваго склона долины Голоустной, въ которомъ наблюдается весьма красивый, но незначительный волнообразный изгибъ глинистаго сланца (антиклиналь), совершающійся на протяженіи всего лишь  $80'$ . Въ обѣихъ устьяхъ рч. Читканъ и въ ея окрестностяхъ возстановляется другая бѣлая складка той-же породы (Читканская), восточное крыло которой пересѣкается долиною названнаго лѣваго притока Голоустной (около 16 верстъ отъ Байкала). Читканъ не превосходитъ 8 верстъ въ длину, составляется изъ двухъ верховьевъ и придерживается сначала почти южно и въ нижнемъ теченіи, юго-западнаго направленія. Водосѣльная часть хребта Приморскаго между верховьями Читканъ и среднимъ теченіемъ Голоустной, возвышается на 1383'

устьемъ; если-же считать послѣднее лежащимъ даже на высотѣ 48' надъ Байкаломъ, то относительная высота хребта равняется здѣсь 1431' надъ озеромъ. По всей долиинѣ Читкана, вверхъ по которой проложена тропа, ведущая къ устью р. Иги въ среднее теченіе Голоустной (см. ниже), въ утесахъ и россыпяхъ замѣчаются или слюдяно-глинистый сланецъ или подчиненный ему темный, сѣровато-зеленый или зеленоватогорный, кварцитовидный, метаморфическій песчаникъ съ намономъ пластовъ, измѣняющимся съ с.-з. къ ю.-з.

Съ устья Читкана Черскій направился къ Нижнему Качергату, впадающему въ Голоустную съ правой стороны, въ разстояніи около 19 верстъ отъ Байкала и около 3 верстъ выше Читкана. Вблизи отъ устья этой рѣчки, на ея лѣвомъ берегу находится стойбище Качергатскихъ тунгусовъ, состоящее изъ нѣсколькихъ (5—6) деревянныхъ юртъ,строенныхъ вообще по типу бурятскихъ, но съ болѣе простоя и болѣе бѣдною обстановкою. Проживающіе въ нихъ тунгусы, въ особенности мужчины, одѣваются въ русскіе крестьянскіе костюмы и отличаются крайнею бѣдностью, благодаря наклонности къ пьянству, содержащему ихъ въ постоянной кабалѣ и зависимости отъ болѣе богатыхъ представителей какъ русскаго, такъ и бурятскаго населенія Голоустной. Они забираютъ деньги и хлѣбъ въ счетъ результатовъ будущихъ промысловъ и потому плоды самой успѣшной охоты продаются ими не по существующей въ данное время цѣнѣ, а по назначенной имъ заимодавцемъ; понятно, что это всегда оканчивается необходимостью поваго забора и т. д. Даже на тюленій («нерпичій») промыселъ они отправляются не своею артелью, а поступаютъ въ артель, называемую какимъ либо изъ зажиточныхъ бурятъ или крестьянъ, работывая этимъ путемъ старые долги. А промыселъ между ними бываетъ нерѣдко весьма успѣшнымъ; такъ напр. однажды такая артель добыла болѣе 60 штукъ тюленей, а въ июлѣ 1878 г. одинъ молодой тунгусъ собственноручно

убилъ семь штукъ медвѣдей. При такихъ неблагопріятныхъ экономическихъ условіяхъ Качергатскіе тунгусы имѣютъ всего лишь нѣсколько коровъ и лошадей, оленей-же они не содержатъ вслѣдствіе чисто мѣстныхъ условій, именно, по недостатку здѣсь оленьяго мха.

Не безынтереснымъ и требующимъ ближайшаго изслѣдованія, является одно изъ свѣдѣній, передаваемыхъ Черскимъ <sup>1)</sup>. Когда, въ разговорѣ съ однимъ изъ Качергатскихъ тунгусовъ, онъ рассказывалъ ему о знакомствѣ съ тунгусами живущими на противоположномъ берегу Байкала, жители Нижняго Качергата стали увѣрять, что между ними и забайкальцами нѣтъ ничего общаго, такъ какъ послѣдніе суорочѣны а не тунгусы, заселяющіе по его мнѣнію только сѣверо-западный берегъ Байкала.

Долина Нижняго Качергата, около устья отличается почти меридіональнымъ направленіемъ и какъ бы противуположнымъ теченію Голоустной, но сейчасъ же далѣе сдвигается въ общемъ съ ю.-з. на с.-в. При общемъ обзорѣ гидрографіи интересующей насъ мѣстности мы говорили уже, что длина всей долины Нижняго Качергата достигаетъ болѣе 20 верстъ и что орографическое значеніе ея состоитъ въ томъ, что теченіемъ названной рѣчки Приморскій хребтъ слѣдующій по ея правому берегу, т. е. со стороны Байкала отдѣляется отъ Онотскаго хребта, сопровождающаго эту рѣчку съ лѣвой стороны. Поэтому было бы весьма желательнымъ болѣе подробное топографическое изученіе всей системы этой рѣчки и въ особенности сопредѣльнаго ей Онотскаго хребта, нежели это могло быть сдѣлано Черскимъ, преслѣдовавшимъ здѣсь главнымъ образомъ геогностическія цѣли. Къ тому-же путешественнику здѣсь значительно мѣшала неблагопріятная погода и буря, разразившаяся проливнымъ дождемъ со снегомъ (24 — 25-го мая); при чемъ туманъ, скоплавшійся

<sup>1)</sup> Черскій, Рукописныя замѣтки о Сибири.

окрестныхъ высотахъ не давалъ возможности изучать особенности ихъ конфигураціи, а раннее время года, вліяя на степень развитія растительности, придавало по всей вѣроятности болѣе мрачный характеръ довольно широкой долины Нижняго Качергата, нежели онъ могъ быть такимъ въ дѣйствительности. Въ нижнемъ теченіи, впрочемъ, по крайней мѣрѣ по лѣвому берегу рѣчки, гдѣ пролегалъ тропа, лѣсистая долина эта обваруживала луговой характеръ и служила мѣстомъ сѣнокосовъ для Качергатскихъ тунгусовъ. На первыхъ приблизительно 7-ми верстахъ, считая вверхъ отъ устья, въ склонѣ долины наблюдалось сѣверо-западное паденіе пластовъ того-же глинистаго сланца, перемежающагося съ метаморфическимъ (сѣровакковымъ?) песчаникомъ темно-зеленовато-сѣраго цвѣта и только въ концѣ этого отрѣзка, около долины Малаго Моелтѹа паденіе слоевъ перешло въ юго-восточное съ крутымъ наклономъ до  $80^{\circ}$ . Малый Моелтѹй представляетъ собою незначительный лѣвый притокъ Качергата, протекающій въ узкой (до 15 саж.) долинкѣ, слѣдующей на в.-ю.  $15^{\circ}$ . На правомъ берегу этой долинки выступаетъ лишь лишь сланецъ, видимый до значительной высоты и падающій какъ сказано выше, на юго-востокъ; между тѣмъ въ террасѣ лѣваго берега Моелтѹа, возвышающейся до 14—16' надъ уровнемъ ручья, можно видѣть, что на головахъ манды залегаетъ конгломератъ, въ вообще не крупной галькѣ котораго преобладаетъ тотъ же глинистый сланецъ, хотя между нею наблюдаются также и полевошпатовыя породы въ рѣдкую впрочемъ примѣсь порфировой. Обломочная порода эта ограничивается однако только названною террасою, тогда какъ склонъ горъ, къ которой послѣдняя примыкаетъ, образуется однимъ лишь кореннымъ сланцемъ, прослѣженнымъ Черскимъ до высоты около 400' надъ долиною.

Обстоятельство это убѣждаетъ уже въ томъ, что конгломератъ террасы не слѣдуетъ смѣшивать съ юрскимъ, которому свойственъ совершенно другой образъ залеганія; отъ

юрского онъ отличается кромѣ того и цементомъ (железистымъ), и потому возрастъ моелтуйскаго конгломерата относится по всей вѣроятности къ послѣднетичному, а въ крайнемъ случаѣ къ миоценовымъ отложеніямъ, съ которыми мы будемъ имѣть случай ознакомиться главнымъ образомъ на ю.-в.-м берегу Байкала. Отправившись далѣе вверхъ по лѣвому берегу Н. Качергата, съ полторы версты выше устья Малаго Моелтуя, можно было видѣть довольно значительную долину праваго притока Качергата, извѣстную подъ названіемъ Долгая падь: верховья ея по словамъ тунгуса, бывшаго проводникомъ въ этой экскурсіи, располагаются не далеко от знакомыхъ намъ уже долинъ: Улунтуя и Озерка, впадающихъ въ Байкалъ; вверхъ по Долгой падѣ отправляются тунгусы желающіе выйти къ Байкалу по названнымъ выше его притокамъ. Версты 1½ выше Долгой пади путешественники пересѣкли устье лѣваго притока Качергата, называемаго Большой Моелтуй, а спустя 4 версты, увидѣли долину Ундимы дабана, впадающаго въ Качергатъ съ правой стороны; въ этой долинѣ, какъ говорятъ, можно выйти какъ на верховья Улунтуя, такъ равно и на верховья Большой Ундимы. Въ попадавшихся на этомъ пути выступавшихъ сланца пласты падаютъ опять на с.-з. Выше Ундимы дабана Нижній Качергатъ образуетъ большую излучину съ выпуклостью, обращенною вообще къ югу; изгибъ этотъ остается до сихъ поръ еще никѣмъ не посѣщеннымъ, такъ какъ Чарский направился къ верховьямъ этой рѣки прямымъ путемъ и спустя нѣсколько верстъ дороги подъ проливнымъ дождемъ смѣшаннымъ со снѣгомъ, вышелъ опять на Качергатъ около мѣста впаденія въ него съ правой стороны рч. Шелѣгуръ. Это та именно долина, верховья которой, какъ сказано выше, можно видѣть съ лѣвой вѣтви источниковъ Нижней пади. Отсюда видно было, что высшія части Приморскихъ хребта совершенно побѣлѣли отъ выпавшаго снѣга, мѣстами на сѣверныхъ высотахъ держался туманъ, мѣшавшій

видѣть особенности Охотскаго хребта, что тѣмъ болѣе достойно сожалѣнія, что вблизи этого мѣста хребетъ этотъ долженъ уже прерываться или переходить въ плоскую возвышенность праваго берега Ангарты. Тропа повернула къ сѣверо-западу, къ верховьямъ Нижняго Качергата, лежащимъ, какъ сказано выше, приблизительно въ 20 верстахъ къ сѣверо-востоку отъ истока Ангарты и, пройдя нѣсколько верстъ по плоской долинь, достигла плоскаго-же перевала къ верховьямъ р.ч. Большой, впадающей въ Ангарту, именно, къ такъ-называемой Лѣвой Большой. Отсюда видно, что Качергаты направляются въ предѣлахъ своихъ источниковъ на в.-ю.  $15^{\circ}$ , а Лѣвая Большая на з.-ю.  $15^{\circ}$ . Въ неясныхъ выступахъ изъ подъ сплошнаго растительнаго покрова, а также въ отдѣльно лежащихъ кускахъ попадались здѣсь только глинистый сланецъ и метаморфическій песчаникъ, но въ долинь Большой стали попадаться уже гальки и валуны, принадлежащіе очевидно древнему конгломерату (см. ниже). Одинъ изъ такихъ, довольно значительныхъ валуновъ (около пуда вѣсомъ) сохраняется тунгусами около стоящаго тутъ же дерева и каждый изъ, во время посѣщенія ими этой мѣстности, употребляется для состязанія въ томъ, кто изъ нихъ съумѣетъ выше подбросить этотъ камень и ударить имъ въ стволъ дерева, кора котораго носитъ уже много слѣдовъ отъ подобныхъ упражненій. Высота перевала, по опредѣленію anerоидомъ, замѣтимъ въ весьма непостоянную погоду, оказалась равною 887' надъ уровнемъ моря. Проѣхавъ верстъ съ 5 внизъ по Лѣвой Большой, тропа выходитъ въ общую долину Большой рѣчки, гдѣ, при соединеніи съ правою Большою, она принимаетъ съ лѣвой стороны долину Моховую. Сейчасъ же ниже устья Моховой, высоко на склонѣ праваго берега Большой, замѣчается утесистый уступъ въ которомъ обнажается перемежающаяся конгломерата съ песчаникомъ темнаго, зеленоватого цвѣта, похожаго на описанный выше на лѣвомъ берегу Ангарты, а отчасти также и на перемежающійся съ гли-



нистымъ сланцемъ по р. Голоустной и Нижнему Качергату но въ томъ, что мы имѣемъ здѣсь дѣло съ юрскими осадками, а не съ болѣе древними сланцами, сопровождавшими насъ начиная съ долины Нижней (см. выше), убѣждаетъ насъ въ первыхъ составъ конгломерата Большой рѣчки. Въ его галы Черскій находилъ, кромѣ полевошпатовыхъ породъ, еще кварцитъ и глинистый сланецъ, принадлежащіе безспорно системѣ породъ, развитыхъ по Качергату и другимъ частямъ системы Голоустной, причемъ одинъ изъ включенныхъ кусковъ глинистаго сланца достигалъ около 17 дюймовъ въ діаметрѣ. Къ тому же конгломератъ этотъ переходитъ отсюда непосредственно въ долину р. Ангара, гдѣ возрастъ отложеніи опредѣленъ уже ископаемыми остатками, какъ объ этомъ мы говорили выше. Пласты въ этомъ утесѣ обнаруживаютъ весьма слабый наклонъ вообще къ сѣверу. Долина Большой направляется отсюда уже на ю.-з., сохраняя въ общемъ такое-же направленіе до самаго устья въ Ангару, отстоящаго отъ долины Моховой на разстояніи около 20 верстъ, а отъ верховьевъ правой Большой на 24 версты. Черскій проѣхалъ внизъ по этой рѣчкѣ впрочемъ только верстъ около 8-ми. На этомъ протяженіи долина является вообще довольно широкою и поросшею смѣшаннымъ, довольно рѣдкимъ лѣсомъ, а мѣстами только кустарникомъ; въ болѣе крутомъ правомъ склонѣ долины мѣстами обнажается такая-же перемежаемость конгломерата, какъ вблизи Моховой, а въ утесѣ, называемомъ Хара-бѣйсанъ, можно наблюдать не вполне ясное впрочемъ паденіе слоевъ на ю.-з. до  $12^{\circ}$ . Около 2-хъ верстъ ниже этого утеса путешественникъ перешелъ на лѣвый берегъ рѣчки, достигающей здѣсь не болѣе 2—3 сажень ширины, и направился вообще къ югу, чтобы, переваливъ черезъ горы, выйти прямымъ путемъ въ село Лиственничное на Байкаль. Покинувъ рч. Большую на высотѣ 476' надъ уровнемъ, и повернувъ въ сухую долину съ лѣваго притока тропа начала подыматься на склонъ прилежащихъ высотъ.

и, спустя около 6 верстъ, достигла высшаго пункта отрога, отдѣляющаго рч. Большую отъ ея лѣваго притока, называемаго Черемшанкою. Высота мѣстности оказалась равною 1246' надъ Байкаломъ; отрогъ не обнаруживаетъ расчлененія и потому является довольно плоскимъ; на пути нерѣдко можно видѣть гальку и валуны, обличающіе составъ почвы изъ юрскаго конгломерата. Повернувъ на гребнѣ къ ю.-ю.-з. и пройдя около 3 верстъ, Черскій спустился въ долину Черемшанки, направляющуюся въ общемъ на з.-с.-з. Широкая долина эта достигаетъ болѣе 10 верстъ въ длину и благодаря своей пологости представляетъ удобное мѣсто для проложенія дороги къ рѣчкамъ Коты на Байкалѣ, если бы тамъ стали процвѣтать или золотые промыслы или же упомянутая выше стеклянная фабрика, такъ какъ верховья Черемшанки, по словамъ тунгусовъ, смежны съ верховьями Большихъ Котовъ и разобщаются удобнымъ переваломъ. Съ долины Черемшанки на западѣ виднѣется порослая лѣсомъ вершинка, извѣстная подъ названіемъ Острая Сопка, располагающаяся на правомъ берегу рч. Большой, въ нѣсколькихъ верстахъ выше ея устья. Вершина эта осмотрѣна была Чекановскимъ (I. с. pag. 179), который нашелъ въ ней обнаженіе юрскаго конгломерата, залегающаго поверхъ песчаника, на чемъ, между прочимъ, было основано мнѣніе его о принадлежности конгломерата къ верхнему ярусу юрскихъ осадковъ, неоправдавшееся изложенными выше данными <sup>1)</sup>, которыя говорятъ только въ пользу перемежаемости, а затѣмъ выклиниванія и исчезновенія конгломерата по мѣрѣ удаленія отъ Байкала, гдѣ онъ является господствующимъ. Что-же касается географическаго положенія Острой Сопки, то показаніе Черскаго, что гора эта видна на западѣ отъ мѣста, гдѣ онъ спустился на Черемшанку, не согласуется съ мѣстомъ, на которомъ Сопка означена на картѣ Чекановскаго (болѣе 10 верстъ выше устья р. Большой) и

<sup>1)</sup> См. р. Ангара и берегъ Байкала до Голоустной.

заставляет полагать ошибку или въ положеніи долины Черемшанки на картѣ Байкала Черскаго (что весьма вѣроятно по его собственному замѣчанію <sup>1)</sup>), или-же у Чекановскаго гора эта отодвинута болѣе къ сѣверо-востоку. Пересѣкши долину Черемшанки, Черскій сталъ подыматься вверхъ по ея лѣвой вѣтви на ю.-з., чтобы перейти на рч. Банную. По дорогѣ виднѣлась нерѣдко конгломератовая галька, которая оказалась покрытымъ и водораздѣлъ между верховьями рч. Распихи (прав. притокъ Ангары) и параллельною ей долиною рч. Банной. Водораздѣлъ этотъ и вообще высшая часть Приморскаго хребта, достигнутая путешественниками въ разстояніи 3—4-хъ верстъ отъ Черемшанки, отличалась плоскою и ровною поверхностью, достигающею въ промежуткѣ между Банною и Распихою 1432' высоты надъ уровнемъ Байкала. Высокій кедровникъ, которымъ порастаетъ эта часть горъ, сильно пострадалъ отъ бывшаго здѣсь ранею весною лѣснаго пожара; мѣстами поверхность почвы была устлана многочисленными обгорѣлыми стволами, между которыми съ большимъ трудомъ пробирались путешественники, ведя лошадей въ поводьяхъ. Нѣкоторые изъ стволовъ еще дымились и вся почва до того была покрыта угольною пылью и золою, что каждый шагъ какъ лошади, такъ и пешеходы подымалъ нерѣдко цѣлый столбъ черной копоти. Но неудобство такого перехода перешло даже въ опасность, когда, съ усиленіемъ дувшаго въ то время съ с.-з. подгорѣлые стволы кедровника стали ломаться и съ трескомъ падать на покрытую копотью землю. Прибавивъ шагу, путешественники удалились ближе къ южному склону гребня, уменьшивъ этимъ шансы возможнаго печальнаго случая, и скоро вышли за предѣлы бывшаго пожара. При взглядѣ съ этого плоскаго гребня одинаковой съ нимъ высоты кажутся какъ горы лѣваго берега Банной, такъ, повидимому, и болѣе высокія части горъ

---

<sup>1)</sup> Черскій, Рукописныя замѣтки о Сибири.

праваго берега Ангарты, обстоятельство, заставляющее предполагать, что опредѣленная анерондомъ цифра высоты этого гребня (1432') быть можетъ нѣсколько преувеличена. Пройдя немного далѣе вдоль гребня, найдено было нѣсколько небольшихъ выступовъ сѣраго гранито-гнейса, но всѣ они выдѣлялись только острововидно изъ подъ окружающаго ихъ конгломерата, галька котораго достигаетъ мѣстами около 17 дюймовъ въ діаметръ. Во всякомъ случаѣ это единственные выступы полевошпатовыхъ породъ въ горахъ праваго берега долины рч. Банной, низовья которой, какъ мы указывали выше, служатъ южною границею развитія юрскихъ осадковъ по правому берегу р. Ангарты. Отсюда Черскій спустился въ долину рч. Банной, направляющейся здѣсь, какъ и вообще, на з.-ю.-з. (вѣрнѣе з.-ю. 15°), пересѣвъ ее въ разстояніи около 4-хъ верстъ выше устья, чтобы перевалить черезъ ближайшій къ озеру отрогъ Приморскаго хребта, извѣстный подъ названіемъ Морской гривы, причемъ слѣдуетъ замѣтить, что названіе это приурочивается не къ какой-либо одной отрасли горъ, но примѣняется вообще къ гребню отрога, ближайшаго къ Байкалу. Для этой цѣли путешественники повернули вверхъ по лѣвой вѣтви рч. Банной, подвигаясь къ ней на ю.-ю.-в. и спустя около 20 минутъ подъема, достигли перевала на верховья знакомой намъ уже Сиротинской долинки, открывающейся въ Байкалъ уже въ предѣлахъ села Лиственичнаго. Здѣсь именно, на высотѣ 906' надъ озеромъ, находится описанное выше обнаженіе юрскаго конгломерата, покрывающаго полевошпатовыя породы, изъ которыхъ состоятъ низшія части горъ около с. Лиственичнаго. Подвинувшись еще нѣсколько къ западу, Черскій спустился къ Байкалу внизъ по описанной выше Каменной долинкѣ, около которой расположена таможня.

Орографическая важность описаннаго маршрута состоитъ въ томъ, что имъ измѣняется прежнее воззрѣніе на юго-западные оконечности какъ Приморскаго, такъ и Онотскаго

хребтовъ. Чекановскій, благодаря которому, какъ сказано выше, мы получили первыя свѣдѣнія о существованіи этихъ двухъ хребтовъ, считавшихся географами за одинъ, известный подъ именемъ хребта Байкальскаго, не имѣлъ возможности достаточно ознакомиться съ описаннымъ нами отрѣзкомъ горъ и, очевидно, не подозрѣвалъ орографическаго значенія долины Нижняго Качергата, не нанесеннаго имъ даже и на геогностическую карту, хотя рѣка эта обозначена уже на картѣ астронома Шварца, подъ названіемъ «Малый Качергатай». Поэтому, по недостаточно мотивированнымъ причинамъ, въ которыхъ скрывалось по всей вѣроятности желаніе поставить хребты эти въ возможно строгую связь съ геогностическимъ ихъ строеніемъ, Чекановскій <sup>1)</sup> считалъ юго-западною оконечностію хребта Онотскаго часть береговыхъ горъ Байкала, лежащую въ промежуткѣ между Ангарою и нижнимъ теченіемъ р. Голоустной и служащую такимъ образомъ водораздѣломъ между соответственными свитами притоковъ названныхъ двухъ рѣкъ. Согласно такому воззрѣнію, Онотъ долженъ былъ направляться сначала на сѣверо-западъ, а затѣмъ параллельно среднему теченію р. Голоустной и принимать уже нормальное обоимъ хребтамъ сѣверо-восточное направленіе. Обстоятельство это заставило такимъ образомъ Онотскій хребетъ изгибаться вокругъ столѣе произвольно означенной юго-западной оконечности Приморскаго хребта, которая, согласно этому воззрѣнію, беретъ начало на лѣвомъ берегу нижняго теченія Голоустной. Между тѣмъ только-что описанный маршрутъ Черскаго убѣждаетъ насъ въ томъ, что достаточно широкая и глубокая долина Нижняго Качергата весьма рельефно ограничиваетъ собою прибрежную полосу горъ Байкала на этомъ протяженіи, превращая ее въ параллельный озеру, вполнѣ типическій хребетъ, западное продолженіе котораго переходитъ непосред-

---

<sup>1)</sup> Чекановскій, I. с. pag. 231 и пр.

венно на пространство, ограниченное съ сѣверо-запада до-  
ною рч. Большой, и упирается прямо въ правый берегъ  
ответственнаго отрѣзка р. Ангары. Хребта съ сѣверо-  
западнымъ направленіемъ здѣсь поэтому не существуетъ вовсе,  
и весь этотъ прибрежный хребетъ можно считать лишь юго-  
западнымъ продолженіемъ Приморскаго, пересекаемаго ниж-  
нимъ теченіемъ р. Голоустной точно также, какъ далѣе къ  
северо-востоку, тотъ-же хребетъ пересекается долинами рѣкъ:  
Большой Бугульдейки, Ангѣ, Сармы и т. д. Онотскому хребту  
здесь, слѣдовательно, нѣтъ мѣста, а онъ, напротивъ, про-  
должается къ юго-западу, вверхъ по лѣвому берегу Нижняго  
Чергата, сохраняя и здѣсь направленіе, параллельное При-  
морскому, переходя еще повидимому и на правый берегъ  
Холовьевъ рч. Большой, а можетъ быть и на все ея верхнее  
теченіе (Острая Сопка, см. выше), послѣ чего, однако, онъ  
повидимому переходитъ въ плоскую возвышенность, или же  
разбивается ею въ нѣкоторомъ отдаленіи отъ праваго берега  
Ангары, и потому, въ противоположность Приморскому хребту,  
онъ не примыкаетъ непосредственно къ долинѣ этой рѣки.  
Окончательное рѣшеніе вопроса какъ о мѣстѣ, такъ равно  
и въ особенностяхъ интересующаго насъ окончанія Онота тре-  
буется ближайшаго изслѣдованія мѣстности, лежащей между  
Холовьевыми рч. Большой, Ушаковкою и Ангарою, по край-  
ней мѣрѣ до ея прав. притока Королка, но къ сожалѣнію  
изъ указанныхъ предѣлахъ не былъ еще ни одинъ изъ уче-  
ныхъ путешественниковъ. Такое, строго орографическое раздѣ-  
леніе этихъ хребтовъ только и вообразимо въ этой мѣстности,  
и какъ, еслибы мы хотѣли принять въ основу классифи-  
каціи геогностическое строеніе, то, какъ мы увидимъ ниже,  
въ протяженіи между истокомъ Ангары и устьемъ р. Боль-  
шой Бугульдейки, большую часть Приморскаго хребта, по  
его ширинѣ, необходимо было бы соединить съ Онотскимъ,  
и состоящую изъ сланцевъ одного возраста, несмотря на  
такое образцовое разъединеніе этихъ хребтовъ среднею частью

долины Голоустной. Наконецъ, что касается означенной на картѣ Чекановскаго полосы «шальштейна», которая, начинаясь отъ Байкала, между долинами Сѣнною и Кадильною направляется сначала на сѣверо-западъ въ верховьямъ рч. Большой и Ушаковки, откуда поворачиваетъ на сѣверо-востокъ и простирается въ такомъ видѣ вверхъ по правому берегу средняго теченія Голоустной, то полоса эта, обозначающая съ совершенною точностью предполагавшееся Чекановскимъ направленіе юго-западной части Онотскаго хребта, является, по замѣчанію Черскаго, не болѣе какъ результатомъ нѣкоторыхъ петрографическихъ и стратиграфическихъ недоразумѣній, вовлекшихъ Чекановскаго и въ указанную выше ошибку въ опредѣленіи положенія юго-западной оконечности Онота. И дѣйствительно, къ категоріи «шальштейновъ и шальштейноваго конгломерата» Чекановскимъ включены не только юрскіе песчаники въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ они отличаются темнозеленовато-сѣрымъ цвѣтомъ (прибрежное видоизмѣненіе) а также конгломераты того же возраста, гдѣ песчанниковъ цементъ ихъ имѣетъ тѣ же свойства и окраску, но выѣстъ съ тѣмъ и сѣро-зеленый или зеленовато-сѣрый метаморфическій песчаникъ, какъ, петрографически, на глазъ нерѣдко весьма сходный съ юрскимъ. Сюда слѣдовательно относится и перемежающійся съ нимъ глинистый и слюдяно-глинистый сланецъ признанные имъ за члены одной и той-же, но болѣе метаморфизированной здѣсь системы породъ и отнесенные имъ-же къ юрскому возрасту, такъ какъ ему не были знакомы условія отсчительнаго залеганія этихъ породъ другъ на другъ <sup>1)</sup> точно также, какъ онъ не зналъ и описанной выше перемежаемости Кадиленскаго известняка, считавшагося имъ девонскимъ съ тѣмъ же глинистымъ сланцемъ. Тѣмъ не менѣе, даже при такомъ воззрѣніи на древность и обоюдное отношеніе этихъ пластовъ, Чекановскому не доставало лишь знакомства

---

<sup>1)</sup> Чекановскій, Зап. Сиб. Отд. И. Р. Общ. Т. XI, стр. 304—305

строением горъ по нижнему течению Голоустной, а также въ промежуткѣ между долиною этой рѣки и Байкаломъ для того, чтобы упомянутую полосу его шальштейновъ, столь совпадающихъ съ принятымъ имъ направлениемъ ю.-з-ой окочности Оното, измѣнить въ болѣе широкую, распространяющуюся почти на всю ширину Приморскаго хребта въ названныхъ предѣлахъ, причемъ полоса эта, понятно, не могла бы уже и загигаться въ такомъ видѣ, въ какомъ она является на его картѣ. Между тѣмъ, какъ показали описанныя выше изслѣдованія Черскаго, значительная часть «шальштейновыхъ породъ» Чекановскаго сводится къ болѣе или менѣе метаморфизованнымъ прибрежнымъ видоизмѣненіямъ юрскаго песчаника и конгломерата, цвѣтъ которыхъ зависитъ отъ примѣси продуктовъ разрушенія роговообманковыхъ гнейсовъ и глинистыхъ сланцевъ, причемъ толща эта залегаетъ вполне несогласно на глинистыхъ сланцахъ, слѣдовательно на остальной части шальштейновой группы породъ Чекановскаго и на полевошпатовыхъ породахъ, покрывая ихъ собою или-же прилегая къ нимъ, какъ позднѣйшіе осадки прилегаютъ къ береговымъ склонамъ долинъ, въ которыхъ размѣщались отлагавшія ихъ воды, и заключая въ себѣ заимствованные отъ нихъ обломки. Такимъ образомъ, на основании всего сказаннаго выше, необходимо признать въ данномъ случаѣ одни лишь орографическія данныя достаточными для опредѣленія и разграниченія интересующихъ насъ хребтовъ, въ которыхъ въ составѣ Приморскаго участвуютъ здѣсь какъ юра, такъ и главнымъ образомъ толща сланцевъ, возрастъ которыхъ относится къ періоду промежуточному между лавровскимъ и лаврентьевскимъ, а наконецъ и лаврентьевскія породы, совершенно отсутствующія въ Оногѣ. Тѣ же данныя составляютъ насъ во-первыхъ продолжить Приморскій хребетъ въ низовьяхъ Голоустной до Ангары, а съ тою же послѣдовательностью и на лѣвый берегъ этой рѣки, послѣ чего очевидно, что Приморскій хребетъ слѣдуетъ разсматривать какъ



сѣверо-восточное продолженіе Тункинской цѣпи горъ, пересѣченной сначала Иркутомъ (ущелье), затѣмъ истокомъ Ангары, а наконецъ, нижнимъ теченіемъ р. Голоустной. Отложивъ до окончанія этого параграфа общее обозрѣніе тѣхъ выводовъ, къ которымъ приводитъ строеніе описываемой части прибрежныхъ горъ озера, перейдемъ къ дальнѣйшему ознакомленію съ системою р. Голоустной, именно съ отрѣзкомъ.

Отъ устья Нижняго Качергата до деревни Тарбѣевой, расположенной въ среднемъ теченіи Голоустной.

Начальная часть описаннаго выше маршрута Черскаго отъ деревни Голоустенской до устья Нижняго Качергата познакомила насъ съ большею частью длины нижняго теченія р. Голоустной, которое въ общемъ, т. е. не взирая на изгибы, занимаетъ долину поперечную, какъ съ орографической точки зрѣнія, такъ и относительно господствующаго здѣсь простиранія пластовъ сланцевъ. Теченіе это (т. е. ниже) продолжается еще на 8 верстъ выше стойбища Качергатскихъ тунгусовъ, представляя нѣкоторыя небезынтересныя явленія, относящіяся между прочимъ и къ вопросу о жизни и преобразованіяхъ рѣчныхъ долинъ. На протяженіи первыхъ 2-хъ или 3-хъ верстъ отъ названнаго стойбища, откуда тропа переходитъ на лѣвый берегъ Голоустной, можно видѣть длины двухъ слѣдующихъ правыхъ притоковъ рѣки, имени Средняго и Верхняго Качергатовъ, направленныхъ вообще къ юго-востоку и до сихъ поръ никѣмъ еще не описанныхъ, хотя долины эти могутъ служить весьма цѣлесообразными путями для изученія пересѣкаемой ими части Олонскаго хребта, вслѣдствіе чего будущимъ изслѣдователямъ можно рекомендовать эти долины и перевалъ съ верховьевъ ихъ одной стороны на верховья рч. Большой (см. выше), а другой, въ долину верхняго теченія р. Ушаковки, имѣя въ виду поставленный выше вопросъ о юго-западной оконечности

лота. Широкая долина Голоустной, слѣдующая въ предѣ-  
ль устьевъ Качергатовъ съ сѣверо-востока на юго-западъ,  
суживается выше устья верхняго изъ названныхъ притоковъ,  
имѣющая почти меридіональное направленіе (ю.-в.  $15^{\circ}$ ). Суже-  
ніе это обусловливается не столько склонами прилежащихъ  
горъ, сколько весьма широкою, террасовидною площадью, под-  
нимающею съ лѣвой стороны и возвышающеюся до 30 фу-  
товъ надъ уровнемъ соотвѣтственно углубившейся здѣсь  
долины, которая образуетъ здѣсь поворотъ, слѣдуя сначала къ  
югу, а выше на в.-ю.-в. Въ склонѣ террасы обнаженъ гли-  
нистый сланецъ, перемежаясь съ сѣрыми кварцитомъ и па-  
мороу на с.-з. Начиная съ послѣдняго изъ названныхъ пово-  
ротъ, около котораго тропы слѣдуетъ уже по площади тер-  
расы, путешественникъ, ѣдущій напр. въ дер. Тарбѣеву,  
замѣтительно вверхъ по долинѣ Голоустной, вдругъ полу-  
чаетъ впечатлѣніе, какъ будто онъ началъ спускаться внизъ  
по теченію рѣки. Такая иллюзія, замѣчаетъ Черскій, отъ ко-  
торой мы заимствуемъ это описаніе, поддерживается, во-  
первыхъ, весьма замѣтнымъ, хотя и легкимъ, наклономъ дна  
нижняго берега долины въ этомъ направленіи, затѣмъ, види-  
тъ впереди пониженіемъ горъ, а наконецъ, начиная съ  
самой правой пѣды Шелѣтѣй, и направленіемъ по-  
ниженныхъ долинъ, противоположныхъ главной долинѣ такъ,  
что только взглядъ на теченіе воды въ руслѣ глубоко врѣ-  
зающагося въ дно долины, убѣждаетъ въ дѣйствительномъ по-  
ниженіи вещей. Такія особенности описываемой части долины  
заставляютъ заняться ими спеціально и съ возможною по-  
длинностью, такъ какъ, по замѣчанію Черскаго, онъ застав-  
ляетъ полагать, что средняя часть теченія р. Голоустной и  
нижняго, до описаннаго суженія, могли составлять  
самостоятельный бассейнъ, принадлежавшій, быть мо-  
жетъ, какъ мы увидимъ ниже, системѣ водъ Куртуна, т. е.  
Кульдейки, и только впоследствии захваченный современ-  
ною нижнею частью Голоустной, которая могла быть въ то

время вполне независимою рѣкою. Но, къ сожалѣнію, в время этой экскурсіи, Черскій долженъ былъ преслѣдовать главнымъ образомъ стратиграфическіе и петрографическіе вопросы и потому съ луговой, поросшей мѣстами лѣсомъ, по поверхности дна долины онъ спустился въ скалистое русло рѣки, углубившейся здѣсь болѣе чѣмъ на десять футовъ въ долину. Начиная съ устья долины Змѣевки, выдающейся съ правой стороны и направляющейся на в.-с.-з. почти противоположно теченію главной рѣки, углубившаяся такимъ образомъ Голоустная образуетъ цѣлый рядъ змѣевидныхъ излучинъ, то непосредственно подмывая часть стѣнящихъ её скалъ, то отступая отъ нихъ на нѣкоторое расстояние. Соотвѣтственно извивается и тропа, по которой спускался Черскій, нерѣдко переходя съ одного берега на другой. Въ обнаженіяхъ выступаетъ все тотъ же глинистый сланецъ съ подчиненными ему песчаниковыми и кварцевыми слоями. Еще ниже Змѣевки, около Шалотынской долины наблюдается волнообразная складка этихъ породъ, а около Змѣевки располагается и другая такая-же, перерѣзываемая рѣкою, вѣрнѣе однимъ изъ ея изгибовъ, почти съ точностью по простиранію пластовъ, хотя сейчасъ-же выше русло направляется на ю.-ю.-з., перерѣзывая пласты и складку по діагонали и доказывая независимость направленія рѣки отъ тектоническихъ условій. Такое углубленіе русла Голоустной исчезаетъ лишь въ мѣстности, называемой Карлукъ, гдѣ тропа выходитъ опять на лѣвую, луговую часть долины, представляющей здѣсь мѣста, удобныя для сѣнокоса. Въ такъ называемомъ Верхнемъ Карлукѣ, нѣсколько ниже долины известной подъ именемъ Егоршина падъ, въ склонѣ лѣваго берега Голоустной вдругъ появляется конгломератъ, во всемъ признакамъ сходный съ юрскимъ, но къ сожалѣнію здѣсь недостаточно хорошо обнаженный, тогда какъ правый берегъ долины состоитъ еще изъ той-же толщи болѣе или менее сланцевъ съ наклономъ пластовъ на ю.-в. Выше Карлукъ

лук начинается среднее теченіе р. Голоустной, которое, какъ сказано выше, достигаетъ около 42 верстъ длины и отличается юго-западнымъ направленіемъ, въ общемъ параллельнымъ береговой линіи Байкала, отъ котораго оно удалено на 18—22 версты, т. е. на всю ширину Приморскаго хребта въ этомъ мѣстѣ. На протяженіи около 8 первыхъ верстъ до устья рч. Илги (см. ниже), широкая долина Голоустной отличается поросшими лѣсистыми склонами и большею частью луговымъ характеромъ дна, въ особенности лѣваго берега, тогда какъ рѣка протекаетъ ближе къ правому, т. е. ближе къ основанію Онотскаго хребта. Изъ этого пологіяго выходитъ и долина незначительнаго ключа, называемаго Тѣрица; долина эта открывается въ виду устья Илги, но нѣсколько ниже ея, и представляетъ первое на пути обнаженіе. На ея правомъ берегу, около самаго устья, встречается глинистый сланецъ въ состояніи переходномъ къ осадочному и распадающійся на большія ровныя плиты, пригодныя для мощенія половъ и т. п. Между тѣмъ лѣвый склонъ этой Торицы образуется конгломератомъ, изъ подъ котораго, съ стороны Голоустной, опять выступаетъ глинистый сланецъ, значительно возвышаясь надъ уровнемъ рѣки. Недостаточно полное обнаженіе это въ общемъ напоминаетъ собою все-таки описанныя нами выше условія залеганія конгломерата въ долинѣ Большой Кадильной, гдѣ порода эта выполняетъ собою долину, вымытую въ глинистомъ сланцѣ. Выше по теченію въ томъ же правомъ склонѣ Голоустной, на протяженіи около 3-хъ верстъ, можно видѣть тотъ-же конгломератъ, заключающимъ высшую половину высоты склона, тогда какъ низъ является осыпаннымъ и поросшимъ. Въ довольно высокіхъ утесахъ этихъ, насупротивъ устья долины рч. Илги, конгломератъ перемежается съ пластами темнаго, зеленоватого песчаника, обнаруживая наклонъ слоевъ на с.-з., подъ угломъ около  $45^{\circ}$ , причемъ въ толщѣ этой наблюдаются и слои глинистаго сланца, свойственные мѣстами, какъ

извѣстно, юрскимъ отложеніямъ Иркутской губерніи. Преобладающій процентъ гальки конгломерата, достигающей изрѣдка 6 вершковъ въ діаметрѣ, состоитъ изъ полевошпатовыхъ кристаллическихъ породъ, въ числѣ которыхъ Черскій не находилъ однако порфировыхъ, столь характерныхъ для тѣхъ-же отложеній, обнаженныхъ со стороны Байкала; не рѣдко между галькою попадаются и болѣе или менѣе обточенные или же острореберные куски глинистаго сланца, заимствованнаго изъ господствующей по Голоустной, болѣе древней толщи. Мѣстами прослойки песчаника, среди конгломерата, обнаруживаютъ весьма ясную наклонность къ структурной отдѣльности, а выше на утесѣ, попадаются куски этой породы, отличающіеся буро-желтымъ, а не сѣро-зеленымъ цвѣтомъ. Между тѣмъ, на противоположномъ (лѣвомъ) берегу долины Голоустной, какъ свидѣтельствуется объ этомъ обнаженіи около устья рч. Илги, выходятъ пласты болѣе древней системы сланцевъ, именно, глинистыхъ въ переходномъ состояніи къ песчаниковому (метаморфическій песчаникъ), располагаясь или отвѣсно, или же круто падая къ ю.-в., подъ угломъ въ 70—80°. Вблизи отъ описаннаго выше, конгломератовыхъ утесовъ, на правомъ берегу Голоустной, располагается второе стойбище тунгусовъ, состоящее изъ нѣсколькихъ лѣтнихъ юртъ, въ родѣ Качергатскихъ. Здѣсь проживаютъ такъ называемые Тарбѣевскіе и Илгинскіе тунгусы, проводящіе зиму въ деревнѣ Тарбѣевой (см. ниже), въ числѣ нѣсколькихъ семействъ, бытіе которыхъ въ настоящее время въ нѣкоторомъ отношеніи зависитъ отъ состоянія которыхъ и вообще экономическія условія разнѣмногомъ лучше Качергатскихъ. По барометрическому опредѣленію Черскаго, высота уровня р. Голоустной около стойбища должна превосходить немного 127', т. е. цифру полученную имъ для устья Торицы, хотя около самаго стойбища, вслѣдствіе крайне измѣнчиваго состоянія атмосферы, онъ получилъ цифру гораздо меньшую указанной выше, взирая на то, что стойбище расположено выше по теченію, нежели Торица.

Хотя отъ названнаго стойбища Черскій сдѣлалъ экскурсію къ верховьямъ рч. Илги, тѣмъ не менѣе описаніе этой долины мы помѣстимъ вмѣстѣ съ маршрутами по другимъ лѣвѣмъ притокамъ Голоустной, дающими рядъ параллельныхъ разрывовъ сѣверо-западнаго склона хребта Приморскаго, въ настоящее же время прослѣдимъ теченіе главной рѣки до деревни Тарбѣвой (около 9 верстъ выше стойбища), откуда начинаются маршруты Чекановскаго по ближайшимъ правымъ притокамъ рѣки.

Нѣсколько выше устья Илги тропы переходить на правый берегъ Голоустной, образующей на пути къ Тарбѣвой довольно значительный изгибъ къ юго-востоку. Въ разстояніи или 3 версты отъ стойбища, около протоки Голоустной, известной подъ названіемъ Курья и вблизи отъ праваго берега устья долины Очеркѣй, Черскій описываетъ весьма интересное отношеніе конгломерата къ глинистому сланцу <sup>1)</sup>. Конгломератъ, составляющій продолженіе описаннаго нами супротивъ устья Илги, залегаетъ здѣсь сначала на глинистомъ сланцѣ, образующемъ нижнюю часть склона Овотскаго хребта до высоты около 12 сажней надъ уровнемъ рѣки. Несмотря на вполнѣ согласное положеніе слоевъ обѣихъ породъ, дающихъ на с.-з. и обнаженныхъ почти вполнѣ параллельно линіи ихъ простиранія, оказывается, что по направленію къ долинѣ Очеркѣй, толща глинистаго сланца обрѣзывается довольно крутою плоскостью, пересѣкающею линію простиранія подъ значительнымъ угломъ и уступаетъ мѣсто конгломерату, мощность котораго соответственно увеличивается книзу до того, что лежащій бокъ его опускается подъ уровень долины Голоустной и Очеркѣй. Между тѣмъ, на лѣвомъ берегу послѣдняго замѣчается обратное отношеніе описанныхъ породъ, именно: изъ подъ утончающагося конгломерата появляется постепенно возвышающаяся толща глини-

<sup>1)</sup> Черскій, Отчетъ за 1878 г. Извѣстія Т. IX, № 5—6, стр. 153.

тога сланца, сохраняющаго то-же положеніе пластовъ (паденіе с.-з.) какъ и ниже Очеркою. Условія эти не допускаютъ уже нивакого сомнѣнія въ томъ, что здѣсь, какъ и на Большой Кадильной, путешественникъ встрѣчается съ древною долиною, промытою въ глинистомъ сланцѣ и выполненною конгломератомъ, который къ сѣверо-западу долженъ гдѣ-либо соединиться съ главною областью распространенія юрскихъ осадковъ, какъ это мы видѣли по долинѣ рч. Нижней и какъ это имѣетъ мѣсто и съ конгломератомъ, обнимающимся со стороны Байкала. Составъ галекъ конгломерата изъ полевошпатовыхъ породъ, развитыхъ, какъ мы увидимъ ниже, далеко къ юго-востоку, т. е. около самаго побережія озера, указываетъ на бывшее здѣсь вообще сѣверо-западное теченіе водъ, отлагавшихъ эту обломочную породу, а описанный выше образъ ея залеганія убѣждаетъ въ томъ, что мы имѣемъ здѣсь дѣло съ уцѣлѣвшими отрѣзками весьма древнихъ (юрскихъ) рѣчныхъ руселъ, принадлежавшихъ юго-восточной окраинѣ Иркутскаго юрскаго бассейна и выполненныхъ осадками водъ послѣдняго. Реставрировать эти русла насколько они уцѣлѣли отъ позднѣйшихъ размывовъ, возможно будетъ лишь путемъ самыхъ детальныхъ изслѣдованій описываемыхъ горъ,—трудъ, во всякомъ случаѣ весьма благодарный и желательный, долженствующій дать въ результатъ возможно точное возстановленіе очертанія бассейна водомывавшихъ Прибайкальскія горы въ юрскій періодъ.

Нѣсколько далѣе устья Очеркою конгломератъ въ плоскихъ выступахъ наблюдается и на противоположномъ (т. е. лѣвомъ) берегу долины Голоустной, которая вслѣдъ за тѣмъ представляетъ довольно значительное суженіе около довольно пологой оконечности отрога, подступающаго съ правой стороны. За этимъ суженіемъ путешественникъ сейчасъ-же попадаетъ въ Тарбѣевское расширеніе долины, достигающее мѣстами до 3 верстъ и названное такъ потому, что въ немъ расположена соименная деревня. Площадь названнаго

расширенія вытягивается главнымъ образомъ съ юго-востока къ сѣверо-западу, такъ какъ оно вызвано открывающеюся здѣсь долиною общихъ устьевъ двухъ правыхъ притоковъ Голоустной, — Окѣрлика, протекающаго съ сѣверо-запада и считающагося главною рѣкою, и Урулкина, слѣдующаго съ з.-ю.-з. и рассматриваемаго какъ правый притокъ Окорлика, впадающій въ разстояніи болѣе версты отъ устья послѣдняго въ Голоустную. На этомъ пути низовья Окорлика проходятъ еще небольшое впрочемъ суженіе, обусловленное въ одной стороны отрогомъ его лѣваго берега, окончность котораго извѣстна подѣ названіемъ горы Свѣтленькіе камушки, а съ другой, уединенною и острововидно возвышающеюся изъ дна долины горою Шаманкою. Мѣстность эта, какъ сказано выше, посѣщалась уже и Чекановскимъ <sup>1)</sup>, въ описаніи котораго мы заимствуемъ нижеслѣдующія свѣдѣнія, дополняя ихъ наблюденіями Черскаго <sup>2)</sup>. Состоя (вмѣстѣ съ сосѣднею деревушкою Малаю Голоустною) изъ 31 двора, обитаемыхъ 166 жителями (81 муж.), деревня Тарбѣева располагается на террасѣ, занимающей уголь между сліяніемъ Урулкина съ Окорликомъ. Терраса эта окаймлена сзади болѣе высокимъ уступомъ, составляющимъ склонъ горъ, которыя отдѣляютъ долину Окорлика отъ Урулкина, и ближе къ послѣднему, юго-западной деревни, оканчиваются крутою и обнаженною стѣною, извѣстною подѣ названіемъ горы Морянъ. Упомянутая выше гора Шаманка, по измѣренію Черскаго, достигаетъ 613' высоты надъ уровнемъ Байкала, возвышаясь всего лишь около 30' надъ прилежащею, сухою частью долины, которою она отдѣляется отъ пологого склона горъ юго-западной стороны расширенія. Гора эта вытягивается въ направленіи съ сѣверо-запада на юго-востокъ; съ послѣдней стороны она украшается живописными утесами, а къ сѣверо-западу опускается къ до-

<sup>1)</sup> Чекановскій, Зап. Сиб. Отдѣла loco cit. стр. 293.

<sup>2)</sup> Черскій, Живописныя записки о Сибири.



линѣ двумя скалистыми уступами, изъ которыхъ нижній представляетъ почти отвѣсную стѣну. Съ этой стороны весьма отчетливо видно, что нисшій изъ названныхъ уступовъ образуется глинистымъ сланцемъ, падающимъ подъ небольшимъ угломъ на ю.-ю.-в., тогда какъ въ верхнемъ уступѣ обнажается конгломератъ изъ мелкой гальки, залегающій по видимому вполне согласно на сланцѣ; конгломератъ образуетъ собою поросшую лѣсомъ вершину горы а также и утесы юго-восточной оконечности, гдѣ можно видѣть перемежаемость его съ зеленовато-сѣрымъ песчаникомъ, какъ насупротивъ устья рч. Илги. Такое строеніе Шаманки указываетъ на то, что гора эта должна была образоваться посредствомъ отдѣленія ея отъ сосѣднихъ высотъ, съ которыми она составляла прежде одно цѣлое. Уже Чекановскій не сомнѣвался въ томъ, что по сухой нынѣ вѣтви долины, отдѣляющей Шаманку отъ юго-западныхъ горъ, должны были протекать въ свое время «соединенныя воды» Урулкина и Окорлика, проложившія нынѣ русло по сѣверо-восточной сторонѣ горы, что-же касается Черскаго, то, не имѣя времени заняться спеціально этимъ вопросомъ, онъ считаетъ возможнымъ поставить еще другой именно: нельзя-ли будетъ современемъ разсматривать Шаманку какъ прежнюю оконечность отрога, отдѣляющаго долину Урулкина отъ Окорлика, которые впоследствии могли соединиться, отрѣзавъ эту оконечность и оставивъ ея въ видѣ острововидной горы? По краткому впрочемъ сообщенію Чекановскаго, на краю сѣверо-западной отвѣсной стѣны этой горы приводятъ къ присягѣ бурятовъ-шаманистовъ, отчего всей вѣроятности произошло и названіе горы.

Маршрутъ Чекановскаго изъ деревни Тарбѣевоѣ вверхъ по долине Урулкина на рч. Ушавову системы р. Ангары.

Описываемый маршрутъ Чекановскаго, совершенный въ маѣ м-цѣ 1869 г., имѣетъ для насъ немаловажное

ченіе, во-первыхъ въ томъ отношеніи, что даетъ разрѣзъ  
лѣстности отъ р. Голоустной до Ангары около Иркутска, на-  
правляющійся въ общемъ съ востока на западъ, до нѣкото-  
рой степени параллельно маршруту Черскаго по Нижнему  
Качергату и рч. Большой, но сѣвернѣе его; во-вторыхъ, ли-  
нія эта пересѣкаетъ собою Овотскій хребетъ, хотя и въ  
диагональномъ направленіи, и, въ связи съ знакомымъ намъ  
уже нижнимъ теченіемъ р. Голоустной, даетъ полный раз-  
рѣзъ Прибайкальскихъ горъ до примыкающей къ нимъ съ  
сѣверо-запада плоской возвышенности, причемъ слѣдуетъ  
только сожалѣть, что во время этихъ экскурсій разбился быв-  
шій съ Чекановскимъ ртутный барометръ, вслѣдствіе чего  
описаніе страдаетъ отсутствіемъ гипсометрическихъ данныхъ.

Мы говорили уже выше о томъ, что направленіе долины  
Урулкина весьма близко къ в.-с.-в. при общей длинѣ около  
18 верстъ, что-же касается ширины, то, судя по картѣ Че-  
кановскаго, она въ общемъ довольно значительна. Тропа,  
начиная съ деревни Тарбѣевой, придерживается все время  
лѣваго склона долины, пересѣкая даже оконечности отро-  
говъ, разобщающихъ многочисленныя, хотя и незначительныя  
долинки, открывающіяся въ Урулкинѣ съ лѣвой стороны.  
Около подошвы горы Морянъ, которою, какъ сказано  
выше, Урулкинѣ отдѣляется отъ Окорлика, на уровнѣ террасы  
деревни Тарбѣевой, выступаютъ глинистые сланцы, падающіе  
на с.-з., слѣдовательно, въ направленіи противоположномъ  
наклону пластовъ въ горѣ Шаманкѣ (см. выше); отсюда до  
долинки, извѣстной подъ названіемъ Дальняя падь, на  
протяженіи около 4-хъ верстъ отъ устья Урулкина Чеканов-  
скій встрѣчалъ только «шальштейны», залегающіе на гли-  
нистыхъ сланцахъ, при чемъ не слѣдуетъ забывать, что подъ  
именемъ «шальштейновъ» Чекановскій понималъ зеленовато-  
сѣрые песчаники, перемежающіеся съ глинистыми сланцами,  
а также и такого-же цвѣта песчаники, подчиненные юрскому  
эпигломерату. Далѣе, выше ключа Максимовскаго, та-

же порода (т. е. «шальштейны») выступает небольшими утесами и образует также розсыпи какъ на склонахъ, такъ и въ самой долинѣ. Подъемъ на Онотскій хребетъ, хотя и длинный, но пологій, а спускъ съ него идетъ въ нѣкоторомъ отдаленіи (до 6 верстъ) вправо, т. е. сѣвернѣе источниковъ лѣваго верховья рч. Ушаковки, называемаго обыкновенно Лѣвою Ушаковкою. Источники эти, судя по картѣ Чекановскаго, удалены отъ верховьевъ Урукина приблизительно на 7 верстъ къ юго-западу, а вся Лѣвая Ушаковка, до слиянія ея съ правою, достигаетъ около 12 верстъ въ длину, придерживается сѣверо-западнаго направленія и принимаетъ съ правой стороны три главныхъ вѣтви или пѣди, какъ-то: Орокченская, Чухнина и Глубокая. Поперегъ этихъ послѣднихъ пролегаетъ тропа, ведущая съ верховьевъ Урукина, постепенно приближаясь къ главной долинѣ. До пѣди Кавардаѣ, о которой не сказано, какой системѣ она принадлежитъ, судя по образцамъ, находимымъ между корнями опрокинутыхъ деревьевъ, развиты тѣ-же шальштейны имѣющіе «наружность песчаниковидную». На пути къ пѣди Орокченской появляются глинистые сланцы, но на крутомъ спускѣ къ ней встрѣчается галька, свидѣтельствующая очевидно о нахожденіи здѣсь конгломерата, — обстоятельство, важное въ томъ отношеніи, что только по этой породѣ, въ предѣлахъ горъ, можно судить съ достовѣрностью, гдѣ именно Чекановскій встрѣчался съ юрскими отложеніями, которые какъ сказано выше, смѣшивались имъ здѣсь съ болѣе древними сланцами. На противоположномъ склонѣ той-же Орокченской долины встрѣченъ однако «шальштейнъ». Мѣстность поросшая сплошною растительностью сопровождала путешественника до лѣваго склона пѣди Чухниной, гдѣ тогда наблюдалась обширная розсыпь «твердаго плитковатаго сланцеватаго песчаника, незначительные выступы которыхъ обнаруживали наклонъ пластовъ на ю.-в.». Отсюда тропа, значительно приблизившись уже къ долинѣ Лѣвой Ушаковки,

спускается въ нее выше устья ручья Глубокаго, приблизительно въ разстояніи одной версты отъ сліянія ея съ Правой. На этомъ пути строеніе мѣстности могло быть наблюдаемо только, осматривая почву подъ опрокинутыми деревьями, которыя у мѣстныхъ жителей извѣстны подъ названіемъ «аскорья»; такимъ образомъ попадались мѣстами песчаники, мѣстами-же глинистые сланцы и галька, и только на спускѣ къ Ушаковѣ выступаетъ коренная порода, обнаженная какъ по ручью Глубокому, такъ и далѣе, до мѣста сліянія обоихъ верховьевъ Ушаковки. Вездѣ здѣсь встрѣченъ конгломератъ съ прослойками сланцеватаго песчаника и пласты «обыкновеннаго глинистаго сланца», падающіе довольно круто на с.-з.; всѣ эти породы, говоритъ Чекановскій, каждый сошлетъ на первый взглядъ тождественными съ породами углеродной иркутской формаціи (т. е. юры); онѣ почти вовсе не размѣнены, хотя и тверже; здѣсь въ нихъ найдены тонкіе прожилки кварца. Правое верховье Ушаковки, или такъ называемая Правая Ушаковка, пересѣчена Чекановскимъ въблизи отъ сліянія ея съ лѣвою. На его картѣ видно, что верховье это достигаетъ болѣе 10 верстъ длины, направляется вообще на юго-западъ и беретъ начало въблизи источниковъ Окорлика съ одной стороны и рѣчекъ (Котъ, Кудда), принадлежащихъ системѣ Куды, съ другой стороны (и. ниже). Въ промежуткѣ между сліяніемъ обоихъ Ушаковокъ, около верховьевъ ручья Глубокаго, на картѣ Чекановскаго означена гора Орокчонъ, о которой впрочемъ въ текстѣ мы не находимъ никакихъ свѣдѣній.

Ниже соединенія двухъ названныхъ верховьевъ, рѣка Ушаковка придерживается въ общемъ почти западнаго направленія на протяженіи около 40 верстъ до устья въ рѣдѣлахъ города Иркутска и протекаетъ въ долинѣ, ширина которой мѣстами достигаетъ 3 верстъ, отличаясь нерѣдко плодотворною почвою, въ особенности въ нижней половинѣ теченія. На протяженіи первыхъ 6-ти верстъ Ушаковка при-

нимаетъ въ себя съ правой стороны рѣчки, вѣрнѣе ключи: Солонянку или Солонкину, Крестовку и Сухую, а ниже извѣстны въ литературѣ: Поливаниха и двѣ Мостовыя въ верхней половинѣ теченія, а Меледиха, Злгостиха, Плишкина падь или Солонянка, Большая и Малая Рудоплавныя, Грязнуха, Каштакъ и, наконецъ, Пшеничная падь въ нижней части долины<sup>1)</sup>; что же касается лѣвыхъ притоковъ, то до сихъ поръ никто изъ путешественниковъ, ни писателей не упоминаетъ о ихъ названіяхъ, не помѣченныхъ также и на существующихъ картахъ, судя по которымъ, притоковъ этихъ должно быть меньшее количество нежели правыхъ, къ тому же они значительно болѣе коротки (большею частью ключики до 2—3 верстъ длины), а въ весьма близкомъ разстояніи отъ лѣваго берега верхняго теченія рѣчки берутъ начало нѣкоторые изъ другихъ притоковъ Ангарты, какъ напр. Королюкъ и Еловка, о которыхъ мы упоминали въ своемъ мѣстѣ<sup>2)</sup>. Изъ

<sup>1)</sup> Черскій. Минеральныя богатства мѣстности, принадлежащей городу Иркутску. Извѣстія Сибирск. Отдѣла И. Р. Геогр. Общ. 1878 Т. IX, № 3 и 4.

<sup>2)</sup> Вода р. Ушаковки была подвергнута Шамаринимъ химическому анализу. 4 пробы, взятые въ чертѣ города Иркутска обнаружили, слѣдующее содержаніе органическихъ и минеральныхъ веществъ. На 1000 куб. сант. воды содержится граммовъ:

	N <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	NH <sub>3</sub>	Неорг. твердыхъ веществъ.	Нелетучихъ органиче- скихъ.
1) Выше бойни . . . . .	0,0002688	0,00068	0,036	0,004
2) Ниже бойни на 8 саж. . .	0,003360	0,00750	0,064	0,008
3) Ниже бойни на 15 саж. . .	0,008479	0,00600	0,108	0,008
4) При устьѣ рукава Ушаковки.	0,0003600	0,000075	0,048	0,008

См. Изв. В.-Сиб. Отд. Т. XVII, № 1—2 таблицы къ стр. 180.

свѣдѣній, передаваемыхъ Чекановскимъ, мы знаемъ, что ниже соединенія описанныхъ выше верховьевъ Ушаковки слонъ праваго берега послѣдней состоитъ на нѣкоторомъ протяженіи изъ известняка, обнаруживающаго нѣсколько ниже по рѣкѣ достаточно ясную слоистость. Порода эта содержитъ дагѣ глину и около пади Крестовой или Крестовки, перемежается съ рухляковыми, твердыми и мягкими сланцами съ наклономъ пластовъ до  $30^{\circ}$  на с.-з. Начиная съ праваго берега долины Сухой (6 верстъ ниже сліянія верховьевъ Ушаковки), известнякъ этотъ обжигаемый на сѣрую известь, смѣняется юрскимъ песчаникомъ, который продолжается до самаго устья въ Ангару, заключая мѣстами плохіе флечы бураго угля и доставляя строительный матеріалъ для г. Иркутска, съ которымъ, какъ равно и съ ближайшими его окрестностями, мы ознакомимся въ третьей части изложенія. Одинъ изъ такихъ угольныхъ флечовъ, (на лѣвомъ берегу Ушаковки, недалеко отъ города, въ мѣстности, известной подъ названіемъ Косой бродъ,) загорѣлся въ шестидесятихъ годахъ этого столѣтія, и подземный пожаръ этотъ продолжался какъ говорятъ нѣсколько лѣтъ. Наконецъ, слѣдуетъ упомянуть еще о послѣ-третичныхъ отложеніяхъ, покрывающихъ юрскіе осадки въ низовьяхъ этой долины. Это продолженіе такъ называемаго лёсса, о которомъ было сказано при описаніи низовьевъ р. Иркуты и долины Ангары около г. Иркутска, и въ которомъ Черскій находилъ кости вымершихъ млекопитающихъ животныхъ вмѣстѣ съ наземными раковинами, какъ то: *Pupa*, *Helix* и т. п. По мѣрѣ приближенія къ низовьямъ долины Ушаковки весьма рѣзко бросается въ глаза измѣненіе въ характерѣ древесной растительности; въ противоположность почти дѣвственнымъ хвойнымъ лѣсамъ, окружающимъ верховья этой долины, здѣсь господствуютъ уже низкорослый березнякъ и осинникъ съ самою незначительною и рѣдкою примѣсью сосны и лиственницы, большіе пни которыхъ, а мѣстами и уединенные вы-

сокіе стволы свидѣтельствуютъ о томъ, что на современное состояніе этой растительности слѣдуетъ смотрѣть какъ на результатъ продолжительнаго истребленія бывшихъ здѣсь большихъ лѣсовъ, на что, какъ мы увидимъ въ своемъ мѣстѣ, имѣются и историческія данныя. Кромѣ города Иреутска, служившаго главною причиною уничтоженія этихъ лѣсовъ, въ долину Ушаковки имѣются еще три поселенія, лежащихъ внѣ городской земли, а именно: деревни Пивовариха или Новоямская (около 11 верстъ отъ устья въ Ангару) и Худякова (8 верстъ выше), лежащая на лѣвомъ берегу, а затѣмъ незначительный выселокъ Милюдиха или Меледиха на правомъ берегу соименной рѣчки, почти насупротивъ Пивоварихи. Это послѣдняя т. е. Пивовариха, принадлежитъ къ самымъ большимъ и состоитъ изъ 70 дворовъ съ 344 жителями (178 муж.), изъ которыхъ значительный процентъ татаръ, построившихъ здѣсь и мечеть. Худякова состоитъ только изъ 16 дворовъ съ 64 жителями (34 муж.), а въ Милюдахъ нѣе 5 хозяйствъ <sup>1)</sup>.

Описанный выше маршрутъ Чекановскаго не даетъ намъ прямого отвѣта на вопросъ: гдѣ именно располагается граница между сѣверо-западнымъ подножіемъ пересѣченнаго или Онотскаго хребта и примыкающею къ нему плоскою возвышенностью. Тѣмъ не менѣе, судя во первыхъ по его изображенію, приведенному выше, что спускъ съ Онота «идетъ въ нѣкоторомъ отдаленіи вправо отъ Ушаковки», т. е. отъ лѣваго верховья этой рѣчки, а во вторыхъ, по увѣренію Черскаго, что обозрѣвая эту долину съ высотъ, окружающихъ низовья, горы видѣются лишь въ значительномъ отдаленіи, можно полагать уже, что искомая граница совпадаетъ съ большею или меньшею точностью съ мѣстомъ сліянія обійи Ушаковой; да и съ геологической точки зрѣнія границу эт

<sup>1)</sup> Всѣ эти деревни принадлежатъ Смоленской вол., см., Ч. I. стр. 452—459.

<sup>2)</sup> Черскій, Рукописныя замѣтки о Сибири.

слѣдуетъ искать около этого мѣста, именно около шести верстъ ниже слиянія, около долины Сухой, выше которой появляются круто падающіе пласты известняка, перемежающіеся далѣе съ рухляковымъ сланцемъ, такъ какъ ниже Сухой господствуетъ уже юра, пласты которой вездѣ, гдѣ они доступны наблюденію, лежатъ горизонтально или съ небольшимъ отклоненіемъ отъ горизонтальности.

**Маршрутъ Чечановскаго отъ деревни Тарбѣевой по р. Омѣрлинѣ въ долину р. Куды системы р. Куды.**

Маршрутъ этотъ даетъ второе сѣченіе хребта Онотскаго, вполнѣ поперечное, такъ какъ въ общемъ линія разрѣза слѣдуетъ здѣсь сѣверо-западному направленію, а не почти западному, какъ по р. Урѣлкинѣ; къ тому же тропа эта, спускаясь по рч. Кудѣ, приводитъ насъ къ лѣвому берегу р. Куды, долина которой, какъ сказано выше, принадлежитъ къ системѣ долинъ (Куда, Муринѣ, Манзурка), отдѣляющихъ полюсу Прибайкальскихъ горъ отъ плоской возвышенности, слѣдуя впрочемъ не вездѣ съ точностью около сѣверо-западнаго склона Онотскаго хребта, въ особенности ближе къ Ангарту (т. е. къ юго-западу), гдѣ долина Куды проложена уже цѣликомъ среди высшей террасы плоской возвышенности.

Отрогъ Онота, образующій лѣвый берегъ долины р. Омѣрлинѣ и оканчивающійся горою Свѣтленькіе камушки, не отличается высотой; онъ продолжается вверхъ по долинѣ волнообразными перегибами на протяженіи приблизительно двухъ верстъ и только за находящеюся тамъ горою Луковичною дѣлается замѣтно выше. Вездѣ здѣсь обнажены «сланцы» (слѣдуетъ полагать, глинистые), падающіе въ Свѣтленькихъ камушкахъ на ю.-в., съ наклономъ около 30°, но далѣе наклонъ дѣлается болѣе крутымъ, переходитъ въ вертикальный, послѣ чего наблюдается уже с.-с.-з. паденіе. Въ горѣ Луковичной тѣже сланцы обнаруживаютъ



большіе волнообразные изгибы съ с.-в.-мъ простираниемъ и вслѣдъ затѣмъ скрываются подъ «шальштейномъ», образующимъ болѣе высокія горы. Тропа, по которой совершенно переваль Чекановскимъ ведетъ однако не по низовьямъ Окорлика, а сначала слѣдуетъ вверхъ по лѣвому берегу Урукина, до знакомой намъ уже Дальней пѣди, сворачиваетъ въ эту послѣднюю и, направляясь вверхъ по ея лѣвому берегу на протяженіи около 7 верстъ, переваливаетъ въ долину Окорлика въ разстояніи около 14 верстъ отъ его устья; такимъ образомъ, только верхнія 10 или 12 верстъ теченія этой рѣчки, слѣдующей вообще юго-восточному направленію, доступны осмотру путешествующаго этою дорогою, тогда какъ большая часть ея протяженія, считая отъ устья, остается въ сторонѣ. На всемъ этомъ пути и по всему правому берегу Окорлика, Чекановскій встрѣчалъ только «шальштейнъ»; породы гребня перевала черезъ Оготъ не могли быть изслѣдованы по причинѣ лежаваго здѣсь еще глубокаго снѣга (4-го мая). Подъемъ на хребетъ оказался пологимъ, началъ же спуска къ верховьямъ Лѣвой Куяды, лежащимъ всего лишь въ 4—5 верстахъ отъ источниковъ Окорлика, отличается сравнительно большею крутизною. Юго-восточный склонъ перевала поросъ кедровымъ лѣсомъ; на сѣверо-западномъ или западномъ же, — такъ какъ водораздѣльная линия приближается здѣсь болѣе къ меридіональному направленію, — произрастаетъ лиственница, къ которой ниже подмѣшиваются сосна. Такая перемѣна въ растительности противоположныхъ склоновъ могла уже до нѣкоторой степени указывать на ответственную перемѣну въ составѣ почвы. И дѣйствительно, хотя на нѣкоторомъ протяженіи пути по Куядѣ Чекановскій вовсе не встрѣчалъ обнаженій, тѣмъ не менѣе между корнями опрокинутыхъ деревьевъ онъ видѣлъ желтый песокъ или гальку, происшедшіе по его мнѣнію отъ разрушенія юрскихъ песчаниковъ и связаннаго съ ними конгломерата. Такую почву путешественникъ встрѣчалъ по всей долине.

(около 16-ти верстъ) Лѣвой Куяды, слѣдующей въ общемъ почти меридіональному направленію до ея сліянія съ правымъ верховьемъ. Это послѣднее верховье извѣстно подъ названіемъ Правой Куяды. Источники ея располагаются въ 8 верстахъ къ сѣверо-востоку отъ Лѣвой и 2—3 верстахъ отъ системы верховьевъ Окорлика, откуда рѣчка направляется сначала на с.-в. (около 7 верстъ), а затѣмъ поворачивается подобно на з.-с.-з., гдѣ сливается съ Лѣвой Куядой въ 3 верстахъ отъ своихъ верховьевъ. Чекановскій осматривалъ эту вѣтвь рѣки. Ея верховье не замерзаетъ зимою и потому, не взирая на снѣгъ, покрывавшій высшіе части Оңотского хребта, коренная порода обнажалась здѣсь съ достаточною ясностью. Ключи, дающіе начало рѣкѣ, стекали по известняку, который, быть можетъ, распространяется и на водораздѣлъ между Окорликомъ и Лѣвою Куядою, но не былъ замеченъ по причинѣ снѣжнаго покрова. Слѣдуя отсюда внизъ, Чекановскій не встрѣчалъ обнаженій; прилежащія горы не были, округленные; почва вообще имѣетъ цвѣтъ желтый; мѣстами мѣтна наносная желтая глина, мѣстами же галька, обиліе которой и характеръ указываютъ на весьма вѣроятное залеганіе конгломерата гдѣ либо вблизи. Обстоятельство это заставляетъ Чекановскаго полагать, что сейчасъ же ниже источниковъ долина Правой Куяды пролегаетъ уже въ юрскихъ горахъ, соприкасающихся къ югу съ «шальштейнами». Приблизительно въ 10 верстахъ ниже источниковъ тропа переходитъ на правый берегъ долины, которая, какъ означено на геогностической картѣ этого путешественника, доходитъ здѣсь, а въ особенности ближе къ сліянію съ Лѣвою Куядою, значительной ширины (2 и 3 версты), что равнымъ образомъ относится и къ долинѣ послѣдняго изъ названныхъ теченій. Около мѣста соединенія ихъ, горы праваго берега замѣтно возвышаются и на протяженіи около двухъ верстъ обнажаютъ известнякъ, пласты котораго падаютъ сначала на ю.-в., а ниже по теченію и на с.-з. Здѣсь же, какъ

равно и нѣсколько верстъ выше, въ Правую Куяду впадаютъ два ключа, незамерзающихъ зимою («талые ключи»), но к сожалѣнію температура ихъ до сихъ поръ нигдѣ еще не измѣрена. Дальнѣйшее описаніе теченія р. Куяды будетъ дано въ главѣ, трактующей о р. Кудѣ и ея притокахъ.

**Маршрутъ Черемнаго отъ дер. Тарбѣевой вверхъ по долинѣ р. Голоустной до ея верховьевъ.**

Отъ Тарбѣевой, вѣрнѣе отъ устья Окорлика, остается еще около 26 верстъ длины средняго теченія р. Голоустной, считая его, какъ сказано выше, до мѣста впаденія праваго притока, извѣстнаго подъ названіемъ Зонгутъ. Эта большая часть средняго отрѣзка рѣки сохраняетъ и здѣсь въ общемъ юго-западное направленіе съ замѣтнымъ впрочемъ дугообразнымъ изгибомъ къ сѣверо-западу, т. е. къ орошаемому ею подножію Онотскаго хребта. Долина отличается вездѣ довольно значительною шириною (до 1 версты) и въ большей части длины поросла хвойною древесною растительностію, мѣшающею подробному осмотру особенностей прилежащихъ горъ, склоны которыхъ однако не особенно крутые, вездѣ не такъ обрывисты и не представляютъ видимыхъ утесовъ, такъ что только въ нѣсколькихъ верстахъ выше Тарбѣевой можно было видѣть обнаженіе тѣхъ же древнихъ сланцевъ (глинистый, песчаниковый), падающихъ на с.-з.; въ остальныхъ же мѣстахъ, только по незначительнымъ розсыпямъ и по кускамъ встрѣчавшимся около склоновъ, слѣдуетъ предполагать, что сланцы эти развиты и на всемъ протяженіи описываемой части долины, какъ это мы увидимъ изъ маршрутовъ на правые притоки рѣки (см. слѣдующ. параграфъ). Около 10 верстъ выше устья Окорлика, гдѣ тропа переходитъ на лѣвый берегъ долины, въ Голоустную впадаетъ съ правой стороны рч. Онотская Колесья, съ довольно широкою долиною, при устьѣ. До сихъ поръ она, какъ и остальные изъ притоковъ,

притоковъ, за исключеніемъ Зонгута, не посѣщалась путешественниками. На картѣ Чекановскаго, гдѣ притоки эти означены повидимому съ достаточною подробностью, хотя изъ текста его неизвѣстно, какими данными онъ пользовался для нанесенія этихъ рѣчекъ, верховья Онотской Колесмы означены почти на гребнѣ соименнаго хребта, въ нѣсколькихъ верстахъ къ юго-востоку отъ описаннаго выше дугообразнаго поворота Правой Куяды, вслѣдствіе чего длина рѣчки можетъ достигать болѣе 15 верстъ при юго-восточномъ направленіи; на половинѣ длины теченія показано также развѣтвленіе и притоки, но какъ они, такъ и самая долина Колесмы, означены безъ какихъ либо названій. Почти насупротивъ Онотской Колесмы (съ версту выше ея) открывается долина болѣе длиннаго лѣваго притока Голоустной, стекающаго съ приморскаго хребта: въ противоположность Онотской Колесмы, рѣчка эта именуется Морскою Колесмою. Описание ея мы помѣстимъ ниже, вмѣстѣ съ другими лѣвыми притоками Голоустной, посѣщенными Черскимъ, теперь же скажемъ только, что подъ тѣмъ же названіемъ она означена и на картѣ Чекановскаго, къ тому же, какъ оказалось впослѣдствіи, съ достаточною точностью, не взирая на то, что эта система Голоустной точно также не посѣщалась имъ лично; обстоятельство же это внушаетъ еще болѣе довѣрія къ остальнымъ показаніямъ карты этого автора, не смотря на неизвѣстность употреблявшихся имъ источниковъ. Далѣе, въ 6 верстахъ выше устья Онотской Колесмы, впадаетъ другой правый притокъ Голоустной, рч. Кунгінъ, видѣнный Черскимъ только въ устьѣ ея долины. Согласно картѣ Чекановскаго длина долины этой достигаетъ около 20 верстъ; она параллельна Онотской Колесмѣ и беретъ начало изъ той же нѣсколькихъ верстахъ отъ системы верховьевъ рч. Кукутъ, впадающей въ р. Муринъ (системы р. Куды), въ 6 верстахъ выше устья знакомой намъ уже отчасти и почти параллельной Кукуту, рѣки Куяды. Затѣмъ верстахъ въ 5-ти

выше Кунгина, находится еще одинъ правый притокъ Голоустной, называемый Зога. Короткій (до 8 верстъ) и состоящій изъ двухъ вѣтвей, онъ снабженъ въ низовьяхъ значительно расширенною долиною, въ которой, вблизи отъ праваго берега Голоустной, располагается Зогинское тунгусское стойбище, именуемое обыкновенно Зоги, хотя на картѣ Черновскаго оно значится подъ названіемъ Джоголы. По замѣчанію Черскаго, стойбище это производитъ совершенно другое впечатлѣніе, нежели Качергатское или Илгинское. Неговоря уже о томъ, что оно гораздо многолюднѣе, и немъ сразу бросаются въ глаза всѣ признаки несравненно лучшаго экономическаго состоянія тунгусовъ, нежели въ другихъ названныхъ мѣстахъ, до того, что кромѣ весьма опрятныхъ и хорошо сложенныхъ зимнихъ юртъ видѣется здѣсь нѣсколько небольшихъ домиковъ построенныхъ уже по типу русскихъ избъ. Одинъ изъ нихъ строился и приводился къ концу именно въ бытность Черскаго, рѣзко обрисовывая своею бѣлизною на фонѣ луговой зелени долины. Верста въ 4—5 выше по рѣкѣ, около мѣста, гдѣ въ нее впадаетъ упоминавшійся уже выше, правый притокъ, Зонгута, построенъ лѣтній улусъ тѣхъ же тунгусовъ, отличающійся болѣе обветшалюю наружностью въ сравненіи съ зимнимъ. Уровень устья Зонгута опредѣленъ Черскимъ въ 549' надъ поверхностью Байкала; это начальный пунктъ средняго теченія Голоустной, которое составляетъ здѣсь собою какъ бы продолженіе долины Зонгута, благодаря вообще юго-западному направленію послѣдняго, при довольно значительной ширинѣ долины. Длина Зонгута, считая по его лѣвой вѣтви, развѣтвленіемъ превосходитъ 8 верстъ, но въ разстояніи болѣе 3-хъ верстъ отъ устья, въ него впадаетъ еще правая вѣтвь съ сѣверо-востока, длина которой, какъ говорятъ, должна достигать около 10 верстъ. Въ предѣлахъ этого устья и верховьяхъ лѣвой вѣтви долина Зонгута образуетъ значительныя озеровидныя и болотистыя расширенія, изъ которыхъ

Верхнее къ сѣверо-востоку продолжается непосредственно въ достаточно широкую долину рч. Хоготъ, берущей начало въ однихъ болотахъ съ Зонгутомъ, но слѣдующей въ диаметрально противоположномъ направленіи на сѣверо-востокъ, къ она впадаетъ съ правой стороны въ р. Куртунъ, правый притокъ Большой Бугульдейки. Такимъ образомъ, долина р. Зонгута, находясь съ одной стороны въ прямой связи съ Голоустной, а съ другой съ Куртуномъ, черезъ посредство Хогота, является членомъ непрерывной цѣпи долинъ, лежащихъ на продолженіи средняго теченія Голоустной, а такъ какъ она къ тому же достаточно углублена сравнительно съ высотой гребней прилежащихъ хребтовъ, то поэтому Черскій считаетъ вполне умѣстнымъ перенести на эту долину, какъ и на Хоготскую, ту же орографическую роль, какую играетъ средняя часть Голоустной относительно отдѣляемыхъ хребтовъ Приморскаго и Онотскаго. Между тѣмъ какъ верхняя часть теченія Голоустной, благодаря своему поперечному направленію, является уже въ роли боковой вѣтви системы этихъ продольныхъ долинъ, — вѣтви аналогичной напр. Морской Колеснѣ и Илгѣ, дающимъ поперечные разрѣзы сѣверо-западнаго склона Приморскаго хребта.

Въ противоположность долинѣ Хогота, съ которою мы знакомимся ниже, лѣвый берегъ Зонгута, по которому проложена тропа, не даетъ никакихъ обнаженій для ознакомленія съ строеніемъ мѣстности, и только присутствіе на пути известковъ знакомыхъ намъ уже сланцевъ, а также галекъ полециатовыхъ породъ, въ связи съ строеніемъ долинъ Хогота верхней части Голоустной, позволяетъ догадываться, что въ общемъ составъ почвы здѣсь не измѣнился и только гдѣ-то въ немъ долженъ участвовать и конгломератъ. Такія же галки попадались также мѣстами и на первомъ склонѣ между устьемъ и устьемъ Зонгута. Верховья р. Голоустной предполагаются въ Приморскомъ хребтѣ въ разстояніи всего въ 3 версты отъ Байкала и около 19 верстъ къ юго-во-

стоку (или ю.-ю.-в.) отъ устья Зонгута, начиная съ котораго тропа подымается вверхъ по правому берегу этого отръзки, углубляясь въ пересѣкаемый имъ хребетъ. Около 3 верстъ выше Зонгутскаго улуса долина Голоустной значительно суживается, хотя и на небольшомъ протяженіи. Суженіе это образуется террасовиднымъ отрогомъ горъ лѣваго берега долины, въ которомъ наблюдается розсыпь какъ глинистаго сланца, такъ и подчиненнаго ему зеленоватого сѣраго, плитковатаго метаморфическаго песчаника. Затѣмъ долина опять расширяется, продолжаясь въ такомъ видѣ до самыхъ верховьевъ и порослая густымъ хвойнымъ лѣсомъ, какъ лиственничнымъ, такъ отчасти и кедровымъ. Склоны, видимые съ дороги, точно также покрыты растительностью, такъ-что съ коренными выступами породъ можно было ознакомиться только пройдя верстъ съ 6 или 7 отъ мѣста суженія. Тамъ время отъ времени выступаетъ глинистый сланецъ, пласты котораго сначала наклонены на ю.-в., а выше и на с.-з. послѣ чего вторично обнаруживаются юго-восточное паденіе съ наклономъ отъ  $75^{\circ}$  до  $45^{\circ}$ . Затѣмъ въ разстояніи нѣсколькихъ верстъ отъ верховьевъ, кромѣ необильныхъ, быть можетъ даже наносныхъ кусковъ глинистаго сланца, около тропы появляются куски и довольно большія глыбы сѣровато-бѣлаго и сѣраго известняка, такого, какой напр. по рч. Большой Кадильной мы видѣли залегающимъ среди глинистыхъ сланцевъ. Наконецъ, недоѣзжая источниковъ рѣки, слѣдуетъ продолжительный подъемъ на склонъ ея лѣваго берега. Подъемъ этотъ, спустя болѣе 2-хъ верстъ дороги, доводитъ до высшей точки перевала съ р. Голоустной на Байкалъ достигающей здѣсь 1836' надъ озеромъ, т. е. 3397' надъ океаномъ. Перевалъ этотъ, какъ всѣ видимыя, сосѣднія съ нимъ точки гребня, отличается плоскоовругленными очертаніями и довольно густою лѣсною растительностью, такъ что вдоль линіи этихъ высшихъ пунктовъ удобно проходить въ верхомъ; въ глыбахъ, выдающихся изъ подъ раститель-

покрова, наблюдается уже не известнякъ, а сѣровато-бѣлый кварцитъ. Отсюда спускъ къ Байкалу ведетъ къ юго-западу, къ лѣвой вѣтви небольшой рѣчки Харгинъ, съ которою мы ознакомимся впоследствии, замѣтивъ въ настоящее время, во-первыхъ, что устье Харгина располагается въ разстояніи до 37 верстъ къ сѣверо-востоку отъ самой выдающейся части дельты р. Голоустной и, во-вторыхъ, что только въ нижней половинѣ теченія этого ручья, слѣдовательно, около самаго Байкала, путешественникъ встрѣчается съ плоскостью залеганія всѣхъ этихъ породъ на выступающихъ тамъ древнѣйшихъ полевошпатовыхъ, на высотѣ до 1114' надъ озеромъ.

Долины р.р. Морской Колесмы и Илги, лѣвыхъ притоковъ средняго теченія р. Голоустной.

Долины рѣчекъ Морской Колесмы и Илги, располагаясь въ промежуткѣ между верхнимъ и нижнимъ теченіями Голоустной, къ тому же въ общемъ параллельно названному тѣку рѣки, служатъ лучшими путями для дополненія нашего знакомства съ Приморскимъ хребтомъ, и потому въ слѣдующемъ мы приводимъ описаніе этихъ долинъ по замѣткамъ Черскаго, прослѣдившаго ихъ до верховьевъ, причемъ изложеніе наше начнемъ съ Морской Колесмы, въ источникѣ которой названный путешественникъ достигъ какъ верховьевъ Голоустной, такъ и Байкала, спускаясь въ нему по долинѣ упомянутого выше Харгинъ. Въ самыхъ низовьяхъ Колесмы, слѣдуя вверхъ по ея правому берегу, путешественникъ встрѣчаетъ двѣ параллельныя террасы, изъ которыхъ низшая возвышается приблизительно на 28' надъ долиною, а высшая около 10' не болѣе. Въ нѣсколькихъ (около 4-хъ) верстахъ выше устья въ Морскую Колесму впадаетъ большой лѣвый притокъ ея, Скатуѣй, означенный и на картѣ Чекановскаго, между тѣмъ въ склонѣ праваго берега выступаетъ глинистый сланецъ, падающій сначала на с.-з.



съ наклономъ до  $30^{\circ}$ , но пласты его вскорѣ образуютъ перегибъ съ наклономъ къ востоку, причемъ въ нижнихъ частяхъ толщи появляется аспидно-черный кварцитъ и метаморфическій песчаникъ, а далѣе, несмотря на значительныя изгибы и переломы пластовъ, наклонъ ихъ все-таки колеблется между с.-в. и с.-с.-в., указывая на соотвѣтственно измѣнившееся простирание. Около 6 верстъ выше устья тропы проходитъ мимо долины праваго притока, извѣстнаго подъ названіемъ Нижней Черемховой, такъ какъ съ версты выше въ Колесму впадаетъ еще другой, Верхняя Черемховая. Долина этой послѣдней отличается большою длиною и беретъ начало, какъ говорятъ, недалеко отъ верховьевъ Голоустной. Далѣе склоны лѣвистой долины Колесмы совершенно поростають растительностью такъ, что только изрѣдка попадающіеся куски знакомыхъ уже сланцевъ позволяютъ судить о неизмѣнившемся строеніи почвы. Проѣхавъ еще верстъ съ 10, путешественникъ достигъ мѣста, гдѣ Морская Колесма составляется изъ трехъ долинъ, сходящихся въ небольшое расширеніе, вытянутое въ юго-западномъ направленіи. Одно изъ этихъ верховьевъ проходитъ съ юго-запада, со стороны р. Илги, другое съ юго-востока, третье съ сѣверо-восточной стороны (в.-с.-в.). Высота мѣста оказалась равною 1036' надъ Байкаломъ. Лѣвый, поросшій склонъ расширенія болѣе пологій, тогда какъ правый угловатый и обнажаетъ сѣрый известнякъ, покрытый слюдистыми глинистымъ сланцемъ, пласты котораго падаютъ съ небольшимъ наклономъ на с.-с.-в., а далѣе и на з.-ю.-з. до ю.-з. Здѣсь же въ долинѣ находится небольшой балаганъ, въ которомъ путешественники пріютились, спасаясь отъ застигшихъ ихъ сильной грозы, разразившейся еще въ первый разъ въ этомъ году (18-го мая ст. стиля 1878 г.). Розыскивая верховья Харгина, чтобы спуститься къ Байкалу, Черскій правился по третьему верховью Колесмы на сѣверо-востокъ и съ долины этой поднялся на прилежащія высоты, до

тапція 1762' надъ озеромъ, отличающаея такимъ же плоско-округленнымъ очертаніемъ какъ и на перевалѣ съ верховьями Голоустной. Густой туманъ съ примѣсью дыма отъ горѣвшаго въ хребтахъ лѣса заставили путешественниковъ довольно долго блуждать по этимъ высшимъ пунктамъ Приморскаго хребта, до того поросшимъ лѣсомъ, что съ нихъ, даже при отсутствіи тумана, нельзя было видѣть озера. Проѣхавъ версты съ 8 къ сѣверо-востоку, они стали спускаться въ долину, которая оказалась принадлежащею верховьямъ р. Голоустной, а не Харгинѣ; этотъ послѣдній былъ отысканъ лишь спустя часъ ѣзды по различнымъ направленіямъ въ сторону Байкала, при чемъ правое верховье оказалось лучшимъ путемъ для спуска. Довольно длинный склонъ велъ къ сѣверо-востоку въ постепенно углубляющуюся широкую долину, но плоскую, сухую и совершенно поросшую растительностью, изъ которой, по временамъ, выдавались плитки того-же глинистаго галца. Ниже, гдѣ долина суживается, значительно углубившись уже въ склонъ хребта, на ея лѣвомъ берегу располагаются утесы сѣровато-бѣлаго кварцита, съ не очень отслаиваемыми слоями, падающими на с.-в. съ незначительнымъ наклономъ. Отсюда, почти съ каждымъ шагомъ, долина дѣлается мрачнѣе и живописнѣе, открывая отчасти и видъ на тѣе отдаленныя, глубокія ея части. Съ лѣвой стороны къ ней присоединяется другая вѣтвь, вверхъ по которой заметны даже слѣды своеобразной дороги. Дорога эта ведетъ вверхъ до высоты 1660' надъ Байкаломъ, къ находящемуся въ мѣстѣ добычи бѣлаго кварцеваго песка, употребляемаго на стеклянныя заводы. Выработка располагается на высотѣ лѣваго берега этой (лѣвой) вѣтви правое верховья Харгинѣ, на поверхности отрога, отдѣляющаго правое верховье отъ лѣваго, сухаго, направляющагося на ю.-в. Произведенный Черскимъ осмотръ этого мѣсторожденія показываетъ, что верхняя часть этого мысовиднаго отрога образована знакомымъ намъ уже кварцитомъ, отъ разрушенія

котораго произошелъ эксплуатируемый песокъ. Песокъ этотъ смывался прежде въ бывшее на поверхности отрога углубленіе, выполняя его сначала съ юго-восточной стороны, послѣ чего начался смывъ и наносъ этого матеріала съ утеса почти противоположной стороны углубленія, вѣрнѣе съ с.-с.-в. Такимъ образомъ отложился сначала нижній пластъ песка съ тонкою слоистостью, наклоненною къ сѣверо-западу, а затѣмъ верхній пластъ, слоистость котораго склоняется на ю.-ю.-з. Толщина обоихъ, покрывающихъ другъ друга пластовъ этого наноса превышаетъ 18 футовъ, насколько можно видѣть въ бортахъ выработки, не доведенной до коренной породы; въ песокѣ замѣчаются мѣстами охристо-бурые прослойки, ухудшающіе его достоинство для производства стекла. Спускъ добытаго изъ выработки матеріала совершается съ большимъ трудомъ, вслѣдствіе значительной крутизны долины Харгина. Песокъ спускаютъ на сани, поддерживаемые бичевою, которая заматывается поочередно за стволы ближайшихъ къ дорогѣ деревьевъ, играющихъ роль блоковъ. При этомъ большинство сосѣднихъ древесныхъ стволовъ носятъ на себѣ глубокіе слѣды двигавшейся по нимъ веревки, а изъ которыхъ изъ нихъ являются уже перепиленными почти половины ихъ поперечнаго діаметра. О древности этого наноса нельзя судить, по недостатку ископаемыхъ, которые въ нихъ поръ нигдѣ еще въ немъ не находились, несмотря на правильную его эксплуатацію. Кварцитъ, давшій матеріалъ для описаннаго отложенія, залегаетъ здѣсь на доломитовомъ известнякѣ, черезъ посредство прослойка глинистаго сланца замѣтнаго впрочемъ лишь въ осыпанномъ состояніи. Известнякъ этотъ отчасти плотный, отчасти очень мелкозернистый, отличается блѣднымъ красноватымъ и желтоватымъ оттѣнкомъ сразу напоминая собою тотъ нисшій членъ сланцевой толщи, съ которымъ мы встрѣтились уже въ долинѣ Озерной и въ низовьяхъ Голоустной, причемъ и здѣсь онъ точно переходитъ мѣстами въ хлоритовый известнякъ. Имъ онъ

зается и верхняя поверхность скалистой и крутой оконечности отрога, разобщающего оба верховья Харгина, — скала, съ которой открылся весьма живописный видъ на низовья этой долины: зеленая полоса ея дна, окружаясь крутыми и утесистыми склонами горъ, упиралась въ синеву водъ Байкала, живленнаго стоящимъ тутъ же для нагрузки песку судномъ. Особенно утесистымъ и крутымъ является оконечность отрога, отдѣляющаго лѣвое верховье Харгина отъ его лѣвой сухой долины; въ скалѣ этой, уже издали можно различать почти undoubtedly возвышающуюся часть, состоящую изъ полевошпатової породы (гранито-сѣенитъ, какъ видоизмѣненіе какого-либо роговообманковаго гнейса), къ крутому склону которой, обращенному вообще въ сторону верховьевъ Харгина, а не къ Байкалу, прилегаютъ слабо наклоненные (на с.-з.) пласты сланцевой толщи, входящей въ составъ остальной части того-же утеса, доказывая весьма наглядно, что въ этомъ мѣстѣ, также какъ въ окрестностяхъ устья Голоустной, мы приблизились къ склону древнѣйшихъ горъ (полевошпатовыхъ), образовавшихъ берегъ водъ, изъ которыхъ отложились примыкающіе и покрывающіе его сланцы съ известнякомъ и кварцитомъ включительно. Подвигаясь внизъ по долине, по которой спускаютъ песокъ, по лѣвой сторонѣ возвышаются утесы того-же известняка, мѣстами неясно-слоистаго, мѣстами-же падающаго весьма отчетливо на с.-з., съ наклоненіемъ пластовъ отъ  $8^{\circ}$  до  $10^{\circ}$ , въ одномъ лишь мѣстѣ до  $30^{\circ}$ . Несколько ключиковъ, изъ которыхъ образуется это верховье Харгина, соединяются въ одинъ, вмѣстѣ съ чѣмъ и долина эта суживается, хотя скалистость свойственна и здѣсь только лѣвому берегу. Въ руслѣ появляются громадныя глыбы афанита, по всей вѣроятности изверженнаго происхождения, но до сихъ поръ еще неопредѣленнаго микропетрографически. Оказывается, что афанитъ этотъ ниже смѣняется перитово-роговообманковымъ очковымъ гранитомъ (массивное видоизмѣненіе такого-же гнейса), причемъ какъ афанитъ, на

высотѣ 1132' надъ озеромъ, такъ и названная полевошпатовая порода, на высотѣ 1014', покрываются описаннымъ выше доломитовымъ и хлоритовымъ известнякомъ, выполняющимъ здѣсь очевидно и неровности на поверхности указанныхъ древнѣйшихъ породъ, такъ какъ на правомъ берегу той же долины афанитъ достигаетъ гораздо большей сравнительной высоты точно также, какъ на лѣвомъ берегу лѣваго верховья, гранитовидная порода значительно превышаетъ уровень залеганія на ней известняка по правой вѣтви Харгина. Наконецъ по долинѣ лѣваго притока Харгина, по которому протекаетъ тропа къ верховьямъ р. Голоустной, таже очковая порода покрывается известнякомъ на высотѣ всего лишь 971' надъ озеромъ. Остальные затѣмъ 2 версты длины долины Харгина проложены исключительно въ названной древнѣйшей породѣ и отличаются болѣе пологими и поросшими склонами, объ особенностяхъ которыхъ со стороны озера, будетъ сказано при описаніи плаванія Черскаго отъ устья Голоустной до р. Бугульдейки, теперь-же обратимся къ маршруту этого путешественника по долинѣ р.ч. Илги.

Долина этой рѣчки превосходитъ 17 верстъ въ длину при общемъ направленіи на з.-с.-з. и перерѣзываетъ собой столь-же лѣсистый сѣверо-западный склонъ Приморскаго хребта, какъ и Морская Колесьма, отъ которой она почти не отличается и поперечными размѣрами. На протяженіи первыхъ 6-ти верстъ, считая отъ устья, въ склонѣ правого берега долины можно довольно часто видѣть выходы коренной породы, именно, метаморфическаго песчаника, темнаго зеленовато-сѣраго цвѣта, пласты котораго падаютъ сначала на ю.-в. отъ 70 до 80°, затѣмъ на с.-з. и опять на ю.-в. съ меньшимъ наклономъ, мѣстами почти горизонтальны, послѣ чего, въ періодически появляющихся обнаженіяхъ, наблюдается уже только юго-восточное паденіе съ наклономъ 45°. На седьмой верстѣ долина Илги составляется изъ трехъ сходящихся здѣсь вѣтвей, изъ которыхъ средняя явля-

главную, а лѣвая носитъ названіе Мякочинъ. Около мѣста слиянія этихъ вѣтвей (по мѣстному выраженію «стрѣлка»), находится тунгузскій промышленный балаганъ, построенный также, какъ и русскіе, изъ лиственничной коры. Балаганъ этотъ обратилъ на себя вниманіе путешественниковъ тѣмъ, что внутренняя сторона его стѣнъ была разрисована изображеніями различныхъ звѣрей, какъ-то: лосей, изюбровъ, медвѣдей и т. п., причемъ рисунокъ, сдѣланный на гладкой внутренней поверхности коры какъ карандашомъ, такъ и углемъ, отличался нерѣдко замѣчательною точностью и мѣткостью въ контурахъ и общей наружности животныхъ, хотя глѣзами можно было видѣть и весьма неудачныя попытки подражанія искусству неизвѣстнаго художника. Впослѣдствіи Черскій узналъ, что рисунки дѣланы были однимъ изъ со- сланныхъ полаковъ, охотившимся въ этихъ горахъ вмѣстѣ съ игинскими тунгусами, которымъ принадлежать только неудачныя изображенія, напоминающія отчасти рисунки древнихъ, доисторическихъ людей. Экскурсія вверхъ по Мякочинѣ показала незначительную его длину (около 5 верстъ) при с.-з. направленіи; онъ образуется изъ двухъ верховьевъ. Склоны долины покрыты растительностью; въ осыпяхъ и кускахъ замѣчается все тотъ же сланецъ, но только ближе къ устью въ коренномъ его выступѣ наблюдается ю.-в.-ный наклонъ известняковъ, распространяющійся и на долину Изги выше устья Мякочина, гдѣ, впрочемъ, въ одномъ мѣстѣ находится и противоположный наклонъ. Здѣсь путешественники, потерявъ тропу, должны были сами прокладывать себѣ дорогу такимъ образомъ по едва доступной чащѣ проѣхали около 3 верстъ, послѣ чего, спустя еще съ версту, появились изображенія того же песчаниковаго сланца, но съ простираніемъ на с.-з., т. е. такимъ, какое мы видѣли и въ верховьяхъ Морской Колесмы, тогда какъ наклонъ ихъ оказался здѣсь противоположнымъ, измѣняясь отъ ю.-з. до ю.-ю.-з. Около 3 верстъ выше по рѣчкѣ изъ подъ сланца выступилъ

сѣрый вонючій известнякъ, а долина повернула на сѣверо-востокъ (считая вверхъ по теченію), образуя тамъ довольно значительное расширеніе болѣе 2 верстъ длины, отчасти болотистое и покрытое толстымъ слоемъ мха. Высота мѣста оказалась равною 954' надъ Байкаломъ; ближе къ сѣверо-восточной оконечности долины, одна изъ ея вѣтвей ведетъ на ю.-з., къ перевалу на Байкальскій склонъ хребта, въ долину ключа, который, какъ говорили Черскому, образуетъ верховье рч. Верхніе Хомуты, устье которой располагается въ 18 верстахъ на с.-в. отъ мыса (т. е. устья) р. Голоустной, слѣдовательно, почти на половинѣ разстоянія между послѣднимъ и устьемъ рч. Харгинъ. Высота перевала опредѣлена въ 1379' надъ Байкаломъ. Высоты лѣваго берега верховьевъ Илги, т. е. упомянутого выше расширенія, слѣдовательно водораздѣльный гребень хребта Приморскаго, отличается такимъ же характеромъ, какъ и въ верховьяхъ р. Колесмы и Голоустной, только здѣсь онъ болѣе удаляется отъ Байкала (5—6 верстъ) и порастаетъ настоящимъ дѣственнымъ лѣсомъ; на высшемъ пунктѣ, достигающемъ 1660' надъ озеромъ, въ корняхъ опрокинутыхъ деревьевъ, Черскій видѣлъ многочисленные и острореберные куски такого же кварцита (сѣровато-бѣлаго), какъ и на Колесмѣ, чѣмъ окончательно подтверждается однообразіе строенія этого склона хребта въ предѣлахъ описанной системы рѣкъ. Что же касается особенностей и строенія противоположнаго, т. е. восточнаго склона Приморскаго хребта, то съ ними мы ознакомимся въ нижеслѣдующемъ изложеніи.

#### В) Берегъ Байкала отъ Голоустной до устья р. Большой Бугульдейки.

Въ противоположность описанному выше отрѣзку между истокомъ Ангары и Голоустною, берегъ Байкала между устьемъ

последней изъ названныхъ рѣкъ и Большой Бугульдейки принадлежитъ въ общемъ сѣверо-восточное направленіе, обуславливая соответственный изгибъ средней части озера, юго-западная половина которой, какъ сказано выше, вытягивается съ запада на востокъ. Длина интересующей насъ части берега, считая по прямому направленію, достигаетъ 63 верстъ, тогда какъ по изгибамъ длина ея увеличится еще почти на 15 верстъ. Изъ отношенія этихъ цифръ другъ къ другу можно заключить уже, что береговая линія озера на описываемомъ протяженіи не должна отличаться значительною извилистостью. И дѣйствительно, благодаря двумъ болѣе выдающимся мысамъ, изъ которыхъ ближайшій къ Голоустной, — Хомутовскій, располагается почти въ концѣ первой четверти, а другой — Бабушка почти съ точностью на половинѣ всего разстоянія до Бугульдейки, весь этотъ отрѣзокъ береговой линіи раздѣляется на три главныхъ бухты. Первая изъ нихъ, для краткости, названа Черскимъ Хомутовскою, въ впадающихъ въ нее двухъ соименныхъ рѣчекъ; вторая, Несчаная или Бакланья, отъ бухточекъ и острова того же названія, а наконецъ третья, самая длинная и всего болѣе врезанная въ побережье, могла бы называться Харгинскою отъ двухъ рѣчекъ того-же имени, или Хюрхюрбаче-Хурхюро) отъ соименной рѣчки, впадающей въ самую глубокую часть бухты. Въ частности-же береговая линія образуетъ здѣсь только небольшіе изгибы, соответствующіе мноству второстепенныхъ, нерѣдко довольно живописныхъ бухточекъ, которыя только и различаются мѣстными жителями подъ различными названіями, хотя многія изъ нихъ относятся и къ категоріи безымянныхъ. Склонъ горъ въ общемъ значительно болѣе крутой и болѣе скалистый, тогда какъ по составу прибойнаго матеріала (*карпа* у мѣстныхъ жителей) или гравия, гораздо ѣже.

Описаніе подробностей мы начнемъ съ сѣверо-восточной оконечности дельты р. Голоустной, откуда Черскій отплылъ 23



іюня 1879 г. Дельта, какъ равно и переходящій въ нее лѣвый берегъ долины Голоустной, ограничиваются здѣсь крутымъ скалистымъ склономъ, состоящимъ изъ обыкновеннаго (слюдянаго) гнейса, переходящаго въ гранитъ. Порода эта обнаруживаетъ здѣсь весьма отчетливое простираніе пластовъ на с.-с.-з. (с.-з.  $15^{\circ}$ ), иногда и на с., съ очень крутымъ наклономъ на в.-с.-в. (в.-с.  $15^{\circ}$ ) или в.; она образуетъ собою всю высоту видимаго склона къ озеру какъ равно и покрывающій его розсыпи такъ-что, наблюдая со стороны Байкала, нельзя было-бы и подозревать столь близкаго присутствія описанныхъ выше сланцевъ, которые примыкаютъ къ сѣверо-западному склону этой гнейсовой стѣны, какъ мы видѣли это, изучая низовья Голоустной. Поэтому о сланцахъ этихъ и не упоминается у прежнихъ изслѣдователей, хотя Меглицкій видѣлъ известнякъ, развитый сейчасъ-же выше въ долине этой рѣки (низшій членъ сланцевъ), но считалъ его принадлежащимъ одному возрасту съ гнейсомъ, какъ это видно на его геогностической картѣ, такъ какъ ему не было известно ни существованіе сланцевъ по этой рѣкѣ, ни отношеніе ихъ къ доломитовому известняку, ни наконецъ положеніе слоевъ послѣдняго относительно полевошпатовыхъ породъ, образующихъ здѣсь только узкую полосу юго-восточнаго склона Приморскаго хребта.

Въ такомъ же видѣ и съ такимъ же положеніемъ пластовъ гнейсъ этотъ обнажается и далѣе по берегу озера, который направляется здѣсь сначала еще на в.-с.-в., а затѣмъ на с.-в. Въ первыхъ двухъ небольшихъ бухточкахъ открывается по одной небольшой долинь, изъ которыхъ вторая именуемая Хуртнукъ, обрѣзывается на своемъ устьѣ на расою до 17' высоты надъ поверхностью Байкала. Пласты гнейса, перешедшаго здѣсь въ роговообманковый, а мѣстами и хлоритово-роговообманковый, изогнуты мѣстами въ желвакообразныя съ боковъ складки съ заостренными вершинами. Слѣдующая небольшая бухточка носитъ названіе Асагольскаго.

отъ имени впадающихъ въ неё двухъ незначительныхъ долинъ. Въ бухтѣ этой Черскій долженъ былъ простоять два дня, вслѣдствіе сильнаго сѣверо-восточнаго вѣтра и вызваннаго имъ волненія. Асогольскія долины разобщаются на устьѣ лишь весьма низкимъ и узкимъ, усѣченнымъ концомъ трога, обѣ онѣ сухія и оканчиваются на высотѣ прибрежной террасы, какъ и Хуртукъ и только дно восточнаго Асагола углублено нѣсколько болѣе, а потому возвышается всего лишь на 7 футовъ; въ верховьяхъ этой долинки струится еще ручей, исчезающій въ низовьяхъ. Склоны ихъ, какъ равно и пересѣкаемыхъ ими горъ, поросли хвойнымъ, преимущественно лиственничнымъ лѣсомъ. Высота ближайшаго къ озеру пункта въ отрогѣ по лѣвому берегу восточнаго Асагола опредѣлена Черскимъ въ 1014' надъ Байкаломъ; въ скалахъ вездѣ попадался только гнейсъ иногда съ кварцевыми жилками. Во время этой экскурсіи (25-го іюня) имъ найдена кушка, сидѣвшая, вопреки извѣстному и даже воспѣтому обычаю этихъ птицъ, на двухъ яйцахъ, лежавшихъ впрочемъ не въ нѣмъ либо гнѣздѣ, а прямо на поверхности земли, въ незначительномъ углубленіи, освобожденномъ отъ слоя лежавшихъ здѣсь сухихъ хвоевъ лиственницы; къ насѣдкѣ этой удалось подойти слишкомъ близко, и потому въ ея опредѣленіи могло быть ошибки, къ тому-же взяты были и оба яйца. На пути къ ближайшему мысу наклонъ пластовъ гнейса переходитъ въ западный (з.-ю.-з.) и опять въ восточный, а долина, располагающаяся на самомъ мысѣ, обрѣзывается со стороны озера террасою до 17' высоты. За мысомъ этимъ находится бухта, называемая Роговикскою, такъ какъ она изъ открывающихся въ нее небольшихъ долинъ, занимаетъ Большой Роговикъ, достигающимъ 1½ саж. ширины въ устьѣ. Гнейсъ падаетъ здѣсь къ западу, образуя по видимому опрокинутую къ западу складку, вслѣдствіе чего и паденіе переходитъ въ восточное. Склонъ Приморскаго хребта принимаетъ довольно рѣзко выраженный терра-

совидный характер вслѣдствіе цѣлаго ряда такихъ же (т. е. террасовидныхъ) отроговъ, отдѣляющихъ долины. Отроги эти хотя и не отличаются правильной террасовидностью, такъ какъ верхняя ихъ поверхность снабжена мѣстами различными углубленіями и небольшими сѣдловинами, но она все-таки болѣе или менѣе горизонтальна и съ высоты около 700' обрѣзывается крутымъ склономъ къ озеру, причемъ ближе къ поверхности послѣднего, мѣстами наблюдаются слѣды и другого уступа, впрочемъ на высотѣ, не достигающей третьей части общей высоты склона.

Таковыми особенностями отличаются всѣ видимые отсюда мысы; около ближайшаго изъ нихъ, Роговикскаго, вслѣдъ за долиною Малаго Роговика, располагается утесъ, извѣстный подъ названіемъ Ворота. Название это какъ нельзя лучше выражаетъ дѣйствительныя особенности этой скалы, составляющей низшій террасовидный уступъ отрога, такъ какъ въ ней образовалось отверстіе до 2 саженой высоты и болѣе сажени ширины и почти столько же длины; отверстіе это пробиваетъ скалу въ направленіи, параллельномъ Байкалу почти на самомъ уровнѣ послѣднего и прежде должно было омываться его водами, прибой которыхъ способствовалъ и паденію отдѣлившихся частей породы; въ настоящее-же время проходъ по этимъ воротамъ совершенно сухой и выполненъ пробойною галькою, возвышающеюся на 1 футъ надъ уровнемъ. Порода, изъ которой состоитъ этотъ весьма красивый утесъ, состоитъ изъ хлоритово-роговообманковаго гнейса переходящаго здѣсь и въ массивное строеніе; паденіе плоскостей на востокъ съ наклономъ до  $60^{\circ}$  <sup>1)</sup>). Скала эта въ первый разъ упоминается въ литературѣ Меглицкимъ <sup>2)</sup>), передавшимъ и краткое ея описаніе; студентъ Лебедевъ, плывшій для встрѣчи съ академикомъ Георги, какъ равно и Радловъ умалчиваютъ о ней.

<sup>1)</sup> Черскій, Рукописныя замѣтки о Сибири.

<sup>2)</sup> Меглицкій, Горн. Журн. loco cit.

Роговиковскій мысъ, кромѣ округленной вершинки, лежащей на мѣстѣ перехода верхней поверхности отрога въ крутой склонъ къ озеру, отличается еще отвѣснымъ столбовиднымъ утесомъ, расположеннымъ почти на половинѣ высоты склона. За нимъ начинается рядъ мысовъ у которыхъ развиты въ длину болѣе низкія террасовидныя поверхности, возвышающіяся все-таки мѣстами повидимому до 300', тогда какъ высшіе уступы отроговъ, до 700' высоты, значительно подвигаются отъ озера; лежащія между ними бухты подразделяются еще на меньшія вырѣзки береговой линіи, благодаря соотвѣстственнымъ мысовиднымъ выступамъ.

Такимъ образомъ первая бухта за Роговиковскимъ мысомъ отличается тройнымъ изгибомъ; одна изъ ея долинъ обрѣзывается на высотѣ около 17'; слоистость гнейса мѣстами извилистая, мѣстами же маскируется, а далѣе обнаруживаетъ западный наклонъ. Еще болѣе сложною является слѣдующая бухта, интересная также и въ геологическомъ отношеніи. Номинальная многихъ сухихъ долинъ, открывающихся иногда на высотѣ террасы (17'), въ нее изливаются сначала рч. Еловка и Хашертуй, а далѣе Нижніе Хомуты. До ближайшихъ западныхъ окрестностей устья послѣдней, гдѣ находится сухая долинка, извѣстная подъ названіемъ Дыроватой, въ утесахъ, мѣстами непосредственно омываемыхъ водою, обнажается все тотъ же гнейсъ то съ восточнымъ, то концемъ съ западнымъ паденіемъ или же переходящій въ ясно-слоистое видоизмѣненіе. Между тѣмъ, около долины Дыроватой, устье которой располагается на высотѣ террасы (17' надъ озеромъ), полевошпатовая порода эта мгновенно смѣняется доломитовымъ известнякомъ, петрографическія особенности котораго въ общемъ вполнѣ тождественны знакомымъ намъ уже нисшимъ членомъ толщи полеозойскихъ сланцевъ, какъ напр. по долинѣ Озерко, въ низовьяхъ Белоустной и въ верховьяхъ Голоустной и въ верховьяхъ рч. Маргінъ. Тожество это подтверждается здѣсь еще и страти-

графическимъ отношеніемъ его къ гнейсу, указывающимъ на неодинаковую древность, но въ настоящемъ случаѣ отношеніе это представляетъ еще большій интересъ потому, что известнякъ, какъ оказывается, выполняетъ собою довольно широкую (болѣе версты) долину въ древнѣйшихъ полевошпатовыхъ породахъ, опускаясь и подѣ уровень Байкала. И дѣйствительно, какъ видно изъ произведенныхъ здѣсь Черскимъ подробныхъ изслѣдованій, плоскость соприкосновенія полевошпатовой породы съ известнякомъ обнаруживаетъ довольно крутой наклонъ къ сѣверо-востоку, постепенно наклоняясь къ озеру и наконецъ исчезая подѣ его поверхностью, причемъ въ противоположность указанному выше западному паденію пластовъ гнейса, ясно слоистый, нерѣдко сланцеватый известнякъ падаетъ здѣсь на с.-в. (с.-с.-в.) съ наклономъ до 75° слѣдовательно вполне несогласно къ гнейсу, а такъ какъ разрѣзъ, представляемый склономъ горъ направляется здѣсь почти поперечно къ простиранію гнейса и параллельно протеканію известняка, то несогласное напластованіе этихъ породъ выражается здѣсь съ еще большею наглядностью, такъ какъ слоистость известняка кажется близкою къ горизонтальной. Въ такомъ видѣ является юго-западная часть перерыва полевошпатовыхъ породъ, выполненнаго низшимъ членомъ сланцевой толщи. Подвигаясь далѣе, мы видимъ, что въ томъ же известнякѣ промыта и долина рч. Нижніе Хомути. Устье рѣчки располагается на низменномъ, наносномъ мѣстѣ, видномъ выступѣ береговой линіи, а въ самой долинкѣ возвышаются громадные утесы того же известняка, въ которыхъ на лѣвомъ берегу, виднѣется недоступное повидимому отъ постороннихъ пещеры. На правомъ берегу рѣчки замѣтны двѣ террасы изъ которыхъ одна достигаетъ только 7', а другая 10' высоты. Въ галькѣ, выносимой рѣчкою, найдены куски кварцита — новое доказательство того, что здѣсь мы имѣемъ дѣло съ толщею сланцевъ, примыкающихъ къ сѣверо-западному склону гнейсовой полосы и покрывающихъ ее на протяженіи,

ченномъ нами по системѣ р. Голоустной, и потому очевидно, что воды, отлагавшія эти сланцы, проникали въ бывшую здѣсь среди гнейсовъ долину, распространялись по ней и на некоторую часть мѣстности, занимаемой нынѣ долиною Байкала, о чемъ въ своемъ мѣстѣ, будетъ сказано съ болѣею подробностью, распространяя тотъ-же выводъ и на часть побережья озера, лежащую между долинами Варначьей и Черкомъ, гдѣ, какъ намъ уже извѣстно, полевошпатовыя породы вполне вытѣсняются какъ толщею тѣхъ-же сланцевъ, такъ и юрскимъ конгломератомъ.

Продолжая наблюдать строеніе склона горъ за устьемъ нижнихъ Хомутовъ, оказывается, что тотъ-же известнякъ (моритовый и тальково-хлоритовый) падаетъ здѣсь уже въ противоположномъ направленіи, именно на юго-востокъ, съ наклономъ до  $45^{\circ}$ , а ближе къ небольшому мысу, ограничивающему эту бухту, изъ-подъ него опять выступаютъ члены полевошпатовыхъ породъ, образуя сѣверо-восточный берегъ той древнѣйшей (палеозойской) долины, т. е. перерыва въ гнейсовой части Приморскаго хребта. Въ этомъ мѣстѣ выступаетъ сначала особенное видоизмѣненіе хлоритоваго сланца, а затѣмъ уже и гнейсъ съ тѣмъ же западнымъ паденіемъ пластовъ, какимъ онъ отличался и на юго-западной границѣ перерыва, какъ это видно въ слѣдующей гл. Небольшія экскурсіи, произведенныя Черскимъ въ предѣлахъ этой интересной мѣстности, убѣдили его въ томъ, что всѣ высшія части склона образуются палеозойскою толщею, прерывшею собою понизившуюся полосу гнейсовъ.

Ближайшая бухта носитъ названіе Верхнихъ Хомутовъ, такъ какъ въ восточной ея оконечности располагается широкая долина соименной рѣчки, высыхающей, впрочемъ, въ лѣтнихъ. Это таже долина, верховья которой мы видѣли на перевалѣ черезъ Приморскій хребетъ съ источниковъ рч. Черкомъ, знакомаго уже намъ лѣваго притока р. Голоустной. Значитъ сейчасъ же за устьемъ Хомутовскій мысъ те-

ряетъ террасовидный типъ вслѣдствіе весьма постепеннаго его пониженія къ уровню озера. Наклонъ пластовъ гнейса, представившій въ одномъ мѣстѣ ненормальный изгибъ съ паденіемъ на с.-з.-с. и с.-с.-в., переходитъ здѣсь въ в.-с.-в. За мысомъ берегъ направляется на с.-с.-в., представляя утесистый и болѣе высокій склонъ, такъ какъ здѣсь къ нему опять подступаетъ высшій уступъ отроговъ; вмѣстѣ съ тѣмъ путешественникъ вступаетъ уже во вторую изъ упомянутыхъ выше трехъ главныхъ бухтовидныхъ выемокъ описываемой части берега, именно въ Бакланью. Съ версту за Хомутовскимъ мысомъ, около подножія крутаго склона, замѣчается довольно значительныхъ размѣровъ скала, почти уединенная и напминающая своимъ очертаніемъ копну сѣна, впрочемъ, лишь съ нѣкотораго отдаленія, такъ какъ вблизи правильность ея контуровъ исчезаетъ. Паденіе пластовъ гнейса все в.-с.-в., въ одномъ мѣстѣ съ замѣтнымъ перегибомъ на з.-ю.-з., заставляющимъ полагать, что въ тектоникѣ этой части побережья могутъ участвовать сжатія складки, опрокинутыя къ з.-ю.-з. С этого мѣста открывается лучшій видъ на всю эту, нѣсколько мрачную, но своеобразно-живописную выемку до мыса Бабушки включительно (см. ниже). Болѣе высокій уступъ пренихъ террасовидныхъ отроговъ здѣсь исчезаетъ совершенно, вслѣдствіе чего горизонтъ зрѣнія закрывается уже высшими пунктами Приморскаго хребта, въ видѣ цѣлаго ряда холмистыхъ, плоскоокругленныхъ вершинъ, отъ которыхъ нисходитъ то болѣе пологій и длинный, то болѣе крутой склонъ, опускаясь сразу до высоты значительно развитаго здѣсь низшаго уступа, благодаря которому образуется родъ холмистаго или менѣе обширнаго, но низкаго предгорья. Предгорье это замѣтно наклоняется къ озеру въ ближайшей части бухты, гдѣ поверхность склона опускается болѣе постепенно, и становится почти горизонтально въ ея сѣверо-восточной части, гдѣ оно разчленено на нѣсколько вполне террасовидныхъ мысовъ, изъ которыхъ оба Колокольные, ближайшіе къ мысу Бабушки.

отличаются довольно оригинальными особенностями. Несмотря на весьма правильно выраженный террасовидный типъ этихъ длинныхъ мысовъ, оконечность каждого изъ нихъ мгновенно возвышается въ видѣ заостренной, неправильно пирамидальной скалы, круто опускающейся къ Байкалу, къ которому даже нѣсколько наклоняется вершина восточнаго Колокольнаго мыса. Отсюда же виднѣется и маленький Бакланій островъ, не достигающій и половины высоты пирамидальныхъ оконечностей расположенныхъ за нимъ Колокольныхъ мысовъ (см. ниже).

Входя въ первую изъ бухтъ, лежащихъ за мысомъ, съ котораго сдѣланъ этотъ обзоръ мѣстности, и обогнувъ низкую и гнѣкстую оконечность мыса, путешественникъ сопровождается еще высокимъ береговымъ склономъ, покрытымъ мѣстами розсыпью гнейса, обыкновенно же поросшимъ растительностью. Склонъ этотъ пересѣкается только одной глубокой долиной съ ключемъ, извѣстнымъ подъ названіемъ Шуниха; въ выносахъ ея, кромѣ преобладающей полевошпатовой породы, наблюдается также и известнякъ, принадлежащій толщѣ древнихъ сланцевъ, до которыхъ достигаютъ очевидно верховья этой долины. Тамъ, гдѣ появляются неосыпанные выходы коренной породы склона и въ ней замѣчается достаточно ясная слоистость, наклонъ слоевъ гнейса вездѣ оказывался восточнымъ (в.-с.-в.), въ большинствѣ же случаевъ порода переходитъ въ гранитовидное измѣненіе, мѣстами въ точковое отъ вкрапленныхъ въ нее нерѣдко округленныхъ полевошпатовыхъ скопленій и напоминающее собою финляндскій гранитъ. Далѣе начинается уже та низкая часть предгорья, о которой сказано было выше. Поростая густымъ хвойнымъ лѣсомъ, она понижается всего болѣе вблизи собственно Бакланьей бухты, насупротивъ которой располагается сомнительный островокъ, обрывающійся къ озеру крутымъ, нерѣдко отвѣснымъ склономъ, высота котораго ниспадаетъ до 30 футовъ и въ составѣ котораго замѣчается уже сіенито-



гранитъ, очковый отъ крупныхъ скопленій полевого шпата. — Нѣкоторыя замѣтки объ интересующей насъ части прибрежья мы находимъ и въ сочиненіи Радде <sup>1)</sup>, который, къ сожалѣнію, должно быть не пользовался ни подробною картою озера, ни хорошими проводниками, вслѣдствіе чего его описаніе страдаетъ иногда недостаткомъ названій мѣстностей, къ которымъ относится данное наблюденіе. Отъ него мы знаемъ во-первыхъ, что одна изъ живописныхъ скалъ (но не островъ), располагающаяся въ разстояніи болѣе 20 верстъ отъ Голоустной, носить названіе Бакланьяго камня, не значущее на извѣстныхъ картахъ и не упоминаемое другими путешественниками. Кромѣ того онъ обращаетъ вниманіе на существованіе особыхъ прибрежныхъ площадокъ, треугольных въ очертаніи, плоскихъ и возвышающихся всего лишь на 2—3' надъ озеромъ, причемъ онѣ не обнаруживаютъ связи съ какими либо долинами, а окружаются, напротивъ, сплошнымъ рядомъ высокихъ коническихъ горъ (*Berg-Kegel*). Такихъ площадки разсматриваются Черскимъ какъ болѣе или менѣе амфитеатральныя бухтовидныя выемки береговыхъ горъ, образованныя своимъ происхожденіемъ одному лишь дѣйствию волнъ на соотвѣтственно растресканную породу склона прибрежнаго хребта; такимъ путемъ, при благопріятномъ расположеніи плоскостей отдѣльности, образуется немалое количество бухтъ, тогда какъ всего чаще процессу этому способствуютъ готовые уже ложбины рѣчныхъ долинъ, затопленныхъ устьями и расширенныхъ затѣмъ волнами. Что-же касается временнаго положенія дна такихъ площадокъ надъ уровнемъ озера, то явленіе это объясняется соотвѣтственнымъ пониженіемъ поверхности Байкала, волны котораго и въ настоящее время работаютъ во многихъ мѣстахъ надъ образованіемъ такихъ выемокъ, омываемыхъ нынѣ непосредственно водою, какъ имѣетъ мѣсто и въ Бакланьей бухтѣ. Употребленное Радде

---

<sup>1)</sup> Радде, I. с., pag. 250—251.

выраженіе *Berg-Kegel* при цѣломъ рядѣ дѣйствительно коническихъ горъ, которыми обставлена такая площадка на прилагаемомъ имѣ, хотя бы и схематическомъ, рисункѣ, не только не изображаетъ явленія этого въ его настоящемъ свѣтѣ, но способно дать превратное понятіе о дѣйствительномъ состояніи вещей, такъ какъ горы въ этихъ мѣстахъ страдаютъ именно отсутствіемъ расчлененія, окружая выемку не рядомъ конусовъ, а болѣе или менѣе сплошною стѣною съ волнистыми или округленными контурами болѣе отдаленныхъ горъ, о которыхъ мы говорили уже выше. На площадяхъ такихъ осужденныхъ нынѣ бухтъ Радде находилъ, кромѣ листовичнаго мха, *Geranium*, *Cypripedium*, *Spiraea*, *Pedicularis*, *Aconitum*, *Polygala* и т. п. растенія.

Большая часть Бакланьей бухточки является такимъ же амфитеатромъ, непосредственно омываемымъ водою. Скалистая, почти вездѣ отвѣсныя стѣны ея достигаютъ слишкомъ 30' высоты и на уровнѣ озера представляютъ цѣлый рядъ подмытыхъ пещеровидныхъ полостей съ нависшими надъ ними частями скалъ, долженствующихъ современемъ обрушиться, увеличивая такимъ образомъ окружность бухты. Вода, шелемая бывшимъ въ то время легкимъ волненіемъ, удаляясь въ своды этихъ пещерокъ, издавая весьма странные, глухіе звуки, способные навести страхъ на суевѣрнаго пловца, еще болѣе омрачался видъ этихъ негостепріимныхъ утесовъ. Весь амфитеатръ этотъ состоитъ изъ сѣраго гранито-гнейса, порфировиднаго, вѣрнѣе очковаго, отъ крупныхъ, мерцательныхъ сростковидныхъ образований (какъ въ финляндскихъ гранитахъ), достигающихъ иногда 50 миллим. въ діаметрѣ; пластоватая отдѣльность породы наклонена на в.-с.-в., вѣстами же какъ въ западномъ, т. е. Бакланьемъ мѣстѣ. Только небольшая часть этой губы (т. е. бухты), именно, около перваго или юго-западнаго Колокольнаго мыса, покрыта низменною и поросшею растительностью до уровня воды, и потому только въ этомъ мѣстѣ путешественникъ мо-

жеть найти пристань и спасеніе отъ застигшаго его вѣтра и волненія. Въ виду этой бухты, какъ бы на продолженіи ея западнаго мыса, и въ разстояніи около  $1\frac{1}{2}$  версты отъ берега, располагается упомянутый уже выше, скалистый островъ, Бакланій камень, посѣщенный до сихъ поръ только Меглицкимъ и Радде. У перваго изъ названныхъ исследователей мы находимъ только замѣтку, что островъ этотъ состоитъ изъ бѣлаго, крупно-зернистаго гранита, дѣлящагося на огромныя кубическія отдѣльности, тогда какъ Радде передаетъ и подробныя наблюденія свои, главнымъ образомъ, надъ обитающими этотъ островъ бакланами, громаднаго стаи которыхъ, снующія около этой скалы, онъ видѣлъ уже съ нѣскалькихъ отдаленій. Приблизившись къ острову, достигающему около 300' высоты, онъ нашелъ его буквально усаженнымъ плоскими гнѣздами, изъ которыхъ торчали открытыя клювы баклановъ-птенцовъ, заботливо охраняемыхъ родителями. Радде, сѣвъ выстрѣломъ взрослыхъ хищниковъ, отлетѣвшихъ целыми тучами версты за 4 отъ острова, Радде вскарабкался на утесъ, чтобы ближе осмотрѣть эту многочисленную пернатую колонію. Слой птичьяго помета покрывалъ скалу толщиною до 1 фута; на немъ лежали остатки мелкой рыбы. Ни ботвы, ни травки, ни клочка лишая не было видно на всемъ этомъ пространствѣ, такъ какъ отъ обилія помета упомянутыя птицы усыхаютъ даже большія деревья, избираемые ими для пристанища. Поверхность скалы была до того скользкою отъ свѣжихъ изверженій, что ходить по ней было не только трудно, но даже и опасно. Содержимое различныхъ гнѣздъ показало Радде всѣ постепенныя фазы развитія корморана (т. е. баклана), начиная съ яицъ и только-что вылупившихся еще слѣпыхъ птенцовъ, до представителей того возраста, въ которомъ начинаютъ уже сильно проростать маховыя перья. Въ находимыхъ имъ теплыхъ яйцахъ явственно ощущалось пульсированіе зародыша. Такая наравномѣрность развитія объясняется тѣмъ обстоятельствомъ, что у баклановъ сѣ-

ски на яйцахъ, кладесть въ то же время и новыя. Пребываніе кormорановъ на этомъ островѣ, пишетъ Радде, продолжается только до тѣхъ поръ, пока семейная жизнь ихъ обуславливается необходимостью со стороны родителей охранять слабыхъ детенышей, послѣ чего они покидаютъ родной утѣсъ и летаютъ къ побережью, въ бухты, гдѣ жадно выжидаютъ добычу, остающуюся имъ отъ рыбнаго промысла. Осенью птицы эти покрываютъ цѣлыми тысячами Баргузинскій заливъ и Селенгинскую дельту и снуютъ стадами около устья Верх. Ангары, гдѣ рыболовство особенно развито. Въ этихъ мѣстахъ, какъ равно и въ окрестностяхъ острова 'Ольхона, видывалъ ихъ въ громадныхъ количествахъ и Черскій, тогда какъ во всей юго-западной части озера съ Бакланьимъ камнемъ включительно, онъ не встрѣчалъ уже ни одного ба-клана, хотя Бакланья бухта осматривалась имъ 26-го іюня, слѣдовательно, въ одинаковое время года и только четырьмя днями позже нежели Радде. Глубина озера между берегомъ и Бакланьимъ островомъ оказалась, по измѣреніямъ Радде, превосходящею 8—10 сажень, и потому, благодаря из-вестной прозрачности байкальской воды, дно видно было по-мѣстности, что же касается самого острова, то Черскій счита-етъ его отдѣлившееся оконечностью западнаго мыса соимен-ной бухты. Видимый отсюда склонъ Приморскаго хребта подблается брустверу крѣпостнаго вала, опускаясь въ та-кой видѣ въ террасовидной части побережя; такой характеръ озера, независящій отъ тектоническихъ условій строенія горъ, свѣдѣетъ обыкновенно подмываніемъ его водою, что и должно имѣть здѣсь мѣсто въ то время, когда уровень озера былъ гораздо выше современнаго и все предгорье это по-крывалось водою Байкала до самаго подножія высшей части хребта (см. ниже).

Ночь 26 — 27 іюня Черскій провелъ въ слѣдующей, т. е. въ Колокольной губѣ, еще болѣе живописной, благодаря описаннымъ выше скалистымъ и неправильно пи-

рамидалнымъ оконечностямъ ограничивающихъ её соименныхъ мысовъ. Недоступнымъ берегъ является здѣсь, однако, только около обоихъ мысовъ, состоящихъ изъ такого же гранито-сіенита, какъ въ Бакланьей бухтѣ, только съ не вполне совершенной, но очень крупной сферической отдѣльностью. Эта послѣдняя около озера наблюдается собственно только на западномъ изъ двухъ Коловольныхъ мысовъ, тогда какъ на восточномъ замѣчается пластоватая трещиноватость, съ наклономъ плоскостей къ западу, слѣдовательно, съ простираніемъ, и здѣсь совпадающимъ съ простираніемъ гнейса. Въ глубинѣ бухты и на прибрежьи замѣчается сухая ложбина, за которою, въ нѣкоторомъ отдаленіи отъ берега, на поверхности, поросшей отчасти растительностью, отчасти же совершенно обнаженной, можно видѣть цѣлый рядъ небольшихъ, бугровидныхъ и неправильно столбовидныхъ скалистыхъ выступовъ, которыми усыяна довольно значительная площадь, напоминая собою что-то въ родѣ кладбища, уставленного оригинальными надгробными камнями. Ближайшій осмотръ этого «кладбища богатырей» (какъ выразился одинъ изъ гребцовъ Черскаго, всматриваясь въ это загадочное для него явленіе) показалъ, что сіенито-гранитъ обладаетъ здѣсь неравномѣрною плотностью вслѣдствіе упомянутой выше наклонности къ сферической отдѣльности, причемъ менѣе плотныя и удобопроницаемыя водою части его разлагаются и превращаются въ дресву, по мѣрѣ смыванія и той обнажаются и выступаютъ наружу глыбы его въ формѣ сферъ и ихъ комбинацій, неподдающіяся такому процессу разрушенія. Такія болѣе устойчивыя части и образуютъ собою въ эти неровности почвы, постепенно обнажаясь изъ-подъ смываемой дресвы; нѣкоторыя изъ такихъ скалъ, по замѣчанію Черскаго, весьма поучительны въ томъ отношеніи, что, будучи результатомъ одного лишь неравномѣрнаго разрушенія породы, они напоминаютъ собою явленія вызванныя стирающимъ дѣйствіемъ ледниковъ: такимъ являются, напр. болѣе

шихъ размѣровъ сферы сіенито-гранита, обнаженные описаннымъ процессомъ только до половины и принимающія по-  
этому наружность такъ называемыхъ «бараньихъ лбовъ» лед-  
никового происхожденія. Остальная часть поверхности этой  
прибрежной площади порастаетъ растительностью и лѣсомъ,  
въ составѣ котораго участвуютъ сосна, ель и береза. Со  
стороны этой бухты, на западномъ Колокольномъ мысѣ,  
именно, на южной сторонѣ находящейся тамъ небольшой пе-  
щеры, гдѣ скала омывается непосредственно водою, Черскій  
сдѣлалъ засѣчку для обозначенія высоты стоянія воды въ Бай-  
калѣ (26-го іюня 1879 г.); горизонтальная черта эта, съ  
стоящею подъ нею цифрою года, выдолблена на высотѣ 2  
метровъ надъ современнымъ ей уровнемъ воды, считая по от-  
вѣсному направленію. Это уже вторая засѣчка, сдѣланная  
имъ на сѣверо-западномъ берегу озера (первая, какъ намъ  
извѣстно, находится около рч. Сѣнной, въ промежуткѣ между  
о-з. окончанностью Байкала и истокомъ р. Ангары (см. выше));  
производство этихъ знаковъ во время путешествія, впрочемъ, не  
всегда зависитъ ни отъ желанія ихъ нанести, ни отъ скалистости  
береговъ, такъ какъ извѣстно, что даже при самыхъ цѣле-  
сообразныхъ въ этомъ отношеніи утесахъ, малѣйшее ко-  
лебаніе воды въ озерѣ, т. е. волненіе, заставляетъ уже от-  
казаться отъ этого дѣла, подѣ страхомъ впасть въ крупную  
ошибку. Вотъ почему Черскій избиралъ для этой цѣли только  
мгнуты совершенно тихаго стоянія воды, столь рѣдкія на  
Байкалѣ. Имѣя въ виду возможность осматриванія засѣчекъ  
даже во время высшаго стоянія воды въ Байкалѣ, Черскій  
сдѣлалъ ихъ всегда выше найденнаго уровня и хотѣлъ при-  
нять за норму для этой цѣли отвѣсную высоту въ 2 метра.  
Истинныя условія, однако, показали, что дѣланіе засѣчекъ на  
такой постоянной высотѣ сопряжено съ немалыми затрудне-  
ніями, безъ которыхъ, разумѣется, не обойдется въ послѣдствіи  
каждая провѣрка высоты стоянія воды по этимъ чертамъ.  
Такимъ образомъ, по причинѣ своеобразностей утесовъ, для

многихъ засѣчекъ потребовалась различная, неодинаковая высота, цифры которыхъ, означенныя какъ на картѣ, такъ и въ отчетахъ Черскаго, необходимо помнить при провѣркѣ. Мѣсто для черты на данномъ утесѣ избиралось съ помощью тонкой бичевки, на концѣ которой привѣшивалась свинцовая гирица, прикасавшаяся къ поверхности озера, при чемъ для черты необходимо было избирать, разумѣется, на столько нависшую часть скалы, чтобы въ промежуткѣ между засѣкою и водою бичевка нигдѣ не прикасалась къ утесу и могла висѣть совершенно свободно. Этимъ путемъ настолько же упростился и способъ провѣрки, такъ какъ для данной засѣчки достаточно будетъ только отпустить гирицу на показанную на картѣ цифру высоты и, приложивъ одинъ конецъ бичевки къ чертѣ на утесѣ, замѣчать положеніе гири относительно уровня воды.

Вслѣдъ за Колокольною бухтою располагается другая, столь же живописная, но гораздо болѣе утесистая, такъ какъ только ближе къ ея восточному мысу находится удобная пристань, благодаря расположенному тамъ устью сухой долины. Это Песчаная губа, въ которую въ 1772 г. занесло бурю судно съ ѣхавшимъ на немъ Палласомъ. Въ противоположность возвышенному на концѣ, восточному Колокольному мысу, мысъ Бабушка, ограничивающій Песчаную бухту съ востока, принадлежитъ уже къ правильно-террасовидному типу, обнажая все ту-же массивную породу, какъ и въ Колокольной губѣ, только съ болѣе мелкою и неправильною отдѣльностью. Въ глубинѣ этой бухты (27-го іюня) нѣкоторая часть поверхности воды покрывалась сѣрно-желтымъ налетомъ такъ называемаго «морскаго цвѣта», т. е. цвѣточной пыли хвойныхъ деревьевъ, — явленіе, о которомъ подробно сообщено уже нами въ одномъ изъ предшествовавшихъ параграфовъ. Бухта Бабушка, въ общемъ похожая на предшествовавшія, располагается уже на крайнемъ восточномъ предѣлѣ развитія описаннаго выше террасо-

виднаго предгорья, такъ какъ къ ней подступаетъ уже непосредственно склонъ Приморскаго хребта, поворачивающаго здѣсь, совмѣстно съ береговою линіею Байкала, на с.-с.-в. и слѣдующаго такимъ образомъ на протяженіи почти 22 верстъ до устья рч. Хюрхуро, т. е. до самой глубокой части большой бухтовидной выемки побережья, которую мы называли Харгинскою и которая начинается съ бухты Бабушки. Эта послѣдняя столь же опасна для плавающихъ какъ и другія, такъ какъ только устье одной широкой долины даетъ доступную пристань. Долинѣ этой соответствуетъ маленькая ступоростепенная бухточка, въ видѣ маленькаго амфитеатра, окруженнаго недоступными скалами до 24' высоты надъ озеромъ, образующими отвѣсныя склоны террасы. Ближайшій осмотръ упомянутой долины обнаруживаетъ небезынтересные моменты въ исторіи ея развитія, указывая вмѣстѣ съ тѣмъ, хотя и въ миниатюрномъ масштабѣ, на значеніе прихода волнъ и захвата ими соответственныхъ частей побережья въ дѣлѣ измѣненія топографическихъ особенностей мѣстности. По наблюденіямъ Черскаго, низовья долины направляются подъ острымъ угломъ къ береговой линіи такимъ образомъ, что высоты ея праваго берега омываются непосредственно Байкаломъ и постепенно суживаются по мѣрѣ приближенія къ устью долины, гдѣ и выклиниваются совершенно. Постепенное подмываніе утесовъ со стороны озера, благодаря неравномѣрной растресканности скалъ, дѣйствовало между тѣмъ съ особеннымъ успѣхомъ въ нѣкоторомъ отдаленіи къ западу отъ устья нашей долины, захватывая каждый разъ соответственную часть высотъ ея праваго берега и образуя въ этомъ мѣстѣ новую бухтовидную выемку, которая современемъ, проделавъ настоящую брешь въ отрогѣ, ограничивавшемъ долину, достигла такимъ образомъ дна послѣдней. Благодаря такому размыву, долина эта сообщается нынѣ съ Байкаломъ въ двухъ мѣстахъ: въ одномъ она обращаетъ къ озеру свое устье, какъ это ствойственно каждой нормальной долинѣ, въ



другомъ же, нѣсколько выше устья, сквозь проломъ, образованный размывомъ, она открывается на отвѣсный скалистый склонъ бухты, врѣзавшейся въ область ея дна. Очевидно, что продолжающійся въ такомъ направленіи захватъ побережья можетъ уничтожить современемъ весь правый берегъ низовьевъ этой долины, дно которой въ этомъ мѣстѣ будетъ изображать собою только террасовидную прибрежную площадь, наклоненную въ сторону бывшаго устья долины. Съ подобнаго рода явленіями, даже въ нѣсколько большихъ размѣрахъ, мы будемъ имѣть случай встрѣчаться еще въ приольхонской части побережья, теперь же прослѣдимъ особенности оставшейся части берега Байкала въ промежуткѣ между Бабушкою и устьемъ р. Бугульдейки.

Скалистый берегъ, непосредственно омываемый водою, продолжается и на слѣдующую, Харгѣйскую губу съ открывающеюся въ неё долиною соименнаго ручья. Это тотъ самый Харгѣй, до котораго Черскій доходилъ сначала по верховьямъ р. Голоустной, а затѣмъ по рч. Морской Колеснѣ и съ которымъ мы ознакомились при описаніи упомянутыхъ маршрутовъ. Со стороны озера и въ низовьяхъ долины этой обнажается сіенито-гранитъ, иногда съ примѣсомъ хлорита; порода и здѣсь является обыкновенно порфировидною и очковою, хотя и болѣе мелкозернистою, нежели въ описанныхъ прежде бухтахъ; куски представителей толщ палеозойскихъ сланцевъ (кварцитъ, известнякъ) можно видѣть лежащими и на устьѣ долины, куда они принесены съ верховьевъ ручья. Насколько можно судить по описанію, въ которомъ впрочемъ Радде не передаетъ названія мѣстности, путешественникъ этотъ (22—23 іюня) долженъ былъ ночевать въ устьѣ именно этого Харгѣя, такъ какъ онъ представляетъ собою единственный въ этой мѣстности «небольшой ручей съ быстрымъ теченіемъ»; онъ находилъ здѣсь обильно растущими: *Ribes*, *Caltha*, *Saxifraga*, *Cortusa Matthioli*, *Rubus saxatilis*, виды осоки (*Carex*) и *Umbelliferae*. Что же

касается Черского, то, кромѣ описаннаго выше изслѣдованія всей этой долины, онъ восходилъ еще на высоты ея лѣваго берега, чтобы ознакомиться съ особенностями обращеннаго къ Байкалу склона Приморскаго хребта. Экскурсія эта показала существованіе здѣсь нѣсколькихъ террасовидныхъ уступовъ, изъ которыхъ первый располагается на высотѣ 108' надъ озеромъ и отличается незначительными размѣрами. На второмъ, болѣе обширномъ уступѣ анероидъ показалъ 231'; терраса эта, хотя точно также поросшая лѣсомъ, какъ и всѣ остальные, интересна въ томъ отношеніи, что изъ-подъ растительнаго слоя на ней выдаются нѣкоторые замѣтно округленные камни мѣстной породы, впрочемъ съ значительно выщерблою поверхностью; нѣсколько сѣвернѣе, на высотѣ 315', найденъ третій уступъ, затѣмъ 77' выше (392' надъ озеромъ) четвертый, а на высотѣ 455' и пятый, на которомъ попадаются большія глыбы сіенито-гранита, хотя и не хорошо обточенные, но настолько все-таки округленные, насколько они бывають иногда и около береговой линіи Байкала, такъ какъ извѣстно, что не всѣ глыбы, подвергающіяся прибою омовъ, отличаются великолѣпно оглаженными поверхностями. Наконецъ высшій, отчасти террасовидный уступъ достигнутъ на высотѣ 802' надъ озеромъ, откуда Черскій возвратился въ палатку, встрѣчая на всемъ этомъ пути все ту-же полевоплатовую породу.

Такія особенности склона горъ въ этомъ мѣстѣ возбуждали желаніе провѣрить ихъ и въ нѣкоторомъ, небольшомъ разстояніи отъ Харгина, чтобы удостовѣриться, насколько устойчивы эти постоянны какъ въ горизонтальномъ, такъ и въ вертикальномъ направленіи, а такъ какъ вслѣдствіе небольшой размѣровъ террасъ, поросшаго ихъ состоянія и значительной высоты ихъ надъ уровнемъ озера, съ поверхности Байкала можно видѣть здѣсь только самыя низкіе уступы, то этому желательнo было произвести другое параллельное восхожденіе на склонъ Приморскаго хребта. Для этой цѣли,

пройдя мимо соседней съ Харгиномъ бухты, сохраняющей вообще тѣ же особенности, какъ и предшествовавшія, столь же скалистой и со слѣдами сферической отдѣльности въ сіенитогранитѣ, Черскій остановился въ слѣдующей за нею, называемой Песчаною (Песчаная 2-я), отстоящей всего лишь около 3 верстъ отъ устья Харгина. Бухточка эта отличается достаточно развитою «каргю» (поясъ прибойнаго матеріала) и потому почти вездѣ легко доступна для высадки; на берегу построено маленькое зимовье очевидно людьми, заготовлявшими сложенные здѣсь дрова для Байкальскихъ пароходовъ; здѣсь же находится и сухая долинка съ устьемъ, открывающимся на высотѣ нѣсколькихъ саженъ (болѣе 30) надъ озеромъ. Терраса эта состоитъ изъ наноса, поросшаго впрочемъ растительностью, изъ-подъ которой замѣтно однако, что, кромѣ полевошпатowychъ породъ, въ составѣ его участвуютъ также куски известняка и кварцита, принесенные очевидно съ болѣе отдаленныхъ высшихъ пунктовъ хребта. Нисшій изъ явственно развитыхъ уступовъ располагается на высотѣ 275', онъ образуетъ собою скалистую террасу, окаймляющую собою бухту и образующую ближайшую часть прибрежья, начиная почти съ устья Харгина, причемъ, по высотѣ своей, она соотвѣтствуетъ здѣсь всего болѣе второму уступу горъ лѣваго берега названной долины (231'), гдѣ именно наблюдались округленные камни. Дальнѣйшее восхождение на склонъ горъ показало, что здѣсь находится эквивалентъ и третьяго уступа Харгина, на которомъ aneroidъ показалъ 328' н. Байк., слѣдовательно, только на 13' болѣе; нашлись затѣмъ слѣды и четвертой террасы, высотой въ 383' надъ озеромъ (на 9' ниже Харгинской), низведенной здѣсь, впрочемъ, на степень террасовиднаго гребня, благодаря долинамъ, ее расчленившимъ; въ видѣ такого же гребневиднаго уступа найдена и еще болѣе высокая терраса, достигающая здѣсь 560' надъ озеромъ, слѣдовательно на 16' выше пятой Харгинской; наконецъ Черскій взомель

уступъ, покрытый розсыпью сіенито-гранита, гдѣ анерондъ показалъ 808' надъ озеромъ, т. е. почти съ точностью ту же цифру, какая получена для высшаго уступа около Харгина (802'). Далѣе начавшійся дождь помѣшалъ восхожденію, давшему все-таки не безынтересные результаты. Очевидно, что террасовидные уступы Приморскаго хребта имѣютъ здѣсь довольно значительное горизонтальное протяженіе и могутъ быть отыскиваемы не взирая на то, что склонъ этотъ изрывается долинами; обстоятельство же это, уже само по себѣ, заставляетъ принимать такіе уступы за результатъ подмывающаго дѣйствія воды, стоявшей здѣсь поэтому поочередно на соотвѣтственно высокихъ уровняхъ. Если же вспомнить высокую террасу лѣваго берега долины р. Култучной (юго-западная оконечность Байкала) съ грядами валуновъ и галекъ, залегающихъ на высотѣ до 928' надъ озеромъ, затѣмъ округленные и оглаженные глыбы по тракту на горѣ Култучной, лежащія на высотѣ 1128', а наконецъ, въ сущности продолженіе той же высокой террасы, сопровождающее почти непрерывно всю длину берега озера отъ с. Култука до истока Ангары и столь отчетливо видимую съ Толстаго мыса, то всѣ эти данныя Черскій считаетъ достаточными для того, чтобы причислить къ озернымъ террасамъ и только что описанный рядъ уступовъ между Харгиномъ и Песчаной 2-ю, даже не придавая особеннаго значенія найденнымъ тамъ округленнымъ валунамъ и глыбамъ, вслѣдствіе недостаточной ихъ характерности.

Въ Песчаной бухтѣ оканчивается нисшая изъ упомянутыхъ выше террасъ, образовавшая собою ближайшую часть прибрежья, начиная почти съ устья Харгина, и замѣняется здѣсь брустверовиднымъ склономъ болѣе высокаго уступа, подступившимъ непосредственно къ озеру. За мысомъ Песчанымъ склонъ этотъ направляется сначала почти прямолинейно, пересекаясь сухою долиною съ устьемъ на высотѣ 20', а затѣмъ представляетъ плоскую бухтовидную выемку

въ родѣ амфитеатра; на сѣверо-восточной оконечности котораго возвышается мысъ Воротъ 2-й. Мысъ этотъ, впервые описанный Черскимъ, образуется невысокимъ, но террасовиднымъ и скалистымъ отрогомъ, весьма похожимъ на знакомый намъ уже мысъ Воротъ 1-й, только съ двумя террасовидными уступами и совершенно отвѣснымъ склономъ къ озеру; въ немъ точно также пробито отверстіе въ видѣ довольно просторныхъ воротъ, основаніе которыхъ, въ противоположность Воротамъ 1-мъ, затоплялось водою Байкала (30-го іюня) настолько по крайней мѣрѣ, что одинъ лишь камень на южной сторонѣ Воротъ выдавался почти на 25 милли. (около 1 вершка) надъ водою, а другой едва показывался ея. Утесъ этотъ состоитъ изъ господствующаго здѣсь сіенито-гранита, лишеннаго только сростковидныхъ образованій, придававшихъ ему прежде видъ финляндскаго гранита.

Обогнувъ Воротъ, путешественникъ вступаетъ въ длинную (до 13 верстъ) но въ общемъ очень плоскую бухтовидную вырѣзку, ограниченную съ сѣверо-востока (вѣрнѣе с.-в. 30°) мысомъ Хюрхюрдъ и раздѣленную второстепенными мысами на нѣсколько (до 6-ти) меньшихъ бухточекъ. Изъ этихъ послѣднихъ всего болѣе интереса представляетъ третья, считая отъ Воротъ, въ которую, кромѣ сухой долинки съ устьемъ на высотѣ около 35' надъ озеромъ, открывается еще глубокая долина, занятая ключемъ, извѣстнымъ подъ названіемъ Хурай-Харгынъ, т. е. сухой (хурай по бурятски) Харгынъ.

Главный интересъ этой бухты собственно геологическій. Изъ всѣхъ предшествовавшихъ изложеній мы знаемъ, что отъ меридіана озера Косогола и р. Оки и до выхода р. Ангара изъ Байкала, господствующимъ направленіемъ (т. е. простираніемъ) складокъ, въ которыя изогнуты пласты древнѣйшихъ полевошпатовыхъ породъ интересующей насъ части земной коры, является простираніе ихъ съ с.-з. на ю.-в., вѣрнѣе съ з.-с.-з. на в.-ю.-в.; затѣмъ отъ истока Ангара до долины Варначей, откуда начинается широкій перерывъ въ развѣ-

этихъ породъ, выполненный отложеніями позднѣйшихъ водъ (палеозейскихъ и юрскихъ), мы видѣли пласты эти съ неправильнымъ простираніемъ; далѣе, съ окрестностей устья р. Голоустной, гдѣ оканчивается упомянутый перерывъ, названный Черскимъ Голоустенскимъ перерывомъ и имѣющій, какъ мы увидимъ ниже, весьма важное значеніе въ исторіи развитія озера Байкала, складки гнейсовой толщи измѣняютъ свое направленіе въ почти меридіональное, т. е. с.-с.-з. и продолжаются въ такомъ видѣ, съ величайшею правильностью, на протяженіи около 25 верстъ, до западныхъ окрестностей Бакланьей бухты, откуда сіенито-гнейсъ принялъ массивное строеніе и перешелъ въ сіенито-гранитъ, сопровождавшій насъ до описываемой нынѣ бухты. Здѣсь же, хотя порода эта и не исчезаетъ, а напротивъ является даже господствующею, продолжаясь до самой глубокой части бухты Хюрхюрд (см. ниже), тѣмъ не менѣе, южнѣе устья Хурай-Харгина, среди нея появляется уже явная слоистость, причемъ порода, въ лицѣ хлоритоваго гнейса, переходящаго даже въ хлоритовый сланецъ отличается уже не с.-с.-з., а сѣверо-восточнымъ простираніемъ пластовъ, т. е. такимъ, какое съ тѣхъ поръ будетъ уже господствующимъ по берегамъ Байкала. Система такого простиранія, т. е. направленія складокъ (с.-в. до в.-с.-в., см. ниже), названа поэтому Черскимъ Байкальскимъ простираніемъ пластовъ, въ противоположность Саянскому, т. е. з.-с.-з., развитому на западѣ отъ меридіана истока Ангары; обѣ-же эти системы направленія древнѣйшихъ складокъ, какъ мы видѣли выше, отдѣляются другъ отъ друга полосою неправильнаго пролеганія или переходною полосою простиранія пластовъ.

Затѣмъ, возвращаясь къ остальной части описываемаго прибрежья, слѣдуетъ сказать, что Хурай-Харгинская бухта граничивается пологимъ и поросшимъ мысомъ, окруженнымъ горю, на которой можно видѣть не мало кусковъ кварцита, а взирая на то, что ближайшія и видимыя части склоновъ

образуются все тѣмъ же сіенито-гранитомъ, иногда краснымъ, иногда же сѣрымъ; большія глыбы полевошпатовой породы выдаются изъ воды и далеко отъ берега, около мыса, указывая на то, что дно озера въ этомъ мѣстѣ не отличается глубиною. Наконецъ, спустя еще два низменныхъ мысовидныхъ выступа, путешественникъ проплываетъ бухточку съ пологими и поросшими склонами горъ и достигаетъ ограничивающаго ее съ с.-в. низменнаго мыса, съ котораго, взглянувъ назадъ, можно видѣть Ворота 2-я на ю.-з. 30°. Это мысъ Хюрхюрд или Хюрхюрё, за которымъ располагается и соименная бухта, образующая самую глубокую часть вырѣзки, лежащей между мысомъ Бабушки и устьемъ Бугульдейки. Около мыса и въ началѣ бухты побережье образуется террасою до 14' высоты и около  $\frac{1}{2}$  версты шириною, послѣ чего около устья долины Хюрхюрд, къ берегу опять подступаетъ склонъ болѣе высокихъ горъ. Горы эти, весьма хорошо обозрѣваемые съ названнаго мыса до самаго устья Бугульдейки, видимо понижаются къ долинѣ послѣдней и, начиная съ лѣваго берега устья Хюрхюрд, являются въ видѣ трехъ плоско округленныхъ вершинъ, начиная съ которыхъ крутой склонъ опускается или почти прямолинейно къ озеру какъ напр. отъ ближайшей къ Хюрхюрд вершины, или представляетъ еще высокій террасовидный уступъ (вторая вершина), или, наконецъ, отдѣляется отъ себя террасовиднымъ отрогъ, какъ напр. образующій правый берегъ устья Бугульдейки. Въ склонахъ этихъ сначала обнажается порфировидный сіенито-гранитъ, но въ кускахъ и валунахъ можно видѣть уже хлоритово-рогообманковый гнейсъ, порфировидный, иногда очковый, отъ крупныхъ (до 20 мил.) сферическихъ скоковъ краснаго ортоклаза, проросшаго мѣстами сѣрымъ полевымъ шпатомъ и заключающаго мелкія скопленія роговой обманки, — однимъ словомъ, это слоистое водоизмѣненіе сіенито-гранита, напоминающаго финляндскій гранитъ. Слѣдуетъ также замѣтить, что, по наблюденіямъ Черсваго <sup>1)</sup>, на

<sup>1)</sup> Черскій, Рукописныя замѣтки о Сибири.

съ мыса Хюрхюро и до устья соименныхъ рѣчекъ, дно бухты образуется утесистою подводною террасою, во многихъ мѣстахъ которой, благодаря прозрачности воды озера, можно отчетливо различать особенности обнаженной тамъ гранитовидной породы, вовсе не покрытой наносомъ. На продолженіи сухой долинки, не доѣзжая рч. Хюрхюрó, какъ равно и около устья послѣдней, дно бухты сразу чернѣетъ, указывая на подводное продолженіе названныхъ долинъ; между тѣмъ склонъ береговыхъ горъ по прежнему продолжается въ видѣ высокаго крутаго бруствера.

Долина рч. Хюрхюрó состоитъ изъ двухъ вѣтвей, разлеченныхъ ближе къ общему ихъ устью низкими зазубренными и узкими отрогомъ болѣе высокихъ горъ, состоящимъ изъ краснаго порфировиднаго сіенито-гранита; таже порода, переходящая отчасти въ неясно слоистый сіенито-гранитъ, образуетъ собою и нисшую часть террасы (до 14' высоты), перерѣзываемой устьемъ рѣчки, покрываясь сверху наносомъ. Правая вѣтвь долины, называемая также Отъ, направляется съ запада на востокъ, тогда какъ лѣвая или собственно Хюрхюрó, слѣдуетъ съ с.-с.-з. на ю.-ю.-в. Уже съ нѣкотораго отдаленія, даже съ самаго мыса Хюрхюрó, внимательное разсматриваніе горъ показываетъ, что на лѣвомъ берегу нисываемой долины высшая часть горы образуется особою, болѣе свѣтлаго цвѣта породою, залегающею на болѣе темной, свитой со стороны Байкала, причемъ плоскость залеганія наклоняется круто въ сторону, противоположную озеру, вообще съ северо западу; съ устья Хюрхюрó условія эти нельзя было видѣть по причинѣ мѣстности ближайшаго склона, за то въ наносѣ находились многочисленные куски кварцита, известняка и даже глинистаго сланца, особенно обильнаго въ выносахъ правой вѣтви. Все это служило прямымъ показаніемъ необходимости экскурсіи для опредѣленія мѣста соприкосновенія болѣе древнихъ (полевошпатовыхъ) породъ съ толщею свѣдѣйшихъ сланцевъ, подступившею здѣсь очевидно весьма



близко къ озеру. И дѣйствительно, восхожденіе по лѣвому берегу ручья Отъ (т. е. правой вѣтви) обнаружило, что не далѣе какъ въ верстѣ отъ Байкала, на высотѣ 624' надъ уровнемъ послѣдняго, сіенито-гранитъ, образующій болѣе низкую, гребневидную оконечность отрога, отдѣляющаго рч. Отъ отъ Хюрхюрѣ, покрывается уже сѣрымъ плотнымъ доломитомъ съ прожилками бѣлаго известковаго шпата. Порода эта прслѣженная Черскимъ до высоты 866' надъ озеромъ, является въ большей части случаевъ въ осыпанномъ состояніи, но въ мѣстахъ, гдѣ она образуетъ небольшіе утесы, не вполне явные слои обнаруживали наклонъ, измѣнявшійся отъ в.-ю.-в. до с.-з. подъ угломъ до 50°. Отсюда видно, что доломитъ переходитъ и на лѣвую вѣтвь, т. е. на самую Хюрхюрѣ и образуетъ собою высшій пунктъ горъ, отдѣляющихъ её отъ озера, со стороны котораго выступаетъ уже сіенито-гранитъ, т. е. та болѣе темная порода, которая наблюдалась уже съ отдаленія. Къ тому же, не взирая на недостаточность слонистости доломита, отсюда-же можно убѣдиться и въ несомнѣнномъ общемъ наклонѣ его толщи къ западу, такъ какъ въ эту сторону видимо наклоняется плоскость покрываемаго имъ сіенито-гранита, который, около озера, достигаетъ уже высоты до 900' надъ его поверхностью. Такимъ образомъ и въ этомъ мѣстѣ мы видимъ, что полоса полевошпатовыхъ породъ, соединяющая современный берегъ Байкала и сѣзизившася здѣсь до 1 версты, играла роль берегового хребта относительно водъ, отлагавшихъ толщу сланцевъ и затоплявшихъ очевидно болѣе низкія части этихъ горъ, вторгаясь въ предѣлы, занимаемые нынѣ долиною озера (см. ниже). Съ продолженіемъ сланцевой толщи отсюда къ сѣверо-западу, мы познакомимся впоследствии, изъ описанія маршрута Черскимъ съ середняго теченія р. Голоустной по системѣ р. Куртунъ до р. Большой Бугульдейки, теперь-же поспѣшимъ къ устью этой рѣки, придерживаясь береговой линіи озера, извилинамъ которой остается проплыть только 9 верстъ.

этотъ протяженіи склонъ горъ пересѣкается только сухими  
ручьями, отрывающимися иногда на наносную террасу,  
возвышающуюся отъ 7 до 23' надъ озеромъ, а мысовидный  
выступъ, въ разстояніи 3 версты отъ Хюрхюрдъ, раздѣляетъ эту  
часть бухты на двѣ главныя вырѣзки. Въ первой изъ нихъ,  
не доѣзжая упомянутого мыса, въ утесѣ и россыпи обнару-  
живается еще сіенито-гранитъ, между тѣмъ какъ во второй  
гнѣисовая порода эта переходитъ уже въ хлоритово-рого-  
обманковый, хлоритовый и хлоритово-сланцевый очковый  
гнейсъ со сростками до 20 мил. въ діаметрѣ и съ паде-  
жми пластовъ на ю.-в. даже на в.-ю.  $30^{\circ}$  и  $22^{\circ}$ , при чемъ  
ниже къ долину Бугульдейки, на гнейсѣ этомъ, со сто-  
ны Байкала, залегаетъ сѣровато и желтовато-бѣлый очень  
мелкозернистый, сахаровидный доломитовый сланецъ, пере-  
рывающійся, какъ мы увидимъ ниже (начиная съ лѣв. берега  
Тыя Бугульдейки), съ полевошпатowymi породами и подчи-  
ненными имъ кристаллическими сланцами; что-же касается  
того что упомянутого мѣстонахожденія этой породы, то  
вероятно, должно быть вслѣдствіе сдвига, она залегаетъ какъ бы  
согласно на гнейсѣ, хотя обнаженія не отличаются здѣсь  
достаточно отчетливостью. Между тѣмъ толща палеозойскихъ  
сланцевъ, подступившая такъ близко къ Байкалу въ предѣ-  
лахъ рч. Хюрхюрдъ, тянется въ такомъ видѣ еще нѣсколько  
верстъ, но начиная съ мыса, разобщающаго обѣ бухты, и съ  
разсѣкающей его долины, въ глубинѣ которой породы эти  
обнажаются даже при взглядѣ съ озера, онѣ довольно быстро  
исчезаютъ къ сѣверу и сѣверо западу, какъ это докажетъ  
нашъ ближайшее ознакомленіе съ долиною Большой Бугуль-  
дейки, къ которой мы и обратимся.

1) Система р. Большой Бугульдейки и описаніе маршру-  
товъ, исходящихъ изъ ея долины.

При общемъ обзорѣ притоковъ Байкала мы говорили  
о томъ, что Большая Бугульдейка (по бурятски: Тыя) достигаетъ

57 верстѣ длины и принадлежитъ поэтому къ числу самыхъ значительныхъ притоковъ сѣверо-западнаго берега озера, лишь немногимъ уступая длинѣ р. Голоустной (86 верстѣ длины, см. выше). Въ противоположность этой послѣдней, она отличается въ общемъ почти прямолинейнымъ и почти меридіональнымъ направленіемъ, причемъ верховья ея располагаются на самомъ водораздѣльной линіи хребта Онотскаго, а вся верхняя частъ (почти половина) теченія пересѣкаетъ собою юго-восточный склонъ тогоже хребта, между тѣмъ какъ большая часть нижняго отрѣзка рѣки образуетъ границу между Приморскимъ хребтомъ и Онотоу; наконецъ низовья этой долины пересѣкаютъ значительно сѣзвившійся здѣсь Приморскій хребетъ и образуютъ въ послѣдствіи дельту, извѣстную подъ названіемъ Бугульдейскаго мыса. Въ настоящемъ параграфѣ нашего изложенія мы приступимъ къ подробному разсмотрѣнію долины этой рѣки и ея притоковъ, подраздѣливъ описаніе это на отдѣльныя части, причемъ, какъ это мы сдѣлали при описаніи системы р. Голоустной, изложимъ здѣсь и результаты тѣхъ путешествій, маршруты которыхъ, исходя изъ долины Бугульдейки, пересѣкали въ извѣстныхъ направленіяхъ Онотскій хребетъ, достигая примыкающей къ нему съ сѣверо-запада плоской возвышенности. А такъ какъ кромѣ академика Георга (1772 г.) изученіемъ системы интересующей насъ рѣки занимался отчасти Чекановскій, отчасти-же Черскій, то этому мы и воспользуемся приведенными уже выше отчетами этихъ путешественниковъ и приложенными къ нимъ картами.

**Маршрутъ Черскаго по низовью В. Бугульдейки и по р. Бугульдейке, первому правому притоку этой рѣки.**

Уже Радде, осматривая устье В. Бугульдейки, замѣчаетъ, что горная рѣчка эта наносила здѣсь столько галекъ, что теченіемъ времени и при содѣйствіи прибойнаго матеріала выбрасываемаго волнами Байкала, наносъ этотъ не только

выполнилъ собою обширную бухту, но и образовалъ еще широкій выступъ, вдающійся нынѣ въ озеро, т. е. Бугульдейскій мысъ <sup>1)</sup>. И дѣйствительно, судя по изслѣдованію Черскимъ отношенію горъ къ низменной части низовьевъ этой рѣки <sup>2)</sup>, оказывается, что въ прежнее время здѣсь могла быть бухта до 2-хъ верстъ въ длину и до 400 сажень ширины, почти съ меридіональнымъ направленіемъ и поперечно усѣченнымъ сѣвернымъ концомъ, сѣверо-западный уголъ котораго пробивается мрачною и сравнительно узкою (около 100 саж.), ущельевидною долиною Бугульдейки. Кромѣ того съ лѣвой, т. е. восточной стороны этой бухтовидной площади, нѣсколько ближе къ озеру, открывается устье довольно длинной и широкой, нынѣ совершенно сухой долины, слѣдующей съ с.-с.-в. на з.-ю.-з. Долина эта играетъ немаловажную роль въ орографіи части побережья, лежащей къ сѣверо-востоку отъ Бугульдейки: она принадлежитъ, какъ мы увидимъ ниже, къ начинающейся здѣсь уже цѣпи продольныхъ долинъ, которыми отдѣляется юго-восточный склонъ Приморскаго хребта къ болѣе низкой и своеобразной прибрежной полосы горъ, упомянутой нами при общемъ обзорѣ мѣстности подъ названіемъ внутрибайкальскихъ горъ. Отсюда же начинается упомянутая выше перемежаемость доломита съ гнейсами, говообманковымъ сланцемъ и т. п., принадлежащая, какъ мы увидимъ впоследствии, верхнему ярусу полевошпатовой (аврентьевской) толщи породъ, слѣдовательно тому же стратиграфическому уровню, какому принадлежитъ такая же перемежаемость по долинѣ р. Иркутъ, причемъ пласты эти на лѣвомъ берегу описываемой бухтовидной площади падаютъ на с.-з. съ наклономъ до 70°, а мѣстами и на ю.-в. Между тѣмъ, по правому берегу, доломитъ тянется довольно длинною полосой, падая вообще на с.-з. или з.-с. 30°, и смѣняется

<sup>1)</sup> Раде, I. с. pag. 253—254.

<sup>2)</sup> Черскій, Рукописныя замѣтки и Отчетъ за 1879 г. I. с.

очковымъ гнейсомъ только ближе къ сѣверной оконечности этой древней бухты. Бугульдейка, сейчасъ же послѣ выхода изъ горъ на обрамленную такимъ образомъ площадь, раздробляется на протоки и, протекая по руслу, заполненному галькою, выходитъ на дельту или наносный мысъ, гдѣ она впадаетъ въ Байкаль двумя рукавами подъ  $52^{\circ}31'$  сѣв. шир. и  $123^{\circ}41'$  вост. долготы, какъ видно изъ опредѣленій астронома Шварца. На площади мыса, по лѣвой сторонѣ устья, располагается довольно значительный зимній бурятскій улусъ, жители котораго проводятъ лѣто въ долинѣ той-же рѣки, но около устья въ нее р. Куртунъ. Такія же пустыя юрты замѣчались и въ одной изъ долинъ, въ ближайшей бухтѣ къ юго-западу отъ устья Бугульдейки. Нѣкоторыя, болѣе влажныя части дельты отличаются хорошою луговою растительностью; здѣсь Радде собиралъ представителей родовъ *Stellaria*, *Primula* и *Gentiana*. Ближе къ сѣверной оконечности площади почва болѣе каменистая и поростаеъ уже лѣсомъ; около склона горъ праваго берега Радде видѣлъ террасу до 8 футовъ высоты, состоящую изъ одной лишь крупной гальки, въ чемъ, однако, по замѣчанію Черскаго, никакъ нельзя заключить о прежнихъ болѣе обширныхъ размѣрахъ Бугульдейки, вѣрзавшейся нынѣ въ этотъ озерно-рѣчной наносъ.

Отсюда Черскій направился вверхъ по долинѣ рѣки, суженной крутыми склонами пересѣкаемаго ею Приморскимъ хребта. Склоны эти, какъ равно и высшіе пункты, не отличаются здѣсь утесистостью, а напротивъ поростають преимущественно хвойнымъ, лиственничнымъ лѣсомъ; около основания лѣваго изъ нихъ можно видѣть наносъ, состоящій изъ осыпей съ ближайшихъ высотъ, падавшихъ очевидно на стоявшую здѣсь прежде воду, и потому отложеніе это состоитъ изъ значительный процентъ совершенно неокругленныхъ камней и глыбъ очковаго гнейса, изъ котораго, судя по россыпямъ, состоятъ сосѣднія горы. Дно долины отличается тѣми-же особенностями флоры и по ея каменистой почвѣ.

пролегаетъ очень дурная дорога, служащая бурятамъ для перевозки вещей во время перекочевки изъ зимняго улуса въ лѣтній и обратно, что, какъ извѣстно, совершается ими на двухъ-колесныхъ телѣгахъ, называемыхъ арбами. Такимъ образомъ проѣзжаютъ верстъ съ 7, гдѣ, въ разстояніи болѣе 10 верстъ отъ Байкала, считая по изгибамъ долины, располагается устье рч. Куртунъ, перваго праваго притока р. Бугульдейки. Къ этому мѣсту долина послѣдней значительно расширяется и принимаетъ луговой характеръ, причемъ пейзажъ, сдѣлавшійся уже гораздо болѣе привѣтливымъ, является еще видимымъ вдали бурятскимъ улусомъ. Терраса лѣваго берега Бугульдейки, какъ равно и склонъ болѣе высокихъ горъ этой стороны, образуются все еще тѣмъ-же членивымъ гнейсомъ, обнаруживающимся здѣсь, впрочемъ, только въ осыпавшихся выступахъ и потому непригодныхъ для опредѣленія положенія пластовъ. Между тѣмъ, на склонѣ горъ праваго берега долины, еще съ версту недоѣзжая устья Куртуна, наблюдается россыпь и куски одного лишь кварцита, смѣнившаго собою очковый гнейсъ и принадлежащаго, какъ мы увидимъ ниже, къ толщѣ палеозойскихъ сланцовъ, соприкасающихся здѣсь съ полевошпатовыми породами, хотя, въ сожалѣнію, густой лѣсъ и вообще растительный покровъ не позволяютъ здѣсь видѣть подробностей соприкосновенія, которыя могутъ быть только предугадываемы, основываясь на весьма хорошихъ разрѣзахъ по теченію Куртуна, изслѣдованному тѣмъ-же путешественникомъ.

Куртунъ есть самый значительный притокъ р. Большой Бугульдейки и достигаетъ 35 верстъ длины, при ширинѣ до 3 сажень. Верховья его располагаются на той же водораздѣльной линіи Онотскаго хребта, на которой беретъ начало знакомые намъ уже правые притоки средняго течения р. Голоустной, въ нѣсколькихъ верстахъ отъ источника рч. Харатъ, принадлежащей сѣверо-западному склону хребта и впадающей въ Муринъ, лѣвый притокъ р. Куды

(см. выше). Верховья эти известны намъ, впрочемъ, только по картѣ Чекановскаго, гдѣ они означены подъ названіемъ Синетуй; отсюда Куртунъ направляется въ общемъ на в.-ю.-в., образуя довольно рѣзко выраженный S-образный изгибъ, который въ верхней части теченія обращенъ къ югу, а въ нижней къ сѣверо-востоку. Почти на половинѣ длины рѣчки въ нее впадаетъ съ правой стороны Хоготъ, долина котораго имѣетъ важное орографическое значеніе потому, что она именно располагается на линіи сѣверо-восточнаго продолженія средняго теченія р. Голоустной, связываясь съ нею черезъ посредство знакомаго намъ Зонгута и отдѣляя собою Онотскій хребетъ отъ Приморскаго. Кромѣ Хогота известны еще только одинъ незначительный правый притокъ, Эксага, впадающій въ  $1\frac{1}{2}$  верстахъ ниже Хогота, тогда какъ съ лѣвой стороны, кромѣ довольно значительнаго притока съ сѣвера и впадающаго выше Хогота, но означеннаго на картѣ Чекановскаго безъ названія, известны еще Шаманка и маленький безымянный притокъ, впадающіе всѣ ниже Хогота. Такъ какъ Черскій (1878 г.) вышелъ въ систему р. Куртуна съ Голоустной, именно съ Зонгута на Хоготъ, съ котораго повернулъ внизъ по теченію Куртуна до его устья, то на этомъ верхняя половина рѣчки осталась до сихъ поръ неисслѣдованной, не взирая даже на удобства сообщенія, такъ какъ именно по ней проложена телѣжная дорога съ упомянутой выше рч. Харатъ. При нижеслѣдующемъ описаніи мы будемъ придерживаться маршрута Черскаго и потому послѣдуемъ за нимъ внизъ по теченію водъ интересующей насъ системы.

Мы говорили уже выше, что горы, ограничивающія озеровидное расширеніе верховьевъ рч. Зонгутъ, переходятъ непосредственно въ высоты, сопровождающія долину рч. Хоготъ, которая беретъ начало въ зонгутскихъ болотахъ и слѣдуетъ с.-с.-в. направленію до самаго устья въ Куртунъ, т. е. на протяженіи около 10 верстъ. Долина эта, въ сущности въ верхней своей части, отличается не ма-

шириною и нерѣдко луговымъ характеромъ; тропа придерживается ея террасовиднаго лѣваго склона, въ которомъ, по временамъ, обнаруживаются куски какъ глинистаго сланца, такъ и связаннаго съ нимъ метаморфическаго песчаника; пласты этихъ породъ, перешедшихъ сюда съ системы р. Голоустной, обнажаются здѣсь въ одномъ мѣстѣ, ниже устья р. Мольки (первый правый притокъ Хогота), и падаютъ на ю.-ю.-в. Столь-же широкою и луговою является и долина р. Куртѹна, какъ въ предѣлахъ устья Хогота, такъ и ниже его, сопровождаясь террасами до 20' высоты. Тропа переходитъ здѣсь на лѣвый берегъ рѣки, гдѣ въ свою очередь можно видѣть глинистый сланецъ, падающій на ю.-в., но нѣсколько ниже, пройдя мельницу, въ обнаженіяхъ юго-же берега наблюдается уже перемежаемость зеленоватого песчаника съ пластами (до 1 саж. толщины), состоящими изъ конгломерата, причемъ отложеніе это развито здѣсь отъ самаго уровня дна долины до видимыхъ высшихъ пунктовъ, слѣдовательно совершенно вытѣснило собою толщу сланцевъ и по своимъ петрографическимъ особенностямъ явилъ тождественно съ знакомыми намъ уже юрскими осадками. Галька конгломерата вообще небольшихъ размѣровъ и состоитъ какъ изъ полевошпатовыхъ породъ, принесенныхъ очевидно съ востока и юго-востока, такъ равно изъ кварцита и глинистаго сланца, что въ свою очередь указываетъ на сравнительно менѣе древній возрастъ этихъ осадковъ. Къ значительнѣе слоистость и вообще состояніе обнаженія не настолькоъ удовлетворительны, чтобы съ точностью изучить положеніе повидимому почти горизонтальныхъ пластовъ. Съ тротуара ниже по рѣкѣ конгломератъ смѣняется опять глинистымъ сланцемъ, появившимся сначала въ видѣ осыпей, а затѣмъ и въ видѣ обнаженія, по которому можно было предѣлать ю.-в. паденіе этой болѣе древней породы. По вѣроятію, судя по такимъ же, но хорошо обнаженнымъ явленіямъ залеганія въ системѣ р. Голоустной и около Бай-



кала, конгломератъ долженъ и здѣсь выполнять собою долину, размытую предварительно въ глинистомъ сланцѣ. Въ двухъ верстахъ ниже мельницы располагается единственный заселенный пунктъ по Куртуну, дер. Куртунская (Тугутуйской вол.), состоящая изъ 15 дворовъ съ 140 жителями, занимающимися какъ хлѣбопашествомъ, такъ отчасти и звѣринымъ промысломъ. Изъ этой деревни въ 1881 г. Агапитовъ <sup>1)</sup> ѣздилъ осматривать древній рисунокъ, сдѣланный красною краскою на одной изъ скалъ по р. Куртуну, но къ сожалѣнію, авторъ не передаетъ никакихъ подробностей о мѣстѣ нахождения этой скалы въ долинѣ названной рѣки, ограничиваясь однимъ лишь описаніемъ явленія, и только по одному изъ его замѣчаній можно полагать, что утесъ этотъ располагается выше деревни, считая по теченію рѣки. По словамъ названнаго изслѣдователя, рисунокъ этотъ сдѣланъ на самой вершинѣ скалы, сажень на 50 отъ русла Куртуна, у самаго входа въ находящуюся тамъ небольшую пещерку. Рисунокъ изображаетъ почти правильный кругъ съ діаметрами въ 24 и 26 сантим., съ окружности котораго, съ лѣвой верхней стороны, опускаются почти радіально четыре черты, не доходящія, впрочемъ, до центра. Рядомъ съ этимъ кругомъ, въ разстояніи 11 сантим. на лѣво отъ него, изображенъ эллипсисъ съ вертикальною длинною осью (16 сантим.), причемъ на лѣвой верхней сторонѣ его окружности вписана параллельная ея линія; наконецъ, вверху надъ этими фигурами, въ разстояніи 12 сантим. надъ эллипсисомъ и 15 сантим. надъ кругомъ, изображены четыре вертикальныя и параллельныя линіи длиною по 15 сантиметровъ. Такъ какъ подобныя изображенія красною краскою встрѣчаются и по р. Ленѣ около Якутска, то поэтѣ Агапитовъ задаетъ вопросъ: нельзя ли приписать и Куртунскій рисунокъ якутамъ, о которыхъ извѣстно, что они прежде жили въ сосѣдствѣ съ бурятами? При обсужденіи этого

<sup>1)</sup> Агапитовъ, Изв. В.-Сиб. Отд. И. Р. Геогр. Общ. Т. XII, № 5, стр. 8.

проса необходимо, однако, имѣть въ виду, что и описанныя нами выше изображенія, открытыя Кропоткинымъ въ системѣ р. Оки, исполнены красною же краскою, и, наконецъ, что качество употребляемой краски зависитъ отъ чисто-мѣстныхъ, не рѣдко даже случайныхъ условій и связано обыкновенно только съ ними, а не съ какими либо племенными особенностями.

Спустя двѣ версты (т. е. ниже Куртунской деревни), тропа проходитъ мимо устья лѣваго притока рѣки, извѣстнаго подъ названіемъ Шаманка. Ключъ этотъ, какъ передавали Черскому, протекаетъ черезъ озерко, называемое Шаманскимъ, воды котораго считаются у бурятъ цѣлебными, вслѣдствіе чего они приносятъ имъ жертвы. Озеро это означено на картѣ Чекановскаго, приче́мъ большая часть длины долины, считая съ верховьевъ, закрашена имъ краскою «шальштейновъ», безъ всякихъ, впрочемъ, оговорокъ въ текстѣ, вслѣдствіе чего, согласно вышензложенному взгляду этого автора на группу его «шальштейновъ», остается неизвѣстнымъ, понималъ ли онъ въ настоящемъ случаѣ юрскіе осадки или же господствующую здѣсь сланцевую толщу. Впрочемъ Черскій въ обнаженіи лѣваго берега устья Шаманской долины видѣлъ глинистый сланецъ съ паденіемъ пластовъ не на ю.-в., какъ выше, а на с.-з., подъ угломъ въ 30°, послѣ чего они вскорѣ перегибаются опять къ юго-востоку, образуя такимъ образомъ складку. Отсюда долина Куртуна нѣсколько суживается, окружаясь высокими лѣсными горами и порослая густымъ лѣсомъ и кустарникомъ, принимаетъ весьма мрачный видъ, усилившійся еще тѣмъ обстоятельствомъ, что Черскій проѣзжалъ ее 21-го мая, когда по берегамъ рѣки и въ нѣкоторыхъ другихъ мѣстахъ лежали еще поляны льда отъ нерастаявшихъ наледей. Желаніе осмотрѣть утесы не позволяло придерживаться не вездѣ даже заштѣной тропы, которая поэтому обыкновенно терялась и проѣздъ совершался жерѣдко по едва проходимой

чащѣ. Главное затрудненіе составляла необходимость бродить черезъ Куртунъ, стѣсняемый довольно высокими ледяными берегами: въ такихъ случаяхъ сначала сводилась въ рѣку одна лишь лошадь, иногда падавшая въ воду съ обломавшагося ледянаго карниза, съ котораго впослѣдствіи садились на лошадь путешественники, повторяя подобную процедуру и при высадкѣ на противоположный берегъ рѣки, только въ обратномъ порядкѣ, такъ какъ сначала высаживался на ледъ всадникъ, а затѣмъ лошадь велась внизъ по теченію до того мѣста, гдѣ берегъ оказывался доступнѣе и нѣсколько свободнѣе отъ льда. Всѣ неудобства такого путешествія вполне оплачиваются, однако, хорошими и поучительными обнаженіями породъ сланцевой толщи, доказавшими несостоятельность господствовавшего въ то время мнѣнія, что известнякъ, развитый въ промежуткѣ между истокомъ Ангарты и Бугульдейкою, будто-бы не перемежается съ глинистыми сланцами, а, напротивъ, только покрывается ими (Чекановскій 1. с.), вслѣдствіе чего известнякъ этотъ считался принадлежащимъ одному возрасту съ развитымъ на плоской возвышенности, а глинистые сланцы относились къ юрскому періоду. Продолжая слѣдовать внизъ по Куртуну, отличающемуся здѣсь юго-восточнымъ направленіемъ, оказывается, что вслѣдъ за упомянутымъ выше юго-восточнымъ наклономъ пластовъ глинистаго сланца, порода эта, на лѣвомъ берегу рѣки, образуетъ значительные пальцевидные изгибы, укладывающіеся въ общемъ въ двѣ небольшія складки, замѣтно опрокинутыя къ сѣверо-западу. Нѣсколько ниже по рѣкѣ наблюдается другая, весьма правильная складка той-же породы, но въ ней, на самой осевой части перегиба, появляется уже и пластъ плотнаго, сѣраго известняка, выступившаго, впрочемъ, лишь незначительнымъ изъ-подъ сланца, какъ это видно въ весьма хорошемъ обнаженіи праваго берега долины. Еще далѣе, пройдя мимо несовсѣмъ удивительныхъ выступовъ глинистаго и слюдяно-глинистаго сланца, а также поросшихъ растительностью склоновъ,

которыми скрывается выступающій далѣе известнякъ, можно видѣть новый изгибъ, въ составѣ котораго участвуютъ уже: прежній, или верхній глинистый сланецъ, залегавшій подъ нимъ известнякъ и выступившій изъ подъ этого послѣдняго нижній пластъ глинистаго и слюдяно-глинистаго сланца; изъ подъ послѣдняго выступаетъ пластъ кварцита, сначала перемежающійся съ глинистымъ сланцемъ, а затѣмъ и съ известнякомъ. Толща такой перемежаемости, занимающей здѣсь нисшій уровень всѣхъ обнаженныхъ по Куртуну пластовъ, образуетъ самую высокую антиклинальную складку, занимающую низовья рѣки; складка отличается очень крутымъ, почти отвѣснымъ пониженіемъ пластовъ юго-восточнаго крыла, вслѣдствіе чего она является какъ бы прижатой къ очковому гнейсу, развитому со стороны Байкала. Породы эти образуютъ собою очень крутой и утесистый лѣвый берегъ рѣки, слѣдующій юго-восточному направленію, отъ котораго, ближе къ устью, отдѣляется узкій гребневидный отрогъ, вытянутый на юго-западъ и какъ бы преграждающій долину. Ближайшій осмотръ показываетъ, однако, что отрогъ этотъ огибается Куртуномъ, образующимъ соотвѣтственную излучину, такъ какъ долина поворачивается здѣсь сначала на ю.-з., а затѣмъ, обогнувъ оконечность понизившагося отрога, направляется на сѣверо-востокъ, гдѣ Куртунъ и сливается съ Бугульдейкою, не образуя уже здѣсь никакого ущелья.

Описанная нами нижняя часть теченія Куртуна, почти отъ устья въ него рч. Шаманки, направляется, какъ сказано выше, на юго-востокъ, вслѣдствіе чего, при почти меридиональномъ теченіи р. Бугульдейки, Куртунъ образуетъ съ нею острый уголъ (въ  $45^{\circ}$ ), обращенный вершиною къ ю.-в. и приближающійся къ Байкалу на разстояніе до 10 верстъ. Если при такихъ условіяхъ принять, совмѣстно съ Чекановскимъ и Черскимъ, что нижняя половина долины Куртуна образуетъ собою границу между Онотскимъ хребтомъ и Приморскимъ, то упомянутый выше треугольный отрогъ падаетъ на

долю Оюта, вѣдряющагося здѣсь въ соотвѣтственное суженіе хребта Приморскаго. Впрочемъ, какъ замѣчаетъ Черскій <sup>1)</sup>, имѣя въ виду во-первыхъ, что горы около Куртунской деревни какъ будто понижаются, замѣтно вывѣсившаяся опять къ низовьямъ Куртуна, а во-вторыхъ, что никто еще не пересѣкалъ этихъ горъ по прямому (сѣверо-восточному) направленію, отъ дер. Куртунской, напр. къ устью р. Кедусы въ Бугульдейку, — вполне вообразимо, что современемъ граница между интересующими насъ хребтами пройдетъ именно по этому, болѣе прямолинейному направленію; въ такомъ случаѣ, разумѣется, какъ низовья Куртуна, такъ и соотвѣтственная часть Бугульдейки выше устья Куртуна должны пересѣчь Приморскій хребетъ, отрѣзывая отъ него и заключенную между ними часть склона. Тѣмъ не менѣе, впредь до будущихъ изслѣдованій въ сказанномъ направленіи, глубокія долины этихъ рѣкъ служатъ лучшими орографическими границами, въ особенности при невозможности основать здѣсь классификаціи на геогностическихъ данныхъ.

Долина Б. Бугульдейки между устьями р.р. Куртуна и Хара-жирги, т. е. до границы между верхнимъ и нижнимъ ея теченіями.

Послѣ мрачныхъ и дикихъ ландшафтовъ какъ низовьевъ Куртуна, такъ и самой Бугульдейки, путешественникъ съ удовольствіемъ встрѣчаетъ часть долины послѣдней, лежащую выше устья поименованнаго ея притока. Широкая (съ версту и болѣе), луговая, мѣстами даже напоминающая нѣкоторыя изъ степныхъ долинъ, она продолжается въ такомъ видѣ вверхъ по теченію на протяженіи почти 11 верстъ, оживляясь сравнительно недурною телѣжною дорогою и разбросанными въ сторонѣ бурятскими улусами, какъ-то: Ухыльтѣ, Сагѣн-турѣкъ, Хара-тѣргынъ, Хухусолъ, считая снѣгу

---

<sup>1)</sup> Черскій, Рукописныя замѣтки о Сибири.

вверхъ. Смѣшанный и хвойный лѣсъ, покрывающій склоны долины, мѣстами расчищенъ и покрытъ только зеленою травой, въ другихъ же мѣстахъ виднѣются довольно живописные утесы, иногда весьма рѣзко выдѣляясь своею бѣлизною, какъ напр. около Сагань-турука. На этомъ протяженіи въ Бугульдейку впадаютъ лишь три незначительныхъ ключа: одинъ съ лѣвой стороны, извѣстный подъ названіемъ Котъ или Хотъ, верстахъ въ 2-хъ выше устья Куртуна; другой съ правой стороны, 6-ю верстами выше перваго, но съ неизвѣстнымъ названіемъ, наконецъ третій, лѣвый же притокъ извѣстенъ у русскихъ подъ именемъ Архирой, подъ которымъ, по инициативѣ Чекановскаго, онъ обозначается и на картахъ, хотя названіе это, по свидѣтельству Черскаго, произошло отъ испорченнаго бурятскаго слова Хурхюрё. Устье этого ключа располагается уже почти въ 11 верстахъ выше Куртуна; долина Бугульдейки, поросшая здѣсь смѣшаннымъ лѣсомъ, нѣсколько суживается, послѣ чего поворачивается на западъ, образуя излучину. По выѣздѣ на весьма живописную луговую полянку, занимающую незначительное расширеніе долины, ландшафтъ принимаетъ уже совершенно другой характеръ. Долина преграждается здѣсь высокимъ отрогомъ, исходящимъ изъ горъ ея праваго берега и слѣдующимъ на востокъ, куда отступаетъ и крутой лѣвый склонъ Бугульдейки, вскорѣ поворачивающій къ сѣверу, навстрѣчу упомянутому отрогу. Около мѣста кажущагося соединенія этихъ скалъ располагается короткое, впрочемъ, ущелье, которымъ Бугульдейка пробиваетъ преградившую ее восточную часть такъ называемаго Кедусинскаго хребта, т. е. отрога, образующаго правый берегъ соименной рѣки—Кедусы, впадающей выше ущелья съ правой стороны. Пересѣкая западную часть упомянутой луговой полянки, тропа переходитъ чрезъ Бугульдейку, на которой здѣсь построена небольшая водяная мельница, и поднимается на крутой, но безлѣсный южный склонъ этой части Кедусинскаго хребта. Съ перевала этого

открывается видъ на небольшой отрѣзокъ долины Бугульдейки, лежащій выше Кедусинскаго ущелья. Отрѣзокъ этотъ достигаетъ всего лишь 4 версты въ длину, но образуетъ значительное (до  $1\frac{1}{2}$  вер.) озеровидное расширеніе, опоясанное съ запада пологимъ склономъ Онотскаго хребта, а съ востока крутыми скатами Приморскаго, нерасчлененнаго здѣсь долинами. Сейчасъ же выше ущелья съ правой стороны въ Бугульдейку впадаетъ рч. Кедуса, съ которою мы ознакомимся ниже, а въ трехъ верстахъ далѣе почти параллельная ей рч. Тұрунга, отдѣленная лишь узкимъ отрогомъ отъ долины слѣдующаго за нею ключа, извѣстнаго подъ названіемъ Алтанъ-хъръ. Террасовидный и скалистый отрогъ лѣваго берега послѣдняго глубоко вдается въ долину Бугульдейки и вмѣстѣ съ крутою и высокою горою Норинъ-Морянъ, принадлежащею уже Приморскому хребту, ограничиваетъ описанное расширеніе съ сѣвера. Почва этого отрѣзка долины Бугульдейки менѣе камениста нежели лежащая ниже Кедусинскаго ущелья и болѣе пригодна къ хлѣбопашеству, хотя пока отрѣзокъ этотъ населенъ одними лишь бурятами. Выше Норинъ-Морянскаго сѣуженія, не достигающаго, впрочемъ, значенія ущелья, дорога поворачиваетъ на сѣверо-востокъ, такъ какъ рѣка отличается здѣсь юго-западнымъ направленіемъ, принятымъ ею начиная съ устья Хара-жергѣ, т. е. пятью верстами выше Алтанъ-хара. Дорога слѣдуетъ здѣсь по террасѣ праваго берега долины, расширяющейся только ближе къ Хара-жергѣ, которая, какъ сказано уже при общемъ обзорѣ рѣкъ, впадающихъ въ Байкалъ, протекаетъ по вѣтви, соединяющей долину Бугульдейки съ приблизившеюся къ ней съ востока Ангою (см. ниже). Устье Хара-жергѣ, отстоящее отъ Байкала въ 34 верстахъ, вмѣстѣ съ устьемъ Куртуна, составляетъ вмѣстѣ съ тѣмъ и конечныя точки, въ предѣлахъ которыхъ долина Бугульдейки отдѣляетъ собою Онотскій хребтъ отъ Приморскаго, расширяющагося здѣсь благодаря

ти меридіональному направленію ниже устья Алтанъ-хара, такъ-что въ промежуткѣ между нимъ и Хара-жергою наибольшая ширина этого хребта достигаетъ уже 25 верстъ, считая по прямому и горизонтальному направленію. На всемъ этомъ протяженіи оба хребта могутъ быть отличаемы уже и по геогностическому ихъ строенію, такъ какъ долина Бугульдейки, ниже устья Хара-жерги и до Куртуна, проложена почти на самой границѣ соприкосновенія двухъ различныхъ системъ породъ, именно, между толщею полевошпатовыхъ породъ, слагающихъ собою Приморскій хребетъ и формаціею сланцевъ, входящихъ въ составъ Онота и прилегающихъ лишь къ подножію Приморскаго, какъ это видно по обнаженіямъ лѣваго берега Бугульдейки. Такимъ образомъ, въ промежуткѣ между устьемъ Куртуна и Кедусинскимъ ущельемъ, на лѣвомъ берегу Бугульдейки, слѣдовательно у подножія Приморскаго хребта, сначала наблюдается россыпь кварцита, а за нимъ известняка, среди котораго, около самой дороги, замѣчаются тонкія прослойки глинистаго сланца, приче́мъ, недоѣзжая улуса Ухылтѣ, въ склонахъ небольшой долинки, можно видѣть, что пласты известняка падаютъ здѣсь на ю.-в. съ наклономъ до  $75^{\circ}$ . Это очевидное сѣверо-восточное продолженіе породъ, участвующихъ въ знакомой намъ уже складкѣ низовьевъ Куртуна, сохраняющихъ здѣсь еще и тоже простираніе; между тѣмъ въ руслѣ и на днѣ долинки лежатъ громадныя глыбы очковаго гнейса, а мѣстами и россыпь его. Нѣсколько далѣе, около того же улуса, вмѣсто гнейса, въ склонѣ Приморскаго хребта обнажается неслоистая въ этомъ мѣстѣ, зеленая порода, очень мелкозернистая и принадлежащая очевидно къ видоизмѣненію хлоритовыхъ сланцевъ, подчиненныхъ гнейсу и переходящихъ въ него, такъ какъ нѣкоторыя части его обнаруживаютъ мѣстами явный гранитовидный составъ, хотя, впрочемъ, породы эти до сихъ поръ не изслѣдованы еще микроскопически. Гнейсъ выщелоченъ также и рѣчкою Котъ, вмѣстѣ съ кусками жиль-



наго кварца. Доломитъ и доломитовый известнякъ образуетъ утесы и на правомъ берегу Бугульдейки, гдѣ около Саганъ-Турѹка образовался обвалъ во время землетрясенія 1861—1862 года, какъ это значитъ на картѣ Чекановскаго, хотя, къ сожалѣнію, въ текстѣ его не сообщается никакихъ подробностей объ этомъ небезынтересномъ явленіи. Придерживаясь и далѣе лѣваго берега Бугульдейки, можно видѣть упомянутую зеленую породу въ видѣ сланца, пласты котораго падаютъ на ю.-в., между тѣмъ какъ доломитъ, ближе къ улусу Хара-тѣргынъ, отличается простираніемъ, параллельнымъ склону Приморскаго хребта и падаетъ съ наклономъ до  $60^{\circ}$  на в.-ю.-в. до в.-с.-в. Между этимъ улусомъ и Хуху-сѣломъ (см. выше), въ обнаженіяхъ Черскій видѣлъ ту же зеленую породу, а въ розсыпяхъ гнейсъ, громадные и неокругленные глыбы котораго до того обильны въ террасѣ около названнаго улуса, что въ нихъ можно предполагать продуктъ разрушенія этой породы въ ея коренномъ мѣсторожденіи на днѣ долины Бугульдейки, хотя на склонахъ горъ здѣсь обнажается кварцитъ съ не вполне яснымъ наклономъ слоевъ на з.-ю.-з. (з.-ю.  $15^{\circ}$ ). Наконецъ, начиная съ южныхъ окрестностей устья рч. Архирей, и до устья Хара-жергѣ, развита перемежаемость глинистаго сланца съ известнякомъ. Перемежаемость эта подробно описана Черскимъ въ его отчетѣ за 1879 г. <sup>1)</sup>, гдѣ онъ имѣлъ въ виду то обстоятельство, что на картѣ Чекановскаго выступы известняка обозначались здѣсь въ видѣ острововидныхъ выходовъ среди глинистаго сланца, а не переслаиванія, которое противурѣчило его воззрѣніямъ на древность этихъ осадковъ. Простираніе пластовъ сланцевой толщи весьма интересно здѣсь въ томъ отношеніи, что оно, согласно съ направлениемъ склона Приморскаго хребта, измѣняется опять въ сѣверо-восточное, какимъ оно было и въ низовьяхъ Куртуна,

---

<sup>1)</sup> Черскій, 1. с. pag. 35—36.

на что мы будемъ имѣть еще случай указать при описаніи долины р. Анги. Что же касается болѣе высокихъ частей склона Приморскаго хребта, то и здѣсь онъ состоитъ изъ толщи полевошпатowychъ породъ, къ которымъ подмѣшивается еще подчиненный имъ кварцитъ (см. долина р. Анги). Изъ кварцита состоитъ также и одинъ изъ болѣе высокихъ пунктовъ, лежащій въ верховьяхъ рч. Архирей и называемый Архирейскою сопкою. Вершина эта, по измѣренію Чекановскаго, возвышается на 2174' надъ Байкаломъ; пласты кварцита простираются здѣсь на в.-с.-в., залегая среди очкового гнейса.

Все верхнее теченіе Бугульдейки проложено уже по юго-восточному склону Онотскаго хребта, такъ какъ Приморскій отклоняется здѣсь уже къ сѣверо-востоку, переходя по лѣвому берегу долины Хара-жергѣ на р. Ангу, о чемъ будетъ сказано съ болѣею подробностью ниже. Поэтому описаніе этой части рѣки мы соединимъ съ маршрутомъ Черскаго, которымъ онъ пересѣкъ Онотскій хребетъ и вышелъ въ долину р. Манзурки, впадающей въ р. Лену, теперь же перейдемъ къ ознакомленію съ упомянутыми выше правыми притоками Бугульдейки, именно: съ Кедусою и Турунгою. Слѣдуя вверхъ по долинамъ этихъ рѣчекъ, Чекаловскій перевалилъ черезъ Онотъ по двумъ направленіямъ и потому, описывая поочередно эти маршруты, считая и путь черезъ верховья Бугульдейки, мы получаемъ три поперечныхъ разрѣза Онотскаго хребта.

Маршрутъ Чекановскаго по долинѣ р. Кедусы и перевалъ черезъ Онотскій хребетъ на рѣчки Цейюрты системы р. Лены и р. Мурины системы Ангара. Ангаро-Ленокій водораздѣлъ.

Рѣка Кедуса представляетъ собою второй по величинѣ правый притокъ Большой Бугульдейки и достигаетъ 22 верстъ въ длину. Верховья ея располагаются въ томъ мѣстѣ Онотскаго хребта, гдѣ онъ образуетъ водораздѣлъ между водами

Байкала, Ангара и Лены, такъ какъ верховья эти отстоятъ всего лишь въ нѣсколькихъ верстахъ отъ источниковъ Куртуна, лежащихъ къ ю.-з. отъ Харата, знакомаго намъ уже притока Мурина, системы р. Куды, слѣдовательно Ангара (къ западу), и еще ближе отъ источниковъ рч. Цекюрты, принадлежащей уже системѣ р. Лены. Отсюда Кедуса направляется на в.-ю.-в. въ общемъ болѣе или менѣе параллельно Куртуну, къ своему устью, лежащему около знакомаго намъ уже ущелья Бугульдейки. Протекая около сѣверной подошвы отрога, называемаго Кедусинскимъ хребтомъ, она, по замѣчанію Чекановскаго, отличается малочисленностью притоковъ. Путь по р. Кедусѣ считается ближайшею дорогою, ведущею съ р. Бугульдейки къ Ользоновской почтовой станціи такъ называемаго якутскаго тракта (см. ниже), который слѣдуя отъ г. Иркутска къ г. Верхоянску на р. Ленѣ, придерживается въ общемъ системы долинъ (Куда, Мурина, Куданца, Манзурка), ограничивающихъ Онокскій хребетъ съ сѣверо-запада и отдѣляющихъ его отъ плоской возвышенности, при чемъ дорога эта, проложенная по лѣвому берегу рѣчки, настолько удобна, что допускаетъ даже телѣжное сообщеніе между Бугульдейкою и названною почтовою станціею. Въ описаніи этого маршрута у Чекановскаго <sup>1)</sup> мы находимъ, къ сожалѣнію, одни лишь геогностическія данныя, не сопровождаемыя орографическими замѣтками объ особенностяхъ касательно Онота въ этомъ мѣстѣ, хотя, судя по передаваемой имъ общей характеристикѣ этого хребта, онъ и здѣсь долженъ отличаться отсутствіемъ выдающихся вершинъ и покрытъ обильной растительностью. На первыхъ двухъ верстахъ пути, считая отъ устья Кедусы, въ обнаженіяхъ Чекановскій видѣлъ только конгломератъ и «шальштейнъ» со скорлуповатою, шаровидною отдѣльностью, — названіе

<sup>1)</sup> Чекановскій, Записки, I. с. pag. 291—292.

<sup>1)</sup> Ibid, стр. 234.

которымъ Черскій обозначаетъ тѣ пласты зеленовато-сѣраго песчаника, съ которыми обыкновенно перемежается юрскій конгломератъ въ горахъ около Байкала, и въ которыхъ дѣйствительно можно видѣть мѣстами сферическую отдѣльность, нѣсколько независающую отъ какого либо сосѣдства съ изверженными породами, чему онъ приводитъ нѣсколько примѣровъ, означивъ ихъ особыми знаками и на геологической картѣ, какъ напр. по низовьямъ р. Иркутъ и по Голоустной. Столь близкимъ нахожденіемъ конгломерата объясняется и тотъ фактъ, что свойственная ему галька наблюдается въ наносѣ, покрывающемъ пласты глинистаго сланца, изъ которыхъ состоитъ восточная оконечность Кедусинскаго хребта, около ущелья Бугульдейки, хотя явленіе это требуетъ еще ближайшаго изслѣдованія склоновъ и террасъ, въ этой части долины рѣки, чтобы рѣшить вопросъ о прежней высотѣ стоянія воды въ долинѣ Бугульдейки (см. ниже). Далѣе, на протяженіи около 14 верстъ, т. е. 16 отъ устья, почти до мѣста, гдѣ соединяются оба верховья Кедусы, встрѣчаются «шальтейнъ и сланцы, среди которыхъ путь въ одномъ только мѣстѣ (приблизительно на 9-й верстѣ отъ устья Кедусы) пересѣкаетъ узкую полосу известняка». Основываясь на приведенномъ выраженіи Чекановскаго, Черскій полагаетъ <sup>1)</sup>, что на сказанномъ протяженіи путешественникъ имѣлъ дѣло очевидно уже не съ юрою, а съ толщею глинистаго сланца и подчиненнаго ему метаморфическаго песчаника, нерѣдко весьма похожаго на зеленовато-сѣрое видоизмѣненіе юрскаго, причемъ маршрутъ этотъ пересѣкаетъ и одинъ изъ перемежающихся съ названными породами пластовъ известняка, хотя на картѣ известнякъ обозначенъ здѣсь Чекановскимъ въ видѣ такого же острововиднаго выхода, какъ и по долинѣ р. Бугульдейки.

На мѣстѣ соединенія обоихъ верховьевъ р. Кедусы рас-

---

<sup>1)</sup> Черскій, Рукописныя замѣтки о Сибири и Отчетъ за 1879 г. loco cit.

полагается зимовье, называемое Ангдодовымъ; здѣсь сланцы смѣняются широкою полосою известняка, образующею водораздѣльную линію Онота и слѣдуютъ далѣе къ сѣверу, по его противоположному склону (см. ниже). По этой известковой почвѣ дорога поднимается вверхъ по правому верховью Кедусы на сѣверо-западъ и, переваливъ черезъ Онотъ, спускается сейчасъ-же въ верховья долины рч. Цекюрты. Высота осталась неопредѣленною, вслѣдствіе упомянутого уже выше (см. система р. Голоустной) поврежденія барометра.

Цекюрта получила свое названіе отъ бурятскаго слова секюръ, что означаетъ время, такъ какъ въ руслѣ этой рѣчки буряты отыскиваютъ кремни для огня, вѣрнѣе роговикъ, попадающійся въ видѣ гнѣздъ и прожилокъ въ известнякѣ. Рѣчка эта, какъ сказано выше, принадлежитъ уже системѣ р. Лены и составляетъ собою верховье неоднократно упоминавшейся уже Куданцы, лѣваго притока Манзурки. Цекюрта придерживается въ общемъ почти меридіональнаго направленія на протяженіи около 25 верстъ, послѣ чего съ нею соединяется болѣе короткая (около 17 вер.) но параллельная ей долина лѣвой или Сухой Цекюрты послѣ чего, спустя еще 10 верстъ въ общемъ сѣвернаго направленія, и принявъ съ лѣвой стороны рч. Зонгутъ широкая долина поворачиваетъ на сѣверо-востокъ подъ названіемъ Куданцы. Чекановскій не описываетъ отношенія другъ къ другу долинъ обѣихъ Цекюртъ, отдѣленныхъ промежуткомъ въ нѣсколько (до 4) верстъ, но на его картѣ промежутокъ между этими рѣчками закрашенъ краскою наносовъ, такъ-что повидимому русла Цекюртъ располагаются по краямъ одной, весьма широкой долины, разобщаясь развѣ незначительнымъ возвышеніемъ почвы. Почти параллельно Цекюртамъ, но въ разстояніи до 20 верстъ къ западу и въ діаметрально противоположномъ направленіи, т. е. съ сѣвера на югъ, направляется верхняя часть долины р. Мүричъ состоящей изъ двухъ верховьевъ: Каменки съ правой сто-

роны и Мольки съ лѣвой, и поворачивающей затѣмъ на юго-западъ, противоположно Куданцѣ, гдѣ Муринь, какъ извѣстно, соединяется съ Кудюю, впадающею въ Анггару. Что же касается промежутка между долиною Цекюртъ и верхнимъ теченіемъ Мурина, то онъ выполняется значительно понизившимся отрогомъ Онота, извѣстнымъ подъ мѣстнымъ названіемъ Поворотъ должно быть потому, что отъ него, какъ сказано выше, поворачиваетъ къ ю.-в.-ду р. Муринь, принимаемая съ лѣвой стороны и рѣчку, называемую Поворотомъ. Впрочемъ, отрогъ этотъ, понизившійся на линіи якутскаго тракта до значенія плоской возвышенности, продолжается далѣе на с.-с.-в. въ видѣ такъ называемаго Березоваго хребта, образующаго водораздѣлъ между Анггарою и Леною, вслѣдствіе чего и Поворотъ разсматривается также какъ южная оконечность того же хребта.

Начиная съ перевала черезъ Онотскій хребетъ, дорога, по которой слѣдовалъ Чекановскій, спускается внизъ по правому берегу Правой Цекюрты, на протяженіи около 10 верстъ пересѣкая все ту же полосу известняка, о которой мы говорили выше, тогда какъ лѣвый берегъ долины въ этомъ мѣстѣ образуется девонскими красноцвѣтными осадками, считавшимися въ то время, предположительно, морскою фаціей юрской буроугольной формаціи и покрывающими собою известнякъ. Къ верховьямъ той же Цекюрты, судя по картѣ Чекановскаго, подступаютъ съ запада и дѣйствительно юрскіе осадки въ видѣ весьма узкаго и выклинивающагося здѣсь угла Иркутскаго бассейна (см. ниже), хотя объ условіяхъ этихъ ничего не сообщается въ текстѣ. Перейдя на лѣвый берегъ рѣчки, дорога пересѣкаетъ наносную почву упомянутаго выше промежутка между обѣими Цекюртами и только за лѣвою или Сухою Цекюртою вступаетъ на почву Поворота или Березоваго хребта, пересѣкая его почти въ западномъ направленіи. Почва эта состоитъ изъ продолженія красноцвѣтнаго девонскаго песчаника, тянущагося и далѣе на сѣверъ, вдоль

названнаго отрога; между тѣмъ дорога, слѣдуя внизъ по правому берегу рѣчки Поворотъ достигаетъ верхняго теченія р. Муринъ. Ширина этой долины около 5 верстъ; дно ея состоитъ изъ известняка, выступившаго изъ подъ девонскихъ породъ Поворота, у основанія котораго, какъ видно на картѣ Чекановскаго, здѣсь вытекаетъ ключъ, не замерзающій зимою; такой же ключъ означенъ имъ и около слиянія обонхъ верховьевъ р. Кедусы. Наконецъ, на правомъ берегу долины Мурина известнякъ скрывается уже подъ юрскимъ песчапикомъ, лежащимъ здѣсь на восточной границѣ распространенія этихъ осадковъ на плоской возвышенности. Относительно положенія пластовъ известняка на протяженіи описаннаго маршрута, Чекановскій могъ судить только на основаніи высоты положенія его выходовъ на водораздѣльной линіи Онотскаго хребта съ одной стороны и въ долинѣ Мурина съ другой, что позволяетъ допускать въ общемъ сѣверный, а всего вѣроятнѣе, сѣверо-западный наклонъ, какъ совпадающій съ такимъ же паденіемъ пластовъ этой породы, опредѣленнымъ по другимъ мѣстамъ того же склона Онота. Что же касается девонскихъ и юрскихъ пластовъ, съ которыми ознакомимся ближе при описаніи сѣверо-западнаго подножія Прибайкальскихъ горъ (якутскій трактъ и т. п.), то они предполагаются здѣсь въ видѣ горизонтальныхъ или почти горизонтальныхъ пластовъ.

Перевалъ черезъ Онотскій хребетъ съ долины рч. Алтанъ-хара, черезъ верховья р. Турунги въ долину р. Ады, системы р. Лены.

Рѣка Алтанъ-хара (харъ), впадающая въ Бугульдейку около знакомаго намъ уже сѣженія этой долины, достигаетъ не болѣе 6 верстъ въ длину, при вообще юго-восточномъ направленіи и снабжена еще болѣе короткимъ лѣвымъ притокомъ. Тропа, по которой направился Чекановскій, ведетъ сначала вверхъ по этому притоку, а затѣмъ по отрогу,

отдѣляющему Алтанъ-харъ отъ Хѣрика, впадающаго въ Бугульдейку выше Хара-жергѣ (см. ниже) и называемаго здѣсь Могойта. Далѣе, въ разстояніи около 10 верстъ отъ Бугульдейки, тропа приближается къ склону лѣваго берега рч. Турунги, которая, какъ мы уже знаемъ, впадаетъ по со-  
сѣдству съ Алтанъ-харомъ. Турунга нѣсколько короче Кедусы, достигая только около 20 верстъ, но протекаетъ въ общемъ параллельно ей и беретъ начало всего лишь въ нѣ-  
сколькихъ верстахъ (около 5) сѣверо-восточнѣе лѣваго вер-  
ховья Кедусы, на той же водораздѣльной линіи Оюта. На  
всемъ этомъ протяженіи до гребня хребта Чекановскій встрѣ-  
чалъ только «шальштейнъ и глинистые сланцы», но по всей  
вѣроятности въ весьма неудовлетворительныхъ выступахъ,  
такъ какъ имъ не опредѣляется здѣсь положеніе пластовъ  
этихъ породъ. Пересѣкая лѣвые притоки верховьевъ Турунги,  
тропа достигла наконецъ водораздѣльной линіи хребта, вмѣстѣ  
съ которою появился и известнякъ, какъ продолженіе той  
его полосы, съ которою мы ознакомились между источниками  
Кедусы и Цекюрты. Въ нѣсколькихъ верстахъ отсюда, къ  
сѣверо-западу, располагаются верховья рч. Ады, отдѣленной  
лишь узкимъ (5—8 верстъ) отрогомъ отъ правой Цекюрты.  
Долина эта направляется сначала почти параллельно Цекюр-  
тѣ, на сѣверъ, а затѣмъ на с.-с.-в., къ мѣсту сліянія ея съ  
Малою Манзуркою, въ которую она открывается съ лѣ-  
вой стороны: длина этой долины достигаетъ 35 верстъ; тропа  
переходитъ на ея лѣвый берегъ, не покидая его до самаго  
устья. Изъ свѣдѣній, передаваемыхъ Чекановскимъ объ этой  
части маршрута <sup>1)</sup>, оказывается, что въ верхней части длины  
долина Ады является безводною; русло ея здѣсь исчезаетъ; его  
мѣсто занимаютъ болѣе или менѣе удлинненные желобки,  
имѣющіе ту общую черту, что непримѣтны около верхняго  
конца, они углубляются къ нижнему, гдѣ и оканчиваются

<sup>1)</sup> Чекановскій, I. с. pag. 319.



въ болѣе или менѣе воронкообразныхъ углубленіяхъ почвы; что же касается этихъ послѣднихъ, то они достигаютъ въ крайнихъ случаяхъ около 3 саженой въ діаметрѣ и  $1\frac{1}{2}$  саж. глубины. По этимъ желобкамъ стекаютъ весеннія воды, скрываясь затѣмъ подъ поверхность известковой почвы долины, такъ какъ она до самаго устья, проложена въ полосѣ известняка, встрѣченнаго на перевалѣ черезъ Оноть. Широкая долина Ады окружается пологими и преимущественно окруженными горами, которыя, какъ замѣчаетъ Чекановскій, повышаются по мѣрѣ приближенія къ устью, вмѣстѣ съ тѣмъ и дно долины дѣлается болотистымъ. Изъ притоковъ Ады извѣстны: съ лѣвой стороны въ разстояніи около 18 верстъ отъ верховьевъ долина Бойца, съ расположенною въ ея верховьяхъ пещерою, извѣстною лишь по картѣ Чекановскаго, а съ правой стороны, въ 22 верстахъ отъ верховьевъ, въ Аду впадаетъ Мухòръ-Адà, изображаемая на картахъ въ видѣ рѣчки до 10 верстъ длины, причемъ, начиная съ ея устья, и сама Адà обозначена уже не въ видѣ сухой долины, а съ водяною струею. Кромѣ того въ 8 верстахъ отъ верховьевъ Ады, съ ея правой стороны, изображена долина съ ключемъ, не замерзающимъ зимою. Что же касается продолженія этого разрѣза до плоской возвышенности, то онъ будетъ описанъ вмѣстѣ съ нижеслѣдующимъ маршрутомъ, такъ какъ путь этотъ слѣдуетъ внизъ по долинѣ Малой Манзурки въ которую впадаетъ Адà.

Верхняя часть теченія р. Бугульдейки и перевалъ черезъ Онотинъ хребетъ съ верховьевъ этой рѣки на р. Малую Манзурку (Углю по Обручеву).

Намъ остается еще рассмотреть верхнюю часть теченія р. Большой Бугульдейки, начиная съ устья рч. Хара-жерги, и маршруты Чекановскаго и Черскаго, которыми, слѣдуя вверхъ по этой части долины, они пересѣка-

здѣсь Онотскій хребетъ и спустились на плоскую возвышенность по р. Малой Манзуркѣ къ Хоготской почтовой станціи на якутскомъ трактѣ; маршрутъ этотъ, замѣтимъ, совершенъ, или по проложенной здѣсь весьма удобной, телѣжной дорогѣ ведущей изъ Хоготской станціи къ Ольхонской степной думѣ, лежащей недалеко отъ Ольхонскихъ воротъ (см. ниже). Изъ свѣдѣній, переданныхъ выше, мы знаемъ уже, что длина описываемой части рѣки достигаетъ не болѣе 25 верстъ и что въ общемъ ея теченіе отличается меридіональнымъ направлениемъ, которому она измѣняетъ только въ трехъ небольшихъ изгибахъ, образуемыхъ долиною въ нижней половинѣ этого отрѣзка. На этомъ протяженіи, какъ и по всей своей длинѣ до устья въ Байкалъ, Бугульдейка сохраняетъ и ту свойственную ей особенность, что самые большіе притоки ея впадаютъ только съ правой стороны. Такимъ образомъ, въ разстояніи около 5 верстъ выше Хара-жерги съ названной стороны впадаетъ рч. Харики длиной до 7 верстъ; верховья его, подъ названіемъ Могойта, лежатъ вблизи долины Алтанъ-хара, какъ объ этомъ упоминалось при описаніи маршрута Чекановскаго на Цекюрту. Затѣмъ, въ 5 верстахъ выше устья Харики, въ Бугульдейку впадаетъ рч. Бѣлѣта, длиной верстъ въ 15 и слѣдующая почти восточному направленію; верховья Бѣлеты, судя по картѣ Чекановскаго, располагаются въ промежуткѣ между источниками Түрунги и той правой долинки верхняго теченія Адъ, въ которой находится упомянутый выше источникъ, незамерзающій зимою, тогда какъ источники довольно значительнаго лѣваго притока Бѣлеты лежатъ вблизи верховьевъ Мухоръ-Адъ, слѣдовательно на продолженіи все той-же недораздѣльной линіи Онотскаго хребта, которая, начиная съ меридіана верховьевъ Ушавовки, вытягивается почти прямолинейно къ сѣверо-востоку, достигая въ такомъ видѣ и истоковъ самой Бугульдейки. Выше Бѣлеты имѣются только значительные правые притоки рѣки, къ тому-же означенные въ ихъ наименованіи, и только названія рѣчекъ: Курга,

Огүль и Бѣхина, упоминаемыя въ текстѣ Чекановскаго, быть можетъ, относятся именно къ этимъ притокамъ. Переходя затѣмъ къ лѣвой сторонѣ Бугульдейки, замѣтимъ во-первыхъ, что долина Хара-жергѣ имѣетъ настолько важное значеніе какъ въ орографическомъ, такъ и въ геологическомъ отношеніи, что ея описанію мы посвятимъ отдѣльный параграфъ, въ которомъ изложимъ и общій взглядъ на возможную исторію развитія долины Бугульдейки, въ связи съ наблюдавшимися въ ней наносными отложеніями. Въ низовья долины той-же Хара-жергѣ, но нѣсколько сѣвернѣе устья послѣдней, открывается и рч. Гоморьянъ, вытекающая изъ горъ сѣвернаго берега этой долины, а еще выше извѣстны рѣчки: Бильгитүй, Болд-жергѣ, Алтанъ-хәръ (лѣвый) и Холошей, составляющія въ сущности лишь незначительные ручейки. На протяженіи первыхъ 10—12 верстъ, въ особенности въ южной части, долина Бугульдейки достигаетъ значительной ширины, отличаясь и луговымъ характеромъ; на террасовидномъ возвышеніи ея лѣваго берега, почти наспротивъ устья Харики, на высотѣ 698' надъ Байкаломъ (Черскій), располагается село, Косая степь, единственное русское поселеніе въ предѣлахъ этой рѣки, если не считать деревни Куртунской, лежащей на соименномъ правомъ притоцѣ (см. выше). Косая степь, иначе Косостепское село, состоитъ изъ 65 дворовъ, имѣетъ 75 жилыхъ строеній и церковь. Жителей въ селѣ 376 об. п. (187 м. п.); всѣ они занимаются земледѣліемъ, а отчасти и звѣриннымъ промысломъ, какъ въ Онотскомъ, такъ и въ Приморскомъ хребтахъ, углубляясь въ послѣдній до окрестностей Малаго моря. Земли у нихъ въ непосредственномъ пользованіи: подъ усадьбами и выпускомъ 58 дес., подъ пашнею 115 дес., а душевыхъ покосныхъ паевъ 106; скота крестьяне держатъ: лошадей 116 (72 рабочихъ), крупнаго рогатаго скота 297; мелкаго скота: телятъ 115, овецъ 187. Село принадлежитъ къ Манзурской

волости Верхоленскаго окр. <sup>1)</sup>). Нѣсколько выше по теченію долина принимаетъ видъ болотистаго луга, воды котораго, по замѣчанію Чекановскаго, нѣсколько желѣзисты, мѣстами же почва принимаетъ и солончаковыя свойства; а недоѣзжая устья рч. Боло-жергі, а по Чекановскому и Кúргі, долина суживается отрогомъ горъ праваго берега и образуетъ небольшое ущелье. Отрогъ этотъ, какъ объясняли Черскому, носитъ названіе Саргутскаго; онъ принадлежитъ къ террасовидному типу, возвышается повидимому не болѣе какъ на 100' надъ долиною и покрытъ наносною почвою съ галькою (см. ниже). Далѣе, желобоидная и окаймленная пологими горами долина рѣки постепенно подымается къ водораздѣльной линіи Онота, гдѣ на высотѣ 1085' надъ Байкаломъ, представляетъ обширное озеровидное расширеніе, выполненное наносною почвою и въ большей части поросшее лѣсомъ, также какъ и отступившіе склоны вышнихъ точекъ хребта. Почти горизонтальная площадь дна этого расширенія и его длина, увеличивающаяся еще переходомъ его въ террасу праваго берега рѣки, должно быть послужила поводомъ къ названію этой мѣстности Долгою степью, подъ которымъ она и извѣстна у мѣстныхъ жителей. Въ южной части Долгой степи, врѣзавшись въ выполняющее ее наносное отложеніе, располагается источникъ Большой Бугульдейки, не подвергшійся, впрочемъ, до сихъ поръ ближайшему изслѣдованію.

Относительно геогностическаго строенія юго-восточнаго склона Онотскаго хребта, пересѣкаемаго этою частью Бугульдейки, слѣдуетъ замѣтить во-первыхъ, что въ промежуткѣ между устьями Хара-жерги и Гоморьяна, со-сторонны послѣдней изъ названныхъ рѣчекъ, Черскимъ описана перемежаемость известняка съ кварцитомъ и глинистымъ сланцемъ, падающая круто на в.-ю.-в. <sup>2)</sup>), а выше по те-

<sup>1)</sup> См. Матер. по изсл. землепользов. и хоз. быта нас. Иркутской г. Т. II, вып. 6-й 1892 стр. 2—7.

<sup>2)</sup> Черскій, Отчетъ за 1879 г. I. с. pag. 36.

ченію Бугульдейки развиты глинистый сланецъ и метаморфическій песчаникъ, совмѣстно съ которыми, около села Косостепскаго, Чекановскій наблюдалъ «шальштейновые конгломераты», считаемые Черскимъ юрскими; къ сожалѣнію Чекановскій описываетъ эту породу вмѣстѣ съ обнаженными тамъ же глинистыми сланцами и потому нельзя еще окончательно рѣшить вопроса: къ которой изъ нихъ относится определенное имъ въ этомъ мѣстѣ крутое паденіе на с.-з.? Породы эти (съ конгломератомъ или безъ него?) могутъ быть прослѣжены вверхъ по склону до верховьевъ пѣди Широкой, открывающейся въ долину Гоморьяна съ правой стороны; изъ глинистыхъ сланцевъ-же состоитъ и такъ называемая Гоморьянская сопка, т. е. высшій пунктъ въ системѣ соименной рѣчки, достигающій по Чекановскому 1748' надъ Байкаломъ, а также лежащая далѣе къ сѣверу Билгитуйская сопка (1597' н. Байк.), но простираніе пластовъ изъ сѣверо-восточнаго перешло здѣсь уже въ меридіональное (с.-ю.), къ чему мы возвратимся еще ниже, говоря о среднемъ теченіи р. Ангй. Въ остальной части верхняго отрѣзка Бугульдейки, хотя поросшіе растительностью склоны и не способствуютъ изученію подробностей ихъ строенія, но судя по осыпямъ и кускамъ, выдающимся изъ подъ растительнаго покрова, здѣсь должна господствовать также толща сланцевъ. отъ будущихъ детальныхъ изслѣдованій долины слѣдуетъ ожидать только указаній относительно подробностей положенія пластовъ и о томъ, примѣшиваются-ли здѣсь къ глинистому сланцу еще кварциты или известнякъ и, наконецъ, съ какимъ уровнемъ сланцевъ имѣемъ мы здѣсь дѣло: съ лежащимъ на поверхности известняка или-же подъ нимъ (сравни такіе-же отнесенія по рч. Нижней, Голоустной и Куртуну).

Но возвратимся къ перевалу черезъ Онотскій хребетъ. Проѣзжая вдоль Долгой степи къ сѣверу оказывается, что она не представляетъ собою котловинно замкнутую съ трехъ сторонъ, какъ это обыкновенно бывае

въ верховьяхъ горныхъ рѣкъ, а напротивъ, расширеніе это является настолько-же открытымъ и къ сѣверу, насколько оно свободно къ югу; по такой-же наносной почвѣ путешественникъ спускается здѣсь прямо въ долину праваго верховья рч. Малой Манзурки.

Широкая долина этой рѣчки, по выраженію Чекановскаго, представляетъ собою одно обширное болото, которое далѣе превращается мѣстами въ такъ называемую трясины; подобно другимъ долинамъ, берущимъ начало въ Онотскомъ хребтѣ, она покрыта густою травою и ерникомъ (*Betula nana*); проѣзжая здѣсь въ маѣ (12-го числа) 1880 года, по болѣе сухимъ мѣстамъ Черскій видѣлъ во множествѣ цвѣтущимъ желтый пострѣлъ (*Aconitum barbatum* Patr), тогда какъ вмѣстѣ съ переваломъ на склонѣ къ Бугульдейкѣ, пострѣлъ этотъ почти мгновенно смѣнился и вытѣснился синимъ (*Aconitum Lycostopium* L.) столь же обильнымъ недѣлимыми. Верстахъ въ двухъ ниже спуска на Манзурку, на ея правомъ берегу, располагается Унгуринская станція Ольхонской дороги, а около 6-ти верстъ далѣе съ Манзуркою соединяется съ лѣвой стороны р. Адѣ, съ которою мы ознакомились раньше, причемъ сейчасъ-же ниже на низовья той-же долины Ады выходитъ еще ручеекъ, называемый Хурай-Адѣ, тогда какъ съ правой стороны, нѣсколько выше соединенія Манзурки съ Адою, въ долину первой изъ названныхъ рѣчекъ открывается довольно широкая и болотистая Устинова падь. До этого мѣста склоны долины обнаруживаютъ продолженіе все той-же сланцевой толщи, при чемъ, ближе къ Устиновой пади, можно видѣть, какъ сланцы сѣраго, сѣрозеленаго, бураго и шоколаднаго цвѣта перемежаются съ прослойками песчаниковыми и кварцитовидными красноватаго цвѣта и сейчасъ-же покрываются слоемъ краснаго песчаника со слюдою, похожаго на Мотскій въ низовьяхъ Иркутѣ, а на этомъ песчаникѣ залежать уже толща известняка. Всѣ эти пласты падаютъ вполнѣ согласно на с.-з.; подробности о недоразумѣніяхъ относительно

одновременности ихъ отложенія изложены въ приведенномъ уже отчетѣ Черскаго за 1879 г. <sup>1)</sup> Появившійся здѣсь известнякъ представляетъ собою непосредственное продолженіе той его толщи, которую мы пересѣкали уже въ верховьяхъ Кедусы и Цекюрты, а затѣмъ Турунги и Ады, спускаясь внизъ по теченію которой какъ равно и Цекюрты, порода эта достигаетъ Устиновой пади съ одной стороны, а рѣки Куданцы и якутскаго тракта съ другой, такъ какъ она не покидаетъ путешественника до самой Хоготской станціи, гдѣ сѣмляется наносами. Сопоставляя с.-з. паденіе этихъ известняковъ съ ю.-в. паденіемъ таковой же породы на правомъ берегу М. Манзурки и на перевалѣ между этой послѣдней и Куданцою, мы получимъ синклинальную складку, образуемую здѣсь верхне-силурійскими породами <sup>2)</sup>. Изъ известняка состоитъ и оконечность отрога, сопровождающаго лѣвый берегъ Ады, известная подъ названіемъ Плякунъ. Отрогъ этотъ, пересѣкаемый дорогою, перешедшею здѣсь на лѣвый берегъ рѣки, суживаетъ долину и образуетъ небольшое ущелье, черезъ которое пробивается рѣка. Здѣсь-же необходимо замѣтить, что относительно названія рѣки ниже соединенія Манзурки съ Адою, возникаетъ нѣкоторое недоразумѣніе въ имѣющейся литературѣ: Чекановскій называетъ её Адю, рассматривая Малую Манзурку какъ правый притокъ этой рѣки, которая въ такомъ случаѣ т. е. Ада, соединившись съ Куданцою, должна впадать затѣмъ въ Большую Манзурку, изливающуюся въ рѣку Лена. Что-же касается Черскаго, то онъ, со словъ везшаго его пассажира, считаетъ р. Аду лѣвымъ притокомъ Малой Манзурки, которая при такомъ возрѣніи, а не Ада, сливается съ Куданцою, придерживаясь до этого сліянія въ общемъ меридіональномъ направленіи.

<sup>1)</sup> Черскій, loco cit. стр. 37.

<sup>2)</sup> Обручевъ, Горн. Журн. 1890 г., № 12 стр. 432 и профил. Табл. VII.

наго направленія, послѣ чего уже поворачиваетъ къ сѣверо-востоку и впадаетъ въ Большую Манзурку, въ разстояніи болѣе 40 верстъ отъ своихъ верховьевъ, болѣе 10 верстъ ниже устья Куданцы и болѣе 28 верстъ ниже ущелья, образованнаго Плакуномъ. Къ тому же сейчасъ-же ниже ущелья, Манзурка принимаетъ съ правой стороны рч. Унгуру болѣе 20 верстъ длины, притекающую съ востока; съ теченіемъ ея мы ознакомимся впослѣдствіи, при описаніи маршрутовъ съ рѣки Анги, откуда именно Чекановскій перешелъ на названной притокъ. Что-же касается остальной части описываемой дороги, то, переваливъ черезъ нисшую часть Плакуна ниже устья Адъ, она скоро отворачиваетъ къ сѣверо-западу, пересѣкая понизившуюся часть отрога, которымъ отдѣляется Манзурка отъ Куданцы, и на лѣвомъ берегу послѣдней достигаетъ Хоготской станціи, расположенной въ долинѣ названной рѣчки, причемъ слѣдуетъ замѣтить, что лѣвый берегъ этой широкой (до 4 верстъ) долины, въ противоположность правому, образуется уже не известнякомъ, а красноцвѣтными девонскими песчаниками и рухляками, спустившимися сюда по лѣвому берегу Цекюры, съ описанной выше части Березоваго хребта или Поворота.

Мы съ точностью слѣдовали маршруту Черскаго, на основаніи котораго нанесены на его картѣ съ соотвѣтствующими названіями стекающіе съ с.-з. склона Онотскаго хребта притоки р. Манзурки. Однако въ послѣднее время по описанной выше Малой Манзуркѣ прошелъ Обручевъ и этотъ послѣдній путешественникъ добавилъ изложенныя свѣдѣнія своими собственными наблюденіями и нѣсколько измѣнилъ взглядъ на М. Манзурку. Такъ какъ это послѣднее названіе вовсе не извѣстно среди мѣстнаго населенія, а вся рѣка до впаденія ея въ собственно Манзурку (Большая Манзурка по Черскому) называется Унгурой, то Обручевъ и предлагаетъ дать этой рѣкѣ вмѣстѣ съ считавшейся Черскимъ за притокъ рч. Унгурой одно названіе р. Унгуры, что



конечно нѣсколько упростить взглядъ на систему р. Манзурки. Такимъ образомъ р.р. Куданца и Ада будутъ уже притоками Унгуры. Далѣе Обручевъ вводитъ одну довольно существенную поправку въ геологическомъ описаніи Черскаго. Долина Куданцы, на лѣвомъ берегу которой расположена Хоготская станція, заполнена аллювіальными наносами и окаймлена низкими холмистыми возвышенностями, отстоящими на правомъ берегу отъ упомянутой станціи въ разстояніи, втрое больше показаннаго на картѣ Черскаго, и кромѣ того первые холмы этой возвышенности (по Ольхонскому тракту) сложены изъ желтаго песка съ мелкой галькой, относящагося къ древнимъ озернорѣчнымъ наносамъ (постплиоцень), показаннымъ на картахъ Чебановскаго и Черскаго по лѣвому склону долины Куданцы и въ нѣкоторыхъ мѣстахъ долины Унгуры (М. Манзурки по Черскому), между тѣмъ какъ Черскій считаетъ ихъ образованными верхне-силурийскими известняками. Только уже на спускѣ<sup>3)</sup> къ Унгуренскому улусу расположенному на лѣвомъ берегу Унгуры и непоказанному на картѣ Черскаго, въ большой ямѣ, вырытой при ремонтѣ тракта, Обручевъ видѣлъ песчано-глинистый тонкослоистый известнякъ (мергель) темно-сѣраго цвѣта, подѣ которымъ обнажается болѣе плотный, неслоистый сѣро-желтый глинистый известнякъ силурийскаго возраста.

Ольхонскій трактъ у Унгуренскаго улуса поворачиваетъ вверхъ по долинѣ Унгуры, покрытой здѣсь аллювіальными наносами. Холмы лѣваго склона долины состоятъ изъ древнихъ озерно-рѣчныхъ осадковъ, склоны же невысокихъ лѣсистыхъ горъ, окаймляющихъ долину, состоятъ, какъ показываютъ обнаженія праваго берега изъ темно-сѣрой слоистой породы (известняка), съ паденіемъ пластовъ на с.-з. под угломъ 20—60°. Обручеву не удалось осмотрѣть этихъ об-

<sup>1)</sup> Обручевъ, Горн. Журн. 1890 г. № 12, стр. 431 — 432.

<sup>2)</sup> Перевалъ здѣсь достигаетъ 194'—230' надъ уровнемъ Унгуры.

жений, потому-что переправа черезъ р. Унгуру, благодаря высокому стоянію воды въ ней, была совершенно невозможна. Въ 5—6 верстахъ отъ улуса трактъ пересѣкаетъ небольшой лѣсистый мысъ, вдающійся въ долину. По большимъ глыбамъ и валунамъ, торчащимъ изъ подъ мховъ, Обручевъ заключаетъ, что и здѣсь развита плотная известковая порода темно-сѣраго цвѣта, которая продолжается до самаго устья р. Ады. Отсюда трактъ направляется уже къ извѣстной намъ Унгу-ренской станціи, расположенной слѣдовательно, по мнѣнію Обручева, не на М. Манзуркѣ а на Правой Адѣ.

Въ настоящемъ изложеніи мы все-таки отдали преимущество обозначеніямъ Черскаго, потому-что таковыя приняты на картѣ «Южной пограничной полосы Азіатской Россіи», нисколько не умаляя основательности въ поправкѣ Обручева, которая, строго говоря, касается лишь номенклатуры.

Д) Берегъ Байкала отъ устья р. Большой Бугульдейки до впаденія р. Анги.

Отъ устья р. Большой Бугульдейки до впаденія въ Байкалъ р. Ангѣ считается около 45 верстъ, даже слѣдуя возможно прямымъ путемъ по озеру. Береговая линія между двумя названными пунктами въ общемъ слѣдуетъ уже сѣверо-восточному направленію, а не с.-с.-в.-му, какъ прежде, и этимъ образуетъ достаточно рѣзкій переходъ отъ оканчивающейся здѣсь юго-западной части озера къ началу средней части Байкала, охарактеризованной уже нами при общемъ обзорѣніи этого бассейна. Въ ближайшихъ восточныхъ окрестностяхъ устья Большой Бугульдейки (мысъ Голый, см. ниже) располагается и самое узкое мѣсто Байкала (до 20 верстъ), сжатого здѣсь съ юго-востока оконечностью громадной дельты р. Селенги, причемъ и береговая линія по направленію къ Ангѣ въ общемъ является выпуклою къ югу, а наибольшая глубина на этомъ рубежѣ ниспадаетъ до 1470',

какъ видно изъ произведенныхъ лейтенантомъ Коновымъ промѣровъ (см. выше стр. 34). Обогнувъ Бугульдейскій мысъ т. е. описанную выше дельту Большой Бугульдейки, путешественникъ вступаетъ въ лежащую за нимъ бухту, которая достигаетъ около 9 верстъ въ длину, измѣряя ее по хордѣ и ограничивается съ востока Голымъ мысомъ. Начиная съ мѣста, гдѣ оканчивается наносное отложеніе низменной дельты, скалистый и крутой берегъ озера почти непосредственно омывается водою и -потому настолько недоступенъ, что лодка Черскаго, захваченная быстро развившимся волненіемъ съ ю.-з., едва спаслась здѣсь около устья небольшой сухой долинки въ разстояніи около 3-хъ верстъ отъ устья Бугульдейки, гдѣ только и нашлась удовлетворительная пристань (2-го іюля 1879 г.). Высота ближайшихъ горъ оказалась не превосходящею 775' надъ поверхностью Байкала: это былъ параллельный озеру отрогъ, образующій лѣвый берегъ упомянутой выше сухой долины, которая открывается въ низовья Бугульдейки съ лѣвой стороны, передъ выходомъ рѣки на площадь ея дельты. Съ высоты названнаго отрога открывается весьма живописный видъ на эту вымершую долину, на выходъ Б. Бугульдейки изъ горъ и на измѣняющееся здѣсь отношеніе Приморскаго хребта къ береговой линіи Байкала. Хребетъ этотъ сохраняетъ здѣсь почти сѣверо-восточное направленіе, отдѣляясь отъ озера названною долиною, тогда какъ береговая линія поворачиваетъ сначала почти на в.-с.-в. и этимъ, такъ сказать, отводитъ мѣсто начинающейся отсюда полосѣ болѣе низкихъ горъ, особенная наружность которыхъ бросалась уже въ глаза академику Георги и будетъ разсмотрѣна нами ниже. Эта та полоса, которая упоминалась Чекановскимъ подъ названіемъ «прибрежья»; Черскій-же описывалъ ее какъ «прибрежно-ольхонскую», включая въ категорію «внутрибайкальскихъ горъ». Широкая, плоская и съ весьма измѣненною конфигураціею склоновъ, эта древняя долина проложена вдоль простиранія бѣлѣющихъ на ея днѣхъ вы-

довъ кристаллическаго известняка и начинается собою рядъ продольныхъ долинъ, которыми прибрежная полоса горъ отдѣляется отъ юго-восточнаго склона хребта Приморскаго. Начиная съ устья Б. Бугульдейки, до острова Ольхона исключительно, береговое плаваніе, совмѣстно съ экскурсіями внутрь страны, будетъ знакомить насъ съ этою полосою и отношеніемъ ея какъ къ Приморскому хребту, такъ, впоследствии, и къ названному острову.

Перемежаемость вообще нетолстыхъ пластовъ различныхъ видоизмѣненій гнейса, роговообманковаго, даже хлоритоваго сланца съ кристаллическимъ известнякомъ, характеризующая строеніе интересующей насъ полосы прибрежныхъ горъ, сопровождаетъ путешественника и на пути отъ устья Больш. Бугульдейки къ Голому мысу, причемъ преобладающимъ наклономъ пластовъ оказывается юго-восточный или ю.-ю.-в. до  $75^{\circ}$ , хотя въ двухъ мѣстахъ наблюдается также и неправильная изогнутость этихъ слоевъ съ измѣненнымъ паденіемъ (ю., ю.-в., в. до в.-с.-с.). Склонъ горъ къ озеру обыкновенно очень крутой, нерѣдко отвѣсный; карга (полоса пробойнаго матеріала) или очень узкая или вовсе отсутствуетъ, замѣняясь мѣстами лишь упавшими съ утесовъ неокругленными еще глыбами. Верстахъ въ 6-ти отъ Большой въ бухту эту впадаетъ Малая Бугульдейка, по-бурятски Хдѣя; долина этой рѣчки достигаетъ болѣе 12 верстъ длины, изъ которыхъ болѣе 10 падаютъ на ея верхнюю часть, слѣдующую юго-западному направленію и расположенную почти на продолженіи описаннаго выше высохшаго лѣваго притока низовья Большой Бугульдейки (см. ниже), тогда какъ нижняя часть, до 2-хъ верстъ длины, поворачивается на ю.-в., къ Байкалу, такъ-что все теченіе ея не выходитъ за предѣлы прибрежной полосы горъ и не касается хребта Приморскаго.

На правомъ берегу устья, среди гнейса, наблюдается небольшой выходъ кристаллическаго известняка, а на лѣвомъ берегу обнажается одинъ лишь роговообманковый гнейсъ съ паде-

ніемъ пластовъ, измѣняющимся отъ юга къ ю.-ю.-в. и съ наклономъ болѣе 60°. Гнейсъ этотъ продолжается и далѣе въ видѣ утесовъ, непосредственно омываемыхъ водою, въ мѣстахъ-же, гдѣ карга болѣе развита, въ образующихъ еѣ галькахъ появляется не мало кварцита, хотя порода эта не встрѣчается вблизи на сушѣ. Ближе къ концу бухты склонъ дѣлается нѣсколько положе; побережье опоясывается террасою изъ песчанаго озернаго наноса до 20' высоты, изъ подъ котораго выступаетъ мѣстами довольно рыхлый песчаникъ, впрочемъ въ неясныхъ обнаженіяхъ; Черскій считаетъ правдоподобнымъ разсматривать песчаникъ этотъ какъ остатокъ третичныхъ осадковъ, съ которыми мы ознакомимся на противоположномъ берегу озера. Наконецъ, Голый мысъ, не смотря на небольшіе разсѣянные на немъ утесы, отличается уже совершенно пологимъ склономъ и неизменною оконечностью, на которой располагается зимній бурятскій улусъ, къ коему, должно быть, относится замѣчаніе Радде, что жители этихъ юртъ дѣлаютъ даже опыты хлѣбопашества, занимаясь имъ, впрочемъ, на противоположномъ склонѣ горъ. По особенностямъ своей верхней поверхности Голый мысъ относится къ террасовиднымъ; въ розсыпи на немъ, наблюдается роговообманковый сланецъ, переходящій въ гнейсъ (роговообманковый), а въ неясныхъ и сдвинутыхъ выступахъ обнажается мелкокристаллическій известнякъ, мѣстами до того обильный зернышками черной роговой обманки и кварца, что его можно бы назвать известково-роговообманковымъ гнейсомъ, въ которомъ полевой шпатъ замѣщается известковымъ; кромѣ того, въ породѣ наблюдаются и блестки графита, а кварцъ въ смѣси съ роговою обманкою образуетъ мѣстами и тонкіе прослойки. Переменяемость такого известняка съ полевошпатовыми породами развита и далѣе за Голымъ мысомъ, между нимъ и ближайшимъ, извѣстнымъ подъ названіемъ Хатай, причемъ пласты здѣсь весьма извилисты и паденіе переходитъ мѣстами отъ ю.-з. въ з.-ю.-з.; склоны столь же круто опускаются

къ озеру, омывался перѣдко водою; на нихъ можно было бы сдѣлать засѣчку, но легкое волненіе, не перестававшее съ самаго устья Б. Бугульдейки, не позволяло исполнить этого желанія и наконецъ усилилось до того, что Черскій долженъ былъ пристать къ сухой долині, лежащей всего лишь въ 2 или 3 верстахъ за Голымъ мысомъ, т. е. сейчасъ-же за Хатаемъ, гдѣ и провелъ ночь  $\frac{4}{5}$  іюля. На правомъ берегу этой глубокой, но сухой и почти безлѣсной долины, обнажается массивная полевошпатовая порода (повидимому роговообманковый гнейсъ, перешедшій въ діоритъ?), тогда какъ на лѣвомъ, въ неясныхъ выступахъ, наблюдается известнякъ, переходящій въ пироксеновый и перемежающійся съ полевошпатовыми породами, съ паденіемъ, измѣняющимся отъ сѣвера къ с.-с.-в. Отсюда видно, что оконечности какъ отрога, образующаго лѣвый берегъ долины, такъ и слѣдующаго за нимъ, съ сосковидною вершиною, поросшею довольно рѣдкимъ лѣсомъ, принадлежать еще къ болѣе высокимъ, тогда какъ далѣе, на протяженіи болѣе 10 верстъ до лѣваго борега долины Борд-елгѣй (см. ниже), ближайшія къ озеру горы сразу и значительно понижаются, являясь въ видѣ цѣлаго ряда параллельныхъ и террасовидныхъ отроговъ, высотой менѣе 70', и только удлиненный горообразный (см. выше) отрогъ, образующій лѣвый берегъ названной долины, а вмѣстѣ съ тѣмъ и соименный, т. е. Боро-елгѣйскій-мысъ, опять достигаютъ болѣе значительной высоты (около 600' надъ Байкаломъ). Отрогъ этотъ такимъ образомъ ограничиваетъ собою съ востока все это пониженіе прибрежныхъ горъ, которое, при соответственномъ стояніи воды въ Байкалѣ, должно было бы превратиться въ бухту. Ближайшій къ нашей долині мысъ принадлежитъ вышеупомянутому отрогу съ сосковидною вершиною и представляетъ довольно пологую оконечность. Еще болѣе пологою и похожею на Голый является наносная оконечность слѣдующаго мыса, лежащаго уже въ предѣлахъ понизившихся прибрежныхъ горъ, хотя склоны ограничивае-

мой имъ бухты скалисты и нерѣдко совершенно лишены каргѣ; паденіе слоевъ обнаженной въ нихъ той-же перемежаемости древнѣйшихъ породъ измѣняется отъ с.-з. до с.-с.-з.-го.

Слѣдующая бухта носить названіе Мортуйской отъ имени открывающейся въ нее соименной долины, недоѣзжая которой, недалеко отъ ея праваго берега, въ известнякѣ можно видѣть жилы грюнштейна, разорванныя на части, которыя, вслѣдствіе продолжавшагося растяженія известковаго пласта, удалились другъ отъ друга на разстояніе около одного метра; въ сожалѣнію, однако, явленіе это могло быть наблюдаемо здѣсь только съ нѣкоторого отдаленія, такъ какъ вслѣдствіе волненія нельзя было близко подплыть къ этому отвѣсному утесу, непосредственно омываемому водою. Мортуйская долина съ расположеннымъ въ ней бурятскимъ улусомъ тогоже имени, направляется съ с.-з. на ю.-в.; она сухая, почти безлѣсная и не достигаетъ даже 5-ти верстъ въ длину; на ея лѣвомъ берегу вмѣсто нормальнаго для этой мѣстности сѣверо-восточнаго (даже в.-с.-в.) простиранія пластовъ, Черскій наблюдалъ сѣверо-западное и с.-с.-з. съ наклономъ сначала на ю.-з. до  $70^{\circ}$ , а далѣе и на с.-в. Обнажающаеся мѣстами въ этой бухтѣ массивная зеленокаменная порода (діоритъ?) обнаруживаетъ иногда довольно замѣтную слоистость и точно также перемежается съ кристаллическимъ известнякомъ, вслѣдствіе чего Черскій не считалъ себя въ правѣ разсматривать её какъ изверженную, не взирая на то, что въ другихъ мѣстахъ (см. ниже) она описывалась прежде какъ таковая (Чекановскій см. ниже). Изъ щелей нѣкоторыхъ прибрежныхъ утесовъ за Мортуйскою долиною просачивается вода, отлагая на поверхности скалъ осадокъ углекислой извести; около скалъ, непосредственно омываемыхъ водою, ближайшая полоса дна весьма неглубокая и нерѣдко покрывается здѣсь однимъ лишь песчанымъ наносомъ безъ малѣйшаго слѣда валуновъ, галекъ или каменныхъ глыбъ на поверхности этого отложенія: очевидно мы имѣемъ здѣсь дѣло

съ подводною террасою, съ которой болѣе крупный матеріалъ снѣтъ прибоемъ волнъ и замѣщенъ пескомъ. Слѣдующая бухта является еще болѣе опасною въ своей западной части, такъ какъ только въ устьѣ единственной долины можно найти пристань для лодки въ случаѣ волненія: ущелистая долинка эта пробивается отвѣсную скалистую стѣну до 30' высоты, опоясывающую здѣсь берегъ Байкала. Долинка эта на съѣмахъ Военно-топографическаго Отдѣла означена подъ именемъ Крестовой, между тѣмъ, по свѣдѣніямъ, собраннымъ Черскимъ, посѣтившимъ Крестовскихъ бурятъ, вмѣстѣ съ которыми онъ совершалъ экскурсіи на р. Ангу и Бугульдейку, Крестовая долина (см. ниже) располагается почти въ 10-ти верстахъ восточнѣе, слѣдовательно къ сѣверо-востоку, а не къ юго-западу отъ Боро-елгайскаго мыса; на картѣ Меглицкаго Крестовая падь означена еще ошибочнѣе, именно западнѣе Мортуйской. Столь же отвѣсный и скалистый мысъ, ограничивающій эту бухту съ востока, отличается столбовидною скалою, расположенною на отчасти террасовидномъ уступѣ его склона. Обогнувъ этотъ живописный мысъ, путешественникъ вступаетъ въ довольно глубоко врѣзанную, небольшую бухту, Боро-елгай, съ двумя соименными долинами, обладающими общимъ широкимъ устьемъ. Долины эти короткія и безводны, не взирая на слѣды русла въ правой изъ нихъ; мѣстность отличается къ тому же безлѣсною, которая, начиная отсюда, весьма характеристична для прибрежно-ольховской полосы горъ: поверхность покрывается лишь негустою, скудною травянистою растительностію, сквозь которую почти вездѣ проскакиваютъ выходы или розсыпи коренной породы. Обстоятельство это придаетъ весьма своеобразный характеръ названной части прибрежья озера, а путешествующій по ней невольно переносится мысленно въ части горъ, выходящія уже за вертикальные предѣлы произростанія древесной растительности. Боро-елгайская долина представляетъ собою, во-первыхъ, исходный пунктъ одной экскурсіи Черскаго, во время которой



онъ пересѣкъ какъ прибрежную полосу горъ, такъ и Приморскій хребетъ въ сѣверо-западномъ направленіи и спустился къ тому мѣсту теченія р. Анги, гдѣ она всего ближе подходитъ къ Бугульдейкѣ, а во-вторыхъ, въ долину Боро-елгѣй вышелъ тотъ же путешественникъ съ низовьевъ Большой Бугульдейки, прослѣдовавъ черезъ верховья Хди (т. е. Малой Бугульдейки) и Крестовки, слѣдовательно вдоль простиранія прибрежной полосы горъ. Оба эти маршрута будутъ описаны нами вмѣстѣ съ изложеніемъ данныхъ, имѣющихся о системѣ р. Анги, теченіе которой даетъ намъ въ свою очередь поперечный разрѣзъ горъ отъ Байкала до юго-восточнаго подножья хребта Онотскаго; теперь-же послѣвшимъ къ устью этой рѣки, до котораго, отъ Боро-елгѣй, остается еще не менѣе 18 верстъ.

Мы говорили уже выше о «горообразномъ» типѣ и высотѣ Боро-елгѣйскаго мыса («Толстаго» у Георги), состоящаго изъ того же массивнаго грюнштейна (діоритъ?); пощеровидныхъ углубленій, описанныхъ Георги, Черскій не видѣлъ здѣсь вовсе, не смотря на то, что, по замѣчанію названнаго академика (1772 г.), величина ихъ была такова, что допускала входъ въ нихъ въ небольшихъ лодкахъ; отсутствіе такихъ углубленій слѣдуетъ очевидно приписать результатамъ подмывающаго дѣйствія прибоя волнъ, успѣвшаго съ тѣхъ поръ, т. е. въ теченіе 117 лѣтъ уничтожить эти щеры; прибой дѣйствуетъ и въ настоящее время весьма разрушительно на эти утесы, что можно видѣть, между прочимъ и изъ слѣдующаго факта: около самаго подножья скалъ, названныхъ за Крестовкою (см. ниже), ближайшая полоса дна покрывается недавно оторванными и потому еще острореберными кусками и глыбами скалъ, тогда какъ въ нѣкоторомъ, даже въ весьма близкомъ разстояніи отъ нихъ, на днѣ озера Черскій наблюдаются уже обточенные и оглаженные валуны. Спустились мы пяти верстъ, на протяженіи которыхъ склонъ горъ перекладывается двумя сухими долинами и наклонъ слоевъ, гдѣ таковы

замѣтны, измѣняется отъ ю.-в. до ю.-ю.-в., располагается устье долины, которую именно, а не долинку, лежащую на юго-западъ отъ Боро-елгайской, какъ это значилось на прежнихъ съѣмкахъ, буряты указывали Черскому какъ Крестовую или Большую Крестовую долину, иначе Крестовку, а по бурятски Хашингаръ. Въ верховьяхъ своихъ, носящихъ другое названіе (см. ниже) и расположенныхъ недалеко отъ Мортуйской, долина эта отличается с.-в. направлениемъ, слѣдовательно почти параллельнымъ Байкалу, отъ котораго она и удалена здѣсь всего лишь отъ 3 до 5 верстъ. Затѣмъ Крестовка поворачиваетъ дугообразно въ востокъ и наконецъ къ юго-востоку (в.-ю.-в.) къ устью, на лѣвомъ берегу котораго находится низменный и наносный Крестовскій мысъ. Въ долину этой и вообще ея системѣ находятся нѣсколько бурятскихъ улусовъ, незамѣтныхъ съ ея устья, въ томъ числѣ и улусъ Крестовскій, изъ котораго Черскій бралъ лошадей и проводника для поѣздки на р. Ангу и Бугульдейку (см. ниже). Кромѣ указаннаго выше недоразумѣнія относительно положенія этой долины на имѣющихся съѣмкахъ, съ Крестовскою связаны еще и нѣкоторыя другія. Во первыхъ, не взирая на то, что на своей геологической картѣ Черскій сохранилъ въ общемъ тоже направленіе береговой линіи озера, какое показывалось здѣсь на лучшихъ изъ прежнихъ съѣмкахъ, тѣмъ не менѣе онъ говоритъ, что съ оконечности Крестовскаго мыса можно видѣть описанный уже нами Голый мысъ на з.-ю. 30°, между тѣмъ, согласно съѣмкамъ даже 5-ти верстнаго масштаба, мысъ тотъ (т. е. Голый), долженъ закрываться Боро-елгайскимъ, идущимся болѣе чѣмъ на 1½ версты въ озеро, и даже ближайшими выступами восточныхъ окрестностей Голаго мыса (Атай и проч). Во-вторыхъ, Большая Крестовая долина, въ числѣ Черскаго, означена на тѣхъ же съѣмкахъ подъ именемъ Саганъ-заба, между тѣмъ Агапитовъ, описывавшій послѣдствіи древнія изображенія на утесѣ того-же имени

(см. ниже), говорить, что утесъ Саганъ-заба или Цаганъ-заба, находится въ пяти верстахъ на сѣверо-востокъ отъ долины Крестовой, отъ которой до устья р. Анги онъ считаетъ 20 верстъ; основываясь на такомъ показаніи, устье Крестовки Черскаго (около 15 верстъ отъ Анги) совпадаетъ съ долиною Саганъ-заба, а Крестовка по Агапитову заняла бы мѣсто Боро-елгая или близкое ему (около 20 верстъ, считая по береговой линіи), изъ чего очевидно впрочемъ только то, что дѣйствительное мѣстоположеніе Саганъ-заба, считавшейся Черскимъ синонимомъ Крестовки, остается до сихъ поръ не достаточно опредѣленнымъ, не взирая на важность ея въ археологическомъ отношеніи (см. ниже).

Съ наноснаго мыса Большой Крестовки открывается весьма хорошій видъ и на сѣверо-восточное продолженіе прибрежныхъ горъ, именно, на всю плоскую, но слоистую бухтовидную выемку около 6 верстъ длины, до западнаго мыса Малой Крестовки, вслѣдъ за которымъ горизонтъ закрывается уже горами, расположенными на с.-в. отъ устья Анги, такъ какъ ни это послѣднее, ни даже ограничивающіе его мысы, не могутъ быть видимы съ этого пункта. Склонъ горъ, образующихъ здѣсь нѣсколько второстепенныхъ мисвидныхъ выступовъ или оконечностей отроговъ, является здѣсь еще болѣе крутымъ и скалистымъ; особенно крутою, почти вполне отвѣсною и высокою оказывается оконечность втораго отрога за Крестовымъ мысомъ; такими-же, но на половину болѣе низкими являются третій и четвертый изъ видимыхъ мысовъ вслѣдствіе соотвѣтственнаго террасовиднаго пониженія склоновъ образующихъ ихъ отроговъ. Столь-же скалистыми и опасными оказались и заключенныя между ними второстепенныя булочки, снабженныя лишь очень узкою каргою или лишеныя ея вовсе. Въ утесахъ этихъ обнажается преимущественно слоистое видоизмѣненіе полевошпатовыхъ породъ (сіенитъ, находящійся по видимому въ весьма тѣсной связи упомянутымъ выше гряшштейномъ), и только появляющіеся

время от времени выходы пластовъ кристаллическаго известняка убѣждаютъ, что мы имѣемъ дѣло съ продолженіемъ все той-же перемежаемости, въ область которой путешественникъ вступаетъ уже съ устья Б. Бугульдейки, причемъ въ известнякѣ этомъ наблюдается повидимому пластовая жила особеннаго грюнштейна, раздвоенная книзу такъ, что подъ уровень озера она прячется уже въ видѣ двухъ жилъ. Высокій и отвѣсный утесъ, которымъ оканчивается упомянутый выше второй отрогъ, считая отъ Крестовскаго мыса, состоитъ изъ гранито-сіенита, а слѣдующій за нимъ изъ известняка, въ которомъ грюнштейновыя жилы подверглись такому-же разрыву, какъ и около Мортуйской долины. Въ сіенито-гранитѣ замѣчаются мѣстами прослойки роговообманковаго сланца, какъ напр. ближе къ четвертому мысу, который отличается довольно живописною, ступенчатою и наклонно усѣченною вершиною около самой его оконечности. Замѣтное мѣстами наденіе пластовъ опредѣлено Черскимъ какъ ю.-в.-ное. Только приблизившись къ этому утесу, открывается видъ на пятый мысъ, нѣсколько болѣе низкій и террасовидный, ограничивающій съ востока скалистую бухточку съ ущелистою долиною. За нимъ скрывается однако вся остальная часть береговой линіи до р. Анги включительно вслѣдствіе поворота ея болѣе къ с.-с.-в. Пятый мысъ можно назвать Малымъ Крестовскимъ, такъ какъ за нимъ располагается бухта и долина Малой Крестовки, извѣстной у бурятъ подъ именемъ Берхѣнъ, съ построеннымъ въ ней улусомъ того-же имени. Съ мыса этого можно видѣть уже: шестой, т. е. северо-восточный мысъ Малой Крестовки, затѣмъ седьмой, или мысъ Шеватѣ, образующій лѣвый берегъ широкой соименной долины и наконецъ, восьмой или Ангинскій, изъ котораго выступаютъ еще: мысъ лѣваго берега устья Анги и Ангинскія горы. Въ противоположность шестому мысу, заключающемуся крутымъ, но уступистымъ профилемъ, почти прямолинейный склонъ седьмаго наклоняется почти подъ

угломъ въ 45°, къ озеру, тогда какъ Ангинскій почти отвѣсно обрѣзанъ, начиная съ высшей своей точки. На скалѣ сѣверо-восточнаго мыса бухты Малой Крестовки, со стороны послѣдней, Черскимъ сдѣлана засѣчка на высотѣ 2 метровъ надъ поверхностью Байкала (11-го іюля 1879 г.). Ближе къ Ангинскому мысу сіенито-гранитъ переходитъ въ соответственное слоистое видоизмѣненіе, падающее на с.-с.-з. до 60°, а въ самомъ мысѣ обнажена перемежаемость нѣсколькихъ пластовъ известняка съ роговообманковымъ сланцемъ; простираніе переходитъ почти въ восточное съ паденіемъ какъ къ сѣверу, такъ и къ югу. Все это видно уже со стороны Ангинской бухты (см. ниже), которая достигаетъ около 4 верстъ ширины и врѣзывается въ побережье болѣе чѣмъ на 2 версты, гдѣ она постепенно суживается (до 1 версты) и упирается наконецъ въ низменное наносное дно устья Анги. Теченію этой рѣки мы посвятимъ нижеслѣдующее изложеніе, въ соответственныхъ частяхъ котораго опишемъ также маршруты, пересекающіе часть горъ, заключенныхъ между этою долиною и Б. Бугульдейкою, какъ равно и путь Чекановскаго съ Анги на р. Унгуру, притокъ р. Манзурки, которымъ онъ пересѣкъ Онотскій хребетъ восточнѣе Бугульдейскаго перевала.

Е) Система р. Анги и описаніе басающихся ея маршрутовъ.

Въ извѣстномъ путешествіи академика Георги читаемъ, что Анга «беретъ начало на з.-ю.-з., вблизи источниковъ р. Лены, отстоящихъ отъ устья Анги всего лишь около 50 верстъ» <sup>1)</sup>. Тоже въ сущности повторяетъ и Радде, говоря, что «Анга беретъ начало вблизи отъ источниковъ Лены, лежащихъ на з.-ю.-з. отъ Ангинской бухты; до устья своей Анга протекаетъ 50 верстъ» <sup>2)</sup>. Ошибка эта исправлена

<sup>1)</sup> Georgi, Reise I. с., pag. 55.

<sup>2)</sup> Радде, I. с., pag. 256.

впервые картою астронома Шварца, на которой какъ теченіе р. Анги, такъ и источники р. Лены означены уже гораздо вѣрнѣе, причемъ оказалось, что верховья Анги лежать во-первыхъ, на с.-с.-з. отъ устья, а во-вторыхъ, въ разстояніи гораздо болѣе сотни (до 140) верстъ къ юго-западу отъ источниковъ р. Лены. Но всего лучше Анга, какъ и Бугульдейка, сдѣлалась извѣстною благодаря изслѣдованіямъ Чекановскаго, изобразившаго систему этой рѣки на своей геогностической картѣ. По этимъ даннымъ мы знаемъ, что рѣка Анга (Ахтѣ у бурятъ) достигаетъ 70 верстъ въ длину и потому нѣсколько превосходить длину Б. Бугульдейки (13-ю верстами), уступая, однако, размѣрамъ р. Голоустной (на 16 верстъ). Верховья ея располагаются на одномъ изъ высшихъ пунктовъ хребта Приморскаго, извѣстномъ подъ названіемъ Харгойскаго гольца (3924' надъ Байк.), въ разстояніи отъ 24 до 27 верстъ на с.-с.-з. отъ устья, а обстоятельство это, при указанной выше длинѣ рѣки (70 верстъ) указываетъ уже на существованіе значительныхъ изгибовъ долины. И дѣйствительно, относительное положеніе другъ къ другу различныхъ частей р. Анги Черскій сравниваетъ съ такими-же условіями теченія р. Голоустной. Въ ней можно различать во-первыхъ, верхнюю часть или Большую Ангу, которая направляется въ сторону противоположную Байкалу, именно съ юго-востока на сѣверо-западъ, (только длина этой части лишь немногимъ превышаетъ 10 верстъ), послѣ чего Анга переходитъ въ Среднюю. Эта послѣдняя, до 32 верстъ длины, болѣе или менѣе параллельна береговой линіи Байкала и направляется сначала на ю.-з., а во второй половинѣ длины почти къ югу, параллельно верхнему теченію Б. Бугульдейки, отъ которой она отстоитъ здѣсь всего лишь на 7, а нѣсколько южнѣе и на 5 верстъ, какъ это имѣетъ мѣсто на широтѣ долины рч. Харжергѣ, знакомаго намъ уже лѣваго притока Бугульдейки. Отсюда Анга поворачиваетъ на в.-ю.-в. къ Байкалу, слѣдо-

вательно въ сторону, противоположную своему верхнему отрѣзку, но въ общемъ параллельно ему; длина этой части, соответствующей нижнему теченію р. Голоустной, равняется 28 верстамъ. Такимъ, т. е. юго-восточнымъ направлениемъ нижней части Анги обусловлено и то ея отношеніе къ Бугульдейкѣ, благодаря которому устья этихъ рѣкъ, сошедшихся такъ близко средними частями (до 5 верстъ), отстоятъ другъ отъ друга на 40 верстъ. Тождественною съ Голоустною является и орографическая роль названныхъ отдѣльныхъ частей р. Анги, такъ какъ верхній ея отрѣзокъ принадлежитъ къ ряду поперечныхъ долинъ, расчленяющихъ сѣверо-западный склонъ Приморскаго хребта; средніе течение отдѣляетъ этотъ хребетъ отъ юго-восточнаго подножья Онокскаго, располагаясь на продолженіи долинъ: Нижняго Качергата, средней части Голоустной, Куртуна, Бугульдейки и Хара-жерги (см. ниже), тогда какъ нижнюю часть теченія Анги Приморскій хребетъ пересекается въ поперечномъ направленіи. Относительно особенностей долины р. Анги Чекановскій передаетъ, что на всемъ протяженіи верхняго и средняго отрѣзка рѣка протекаетъ по широкой и въ ея бытность, болотистой долинкѣ, которая только въ трехъ мѣстахъ стѣсняется горами, подступающими съ лѣвой стороны въ видѣ болѣе или менѣе значительныхъ утесовъ; около этихъ скалъ рѣка извивается и представляетъ такимъ образомъ три небольшіе петлеобразные изгиба, нарушающіе въ общемъ прямолинейное направленіе этой части долины. Самые значительные притоки рѣка принимаетъ съ лѣвой стороны, изъ хребта Приморскаго, напр. Средняя Анга, до 18 верстъ длины, берущая начало около того-же Харгойскаго гольца и протекающая вообще почти въ западномъ направленіи къ устью, которое расположено почти въ 19 верстахъ ниже верховьевъ Большой Анги. Ниже Средней Анги впадаютъ рѣки Малая Анга, Аренга, Борто-талá, и Асá 1-ая или верхняя, недостигающія и 10 верстъ длины. Съ прав

стороны между тѣмъ въ нее впадаютъ все незначительныя притоки, какъ-то: Харгитуй, впадающій на границѣ верхняго теченія со среднимъ и расположенный на одной линіи съ послѣднимъ, вслѣдствіе чего рѣчка эта вполне соотвѣтствуетъ Зонгуту, впадающему въ Голоустную; далѣе, Бугулькѣ, берущій начало въ Онотскомъ хребтѣ, на водораздѣлѣ между системою водъ Байкала и Лены, т. е. Манзурки (см. ниже), и впадающій двумя верстами ниже устья Средней Анги, а наконецъ рч. Харбагура, замѣчательная тѣмъ, что она протекаетъ по долинѣ, общей съ Хара-жергою, впадающею въ Бугульдейку, но течетъ въ діаметрально противоположномъ направленіи (см. ниже). Оба склона долины р. Анги имѣютъ неодинаковую наружность на всемъ этомъ протяженіи. Лѣвый склонъ болѣе высокій, принадлежащій сѣверо-западной покатости Приморскаго хребта, является не только болѣе расчлененнымъ, но и болѣе пологимъ; правый склонъ, т. е. Онотскій, направляется, напротивъ, въ видѣ непрерывнаго и мало расчлененнаго, болѣе или менѣе крутаго ската. Противъ нижняго петлеобразнаго изгиба рѣки (ниже устья Боро-тала) склонъ этотъ значительно понижается вслѣдствіе глубокаго «перегиба» въ отрогѣ, отдѣляющемъ Ангу отъ Бугульдейки, но затѣмъ онъ быстро возвышается, принимая видъ весьма крутой стѣны, особенно высокой противъ знакомой намъ уже Гоморьянской сопки. Къ югу отъ этой послѣдней склонъ, какъ равно и весь водораздѣльный отрогъ, быстро понижаются къ долинѣ Харбагуры и Хара-жерги, уровень которой лишь немногимъ превышаетъ поверхность долинъ приблизившихся здѣсь другъ къ другу двухъ главныхъ рѣкъ. Поэтому общая долина Харбагуры и Хара-жерги, отличаясь в.-с.-в. направленіемъ, связываетъ собою долину Бугульдейки съ Ангою въ томъ мѣстѣ, гдѣ онѣ приблизились другъ къ другу на разстояніе всего лишь пяти верстъ,—явленіе, въ которомъ, какъ мы увидимъ ниже, скрыты нѣкоторые небезынтересные моменты исторіи развѣтвляющагося и преобразованій долинъ этихъ двухъ рѣкъ.



Начиная съ устья Харбагуры, Анга принимает юго-восточное направлѣніе и, миновавъ расположенную здѣсь русскую деревню Куретскую (Манзурской волости Верхоленскаго окр. состоятъ изъ 54 дворовъ съ 334 жит., въ т. числѣ 154 м. п.), вступаетъ въ узкую и ущелистую долину, пересекающую Приморскій хребетъ. По свѣдѣніямъ, собраннымъ Чекановскимъ, мы знаемъ еще, что около деревни Куретской въ Ангу впадаютъ съ правой стороны небольшіе ключи или рѣчки: Куретки (ихъ двѣ) и Молька, а съ лѣвой стороны, въ предѣлахъ ущелистой части долины, на его картѣ означена рч. Аса 2-я или Нижняя Аса; эта послѣдняя имѣетъ болѣе 10 верстъ длины, протекаетъ въ юго-западномъ направленіи и въ разстояніи болѣе 2 верстъ отъ устья раздѣляется на два рукава, изъ которыхъ лѣвый еще раздваивается, такъ-что все устье Асы, считая между крайними рукавами, занимаетъ пространство до 2 верстъ. Къ сожалѣнію, однако, ни на картѣ, ни въ текстѣ мы не находимъ удовлетворительнаго отвѣта на возникающій при этомъ вопросъ: помѣщаются ли эти рукава на площади расширившейся въ этомъ мѣстѣ долины р. Анги, что было бы всего естественнѣе, или-же рукава эти проложены въ отдѣльныхъ узкихъ долинахъ среди развитаго тамъ гнейса, на что какъ будто указываетъ карта этой мѣстности? Пройдя верстъ съ 16 по сѣуженной долины, т. е. всю ширину пробиваемаго ею здѣсь Приморскаго хребта, р. Анга, какъ передаетъ Черскій, входитъ въ предѣлы прибрежно-ольховской полосы горъ, пересекаемой ею въ свою очередь, начиная съ линіи продольныхъ долинъ, которая отдѣляетъ эту полосу отъ юго-восточнаго подножья Приморскаго хребта. По юго-западной изъ этихъ продольныхъ долинъ протекаетъ правый притокъ Анги, рч. Еланца, достигая 15 верстъ въ длину и располагаясь вообще параллельно Байкалу, въ разстояніи около 11 верстъ отъ его береговой линіи, при чемъ верховья этой долины лежатъ вблизи отъ системы Малой Бугульдейки. Что-же касается сѣверо-

восточной долины, лежащей какъ бы на протяженіи Еланцы, то она въ общемъ столь-же параллельна озеру, но ближе къ Ангѣ сухая, а далѣе отчасти занята русломъ пересѣкающаго еѣ затѣмъ Уланъ-Бургаса, самаго значительнаго лѣваго притока Анги. Рѣчка эта, осмотрѣнная Чекановскимъ, имѣетъ болѣе 20 верстъ длины, беретъ начало въ хребтѣ Приморскомъ въ небольшомъ разстояніи (болѣе 10 верстъ) отъ Малаго моря (см. ниже) и, выйдя изъ хребта, поворачивается къ юго-западу, на встрѣчу Еланцѣ, но, недойдя около 4 верстъ до устья послѣдней, поворачивается къ юго-востоку и впадаетъ въ Ангу почти въ 5 верстахъ ниже Еланцы; по длинѣ Уланъ-Бургаса Чекановскимъ означено много ключей, не замерзающихъ зимою, встрѣчающихся также и по р. Ангѣ, какъ въ среднемъ, такъ и въ ущелистомъ ея теченіяхъ. Ниже устья Уланъ-Бургаса Ангa пересѣкаетъ еще нѣсколько продольныхъ долинъ, которымъ прибрежная полоса горъ обязана характеристичнымъ для нея расчлененіемъ на болѣе или менѣе параллельныя, невысокія цѣпи. Изъ этихъ долинъ болѣе извѣстны лѣвыя, относительно Анги: ихъ двѣ, не считая еще третьей діагональной долины, въ которой располагаются Таржиранскія гуджиристыя озера, извѣстныя еще со временъ Георга; свѣдѣнія о нихъ будутъ изложены нами ниже, теперь же обратимся въ маршрутамъ, знающимъ съ орографическими подробностями въ предѣлахъ системы интересующей насъ рѣки и прилежащихъ къ ней мѣстностей, а также и съ ея строеніемъ.

Маршруты Чекановскаго въ бассейнѣ р. Анги; его изслѣдованія въ Приморскомъ хребтѣ и перевалъ черезъ Олотъ въ систему р. Манзурии.

Судя по маршрутамъ, означеннымъ на его геогностической картѣ, Чекановскій ознакомился съ значительною частью прибрежной полосы горъ. Отправившись съ низовьевъ Боль-

пой Бугульдейки на сѣверо-востокъ, почти параллельно Байкалу, вверхъ по описанной выше высохшей долинѣ, онъ проѣхалъ по верхнему теченію Малой Бугульдейки, коснулся верховьевъ Большой Крестовки и долины Еланцы, откуда повернулъ нѣсколько болѣе къ востоку и встрѣтилъ р. Ангу всего лишь въ двухъ верстахъ выше ея устья; пройдя отсюда вверхъ по рѣкѣ, онъ повернулъ въ одну изъ упомянутыхъ выше продольныхъ долинъ и затѣмъ достигъ берега Байкала около мыса Уланъ-Нуръ (около 13 верстъ къ с.-в. отъ устья Анги, см. ниже). Отъ Уланъ-нурса онъ направился на западъ, еще разъ пересѣкъ прибрежную полосу горъ, почти до начала нижней половины теченія р. Уланъ-Бургаса, и внизъ по нему достигъ выхода Анги изъ Приморскаго хребта. Затѣмъ, направившись вверхъ по лѣвому берегу Анги, онъ прошелъ ее до самыхъ верховьевъ Средней и Большой Анги, расположенныхъ на гольцѣ Харгойскомъ и, описавъ кругъ почти на самой осевой части Приморскаго хребта, приблизившись къ верховьямъ Уланъ-Бургаса, и проѣхавъ около гольца того-же имени, онъ спустился опять на Ангу, чтобы переехать съ ея долины на Манзурку. Свѣдѣнія, переданныя имъ въ отчетѣ о прибрежной полосѣ горъ, къ сожалѣнію, оказываются весьма краткими въ сравненіи съ обширностью осмотрѣннаго района, тѣмъ не менѣе въ общемъ онѣ съ достаточною наглядностью характеризуютъ эту мѣстность. Вообще южнѣе, т. е. на ю.-з. отъ Анги, говоритъ Чекановскій (стр. 235), побережью свойственны округленные контуры и лѣсная растительность здѣсь обильна, напротивъ, между Ангою и Малымъ Моремъ, оно безлѣсно и горы, низкія сравнительно съ прилежащими высотами Приморскаго хребта, тянутся рядами, болѣе или менѣе параллельными, снабжаясь нерѣдко узкими и острыми гребнями. Среди такихъ горъ лежатъ давно извѣстныя гуджиристыя Таржиранскія озера, занимая повидимому поперечное углубленіе почвы. Въ выноскѣ къ той-же страницѣ передаются свѣдѣнія

о строеніи этой мѣстности: тамъ говорится, что на пути отъ Уланъ-Бургаса до Уланъ-нұра Чекановскій пересѣкалъ перемежающіяся полосы породъ гранитовидныхъ, гнейсовъ и известняка; мѣстами встрѣчался роговообманковый сланецъ, къ тому же въ этой части побережья онъ находилъ много выходовъ породъ, считаемыхъ имъ изверженными, впрочемъ безъ опредѣленія петрографическаго вида. Кромѣ того условными знаками показаны на его картѣ: мѣста добычи полеваго шпата и кварца для стеклянаго завода въ верховьяхъ М. Бугульдейки, въ одномъ изъ притоковъ рч. Еланцы (Нарынъ-Кунтá) и около Уланъ-нұра, а также мѣста добычи желѣзныхъ рудъ для бывшаго желѣзнаго завода около выхода р. Анги изъ хребта, въ верховьяхъ Еланцы и въ нѣсколькихъ мѣстахъ отъ лѣваго берега Анги, ниже устья Уланъ-Бургаса, на пути къ Уланъ-нұру. Болѣе полными и въ особенности подробными, въ петрографическомъ отношеніи, являются его изслѣдованія хребта Приморскаго. Хребетъ этотъ характеризуется вообще угловатыми контурами и каменистымъ свойствомъ почвы; на немъ расположены высшія точки мѣстности. Каменные вершины этого хребта, покрытыя скуднымъ лѣсомъ или совсѣмъ обнаженныя, обращаютъ на себя вниманіе уже на правомъ берегу нижняго теченія Анги по Бугульдейкѣ, какъ напр. Сопка Архирей (2174' надъ Байк.), о которой мы говорили уже выше, и Куретская сопка (2378' н. Байк.), лежащая въ верховьяхъ рѣчекъ Куретокъ, упомянутыхъ уже нами правыхъ притоковъ Анги около деревни Куретской. Далѣе, къ сѣверо-востоку отъ нихъ, уже за Ангою, располагается гора менѣе выразительной наружности, питающая обѣ рѣчки Асы и Боро-талу, а еще далѣе въ томъ же направленіи мы видимъ массы горъ, составляющихъ основаніе гольцовъ: Уланъ-Бургасскаго, нѣсколько болѣе высокаго Харгойскаго (3924' н. Байк.) и еще болѣе выдающагося Сармынскаго гольца, лежащаго уже ближе къ р. Сармѣ, впадающей въ Малое Море (см. ниже). Глав-

ная масса хребтовъ состоитъ изъ очкового гнейса, названнаго Чекановскимъ Байкальскимъ гнейсомъ, который является то въ видѣ хлоритоваго, то въ видѣ слюдянаго видоизмѣненія, переходя и въ соотвѣтственные сланцы, а также и въ массивныя видоизмѣненія того-же петрографическаго состава.

Между тѣмъ, на осевой линіи хребта располагается полоса слюдистаго сѣроватобѣлаго кварцита, связанная съ гнейсомъ переходами черезъ посредство слюдянаго сланца; полоса эта, расширяясь къ сѣверо-востоку до 10 верстъ, суживается въ томъ мѣстѣ, гдѣ ее пересѣкаетъ Анга, до 2 верстъ, отклонившись на столько ближе къ юго-восточному склону хребта, что она переходитъ Ангу въ промежуткѣ между устьемъ Нижней Асы и долиною Еланцы, причемъ соотвѣтственно суживается и юго-восточная полоса байкальскаго гнейса. Въ предѣлахъ этой кварцитовой полосы берутъ начало какъ Большая такъ и Средняя Анга, а также Нижняя или вторая Аса; на ней располагаются и названные выше пункты хребта. «Въ августѣ 1869 г.», говоритъ Чекановскій (выноска къ стр. 271), «завидѣвъ бѣлую вершину гольца Харгойскаго, мои проводники увѣрили, что встрѣтимъ на ней много снѣгу; въ дѣйствительности-же нашли бѣлые кварциты и продуктъ ихъ разрушенія, бѣлый песокъ. Нечѣмъ было утолить жажду послѣ затруднительнаго подъема, хотя подъ ногами, между громадными глыбами камня въ глубинѣ, вездѣ клокотала вода». «Очевидно», продолжаетъ авторъ, «цвѣтъ породы вводилъ въ заблужденіе тѣхъ, которые сообщали о нахожденіи снѣжныхъ вершинъ по сосѣдству Малаго Моря». Впрочемъ, въ половинѣ августа 1879 г. Черскій видѣлъ клочекъ дѣйствительнаго снѣга, уцѣлѣвшій на одномъ изъ гольцовъ этой мѣстности. Что-же касается продолженія осевой части хребта на юго-западъ отъ Анги, между нею и Б. Бугульдейкою, то пространство это осталось неизслѣдованнымъ Чекановскимъ. Кромѣ перечисленныхъ породъ Чекановскимъ найдены еще въ Приморскомъ хребтѣ: прот-

гиновый, эпидотизированный кварцевый порфиръ въ неясныхъ выступахъ у подножья хребта по среднему теченію р. Анги.

Различіе между строеніемъ хребта Онотскаго и Приморскаго по среднему теченію р. Анги оказалось еще болѣе рѣзкимъ нежели по Большой Бугульдейкѣ. И дѣйствительно, весь лѣвый берегъ указаннаго отрѣзка рѣки окрашенъ Чекановскимъ цвѣтомъ байкальскаго гнейса, т. е. породы хребта Приморскаго, тогда какъ на правомъ развиты одни лишь члены сланцевой тощи, изъ которой состоитъ здѣсь Онотъ. Что-же касается частностей, то преобладающею породою является глинистый сланецъ и связанный съ нимъ метаморфическій песчаникъ («шальштейновый»), изъ подъ которыхъ въ двухъ мѣстахъ выступают и другіе пласты, а именно: между устьемъ верхней или первой Асы и петлевымъ изгибомъ около Бороталы, обнажается полоса известняка, а выше устья Булука известнякъ и залегающій подъ нимъ кварцитъ съ марганцовыми рудами; такъ-что Анга протекаетъ здѣсь по самой линіи сопряженія этихъ сланцевъ съ гнейсомъ. Въ долину р. Анги Чекановскимъ сдѣланы слѣдующія измѣренія высотъ, изъ которыхъ первыя относятся къ ея среднему теченію: для устья р. Аренги получено 937' надъ Байкаломъ, для мѣста соединенія Средней Анги съ Большою 1028', а наконецъ для зимовья на р. Средней Ангѣ 1345' н. Байк.; только къ сожалѣнію мѣсто расположенія этого зимовья не описано въ текстѣ и не означено на картѣ. Съ устья рч. Булукъ Чекановскій перешелъ черезъ Онотскій хребетъ въ систему р. Манзурки. Рѣчка Булукъ, правый притокъ р. Анги, впадающій въ нее около 2 верстъ ниже устья Средней Анги, берегъ начало на сѣверо-восточномъ продолженіи той-же водораздѣльной линіи Онотскаго хребта, на которой лежатъ источники и Б. Бугульдейки, отстоящіе отъ верховьевъ Булука приблизительно въ 12 верстахъ; отсюда Булукъ направляется къ югу и впадаетъ въ Ангу въ разстояніи всего лишь 6—8 верстъ отъ вер-

ховьевъ. Тропа къ первому слѣдуетъ вверхъ по лѣвому берегу ручья, въ нѣкоторомъ отъ него разстояніи, вдоль по-лосы известняка, залегающаго на упомянутомъ выше кварцита<sup>1)</sup>. Перевалъ черезъ Онотскій хребетъ образуется здѣсь толщею глинистыхъ сланцевъ и «шальштейна», залегающихъ поверхъ известняка. Хребетъ, какъ и въ другихъ мѣстахъ, отличается здѣсь отсутствіемъ особенно выдающихся вершинъ и округленностью горъ, поросшихъ обыкновенно мхомъ и густымъ лѣсомъ преимущественно кедровымъ, и только далѣе къ востоку, къ верховьямъ р. Анги, можно видѣть, что Онотскій хребетъ отдѣляется отъ себя короткою соединительною вѣтвь къ хребту Приморскому. Вѣтвь эта, снабженная острыми и зубчатымъ гребнемъ пройдена въ самое послѣднее время Обручевымъ, маршрутъ котораго будетъ изложенъ далѣе.

Но возвратимся къ перевалу черезъ Онотскій хребетъ. Глинистый сланецъ образуетъ собою гребень хребта, продолжаясь и на его сѣверо-западный склонъ, перерѣзанный здѣсь системою рч. Унгуры, впадающей съ правой стороны въ Малую Манзурку, ниже ущелья, о чемъ было сказано выше при описаніи перевала съ верховьевъ Бугульдейки. Унгура достигаетъ болѣе 20 верстъ длины и беретъ начало на водораздѣльной линіи Онота, въ разстояніи болѣе 10 верстъ къ с.-с.-в. отъ источниковъ Булука, изъ той-же соединительной вѣтви хребта, которая образуетъ водораздѣлъ между Ангою и Сармою. Направляясь въ общемъ почти на западъ (нѣсколько къ з.-с.-з.), Унгура въ разстояніи 10 верстъ отъ устья принимаетъ съ лѣвой стороны рч. Унгуруханъ менѣе 10 верстъ длины и слѣдующую с.-с.-з.-му направленію и въ 4 верстахъ выше, съ той же стороны, въ нее впадаетъ еще Бильчиръ (Верхн. Унгуруханъ по Обручеву, см. ниже), который, по мнѣнію Черскаго, слѣдуетъ разсматривать какъ лѣвое верховье Унгуры, такъ какъ слово билъ

<sup>1)</sup> Чекановскій, loco cit. стр. 291—292.

чиръ означаетъ у бурятъ развѣтвленіе («стрѣлка» у русскаго населенія), примѣняемое ими только къ слиянію верховьевъ данной рѣчки. Чекановскій спустился съ Онота по правому берегу Унгурхана и, перейдя на правую сторону Унгуры, достигъ ея устья, а затѣмъ и Ольховской дороги, гдѣ послѣдняя отворачиваетъ уже къ Хоготской станціи. Глинистый сланецъ, сопровождавшій путешественника, начиная съ самаго перевала, смѣняется около устья Унгуры известнякомъ, который достигался и другими поперечными разрѣзами Онота; порода эта падаетъ здѣсь на с.-з. и, какъ было сказано выше, скрывается подъ девонскими пластами лѣваго берега долины р. Куданцы. Описанный маршрутъ Чекановскаго представляетъ собою самый полный изъ совершенныхъ имъ разрѣзовъ Прибайкальскихъ горъ, такъ какъ онъ захватываетъ всѣ орографическія формы, входящія въ составъ сѣверо-западнаго Прибайкалья, а именно: прибрежную полосу горъ, Приморскій хребетъ, Онотскій и прилежащую къ послѣднему часть плоской возвышенности. Какъ на болѣе слабую сторону собранныхъ этимъ маршрутомъ данныхъ нельзя не указать на почти совершенное отсутствіе стратиграфическихъ данныхъ <sup>1)</sup>, которыя могли бы пролить свѣтъ на отношеніе другъ къ другу пластовъ, входящихъ въ составъ всѣхъ этихъ отдѣльных частей, а слѣдовательно и на относительную ихъ древность. Относительно простиранія пластовъ мы находимъ правда общія указанія на то, что в.-с.-в.-ое слѣдуетъ считать преобладающимъ; кромѣ того, Чекановскій отличаетъ еще три направленія пластовъ, какъ-то: з.-в.-ное, замѣченное имъ въ низовьяхъ р. Анги, на восточномъ склонѣ Харгойскаго гольца и мѣстами въ долинѣ Б. Бугульдейки; меридіональное простираніе (с.-ю.) господствуетъ, между прочимъ, въ той части

---

<sup>1)</sup> Въ этомъ отношеніи пополняетъ наши свѣдѣнія изложенный ниже маршрутъ Обручева.



Ангинско-Бугульдейскаго водораздѣла, которая лежитъ къ сѣверу отъ долины Харбагуры и Хара-жерги, а наконецъ с.-з.-ое простираніе, наблюдавшееся впрочемъ только на плоской возвышенности; всѣ эти четыре направленія «поднятія» Чекановскій считаетъ самостоятельными <sup>1)</sup>. Что же касается паденія пластовъ, то таковое упоминается только для известняка, развитаго въ низовьяхъ р. Унгуры. Чекановскій полагаетъ однако, что «хребетъ Онотскій и хребетъ Приморскій, рассматриваемые какъ гряды съ сѣверо-восточнымъ простираніемъ, принадлежать оба къ одной и той-же эпохѣ поднятія» <sup>2)</sup>, и что подъемъ этотъ «имѣлъ мѣсто послѣ отложенія пластовъ юрской формаціи» <sup>3)</sup>. Такое мнѣніе основывалось, впрочемъ, на весьма недостаточныхъ данныхъ относительно мѣстъ и образа соприкосновенія и залеганія породъ, слагающихъ названные хребты, вслѣдствіе чего члены одной и той-же сланцевой толщи (глинистые сланцы, известнякъ и кварцитъ) относились къ тремъ различнымъ по времени формаціямъ (юрской, девонской и силурійской), а во-вторыхъ, упомянутый выше недостатокъ стратиграфическихъ данныхъ давалъ мѣсто возрѣнію, вѣрнѣе вопросу, заданному еще Гофманомъ, подозрѣвавшимъ, что прибайкальскіе гнейсы могутъ быть результатомъ соотвѣтственнаго перерожденія юрскихъ отложеній <sup>4)</sup>. Такому взгляду сочувствовалъ и самъ Чекановскій <sup>5)</sup>, хотя ему и не удалось опровергнуть <sup>6)</sup> фактъ, впервые указаннаго Меглицкимъ <sup>7)</sup>, что юра залегаетъ несогласно даже на глинистыхъ сланцахъ около Байкала, въ мѣстности, до которой, замѣтимъ, не доходилъ Гофманъ въ

<sup>1)</sup> Чекановскій, I. с., pag. 236.

<sup>2)</sup> Чекановскій, I. с., pag. 315.

<sup>3)</sup> Чекановскій, I. с., pag. 326.

<sup>4)</sup> Гофманъ, *Reise nach den Goldwäschern etc.* I. с., pag. 102 и слѣд.

<sup>5)</sup> Чекановскій, Изв. Сиб. Отд. И. Р. Геогр. Общ. Т. I. 1870, стр. 22.

<sup>6)</sup> Чекановскій, Зап., I. с., pag. 304—306.

<sup>7)</sup> Меглицкій, Горн. Журн., I. с., стр. 56.

своей экскурсії съ знакомаго намъ уже пріиска на Ботахъ. Съ этой точки зрѣнія понятно, что Чекановскій скорѣе склонился допустить, что среднее теченіе р. Анги проложено по линіи сдвига <sup>1)</sup>, нежели по линіи несогласнаго напластованія, какъ это слѣдуетъ предполагать на основаніи всѣхъ приведенныхъ выше данныхъ, начиная съ низовьевъ Иркутка и кончая системою р. Бугульдейки. Вопросъ объ отношеніи прибрежной полосы горъ къ хребту Приморскому рѣшается, между прочимъ, маршрутомъ Черскаго по системѣ р. Анги, о которомъ будетъ рѣчь нѣсколько ниже, теперь же изложимъ маршрутъ Обручева, знакомящій насъ съ восточной оконечностью Онотскаго хребта.

Маршрутъ Обручева черезъ Онотскій и Приморскій хребты, съ системы р. Унгуры (Малая Манзурка) въ систему р. Сармы.

Чтобы достигнуть острова Ольхона, Обручевъ <sup>2)</sup> не отправился по обыкновенному ольхонскому тракту, описанному нами раньше, а рѣшилъ пересѣчь Онотскій и Приморскій хребты по новому направленію, именно спуститься въ систему р. Сармы, верхнее теченіе которой вовсе еще не было изслѣдовано. Съ этой цѣлью путешественникъ сперва направился отъ Хоготской станціи якутскаго тракта по ольхонскому тракту до того мѣста, гдѣ этотъ послѣдній изъ долины Унгуры (Мал. Манзурка по Черскому) сворачиваетъ въ долину Ады <sup>3)</sup>, гдѣ и расположена упоминавшаяся Унгурина-ская станція. Не сворачивая затѣмъ въ долину Ады, путешественникъ сталъ продолжать подниматься по долинѣ Унгуры, по тропѣ, проложенной звѣропромышленниками.

Тропа, придерживавшаяся сперва лѣваго берега Унгуры, переходитъ въ одной верстѣ выше устья Ады на правый

<sup>1)</sup> Чекановскій, 1. с., pag. 315.

<sup>2)</sup> Обручевъ, Изв. В.-Сиб. Отд. И. Р. Геогр. Общ. Т. XXI, № 3, стр. 10—20, а также Горн. Журн. 1890 г. № 12, стр. 431—442,

<sup>3)</sup> См. выше, стр. 280.

берегъ рѣки и ведетъ сперва по широкому луку, залитому во время проѣзда Обручева водой, на которомъ расположены остатки бывшихъ здѣсь тунгузскихъ юртъ. За лугомъ въ долину вдается широкій и пологій мысъ, отходящій отъ возвышенности праваго склона и лишенный обнаженій. За мысомъ находится падъ довольно большой рѣчки, на лѣвомъ берегу которой торчатъ скалы, переходящія затѣмъ и на правый берегъ Унгуры. Выступающія на крутомъ склонѣ скалы, или лучше говоря косые гребни, состоятъ изъ сланцеватой мелкозернистой породы, издающей глинистый запахъ и вскипающей отъ кислоты. Микроскопъ обнаруживаетъ слѣдующія ея составныя части: округленные зерна кварца, полевого шпата, роговой обманки, хлорита, чешуекъ бѣлой и черной слюды, связанныхъ между собою глинисто-известковымъ цементомъ. Обручевъ относитъ эту породу къ сѣрой ваккѣ, т. е. къ древнимъ песчаникамъ, происшедшимъ отъ разрушенія древнихъ кристаллическихъ породъ архейской системы — гранитовъ, гнейсовъ и кристаллическихъ сланцевъ. Вслѣдствіе сланцеватости Обручевъ даетъ ей названіе *сѣровакковой сланца*, тѣмъ болѣе, что выше по Унгурѣ встрѣчается плотная, плитковатая сѣрая вакка, а на верховьяхъ тойже рѣки сѣровакковый конгломератъ. Подобныя только что описанной породы встрѣчаются и въ другихъ мѣстахъ и описаны Чекановскимъ <sup>1)</sup> подъ именемъ то шальштейноваго конгломерата, то зернистаго, землистаго и плитковатаго шальштейна <sup>2)</sup> и зеленыхъ метаморфическихъ сланцевъ <sup>3)</sup>, а Черскимъ подъ названіемъ сѣровакковыхъ глинистыхъ сланцевъ и сѣровакковыхъ кварцитовидныхъ метаморфическихъ песчаниковъ <sup>4)</sup>. Паденіе пластовъ описаннаго сланца на ю.-в.  $10\frac{1}{2}^{\circ}$  подъ угломъ въ  $36^{\circ}$ . Такимъ обра-

<sup>1)</sup> Чекановскій, Зап. Сиб. Отд. И. Р. Геогр. Общ. Т. XI, стр. 250—262.

<sup>2)</sup> Ibidem, pag. 278—288.

<sup>3)</sup> Ibidem, pag. 276—278.

<sup>4)</sup> Черскій, Изв. Сиб. Отд. И. Р. Геогр. Общ. Т. XI, № 1—2.

зомъ, сопоставляя с.-з. паденіе известняковъ, развитыхъ по р. Адѣ (см. выше) и только что описанное, мы получаемъ антиклинальную складку между устьями Ады и описываемой рѣчки.

Въ небольшомъ обнаженіи за падью лѣваго притока этой рѣчки замѣчается почти горизонтальное залеганіе зеленовато-сѣрой плитчатой породы. Это ничто иное какъ болѣе свѣтлая, болѣе крупнозернистая, несланцеватая разность вышеописанной породы. Далѣе тропа пересѣкаетъ два правыхъ притока Унгуры, рѣчки Марикту и Аяканъ. Изъ нихъ Аяканъ течетъ по широкой пади съ пологими склонами, усѣянной валунами и обломками зеленовато-сѣраго песчаника. За слѣдующимъ ручьемъ, впадающимъ также справа въ Унгуру, которому Обручевъ предложилъ названіе Медвѣжьяго, въ обнаженіи виднѣтъ зеленовато-сѣрый, мелкозернистый сѣровакковый песчаникъ съ паденіемъ слоевъ на ю.-в.  $9\frac{1}{2}^{\circ}$  подъ угломъ  $35-38^{\circ}$ . Этотъ песчаникъ, отличающійся отъ вышеописаннаго большимъ содержаніемъ черной и бѣлой слюды, перемежается здѣсь съ прослойками сѣровакковаго сланца въ 2—3 дюйма толщины. Мѣстами пласты песчаника пересѣчены жилками молочнобѣлаго или красноватаго кварца. Выше Медвѣжьяго ручья въ Унгуру справа впадаетъ многоводная рѣчка Зоктунъ, обладающая въ верхнемъ своемъ теченіи з.-ю.-з. направленіемъ, т. е. параллельнымъ Унгурѣ, но поворачивающаяся за нѣсколько верстъ до впаденія на югъ.

Поднимаясь по Зоктуну, какъ педедали Обручеву проводники, можно перебраться по довольно пологому, но крайне болотистому перевалу, на лѣвыя верховья рѣки Якшалъ, лѣваго притока Сармы. Не доходя до устья Зоктуна, тропа, чтобы избѣгнуть болотъ въ его устьѣ, переходитъ снова на лѣвый берегъ Унгуры, гдѣ впадаютъ въ нее двѣ рѣчки Нижній и Верхній Унгурханы, изъ которыхъ Верхній на вѣстѣ Черскаго названъ Бильчиромъ. Миновавъ устье Зоктуна, тропа возвращается на правый берегъ Унгуры и пересѣкаетъ затѣмъ пади двухъ небольшихъ ручьевъ. За вто-

рытъ изъ нихъ можно встрѣтить снова обнаженіе зелено-  
вато-сѣраго сѣровакковаго песчаника съ паденіемъ пластовъ  
на с.-в.  $72^{\circ}$ , подъ почти прямымъ угломъ. Немного дальше  
паденіе пластовъ того же песчаника измѣняется въ ю.-в.  
подъ угломъ  $50-60^{\circ}$ , а еще далѣе паденіе снова на с.-з.  
подъ прямымъ угломъ. Отъ Зоктуна пятый ручей съ правой  
стороны названъ Обручевымъ рч. Болотной. Рѣчка эта  
протекаетъ по весьма широкой пади съ пологими склонами,  
лишенными всякихъ обнаженій; посреди гальки, обильно  
устилающей долину, можно встрѣтить сѣровакковый песчаникъ  
зеленоватаго цвѣта, такой же сланецъ и рогово-обманковый  
гранитъ. Лѣвый берегъ Унгуры между Верхнимъ Унгурха-  
номъ и слѣдующимъ за нимъ притокомъ Харгитуемъ пред-  
ставляетъ весьма крутой и высокій (200—300 метр.) склонъ,  
имѣющій видъ высокой лѣсистой горы съ слабоволнистымъ  
гребнемъ. Тутъ въ 2—3 верстахъ выше устья Болотной въ  
Унгуру изливается ручей, названный Обручевымъ Камен-  
истымъ, текущій по пади, на лѣвомъ склонѣ которой имѣется  
обнаженіе зеленовато-сѣраго сѣровакковаго песчаника съ па-  
деніемъ пластовъ на ю.-в.  $9^{\circ}$  подъ угломъ въ  $48^{\circ}$ , а затѣмъ  
слѣва же впадаетъ рч. Харгитуѣ, стекающая съ Ангин-  
скаго гольца, прекрасно виднаго въ верховьяхъ совершенно  
прямой долины упомянутой рѣчки. За Харгитуемъ долина  
Унгуры расширяется, и склоны ея становятся пологими. До-  
лина и склоны представляютъ собой мховыя болота, поросшія  
рѣдкимъ лѣсомъ, и лишены вовсе обнаженій. Въ 5—6  
верстахъ отъ Харгитуа находится слияніе двухъ рѣчекъ,  
составляющихъ Унгуру. По лѣвой изъ нихъ отправился Об-  
ручевъ и вступилъ, направляясь по правому ея склону  
въ область обширныхъ росыпей валуновъ и обломковъ кон-  
гломерата и сѣровакковаго песчаника. Значительное коли-  
чество этихъ валуновъ и обломковъ конгломерата въ однихъ  
мѣстахъ заставляеть предположить залеганіе подъ росыпью  
коренной породы—сѣровакковаго конгломерата, состоящаго

изъ мелкозернистой сѣро-зеленой массы, цементирующей овалатную гальку кварцита и сѣраго глинистаго сланца. Далѣе обломки песчаника становятся рѣже и замѣняются глинистымъ сланцемъ, выходы котораго обнаруживаются въ плоскихъ склонахъ. Этотъ то сѣровакковый конгломератъ Обручевъ и считаетъ за нижній членъ силурійскихъ сѣровакковыхъ породъ, залегающихъ на болѣе древнемъ глинистомъ сланцѣ. Такимъ образомъ вся свита сѣровакковыхъ породъ отъ рч. Безъимянки <sup>1)</sup> до росыпи конгломерата можетъ быть отнесена, по мнѣнiю путешественника, къ ярусу № 4, установленному Черскимъ, т. е. къ верхнему ярусу нижняго отдѣла силурійскихъ породъ. Лѣвая Унгуръ притекаетъ съ юга по широкой болотистой долинѣ, правая же Унгуръ течетъ съ востока по болотистой мѣстности изъ озера въ озерко въ видѣ маленькаго ручейка. По Правой Унгурѣ ведетъ тропа на перевалъ черезъ Онотскій хребетъ въ верховье Якшалала. Перевалъ этотъ поросъ густымъ кедровымъ лиственничнымъ лѣсомъ. Его высшій пунетъ, представляющій площадь въ нѣсколько квадратныхъ верстъ, достигаетъ высоты 3960 — 4290' н. ок. (1200—1300 метр. по Обручеву).

Спускъ въ долину Якшалала гораздо круче спуска въ Унгуръ. Вершины Онотскаго хребта, видимыя съ перевала, имѣютъ округлыя очертанiя и почти всѣ покрыты лѣсомъ. Ангинскій голецъ въ видѣ пологого купола видѣнъ на ю.-з., Сарминскій голецъ на ю.-ю.-в., между ними возвышается наиболѣе удаленный отъ перевала Харгойскій, а на сѣверѣ видѣется низкій Якшалальскій, едва переходящій за предѣлы лѣсной растительности. Такъ какъ вершина послѣдняго недоступна вслѣдствiе скалистости, болотъ и бурелома, то Обручевъ съ перевала направился на ю.-в., перевалилъ черезъ гребень между Якшалаломъ и слѣдующимъ за нимъ лѣвымъ притокомъ Сармы Успаномъ и спустился

<sup>1)</sup> Правый притокъ Унгуръ нѣсколько ниже Марины.

въ долину послѣдней. На перевалѣ вовсе не оказалось обнаженій, а попадавшіеся на пути обломки горныхъ породъ принадлежали темно-сѣрому глинистому сланцу, зеленовато-сѣрому глинисто-сланцистому сланцу и сѣрвакковому песчаннику. Послѣднія двѣ породы попадались рѣдко.

Въ долину Успана тропа направляется по крутому лѣвому склону ущелья небольшого ручья. Тутъ въ нижней части спуска наблюдается выходъ глинистаго сланца съ паденіемъ на с.-з.  $7\frac{1}{2}^{\circ}$  подъ угломъ въ  $22^{\circ}$ ; немного далѣе встрѣчены глыбы плотнаго известняка темно-сѣраго цвѣта, такого-же цвѣта кварцита, заключающаго чечевицеобразныя черныя включенія въ 1—1,5 мил. величиной. Быть можетъ, полагаетъ Обручевъ, эти включенія окажутся неясными остатками маленькаго трилобита.

Успанъ беретъ начало у подошвы Ангинскаго хребта, въ 8—10 верстахъ отъ описаннаго перевала, и течетъ затѣмъ прямо на с.-с.-в. по весьма узкой и глубокой долинѣ (высота склоновъ равна 990—1056', 300—320 метр. по Обручеву), не принимая до самаго своего устья въ Сарму какихъ-либо значительныхъ притоковъ. Нижнее теченіе его становится болѣе извилистымъ. Въ лѣвомъ склонѣ Успана, на мѣстѣ спуска съ перевала, обнажается глинистый сланецъ съ паденіемъ на с.-з. подъ угломъ  $40-70^{\circ}$ . Въ валунахъ можно встрѣтить здѣсь глинистый сланецъ, бѣлый кварцъ, желтовато-бѣлый кварцитъ, роговообманковый гранитъ, брекчію изъ кусковъ глинистаго сланца, цементированныхъ бѣлымъ кварцемъ, и слюдистый гнейсъ, что указываетъ на нахожденіе въ верховьяхъ Успана выходовъ кристаллическихъ породъ, между тѣмъ какъ по среднему и нижнему теченіямъ Обручеву удавалось находить только выходы глинистыхъ сланцевъ, кварцитовъ и известняковъ, относящихся съ нижнему ярусу свлурійской системы.

Въ нѣсколькихъ мѣстахъ лѣваго склона долины выступаютъ скалы плотнаго сѣраго известняка, обрывающіяся

нерѣдко прямо въ рѣку отвѣсной стѣной, на вершинѣ которой торчатъ острые пики. Въ 10 верстахъ отъ устья выступаетъ подобная скала, имѣющая видъ неправильнаго конуса. Въ скалѣ замѣтно сквозное отверстіе высотой приблизительно въ 3—3½ саж., шириной въ 2½—3 саж., длиной въ 7—8 саж. Между тѣмъ правый склонъ долины Успана болѣе пологій, покрытъ лѣсомъ и моховыми болотами и представляетъ мало обнаженій. Противъ известняковыхъ скалъ обнажаются розовато-сѣрые кварциты съ паденіемъ пластовъ или на с.-з. или на ю.-в. подъ углами 50—85°. Въ общемъ долина рѣдко достигаетъ болѣе 100 саж. ширины, при ширинѣ рѣки всего въ нѣсколько сажень, и ближе къ устью изобилуетъ лужайками и чащами тальника.

Изъ стратиграфическихъ данныхъ Обручевъ выводитъ, что известняки залегаютъ ниже глинистыхъ сланцевъ, а кварциты ниже известняковъ; вся же эта свита соответствуетъ нижнимъ ярусамъ нижняго отдѣла силурійской системы по классификаціи Черскаго.

Спустившись по Успану, Обручевъ достигъ р. Сармы, которая въ данномъ мѣстѣ представляетъ собою большую и быструю рѣку. Долина ея то расширяется, то стѣсняется скалами въ ущелье. Глубина рѣки достигаетъ внѣ перекатовъ, гдѣ глубина не превышаетъ 1 метра, довольно значительной величины. Вслѣдствіе быстроты теченія и массы валуновъ, разбросанныхъ по ея руслу, Сарма не легко переходитъ въ бродъ. Перебравшись на лѣвый берегъ Сармы, устья Успана, путешественникъ поднялся на отрогъ гольца, расположеннаго въ треугольникѣ между Сармой и лѣвымъ ея притокомъ Нуганомъ и названнаго Обручевымъ Нуганскимъ гольцомъ. Подъемъ оказался въ 5—6 верстъ длинны и лишенъ обнаженій; только валуны и обломки бѣлаго кварца, мелкозернистаго кварцита и зеленовато-сѣраго филита свидѣтельствуютъ о томъ, что названныя породы принимаютъ участіе въ сложеніи гольца. Небольшая куполооб-



разная вершина усыпана плитками кварцита и поросла кедровым сланцемъ. Высота его опредѣляется въ 2400—2700<sup>1)</sup> н. ок. Съ вершины гольца можно видѣть окрестности на далекое разстояніе. Видно во-первыхъ, что Сарминскій гольецъ выше Нуганскаго на 1320—1650' (400—500 метр. по Обручеву), во-вторыхъ, что Сарма течетъ съ сѣвера и только въ 10 верстахъ отъ гольца поворачиваетъ на в.-с.-в. (этимъ вводится поправка на картѣ Черскаго, показывающей теченіе ея съ с.-в.), далѣе видно, что Успанъ и Якшаль текутъ по параллельнымъ долинамъ, разобщеннымъ отрогомъ не въ 10 верстъ ширины, какъ показано на картѣ Черскаго, а въ 2—3 версты; что наконецъ верховье Якшала состоитъ изъ нѣсколькими рѣчками. Рѣчка Нуганъ протекаетъ у сѣверной подошвы гольца почти прямолинейно съ востока на западъ, Параллельно Сармѣ справа впадаетъ въ Нуганъ падъ Сухая, правый склонъ которой постепенно поднимается до водораздѣла между ней и Сармой, а на лѣвомъ торчатъ зубчатые скалы. Съ с.-в. въ долину Сармы спускаются лѣсистые контрфорсы Оютскаго хребта; на ю.-в. виденъ гребень послѣдней цѣпи Приморскаго хребта, за которымъ можно въ дали различить купола Ольхонскихъ горъ. Таковъ видъ, представившійся путешественнику съ вершины Нуганскаго гольца.

Затѣмъ Обручевъ спустился по крутому сѣверному склону гольца, поросшему рѣдкимъ горѣлымъ лѣсомъ въ долину р. Нугана, длина которой около 12—15 верстъ. Верховье его, находящееся на сѣверо-западномъ склонѣ послѣдней цѣпи При-

<sup>1)</sup> Въ статьѣ Обручева нѣтъ соответствія между высотами на картѣ, выраженными очевидно въ футахъ и цифрами въ текстѣ, выраженными въ метрахъ, такъ-что является затрудненіе предположить, гдѣ допущена ошибка въ перечисленіи. Такъ напр. въ данномъ случаѣ въ текстѣ поставлены цифры высоты Нуганскаго гольца надъ океаномъ 1200—1300 метр., надъ Байк. 700—800 метр. и надъ уровнемъ Сармы 500—600 метр., чтобы дало въ футахъ 3960—4290' н. ок., 1650—1980' надъ ур. Сармы и 2310—2640 н. Байк., считая въ метрѣ 3,3 фута, а въ 2400—2700' н. ок. и т. д., какъ показано на картѣ. Мы придемъ къ своему обозначенію на картѣ.

морского хребта, отличается обширными наледями, не тающими до начала августа. На пологих склонах Нугана выступают мѣстами скалы известняка, мѣстами же обнажается филлитъ, въ условіяхъ, дающихъ возможность путешественнику заключить о чередованіи пластовъ филлита и мелкозернистаго известняка. Паденіе пластовъ здѣсь на ю.-в.  $8\frac{1}{2}^{\circ}$  или на с.-з.  $8\frac{1}{2}^{\circ}$  подъ углами  $40-70^{\circ}$ . Дойдя до устья Нугана, путешественникъ направился по лѣвому берегу Сармы до устья Успана. Лѣвый склонъ долины Сармы сперва болѣе или менѣе пологій, болотистый и поросъ густымъ лѣсомъ, противъ же устья Якшала онъ становится крутымъ и представляетъ собой или обнаженные осыпи или скалы известняка и кварцита. Подобныя же осыпи и скалы сопровождаютъ лѣвый склонъ долины Сармы и ниже устья Успана. Между тѣмъ правый склонъ долины на описанномъ отрѣзкѣ остается все время крутымъ и мѣстами скалистымъ, какъ на примѣръ трехголовая известняковая скала выше устья Якшала. Противъ устья Успана Обручевъ перешелъ снова на правый берегъ Сармы и рассчитывалъ его уже не покидать, а по нему дойти до устья Сармы въ Байкалъ, но такъ какъ проводники не знакомы были съ этою частью теченія Сармы, которая, судя по слухамъ, протекаетъ здѣсь по трудно доступнымъ даже пѣшеходцу ущельямъ, другихъ же проводниковъ нельзя было достать, то путешественникъ поднялся по правому склону Сармы на возвышенность Приморского хребта и направился на ю.-ю.-в. къ Байкалу.

Возвышенность эта представляетъ собой густую кедровую тайгу. Въ 3—4 верстахъ отъ устья Успана путешественнику преградило путь глубокое и узкое ущелье съ обрывистыми и неприступными склонами, на днѣ котораго ревѣлъ горный ручей. Пришлось обойти съ верховья этотъ ручей, а затѣмъ только продолжать путь въ намѣченномъ направленіи. Пройдя версть 4—5 по этому направленію, путешественникъ добрался до лѣваго обрыва небольшого праваго

притока Сармы. Вслѣдствіе глубины долины этой рѣчки Обручевъ далъ ей названіе Глубокой. Обрывъ этотъ возвышается на 1650' (500 метр. по Обручеву) надъ уровнемъ долины. На всемъ пути между устьемъ Успаномъ и рч. Глубокой обнаженій вовсе не встрѣчалось, только валуны кварцита и біотитоваго гнейса всюду въ изобиліи торчали изъ подъ мха.

Спустившись съ большимъ трудомъ по лѣвому склону въ долину Глубокой, Обручевъ направился внизъ по направленію къ Сармѣ. Во время спуска мѣстами можно было наблюдать выходы мелкозернистыхъ слюдистыхъ кварцитовъ съ паденіемъ слоевъ на ю.-в.  $10^{\circ}$  подъ угломъ въ  $70-80^{\circ}$ . Ущелье Глубокой оказалось весьма узкимъ и усѣяннымъ громадными валунами кварцита, гнейса и гранита, покрытыми вѣт русла рѣчки мхомъ и весьма рѣдкимъ лѣсомъ. Самая рѣчка достигаетъ не болѣе какъ  $1\frac{1}{2}$  саж. въ ширину и мчитъ со страшной быстротой по крупнымъ валунамъ.

Подобнымъ обходомъ Обручевъ рассчитывалъ миновать неприступное Сарминское ущелье и, спустившись по Глубокой, очутиться ниже его, но надежда не сбылась и, подойдя къ Сармѣ, путешественникъ убѣдился въ томъ, что тѣснина оказалась еще впереди. Противъ устья Глубокой Сарма въ нѣсколько десятковъ метровъ шириной стремительно мчитъ по громаднымъ валунамъ, достигающимъ иногда 1—2 куб. саж. Такъ какъ въ ямахъ между валунами глубина рѣки достигаетъ 1 саж., то разумѣется не могло быть и мысли о переправѣ черезъ нее ни въ бродъ ни на плотахъ. Направиться же внизъ по ея правому берегу тоже не было возможности, такъ какъ тутъ тянулась сплошная осыпь громадныхъ глыбъ, занимавшая весь склонъ, а дамы путь преграждали скалы, отвѣсно обрывавшіяся въ рѣку. Путешественнику поневолѣ пришлось вернуться тѣмъ же путемъ на возвышенность Приморскаго хребта, чтобы не возвращаться въ долину Сармы. Поднявшись такимъ

образомъ на Приморскій хребетъ, Обручевъ вступилъ въ область лиственничной тайги, занимающей болотистую и каменистую равнину, представляющую плоскую возвышенность упомянутого хребта. Чтобы лучше ориентироваться въ мѣстности, путешественникъ взобрался на скалу, сложенную изъ мясокраснаго гранито-гнейса съ пластообразной отдѣльностью и паденіемъ пластовъ на с.-с.-з. подь угломъ 25—30° и одиноко торчавшую среди однообразной тайги, и ему представился слѣдующій видъ. Къ сѣверу и западу разстиались, на большое разстояніе лѣса по плоской равнинѣ, на которой тамъ и сямъ возвышались холмы съ торчащими на нихъ небольшими скалами; на ю.-з. равнина упиралась въ высокую гриву, окаймляющую съ сѣвера долину р. Кучулги (см. ниже); на востокъ равнину отдѣлялъ отъ спуска къ Сармѣ невысокій гребень, усаженный отдѣльными скалистыми вершинами; наконецъ на ю.-в. виднѣлась зеркальная поверхность Малаго Моря, а дальше мысы Воротъ и Ольхонскія горы.

Чтобы спуститься къ Байкалу, Обручевъ хотѣлъ воспользоваться падью Итырхей, но она оказалась непригодной для этой цѣли, такъ какъ сперва, въ верхней своей части, представляетъ сплошную розсыпь валуновъ, а затѣмъ превращается въ узкое ущелье, надъ которымъ торчатъ скалы чернаго біотитоваго гнейса, на днѣ которой бѣшено мчится ручей<sup>1)</sup>. Пришлось слѣдовать по лѣвому склону этой пади, прокладывая себѣ путь среди чащей осиноваго подлѣска, и наконецъ спуститься къ Байкалу по сосѣдней небольшой ложинкѣ. Отсюда Обручевъ двинулся къ лѣтникамъ Сарминскаго улуса, расположеннымъ въ устьѣ рч. Итырхей, гдѣ онъ и остановился на отдыхъ.

---

<sup>1)</sup> Впослѣдствіи Обручевъ узналъ отъ бурятъ Сарминскаго улуса, что по Итырхею можно проѣхать верхомъ, чѣмъ пользуются, чтобы обойти Сарминское ущелье. Поднявшись по Итырхею на Приморскій хребетъ, буряты спускаются по Глубокой до Сармы по тому же пути, которымъ шелъ путешественникъ.

Экскурсія Черского съ долины Боро-елгай на р. Ангу и Таржиранскія озера; перевалъ черезъ Приморскій хребетъ въ промежутокъ между Вугульдейкою и Ангою.

Экскурсію эту Черскій началъ съ берега Байкала, съ устья въ него описанной уже выше Боро-елгайской долины (6-го іюля 1879 г.) около 20 верстъ западнѣе устья р. Анги. На прибрежной террасѣ aneroidъ показалъ высоту въ 53' надъ озеромъ; отсюда путешественникъ направился вверхъ по лѣвой вѣтви Боро-елгай, ведущей прямо къ крутому подъему на береговую высоту. Въ террасѣ обнажается слегка цементированный известью наносный озерный песокъ, а горы состоятъ изъ перемежающихся: полевошпатowychъ породы и роговообманковаго сланца съ кристаллическимъ известнякомъ. Ближайшій высшій пунетъ, достигающій 597' надъ Байкаломъ, образуетъ и водораздѣлъ между долинами Боро-елгай и Большою Крестовкою, къ которой путешественникъ спустился по небольшой ея правой вѣтви; на перевалѣ располагается озеровидное углубленіе почвы. Пласты являются здѣсь значительно изогнутыми, отличаюсь неправильностями въ простираниіи. Крестовка, отстоя здѣсь всего лишь въ 5 верстахъ къ с.-в. отъ озера, слѣдуетъ въ общемъ почти къ востоку; благодаря безлѣсности и скудости даже травянистой растительности на поверхности каменистой почвы, видно, что выше по направленію долины особенно обильны пласты известняка, бѣлѣющіе издали. Крестовскій улусъ расположенъ на высотѣ 351' надъ Байкаломъ; отъ него тропа поднимается на слѣдующій гребень горъ, отдѣляющій Крестовку отъ системы рч. Еланцы, и, направляясь на с.-в., достигаетъ высоты 950' надъ Байкаломъ; къ востоку отъ дороги, въ долину называемой Нуръ, располагается сомнительный бурятскій улусъ, а вблизи него маленькое озеро, отъ котораго долина получила свое наименованіе; на поверхности почвы можно видѣть цѣлый рядъ выходовъ известняка (головы пластовъ), съ паденіемъ близкимъ здѣсь къ западному.

на высотахъ этихъ, какъ равно и въ другихъ мѣстахъ прибрежной полосы горъ и на Ольхонѣ, Черскій видѣлъ не малое количество чаекъ (*Lagus*), занимающихся столь несвойственнымъ, повидимому, для нихъ ремесломъ, какъ ловля кузнечиковъ («кобылка» у мѣстныхъ жителей), весьма обильныхъ не только по этимъ безлѣснымъ и сухимъ мѣстамъ, но и вообще по Иркутской губерніи, гдѣ они нерѣдко производятъ значительныя опустошенія посѣвовъ. Къ перевалу около Нурайскаго улуса (Нуръ) приходитъ еще другая тропа съ юго-запада, по которой Черскій достигъ съ низовьевъ Большой Бугульдейки того-же пункта, съ которымъ мы ознакомимся теперь-же, чтобы не возвращаться уже болѣе къ западной части прибрежной полосы горъ. Дорога эта слѣдуетъ сначала вверхъ по знакомой намъ уже сухой долині, открывающейся съ лѣвой стороны въ Бугульдеку вблизи ея устья. Верховья, вѣрнѣе верхняя часть этой безводной продольной долины, въ противоположность низовьямъ, поростають мѣстами лѣсомъ; на высотѣ 588' надъ Байкаломъ тропа приводитъ къ спуску въ долину Малой Бугульдейки, углубившейся здѣсь до высоты всего лишь 247' надъ озеромъ. Условія конфигураціи мѣстности, принимающей здѣсь холмистую наружность, требовали бы болѣе подробнаго ея изслѣдованія и возможно подробной топографической съѣмки: при поверхностномъ же обзорѣ ея кажется, что наша безводная долина въ сущности здѣсь не оканчивается, а продолжается еще далѣе къ сѣверо-востоку, тогда какъ наружность мѣстности и прежняго продолженія верховьевъ древней долины измѣнились только вслѣдствіе позднѣйшаго образованія и углубленія Малой Бугульдейки, проложившей болѣе близкій стокъ водамъ къ Байкалу. Обнажающаяся здѣсь нерѣдко порода (неопредѣленный еще грюнштейнъ), считавшаяся Чекановскимъ изверженною, обнаруживаетъ мѣстами ясную слоистость отъ соотвѣтственнаго расположенія минераловъ (паденіе пластовъ измѣняется отъ

в.-ю.-в. до з.-с.-з.) и, по мнѣнію Черскаго, можетъ быть разсматриваема какъ производная отъ плагіоклазоваго роговообманковаго гнейса. Далѣе къ сѣверо-востоку слѣдуетъ подъемъ на значительно повывсившіяся и поросшія лѣсомъ горы, высшій пунктъ которыхъ по этой дорогѣ достигаетъ 1451' надъ Байкаломъ; здѣсь-же находится бурятскій улусъ, называемый Доло-мотѣ, отъ котораго ложбина принимаетъ уже наклонъ къ с.-с.-в., а далѣе къ юго-востоку располагаются верховья знакомой намъ уже Мортуйской долины. Въ обнаженіяхъ преобладаетъ гнейсогранитъ, переходящій въ очковый гнейсъ, т. е. въ «байкальскій гнейсъ» Чекановскаго. Съ указанной выше высоты, по пересѣченіи незначительной долины Мухорь-Булукъ, слѣдуетъ крутой спускъ въ весьма живописную, широкую и безлѣсную котловину Булукъ, лежащую на высотѣ 883' надъ Байкаломъ; она принадлежитъ уже системѣ верховьевъ Большой Крестовки; отсюда Черскій направился къ упомянутому выше Нурайскому улусу и къ спуску въ долину рч. Еланцы, праваго притока р. Анги.

Тропа ведетъ сначала внизъ по долинѣ Хмсѣ, составляющей короткую лѣвую вѣтвь низовьевъ Нарынъ-Кунти, которая впадаетъ въ Еланцу съ правой стороны, около расположенной тамъ деревни Кунтинской, на высотѣ 826' надъ Байкаломъ. На этомъ пути, судя по роскнпямъ и неяснымъ выходамъ, пересѣкаются перемежающіеся пласты гнейса и известняка, простираніе которыхъ приближается здѣсь уже къ правильному, именно къ сѣверо-восточному. Вблизи Кунтинской деревни, въ той-же долинѣ расположенъ выселокъ Тѣргентъ; здѣсь же построенъ небольшой, недѣйствующій нынѣ стеклянный заводъ. Въ обѣихъ упомянутыхъ деревняхъ 26 дворовъ и 170 жит. Деревни эти принадлежатъ къ составу Манзурской волости Верхотенскаго округа, при описаніи которой мы еще будемъ имѣть случай говорить объ ихъ экономическомъ положеніи. Черезъ деревню эту проходитъ продолженіе упомянутой выше Ольховской

роги, проложенной сюда съ сѣвера, съ деревни Куретской на р. Ангѣ, черезъ соотвѣтственную часть Приморскаго хребта, съ которою мы ознакомимся ниже. Изъ Кунтинской деревни дорога эта поворачиваетъ къ сѣверо-востоку, внизъ по долинѣ Еланцы, куда направился и Черскій, чтобы осмотрѣть выходъ р. Анги изъ хребта Приморскаго. Сейчасъ же ниже деревни располагается объемистое возвышеніе почвы, слѣдующее поперечному къ долинѣ направленію, вслѣдствіе чего этотъ отъзокъ ея принимаетъ котловинообразную наружность. Главнѣйшій интересъ этой долины состоитъ въ томъ, что она обнаруживаетъ весьма наглядно постигшія ея преобразованія отъ углубленія русла соименной рѣчки. Препрежне дно этой долины, на которомъ расположены и поименованныя выше деревни, продолжается видимо къ сѣверо-востоку, понижаясь довольно равномѣрно и сохраняя какъ ширину, такъ и всѣ другія характерныя особенности, связанныя съ каменистостью и сухостью; между тѣмъ русло Еланцы, углубившись болѣе тѣмъ на 150' въ это древнее дно, образовало, если можно такъ выразиться, настоящую долину въ долинѣ, постепенно превращая болѣе древнее дно въ террасовидныя площадки, лежащія на соотвѣтственной высотѣ надъ современнымъ уровнемъ рѣчки, къ которому спускается и Ольхонская дорога. Кромѣ продольнаго углубленія русломъ Еланцы, дно древней долины подверглось мѣстами и поперечному расчлененію, благодаря вѣтвямъ, т. е. притокамъ рѣчки, приходящимъ съ Приморскаго хребта, какъ напр. долиною Шалоты, въ которой располагается и соименный бурятскій улусъ. Въ обнаженіяхъ наблюдается все таже перемежаемость полевошпатовыхъ породъ съ известнякомъ, входящимъ въ составъ дна долины; около Шалоты гнейсъ переходитъ въ кварцитъ; простираніе пластовъ вездѣ сѣверо-восточное, съ паденіемъ на ю.-в., такъ-что долину Еланцы можно считать хорошимъ образцомъ продольныхъ долинъ. Характеръ углубленной долины значительно отличается отъ физіо-



гномиі древняго дна, въ которое она врѣзалась, что обусловлено большею влажностью; довольно густая зелень травяной растительности усиливается еще по мѣрѣ приближенія къ низовьямъ, хотя неблагоприятныя климатическія условія мѣстности обнаруживаются уже тѣмъ обстоятельствомъ, что Черскій, даже 6-го іюля, видѣлъ здѣсь, въ нѣсколькихъ мѣстахъ площадки, покрытыя нерастаявшимъ еще льдомъ. Наконецъ, передъ глазами путешественника открывается весьма живописное расширеніе долины Еланцы на мѣстѣ ея сліянія съ Ангою. Дно этой озеровидной котловины отличается вполне луговымъ характеромъ, густота зелени еще усиливается отчасти болотистымъ свойствомъ почвы, причемъ не маловажнымъ украшеніемъ являются во-первыхъ группы деревьевъ, разбѣянные по долинѣ и густой тальникъ, поростающій берега какъ Еланцы, такъ и самой Анги, во-вторыхъ, миссіонерская церковь и небольшая деревня Еланца, построенная въ той же котловинѣ, на высотѣ 382' надъ уровнемъ Байкала; кромѣ того пейзажъ оживляется и нѣсколькими бурятскими улусами. Еще большую прелесть придаютъ этой мѣстности окружающія еѣ горы, которымъ недостаетъ только альпійскаго характера для того, чтобы соперничать съ пейзажами Швейцаріи или нѣкоторыхъ долинъ системы р.р. Иркуты, Китоя и Бѣлой. Съ сѣверной стороны горизонтъ закрывается склономъ хребта Приморскаго, опускающимся здѣсь прямо и непосредственно въ котловину. Болѣе или менѣе густо поросшій лѣсомъ хребетъ этотъ нѣсколько понижается къ западу, тогда какъ къ востоку, вѣрнѣе къ с.-в., гребень его снабженъ нѣсколькими весьма тупыми и низкими вершинами. Въ этой части хребта виднѣется и долина пересѣкающей его ущелистой части р. Анги, на лѣвомъ берегу которой хребетъ является нѣсколько расчлененнымъ продольными долинами, вслѣдствіе чего онъ состоитъ какъ бы изъ трехъ параллельныхъ отроговъ, высота которыхъ возрастаетъ по направленію къ осевой части хребта. Съ сѣвера

восточной и восточной стороны площадь котловины ограничивается цѣлымъ рядомъ крутыхъ, почти отвѣсныхъ утесовъ, пестрящихся отъ входящихъ въ составъ ихъ известковыхъ пластовъ; утесы эти несравненно ниже Приморскаго хребта и образуютъ собою поперечный разрѣзъ сѣверо-восточнаго продолженія прибрежной полосы горъ; около образуемой ими живописной скалистой стѣны протекаетъ Анга, послѣ выхода изъ ущелья. Склонъ южной части той-же прибрежной полосы горъ окаймляетъ площадь котловины съ юго-востока, между тѣмъ какъ къ юго-западу виднѣется знакомая намъ уже суженная часть долины Еланцы. Ближайшій осмотръ окружающихъ горъ обнаруживаетъ, что интересующее насъ расширеніе образовалось на счетъ дна той-же древней долины, въ которую, какъ мы видѣли выше, врѣзалась и углубилась современная Еланца. Въ томъ, что эта древняя долина продолжалась до самаго выхода р. Анги изъ ущелья, убѣждаетъ насъ то обстоятельство, что вдоль прилежащаго склона Приморскаго хребта и на соотвѣтственной высотѣ надъ уровнемъ низовьевъ Еланцы, располагается терраса, хорошо замѣтная даже съ деревни (Еланцинской) и являющаяся прямымъ продолженіемъ размытой и уничтоженной части прежняго болѣе высокаго дна. Въ свою очередь, взглянувъ на сѣверо-восточное продолженіе склона Приморскаго хребта, начиная съ той-же высоты лѣваго берега выхода долины Анги изъ ущелья, Черскій видѣлъ отчетливую террасу, служащую какъ бы продолженіемъ развитой на западѣ, какъ будто древняя долина Еланцы продолжалась еще далѣе къ сѣверо-востоку, пересѣкая современную долину р. Анги. Но здѣсь-же, начиная съ упомянутой выше скалистой стѣны, ограничивающей интересующее насъ расширеніе съ сѣверо-востока, соотвѣтственно возвышается и вся мѣстность, скрывающая продолженіе какъ бы сливающейся съ нею террасы. Черскій не располагалъ достаточнымъ временемъ, чтобы сдѣлать еще экскурсію къ сѣверо-востоку, вдоль склона Приморскаго

хребта, но восхождение на высоты лѣваго берега Анги въ этомъ мѣстѣ привело его къ слѣдующему предположенію, которое онъ ставитъ на видъ будущимъ изслѣдователямъ этой, весьма интересной мѣстности: долина Уланъ-Бургаса, лѣваго притока р. Анги, извѣстнаго намъ по изслѣдованіямъ Чекановскаго, располагаясь приблизительно на той-же высотѣ, какъ и древняя долина Еланцы, продолжалась прежде прямолинейно, вдоль подножья Приморскаго хребта и въ нижней своей части на встрѣчу современному устью Еланцы, и только въ послѣдствіи низовья Уланъ-Бургаса отклонились къ юго-востоку, къ нынѣшнему его устью. Четырехверстный отрѣзокъ долины, оставшійся сухимъ послѣ такого поворота названной рѣчки, подвергся затѣмъ измѣненію его прежнихъ особенностей вслѣдствіе размыва, въ которомъ участвовалъ и современный маленькій лѣвый притокъ Анги, вмѣщающій небольшое озеро—Хара-н-уръ (Черное озеро). Подробности самого процесса подобнаго измѣненія долинъ и перемѣщенія прежнихъ руселъ мы будемъ имѣть случай уразумѣть при описаніи нѣсколькихъ случаевъ, въ которыхъ явленіе это изслѣдовано детально, теперь-же замѣтимъ, что описанными до сихъ поръ маршрутами, во всякомъ случаѣ, устанавливается существованіе уже трехъ продольныхъ долинъ отдѣляющихъ юго-восточное подножье Приморскаго хребта отъ примыкающей здѣсь къ нему прибрежной полосы горъ, а именно: древней бугульдейской, въ которую мы включаемъ и часть верхняго теченія Малаго Бугульдейки, затѣмъ долины Еланцы и наконецъ долины Уланъ-Бургаса; ниже мы увидимъ, что на сѣверо-восточномъ протяженіи этой линіи долинъ располагается еще четвертая (рч. Хушиху) ведущая къ юго-западной оконечности Малаго Моря, которая, въ свою очередь, Приморскій хребетъ отдѣляется отъ острова Ольхона.

Изъ расширенія низовьевъ Еланцы Черскій сдѣлалъ небольшую экскурсію вверхъ по р. Ангѣ, въ предѣлахъ усть

листой части ея долины, чтобы ознакомиться съ отношеніемъ породъ, слагающихъ прибрежную полосу горъ, къ пластамъ, входящимъ въ составъ Приморскаго хребта. Обнаженія лѣваго берега Анги, начиная съ упомянутыхъ выше пестрыхъ утесовъ, даютъ великолѣпный и самый поучительный разрѣзъ для этой цѣли, такъ какъ онъ обнимаетъ породы обѣихъ соприкасающихся здѣсь орографическихъ формъ. Сначала мы встрѣчаемъ два довольно мощныхъ (до 200' и болѣе) слоя бѣлаго кристаллическаго известняка, перемежающихся съ роговообманковымъ гнейсомъ, а также съ бѣлымъ пластомъ гранитовидной породы, которая, вмѣстѣ съ известнякомъ, придаетъ полосатый и пестрый видъ этимъ скаламъ, образующимъ дно бывшей Уланъ-Бургаской долины (въ смыслѣ Черскаго); паденіе всѣхъ этихъ пластовъ юго-восточное (до ю.-ю.-в.), крутое до 75°. Подъ самымъ сѣвернымъ изъ упомянутыхъ слоевъ известняка залегаетъ опять роговообманковый гнейсъ, подъ нимъ слюдистый кварцитъ и слюдяный сланецъ, въ подѣ котораго, наконецъ, уже въ склонѣ Приморскаго хребта, выступаетъ хлоритово-роговообманковый гнейсъ, переходящій въ байкальскій, т. е. очковый, содержащій мѣстами прослойки хлоритоваго сланца. Гнейсъ этотъ, залегающій вполне согласно подѣ упомянутою выше перемежаемостью и точно также падающій на ю.-в., образуетъ собою именно ту юго-восточную полосу байкальскаго гнейса, которая, какъ сказано выше, и какъ показано на картѣ Чекановскаго, пересекаетъ собою р. Ангу нѣсколько сѣвернѣе бывшаго здѣсь желѣзнаго завода. Но и въ полосѣ этой, со стороны сѣуженной здѣсь утесистой долины Анги, Черскій нашелъ пропластокъ темносѣраго известняка, весьма отчетливо и согласно залегающій среди байкальскаго гнейса, обстоятельство, ускользнувшее отъ вниманія Чекановскаго очевидно потому, что, судя по картѣ, маршрутъ его отклонился здѣсь нѣсколько въ сторону отъ рѣки, направившись, должно быть, по поросшей растительностью части горъ. Еще

выше по теченію Анги, байкальскій гнейсъ залегаетъ на слюдяномъ сланцѣи слюдистомъ кварцитѣ, падающемъ согласно съ гнейсомъ на ю.-в., съ очень крутымъ наклономъ; породы эти связаны здѣсь къ тому-же и довольно постепеннымъ петрографическимъ переходомъ.

Кварцитъ этотъ, добывавшійся для выкладки доменныхъ печей, принадлежитъ уже къ упомянутой выше осевой полосѣ Приморскаго хребта и, какъ извѣстно, сѣняется далѣе къ сѣверу сѣверо-западною полосою байкальскаго гнейса, который, какъ мы увидимъ изъ маршрута Черскаго, пересѣкашаго хребетъ этотъ западнѣе долины р. Анги, въ свою очередь падаетъ къ юго-востоку, слѣдовательно, согласно со всею свитою породъ описаннаго разрѣза. Поучительность изложенныхъ здѣсь результатовъ геогностическаго изслѣдованія описываемой мѣстности состоитъ въ томъ, что ими не допускается никакой возрастной самостоятельности, и тектонической обособленности въ породахъ хребта Приморскаго относительно пластовъ, входящихъ въ составъ прибрежной полосы горъ. Здѣсь, напротивъ того, можно видѣть только доказательство явленій, описанныхъ нами и около юго-западной оконечности Байкала (ущелье Иркута), что перемежаемость кристаллическаго известняка съ полевошпатовыми породами и связанными съ ними кристаллическими сланцами представляетъ собою только верхній ярусъ одной и той-же системы пластовъ (лаврентьевскихъ по Черскому), въ болѣе глубокихъ горизонтахъ котораго (нижній ярусъ) господствуютъ гнейсы, а здѣсь и кварцитъ, съ чѣмъ мы будемъ имѣть случай еще неоднократно встрѣчаться, къ тому же въ еще болѣе наглядныхъ разрѣзахъ (см. ниже). Замѣтивъ, что передъ окончательнымъ выходомъ р. Анги изъ хребта Приморскаго на площадь Еланцинской долины находится еще небольшое расширеніе, въ которомъ располагается нѣсколько бурятскихъ юртъ, мы послѣдуемъ за маршрутомъ Черскаго, ведущимъ внизъ по теченію Анги, а затѣмъ по Ольховской

дорогѣ, по направленію къ сѣверо-востоку, къ Ольхонской Ивородческой Управѣ или Думѣ, на пути къ которой располагаются такъ называемыя Таржиранскія озера, принадлежащія системѣ долинъ рѣки Анги.

Анга, послѣ выхода ея изъ Приморскаго хребта и Еландинской долины, направляется, какъ сказано выше, на в.-ю.-в. къ Байкалу, пересѣкая на всемъ этомъ протяженіи (болѣе 10 верстъ) прибрежную полосу горъ. Дорога, перейдя на лѣвый берегъ долины, спускается внизъ по ней, верстъ съ 6, считая отъ устья Еланцы—и, миновавъ устье Уланъ-Бургаса, поворачиваетъ къ сѣверо-востоку на высоты лѣваго берега Анги. Поднявшись на высоту около 150', мы замѣчаемъ, что здѣсь располагается длинная, ровная, широкая и сухая продольная долина, оставшаяся нынѣ на значительной высотѣ надъ углубившимся русломъ Анги, системѣ которой она очевидно принадлежала. Долина эта, которую Черскій называетъ Худыктуйскою, отъ имени расположеннаго въ ней бурятскаго улуса, производитъ на путешественника впечатлѣніе сухаго дна прежняго залива, такъ какъ въ береговыхъ ея горахъ наблюдаются бухтовидныя выемки и мысовидные отроги, а изъ дна выступаютъ возвышенія въ родѣ острововъ. Она продолжается въ такомъ видѣ около 20 верстъ къ сѣверо-востоку, гдѣ мы будемъ имѣть случай встрѣтиться съ нею на пути изъ Уланъ-нурской долины (см. ниже); въ разстояніи же около 6 верстъ отъ Анги, Худыктуйская долина пересѣкается другою, болѣе узкою, углубившеюся здѣсь почти на 200' и слѣдующею на ю.-з. (до ю.-ю.-з.), слѣдовательно діагонально къ ней;—это Т а р ж и р а н с к а я д о л и н а, вмѣщающая въ себѣ соименныя гуджиристыя озера. Ольхонская дорога спускается въ нее, переходитъ затѣмъ на ея лѣвый берегъ и, поднявшись на продолженіе, т. е. верхнюю часть перерѣзанной такимъ образомъ Худыктуйской долины, слѣдуетъ до самыхъ верховьевъ послѣдней (см. ниже), откуда переваливаетъ черезъ сѣверный отрогъ въ долину Харабулуа (системы Малаго

Моря), гдѣ и расположена Ольхонская дума <sup>1)</sup>. Между тѣмъ Таржиранская долина (иначе Тажеранская) беретъ начало въ нѣсколькихъ (около 3-хъ) верстахъ къ западу отъ Думы и въ 6 верстахъ отъ ю.-з-й оконечности Малаго Моря и, придерживаясь ю.-ю.-з. направленія, достигаетъ около 20 верстъ въ длину, изъ которыхъ около 10-ти падаетъ на ея верхнюю часть, лежащую сѣвернѣе мѣста пересѣченія Худыктуйской. Въ этомъ, т. е. въ верхнемъ ея отрѣзкѣ располагается и большая часть извѣстныхъ до сихъ поръ озеръ. Уже изъ сообщенія академика Георги извѣстно было, что между «снѣжными горами» въ этомъ мѣстѣ (т. е. между Приморскимъ хребтомъ и Байкаломъ), въ глубинѣ долины, находится множество небольшихъ соленыхъ озеръ, изъ которыхъ добывается «сибирская слабительная соль» или «кушіръ», причемъ озера эти назывались этимъ ученымъ нѣсколько ошибочно «Таржиранскими». Около береговъ этихъ небольшихъ озеръ, говоритъ Георги, постоянно образуется соляная кора и надъ водою выются стаи водяныхъ птицъ, въ особенности утокъ, изъ породы такъ называемыхъ турпановъ или красныхъ утокъ, (*Anas guttata*), любимую пищу которой составляетъ водящесся здѣсь ракообразное животное «соляной ракъ» (*Cancer salinus* Linn.). Черскій, осматривавшій эту долину въ 1880 г. (14-го мая), передаетъ, что онъ видѣлъ въ ней одиннадцать маленькихъ озеръ, не достигавшихъ  $\frac{1}{2}$  версты въ діаметрѣ и расположенныхъ вдоль Таржиранской долины такимъ образомъ, что 8 изъ нихъ лежатъ въ верхней части, т. е. сѣвернѣе Худыктуйской долины, а три остальные южнѣе. Озера эти не имѣютъ никакого стока, и въ то время только около нѣкоторыхъ изъ нихъ можно было видѣть весьма тонкую

---

<sup>1)</sup> Нѣкоторыя свѣдѣнія объ инородцахъ Ольхонскаго Инородческаго Вѣдомства будутъ сообщены ниже. Къ сожалѣнію прекрасное изслѣдованіе о землепользованіи и хозяйственномъ бытѣ сѣвернаго сибирскаго населенія Верхонскаго округа, результаты котораго обнародованы въ 1892 году, не захватило Ольхонскаго Инородческаго Вѣдомства.

пленку бѣлаго солянаго (гуджиристаго) налёта, покрывавшаго глинистое побережье. Второе изъ этихъ озеръ, считая съ верховьевъ долины, носить названіе Хара-нѹръ (Черное озеро) и расположено на высотѣ 332' надъ Байкаломъ; оно снабжено небольшимъ островомъ и, судя по размѣрамъ глинистаго побережья; оно успѣло уже уменьшиться на половину прежней величины.

Скудная растительность, покрывающая эту безлѣсную долину и ничтожный слой песчанистаго или глинистаго наноса, позволяютъ видѣть во многихъ мѣстахъ ея дна и склоновъ выходы головъ коренныхъ породъ, пересѣкаемыхъ долиною по діагонали къ простиранію слоевъ; такимъ образомъ около перваго озера обнажается роговообманковый сланецъ и гнейсъ, переходящій въ байкальскій (очковѣй) съ очень крутымъ наклономъ пластовъ, измѣняющимся отъ с.-с.-з. до ю.-ю.-в., а около Хара-нура выступаютъ пласты кристаллическаго известняка и роговообманковаго гнейса. Седьмое озеро оказалось почти совершенно высохшимъ. Восьмое лежитъ на сѣверной сторонѣ Ольхонской дороги, пересѣкающей здѣсь Таржиранскую долину, на днѣ которой анерондъ показалъ 332' надъ Байкаломъ, тогда какъ высота прилежащихъ частей Худыктуйской долины возвышается на 218' надъ дномъ перерѣзавшей её Таржиранской. Около восьмага озера, отличающагося раздвоеннымъ концомъ, обращеннымъ въ дорогѣ, пласты той-же перемежаемости породъ падаютъ на с.-с.-з., но южнѣе дороги наклонъ слоевъ измѣняется въ ю.-ю.-в. Такимъ (т. е. ю.-ю.-в.) наклономъ отличаются и слои плитковатаго кварцита съ блестками графита, обнаженные около девятаго озера, лежащаго сейчасъ-же южнѣе Ольхонской дороги. Десятое озеро почти совершенно высохшее, а за нимъ, пройдя полосу головъ роговообманковаго сланца, Черскій достигъ одиннадцатаго озера, около котораго анерондъ показалъ 283' надъ Байкаломъ. Озеро это носить названіе Дабагатуй, т. е.



соленосное; изъ него именно добывалась прежде главная масса гуджира, который имѣлъ для бурятъ немаловажное значеніе и употреблялся какъ примѣсъ не только въ кушанья, вмѣсто соли, но и къ чаю, для приданія ему болѣе остраго вкуса. Въ настоящее же время, когда чистая русская соль вошла во всеобщее употребленіе, эксплуатація гуджира вообще прекратилась и только бурятскій скоть пользуется солончаковыми условіями мѣстности и то подъ бдительнымъ окомъ пастуховъ, такъ какъ извѣстны случаи, что скоть, добравшись до самыхъ озеръ и злоупотребивъ гуджиромъ, подвергался болѣзни и падежу.

До сихъ поръ, къ сожалѣнію, соль эта, насколько намъ извѣстно, не подвергалась еще подробному химическому изслѣдованію, какъ равно и вода осаждающихъ ее озеръ; точно также небезынтересно было бы ближайшее знакомство какъ съ фауною, такъ и съ флорою ихъ, не говоря уже о болѣе точномъ ознакомленіи съ размѣрами и глубиною этихъ высыхающихъ бассейновъ. Быть можетъ по причинѣ бывшаго въ то время сильнаго вѣтра, Черскій не видѣлъ ни одного ракообразнаго на берегахъ тѣхъ озеръ, къ которымъ онъ приближался; тогда не было также и никакихъ птицъ; впрочемъ, онъ проѣхалъ по этой долинѣ слишкомъ поспѣшно, чтобы заняться болѣе подробнымъ осмотромъ озеръ въ которыхъ, по всей вѣроятности, найдется какой либо изъ извѣстныхъ или близкихъ имъ видовъ байкальскихъ гаммаридовъ, столь подробно описанныхъ Дыбовскимъ. По замѣчанію Черскаго, изслѣдованіе соленосности (гуджиристости) Таржиранскихъ озеръ необходимо было бы произвести въ связи съ подробными химическими анализами породъ, входящихъ въ составъ прибрежной полосы горъ и острова Ольхона, а также продуктовъ ихъ разрушенія. Путешественникъ этотъ сообщаетъ, что пласты полевошпатовыхъ породъ, перемежающихся съ кристаллическимъ известнякомъ какъ на материкѣ, такъ въ особенности на Ольхонѣ (см.

ниже), подвергаются каолинизации и вообще химическому разложению на довольно обширныхъ протяженіяхъ склоновъ горъ къ Байкалу, причемъ продукты такого разрушенія потребляются рогатымъ скотомъ мѣстныхъ жителей мѣстами на самомъ мѣстѣ ихъ образованія, гдѣ напр. бараны выѣдаютъ современемъ глубокія ямки также, какъ и въ любой нормальной солончаковой мѣстности, не взирая даже на то, что явленіе это имѣетъ мѣсто на довольно крутомъ склонѣ разрушающейся скалы. Вотъ почему, а также при отсутствіи данныхъ на нахожденіе не только въ предѣлахъ Байкальской долины, но и большей части Восточной Сибири (см. ниже) морскихъ отложений послѣдевонскихъ періодовъ, Черскій полагаетъ, что гуджиристость Таржиранскихъ озеръ можно будетъ разсматривать какъ результатъ выщелачиванія и скопленія солей, заимствованныхъ изъ упомянутыхъ выше продуктовъ разрушенія кристаллическихъ породъ.

Черскій не доходилъ до устья Таржиранской долины и потому неизвѣстно, находятся ли тамъ еще подобныя же озера или же рядъ ихъ оканчивается Дабагатуемъ, въ общемъ же онъ указываетъ на эту мѣстность какъ на весьма оригинальный, наглядный и поучительный примѣръ измѣненія конфигураціи путемъ размыва проточными водами: весьма хорошо развитая и сохранившаяся продольная долина (Худыктуйская) пересѣкается діагонально (Таржиранскою), столь же длинною и настолько углубившеюся, что съ уровня ея дна можно и не подозревать существованія пострадавшей долины. Таржиранская долина, какъ пересѣкающая, принадлежитъ поэтому къ позднѣйшимъ проявленіямъ размыва, другими словами, — она моложе Худыктуйской, образованіе которой, какъ мы увидимъ ниже, въ свою очередь, нельзя поставить въ какую либо связь съ тектоническими условіями строенія почвы, не взирая на то, что долина эта пролегаетъ почти по такъ называемой антиклипальной линіи, т. е. по гребню складки. Наконецъ, что касается вопроса

о древности самого факта пересѣченія, то мы коснемся его при описаніи частей той-же мѣстности, въ которыхъ сохранились въ лучшемъ видѣ наносныя отложенія, теперь же замѣтимъ въ заключеніе, что въ лѣвой вѣтви верховьевъ Таржиранской долины Черскій видѣлъ террасу, располагающуюся, повидимому, на одной высотѣ съ уровнемъ Худыкутской долины и верховьевъ упомянутого выше Харабулуза, и перейдемъ къ послѣдней части этого маршрута, именно къ перевалу черезъ Приморскій хребетъ, совершающему Черскимъ изъ Кунтинской деревни по линіи Ольхонской дороги.

Дорога изъ названной деревни къ Куретской, лежащей, какъ сказано выше, уже вблизи подножья Онотскаго хребта, направляется въ общемъ къ сѣверо-западу (с.-с.-з.). Приморскій хребетъ представляетъ пологій склонъ, по которому, среди растущаго здѣсь хвойнаго лѣса, подъемъ совершается весьма удобно даже въ экипажахъ и на 6-й верстѣ отъ Кунтинской деревни достигается высшій пунктъ, лежащій на 2134' надъ Байкаломъ, т. е. на 1308' надъ деревнею. Столь же удобно совершается и спускъ по противоположному склону, ведущій въ довольно живописную луговую долину рѣчки Малой Куреты, впадающей въ р. Ангу ниже Куретской деревни. На всемъ этомъ пути нѣтъ ни одного утеса и ни одной рѣзко выдающейся вершины; только по розсыпямъ и отдѣльно лежащимъ кускамъ породъ можно догадываться о строеніи хребта въ этомъ мѣстѣ. Такимъ образомъ, въ началѣ подъема, т. е. на склонѣ къ долинѣ Еланцы, въ которой расположена Кунтинская деревня, наблюдается розсыпной слюдистаго кварцита, который далѣе, начиная съ 7-й версты за деревнею, смѣняется очковымъ гнейсомъ, составляющимъ очевидно всю остальную часть хребта. Долина М. Куреты, не взирая на ничтожность протекающаго по ней ручья, представляетъ бассейновидное (озероподобное) расширеніе около  $\frac{1}{2}$  версты въ діаметрѣ, вытянутое въ сѣверо-западномъ

направленіи; окружаясь невысокими, но поросшими лѣсомъ отрогами Приморскаго хребта, бассейнъ этотъ снабженъ узкимъ проходомъ къ сѣверо-востоку (с.-с.-в.), черезъ который М. Курета изливается въ р. Ангу (съ правой ея стороны) передъ входомъ ея въ ущелистую часть долины. Высота положенія дна бассейновиднаго расширенія М. Куреты, по опредѣленію Черскаго, оказалась равной 653' надъ Байкаломъ. Отрогъ, ограничивающій долину съ лѣвой стороны и отдѣляющій ея отъ Большой Куреты, снабженъ отчетливо развитою террасою, возвышающеюся на 15' надъ дномъ расширенія; въ немъ находится также и довольно глубокая сѣдловина, понижающая эту часть водораздѣла до 64' надъ М. Куретою, т. е. 717' надъ Байкаломъ. Всѣ склоны бассейна поростаюгъ густою травою, маскирующею составъ ихъ, за исключеніемъ праваго берега, ближе къ суженному низовью рѣчки, гдѣ замѣчаются выходы головъ байкальскаго гнейса, пласты котораго падаютъ здѣсь на ю.-в.; среди него замѣчается также очень мелкозернистый г里昂штейнъ въ видѣ прослойковъ или пластовыхъ жилъ. Отсюда тропа переваливаетъ черезъ упомянутую выше сѣдловину въ отрогъ лѣваго берега расширенія и спускается въ долину Большой Куреты, почти столь-же незначительной рѣчки какъ и Малая; долина эта сейчасъ же открывается въ Ангу, гдѣ около устья Куреты располагается упоминавшаяся уже выше деревня Куретская, высоту которой надъ уровнемъ Байкала Черскій опредѣляетъ въ 640 футовъ. Къ западу отъ нея, въ сторону р. Бугульдейки, ведетъ сквозная долина, составляющая соединительную вѣтвь между послѣднею и Ангою и занятая нынѣ рѣчками: Харбагурою, впадающею въ Ангу выше деревни и Хара-жергою, изливающейся въ Бугульдейку. Долинѣ этой, вслѣдствіе ея важнаго морфологическаго значенія для исторіи развитія Анги и Бугульдейки, мы посвящаемъ особый, нижеслѣдующій параграфъ нашего изложенія.

Ж) Долина Харбагуры и Хара-жерги какъ соединительная вѣтъ между долинами рѣкъ: Анги и Большой Бугульдейки, и относительная древность хребтовъ Онотскаго и Приморскаго.

Мы говорили уже выше, что сквозная долина, занятая нынѣ теченіями рѣчекъ Харбагуры и Хара-жерги, располагается какъ разъ на томъ мѣстѣ, гдѣ верхнія половины теченій р.р. Анги и Бугульдейки всего болѣе сближаются другъ съ другомъ, прежде чѣмъ принять расходящееся направление, свойственное ихъ нижнимъ частямъ. Водораздѣлъ между этими рѣками, сѣзавшійся такимъ образомъ почти до 5 верстъ, пересѣкается названною сквозною долиною въ поперечномъ направленіи, почти съ запада на востокъ, обусловливая и соотвѣтственную ея незначительную длину; что-же касается ширины, то, сѣзавшая почти на половинѣ своей длины до  $\frac{1}{2}$  версты и менѣе, она расширяется постепенно какъ въ сторону Анги, такъ и Бугульдейки, переходя съ одной стороны въ Куретскую площадь, названную такъ отъ соименной деревни на р. Ангѣ, а съ другой въ Косостепскую на Бугульдейкѣ. Такимъ образомъ съ западной стороны, вѣрнѣе съ западнаго конца, долина эта, сливаясь съ дномъ Бугульдейскою, ограничивается лѣвымъ берегомъ этой рѣки, точно также какъ съ востока она упирается въ правый берегъ р. Анги; между тѣмъ съ сѣвера она ограничивается южнымъ склономъ отрога Онотскаго хребта, отдѣляющаго верхнія половины теченій Анги и Бугульдейки и названнаго Чекановскимъ Гоморьянскою грядою отъ знакомой намъ уже Гоморьянской сопки, которая достигаетъ 1748' высоты надъ Байкаломъ, а съ южной стороны склоны долины образуются прилежащимъ скатомъ Приморскаго хребта съ возвышающимися на немъ вершинами сопки Архирей (2174' надъ Байк.) и еще болѣе высокой Куретской сопки (2378' н. Байк.), вслѣдствіе чего эта часть

Приморскаго хребта, сѣуженная здѣсь соотвѣтственнымъ положеніемъ рѣкъ Анги и Бугульдейки, названа Чекановскимъ Куретскимъ массивомъ или отрогомъ. Что-же касается дна самой долины и отношенія его къ современному уровню Анги и Бугульдейки, то для этой цѣли мы располагаемъ цифрами высотъ, опредѣленныхъ Черскимъ во время его проѣзда по проведенной здѣсь части Ольхонской дороги. Принимая для Куретской деревни на Ангѣ указанную выше цифру 640' надъ Байкаломъ, высшій пунктъ наноснаго дна описываемой соединительной долины возвышается на 154' надъ деревнею, а уровень Бугульдейки около устья Хара-жерги превышаетъ Куретскую деревню, слѣдовательно и Ангу, почти на 58 футовъ. Современное орошеніе долины образуютъ двѣ незначительныя рѣчки. Одна изъ нихъ, *Хара-жерга*, беретъ начало вблизи Архирейской сопки, направляясь сначала почти на сѣверъ; затѣмъ, выйдя на долину, она образуетъ крутой дугообразный поворотъ къ западу и юго-западу, къ лѣвому берегу Бугульдейки, въ которую она и впадаетъ. На выпуклой сторонѣ этого дугообразнаго изгиба, какъ описываетъ Чекановскій, располагается водораздѣлъ между Хара-жергою и Харбагурою, представляющій полосу почвы едва возвышенной надъ уровнемъ разобщаемыхъ рѣчекъ и имѣющій всего лишь нѣсколько футовъ ширины<sup>1)</sup>. Берущій здѣсь начало ключикъ *Харбагура*, судя по картѣ Чекановскаго, не-превосходитъ 2 версты въ длину и направляется ближе къ сѣверному склону долины на сѣверо-востокъ, къ правому берегу р. Анги, слѣдовательно въ сторону почти діаметрально противоположную Хара-жергѣ, такъ-что сѣвосточная долина эта въ общемъ напоминаетъ знакомый намъ уже водораздѣлъ между Иркутомъ, передъ входомъ его въ ущелье, и системою р. Култучной, впадающей въ юго-западную оконечность Байкала. Кромѣ названныхъ двухъ рѣ-

---

<sup>1)</sup> Чекановскій, Зап. 1. с., pag. 318.

чекъ слѣдуетъ замѣтить, что въ западную оконечность интересующей насъ долины врѣзываются еще низовья р. Гоморьянъ, впадающей въ Бугульдейку нѣсколько выше Харажерги. Чекановскій, которому мы обязаны знакомствомъ съ этою долиною, передаетъ также свѣдѣнія и о геогностическомъ строеніи этой мѣстности.

Онъ показалъ, что долина эта располагается на границѣ двухъ разнородныхъ образованій; къ сѣверу отъ нея развиты породы, изъ которыхъ состоитъ Онотскій хребетъ, а именно: «шальштейны», метаморфическіе глинистые сланцы, известнякъ и кварциты, подчиненные известняку, между тѣмъ южный склонъ долины образуется уже породами хребта Приморскаго, какъ-то: байкальскимъ гнейсомъ, протогиновыми породами и кварцитомъ. Настолько же отлично и положеніе пластовъ по обѣ стороны этой долины. Къ сѣверу отъ нея породы отличаются меридіональнымъ простираніемъ (с.-ю.): такое положеніе пластовъ обнаруживаютъ глинистые сланцы на сопкахъ Гоморьянской и Билъгитуйской; это-же простираніе свойственно и породамъ праваго склона р. Анги, около ея нижняго петлевиднаго изгиба. Напротивъ того, къ югу отъ долины, въ горѣ Архирей, пласты направляются къ в.-с.-в. Что-же касается самой долины, то Чекановскій полагалъ, что на нее распространяется простираніе, свойственное Гоморьянской грядѣ (с.-ю.): въ ближайшемъ сосѣдствѣ села Косостепскаго, на лѣвомъ склонѣ долины р. Б. Бугульдейки, составляющемъ въ то же время сѣверный склонъ разсматриваемой долины, онъ видѣлъ «шальштейны» и глинистые сланцы съ простираніемъ на в.-с.-в., т. е. такое-же, какъ и на сопкѣ Архирей, къ югу отъ долины; впрочемъ, какъ было сказано выше, Черскій доказалъ впослѣдствіи, что почти меридіональнымъ простираніемъ отличаются пласты породъ, обнаженныхъ на днѣ долины, гдѣ въ ней врѣзались низовья Харажерги (перемежаемость известняка, кварцита и глинистаго сланца съ паденіемъ на в.-ю.-в. до в.-ю. 15°).

Собранныхъ имъ данныхъ Чекановскій считалъ достаточно для того, чтобы считать долину Харбагуры и Хара-жерги «долиною поднятія, принадлежащею къ системѣ подъема на в.-с.-в.». Но самымъ интереснымъ результатомъ изслѣдованій Чекановскаго въ этой мѣстности является изученіе наносныхъ отложеній, выполняющихъ эту долину, и распространенія ихъ на прилежащія долины <sup>1)</sup>). Наносы эти состоятъ отчасти изъ сыпучаго песку, болѣе или менѣе чистаго, отчасти изъ глинистаго песку охристожелтаго цвѣта и изъ гравія съ подмѣшанною къ нему вообще мелкою, но хорошо обточенною галькою, количество которой мѣстами до того увеличивается, что она почти вытѣсняетъ собою песокъ; мѣстами галька эта слабо цементируется водною окисью желѣза, превращающею её въ конгломератъ. Относительно распространенія этого наноса у Чекановскаго находимъ нижеслѣдующія данныя. Отложеніе это наблюдается имъ во-первыхъ, по р. Ангѣ выше ущелистой части ея долины, на болѣе пологомъ ея лѣвомъ склонѣ; отсюда вверхъ, около дер. Куретской, оно особенно выразительно, образуя на правомъ берегу Анги холмы, которые тянутся до устья рч. Харбагуры и до слѣдующей за нею весьма широкой, но короткой пади Умбура. Далѣе вверхъ по р. Ангѣ отложеніе это не было замѣчено, но съ устья Харбагуры оно переходитъ въ сквозную долину этой рѣчки, поднимается на ея сѣверный склонъ, къ утесу, извѣстному у мѣстныхъ жителей подъ названіемъ Бѣлаго камня. Утесъ этотъ располагается почти насупротивъ упомянутаго выше дугообразнаго изгиба Хара-жерги, входя поэтому въ составъ Онотскаго хребта съ орографической точки зрѣнія; тѣмъ не менѣе онъ состоитъ еще изъ породъ хребта Приморскаго, такъ какъ Чекановскій <sup>2)</sup> нашелъ въ немъ кварцъ, должно быть жильный, около котораго выступаетъ хлористовый сланецъ во

<sup>1)</sup> Чекановскій, I. с., pag. 320.

<sup>2)</sup> Чекановскій, I. с., pag. 263.



всѣхъ описанныхъ имъ видоизмѣненіяхъ, хотя къ сожалѣнію о положеніи пластовъ этого сланца онъ не передаетъ никакихъ свѣдѣній; только выше Бѣлаго камня начинаются глинистые сланцы и «шальштейнъ», т. е. породы хребта Оютскаго, въ свою очередь съ невыясненнымъ положеніемъ пластовъ, среди которыхъ Чекановскій наблюдаетъ «болѣе или менѣе мощныя массы бѣлаго кварца, образующаго, по всему вѣроятію, жилы». Около этого утеса интересующее насъ наносное отложеніе достигаетъ высоты «не менѣе 200' надъ долиною», слѣдовательно, принимая во вниманіе указанныя выше гипсометрическія данныя Черскаго, уровень залеганія наноса возвышается здѣсь не менѣе какъ на 354 фута надъ Ангою (дер. Куретская), на 296' надъ Бугульдейкою и на 994' надъ Байкаломъ. Отсюда, сохраняя значительную мощность, наносъ переходитъ въ долину Бугульдейки и въ него глубоко врѣзываются низовья рч. Гоморьяна. Сказаннымъ не ограничивается, однако, распространеніе этого наноса. Сохраняя въ общемъ тѣже особенности, мощный пластъ его обнажается ниже по теченію Бугульдейки, во-первыхъ, около устья пади Бахиной, гдѣ Чекановскій нашелъ въ немъ кость, которая, по опредѣленію Черскаго, оказалась тазовою костью носорога, чѣмъ и опредѣляется древность описываемыхъ осадковъ. Далѣе, внизъ по Бугульдейкѣ, наносъ этотъ выполняетъ собою низменность около устья рр. Турунги и Кедусы (см. выше), гдѣ впрочемъ онъ отличается болѣе крупною галькою; утесъ около устья рч. Алтанъ-Хара въ свою очередь покрытъ наносомъ съ мелкою галькою, которая, какъ мы видѣли выше, найдена Черскимъ и на перевалѣ черезъ Кедусинскій отрогъ, образующій суженіе долины Бугульдейки. Тотъ же наносъ прослѣженъ Чекановскимъ и вверхъ по теченію этой рѣки, начиная съ устья Хара-жерги. Онъ залегаетъ толстымъ слоемъ около с. Костинскаго, образуя выше устья р. Харики подошву склона долины Бугульдейки. Еще далѣе тоже отложеніе встрѣчается и

перевалъ черезъ отрогъ (Сыргутскій отрогъ по Черскому), образующій первое суженіе долины, а также около рѣчекъ Огула и Курги. Приближаясь затѣмъ къ верховьямъ Бугульдейки, тоже отложеніе выстилаетъ дно описаннаго выше озеровиднаго расширенія долинъ на гребнѣ Онота, извѣстнаго подъ названіемъ Долгой степи, гдѣ оно залегаетъ подъ тонкимъ растительнымъ слоемъ и образуетъ также болѣе или менѣе возвышенные холмы праваго склона долины, покрытые сосновымъ лѣсомъ, который въ этой мѣстности обличаетъ обыкновенно сыпучую и сухую песчаную почву. Залегая здѣсь непрерывнымъ слоемъ на протяженіи болѣе 10 верстъ, наносъ этотъ покрываетъ такимъ образомъ и высшую точку перевала черезъ Онотскій хребетъ, возвышаясь слѣдовательно на 1085' надъ уровнемъ, хотя цифра эта, слѣдуетъ замѣтить, превышаетъ только 91 футомъ указанную выше высоту залеганія того же отложенія въ долинѣ Харбагуры и Харажерги, около Бѣлаго камня (не менѣе 994' надъ Байк.). Осадки эти на самомъ перевалѣ покрываются еще слоемъ глины, способствующимъ вѣроятно произрастанію здѣсь и березы, на столько рѣдкой на этомъ хребтѣ, что мѣсто это носить названіе «Березникъ». Изъ приведеннаго выше описанія Онотскаго хребта въ этомъ мѣстѣ мы видѣли, что, если руководствоваться склонами высшихъ горъ, то между верховьями Бугульдейки и Малой Манзурки мы не находимъ никакихъ рѣзкихъ границъ, такъ какъ расширеніе Долгой степи является на столько-же открытымъ въ сторону системы водъ Байкала, на сколько и къ названному притоку р. Лены; такая же непрерывность наблюдается и въ распространеніи интересующаго насъ наноснаго отложенія, переходящаго здѣсь непосредственно и на верховья М. Манзурки (Унгуръ по Обручеву <sup>1)</sup>). И дѣйствительно, изъ него состоитъ удлиненный и высокій, мысовидный отрогъ, разъединяющій оба верховья М.

---

<sup>1)</sup> См. выше стр. 289.

Манзурки; далѣе въ нѣсколькихъ мѣстахъ на пути до горы Плакунъ внизъ по рѣчкѣ, въ свою очередь можно видѣть этотъ осадокъ. Наконецъ, отъ Плакуна, онъ распространяется вверхъ по р. Адѣ на протяженіи отъ 8 до 10 верстъ, послѣ чего онъ повидимому прекращается; ниже ущелья, которое проходитъ Манзурка послѣ соединенія съ Адою, наносъ этотъ точно также не встрѣченъ, хотя, какъ замѣчаетъ Черскій, «болѣе древніе наносы», отмѣченные Чекановскимъ въ озеровидныхъ долинахъ р.р. Куданцы и Большой Манзурки (см. ниже), повидимому можно считать уцѣлѣвшими отъ размыва остатками того-же отложенія, чѣмъ, разумѣется, т. е. позднѣйшимъ размывомъ, объясняется разрозненное и поврежденное состояніе этого наноса и на всемъ описанномъ нами районѣ его распространенія. Всѣ эти данныя порождаютъ роковымъ образомъ вопросъ: при какихъ условіяхъ конфигураціи мѣстности послѣдовало отложеніе этого наноса на площади, на которой въ настоящее время возвышаются два водораздѣла (Байкальско-Ленскій и Бугульдейско-Ангинскій) и которое орошается нынѣ тремя отдѣльными рѣками (Манзурка, Бугульдейка и Ангa), находящими себѣ выходъ изъ этой площади черезъ ущелья? а во-вторыхъ, какими дѣятелими измѣнились условія, давшія возможность образованія этого наноса? Предложивъ эти вопросы и оставляя рѣшеніе ихъ въ подробностяхъ будущимъ изслѣдователямъ, Чекановскій заключаетъ однако <sup>1)</sup>, что хребетъ Онотскій, «въ той крайней мѣрѣ мѣстности, гдѣ расположены верховья р. Б. Бугульдейки, поднять сравнительно въ недавнее время или самъ по себѣ отдѣльно, или вмѣстѣ со всей прилежащей мѣстностью на ту высоту, которую онъ обладаетъ нынѣ или-же приобрѣлъ по меньшей мѣрѣ присущее ему нынѣ значеніе одного изъ главнѣйшихъ водораздѣловъ края».

Хотя Чекановскій и не высказывается прямо о харак-

---

<sup>1)</sup> Чекановскій, I. с., pag. 323.

теръ наноса, приведшаго его къ такому заключенію, тѣмъ не менѣе самъ выводъ этотъ дѣлаетъ очевиднымъ, что описанный наносъ имъ разсматривался не иначе какъ рѣчное отложеніе: онъ долженъ былъ предполагать существованіе рѣки, теченію которой отъ нынѣшней системы р. Лены до Кедусинскаго ущелья Бугульдейки и до р. Анги, или-же обратно, не могъ мѣшать современный гребень Онотскаго хребта; только при подобномъ воззрѣніи могла возникнуть и мысль о томъ, что хребетъ этотъ, какъ измѣнившій такіа гидрографическія условія, образовался въ періодъ, послѣдовавшій за отложеніемъ описанныхъ осадковъ, слѣдовательно «сравнительно въ недавнее время», заставивъ воды прежней одной рѣки раздѣлиться на современные три системы, т. е. Манзурки или Лены, Бугульдейки и Анги. Если же вставить въ этотъ выводъ и приведенное выше заключеніе Чекановскаго, согласно которому хребты Онотскій и Приморскій «принадлежать оба къ одной и той же эпохѣ поднятія» <sup>1)</sup>, то взглядъ на сравнительно недавнее (послѣдтритичное) возникновеніе перваго изъ нихъ распространяется очевидно и на послѣдній, другими словами, на время образованія сѣверно-байкальскихъ горъ вообще,—что, очевидно, является уже вполне несогласнымъ съ тѣми стратиграфическими данными, съ которыми мы успѣли уже ознакомиться въ различныхъ мѣстахъ предшествовавшихъ изложеній.

Совершенно въ другомъ свѣтѣ поставлены вопросы эти позднѣйшими изслѣдованіями Черскаго <sup>2)</sup>. Въ описанныхъ Чекановскимъ послѣдтритичныхъ осадкахъ Черскій видитъ не рѣчные, а озерныя отложенія, къ чему склоняетъ какъ составъ ихъ, такъ и залеганіе въ озеровидныхъ расширеніяхъ, которыя выполнялись ровнымъ, плоскимъ и мощнымъ покровомъ того наноса до значительной высоты, какъ это до сихъ поръ

<sup>1)</sup> Чекановскій, 1. с. pag. 315.

<sup>2)</sup> Черскій, 1. с., Отчетъ за 1879 г., стр. 75, а также Рукописныя записки о Сибири.

еще наблюдается въ верховьяхъ Бугульдейки, вѣрнѣе, на самой водораздѣльной части хребта Онотскаго, въ знакомой уже намъ «Долгой степи», гдѣ покровъ этотъ всего менѣе подвергся позднѣйшему размыву. При такой постановкѣ вопроса древнѣй озерный бассейнъ этотъ помѣщался уже на готовомъ гребнѣ Онотскаго хребта, въ видѣ альпійскаго озера. Воды его, судя по оставшемуся наносу, распространялись къ югу, по Бугульдейкѣ, верстъ слишкомъ на 30, до Кедусинскаго ущелья, а къ востоку до р. Анги, черезъ сквозную долину Харбагуры и Хара-жерги,—условія, при которыхъ соотвѣтственные притоки Бугульдейки и вся верхняя половина теченія рѣки Анги должны были принадлежать системѣ водъ этого озера, въ особенности потому, что извѣстный до сихъ поръ уровень залеганія описаннаго наноса въ долинѣ Харбагуры и Хара-жерги, около Бѣлаго камня (994' надъ Байк.) не достигаетъ только на 91 футъ той высоты, на которой покоится нынѣ тотъ же осадокъ на перевалѣ черезъ Онотскій хребетъ (1085' н. Байк.), а столь незначительное различіе можетъ зависѣть не только отъ послѣдовавшаго размыва, но даже и отъ ошибочности барометрическаго способа нивелировки; къ тому же въ этомъ отношеніи долина Хара-жерги еще далеко не достаточно изслѣдована, чтобы не найти въ ней террасъ или остатковъ того же наноса на еще болѣе высокомъ уровнѣ. Что-же касается сѣверныхъ границъ водъ этого осушеннаго нынѣ озера, то, какъ сказано уже выше и къ чему мы возвратимся еще при описаніи системы долинъ, лежащихъ у сѣверо-западнаго подножья хребта Онотскаго (Куда, Муринъ, Куданца, Манзурка), воды его посредственно или даже и непосредственно (т. е. какъ озерныя, а не какъ связанныя истокомъ) могли соединяться по крайнѣмѣрѣ съ бассейномъ Лены. Наконецъ, относительно нижнихъ теченій рѣкъ Анги и Бугульдейки Черскій замѣчаетъ, что они могли быть въ началѣ самостоятельными рѣками, верховья которыхъ, обладая отступательнымъ движеніемъ, могли

впослѣдствіи достигнуть этого озернаго бассейна и спустить его въ Байкаль. Возрѣніе это онъ считаетъ однако не болѣе какъ предположеніемъ, требующимъ болѣе подробныхъ изслѣдованій, для которыхъ ему не доставало времени, такъ какъ болѣе отдаленныя экскурсіи его должны были имѣть главною цѣлью стратиграфическое отношеніе другъ къ другу породъ, входящихъ въ составъ прибрежныхъ горъ долины Байкала. Онъ обращаетъ вниманіе будущихъ изслѣдователей также на то обстоятельство, что указанный выше уровень залеганія озернаго наноса какъ въ долинѣ Харбагуры и Харажерги (994' н. Байк.), такъ и на самомъ перевалѣ черезъ Онотскій хребетъ (1085' н. Байк.), не выходитъ за предѣлы извѣстной уже высоты залеганія наносныхъ образованій около самаго Байкала и того горизонта, на которомъ располагаются высшія изъ прибрежныхъ террасъ, которыми доказывается бывшее въ то время, соотвѣтственно высокое стояніе водъ въ Байкалѣ. И дѣйствительно, мы видѣли уже выше, что южный песчаный наносъ, очевидно озернаго происхожденія, залегаетъ въ окрестностяхъ юго-западной оконечности озера, юже входа Иркутъ въ ущелье, на высотѣ 1.103' надъ современнымъ уровнемъ Байкала; далѣе къ востоку, гряды обоченныхъ галекъ на высокой террасѣ лѣваго берега рѣки Култучной найдены Черскимъ на высотѣ 928' надъ озеромъ, оглаженные валуны на горѣ Култучной появляются на высотѣ 1.128'; той же приблизительно высоты (1.200' н. Байк.) восточное продолженіе этой террасы до Толстаго мыса юло истока р. Ангары; далѣе, террасовидные отроги, поднимающіеся къ сѣверо-востоку отъ устья Голоустной, возвышаются до слишкомъ 800' надъ озеромъ, причемъ на нѣкоторыхъ изъ нихъ можно видѣть оглаженные валуны, хотя и не такъ отчетливо какъ по р. Култучной; наконецъ, если при-  
йти къ сказанному, что и не далеко отъ устья р. Анги (ниже) озерный песокъ мы увидимъ залегающимъ на высотѣ 695' н. Байк., а далѣе, въ Маломъ морѣ, мы встрѣтимся

съ террасами, достигающими той-же высоты какъ и гради галекъ въ террасѣ долины р. Култучной (928' н. Байк.), то роковымъ образомъ рождается и вопросъ объ отношеніи столь высоко стоявшихъ въ то время водъ къ долинамъ р.р. Анги и Бугульдейки, а также и къ перевалу черезъ Онотскій хребтъ на Малую Манзурку, гдѣ именно описанное нами наносное отложеніе залегаетъ на высотѣ 1.085' надъ Байкаломъ. Черскій считаетъ поэтому возможнымъ и такое предположеніе, согласно которому виновникомъ отложенія описаннаго наноса могли быть воды самого Байкала, проникшія въ названныя долины и перешагнувшія даже черезъ нисшую часть водораздѣльной линіи Онота (1.085' н. Байк.) <sup>1)</sup>. Во всякомъ случаѣ очевидно, что ни одно изъ этихъ двухъ-воззрѣній, въ противоположность приведенной выше гипотезѣ Чекановскаго, не нуждается въ сравнительно недавнемъ образованіи Онотскаго хребта, и потому предположенія эти болѣе согласны съ фактической стороною вопроса, указывающею, какъ мы увидимъ и ниже, что хребтъ этотъ омывался съ сѣверо-западной стороны еще девонскимъ моремъ, хотя понятно, что нѣкоторыя, сравнительно незначительныя перемѣщенія почвы могли имѣть здѣсь мѣсто въ послѣтретичный періодъ, но таковыя никакъ еще не доказываются существованіемъ описаннаго наноса на высшемъ пунктѣ перевала. Въ свою очередь, Черскій не признаетъ самостоятельности и за указанными здѣсь Чекановскимъ различными направленіями «поднятія», т. е. простираній пластовъ и видитъ въ своеобразной измѣнчивости ихъ не только результатъ позднѣйшаго образованія Онотскаго хребта сравнительно съ Приморскимъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ одинъ изъ небезынтересныхъ примѣровъ вліянія извилистости древнѣйшаго берега на простираніе пластовъ прилегающихъ къ нему позднѣйшихъ осадковъ. И дѣйствительно, изъ различныхъ предшествовавшихъ парагра-

---

<sup>1)</sup> Черскій, Рукописныя замѣтки о Сибири.

фовъ нашего изложенія мы видѣли, что въ общемъ крутой сѣверо-западный склонъ полевошпатовыхъ (по Черскому, лаврентьевскихъ) породъ, входящихъ въ составъ хребта Приморскаго, отличался на западѣ отъ р. Б. Бугульдейки сѣверо-восточнымъ направленіемъ, а перейдя на лѣвый берегъ долины этой рѣки, почти на широтѣ устья въ неѣ р. Куртунъ, вдругъ поворачиваетъ къ сѣверу и слѣдуетъ такимъ образомъ до устья долины Хара-жерги; здѣсь онъ поворачиваетъ сначала нѣсколько къ востоку, образуя южный берегъ этой сквозной долины и переходитъ на лѣвый берегъ долины р. Анги, вверхъ по которому склонъ этотъ опять принимаетъ сѣверо-восточное направленіе. Не взирая на такой многократный изгибъ описаннаго склона, простираніе породъ хребта Приморскаго остается въ предѣлахъ указаннаго пространства вездѣ одинаковымъ, измѣняясь только отъ с.-в. до в.-с.-в., такъ-что всѣ замѣченные Чекановскимъ уклоненія отъ этого направленія, относятся къ породамъ Онотскаго хребта, прикасающимся здѣсь къ полевошпатовой толщѣ. Обзоръ этихъ уклоненій по всей длинѣ ломанной линіи прилежащаго склона полевошпатовыхъ породъ обнаружилъ, что простираніе складокъ Онотскихъ сланцевъ измѣняется не по какимъ либо произвольнымъ направленіямъ, а напротивъ, въ общемъ вполне сообразно съ описанными изгибами сѣверо-западнаго подножья Приморскаго хребта, такъ-что сѣверо-восточное ихъ простираніе, господствовавшее въ предѣлахъ рѣкъ Голоустной, Куртуна и части нижняго теченія Бугульдейки, смѣняется выше по долинѣ послѣдней почти меридіональнымъ пролеганіемъ пластовъ, переходящимъ и на весь правый берегъ нижней половины средняго, почти меридіональнаго теченія р. Анги, въ верхней части которой, какъ и повсемѣстно, въ нѣкоторомъ отдаленіи отъ лаврентьевскихъ породъ, опять появляется нормальное для этихъ хребтовъ, сѣверо-восточное направленіе прижатыхъ пластовъ. Объясняя образованіе складокъ вообще процессомъ боковаго (тангенціальнаго) сжиманія земной коры и



указывая на извѣстныя явленія прижатія такихъ складокъ къ склонамъ болѣе древнихъ породъ и даже опрокидыванія ихъ на склонъ послѣднихъ (какъ напр. по р. Куртуну), Черскій смотритъ на описанныя уклоненія въ простираніяхъ какъ на результатъ вдавливанія сжимающихся пластовъ Онотскихъ въ бухтовидную выемку прилежащаго склона Приморскаго хребта, вслѣдствіе чего складки Онотскихъ сланцевъ, благодаря присутствующимъ породамъ извѣстной доли пластичности, стремились укладываться здѣсь болѣе или менѣе параллельно изгибамъ Приморскаго хребта, къ которому они прижимались подъ вліяніемъ одного и того-же общаго сжиманія ихъ, дѣйствовавшаго по направленію съ с.-з. на ю.-в., т. е. подъ прямымъ угломъ къ нормальному господствующему простиранію. Такимъ образомъ «самостоятельность поднятія» остается здѣсь только за простираніемъ с.-в. до в.-с.-в., всѣ же остальные, указанные Чекановскимъ въ описываемой мѣстности, являются только мѣстными измѣненіями, вызванными извилистымъ направленіемъ подножья прибрежныхъ горъ того моря (см. ниже), изъ котораго отлагались Онотскіе сланцы. Роль этихъ прибрежныхъ горъ игралъ хребетъ Приморскій, болѣе глубокая древность котораго, а слѣдовательно и независимость его отъ несуществовавшаго еще въ то время хребта Онотскаго, доказывается и описанными въ своемъ мѣстѣ (см. выше) несогласными напластованіями сланцевъ послѣдняго на полевошпатовыхъ породахъ.

Наконецъ, замѣтимъ еще, что Черскій опровергаетъ также и взглядъ Чекановскаго на долину Харбагуры-Хара-жерги, какъ на «долину поднятія», возрѣніе тѣсно связанное съ предполагавшеюся единовременностью образованія обихъ ограничивающихъ её хребтовъ. Онъ рассматриваетъ её, напротивъ, какъ долину размыва, образовавшуюся путемъ извѣстнаго въ природѣ соединенія верховьевъ двухъ противоположныхъ рѣчекъ на питавшей ихъ вершинѣ водораздѣльнаго отрога, подвергшагося впослѣдствіи размыву. Слѣды такого

отрога, вѣрнѣе части его, принадлежащей нынѣшнему Приморскому хребту, можно видѣть на правомъ берегу дугообразнаго поворота Хара-жерги, гдѣ выступаетъ хлоритовый очковый гнейсъ. Бѣлый камень, со стороны Онотскаго хребта, представляетъ, повидимому, остатокъ бывшаго продолженія того же водораздѣльнаго отрога, окончательному разрушенію котораго должны были способствовать въ послѣдствіи и стоячія (озерныя) воды, заполнившія эту мѣстность и отложившія описанный нами наносъ.

Покончивъ съ наличнымъ итогомъ данныхъ, относящихся къ этой весьма интересной, но въ деталяхъ мало изслѣдованной еще мѣстности, перейдемъ къ продолженію описанія прибрежья Байкала, лежащаго на сѣверо-востокъ отъ устья р. Анги.

3) Сѣверо-восточная часть прибрежной полосы горъ, отъ р. Анги до меридіана Ольхонскихъ воротъ. Юго-западная оконечность Малаго моря.

Сѣверо-восточная часть прибрежной полосы горъ, въ которую мы уже отчасти заглядывали во-первыхъ, говоря о долині Уланъ-Бургаса, а затѣмъ, слѣдя за маршрутомъ Черскаго къ Таржиранскимъ озерамъ (см. выше), ограничивается съ юго-западной стороны долиною р. Анги послѣ выхода последней изъ ущелья, съ сѣверо-запада хребтомъ Приморскимъ съ описанными и упоминавшимися уже его высшими точками (гольцы: Уланъ-Бургаскій, Харгойскій и Сарминскій), а съ сѣверо-востока такъ называемыми Ольхонскими воротами, т. е. проливомъ, отдѣляющимъ ю.-в.-й конецъ острова Ольхона отъ материка, и юго-западною оконечностью Малаго моря, извѣстною подъ названіемъ залива Хушилху или Кучулгинскаго, отъ имени впадающей въ него рѣчки, относительно которой заливъ этотъ играетъ роль длинной губы

(см. ниже); наконецъ съ юго-восточной стороны, какъ извѣстно, полоса эта примыкаетъ къ Байкалу, т. е. «Большому морю». Имѣя въ виду во первыхъ, сложность и извилистость самой береговой линіи, распадающейся соотвѣтственно указаннымъ выше границамъ на три части, а во-вторыхъ, экскурсіи, совершавшіяся въ глубину этой полосы горъ, мы раздѣлимъ настоящее изложеніе на три части, начавъ его съ отрѣзка береговой линіи озера отъ устья р. Анги до Ольхонскихъ воротъ.

**Берегъ Байкала отъ устья р. Анги до Ольхонскихъ воротъ и маршрутъ Черскаго отъ Уланъ-нура до долины рч. Жушигу.**

Мы ознакомились уже выше какъ съ очертаніемъ, такъ и съ размѣрами скалистой бухты р. Анги, причемъ было сообщено и о строеніи западнаго берега мыса этой бухты, напоминающей собою въ общемъ какъ бы затопленную котловину верховьевъ какой либо рѣки, если не обращать вниманія на перерывъ, образованный устьемъ Анги. Не доплывъ до послѣдняго, Черскій приблизился къ бѣляющимъ утесамъ восточнаго берега бухты, оказавшейся не глубокою, съ вездѣ замѣтнымъ для глаза песчанымъ дномъ. Большая часть этого склона образуется кристаллическимъ известнякомъ, подъ которымъ залегаетъ роговообманковый сланецъ, переходящій мѣстами почти въ слюдяный, но наклонъ слоевъ здѣсь оказался западнымъ, вслѣдствіе постигшаго этотъ отрогъ сдвига (см. ниже). Ближе къ оконечности восточнаго мыса бухты изъ подъ роговообманковаго сланца выступаетъ сіенито-гранитъ, образующій всю остальную часть этого отрога, о террасовидномъ типѣ и сравнительно небольшой высотѣ котораго мы говорили уже выше, при общемъ обзорѣ склона береговыхъ горъ, видимыхъ съ западныхъ окрестностей Ангинской бухты. Отсюда, т. е. съ оконечности восточнаго Ангинскаго мыса до Ольхонскихъ воротъ считается 25 верстъ, считая по Байкалу и по возможно болѣе прямому

направленію, но береговая линія озера, кромѣ болѣе мелкихъ изгибовъ, троекратно измѣняетъ здѣсь свое направленіе, такъ какъ на первыхъ 9 верстахъ, до мыса Уланъ-нұръ (у Меглицкаго неправильно: «Алла-нұръ») она слѣдуетъ въ общемъ почти на в.-с.-в., затѣмъ до долины Аргойтѣ 1-ой (около 8 верстъ) отклоняется на с.-с.-в., послѣ чего, до мыса Крестъ около входа въ Ольхонскія ворота (10 верстъ отъ Аргойтѣ) опять поворачивается почти на в.-с.-в., причемъ, начиная съ Уланъ-нұра, береговая линія эта входитъ уже въ составъ значительной, хотя и довольно плоской бухтовидной выемки, дополняемой по ту сторону воротъ юго-восточнымъ берегомъ острова Ольхона, какъ это мы увидимъ ниже. Первый изъ упомянутыхъ отрѣзковъ береговой линіи принадлежитъ къ всего болѣе извилистымъ, главнымъ образомъ благодаря довольно обширной бухтѣ, расположенной сейчасъ-же за восточнымъ Ангинскимъ мысомъ. Бухта эта означена на нѣбующихся съѣмкахъ безъ всякаго названія: Черскій, въ свою очередь не пользовался здѣсь хорошимъ проводникомъ, такъ-что только по описанію Агапитова, изслѣдовавшаго древнія изображенія на скалахъ около Байкала (см. ниже), можно полагать, что бухта, о которой идетъ рѣчь, или по крайней мѣрѣ часть ея извѣстна подъ названіемъ Ая, такъ какъ послѣдняя, по весьма краткому, впрочемъ, замѣчанію Агапитова, «расположена верстахъ въ двухъ отъ устья р. Анги къ сѣверо-востоку» <sup>1)</sup>. Бухту эту Георги называлъ Ангинскою (въ отличіе отъ сосѣдней «бухты р. Анги») и въ ней онъ долженъ былъ спастись отъ застигшей его бури (1772 г.); къ сѣверо-восточному углу ея приставалъ затѣмъ Радде (26 іюня 1855 г.), а наконецъ, въ 1879 г. (12-го іюля) въ томъ же углу бухты долженъ былъ ночевать и Черскій, застигнутый сильнымъ волненіемъ съ сѣверо-востока. По описанію послѣд-

---

<sup>1)</sup> Агапитовъ, Изв. В.-Сиб. Отд. И. Р. Геогр. Общ. 1881 г. Т. XII, № 4—5, стр. 7.

ного бухта эта врѣзывается въ прибрежныя горы не менѣе какъ на 1 версту и состоитъ изъ двухъ частей; изъ нихъ самая узкая, расположенная на продолженіи сухой долины, въ видѣ затопленнаго ея низовья, направляется на в.-с.-в. и открывается въ болѣе широкую, сѣверо-восточный берегъ которой пересѣкается четырьмя небольшими долинками. Восточный мысъ Анги, состоя изъ сіенито-гранита, мѣстами порфировиднаго, ограничиваетъ собою только узкую часть бухты; сѣверный склонъ той-же части образуется кристаллическимъ известнякомъ, изъ подъ котораго выступаетъ роговообманковый гнейсъ, составляющій всю длину сѣвернаго берега болѣе широкой части бухты, перерѣзаннаго упомянутыми выше четырьмя долинками; пласты всѣхъ перечисленныхъ породъ падаютъ на ю.-в. Въ нѣкоторыхъ изъ этихъ долинокъ, какъ равно и въ главной, открывающейся въ узкую часть бухты, находятся единственные мѣста, дающіе удобныя, песчанныя пристани для лодокъ, такъ какъ остальная часть побережья очень скалистая. Осмотръ четвертой, т. е. самой восточной долинки, показалъ нахожденіе на ея устьѣ террасы до 20' высоты и состоящей изъ озернаго песчаннаго наноса, въ которомъ тонкіе и горизонтальныя, бурожелтые слои перемежаются съ блѣдножелтыми, почти бѣлыми. Восхожденіе вверхъ по этой короткой долинкѣ убѣдило Черскаго, что то-же озерное отложеніе залегаетъ и въ котловинообразномъ расширеніи ея верховьяхъ, на высотѣ 377' надъ уровнемъ Байкала, гдѣ пласты гнейса падаютъ на ю.-в. съ наклономъ до 65°; мѣстами въ пескѣ наблюдаются пропластки дресвы и гравія, въ особенности около мѣста залеганія и соприкосновенія съ коренною породою; въ наносѣ этомъ отыскался одинъ позвонокъ и лѣвая пястная кость неопредѣленнаго еще жвачнаго животнаго, величиною съ козла. На скалахъ Раде видѣлъ немало чаекъ (*Larus cachinans*), а также гнѣзда галокъ (*Corvus dahuricus*); энтомологическая его коллекція состояла здѣсь изъ красивыхъ экземпляровъ *Sphodrus*, *Galeruca*, *Dorcadion*, *Mylabris* и

*Epicauta*. Онъ углублялся по всей вѣроятности по главной долинь, такъ какъ только вверхъ по ней можно находить бурятскіе улусы. Около одного изъ нихъ, на обратномъ пути, Радде видѣлъ три столба до 6' высоты; на среднемъ столбѣ были прибиты двѣ дощечки до 2' длины въ родѣ дорожныхъ указателей; на второмъ была только одна отвѣсная дощечка, а на третьемъ, подъ такою-же дощечкою висѣли два войлочныя (*Wollfilz*) мѣшечка. Въ этихъ послѣднихъ оказалось нѣкоторое число шерстяныхъ же карманчиковъ, въ которыхъ хранились изображенія бурятскихъ божковъ и нѣкоторыя жертвы. Изъ растений собраны между прочимъ: *Glauximaritima*, *Linum* (дикій ленъ), *Pedicularis*, прекрасныя *Lilium tenuifolium* и *Valeriana*. Ни одному однако изъ этихъ изслѣдователей не довелось тщательно осмотрѣть всей высоты известковыхъ скалъ сѣвернаго берега узкой части бухты, на которыхъ именно, на высотѣ до 10 саженой надъ уровнемъ Байкала, находятся описанныя Агапитовымъ древніе рисунки и начертанія; съ ними, какъ равно и съ другими древностями этой части побережья озера и острова Ольхона, мы ознакомимся въ особомъ параграфѣ изложенія, теперь-же послѣдуемъ далѣе къ сѣверо-востоку, по направленію къ Ольхонскимъ воротамъ.

Только на слѣдующій день (13 іюля), въ 11 ч. утра, разсѣялся густой туманъ, покрывшій ночью поверхность Байкала, и Черскій могъ покинуть описанную бухту, впрочемъ при весьма ненадежномъ состояніи озера, такъ какъ утихшее сѣверо-восточное волненіе начинало смѣняться юго-западнымъ. Брустверовидный скалистый берегъ повернулъ на в.-с.-в., мѣстами омывался непосредственно водою. Три версты спустя путешественникъ достигъ западнаго мыса Уланъ-нурской бухты, склонъ горъ которой пересѣкается тремя долинами. Волненіе весьма быстро увеличилось и достигло такой силы, при которой плавающій Черскій не могъ уже держаться вблизи берега и потому необходимо

было пристать въ одну изъ упомянутыхъ долинокъ; для этой цѣли избрана была третья, т. е. крайняя восточная, но, лишь только лодка успѣла приблизиться на сажень отъ берега, на неё наскочилъ громадный валъ и съ помощью слѣдующихъ за нимъ нѣсколькихъ другихъ, лодка почти мгновенно была залита водою, по счастью уже на неглубокомъ прибрежьи. Почти столь же мгновенно гребцами были вытащены всѣ тюки съ сухарями, спасшимися поэтому отъ неминуемой подмочки, все-же остальное а затѣмъ и потонувшую лодку съ тяжелыми коллекціями необходимо было вытаскивать уже изъ подъ уровня взволнованнаго Байкала, что сопряжено было съ немалыми затрудненіями вслѣдствіе сильнаго прибоа волнъ. Что же касается всплывшихъ различныхъ деревянныхъ вещей, въ томъ числѣ и брошенныхъ веселъ, то всѣ они вскорѣ были выброшены на берегъ волнами. Долинка, къ которой присталъ Черскій, носитъ названіе Уланъ-нурской, хотя сама она, какъ и вся бухта, ничѣмъ не заслуживаетъ этого имени, означающаго въ дословномъ переводѣ: красное (уланъ) озеро (нуръ); она, какъ и другія въ той же бухтѣ (въ особенности средняя), очень короткая и напоминаетъ собою какъ бы котловинообразное верховье долины, остальная часть которой скрыта подъ уровнемъ озера. На высотѣ около 37' въ ней располагается наносная песчаная терраса; что же касается высоты окружающихъ её горъ, то она измѣняется отъ 456 до 1307' надъ Байкаломъ, причемъ высшій пунктъ располагается ближе къ сѣверной части окружности котловины. На пути къ этой вершинѣ, на высотѣ 1070' надъ озеромъ, располагается уединенная скала до 14' высоты въ формѣ какъ бы маленькаго зданія съ башнею на одномъ изъ концовъ, причемъ около самой вершины этой башни замѣчается кругъ, въ родѣ циферблата часовъ, который при ближайшемъ осмотрѣ оказывается ничѣмъ другимъ какъ сферой, зависящей отъ шаровидной отдѣльности породы (см. ниже). Взглядъ на мѣстность съ высшаго пункта

(1307' н. Байк.) поучителенъ въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ. Отсюда видно во первыхъ, что сейчасъ же за узкою цѣпью прибрежныхъ высотъ располагается широкая продольная долина, вполне напоминающая собою описанную выше Худыктуйскую, по которой Ольхонская дорога слѣдуетъ отъ р. Анги къ Думѣ. Она точно также направляется на з.-ю.-з. къ лѣвому берегу низовьевъ Анги и повидимому пересѣкается тамъ нижнею частью Таржиранской долины, одно изъ озеръ которой виднѣется отсюда на з.-ю.-з. Но долина эта, которую Черскій называетъ Уланъ-нурскою продольною, лежитъ южнѣ Худыктуйской и отличается повидимому почти горизонтальнымъ положеніемъ дна, безъ видимаго наклона въ сторону Анги, и, почти на меридіанѣ Уланъ-нурской бухты, достигаетъ 736' надъ Байкаломъ. Замѣчательно тоже, что долина эта къ сѣверо-востоку является отчасти открытою и къ Байкалу, гдѣ она состоитъ изъ двухъ вѣтвей, долженствовавшихъ образовать ея верховья. Обстоятельство это достигается посредствомъ двухъ, сравнительно узкихъ долинокъ, круто падающихъ къ Байкалу, но своими верховьями сливающихся плавно и совершенно съ южною вѣтвью продольной Уланъ-нурской; одна изъ этихъ долинокъ, ближайшая и поперечная, открывается въ сосѣднюю съ Уланъ-нурскою бухту и носитъ названіе Буракшинъ, другая-же, продольная, впадаетъ въ слѣдующую бухточку и извѣстна подъ названіемъ Россѣ-амынъ (см. ниже), а между ними располагается гора Россѣ, достигающая 1368' надъ Байкаломъ (см. ниже). Такого рода условія, при современномъ уровнѣ нашихъ свѣдѣній о происхожденіи конфигураціи, могутъ быть объяснены не иначе, какъ допуская, что описанное отношеніе долинокъ Буракшинъ и Россѣ-амынъ достигнуто отступающимъ движеніемъ ихъ, прежде обособленныхъ и самостоятельныхъ верховьевъ до тѣхъ поръ, пока не разрушилась преграда, отдѣлявшая ихъ отъ Уланъ-нурской, съ лѣвымъ верховьемъ которой долинки эти сливаются теперь совершенно. Съ этой



точки зрѣнія продольная Уланъ-нурская долина принадлежитъ системѣ р. Анги, являясь самою южною изъ трехъ долинъ (Уланъ-бургаская, Худыктуйская и Уланъ-нурская), которыми прибрежная полоса горъ на востокъ отъ Анги расчленяется на главныя, параллельныя между собою и вмѣстѣ съ тѣмъ продольныя гряды, придающія этой мѣстности своеобразный характеръ. Обойдя по гребню горъ всю котловину, къ которой пристала лодка, Черскій спустился въ продольную Уланъ-нурскую долину, къ расположенному тамъ сомнительному бурятскому улусу (736' надъ Байк.), пересѣвая долину вообще въ сѣверномъ направленіи, чтобы выйти въ Ольхонскую инородческую думу. На днѣ долины наблюдаются выходы головъ кристаллическаго известняка, полосы котораго тянутся вообще къ с.-в. или в.-с.-в.; мѣстами можно видѣть обнаженнымъ наносное отложение, состоящее изъ красной глины. Ближе къ сѣверному склону долины, за известнякомъ, тянутся такія-же полосы роговообманковаго сланца, затѣмъ, на подъемѣ, опять слой известняка и за нимъ довольно мощный пластъ роговообманковаго гнейса, переходящаго въ неяснослойное видоизмѣненіе съ множествомъ кварцевыхъ жилъ. Высшій пунетъ продольной гряды, на которую поднялся путешественникъ, оказался равнымъ 1326' надъ Байкаломъ. Съ этого перевала открылся хорошій видъ на расположенную къ сѣверу отъ него верхнюю часть Худыктуйской долины, знакомой намъ въ ея нижней части изъ описанія экскурсіи Черскаго къ Таржиранскимъ озерамъ. Достигая здѣсь достаточной ширины и располагаясь на высотѣ 1000' надъ Байкаломъ, долина эта раздѣляется еще низкими продольными гребнями обнажающихся головъ коренныхъ породъ на второстепенныя части, по сѣверной изъ которыхъ продолжается Ольхонская дорога. Несмотря на весьма явный наклонъ въ сторону р. Анги,—наклонъ, по всей вѣроятности преувеличенный еще указанною здѣсь цифрою высоты, которую Черскій не придаетъ особеннаго значенія, вслѣдствіе непо-

стоянныхъ атмосферныхъ условій, долина эта, какъ и Уланъ-нурская, открывается также и къ Байкалу, съ помощью сравнительно узкой ложбины, называемой Аргойта-аминъ (см. ниже). Почва въ этой ложбинѣ состоитъ изъ уплотненнаго слоистаго суглинистаго наноса, буровато-желтаго цвѣта съ бѣлыми прослойками или же краснаго, какъ въ Уланъ-нурской, очевидно озернаго происхожденія (см. ниже); въ качествѣ коренной породы является все также перемежаемость кристаллическаго известняка съ роговообманковыми и полевошпатовыми породами, сохраняющими тоже (в.-с.-в. до с.-в.) простираніе. Далѣе, за небольшимъ переваломъ, дорога спускается въ долину Хара-булука системы рч. Хушилху, впадающей въ Малое Море (см. ниже), и достигаетъ Ольхонской думы, расположенной въ верховьяхъ Хара-Булука. Нанявъ здѣсь свѣдущаго проводника-бурята, необходимаго для предстоявшаго плаванія вокругъ острова Ольхона и въ Ольхонскихъ воротахъ, Черскій возвратился къ палаткѣ въ Уланъ-нурской бухтѣ. Прежде нежели покинуть эту послѣднюю, замѣтимъ, что Черскій считаетъ еще недоказаннымъ предполагавшуюся Чебановскимъ изверженность породы, обнаженной около Уланъ-нурскаго мыса, т. е. вокругъ верховьевъ поперечной Уланъ-нурской долины. Дѣйствительно, въ обнаженной тамъ той-же перемежаемости полевошпатовыхъ породъ съ кристаллическимъ известнякомъ замѣчаются довольно своеобразныя явленія <sup>1)</sup>. Такъ напр., какъ роговообманковый сланецъ, такъ сіенитогранитъ и даже известнякъ принимаютъ нерѣдко весьма хорошо развитую сферическую и концентрически-скорлуповатую отдѣльность, обусловливающую мѣстами весьма оригинальное зрѣлище, въ особенности тамъ, гдѣ на мѣстѣ выхода головъ роговообманковаго сланца обнаруживаются цѣлые ряды маленькихъ сферъ, лежащихъ по линіи простиранія пластовъ;

<sup>1)</sup> Черскій, Отчетъ за 1879 г. loc. cit. стр. 15—17.

точно также здѣсь замѣчаются и различнаго рода изгибы слоевъ, даже наблюдался наклонъ пластовъ въ различныя стороны отъ одного и того-же центра (такъ называемое «квакверзальное» паденіе пластовъ); но послѣднее явленіе, какъ и всѣ перегибы, отличается миниатюрнымъ масштабомъ (на протяженіи 2 или 3 сажень), а всѣ массивныя породы до того рѣдко переходятъ въ слоистыя, что ихъ можно считать лишь массивными видоизмѣненіями послѣднихъ, за исключеніемъ впрочемъ только одной, найденной Черскимъ, незначительной жилы грюнштейна въ известнякѣ, о которой у Чекановскаго не упоминается вовсе.

Въ размѣщеніи мысовъ въ промежуткѣ между устьемъ р. Анги и Ольхонскими воротами у академика Георги встрѣчаются нѣкоторые недоразумѣнія, не позволяющія судить, къ какому изъ существующихъ здѣсь мысовидныхъ выступовъ относится данное названіе, въ особенности потому, что въ настоящее время названія эти вышли уже изъ употребленія. Изъ различаемыхъ имъ здѣсь, однако, двухъ мысовъ названіе «Заворотный» въ 5-ти верстахъ отъ Анги, примѣнно развѣ къ восточному Ангинскому мысу, а «Утесовый» къ Улань-нурскому мысу, ограничивающему соименную бухту съ сѣверо-востока, хотя разстояніе его отъ Анги у Георги (20 верстъ) слишкомъ преувеличено. Отъ этого мыса, а въ особенности спустя съ 2 версты за нимъ, берегъ поворачиваетъ на с.-с.-в., по направленію къ упоминавшейся выше долинкѣ Ардойтэ-амынъ, и даетъ болѣе или менѣе поперечный, вѣрнѣе діагональный разрѣзъ мѣстности. Скалистый и почти отвѣсный склонъ, нерѣдко омываемый непосредственно водою, тянется за этимъ мысомъ, окружая собою бухту Бѣракинъ, въ которую открывается соименная долинка, отводящая южное верховье продольно Улань-нурской долины къ Байкалу; только сѣверо-восточный мысъ этой бухточки отличается наноснымъ побережьемъ и даетъ хорошую пристань. Утесы эти интересны въ томъ от-

ношеніи, что обнаженные въ нихъ многочисленные прослой известняка обнаруживаютъ различныя степени ихъ измѣненія, обусловленнаго, по мнѣнію Черскаго, болѣе или менѣе значительнымъ ихъ выщелачиваніемъ: нѣкоторыя изъ нихъ являются поэтому въ разрѣзѣ въ видѣ вполне видимыхъ чечевицъ съ тонкими и выклинивающимися отростками на продолженіи ихъ длинныхъ осей, другія являются въ видѣ толстыхъ жилъ, выклинивающихся весьма быстро кверху, третьи затѣмъ обнаруживаютъ обратное отношеніе къ уровню озера, причемъ можно видѣть и нѣчто въ родѣ развѣтвленія, зависающаго какъ бы отъ сближенія и частичнаго соприкосновенія другъ съ другомъ двухъ такихъ чечевицъ. Явленіе это, требующее детальнаго изслѣдованія, поучительно въ томъ отношеніи, что такого рода выщелачиваніемъ и совершеннымъ уничтоженіемъ различныхъ частей известковыхъ прослойковъ должно было вызываться соотвѣтственное сближеніе и изгибаніе перемежавшихся съ ними пластовъ полевошпатowych и роговообманковыхъ породъ; этимъ путемъ могла достигаться, если не вся, то по крайней мѣрѣ значительная часть описанной выше извилистости слоевъ. Крутое паденіе пластовъ, измѣнявшееся отъ ю.-в. до с.-з., переходитъ ближе къ долиנѣ Россее-амынъ въ весьма правильное ю.-ю.-в. Имѣя въ виду болѣе подробное ознакомленіе съ отношеніемъ этой довольно глубокой долины къ продольной Уланъ-нурской, Черскій сдѣлалъ экскурсію вверхъ по ея правому берегу, на расположенную здѣсь гору того же имени. Направленіе долины къ Байкалу оказалось в.-с.  $15^{\circ}$ ; низовья ея проложены въ пластѣ кристаллическаго известняка, слои котораго падаютъ довольно круто ( $50^{\circ}$  и болѣе) на ю.-ю.-в.; по головамъ этой породы, образующей правый берегъ долины, Черскій началъ восхожденіе на вершину горы Россее-амынъ. Ближайшій изъ болѣе высокихъ пунктовъ располагается на неправильномъ уступѣ склона, образующемъ какъ бы предгорье для высшей точки горы; высота этого мѣста оказалась

равною 744' надъ Байкаломъ, приче́мъ на глазъ уже видно, что уступъ этотъ замѣтно превышаетъ собою уровень верхней части продольной Уланъ-нурской долины, такъ-что цифра 736' н. Байк., полученную для неанероидомъ (см. выше), слѣдуетъ считать нѣсколько преувеличенную. Уступъ этотъ образуется пластомъ роговообманковаго гнейса и сланца, залегающаго поверхъ известняка и заключающаго въ составѣ нѣрѣдко столько зеренъ известковаго шпата, что нѣкоторыя части его можно было бы назвать известково-роговообманковымъ сланцемъ; въ пластахъ его замѣтенъ изгибъ по линіи ихъ простиранія, такъ-что ближе къ Байкалу слои падаютъ на ю.-з., а къ востоку наклонъ этотъ постепенно переходитъ въ ю.-ю.-в. и ю.-в.; здѣсь-же замѣчаются и пластовыя кварцевыя жилы, содержащія мѣстами колчеданъ въ небольшомъ количествѣ. Отсюда можно видѣть съ достаточною отчетливостью, какъ лѣвая вѣтвь верховьевъ долины Россѣ врезывается въ дно Уланъ-нурской, которая прежде, повидимому, должна была продолжаться еще нѣсколько далѣе къ сѣверо-востоку, т. е. ближе къ Байкалу. Склонъ горы, къ которому примыкаетъ описанный уступъ, образуется головами другаго известковаго пласта, покрывающаго роговообманковый сланецъ и падающаго вполне согласно съ нимъ на ю.-ю.-в.; на высотѣ 989' надъ озеромъ, порода эта въ свою очередь покрывается роговообманковымъ гнейсомъ и сланцемъ. Среди осыпанныхъ частей головъ этихъ породъ, ближе къ вершинѣ горы, попадаются куски подчиненной имъ здѣсь гранатовой породы въ весьма красивомъ ея видоизмненіи, съ трещинками, выполненными гранатовыми щетками; порода эта, судя по розсыпи, развита здѣсь однако въ самомъ ограниченномъ видѣ, въ другихъ же мѣстахъ Прибайкалья она нигдѣ не замѣчена. На весьма тонкомъ слоѣ детритуса описаннаго склона произрастають группы хвойныхъ деревьевъ, столь рѣдкія въ описываемой полосѣ горъ. На высшемъ пунктѣ горы анероидъ показалъ 1368' надъ Ба

каломъ. Пунктъ этотъ является въ видѣ округленнаго гребня, вытянутаго на з.-ю.-з., т. е. по линіи простиранія породъ. Отсюда видно, что гора эта, вмѣстѣ съ прилежащими къ ней съ южной стороны болѣе низкими вершинами, образуетъ водораздѣлъ между долинками: Россѣ съ сѣвера, и Буракшина съ юга, а также Уланъ-нурскою съ западной стороны; среди роговообманковаго гнейса попадаются прослойки, въ которыхъ роговая обманка замѣняется пироксеномъ (байкалитомъ), какъ въ Тункинской долині по р. Иркуту и т. п. Спускаясь по западному склону горы, чтобы осмотрѣть верховья долины Россѣ, Черскій въ свою очередь наткнулся на россыпь гранатовой породы. Правое верховье долины является почти поперечнымъ къ простиранію пластовъ, въ противоположность главному, т. е. лѣвому. Благодаря безлѣсности и весьма скудному наносу, всего чаще отсутствующему совершенно, можно видѣть, какъ одинъ изъ пластовъ, пересѣкаемыхъ правымъ верховьемъ Россѣ, достигающій на его лѣвомъ берегу нѣсколькихъ десятковъ саженой толщины, постепенно выклинивается, перейдя на правый берегъ, т. е. по линіи своего простиранія, обуславливая соотвѣтственный изгибъ прилежащихъ къ нему пластовъ сланцевъ; въ томъ же пластѣ известняка, гдѣ его пересѣкаетъ долина, наблюдаются и воронкообразныя углубленія почвы,—очевидные результаты проваловъ размывшихъ въ немъ полостей. Но однимъ изъ болѣе интересныхъ явленій, замѣчаемыхъ въ области верховьевъ описываемой долины, нельзя не считать слоистый песчаный наносъ красноватаго цвѣта, достигающій мѣстами довольно мощнаго развитія; наносъ этотъ можно прослѣдить до высоты 695' надъ Байкаломъ и до высоты Уланъ-нурской долины съ одной стороны, и до уровня Байкала съ другой, причемъ вездѣ онъ сохраняетъ озерный характеръ и горизонтальную слоистость. Изъ этого очевидно во-первыхъ, что въ періодъ высокаго стоянія воды въ Байкалѣ имѣла затоплялась Уланъ-нурская долина, а слѣдовательно и

другія, принадлежащія системѣ р. Анги, а во-вторыхъ, что захватъ Уланъ-нурской долины вторгнувшимися въ нее верховьями Россее-амынъ имѣлъ мѣсто еще до отложенія описаннаго наноса. Что-же касается несовпаденія между высотой извѣстнаго залеганія такого наноса и высотой описанныхъ выше террасъ, значительно превосходящихъ уровень расположенія здѣсь слоистаго песка, то необходимо замѣтить, что этого рода озерные осадки должны были впоследствии подвергаться значительному преобразованію и уничтоженію не только путемъ смыва ихъ со склоновъ болѣе высокихъ горъ, но и сдуваніемъ ихъ вѣтрами и ураганами, столь частыми и сильными на Байкалѣ. Если принять во вниманіе безлѣтность этой полосы горъ, столь облегчающую процессу сдуванія сыпучихъ песковъ, къ тому же расчлененіе широкими продольными долинами, направленіе которыхъ совпадаетъ съ направленіемъ господствующихъ вѣтровъ, то сдѣлается вполне очевиднымъ, что уровень современнаго залеганія слоистыхъ песковъ въ этой мѣстности, какъ и вообще на склонахъ прибрежныхъ горъ Байкала, не можетъ намъ дать понятія о дѣйствительной высотѣ бывшаго стоянія воды въ озерѣ. Цифры, которыми выражается высота современнаго положенія древнихъ озерныхъ наносовъ, должны быть поэтому вообще несравненно меньше высоты, до которой достигала необычайно высокая въ то время поверхность озера, обличаемая какъ данными, описанными нами въ юго-западныхъ его окрестностяхъ, такъ совпадающею съ ними высотой террасъ, хотя руководящее значеніе послѣднихъ, въ особенности вдали отъ наносныхъ отложеній, страдаетъ, въ свою очередь, невозможностью судить о времени, которому принадлежитъ ихъ образованіе.

Почти меридіональное направленіе скалистаго берега озера продолжается еще болѣе 3 верстъ до бухты Аргоита, расположенной на самомъ поворотѣ береговой линіи къ в.-с.-в., въ сторону Ольхонскихъ воротъ. Особенности какъ

склона горъ, такъ и ихъ строеніа на этомъ протяженіи не отличаются отъ описанныхъ выше, и только въ стратиграфическомъ отношеніи слѣдуетъ замѣтить, что, недоѣзжая Аргойтѣ, пласты, падавшіе сначала на ю.-ю.-в., образуютъ антиклинальный перегибъ и далѣе обнаруживаютъ уже с.-с.-з. наклонъ. Долина Аргойтѣ, или Аргойтѣ-амынъ (*амынъ* означаетъ собственно *устье*), какъ сказано уже выше, играетъ въ сущности такую же роль относительно верховьевъ Худыктуйской долины, какъ Бурашкинъ и Россѣ относительно Уланъ-нурской; она точно также короткая, сухая, съ песчанымъ наносомъ, но кромѣ того въ ней произрастаетъ еще, хотя и скудно, сосна и расположены двѣ бурятскія юрты.

Отъ устья Аргойтѣ до Ольхонскихъ воротъ остается уже не болѣе 10 верстъ къ в.-с.-в. Берегъ, на этомъ протяженіи, образуетъ нѣсколько незначительныхъ бухтовидныхъ выемокъ и только во второй половинѣ длины онъ слегка изгибается въ видѣ хотя и длинной, но весьма плоской Тункырской бухты. Еще съ окрестностей долины Россѣ открывается хорошій видъ на горы, образующія эту часть прибрежной полосы. Вслѣдъ за вершиною Россѣ (1368' н. Байк.) возвышаются вблизи отъ берега еще двѣ почти такія же, изъ которыхъ болѣе заостренная, лежащая за лѣвымъ берегомъ Аргойтѣ и болѣе удаленная отъ озера, носить названіе Аргойтѣ хадай, у русскихъ гора Ворожейкина; за нею, спустя высокую и широкую сѣдловину, возвышается почти соско-видная вершина Танхынъ (1917' н. Байк., см. ниже), кульминаціонный пунктъ всей этой мѣстности, начиная съ котораго, во второй половинѣ длины прибрежья, располагается еще болѣе широкая сѣдловина, углубляющаяся ближе къ Воротамъ, въ области долинки Тункыръ, до высоты всего лишь около 100' надъ Байкаломъ, тогда какъ по направленію къ Ольхонскому зунду или воротамъ, сѣдловина эта ограничивается горою мыса Крестъ, достигающею 233' высоты



надъ озеромъ. Столь-же опасный, почти отвѣсный и высокій скалистый склонъ прерывается на всемъ этомъ протяженіи пятью узкими и крутыми сухими долинками, а именно: Безъимянною, сейчасъ же за Аргойтѣ, съ незначительнымъ наноснымъ мыскомъ за ея устьемъ, затѣмъ Аргойтинъ-зунъ-кугъ, лежащая между горами Аргойтѣ и Танхыномъ, далѣе Танхынн-барунъ-кугъ и Танхынн-нѣхунъ, а за ними, въ небольшой бухточкѣ, Танхынн-зунъ-куго, нисходящія съ южной покатости Танхына; наконецъ, въ самой глубокой части упомянутой выше сѣдловины, въ бухтовидную выемку, открывается глубокая, но узкая, овраговидная долина Тункыръ, въ разстояніи менѣе 3 верстъ отъ мыса Крестъ, съ котораго начинаются Ольхонскіе ворота. Экскурсія на высоты лѣваго берега низовьевъ Тункырской долины обнаружила весьма интересное отношеніе ея къ другой, высохшей долиנѣ. Оказывается, что за ближайшимъ къ озеру гребнемъ горъ располагается довольно широкая, но сухая, продольная долина, впадающая въ ближайшій, самый южный заливъ Ольхонскихъ воротъ, называемый Тутскимъ (Туть), который имѣетъ видъ затопленного низовья этой долины. Верховья долины состоятъ какъ бы изъ двухъ вѣтвей, изъ которыхъ лѣвая, вполне правильно развитая, съ бассейновиднымъ расширеніемъ, располагается около сѣвернаго подножья горы Танхынъ, верстахъ въ шести отъ устья, т. е. отъ залива, между тѣмъ какъ правая теряется въ террасовидномъ уступѣ южнаго склона Танхына. Правый берегъ этой долины, которую Черскій называетъ Тункырско-Тутскою, является въ видѣ прибрежнаго гребня горъ, круто, мѣстами почти отвѣсно опускающагося къ Байкалу, волны котораго значительно подмываютъ эту скалистую стѣну. Результатомъ такого подмывающаго дѣйствія волнъ является и Тункырская бухточка («Тункыри амьнъ»), на мѣстѣ которой гребень праваго берега Тункырско-Тутской долины пострадалъ

столько, что часть его уничтожилась совершенно, при чемъ захвачена даже и частица лежащаго за нимъ дна долины, т. е. тальвега, на высотѣ до 227' надъ озеромъ. Происшедшая такимъ образомъ брешь въ правомъ берегѣ нашей долины сдѣлалась со временемъ достояніемъ періодическихъ водъ, стекавшихъ по склону утеса въ Байкаль, вслѣдствіе чего въ этомъ мѣстѣ и образовался оврагъ Тункырѣ. Верховья его постепенно врѣзывались въ направленіи поперечномъ къ захваченной древней долинѣ, ниже соединенія ея обоихъ верховьевъ и, достигнувъ наконецъ ложа лѣвой изъ этихъ вѣтвей, новый оврагъ захватилъ въ себя и воду періодическаго ключа, питающагося на сѣверномъ склонѣ Танхына, что послужило ему очевидно къ болѣе значительному углубленію и расширенію собственной долины, а также къ окончательному осушенію нижняго отрѣзка Тункырско-Тутской долины, слѣдующей на с.-в., къ Ольхонскимъ воротамъ, т. е. къ Тутскому заливу. Такимъ образомъ, отъ древней Тутской долины, съ устьемъ на с.-в., въ Воротахъ, осталась нынѣ только нижняя, меньшая ея часть, версты съ 3, считая вмѣстѣ съ заливомъ, тогда какъ верхняя, болѣе большая часть (5 верстъ) преобразовалась нынѣ въ Тункырскую, съ устьемъ на югъ, къ Байкалу, хотя ложбина Тункырскаго оврага въ общемъ лишь немного нарушила правильность прежней кривой линіи дна Тутской долины, образовавъ лишь небольшой перекалъ въ отрѣзанной оврагомъ ея нижней части.

Тѣмъ не менѣе бурятскій улусъ, лежащій около устья долины въ заливѣ называется Тутъ, а расположенный въ прежнемъ ея верховьи около сѣвернаго подножья Танхына, на высотѣ 903' надъ озеромъ, носитъ уже названіе Тункырскаго улуса; дно всей этой долины совершенно покрыто травой, хотя и скудною; свалистость почвы свойственна только ея склонамъ и оврагу Тункырѣ; лѣсная растительность, какъ мы увидимъ ниже, присуща только сѣверному склону и вершинѣ Танхына.

Не менѣе интересныя явленія наблюдалъ Черскій и при осмотрѣ верховьевъ Тункырско-Тутской долины. Мы говорили уже выше, что лѣвое изъ нихъ развито вполне правильно и въ немъ построенъ упомянутый нами зимній Тункырскій улусъ. Что-же касается праваго, ограниченного съ сѣверной стороны Танхыномъ, а съ южной (т. е. съ правой) прибрежнымъ гребнемъ горъ, то, слѣдуя вверхъ по его долині, оказывается, что сейчасъ-же выше ея слиянія съ лѣвою, она сразу теряетъ весь свой правый склонъ, т. е. прибрежный гребень, такъ-что дно долины является вполне открытымъ къ Байкалу, представляя террасовидный уступъ на высотѣ почти отвѣсныхъ и до сихъ поръ подмываемыхъ волнами, высокихъ береговыхъ скалъ озера, послѣ чего и уступъ этотъ суживается, а затѣмъ и исчезаетъ въ неровностяхъ южнаго склона Танхына.

Если первые изслѣдователи Байкала, вглядываясь въ отвѣсно усѣченные оконечности нѣкоторыхъ его мысовъ, спрашивали: куда дѣвалась другая половина этой горы? то въ настоящемъ случаѣ, говорить Черскій, рождается уже невольный вопросъ: что сдѣлалось съ горами праваго берега этой долины, а наконецъ и съ ея верховьемъ? Отвѣтъ на этотъ вопросъ очевидно тотъ-же, что и относительно усѣченныхъ, горообразныхъ мысовъ; только явленія эти никакъ не уязвляютъ на бывшій здѣсь провалъ, какъ полагали въ свое время, но служатъ нагляднымъ доказательствомъ въ сущности такого-же захвата прибрежныхъ горъ приборомъ волнъ Байкала, примѣры котораго, въ несравненно большемъ масштабѣ, хорошо извѣстны по берегамъ современныхъ морей и океановъ.<sup>1)</sup> Въ геогностическомъ отношеніи описанная часть берега сохраняетъ тѣ-же особенности, какъ и выше; паденіе пластовъ вездѣ с.-с.-з., причемъ въ перемѣщаемости участвуютъ здѣсь всего лишь два пласта известняковъ (около Танхына и ближе къ Тункырскому оврагу).

<sup>1)</sup> Черскій, Рукописныя замѣтки о Сибири.

Юго-западный или материковый берег Ольхоновых воротъ, отъ мыса Кресть до мыса Уланъ-хадай.

Огибая мысъ Кресть, около котораго, на узкомъ прибрежьи построена малая рыбацья юрта, путешественникъ вступаетъ уже въ Ольхонскія ворота, т. е. узкій (до  $1\frac{1}{2}$ —2 версты) проливъ (зундъ), отдѣляющій юго-западную оконечность острова Ольхона отъ прилежащей части материка; вмѣстѣ съ тѣмъ открывается и весьма хорошій видъ на эту живописную мѣстность. Узкая полоса воды зунда, протянувшаяся на 8 версты къ с.-с.-з., стѣсняется здѣсь рядомъ скалистыхъ и живописныхъ мысовъ, протянувшихся какъ со стороны материка, такъ и Ольхона; изъ мысовъ этихъ, ограничивающихъ врѣзавшіеся между ними прелестныя бухты, видны отсюда какъ Ольхонскій Хоринъ-иргъ (у русскихъ: Кобылья голова) съ его оригинально понизившеюся оконечностью (см. ниже), такъ и частичка материковаго Уланъ-хадай, за которыми располагается уже юго-западная часть и оконечность Малаго моря; наконецъ задній планъ перспективы образуется видимымъ отсюда юго-западнымъ склономъ Приморскаго хребта съ котловинообразнымъ расширеніемъ низовьевъ пересѣкающей его долины рѣки Сармы, такъ-что Ольхонскія ворота располагаются какъ-бы на продолженіи этой долины, о чемъ съ большею подробностью будетъ сказано въ особомъ параграфѣ нашего изложенія, вмѣстѣ съ общимъ обзорѣніемъ Ольхонскаго зунда. Теперь-же приступимъ къ ознакомленію съ материковымъ берегомъ воротъ, придерживаясь маршрута Черскаго отъ мыса Кресть до Уланъ-хадай.

Продольный къ Байкалу отрогъ, образующій правый берегъ знакомой намъ нынѣ безводной и отчасти преобразованной уже Тунгырско-Тутской долины, значительно расширяется съ сѣверной стороны около низовьевъ этой долины, затопленныхъ водою Байкала и превращенныхъ въ Тутскій заливъ; вмѣстѣ съ тѣмъ отрогъ этотъ ближе къ своей око-

нечности, возвышается до 766' надъ уровнемъ озера, послѣ чего, со стороны Воротъ, онъ усѣченъ въ поперечномъ направленіи. Небольшая бухтовидная выемка, извѣстная подъ названіемъ Хунхитѣ, раздѣляетъ эту скалистую оконечность отрога на двѣ части; изъ нихъ южная составляетъ собою упоминавшійся уже выше мысъ Крестъ, названный такъ потому, что въ прежнее время на немъ былъ поставленъ не существующій уже нынѣ крестъ, тогда какъ сѣверный уголъ раздвоенной такимъ образомъ оконечности отрога образуетъ мысъ Тутъ, ограничивающій соименный (Тутскій) заливъ съ южной стороны. Изъ бухты Хунхитѣ, снабженной хотя и узкимъ, но песчанымъ побережьемъ, ведетъ вверхъ на отрогъ крутая и сухая, не глубокая долина, слѣдуя по которой, Черскій наблюдалъ слоистый песчаный наносъ, переходящій и на верхнюю поверхность понизившагося здѣсь отрога, гдѣ озерный осадокъ этотъ залегаетъ на высотѣ 399' надъ уровнемъ озера. Отрогъ образуется гнейсомъ, переходящимъ мѣстами въ гранито-гнейсъ и гранитъ; паденіе пластовъ его вездѣ с.-с.-з.-ное. Съ высоты его весьма хорошо обозрѣвается первый, т. е. самый южный заливъ Ольхонскихъ воротъ, именно Тутскій. Достигая повидимому около 2 верстъ въ длину при ширинѣ около  $\frac{1}{2}$  версты, располагаясь къ тому-же на прямомъ продолженіи Тункырско-Тутской долины, онъ дѣйствительно имѣетъ видъ затопленнаго продолженія этой долины, безъ рѣзко замѣтныхъ слѣдовъ расширяющаго дѣйствія прибойныхъ волнъ, вслѣдствіе чего онъ можетъ служить хорошимъ типомъ «заливовъ или бухтъ затопленія», называемыхъ такъ Черскимъ въ отличіе отъ такихъ-же «прибойныхъ» формъ, вызванныхъ соотвѣственнымъ размывомъ отъ прибоя волнъ, (озерныхъ или морскихъ) и принимающихъ болѣе или менѣе амфитеатральныя типъ.<sup>1)</sup> Заливъ этотъ слегка изогнутъ съ выпуклостью, обра-

---

<sup>1)</sup> Черскій, Рукописныя замѣтки о Сибири.

щенною къ сѣверо-востоку и нѣсколько расширенъ въ восточной половинѣ долины, которая отдѣляется отъ западной, болѣе узкой, незначительнымъ мысовиднымъ выступомъ сѣвернаго берега. На поверхности залива видѣются три наносныхъ островка, поросшихъ камышемъ: изъ нихъ одинъ около ю.-в. берега узкой части, другой около того-же берега но ближе къ Тутскому мысу, между тѣмъ какъ третій лежитъ около сѣверо-западнаго берега болѣе широкой части вблизи упомянутого выше мысовиднаго выступа. Первые два уже почти превратились въ полуострова помощью узенькихъ перешейковъ; кромѣ того западнѣе втораго изъ нихъ скоро образуется четвертый островокъ, обозначенный уже вырастающимъ на отмели камышемъ. Почти весь заливъ этотъ проложенъ въ упомянутыхъ выше полевошпатовыхъ породахъ и только на сѣверо-западномъ берегу его, около островка, выходитъ одинъ пропластокъ кристаллическаго известняка. Замѣтивъ, что въ самыя низовья Тутской долины открывается еще другая, меньшая, въ роли ея лѣвой вѣтви, перейдемъ къ дальнѣйшему плаванію Черскаго вдоль этого берега Воротъ.

Отрогъ, ограничивающій Тункырско-Тутскую долину съ лѣвой стороны, достигаетъ около 800' надъ Байкаломъ въ восточной своей части, гдѣ онъ принимаетъ почти террасовидный типъ, послѣ чего, только вблизи Воротъ, понижается и оканчивается похоже на описанный выше, такъ-что въ немъ точно также различаютъ два мыса и разобщающую ихъ небольшую бухтовидную выемку въ родѣ Хунхатѣ, только не имѣющую названія. Южный мысъ, ограничивающій Тутскій заливъ съ сѣверной стороны, именуется У х ѣ р ь - г а р г а ш и (или У к ѣ р ь - г а р г а ш и) отъ того, что на него обыкновенно сгоняютъ скотъ (*ухѣръ* или *укѣръ*), а слѣдующій за нимъ, сѣверный, Х а р г а н т а; утесы эти состоятъ изъ роговообманковаго гнейса, падающаго круто на с.-с.-з. Сейчасъ-же за Харгантою путешественникъ вступаетъ въ небольшую, но довольно глубоко врывающуюся бухту, называемую Перевозъ, такъ какъ изъ

нея переплавляютъ идущихъ на островъ Ольхонъ, отличающийся весьма оригинальными особенностями. Если вообразить, говорить Черскій, куполообразный островъ до 30' высоты, половина котораго, обращенная къ Воротамъ вполне уничтожена почти отвѣснымъ, нѣсколько вогнутымъ разрывомъ, тогда какъ оставшаяся часть связана съ материкомъ черезъ посредство низменнаго наноснаго, песчанаго перешейка, то мы получимъ дѣйствительное представленіе топографическихъ особенностей этого мыса, носящаго названіе Юбуханъ, причемъ, при взглядѣ на него въ профиль, напр. съ мыса Харгантъ, мы видимъ какъ-бы поперечный разрывъ долины, дно которой изображаетъ собою наносный перешеекъ, а окончность мыса является въ роли береговаго отрога горъ, до половины размытаго со стороны Воротъ; при взглядѣ-же съ еще большаго отдаленія, окончность эта кажется уже островомъ, такъ какъ перешеекъ дѣлается незамѣтнымъ по причинѣ его низменности. Мысъ этотъ принадлежитъ поэтому къ типу острововидныхъ мысовъ, представляющихъ собою, какъ сказано выше, крайнюю производную форму отъ горообразныхъ мысовъ, достигаемую соответственнымъ углубленіемъ сѣдловины, дно которой у острововидныхъ типовъ почти поравнялось съ уровнемъ омывающей ихъ воды. Въ окончности Юбухана обнажена бѣлая порода гранитоваго состава, но перемежающаяся съ нѣсколькими тонкими прослойками роговообманковаго гнейса, падающими на с.-с.-з.

Мысъ этотъ вмѣстѣ съ ограничиваемою имъ Перевозною бухтою является въ сущности лишь частью расположенной здѣсь большой и сложной бухты, извѣстной подъ названіемъ Базарной потому, что въ глубинѣ ея, на плоскомъ прибрежьи, построены бараки для прѣзжающихъ сюда лѣтомъ купцовъ съ товарами для обмѣна на рыбу.

Базарная бухта достигаетъ около 2 версты въ длину и около версты въ ширину, вытягиваясь въ в.-ю.-в. направленіи. На юго-западномъ ея берегу, вслѣдъ за Перевозною

бухточкою, располагается другая, менѣе глубоко-връзанная въ береговныя горы и называемая Куркутскою, правильнѣе Малою Куркутскою, такъ какъ рядомъ съ Базарною, какъ мы увидимъ ниже, находится другая, самостоятельная и большая Куркутская бухта. Малая Куркутская располагается на устьѣ въ ней сухой соименной долины, болѣе или менѣе параллельной Тункырско-Тутской, но нѣсколько болѣе короткой (см. ниже); объ этой долинѣ Черскій замѣчаетъ, что, если продолжить ее мысленно къ юго-востоку, до перешейка Юбухана, то окончечность этого послѣдняго будетъ играть роль ущѣльѣваго отъ размыва остатка лѣваго берега этой долины, поврежденной со стороны Базарной бухты, — обстоятельство вполне воображимое, хотя и не имѣющее за собою строгихъ доказательствъ. Куркутская бухточка отдѣляется ущѣченнымъ мысовиднымъ выступомъ береговыхъ скалъ отъ слѣдующей за нею самой глубокой, т. е. отдаленной части бухты, называемой собственно Базарною. Утесъ этотъ носить названіе Бурлѣ-хапсагай и состоитъ изъ перемежаемости гнейса, гранито-гнейса, роговообманковаго сланца и кристаллическаго известняка въ числѣ двухъ пропластковъ; слои падаютъ на с.-с.-в.; третій слой известняка выходитъ въ самой Базарной бухтѣ среди такой же перемежаемости и при одинаковомъ наклонѣ. Пласты эти, пересѣкаясь бухтою и вообще Воротами почти въ поперечномъ направленіи къ ихъ простиранію, переходятъ, какъ мы увидимъ въ своемъ мѣстѣ, на восточной берегъ Воротъ, т. е. на островъ Ольхонъ, такъ-что продолженіе напр. известковыхъ пластовъ Бурлѣ-хапсагая и вообще Базарной бухты находится на Ольхонскомъ мысѣ Зббри-хушунъ (см. ниже). Базарная бухта ограничивается съ с.-с.-в. отрогомъ, называемымъ Иххтѣ, отъ слова *Ixxé* или *exé*, означающаго *большой*. Этотъ удлиненный мысъ, въ нѣсколько сотъ футовъ высоты, отличается заостренными вершинами въ своей западной части, которая, какъ мы увидимъ ниже, зна-



чительно суживается и понижается на столько, что и этот мыс долженъ быть разсматриваемъ какъ весьма близкій къ острововидному типу, хотя размѣры его несравненно больше Юбухана. Склонъ его, обращенный къ описываемой бухтѣ, образуетъ волнисто изогнутую береговую линію, въ которой отличаются поэтому три безымянныя бухтовидныя выемки; изъ нихъ въ ближайшую къ Базарной выходитъ пласть известняка, тогда какъ остальная часть склона Иххтѣ образуетъ полевошпатовыми породами.

Изъ Базарной бухты, слѣдуя вверхъ по Куркутской долины, Черскій сдѣлалъ экскурсію съ цѣлью посѣтить вершину горы Танхынъ и оттуда спуститься въ долину Харабулука системы юго-западной оконечности Малаго Моря. Куркутская долина, безлѣсная и сухая, какъ и всѣ другія, изрѣзывающія эту мѣстность, направляется на в.-с. 30°. Приблизительно въ 2 верстахъ отъ устья онъ достигъ мѣста соединенія двухъ вѣтвей долины; осмотрѣвъ здѣсь три пласта кристаллическаго известняка, обнаженныхъ среди господствующихъ полевошпатовыхъ породъ, путешественникъ направился вверхъ по правой вѣтви долины, до верховьевъ которой осталось немногимъ болѣе трехъ верстъ. Долина замыкается тамъ почти меридіональнымъ отрогомъ, образующимъ водораздѣлъ между нею, какъ и вообще между склономъ мѣстности къ Воротамъ, и почти поперечною долиною Саганъ-булука (см. ниже), который, соединившись съ упоминавшимся выше Хара-булукомъ, въ роли правой вѣтви долины послѣдняго, впадаетъ въ долину Хушилахъ системы ю.-в. оконечности Малаго Моря (см. ниже). На водораздѣльномъ отрогѣ, какъ разъ въ верховьяхъ Куркутской долины, одна изъ горъ отличается заостренною вершиною, другая, такая же, располагается на правомъ берегу верховьевъ и входитъ уже въ составъ продольнаго отрога отдѣляющаго эту долину отъ Тункырско-Тутской. По сѣдловинѣ, лежащей около восточнаго склона послѣдней изъ упомяну-

тѣхъ двухъ вершинъ, Черскій поднялся до высоты 897' надъ Байкаломъ, повернувъ къ югу, переваливъ въ Тункырско-Тутскую долину и, пройдя вверхъ по ней, достигъ улуса Верхне-Тункырскаго, лежащаго на высотѣ 903' надъ озеромъ, около сѣверо-восточнаго подножья Танхына. Улусъ этотъ обитаемъ только въ зимнее время, такъ какъ лѣтомъ долина совершенно безводна. Отсюда удобно осматривается верховье этой долины, расширенное въ родѣ очень плоской котловины, причемъ мѣстность, благодаря довольно острому гребню и нѣсколькимъ заостреннымъ его вершинамъ, напоминаетъ отчасти альпійскіе ландшафты, съ которыми контрастируетъ, однако, ровный и почти степной характеръ дна долины, покрытой скудною травою. Впереди между тѣмъ возвышается Танхынъ, покрытый съ этой стороны хвойнымъ лѣсомъ. На склонѣ его пересѣкается тропою западное продолженіе того известковаго пласта, который выходитъ къ Байкалу около устья Тункира (см. выше), послѣ чего роговообманково-полевошпатовая порода развита уже до самаго высшаго пункта, гдѣ anerоидъ показалъ 1917' надъ Байкаломъ, и только на южномъ склонѣ, со стороны озера, бѣлѣтся другой известковый пласть. Вершина эта является вытянутою въ продольномъ направленіи (в.-с.-в.), причемъ высшій пунктъ лежитъ въ западной части. Отсюда видно, что въ промежуткѣ между верховьями Тункырско-Тутской долины съ одной стороны и Худыктуйской съ другой, около сѣвернаго подножья располагается продольная же бассейновидная Танхынская долина, съ которою, со стороны Байкала, сообщается знакомая намъ уже поперечная долина Танхынъ-бару́нъ-кугъ, въ роли отводящаго канала. Дно Танхынской долины, по измѣренію Черскаго, возвышается на 1167' надъ озеромъ и здѣсь располагается сомнительный бурятскій улусъ, представляя собою высшій изъ заселенныхъ пунктовъ мѣстности. Параллельно Танхынской долинѣ, но сѣвернѣе, и отдѣляясь отъ нея узкимъ гребнемъ, располагается продольная же, но

болѣе низкая долина верховьевъ Саганъ-булұка, съ сомненными улусомъ, а верстахъ въ 2-хъ къ с.-з-ду, и верховья Хара-булұка, гдѣ на высотѣ 405' надъ озеромъ находится Ольхонская дума или инородческая управа. Саганъ-булұкъ, достигая около 7 верстъ въ длину и принимая ближе къ устью продольную, правую вѣтвь, называемую Олзонтоѣ, направляется нѣсколько дугообразно къ с.-з-ду, тогда какъ Хара-булұкъ, съ ключемъ того-же имени и 5 верстъ длины, отличается почти меридіональнымъ направленіемъ, послѣ чего, соединившись съ Саганъ-булукомъ, открывается съ правой стороны въ большую продольную долину рч. Хушилху, на продолженіи которой располагается юго-западная оконечность Малаго Моря. Спустившись по Хара-булуку до сліянія его съ Саганъ-булукомъ, Черскій, придерживаясь здѣсь дороги, ведущей изъ Думы къ Базарной бухтѣ, повернулъ вверхъ по послѣдней изъ названныхъ долинъ, затѣмъ вверхъ по Олзонтою и къ Базару. Всѣ эти долины довольно глубоко врѣзаны въ почву и въ ихъ верховьяхъ виднѣются котловинообразныя расширенія; строеніе пересѣкаемой ими мѣстности столь же однообразно какъ и во всей прибрежной полосѣ описываемыхъ горъ и только ю.-ю.-в-ое паденіе пластовъ, наблюдаемое въ низовьяхъ обоихъ Булұковъ, указываетъ на то, что, подвигаясь къ сѣверу, путешественникъ долженъ вступить въ предѣлы другой складки пластовъ, что подтверждается, какъ мы сейчасъ же увидимъ, и обнаженіями оконечности отрога Иххытѣ.

Оконечность эта раздвоена еще болѣе глубокою бухточкою нежели въ предшествовавшихъ двухъ случаяхъ и потому образуетъ два рѣзко очерченные мыса, изъ которыхъ ближайшій къ Базарной бухтѣ сохраняетъ названіе Иххытѣ, а слѣдующій за нимъ именуется Куркұтскимъ. Оба они состоятъ изъ гнейса, при чемъ Иххытѣ соотвѣствуетъ синклинальной линіи между двумя складками, вслѣдствіе чего часть пластовъ, со стороны Базарной бухты, со-

храняетъ еще прежнее с.-с.-з. паденіе, а остальная, какъ равно и въ Куркутскомъ мысѣ, отличается уже противоположнымъ, т. е. ю.-ю.-в. наклономъ слоевъ, между которыми, въ глубинѣ разобщающей бухточки, выходитъ и пластъ кристаллическаго известняка.

Слѣдующая за этимъ мысомъ бухта Куркутъ или Куркутская,—последняя бухта Воротъ, является вмѣстѣ съ тѣмъ и самою значительною (болѣе 2-хъ верстъ длины и около 2-хъ ширины), вытягиваясь все-таки на в.-с.-в. Она еще болѣе сложная, нежели Базарная, и потому какъ въ ея южномъ берегу такъ и въ сѣверномъ различаются по три второстепенныя бухтовидныя выемки: въ самой глубокой части ея построенъ бурятскій улусъ того же имени, около котораго бѣлѣтся выходъ известковаго пласта. Особенно живописнымъ является длинный, но узкій мысъ, ограничивающій эту бухту съ сѣверной стороны и отдѣляющій еѣ отъ юго-западной оконечности Малаго Моря: это Уланъ-хадай-хушунъ, названіе котораго (*уланъ* — красивая, *хадай* — гора, *хушунъ* — мысъ) свидѣтельствуеъ уже о томъ, что видъ его производитъ такое же впечатлѣніе и на мѣстныхъ жителей. Мысъ этотъ отличается альпійскимъ характеромъ образующаго его горнаго отрога, хотя и сравнительно въ миниатюрномъ масштабѣ: весьма стройная пирамидальная вершина, развѣ не многимъ превосходящая 1000' надъ Байкаломъ, образуетъ кульминаціонный пунктъ, лежащій почти на меридіанѣ, даже западнѣе, самой глубокой части Куркутской бухты, и отъ него, цѣлымъ рядомъ постепенно понижающихся, но заостренныхъ вершинъ, мысъ опускается къ своей удлиненной, незазубренной и гребневидной части (до 28' надъ Байк.) съ горообразною оконечностью въ 235' надъ озеромъ. Изъ главнѣйшихъ особенностей этой, т. е. южной стороны Уланъ-хадайскаго мыса слѣдуетъ упомянуть во-первыхъ, что и врѣзанныя въ него второстепенныя бухточки, о которыхъ было сказано выше, огра-

ничиваются довольно удлинненными скалистыми мысами, изъ которыхъ второй, считая отъ глубины Куркутской бухты, отличается почти острововидною формою; къ тому-же въ крайней восточной бухточкѣ, почти около самаго низкаго мѣста Уланъ-хадайскаго мыса, находится утесъ, верхняя часть котораго, на высотѣ около 14' надъ озеромъ, снабжена настолько обширнымъ и совершенно сквознымъ отверстіемъ, что въ немъ удобно можетъ стоять человѣкъ даже высокаго роста; войти въ эту пробойну можно только съ высоты гребня мыса, такъ какъ утесъ этотъ, названный Дыроватымъ, отвѣсно опускается къ узкому и каменистому побережью. Весь мысъ образуется гнейсомъ, какъ роговообманковымъ, такъ и слюдянымъ, мѣстами очковымъ (байкальскимъ); не взирая на мѣстныя уклоненія, въ общемъ и на осевой части мыса пласты падаютъ на ю.-ю.-в.; продолженіе этихъ слоевъ приходится уже на сѣверо-западный берегъ острова Ольхона (см. ниже). Мѣстами на гребнѣ мыса и около него можно видѣть остатки слоистаго песчанаго наноса, залегающіе до высоты 170' надъ озеромъ.

И) Заливъ Хушилаху или юго-западная оконечность Малаго моря, отъ мыса Уланъ-хадай до дельты р. Сармы.

Погода, во время бытности здѣсь Черскаго, была настолько измѣнчива и вѣтренна, что, въ теченіи одного дня, направленіе вѣтра, волновавшаго Байкаль, обмѣняло почти всѣ румбы компаса, послѣ чего упрочился сильный сѣверо-восточный, не позволявшій выйти изъ Куркутской бухты и на слѣдующій день. Волненіе усилилось на столько, что неудачная попытка обогнуть Уланъ-хадайскій мысъ едва не повлекла за собою гибель лодки: избравъ время прохожденія менѣе высокихъ волнъ, надо было успѣть повернуть среди нихъ лодку и возвратиться на прежнюю стоянку около Дыроватаго утеса, иначе лодка могла бы разбиться о скалистую стѣну оконеч-

ности Уланъ-хада, усѣченной въ направленіи з.-с.  $30^{\circ}$ , и потому подверженной самому сильному прибою волнъ. Такимъ образомъ только на третій день удалось обойти этотъ мысъ, вѣсть съ чѣмъ открылся красивый видъ на расположенную за нимъ юго-западную оконечность Малаго Моря, известную подъ названіемъ залива или бухты Хушилху. Заливъ этотъ, называемый также Кучулгинскимъ, отъ русскаго произношенія слова Хушилху («Кучулга»), достигаетъ около 8 верстъ въ длину и болѣе 2 верстъ ширины и является нѣсколько изогнутымъ вслѣдствіе того, что западная часть его, до 5 верстъ въ длину, принимаетъ почти ю.-ю.-з. направленіе. Юго-восточный берегъ залива образуется прилежащимъ склономъ Уланъ-хадайскаго отрога, въ которомъ, на первыхъ трехъ или 4-хъ верстахъ располагаются три второстепенныя бухточки; вслѣдъ за ними отъ Уланъ-хада выдается скалистый мысъ, съ оконечностью почти острововиднаго типа, за которою берегъ этотъ образуетъ собою уже почти одинъ бухтовидный изгибъ на протяженіи всей 5-ти-верстной длины, до оконечности залива, переходящей въ длину рѣчки Хушилху, и только ближе къ устью послѣдней располагается небольшая бухточка Сахтырь, съ соименною сухою долиною. По всей длинѣ этого склона Уланъ-хадайскаго отрога, какъ равно и его высшихъ точекъ обнажается роговообманковый гнейсъ, переходящій въ слюдяный и очковый; паденіе пластовъ ю.-ю.-з. съ наклономъ до  $65^{\circ}$ . При восхожденіи на отрогъ, вблизи оконечности залива, но восточнѣе долины Сахтырь, Черскій видѣлъ два террасовидныхъ уступа, изъ которыхъ одинъ располагался на высотѣ 154', а другой 414' надъ уровнемъ залива, тогда какъ высшій пунктъ отрога на этомъ меридіанѣ достигаетъ всего лишь 543' надъ озеромъ. Съ высоты какъ этого, такъ и противоположнаго берега залива удобно осматривается какъ самая оконечность послѣдняго, такъ и долина Хушилху. Дельта этой рѣчки очень болотиста; исходящею отъ нея заостренною и про-

дольною косою оконечность залива раздѣляется на двѣ части, въ южную изъ которыхъ изливается Хушилху послѣ соединенія ея съ знакомымъ намъ уже Хара-булѣкомъ, причемъ въ низовьяхъ послѣдняго виднѣется еще небольшое озеро; что-же касается сѣверной части, то кромѣ устьевъ нѣкоторыхъ, повидимому заросшихъ нынѣ, лѣвыхъ рукавовъ Хушилху, придающихъ угловатость очертанію этой оконечности, въ ней замѣчаются два малыхъ, наносныхъ островка, лежащихъ близко другъ отъ друга. Самая долина Хушилху достигаетъ болѣе 10 верстъ въ длину и направляется въ общемъ съ ю.-з. на с.-в., такъ-что описываемый заливъ является какъ-бы затопленнымъ и расширеннымъ ея продолженіемъ; нѣсколько выше устья въ нее открывается еще короткая вѣтвь съ сѣверо-запада, извѣстная подъ названіемъ Хулурюнъ-гбаль. Долина Хушилху, на всемъ, видимомъ съ высотъ протяженіи, отличается довольно значительною шириною и ровнымъ, зеленымъ дномъ; правый берегъ ея ограничивается крутымъ и утесистымъ склономъ отроговъ, отдѣляющихъ ея побочныя вѣтви, тогда какъ на лѣвомъ берегу располагается довольно узкая (около 1 версты) и болѣе низкая полоса, хотя и съ волнистою поверхностью, но террасовидно примыкающая къ возвышающемуся здѣсь юго-восточному подножью Приморскаго хребта. При указанной длинѣ долины и при такомъ ея направленіи, верховья Хушилху должны располагаться весьма близко и на продолженіи той продольной долины, часть которой, какъ сказано было выше, занимается теченіемъ Уланъ-Бургаса, и потому долину Хушилху Черскій относитъ къ линіи тѣхъ продольныхъ ложбинъ (Малая Бугульдейка, Еланца, Уланъ-Бургась, Хушилху), которыми Приморскій хребетъ отдѣляется отъ прибрежной полосы горъ; на продолженіи той-же линіи долинъ располагается очевидно и все Малое Море, о чемъ съ большею подробностью будетъ сказано въ соотвѣтственномъ мѣстѣ нашего изложенія. Вопросъ

о томъ: соединяется-ли ложбина, занятая и углубленная нынѣ рѣчкою Хушилху, съ ложбиною Уланъ-Бургаса, можно рѣшить только непосредственнымъ изслѣдованіемъ этихъ долинъ, тогда какъ осмотръ мѣстности съ высотъ, лежащихъ восточнѣе Хулурюнь-гѣла, хотя и позволяетъ видѣть большую часть долины Хушилху, но верховья ея скрываются за упомянутымъ выше, террасовиднымъ предгорьемъ Приморскаго хребта. Впрочемъ Черскій замѣчаетъ, что террасовидная полоса эта сливается съ горизонтомъ, принимая тамъ совершенно прямолинейный и горизонтальный контуръ верхней поверхности, а такъ какъ уровень послѣдней ниже горъ праваго берега долины Хушилху, то поверхность эта, при взглядѣ на нее съ названныхъ высотъ, является все-таки въ роли дна долины, конца которой нельзя видѣть, такъ какъ онъ скрывается за горизонтомъ, не преграждаясь никакими горами. Съ тѣхъ-же высотъ можно видѣть и долину Хулурюнь-гѣла. Начало ея лежитъ непосредственно въ Приморскомъ хребтѣ, гдѣ долина эта, узкая и короткая, занята незначительнымъ ключикомъ; сейчасъ же около подножья она принимаетъ характеръ не особенно длинной, но рѣзко выраженной и углубленной продольной долины, играющей роль двухъ діаметрально противоположныхъ, сходящихся вѣтвей Хулурюнь-гола, который ниже направляется къ ю.-в., черезъ поперечную долину, впадающую съ лѣвой стороны въ Хушилху. Замѣчательно, что верховья лѣвой изъ упомянутыхъ двухъ продольныхъ вѣтвей совершенно сливаются съ верховьями такой-же продольной, но правой вѣтви рѣчки Харгѣй, вытекающей изъ Приморскаго хребта въ двухъ верстахъ восточнѣе Хулурюнь-гола и впадающей въ тотъ-же заливъ (см. ниже), а далѣе къ сѣверо-востоку видно, что рядъ такихъ-же продольныхъ долинъ продолжается и до праваго берега низовьевъ р. Сармы, слѣдовательно, болѣе 11 верстъ восточнѣе Хулурюнь-гола. Такимъ образомъ, сѣвернѣе долины Хушилху располагается здѣсь еще другая



линія продольныхъ долинъ, болѣе короткихъ и сравнительно узкихъ, съ сѣверо-восточнымъ продолженіемъ которыхъ мы ознакомимся впослѣдствіи, теперь же замѣтимъ только, что линія эта находится въ связи съ описанною выше террасовидною площадью лѣваго берега Хушилху, хотя, въ большей части своей ширины площадь эта преграждается высотами лѣваго берега низовьевъ Хулурюнгъ-гола. Все это вводитъ насъ уже въ предѣлы сѣверо-западнаго берега залива Хушилху, къ описанію котораго мы и обратимся. Береговая линія его является гораздо болѣе извилистою, нежели линія юго-восточнаго: благодаря тремъ главнымъ, значительно выдающимся мысамъ, а затѣмъ и дельтѣ р. Сармы, здѣсь различаются четыре главные бухты, а именно: Хушилху (ближайшая къ устью рѣчки), Харгойская съ устьемъ соименной рѣчки, Шидэй съ устьемъ того-же имени, и наконецъ Сарминская, размѣры которыхъ увеличиваются по мѣрѣ удаленія къ сѣверо-востоку и достигаютъ болѣе 3 верстъ ширины. Въ первую изъ этихъ бухтъ открывается короткая и сухая долинка съ двумя котловинообразными расширеніями, слѣдующими другъ за другомъ. Выдающійся сейчасъ-же за нею первый мысъ совмѣщаетъ высшіе пункты этой мѣстности, лежащіе на сѣверо-западномъ продолженіи образующаго его отрога. Слѣдуя по его безлѣсному, каменистому и уступистому гребню по направленію къ хребту Приморскому, Черскій достигъ сначала вершины, лежащей на лѣвомъ берегу втораго, т. е. верхняго котловинообразнаго расширенія упомянутой выше сосѣдней долины, гдѣ aneroidъ показалъ 453' надъ Байкаломъ. Вершина эта, какъ и большая часть уступовъ этого отрога, имѣетъ характеръ гребня, поперечнаго къ длинѣ отрога, и продольнаго, т. е. параллельнаго къ простиранію порода, впереди за нимъ располагается продольная-же долинка, связанная съ сосѣднею котловиною, а за нею возвышается тупо-заостренная вершина Харгойской горы, самой высокой гора

этой части прибрежья. Еще съ нѣкотораго отдаленія можно видѣть, что вокругъ вершины этой горы и въ нѣкоторомъ отъ нея разстояніи располагается какая-то узкая, темная и прерывающаяся полоска, изгибающаяся около высшаго пункта горы, какъ часть окружности около своего центра. Экскурсія къ этой вершинѣ убѣдила Черскаго, что упомянутой выше полосой казалась каменная стѣна, искусственно сложенная изъ плитъ гнейса такимъ-же образомъ какъ дрова укладываются въ сажени. Стѣна эта, имѣющая видъ узкаго крѣпостнаго вала, изгибается полукругомъ съ радіусомъ въ 40 саженей около вершины Харгойской горы, принятой за центръ; высота вала достигаетъ болѣе 4 футовъ, къ тому-же, какъ видно было и съ отдаленія, валъ этотъ не сплошной, а состоитъ изъ отдѣльныхъ частей, какъ бы отрѣзковъ отъ 1 до нѣсколькихъ саженей длины, причемъ ближайшій осмотръ обнаруживаетъ, что прерывистость стѣны не обуславливается частичными ея обвалами и вообще разрушеніемъ, а напротивъ, мы имѣемъ здѣсь дѣло съ недостроеннымъ валомъ, возводившимся какъ-бы единовременно на различныхъ пунктахъ окружности. Полукругъ этотъ, обращенный выпуклою стороною къ Байкалу, примыкаетъ своими оконечностями къ весьма крутому и высокому сѣверному склону горы, опускающемуся къ продольной долинѣ, которою Харгойская гора отдѣляется здѣсь отъ хребта Приморскаго. Съ такого рода сооруженіями, относимыми буратами ко времени владычества монголовъ, и называемыми монгольскими стѣнами («монголи шибѣ»), мы будемъ имѣть случай неоднократно встрѣчаться въ приольхонской мѣстности и на самомъ островѣ Ольхонѣ и посвятимъ этимъ древнимъ постройкамъ особый параграфъ нашего изложенія, теперь-же перейдемъ къ осмотру окрестностей Харгойской горы. Съ высшаго пункта горы, достигающаго 543' надъ озеромъ, открывается хорошій видъ на упомянутую продольную долину. Отсюда видно, во-первыхъ, что рѣчка Харгой про-

текаетъ въ глубокой поперечной долинь, вообще съ юго-восточнымъ направленіемъ, но вслѣдъ за выходомъ ея изъ хребта, встрѣтивъ ограничивающую его продольную долину, поворачиваетъ вдоль по ней на сѣверо-востокъ, замѣтно углубившись въ дно этой долины, послѣ чего, спустя менѣе версты такого направленія, Харгой, около горы, на которой расположена описанная выше стѣна, поворачиваетъ опять къ юго-востоку, пересѣкая прибрежныя высоты поперечною долиною, довольно широко открытою къ заливу Хушиху. Перерѣзанная такимъ образомъ продольная долина является въ видѣ двухъ вѣтвей Харгойской, съ наклономъ къ этой рѣчкѣ, причемъ верховья правой изъ нихъ, отдѣляются отъ лѣвой продольной вѣтви Хулурюнъ-гола переваломъ, лежащимъ значительно ниже высотъ, ограничивающихъ эту линію продольныхъ долинъ. Что-же касается лѣваго отрѣзка Харгойской продольной долины, то верховья его раздвоены, но отношеніе ихъ къ слѣдующей за ними долинь недостаточно хорошо замѣтно. Источники самого Харгоя до сихъ поръ извѣстны только по картѣ Чекановскаго, видѣвшаго ихъ впрочемъ только съ отдаленія, судя по означенному тамъ-же маршруту этого путешественника. Верховья эти лежатъ вообще на западъ и въ разстояніи болѣе 11 верстъ отъ устья, причемъ они берутъ начало на одномъ водораздѣлѣ съ источниками Уланъ-Бургаса (см. выше), а верхнее теченіе Харгоя проложено, судя по той-же картѣ, въ продольной долинь, слѣдующей на сѣверо-востокъ и лишь впоследствии поворачивающей къ юго-востоку, ближе къ выходу ея изъ Приморскаго хребта. Отъ имени этой рѣчки одинъ изъ знаковыхъ намъ уже вышихъ пунктовъ Приморскаго хребта получилъ названіе Харгойскаго гольца, но онъ, судя по картѣ Чекановскаго, располагается въ разстояніи болѣе 15 верстъ къ западу (з.-с.-з.) отъ устья рѣчки, вблизи верховьевъ р. Анги, и потому можетъ питать развѣ нѣкорые лѣвые притоки Харгоя, къ которому обращенъ юго-восточный склонъ этой вершины.

О геогностическомъ строеніи мѣстности въ предѣлахъ маршрута этой экскурсіи Черскій сообщаетъ, что на оконечности мыса обнажается роговообманковый гнейсъ съ переходами въ весьма типическій очковый (байкальскій), среди котораго залегаетъ прослоекъ известково-байкалитоваго сланца; пласты падаютъ сначала на ю.-ю.-в., а затѣмъ очень круто на с.-с.-з., но съ характеромъ опрокинутыхъ слоевъ; далѣе слѣдуетъ перемежаемость девяти тонкихъ пластовъ кристаллическаго известняка со столькими же пластами какъ роговообманковаго, такъ и слюдянаго гнейсовъ, падающими сначала на с.-с.-з., а затѣмъ на ю.-ю.-в., послѣ чего, на днѣ лѣвой продольной вѣтви Хулурюнь-гола выступаютъ: гнейсъ, слюдистый кварцитъ и байкальскій гнейсъ, тогда какъ крутой склонъ Приморскаго хребта обнажаетъ около Хулурюнь-гола хлоритовый сланецъ, точно также падающій на ю.-ю.-в. Разрѣзъ этотъ, очевидно, какъ и описанный выше по р. Ангѣ, въ свою очередь не говоритъ въ пользу какой-либо самостоятельности породъ, входящихъ въ составъ хребта Приморскаго, а указываетъ только на нисшій стратиграфическій ихъ уровень въ ряду пластовъ одной и той-же толщи кристаллическихъ породъ, относимыхъ Черскимъ къ лаврентьевской системѣ.

Сейчасъ-же за описаннымъ мысомъ, который можно бы назвать Большимъ Харгойскимъ, слѣдуетъ Харгойская бухта, состоящая изъ двухъ крайнихъ, болѣе глубокихъ выемокъ, и плоской средней, образующейся дельтою Харгоя. Эта послѣдняя ограничивается съ юго-запада небольшимъ скалистымъ мысомъ (Малый Харгойскій), а съ сѣверо-восточнымъ своимъ выступомъ ограничиваетъ прилежащую крайнюю бухтовидную выемку. На этомъ выступѣ дельты располагается вполне уединенный скалистый бугоръ въ нѣсколько квадратныхъ саженей: это очевидно прежній островокъ, связанный впоследствии съ материкомъ наноснымъ отложеніемъ дельты; западнѣе этого бугра, играющаго нынѣ

роль оконечности мыса, располагается устье Харгой въ видѣ одного, постепенно расширяющагося русла. Въ промежуткѣ между Большимъ и Малымъ Харгойскими мысами, ближе къ послѣднему, въ бухтѣ находится небольшой островокъ до 20' высоты; скала эта состоитъ изъ роговообманковаго гнейса, пласты котораго падаютъ на ю.-в.; это очевидно уцѣлѣвшій отъ размыва остатокъ прежняго продолженія одного изъ ближайшихъ мысовъ (сравни сказанное ниже объ островахъ Малаго моря).

Второй изъ главныхъ мысовъ, Шидэй, отдѣляющій Харгойскую бухту отъ слѣдующей за нею Шидэйской, уподобляется, по своему очертанію, ромбическому четырехугольнику, одинъ изъ угловъ котораго связанъ съ материкомъ. Это скалистый и довольно высокій мысъ, въ составѣ котораго наблюдаются четыре пласта известняка, перемежающіеся съ гнейсомъ, и имѣющіе весьма правильный наклонъ слоевъ на ю.-ю.-в. За мысомъ и около восточнаго склона его основанія располагается самая глубокая часть Шидэйской бухты, съ построеннымъ въ ней соименнымъ улусомъ около устья сухой Шидэйской долины (см. ниже), тогда какъ слѣдующая за нею сѣверная часть той-же бухты, отдѣленная отъ первой почти прямоугольнымъ, мысовиднымъ выступомъ прибрежныхъ горъ, ограничивается длиннымъ и самымъ значительнымъ изъ мысовъ описываемаго берега залива Хушилху, направляющимся вообще на в.-ю.-в. (вѣтрѣ в.-ю. 34°); это Сарминскій или Захань-Сарминскій мысъ, по которому Черскій сдѣлалъ экскурсію до высшаго пункта образующаго его отрога. Оконечность послѣдняго, входящая въ составъ мыса, представляетъ сначала удлинено-острововидную возвышенность до слишкомъ 100' надъ уровнемъ, а затѣмъ гору, достигающую 282' той-же относительной высоты; далѣе, гора эта отдѣляется отъ слѣдующаго за нею высшаго пункта длинною сѣдловиною, на днѣ которой возвышается еще нѣсколько низкихъ, поперечныхъ и парал-

дельныхъ другъ другу, скалистыхъ грядокъ; наконецъ слѣдуетъ довольно крутой и уступистый подъемъ на высшую точку отрога, на которой anerондъ показалъ 539' надъ Байкаломъ. Отсюда слѣдуетъ спускъ въ продольную долину, ограниченную съ сѣверо-запада крутымъ склономъ Приморскаго хребта, причемъ дно ея располагается, повидному, на высотѣ, не превышающей 280' надъ озеромъ. Вершина этой горы располагается на сѣверо-восточномъ продолженіи Харгойской; часть ограничиваемой ею продольной долины наклоняется и, такъ сказать, отводится къ Байкалу посредствомъ поперечной Шидэйской (см. выше), другая же, сѣверо-восточная, черезъ средство открывающейся въ со-сѣднюю бухту Захань-Сарминской долины съ улусомъ того же имени. Уже отсюда видно, что продольная долина со-путствуетъ подножью Приморскаго хребта и еще далѣе къ сѣверо-востоку, до нивовьевъ р. Сармы, а съ высотъ праваго берега Захань-Сарминской долины, достигающихъ 550' надъ Байкаломъ, можно съ удобствомъ видѣть и подробности какъ ея устройства, такъ и вообще топографическихъ особенностей прибрежья. Отсюда видно во-первыхъ, что сѣверо-восточная часть продольной долины занята ручьемъ Талдъ, который, вытекая изъ поперечной долины въ Приморскомъ хребтѣ, поворачиваетъ затѣмъ къ востоку и, спустя 2—3 версты, впадаетъ съ правой стороны въ рѣку Сармъ, въ предѣлахъ ея дельты; къ тому-же здѣсь можно видѣть, что прибрежныя горы (550' н. Байк.), ограничивающія продольную долину съ юго-востока, продолжаются отсюда не болѣе какъ на 2 или 3 версты къ сѣверо-востоку, гдѣ гряда эта постепенно суживается, понижается и наконецъ оканчивается въ западной части дельты Сармы въ видѣ округленнаго скалистаго мыса, окруженнаго, впрочемъ, наносною низменностью; между тѣмъ склонъ той-же гряды, обращенный къ Сарминской бухтѣ, образуетъ два небольшихъ мысовидныхъ выступа и омывается, въ значительной части длины, почти непосред-

ственно водою. Строеніе всѣхъ этихъ горъ такое-же какъ и въ отрогѣ западнѣе Харгоя, а часть гряды, лежащая восточнѣе Захань-Сарминской долины, состоитъ изъ гнейса; известнякъ уцѣлѣлъ только на оконечностяхъ двухъ упомянутыхъ выше мысовидныхъ выступовъ со стороны бухты. Къ юго-востоку отъ устья Захань-Сарминской долины, въ соименной бухтѣ, располагаются два скалистые островка, вытянутые на одной линіи въ сѣверо-восточномъ направленіи; бѣльшій изъ нихъ носить названіе То й н о к ѣ; судя по ихъ расположенію, возможно, что они составляютъ высшіе пункты подводной гряды, слѣдующей отъ основанія Захань-Сарминскаго мыса, именно второй его вершины, считая отъ почти острововидной его оконечности.

Такимъ образомъ, вмѣстѣ съ описаннымъ выше окончаніемъ гряды прибрежныхъ горъ въ западной части дельты р. Сармъ, исчезаетъ, разумѣется, и ограничивавшаяся ими продольная долина, а открывается склонъ Приморскаго хребта, который, начиная съ этого мѣста, образуетъ собою уже непосредственно берегъ озера (Малаго моря), точно также, какъ это имѣло мѣсто къ западу отъ меридіана устья Большой Бугульдейки, откуда, какъ извѣстно, и начинается описанная нами прибрежная полоса горъ. Приморскій хребетъ, въ предѣлахъ теченія р. Хушилху, отличался болѣе пологимъ склономъ и болѣею расчлененностью, благодаря нѣсколькимъ глубокимъ поперечнымъ долинамъ, принадлежащимъ очевидно лѣвымъ, нѣмъ не изслѣдованнымъ еще притокамъ названной рѣчки, но хорошо видимымъ съ высотъ лѣваго берега Хулурюнъ-гола и низовьевъ Харгоя. Съ этихъ же высотъ Черскій видѣлъ, что верхняя поверхность хребта, ближе къ склону, является террасовидною относительно лежащихъ за ними (къ сѣверу) вышшихъ пунктовъ, въ видѣ округленныхъ вершинъ, сравнительно немного выдающихся надъ уровнемъ террасовидной поверхности. По мѣрѣ приближенія къ меридіану юго-за-

падной оконечности Малаго моря (устье рч. Хушилху) и даѣе къ сѣверо-востоку, Приморскій хребетъ является менѣе расчлененнымъ и болѣе крутымъ, въ особенности ближе къ р. Сармѣ, гдѣ склонъ этотъ почти совершенно безлѣсный, изрѣзывается только неглубокими, хотя и многочисленными ложбинами, происшедшими отъ стока періодическихъ водъ. Но и здѣсь, напр. въ промежуткѣ между долиною верховьевъ ручья Талѣ и выходомъ Сармы, довольно ясно наблюдается высшая террасовидная поверхность, поростающая хвойнымъ лѣсомъ, и только позади ея возвышаются тупоугольныя, низкія вершинки, едва нарушающія прямолинейность почти горизонтальной линіи контура высшаго гребня хребта. Подробныя измѣренія высотъ, для опредѣленія средней цыфры высоты этой высшей террасовидной поверхности, потребуютъ продолжительныхъ и тщательныхъ изслѣдованій хребта въ будущемъ, въ настоящее же время можно указать лишь на тотъ фактъ, что восхожденіе Черскаго на край этой высшей террасы около р. Сармы (см. ниже), показало для этой точки совершенно ту-же высоту (928' надъ Байкаломъ), на которой, какъ извѣстно, на высшей террасѣ лѣваго берега долины р. Култучной, тѣмъ-же путешественникомъ открыты грядки валуновъ и галекъ. Съ подробностями этого восхожденія, какъ равно и съ результатами изслѣдованія дельты и нѣкоторой части долины р. Сармы, мы ознакомимся впоследствии, теперь же приступимъ къ описанію острова Ольхона, вмѣстѣ съ чѣмъ ознакомимся и съ образуемымъ имъ юго-восточнымъ берегомъ Малаго моря, къ которому относится уже р. Сарма.

### 3) Островъ Ольхонъ.

Островъ Ольхонъ является самымъ очевиднымъ продолженіемъ южной части знакомой намъ уже прибрежной по-



лосы горъ, прерваннымъ поперечною долиною Воротъ и отдѣленнымъ отъ Приморскаго хребта Малымъ моремъ. Наибольшая длина острова, измѣряя по его средней линіи, достигаетъ 73 верстъ, а ширина не превосходитъ 14 верстъ. При общемъ направленіи на в.-с.-в. островъ отличается замѣтнымъ дугообразнымъ изгибомъ съ выпуклостью, обращенною къ юго-востоку. Изгибъ этотъ обусловливается неодинаковымъ направленіемъ отдѣльныхъ частей Ольхона, изъ которыхъ юго-западная, на протяженіи до 27 верстъ, вытягивается въ направленіи в.-с.-в., средняя (28 верстъ длины) направляется на с.-в., а сѣверо-восточная (18 верстъ длины) на с.-с.-в., причемъ, вслѣдствіе рѣзкаго перехода отъ одного направленія къ другому, появляется и угловатость изгиба, особенно хорошо выраженная на выпукломъ, юго-восточномъ берегу, гдѣ мысы: Ухъанъ, а далѣе Ижимэй, располагаются какъ разъ на мѣстахъ перехода названныхъ частей другъ въ друга. Если прибавить еще, что, въ противоположность сѣверо-западному берегу острова, юго-восточный его берегъ отличается болѣе прямолинейною береговою линіею, во-вторыхъ, что юго-западная оконечность его является широкоустьченною, тогда какъ сѣверо-восточная суживается въ видѣ мыса (Хобой или Верхнее изголовье), то выше сказанное даетъ достаточное общее понятіе объ очертаніи интересующаго насъ острова.

Въ орографическомъ отношеніи Ольхонъ представляетъ собою хребетъ съ вообще пологимъ сѣверо-западнымъ склономъ и очень крутымъ юго-восточнымъ. Около послѣдняго располагаются и высшія точки хребта, въ видѣ почти неразчлененнаго, непрерывнаго гребня, съ округленными, а изрѣдка и тупо-угловатыми контурами. Гребень этотъ, вблизи Ольхонскихъ Воротъ, достигаетъ уже 1182' высоты надъ уровнемъ Байкала; отсюда онъ въ общемъ постепенно, но плавно повышается къ сѣверо-востоку, такъ что на половинѣ длины юго-западной части острова (въ

выше), въ системѣ долины Идибѣ, онъ нѣсколько превосходить 1350', затѣмъ, въ средней части длины достигаетъ 1709' (около Ольхонскаго Уланъ-нѹра, въ противоположность материковому), а сейчасъ-же далѣе, на границѣ съ сѣверо-восточною частью и 2407' надъ озеромъ, въ горѣ, известной подъ названіемъ Ижимэй; отъ этого, абсолютно высшаго пункта острова, превышающаго и материковый Танхынъ, онъ нѣсколько террасовидно понижается къ сѣверо-восточной оконечности, гдѣ гора Хара-ундѹръ (иначе: Хара-ундѹръ) не превосходитъ уже 792' надъ Байкаломъ. Сѣверо-западный берегъ, какъ уже слѣдуетъ изъ вышесказаннаго, пологій, богатъ бухтами, дно которыхъ песчаное. Защищенный отъ волненія рядомъ выдающихся мысовъ, онъ представляетъ удобства для рыбной ловли. Между бухтами берегъ довольно-таки высокій, обрывистый и скалистый, но все-же значительно ниже юго-восточнаго. Мысы всѣ скалисты и достигаютъ высоты въ нѣсколько десятковъ сажень, какъ напр.: Харгой, Харанса, Бубунъ и Уланъ-байсанъ. Такимъ образомъ этотъ берегъ относится къ типу котловинныхъ окраинъ (Beckenrandküsten). Вблизи с.-з. берега расположены острова Хыбинъ, Угунгой, Зумугой, Харанса, Модотѣ и Ядоръ. У мыса Хобой, расположеннаго на восточной оконечности Ольхона, сѣверо-западный берегъ постепенно переходитъ въ юго-восточный.

Юго-восточный склонъ острова обнаруживаетъ на себѣ почти одни лишь признаки продолжительнаго подмыванія его прибоемъ волнъ, обусловившимъ и его крутизну, доходящую до своего максимума въ окрестностяхъ упомянутаго уже высшаго пункта (Ижимэй). Сѣверо-западный склонъ Ольхона является, между тѣмъ, ареною дѣйствія исчезнувшихъ впрочемъ нынѣ проточныхъ водъ, вслѣдствіе чего онъ подвергся и самому значительному расчлененію долинами. Долины эти въ среднихъ двухъ четвертяхъ длины острова являются преимущественно въ видѣ поперечныхъ или отчасти діагональ-

ныхъ, а въ юго-западной и сѣверо-восточной частяхъ въ видѣ продольныхъ долинъ. Обстоятельство это повліяло на соотвѣтственныя особенности въ очертаніи поперечныхъ разрывовъ острова, такъ-что, напр. на меридіанахъ Ижимѣйскихъ высотъ, профили эти представляютъ постепенный и пологій, девятиверстный подъемъ отъ Малаго моря до высшей точки, откуда слѣдуетъ очень крутой, иногда довольно близкій къ отвѣсному, склонъ къ Байкалу; между тѣмъ какъ въ профиляхъ юго-западнаго отрѣзка Ольхона различаются отъ двухъ до трехъ параллельныхъ грядъ, возвышающихся все-таки къ юго-восточному, крутому склону.

Болѣе низкія изъ этихъ грядъ подверглись мѣстами расчлененію на пики, иногда остроконечные, что придаетъ этой части склона альпійскій характеръ, хотя и въ небольшомъ масштабѣ, въ особенности, если смотрѣть на эти вершины съ небольшого разстоянія, такъ какъ съ отдаленія онѣ исчезаютъ, сливаясь со склономъ высшаго гребня тяжелой и массивной наружности. Такъ напр. горы около залива Елгай (см. ниже), а еще болѣе на южномъ берегу Харгойскаго залива (Ольхонскій Харгѣй, въ противоположность знакомому намъ уже материковому), имѣютъ видъ весьма живописныхъ альпійскихъ пиковъ, которыми, впрочемъ при болѣе тупыхъ вершинахъ, усѣяна и большая часть юго-западной оконечности острова, какъ это видно, если смотрѣть съ западнаго берега Воротъ, напр. съ Базарной бухты. На пики эти, на меридіанѣ даннаго мѣста, никогда не достигаютъ высоты неуклюжаго гребня хребта, образующаго, такъ сказать, остовъ Ольхона, и потому тамъ напр., гдѣ около Воротъ хребетъ возвышается со стороны Байкала на 1182' высшій пунктъ со стороны Малаго моря, не превосходитъ 1020', или же, гдѣ около юго-восточнаго берега, въ средней части острова, нѣсколько понизившаяся часть хребта достигаетъ все-таки 1296' (около долины Хатхѣ), высшій пунктъ почти на томъ же меридіанѣ, но вблизи Малаго моря (южнѣе)

Пещерного мыса), не превосходить 1045', и т. д. Всѣ эти вершины, по выраженію Черскаго, доступны однако не однимъ лишь обитателямъ бурятскаго Олимпа, но посѣщаются ежедневно и Ольхонскими баранами, лошадьми, даже и коровами, проложившими по нимъ цѣлую сѣть весьма удобныхъ тропинокъ, въ погонѣ за весьма скудною травою, что относится равнымъ образомъ и къ высшимъ точкамъ материковой части прибрежной полосы горъ съ величавымъ Танхынномъ включительно. Что-же касается упоминаемыхъ въ литературѣ, скалистыхъ отвѣсныхъ утесовъ на сѣверо-западномъ берегу острова, то они почти не превышаютъ 70' и только обрѣзываютъ собою оконечности мысовъ и скаты многихъ бухтъ этого, въ общемъ пологого склона. Только въ немногихъ долинахъ, изрѣзывающихъ Ольхонскій островъ, протекають ключи и то весьма незначительные. На юго-восточномъ берегу ихъ только три, а именно: Хѣлзынъ, Идибѣ и Тышигенъ, расположенные въ юго-западной части острова, тогда какъ на сѣверо-западномъ склонѣ ихъ насчитываютъ пять, какъ-то: Харанса, Одѣнимъ, Ялгай или Елгай, Доднаргунъ (дословно: *семь сосенъ*, см. ниже) и Хѣдактъ,— всѣ въ юго-западныхъ двухъ третяхъ длины Ольхона, который поэтому вообще можно назвать маловоднымъ. Кромѣ перечисленныхъ ключей на Ольхонѣ имѣется два озера Загли и Елгай, расположенныя близъ берега Байкала. Это небольшія бухты, отдѣлившіяся отъ Байкала постепеннымъ образованіемъ косы, которая наконецъ совершенно отдѣлила ихъ отъ главнаго водоема. Елгай, по мнѣнію Обручева, вѣроятно пытается просачиваніемъ воды изъ Байкала, Загли имѣетъ свои источники и отводитъ избытокъ воды помощью мелкаго небольшого протока, прорывшаго себѣ ложе по песчаной плотинѣ, отдѣляющей озеро отъ Байкала.

Островъ отличается также и бѣдностью лѣсной растительности, которою покрываются лишь среднія три пятыхъ части длины высшаго гребня хребта, тогда какъ остальная часть

поверхности всего Ольхона порастает только скудною травою, камениста или песчаниста, напоминая собою материковую часть прибрежной полосы горъ. Сѣверная граница распространѣнія лѣсовъ начинается у западной оконечности острова, идетъ къ серединѣ Хужирской долины, откуда уже доходитъ до Малаго моря. Далѣе у мыса Харанса она отступаетъ на 3—4 версты южнѣе и снова доходитъ до Малаго моря у мыса Нюргенэ. Пройдя мысъ Уланъ-байсанъ, граница пересѣкаетъ снова островъ до мыса Хагай. Лѣса занимаютъ довольно большія площади; только въ восточной части острова они встрѣчаются рѣдкими рощицами, окруженными большими пастбищами, и состоятъ изъ ели, пихты, сосны, лиственницы, тополя (*Populus suaveolens* Fisch.), осины и березы, приуроченныхъ къ долинамъ и холмамъ. На главномъ же хребтѣ встрѣчается и кедръ. Лѣсные участки вблизи улусовъ значительно опустошены. Пастбища каменисты и песчаны и приурочены къ склонамъ холмовъ. Если бы бурятскій скотъ не пасся на волѣ, то долины и котловины представляли бы прекрасные сѣнокосы. Удобныя для обработки земли приурочены къ берегамъ Малаго моря, между улусами Харанса и Нюргенэ. Тутъ почва черноземная. Подобной же хорошей почвой отличаются котловины долинъ Идибэ, Тышигенэ и Хужиръ, еще недавно представлявшія лѣсныя площади. По свидѣтельству Обручева <sup>1)</sup> тутъ засѣвается около 50 десятинъ. Однако суровый климатъ, а главное ранніе заморозки къ концу лѣта препятствуютъ созрѣванію озимой ржи. Вотъ, для выясненія этого то вопроса, по мнѣнію Обручева, интересно было бы устроить метеорологическую станцію на Ольхонѣ, въ особенности потому, что климатъ острова не согласуется съ установившимся мнѣніемъ, что Байкалъ будто бы умѣряетъ климатъ сосѣдней мѣстности. Суровость климата имѣетъ вліянія и на цвѣтеніе многихъ растеній, которое здѣсь

<sup>1)</sup> Обручевъ, Горн. Журн. 1890. № 12, стр. 446.

сильно запаздываетъ, сравнительно съ другими мѣстностями. Кромѣ того всѣ растенія отличаются малымъ ростомъ и слабымъ развитіемъ. Пески приурочены къ сѣверной части острова, по берегу Малаго моря. Вокругъ улуса Харгой и Елгай, къ западу отъ Долд-наргуна, между Хужиромъ и мысомъ Булукъ близъ ул. Харанса и Нюргенѣ встрѣчаются обнаженные, частью же поросшіе сосновымъ лѣсомъ пески. Пески эти—вѣроятно результатъ отложенія древнихъ озеръ. Обнаженіе же ихъ зависитъ съ одной стороны отъ истребленія лѣса, съ другой отъ поѣданія травы скотомъ и тѣмъ разрыхленія почвы; и дѣйствительно, пески, какъ уже изъ вышесказаннаго слѣдуетъ, встрѣчаются преимущественно около улусовъ.

О флорѣ Ольхона мы имѣемъ довольно много свѣдѣній отъ Георги, Радде, Турчанинова и Обручева, однако-же наибольшаго вниманія въ этомъ отношеніи заслуживаетъ работа Прейна, изложеніе которой даетъ намъ весьма полную картину флоры острова <sup>1)</sup>. Прейнъ посѣтилъ однако-же только степныя мѣстности, не выдавъ вовсе тѣхъ частей острова, гдѣ преобладаетъ лѣсная растительность, а потому о распространеніи и характерѣ этой послѣдней мы должны довольствоваться тѣми немногими данными, которыя мы изложили выше, говоря о лѣсахъ, прибавивъ къ перечисленнымъ древеснымъ породамъ слѣдующіе кустарники: ивковыя, черемуха, березовый ерникъ (*Betula nana* Poir.), сѣрая ольха, шиповникъ, багульникъ (*Rhododendron dahuricum* Fisch.), золотарникъ (*Caragana pygmaea*, var. *secunda* Turcz.), *Potentilla fruticosa* L., *Spiraea confusa* Rgl., *Cotoneaster vulgaris* Lindl., брусника и голубика.

Степная флора, своеобразно развитая на Ольхонѣ, произ-

---

<sup>1)</sup> Прейнъ, Изв. В.-Сиб. Отд. И. Р. Г. О. Т. XXV, № 1, стр. 29—54.

водить въ общемъ, какъ говорить Преинъ, на первый взглядъ непривлекательное впечатлѣніе, особенно на западномъ концѣ острова, гдѣ не видно ни одного деревца, а берега бухтъ и склоны желто-сѣрой окраски. Только при ближайшемъ осмотрѣ можно видѣть много цвѣтущихъ растений. Такіе же пустынные на видъ степные участки встрѣчаются и на восточной оконечности острова. Сѣверный же берегъ представляетъ во флористическомъ отношеніи значительное разнообразіе. Здѣсь встрѣчаются ровныя и плоскія пространства между мысами, вдающимися въ Малое море, покрытыя соснами и лиственницами, или же лишенные лѣса и степныя. Лѣса здѣсь, составляя продолженіе таковыхъ же внутри острова, подходятъ къ самому берегу. Деревья въ этихъ прибрежныхъ лѣсахъ стоятъ очень не тѣсно, невысокаго роста, приземисты при значительной толщинѣ и не имѣютъ подлѣска. Изъ травяныхъ растений здѣсь наблюдаются только свѣтолюбивыя, не образующія однако-же сплошнаго ковра; мховъ, лишайниковъ вовсе не видно, кромѣ тѣхъ, которые встрѣчаются на упомянутыхъ выше безлѣсныхъ равнинахъ съ каменистою почвою. По мѣрѣ движенія внутрь острова появляется и лѣсная флора, сперва въ видѣ кустарниковъ: *Spiraea confusa* Rgl. et Körn, *Potentilla fruticosa* L., *Rosa cinnamomea* L.; *Cotoneaster vulgaris* Lindl., *Rhododendron dahuricum* L., мховъ и лѣсныхъ лишаевъ, а также нѣкоторыхъ лѣсныхъ травъ. На ряду съ упомянутыми формами иногда попадаются и чисто степныя, какъ напр. *Patrinia sibirica* Juss., *Phlox sibirica* L., *Oxytropis oxurphylla* Pall., указывающія на большее развитіе здѣсь степной флоры.

Безлѣсныя пространства, приуроченныя къ ровнымъ участкамъ или склонамъ холмовъ на берегахъ Ольхона напоминаютъ по своей флорѣ степи Забайкалья и Монголіи, съ другой стороны же они имѣютъ нѣкоторое сходство съ каменистой лишайниковой тундрой глубокаго сѣвера (Barren-Group Арктической Америки). Исключеніе составляютъ тѣ участки

гдѣ недавно протекалъ или еще протекаетъ ручей или гдѣ въ ложбинкѣ удержалась еще въ почвѣ сырость. Тамъ можно еще видѣть свѣжую зелень, а въ другихъ мѣстахъ окраска желтоватосѣрая и утомительная, удручающе дѣйствующая, какъ говорить Преинъ, на глазъ. Этотъ однообразный цвѣтъ растительнаго покрова зависитъ отъ массы желтыхъ листьевъ и засохшихъ пожелтѣвшихъ стеблей какого-то злака, среди которыхъ однако же часто можно замѣтить всевозможныя невысокія травы съ красивыми цвѣтами. Лишайники преобладаютъ по склонамъ возвышенностей, гдѣ замѣчаются значительные выходы горной породы. Въ этихъ случаяхъ на южномъ склонѣ возвышенностей покровъ болѣе разнообразенъ и заключаетъ слѣдующія степныя растенія: *Alyssum lenense* Adams., *Smelowskia cinerea* C. A. Mey., *Arenaria capillaris* Poir., *Stellaria dichotoma* L., *Stellaria glauca* With., *Linum sibiricum* D. C., *Thymus Serpyllum* L., *Dracocephalum pinnatum* L., *Cerastium arvense* L., *Rheum undulatum* L., *Goniolimon speciosum* Boiss., *Polygonum divaricatum* L., *Berinia tenuifolia* Sz., *Oxytropis muricata* Pall., *Oxytropis oxyphylla* Pall., *Cymbaria dahurica* L., *Thermopsis lanceolata* R. Br., *Umbilicus spinosus* D. C., *Eritrichium obovatum* D. C., *Potentilla cinerea* Chaix., *Potentilla sericea* L., *Patrinia sibirica* Juss., *Hedysarum setigerum* Turcz., *Astragalus lupulinus* Pall., *Artemisia frigida* Willd., *Iris flavissima* Pall., *Allium tenuissimum* Willd., *Festuca ovina* L., *Triticum cristatum* Schreb., *Papaver alpinum* L., *Lilium tenuifolium* Fisch., *Clausia aprica* Korn. Trotzky, *Thalictrum foetidum* L., *Polygala tenuifolia* Willd., *Chamaerodos altaica* Bnge., *Androsace villosa* L., *Caragana pygmaea*, var. *secunda* Turcz., *Ephedra monosperma* J. G. Gmel. и нѣкоторыя другія.

По склону возвышенности на восточномъ концѣ острова, среди чисто лиственничнаго лѣса произрастаетъ много свѣтолюбивыхъ, даже чисто степныхъ формъ, какъ-то: *Scorzonera radiata* Fisch., *Scorz. austriaca* Willd., *Phlox sibirica* L.,



*Pedicularis rubens* Steph., *Astragalus versicolor* Pall., *Aster alpinus* L., *Euphorbia Esula* L., *Oxytropis oxuphylla* Pall., *Vicia megalotropis* и н. др. Тутъ-же растутъ чисто лѣсные формы: *Iris ruthenica* Dryand., *Aquilegia sibirica* Lam., *Lathyrus humilis* Fisch. и др.

Тоже, но еще въ большей степени, наблюдается въ хвойныхъ лѣсахъ. Въ одномъ изъ такихъ лѣсовъ, именно въ основномъ, расположенномъ въ видѣ клочка на безлѣсномъ склонѣ бухты, обращенномъ къ югу, на сухой и каменной почвѣ довольно рѣдко росли разбросанныя сосны, не отличающіяся высокимъ ростомъ, но толстыя, приземистыя и съ шапкообразными верхушками. Мелкихъ деревьевъ, пней и погибшихъ стволовъ нигдѣ не видать, ни въ самомъ лѣсѣ, ни на его окраинахъ. Въ изобиліи напелъ здѣсь Прейнъ: *Anemone patens* L., *Anemone pulsatilla* L. *Cymbaria dahurica* L., *Thermopsis lanceolata* R. Br., *Phlox sibirica* L., *Peucedanum baicalense* Koch., *Polygala tenuifolia* Willb., *Rhaponticum uniflorum* D. C., *Iris flavissima* Pall., *Serratula centauroides* L., *Senecio campestris* D. C., *Aster alpinus* L. Всѣ эти формы встрѣчаются на безлѣсныхъ степныхъ склонахъ, а потому, по мнѣнію Прейна, возможно предположить, что описанные участки лѣсовъ развились на почвѣ, занятой ранѣе степной флорой. Раздѣляя взглядъ Коржинскаго <sup>1)</sup> по отношенію степи къ лѣсу, что въ мѣстахъ сопрякосновенія лѣсной и степной формацій, первая увеличивается на счетъ второй, Прейнъ объясняетъ невозможность примѣненія его Ольхону, гдѣ условія, для увеличенія лѣсовъ, при малонаселенности, были бы самыми благопріятными, во-первыхъ, волѣдствіе неудовлетворительныхъ условій субстрата, а затѣмъ и сильныхъ вѣтровъ, исключаяющихъ во многихъ мѣстахъ возможность укрѣпиться лѣснымъ сѣменамъ. Изученіе Ольхонской флоры

<sup>1)</sup> Коржинскій, Сѣвери. граница черноземно-степной обл. вост. пол. Европ. Россіи. 1888 и 1891 г. Тр. Общ. Естеств. И. Казанск. Унив. Т. XIX, вып. 6.

заставляет Прейна присоединиться къ мнѣнію Неринга, полагающаго, что степи, со времени ледниковаго періода, сперва были тундрами (арктическими степями по Нерингу), которыя затѣмъ съ повышеніемъ температуры стали степями, смѣняющимися въ свою очередь лѣсами <sup>1)</sup>. Подобное мнѣніе подтверждается присутствіемъ въ ольхонской флорѣ нѣкоторыхъ видовъ, близкихъ къ видамъ сѣверной тундры. Однако-же подробное приложеніе взгляда Неринга, по мнѣнію Прейна, въ Сибири не можетъ еще имѣть мѣста, тѣмъ болѣе, что существованіе здѣсь ледниковаго періода еще съ точностью не доказано.

Кромѣ вышеприведенныхъ видовъ степной и лѣсной формаций въ списокъ растеній, собранныхъ Прейномъ, мы находимъ еще слѣдующія: *Anemone sylvestris* L., *Ranunculus Cymbalariae* D. C., *Ranunculus pulchellus* C. A. Mey., *Ran. affinis* R. Br., *Ran. auricomus* L., *Ran. acris* L., *Isopyrum fumarioides* L., *Delphinium elatum* L., *Delph. grandiflorum* L., *Oxytropis coerulea* Pall., *Ptilotrichum elongatum* C. A. Mey., *Draba nemorosa* L., *Erysimum altaicum* C. A. Mey., *Dianthus superbus* L., *Gypsophila Gmelini* Bnge., *Lychnis sibirica* L., *Geranium pseudosibiricum* J. Mey., *Trifolium repens* L., *Ervum megalotropis* Trautv., *Potentilla nivea* L., *Potentilla pensylvanica* L., *Chamaerodos grandiflora* Bnge., *Sanguisorba officinalis* L., *Epilobium angustifolium* L., *Epil. palustre* L., *Galium boreale* L., *Artemisia macrobotrys* Led., *Artemisia* sp., *Art. commutata* Bess., *Art. Sieversiana* Willd., *Art. palustris* L., *Archyrophorus maculatus* Scop., *Taraxacum dissectum* Led., *Campanula glomerata* L., *Camp. rotundifolia* L., *Vaccinium Vitis-idaea* L., *Vacc. uliginosum* L., *Pyrola rotundifolia* L., *Primula farinosa* L., *Pr. sibirica* Jacq., *Androsace septentrionalis* L., *Trientalis europaea* L., *Vincetoxicum sibiricum* Decaisne., *Gentiana Amarella* L., *G. barbata* Froel., *G.*

---

<sup>1)</sup> Dr. Alfr. Nehring, Ueber Tundren und Steppen d. Jetzt- und Vorzeit. Berlin 1890.

*humilis* Stev., *Myosotis sylvatica* Hoffm., *Echinospermum Lap-pula* L., *Linaria vulgaris* Mill., *Scrophularia incisa* Weinm., *Veronica longifolia* L., *Orobanche ammophila* C. A. Mey., *Dracocephalum Ruyschianum* L., *Scutellaria galericulata* L., *Galeopsis tetrahit* L., *Leonurus tataricus* L., *Lamium album* L., *Plantago media* L., *Rumex acetosa* L., *Cypripedium gut-tatum* Sw., *Polygonatum officinale* All., *Smilacina bifolia* Desf., *Lilium Martagon* L., *Allium* sp., *Carex duriuscula* C. A. Mey., *Car. vesicaria* L., *Alopecurus pratensis* L., *Poa pratensis* L., *Bromus inermis* Leyss., *Triticum cristatum* Schreb., *Hordeum pratense* L., *Equisetum palustre* L., *Eq. sylvaticum* S., *Pte-ris aquilina* L.

Изъ приведенныхъ выше списковъ растений видно, что въ ольхонской флорѣ много такихъ формъ, которыя, встрѣчаясь въ Забайкальѣ, не найдены въ Прибайкальѣ, какъ напр.: *Ptilotrichum elongatum* C. A. Mey., *Caragana pygmaea* D. C., *Oxytropis oxyphylla* Pall., *Astragalus versicolor* Pall., *Hedysarum setigerum* Turcz., *Chamaerodos altaica* Bnge., *Scrophularia incisa* Weinm., *Polygonum Laxmanni* Lepesch., *Rheum undulatum* L., *Cymbaria dahurica* и др. Эти степныя Забайкальскія формы представляютъ собой остатки той болѣе древней флоры, которая была общаю всему Прибайкалью и Монголіи. Вытѣсненная же съ одной стороны лѣсной формаціей, съ другой же болѣе приспособленными видами степной формаціи, вновь образовавшимися на мѣстѣ подъ вліяніемъ измѣненій физико-географическихъ условій или же переселившимися изъ другихъ центровъ, формація эта, по мнѣнію Прейна, сохранилась еще мѣстами, какъ напр. на Ольхонѣ, въ нѣкоторыхъ пунктахъ Балаганскаго окр. Иркутской губ. и въ Забайкальѣ.

Изъ другихъ ботаническихъ формацій наиболѣе обращаетъ вниманіе на Ольхонѣ формація сыпучихъ песковъ, которая характеризуется главнымъ образомъ слѣдующими видами: *Alyssum alpestre* L., *Silene ambigua* Turcz., *Geranium sibiricum* L., *Potentilla anserina* L., *Saxifraga bronchialis* L.,

*Glaux maritima* L., *Polygonum aviculare* L., *Pol. Laxmanni* Lepech., *Urtica dioica* L., *Urt. cannabina* L., *Alopecurus brachystachys* M. Bieb., *Glyceria subfastigiata* Griseb.

Упомянемъ здѣсь еще объ одной травѣ *измодѣкз* (вѣроятно *Botrychium lunare* Sw.), растущей здѣсь на высокихъ мѣстахъ, известной однако же и на материкѣ. Трава эта употреблялась будто бы прежде какъ единственное средство отъ водянки и вывозилась изъ Сибири <sup>1)</sup>).

Съ оскуденіемъ лѣсовъ связана и бѣдность населяющей ихъ фауны, хотя, какъ показали свѣдѣнія, собранныя по этому вопросу Черскимъ, бѣдность фауны лѣсовъ Ольхона слѣдуетъ понимать только въ смыслѣ небольшого количества индивидуумовъ, сохраняющихся здѣсь до сихъ поръ даже только потому, что часть этого лѣсистаго хребта, какъ мы увидимъ ниже, считается у бурятъ на столько священною, что посѣщается ими весьма рѣдко, а періодическій доступъ къ ней дѣлается вполне невозможнымъ. Въ этихъ лѣсахъ водятся поэтому: 1) благородные олени или изюбры, 2) козули (серны), появившіяся, впрочемъ, только въ 1870 или 1871 г.г. 3) лисицы, 4) волки, 5) сибирскіе хорьки, 6) горностаи и 7) зайцы, а по безлѣснымъ мѣстамъ, кромѣ 8) полевыхъ мышей, попадаютъ также 9) суслики; въ 1878 году появился даже медвѣдь, перешедшій на островъ по льду съ Приморскаго хребта.

Населеніе острова исключительно бурятское, размѣщающееся въ 17—18-ти улусахъ, которые, за исключеніемъ двухъ (въ долинахъ: Идибѣ и Хагай), располагаются въ долинахъ сѣверо-западнаго склона Ольхона близъ береговъ Малаго моря. Всѣхъ бурятъ насчитывается до 1000 душъ обоего пола, такъ-что на каждый улусъ приходится не болѣе 55 душъ. Все населеніе подраздѣлено на два рода, называемые Абызаевскими, которые управляются старшиной по выбору. Свя-

---

<sup>1)</sup> Шукинъ, Сынъ Отечества 1852 г. № 8.

ценная пещера въ Шаманскомъ мысѣ служить границей между родами. Роды подчиняются Ольхонской степной думѣ Верхоленскаго округа <sup>1)</sup>. Какъ во времена путешествія Георги (1772 г.), такъ и до сихъ поръ, главнымъ занятіемъ жителей является скотоводство и рыболовство, причемъ уловленная рыба (омуль) продается русскимъ скупщикамъ, появляющимся лѣтомъ на островѣ. И теперь, точно такъ же, самые богатые изъ нихъ имѣютъ не болѣе 50—60 штукъ коровъ и до 30 лошадей, барановъ же не болѣе 200 головъ, тогда какъ во времена Георги ихъ насчитывали до 500 штукъ; въ общемъ же населеніе отличается бѣдностью и скотъ страдаетъ отъ недостатка сѣна. По описанію Щукина буряты ольхонскіе отличаются особой дикостью. Путешественнику удавалось встрѣтить такихъ, которымъ никогда не приходилось побывать на материкѣ и видѣть русскихъ. Какъ уже сказано выше главнымъ занятіемъ населенія является скотоводство и рыболовство, особенно послѣднее, ради котораго ольхонцы стали маленькими партіями отправляться на Верхнюю Ангору, гдѣ ловятъ омулей. По берегамъ Ольхона буряты ловятъ омулей подо льдомъ неводами съ 1-ой недѣли великаго поста и до мая, когда ледъ на Байкалѣ начинаетъ разбиваться вѣтрами.

Извѣстенъ сталъ Ольхонъ русскимъ съ 1643 года, во время путешествія, какъ передаетъ Щукинъ, казачьего пятидесятника Курбата Иванова, вышедшаго съ 75 казаками изъ г. Якутска отыскивать Байкаль. Ивановъ поднялся по Ленѣ сколько могъ, узналъ отъ кочевавшихъ тамъ бурятъ о Байкалѣ, спустился къ его берегу и, увидавъ вблизи него большой островъ, переправился на него на плотахъ и разбилъ въ первомъ же сраженіи ольхонскихъ бурятъ. Однако острогъ онъ на островѣ не выстроилъ, вѣроятно по недостатку удоб-

---

<sup>1)</sup> Обручевъ, Горн. Журн. 1890 г. № 12, стр. 447.

ныхъ для того мѣстъ. Но первыя научныя свѣдѣнія, объ Ольхонѣ сообщаетъ Георгі ¹).

Названный ученый, какъ извѣстно, проплыль Ольхонскія Ворота безъостановочно и остановился на сѣверо-западномъ берегу Малаго моря, за дельтою р. Сармы, откуда только онъ переправился на Ольхонъ и дѣлалъ сухопутныя экскурсіи по его сѣверо-западному склону. Послѣ этого только въ 1852 году островъ посѣщенъ былъ Щукинымъ ²). Меглицкій ³) ознакомился только съ юго-западною частью острова, который онъ считалъ «самостоятельною грядою», въ смыслѣ отдѣльной «оси поднятія», предполагая, что полоса изверженнаго гранита образуетъ въ немъ высшіе точки юго-восточнаго берега; онъ рассматривалъ Ольхонъ отдѣлившимся отъ материка путемъ размыва узкой долины Ворота и высказалъ предположеніе о возможности прежняго соединенія его даже съ Святымъ носомъ, полуостровомъ, лежащимъ на юго-восточномъ берегу Байкала, какъ разъ на мысленномъ продолженіи интересующаго насъ острова, въ 46 верстахъ ближайшаго разстоянія. Такое отношеніе Ольхона къ Святому носу не ускользнуло и отъ наблюдательности самихъ бурятъ, какъ объ этомъ свидѣлствуетъ весьма интересное преданіе, сообщенное между прочимъ, врачомъ Кириловымъ ⁴). Баргузинскіе буряты передавали ему, что Святой Носъ соединялся съ Ольхономъ полосой суши, по которой, согласно этому преданію, переходилъ Чингисъ-Ханъ; о томъ, что герой этотъ былъ на Ольхонѣ, гласитъ, какъ извѣстно и народное монгольское преданіе, сообщенное еще историкомъ Миллеромъ ⁵), хотя ни онъ самъ, ни впоследствии Черскій, не могли провѣрить этого

¹) Georgi, Bemerk. a. s. Reise im Russ. Reiche, Bd. I.

²) Щукинъ, Сынъ Отечества 1852 г. № 8.

³) Меглицкій, Горн. Журн. 1853 г.

⁴) Рукопись, представленная И. Р. Географич. Обществу въ 1876 г.

⁵) Sibirische Gesch. в Sammlung Russ. Gesch., B. VI, 1761, p. 112.

преданія свидѣтельствомъ бурятъ (см. ниже, о монгольскихъ постройкахъ). Радде точно также проплылъ безъостановочно черезъ Ворота, затѣмъ повернулъ вдоль сѣверо-западнаго берега острова, къ которому онъ приставалъ въ трехъ мѣстахъ и почти на половинѣ средней части Ольхона, изъ бухты Харанса (см. ниже), сдѣлалъ экскурсію къ противоположному берегу острова. Изъ той же бухты онъ переплылъ на сѣверо-западный берегъ Малаго моря. Черскій (1879 г.) <sup>1)</sup> объѣхалъ этотъ островъ кругомъ, посѣтивъ всѣ его бухты и дѣлая экскурсіи внутрь страны, на что ему необходимо было употребить 21 день. Наконецъ Ольхонъ былъ посѣщенъ въ 1889 году Обручевымъ <sup>2)</sup> съ цѣлью провѣрить слухи объ источникахъ нефти на сѣверо-восточномъ концѣ острова и о драгоцѣнныхъ минералахъ встрѣчающихся на немъ и въ самое послѣднее время ботаникомъ Прейномъ <sup>3)</sup>. Для болѣе яснаго изложенія подробныхъ свѣдѣній объ этомъ островѣ мы будемъ придерживаться маршрута Черскаго, вставляя въ соотвѣтственные мѣста и результаты изслѣдованій другихъ, упомянутыхъ выше ученыхъ. Наконецъ, что касается самаго названія Ольхона, то Шукинъ объясняетъ его происшедшимъ отъ бурятскаго слова *олханъ*, что значитъ *сухой*, — названіе весьма характеристическое для острова, такъ какъ онъ дѣйствительно, какъ мы видѣли раньше, очень мало орошенъ.

#### А) Плаваніе вдоль юго-восточнаго берега острова Ольхона.

Отъ знакомаго уже намъ мыса Кресть, съ котораго начинается материковый берегъ Ольхонскихъ воротъ, Черскій пересѣкъ этотъ узкій проливъ въ поперечномъ направленіи,

<sup>1)</sup> Черскій, Изв. В.-Сиб. Отд. И. Р. Г. О. Т. XI, № 1—2.

<sup>2)</sup> Обручевъ, Горн. Журн. 1890 г. № 12, также. Изв. В.-Сиб. Отд. И. Р. Геогр. Общ. Т. XXI, № 3.

<sup>3)</sup> Прейнъ, Изв. В.-Сиб. Отд. И. Р. Г. О. Т. XXV, № 1.

къ противулежащему, ольхонскому мысу, извѣстному подъ названіемъ Уншунъ. Мысъ этотъ представляетъ собою высокій, тупо-округленный, южный уголь этой (ю.-з.-й) оконечности Ольхона; съ него именно начинается юго-восточный берегъ острова.

На протяженіи 28 верстъ отъ Уншуна до мыса Уханъ, а слѣдовательно, на всей длинѣ юго-западной части острова, описываемый берегъ направляется въ общемъ на в.-с.-в. (ближе къ востоку), образуя легкій дугообразный, бухтовидный изгибъ. Такимъ направленіемъ береговой линіи, отличающейся къ тому же весьма незначительною извилистостью, Ольхонъ дополняетъ собою ту выемку, которая началась соотвѣтственнымъ поворотомъ берега Байкала еще на материкѣ, въ 15 верстахъ на ю.-ю.-з. отъ Воротъ, т. е. отъ знакомаго намъ уже, Уланъ-нурскаго мыса. И дѣйствительно, промежутокъ между послѣднимъ и Уханомъ, достигающій 44-хъ верстъ длины по прямому направленію (по хордѣ дуги), является длиною (44 версты) бухтою, врѣзавшеюся въ берегъ до 7 верстъ, именно въ той своей части, гдѣ въ нее открываются Ольхонскія Ворота. Поэтому Черскій называетъ всю эту большую выемку бухтою Ольхонскихъ воротъ, рассматривая ее какъ принадлежность средней части Байкала (отъ сѣуженія дельтою р. Селенги до устья р. Баргузинъ).

Скалистый берегъ омывается непосредственно водою, представляя только два незначительныя мысовидныя накопленія прибойной гальки; за вторымъ изъ нихъ, въ разстояніи около 3-хъ верстъ за Уншунъ, находится малая бухточка, дающая первую удобную пристань для лодки, такъ какъ упомянутые выше мысовидные выступы подвержены сильному прибою волнъ во время бури. Бухточка эта носитъ названіе Мангасъ-пугò (или нугунъ), что означаетъ: русская бухта (*мангасъ* — русскій на прибайкальскомъ нарѣчій, тогда какъ забайкальскіе буряты называютъ русскихъ *оротъ*); въ нее от-



крывается сухая, соименная долина, слѣдующая юго-восточному направленію. Восходя по ней Черскій встрѣтилъ такой же песчаный озерный наносъ, какъ и на материкѣ, поднимающійся здѣсь до высоты 213' надъ современнымъ уровнемъ Байкала. Ближайшій къ озеру высшій пунктъ острова образуетъ собою гребень, вытянутый съ запада на востокъ, по правому берегу верховьевъ долины Мангасу, и образующій западною своею оконечностью мысъ Уншунъ. Съ вершины этой можно видѣть, что верховья Мангасу сливаются непосредственно съ верховьями другой, сухой же долины, слѣдующей на западъ, къ ближайшей за Уншуномъ, бухтѣ Ольхонскихъ воротъ (Уншунская бухта, см. ниже), около которой долина эта принимаетъ еще двѣ вѣтви: правую и лѣвую. Къ сѣверу отъ этой долины располагается абсолютно высшій пунктъ юго-западной оконечности острова, достигающій 1182' надъ Байкаломъ, но съ нимъ мы ознакомимся при описаніи ольхонскаго берега Воротъ (см. ниже).

Слѣдующая удобная пристань находится верстахъ въ трехъ за Мангасу, въ такой-же незначительной бухточкѣ, называемой Хара-амынъ, недоѣзжая которой, на склонѣ горъ наблюдаются башневидные утесы около небольшой Безимьянной долины. Въ долинѣ Хара-амынъ точно также замѣчается озерный песчаный наносъ, поднимающійся вверхъ по склону. За ближайшимъ мысовиднымъ выступомъ крутаго склона горъ обнаруживается единственный здѣсь, болѣе выступающій и нѣсколько террасовидный, не высокій мысъ, на которомъ располагается устье долинки Жедо-шибѣ-бусъ (около 2-хъ верстъ за Хара-амыномъ); съ версту — далѣе долины Хурай-Халзынъ съ живописнымъ, хотя и не высокимъ, башневиднымъ утесомъ на правомъ берегу, а спустя еще 1½ версты, достигается устье Халзына, перваго ключа на описанномъ протяженіи. Долина Халзына состоитъ изъ двухъ вѣтвей: правой, придерживающейся юго-восточнаго направленія, и лѣвой, слѣдующей съ сѣвера на югъ; обѣ вѣтви сли-

чаются довольно значительнымъ по ширинѣ плоскимъ дномъ и меньшимъ наклономъ послѣдняго, тогда какъ короткое низовье долины является узкимъ и ущелистымъ съ дномъ, заваленнымъ громадными глыбами. Упомянутый выше постоянный, хотя и незначительный ключикъ протекаетъ по правой долинѣ, а нѣкоторая часть лѣвой порослаетъ лиственничнымъ лѣсомъ, поднимающимся и на высоты ея лѣваго берега, т. е. на главный гребень хребта.

Отъ Халзына берегъ направляется почти прямолинейно къ востоку, на протяженіи 8 верстъ, до устья долины Идибѣ. Видимая съ озера часть высшаго гребня является мѣстами зазубренною и представляетъ нерѣдко сначала отвѣсную стѣну до 70', а ниже нѣсколько болѣе пологій склонъ, покрытый осыпью; появившаяся на Халзынѣ лѣсная растительность покрываетъ сначала только высшіе пункты горъ, а затѣмъ, въ соотвѣтственныхъ мѣстахъ, переходитъ и на склонъ къ озеру, причемъ къ лиственницѣ подмѣшивается здѣсь и сосна. Мѣстами на осыпанной части склона замѣчается терраса до 11' высоты и болѣе или менѣе узкое, наносное побережье, а ближе къ Идибѣ утесы обнажаютъ склонъ до самаго уровня озера. Долина Идибѣ съ соименнымъ въ ней ключемъ принадлежитъ къ самымъ значительнымъ въ этой части острова и достигаетъ около 7 верстъ въ длину; верховья ея состоятъ изъ двухъ бассейновидныхъ, широкихъ и параллельныхъ другъ другу долинъ, вытянутыхъ на с.-з. и окруженныхъ пологими, холмистыми и безлѣсными склонами; долины эти, сообщаясь съ собою съ западной стороны, снабжены отдѣльными отводящими ложбинами, изъ соединенія которыхъ образуется главная долина Идибѣ, окруженная лѣсомъ, принимающая мѣстами даже луговой характеръ, тогда какъ верховья напоминаютъ собою степныя мѣстности. Въ сѣверовосточномъ (лѣвомъ) изъ упомянутыхъ расширеній располагается соименный бурятскій улусъ (лѣтній), на высотѣ 1050' надъ Байкаломъ, а ниже въ долинѣ построенъ другой, пред-

назначенный для зимы. Высота отрога, отдѣляющаго оба расширенія, достигаетъ, по опредѣленію Черскаго, 1352'. На съѣмкахъ Военно-Топографическаго Отдѣла долина Идибѣ, названа ошибочно «Эдвій»; объясняя эту ошибку, бурятъ, сопровождавшій Черскаго, заключилъ, что «землемѣръ, должно быть, «писалъ мѣмо», употребивъ слово мѣмо, очевидно также, какъ оно примѣняется ими для обозначенія промаха въ стрѣльбѣ.

Отъ Идибѣ до конца юго-западной части этого берега, т. е. до мыса Уханъ, считается около 10 верстъ. На этомъ протяженіи береговая линія, слѣдуя на в.-ю.-в., изгибается въ двѣ, очень плоскія, бухтовидныя выемки, отдѣленныя незначительнымъ мысомъ Хылтыгѣ. Ближе къ этому мысу, почти отвѣсный и утесистый склонъ пересѣкается двумя, незначительными долинками: Гырѣлъ и Ургунтѣй, а за мыскомъ долиною Тышигенѣ съ ключемъ того-же имени. Долина эта располагается почти на половинѣ разстоянія къ Ухану; склонъ хребта дѣлается здѣсь болѣе пологимъ (до 40°) и порослаетъ хвойнымъ лѣсомъ; вездѣ развита прибойная полоса наноса (каргъ), хотя и незначительной ширины. Около мыса Уханъ ближайшая къ нему изъ двухъ расположенныхъ здѣсь долинокъ, носить названіе Ухъни-бару́нь-кургунъ (иначе кухунъ). Поросшимъ и настолько-же болѣе пологимъ склономъ отличается и мысъ-Ухънь, за которымъ берегъ острова поворачиваетъ уже къ сѣверо-востоку.

Геогностическое строеніе описанной части берега въ сущности ничѣмъ не отличается отъ материковой части прибрежной полосы горъ. Черскій видѣлъ здѣсь ту-же перемежаемость кристаллическаго известняка съ роговообманковымъ гнейсомъ и его видоизмѣненіями; пласты этого известняка обнажаются: въ двухъ мѣстахъ между Уншуномъ и Мангасу, затѣмъ три пласта его выходятъ между Жедѣ-шибѣбусы и Хурай-Халзыномъ, два между Халзыномъ и Идибѣ и въ трехъ мѣстахъ между послѣднею и Уханомъ. Всего

болѣе интересно то обстоятельство, что пласты этихъ породъ являются очевиднѣйшимъ продолженіемъ материковыхъ. При описаніи прибрежныхъ горъ въ промежуткѣ между Уланъ-нүромъ и мысомъ Крестъ, т. е. юго-западной стороны бухты Ольхонскихъ воротъ, дополняемой съ сѣверо-востока берегомъ Ольхона до мыса Уханъ, мы видѣли, что бухта эта на столько врѣзывается въ прибрежныя горы, что пересѣкаетъ собою антиклинальную складку пластовъ, обнаженную между долинами Россее-амынъ и Аргойтѣ, и захватываетъ еще значительную часть сѣверо-западнаго склона (крыла) этой складки, вслѣдствіе чего, породы, обнаженныя въ самыхъ глубокихъ частяхъ бухты, напр. отъ Аргойтѣ до Ольхонскихъ воротъ, отличаются с.-с.-з.-мъ наклономъ слоевъ. Если не обращать вниманія на вполнѣ мѣстные, но значительные изгибы слоевъ на оконечности мыса Уншунъ, то оказывается, что тоже с.-с.-з.-ое паденіе распространяется и на пласты юго-восточнаго берега Ольхона до устья долины Идибѣ, <sup>1)</sup> около котораго, въ упомянутыхъ выше утесахъ, наблюдается весьма ясный, антиклинальный перегибъ слоевъ, лежащій какъ разъ на мысленномъ продолженіи осевой части складки, пересѣченной южнѣе Аргойтѣ. Согласно съ тѣмъ, весь остальной отрѣзокъ берега Ольхона, отъ Идибѣ до Ухана, какъ выдвигающійся къ юго-востоку отъ этой антиклинальной линіи, отличается ю.-ю.-в.-мъ наклономъ слоевъ, слѣдовательно, согласнымъ съ развитымъ отъ Уланъ нүра до Россее-амынъ. Съ такими стратиграфическими условіями вполнѣ согласуется и тотъ фактъ, что въ верховьяхъ Идибѣ Черскій наблюдалъ

---

1) При устьѣ Идибѣ Обручевъ опредѣлилъ паденіе гнейсовъ на ю.-в. 11 н. подъ угломъ въ 35°, нѣсколько же выше по долину наблюдается отвѣсное паденіе, а еще выше оно переходитъ въ с.-з. Фактъ этотъ указываетъ и на то, что ось Ангинско-Баргузинской антиклинали (см. ниже) проходитъ въ данномъ мѣстѣ по самому острову недалеко отъ берега, а не по Байкалу недалеко отъ устья ручья Идибѣ, какъ показано Черскимъ.

ю.-ю.-в. падение пластовъ, въ противоположность с.-с.-з-му, господствующему на западъ отъ устья той-же долины. Явление это указываетъ на нахождение здѣсь и синклинальнаго изгиба слоевъ, который, какъ мы увидимъ ниже, составляетъ прямое продолженіе такого-же перегиба, наблюдавшагося на западномъ берегу Ольхонскихъ воротъ, въ мысѣ Ихтѣ, отдѣляющемъ Базарную бухту отъ Куркутской (см. выше).

За мысомъ Уханъ начинается средняя часть юго-восточнаго берега Ольхона, видимая съ этого мыса почти на всемъ ея протяженіи до Ижимэйскаго мыса включительно. Часть эта какъ сказано выше, направляется на сѣверо-востокъ и изогнута въ видѣ бухты до 30 верстъ длины, считая по ея хордѣ, т. е. до ограничивающаго ее съ сѣверо-востока Ижимэйскаго мыса. Этотъ послѣдній, при взглядѣ на него съ Ухана, обнаруживаетъ всѣ признаки типа довольно длинныхъ горообразныхъ мысовъ, хотя, въ сущности, онъ все не обособленъ съ сѣверо-востока и потому не вдается такъ въ озеро, какъ это кажется съ стороны Ухана. Такая мнимая его горообразность зависитъ во-первыхъ отъ того, что, начиная съ этого высшаго пункта слѣдуетъ пологій склонъ къ с.-з., т. е. къ Малому морю, а во-вторыхъ, что часть этого склона можно видѣть съ Ухана, такъ какъ бухта врѣзалась съ этой стороны за линію высшаго гребня хребта, а склонъ ближайшей къ Ижимэю части горъ пересекается еще долиною. Вся эта бухта подраздѣляется еще на нѣсколько (до 6-ти) второстепенныхъ, увеличивающихся по направлению къ сѣверо-востоку; изъ нихъ извѣстны названія только первыхъ трехъ (Уханская, Хатха и Бүдэ) и послѣдней (Уланъ-нүрская). Склонъ горъ вездѣ крутой (до 45° и болѣе), но въ большей части случаевъ не представляетъ сплошныхъ утесовъ и порастаетъ даже лѣсомъ, густота котораго достигаетъ своего максимума на высшихъ точкахъ хребта. Изъ долинъ, пересекающихъ этотъ склонъ, извѣстны: Уханъ-и-зунъ-кугунъ, не болѣе какъ въ 1 версту

за Уханомъ, далѣе Хатхѣ, въ 4 верстахъ отъ Ухана, спустя еще столько же, открывается Барунъ-Будэ (барунъ означаетъ *западный* или правый, считая отъ солнца), а менѣе двухъ верстъ за нею Зунъ-будэ (зунъ = *восточный* или лѣвый отъ солнца); далѣе слѣдуетъ рядъ безымянныхъ ложбинокъ и небольшихъ долинъ, и только лежащая въ 13 верстахъ отъ Зунъ-будэ, около 8 верстъ недоѣзжая Ижимѣйскаго мыса, извѣстна подъ названіемъ Уланъ-нуръ (Ольхонскій Уланъ-нуръ, въ противоположность материковому), не взирая на то, что ни въ этой долинѣ, ни по ея сосѣдству, нѣтъ никакого озера (нуръ), ни даже наносовъ краснаго цвѣта (уланъ), къ тому-же и мѣстность сама по себѣ, не представляетъ ничего живописнаго, красиваго (уланъ, означаетъ также *красивый*). Наконецъ, около самаго Ижимя, располагается долина, носящая одинаковое названіе съ этимъ высшимъ пунктомъ Ольхона. Около Ухани-зунъ-кугунъ можно видѣть террасу, возвышающуюся до 14' надъ озеромъ, а около долины Хатхѣ до 21'. По этой долинѣ Черскій сдѣлалъ небольшую экскурсію на высоты ея праваго берега. Общее направленіе долины на в.-ю.-в. Ближайшая вершина возвышается всего лишь на 438' надъ озеромъ; за нею слѣдуетъ первая утесистая сопочка, достигающая 878' высоты. Узкій гребень ведетъ отъ этой вершины на весьма отчетливо развитый уступъ, лежащій на высотѣ 1045' надъ Байкаломъ, послѣ чего начинается крутой подъемъ на высшій пунетъ, на которомъ анеронидъ показалъ 1296' той же относительной высоты; онъ оказался узкимъ и короткимъ, почти плоскимъ, скалистымъ гребнемъ, отдѣляющимъ правый берегъ верховьевъ Хатхи отъ Байкала, а съ западной стороны и отъ лѣваго берега небольшой сосѣдней долины. Отсюда видно, что какъ на лѣвомъ берегу Хатхи, т. е. къ сѣверо-востоку, такъ и западнѣе этого гребня, высота горъ значительно увеличивается, достигая повидимому отъ 1500 о 1600' надъ уровнемъ озера. Обстоятельство

это подтвердилось слѣдующимъ восхожденіемъ, совершеннымъ вверхъ по долинѣ Уланъ-нуръ, по лѣвому изъ ея трехъ верховьевъ. Перейдя черезъ сѣдловину въ ограничивавшемся отрогѣ (1292' надъ Байк.) и переваливъ черезъ слѣдующее затѣмъ возвышеніе (1684' н. Байк.), Черскій достигъ абсолютно высшей точки на этомъ меридіанѣ, достигающей 1709' надъ озеромъ. Это известковый гребень, образующій заднюю стѣну котловинообразнаго расширенія средняго верховья Уланъ-нурской долины. Болѣе высокимъ кажется отсюда только Ижимэй, вершина котораго хорошо видна съ этого мѣста; сквозь хвойный лѣсъ, растущій на гребенѣ хребта, виднѣется нѣкоторая часть Малаго моря. На одномъ изъ деревьевъ, нѣсколько ниже гребня, Черскій нашелъ русскую надпись «Убилъ 10-го мая»; по догадкамъ мѣстныхъ бурятъ она сдѣлана, должно быть, однимъ изъ жителей Косой степи (на Б. Бугульдейкѣ, см. выше), пріѣзжающихъ сюда иногда для охоты за изюбрами.

Изъ той-же (Уланъ-нурской) бухты Черскій восходилъ и на вершину Ижимэйскаго мыса, составляющую, какъ было сказано выше, кулиминаціонный пунктъ Ольхонскаго хребта. До высоты около 70' надъ озеромъ, гдѣ находится довольно отчетливо развитая терраса, склонъ горъ одѣтъ весьма мощнымъ наноснымъ отложеніемъ, состоящимъ изъ осыпавшихся каменныхъ глыбъ и болѣе мелкихъ продуктовъ разрушенія, часть которыхъ острореберна, другая-же носить на себѣ ясныя слѣды оглаживанія ихъ водою, такъ-что все это отложеніе имѣетъ достаточно типичный характеръ осадковъ образующихся около крутыхъ и обрушивающихся скалистыхъ береговъ озера. Поднявшись по ближайшей къ Ижимэю долинѣ, до высоты 495', Черскій продолжалъ восхожденіе по ея лѣвой вѣтви и, на высотѣ 1295', вступилъ на террасовидную площадь, обращенную крутымъ склономъ къ Байкалу также, какъ это имѣетъ мѣсто и во всѣхъ террасахъ озернаго происхождения. Площадь эта, не взирая на отсутствіе на ней ка-

кихъ либо характерныхъ наносныхъ отложеній, заслуживаетъ однако полнаго вниманія со стороны будущихъ изслѣдователей, въ распоряженіи которыхъ будутъ болѣе точные нивелировочные инструменты, нежели anerоидъ или барометръ, допускающіе извѣстныя, нерѣдко весьма значительныя погрѣшности. Во всякомъ случаѣ, въ настоящее время достойно вниманія и то обстоятельство, что цифра высоты этой террасы, хотя быть можетъ нѣсколько и преувеличенная (1295', при сильномъ ю.-з. вѣтрѣ), довольно близко подходитъ къ высотѣ залеганія какъ песчанаго наноса въ окрестностяхъ юго-западной оконечности Байкала (1103'), такъ и оглаженныхъ глыбъ на горѣ Култучной (1128'); терраса эта, какъ достаточно хорошо развитая, осмысливаетъ собою къ тому-же и менѣе характерный уступъ на томъ-же берегу Ольхона, упомянутый нами около долины Хатхà (1045' надъ Байкаломъ).

Терраса эта примыкаетъ къ плоской-же поверхности, возвышающейся до 1582' надъ озеромъ, послѣ чего путешественникъ вступаетъ на тупой гребень, высота котораго, отъ 1596' возрастаетъ далѣе до 1744'. Путь этотъ доводитъ наконецъ до сѣверо-западнаго основанія вершины Ижмѣя, на которомъ anerоидъ показалъ 2084' надъ озеромъ, между тѣмъ какъ съ юго-восточной стороны она возвышается до 2232', вездѣ обнажая одинъ лишь кристаллическій известнякъ съ блестками графита, обильными и въ пластахъ той-же породы, обнаженныхъ на материкѣ. Известнякъ образуетъ собою и абсолютнo высшій пунктъ скалистой вершины, достигающій 2407' надъ Байкаломъ. Хвойный и смѣшанный лѣсъ порастаетъ всѣ доступныя ему части этихъ высотъ; гдѣ трава достигала большей тучности, она оказывалась измятою недавно лежавшими здѣсь изюбрами, оставившими и свои характерныя пометы. Съ вершины доступна осмотра большая часть острова и почти все Малое море; съ ней видны были даже сѣжныя вершины южнаго берега юго-западной части Байкала, въ системахъ р.р. Выдренной, Снѣжной и Мурина,



удаленныя отъ этой мѣстности на слишкомъ 250 верстъ. — Вершина Ижимѣя, какъ равно такъ называемый Пещерный мысъ, на сѣверо-западномъ берегу острова (см. ниже), считаются у бурятъ одними изъ самыхъ священныхъ мѣстъ Байкала, къ которымъ, какъ мы увидимъ ниже, относится еще и долина Хѣръ-хушунъ (рытый мысъ) на с.-з-мъ берегу озера. Записанное Черскимъ преданіе говоритъ слѣдующее, по поводу названныхъ священныхъ мѣстъ на Ольхонѣ. Между монголами, заселявшими прежде какъ побережье Байкала, такъ и островъ Ольхонъ, и исповѣдовавшими ламаизмъ, жилъ, въ видѣ исключенія, шаманъ, по имени *Нагрѣ-бѣ* (бѣ означаетъ шаманъ), съ женою, именуемою *Загрѣ-хатанъ* (*хатанъ*-супруга). Шаманъ этотъ былъ настолько могучимъ что пользовался полнымъ уваженіемъ божества («жителя грома», по выраженію рассказчика бурята), называемаго *Угутѣ-нойнъ*, вслѣдствіе чего этотъ послѣдній считалъ даже необходимымъ прибѣгать къ совѣтамъ знаменитаго представителя шаманства на Ольхонѣ. Задумавъ переселить всѣхъ монголовъ за Байкалъ, Угутѣ-нойнъ сообщилъ объ этомъ предположеніи шаману, который, не желая разстаться съ родиною, просилъ оставить его на островѣ. Угутѣ не только изъявилъ согласіе на просьбу Нагрѣ, но далъ ему, вмѣсто дворца, гору Ижимѣя, а въ дѣти, которыхъ не было у шамана, орла; самъ-же, съ женою, называемою *Унутѣ-хатанъ*, поселился въ пещерѣ, около Малаго моря (см. ниже). Что-же касается монголовъ, то они на слѣдующій день проснулись уже за Байкаломъ, оставивъ послѣ себя каменные стѣны (въ родѣ Харгойской стѣны), маяки (см. ниже) и т. п., которымъ буряты, въ свою очередь, приносятъ иногда жертвы. Съ тѣхъ поръ названныя мѣста Ольхона считаются священными и, если въ теченіи даннаго луннаго мѣсяца умираетъ кто либо изъ бурятъ Ольхонскаго вѣдомства, то ни около Ижимѣя, ни около пещернаго мыса, никто изъ жителей не можетъ ни проходить, ни проплывать, впредь до слѣдующаго новолунія.

Плаваніе Черскаго вокругъ Ольхона имѣло мѣсто именно въ такой, критическій для мѣстныхъ жителей, періодъ времени и потому, проводникъ его, вѣрный своимъ воззрѣніямъ на святость Ижимя, оставилъ лодку около устья Уланъ-нурской долины, перевалилъ по сей послѣдней на противоположный берегъ Ольхона, послѣ чего возвратился къ Байкалу по низовьямъ долины Хагѣй (см. ниже), въ 10 верстахъ къ сѣверо-востоку отъ Ижимя, обойдя его такимъ образомъ маршрутомъ не менѣе 18 верстъ въ длину и сдѣлавъ, въ угоду богамъ, два перевала черезъ хребетъ. Географическія наблюденія не подтвердили предполагавшагося нахожденія гранитнаго стержня и въ этой части Ольхонскаго хребта, сосредоточивающей высшіе пункты острова: береговая линія пересѣкаетъ на этомъ протяженіи пласты всё той же перемежаемости, известнякъ которой выступаетъ между Уханомъ и Хатхой, затѣмъ, между долинками Бүдэ, въ окрестностяхъ устья Уланъ-Нуръ и около Ижимя, съ его высшею точкою включительно. Такъ какъ берегъ острова, начиная съ мыса Уханъ, поворачиваетъ къ сѣверо-востоку, то поэтому продолженіе складки, поврежденной, вѣрнѣе захваченной бухтою Ольхонскихъ воротъ въ промежуткѣ между окрестностями Аргѣйтэ (на материкѣ) и Идибэ (на островѣ, см. выше), опять пересѣкается и захватывается Байкаломъ около устья долины Барунъ-бүдэ, и это въ послѣдній уже разъ, такъ-что дальнѣйшее продолженіе этой складки можно уже встрѣтить только на противоположномъ берегу озера.

Долина Барунъ-бүдэ, въ своихъ низовьяхъ, располагается на самой осевой части этой складки, вслѣдствіе чего, начиная съ ея лѣваго берега и до Ижимя включительно, паденіе пластовъ вездѣ с.-с.-з.-ое, тогда какъ отъ Ухана до устья Б. Бүдэ, оно ю.-ю.-в.-ое. Этотъ перегибъ слоевъ хорошо наблюдается даже подъ уровнемъ воды, гдѣ, начиная съ Ухана, черезъ Хатху и Бүдэ, почти до половины разстоянія

между послѣдними и Уланъ-нүромъ, Черскій видѣлъ подводную террасу, сопровождающую берегъ довольно узкою полосою съ крутымъ склономъ къ юго-востоку. Терраса эта въ нѣкоторыхъ мѣстахъ вовсе не покрыта наносомъ и, благодаря прозрачности воды, въ такихъ мѣстахъ ясно различаются образующія ее головы пластовъ и опредѣляется удобно наклонъ послѣднихъ; около низовьевъ Бару́нъ-бүдэ можно видѣть, что терраса пересѣкается глубокою и потому чернѣющею ложбиною, составляющею затопленное продолженіе названной долины.

Послѣдняя часть юго-восточнаго берега острова, отъ мыса Ижимѣй до Верхняго изголовья (иначе Хобой), какъ сказано выше, отличается въ общемъ с.-с.-в.-мъ направлениемъ, въ частности же его можно раздѣлить на слѣдующія три главныя части. Сейчасъ же за Ижимѣемъ слѣдуетъ плоская бухтовидная выемка до 4 верстъ длины, ограниченная мысомъ Нижній Шинтуй. За нимъ располагается самая значительная бухта Хага́йская, до 13 верстъ длины по хордѣ, а наконецъ поворотъ берега къ с.-с.-з.-д., къ прилежащей оконечности острова (Хобой), — поворотъ, продолжающійся около 6-ти верстъ, на протяженіи которыхъ расположены три бухточки: Шарахапсага́йская, Верхне-Шинтуйская и Хобойская съ соименными мысами. Начиная съ высшаго пункта Ижимѣя, хребетъ, по направленію къ сѣверо-восточной оконечности острова, начинается понижаться, причемъ, какъ это весьма отчетливо видно при взглядѣ на островъ съ противоположнаго берега Малаго моря (напр. съ Замы, даже съ Онгурева, см. ниже), пониженіе это достигается рядомъ террасовидныхъ уступовъ, которыхъ, съ указаннаго выше отдаленія, Черскій насчитываетъ четыре. Затѣмъ, начиная почти съ конца первой трети Хага́йской бухты, слѣдовательно, на протяженіи около 10—12 верстъ, сѣверо-восточная часть острова понижается до 800—700' и продолжается въ такомъ видѣ къ еще болѣе

низкому, террасовидному и крутоусѣченному конечному мысу, представляя по большей части округленные и волнистыя въ разрѣзѣ вершины. Крутой склонъ не рѣдко непосредственно омывается водою, въ особенности сѣвернѣе долины Хагай, которая играетъ роль отводящаго, поперечнаго канала для продольныхъ долинъ этой мѣстности; къ тому же, вмѣстѣ съ описаннымъ выше пониженіемъ сѣверо-восточной части острова, исчезаетъ и древесная растительность, вслѣдствіе чего этотъ отрѣзокъ, по своей наружности, уподобляется юго-западному. Столь же скалистыми являются и три послѣднія бухточки, вмѣстѣ съ разобщающими ихъ мысами. Въ первую изъ нихъ, Шара-хапсагайскую, открывается соименная долина. Экскурсія вверхъ по лѣвому берегу этой овраговидной долины показала во-первыхъ, что ближайшая вершина горы достигаетъ 419' надъ озеромъ. Отсюда видно, что оврагъ этотъ сообщается съ хорошо развитою долиною, которая беретъ начало на ю.-ю.-в., въ котловинообразномъ расширеніи, лежащемъ на высотѣ 505' надъ Байкаломъ, и слѣдуетъ на с.-с.-з., послѣ чего она открывается въ Хобойскую бухту. Высшій пунктъ, лежащій сѣвернѣе этой долины, называется Хара-ундѣръ или Хара-ундѣръ (*хара* — черная; *ундѣръ* — высота) и достигаетъ 792' высоты. Съ него, какъ расположеннаго вблизи оконечности острова, можно видѣть одновременно какъ Байкаль, такъ и Малое море; особенно поучителенъ отсюда видъ къ юго-западу, обнимающій громадную часть сѣверо-западнаго склона острова: видъ этотъ обнаруживаетъ, что названный склонъ Ольхона поднимается къ высшимъ пунктамъ хребта не болѣе, какъ подъ угломъ 23°, образуясь цѣлымъ рядомъ соотвѣтственно положихъ, поперечныхъ отроговъ, тогда какъ видимый отсюда юго-восточный скатъ высотъ, ближайшихъ къ вершинѣ Ижмѣя, круто опускается къ Байкалу; оконечности упомянутыхъ отроговъ образуютъ собою цѣлый рядъ мысовъ, вдающихся въ Малое море по краямъ разобщаемыхъ ими бухтъ. Замѣтивъ

въ заключеніе, во-первыхъ, что мысъ Верхній Шинтуй принадлежитъ къ террасовидному типу и что онъ именно, при взглядѣ на Ольхонъ съ сѣверо-западнаго берега Байкала, напр. съ Онгурёна (см. ниже), кажется окончечностью острова, тогда какъ дѣйствительный конечный мысъ Ольхона, — Хобой или Верхнее изголовье, является разорваннымъ и отчасти башневиднымъ утесомъ, перейдемъ къ свѣдѣніямъ о геогностическихъ условіяхъ описанной части острова. Въ этомъ отношеніи, вслѣдствіе неизмѣнившагося строенія мѣстности, достаточно указать только на стратиграфическую сторону вопроса, главный интересъ которой состоитъ въ томъ, что въ промежуткѣ между мысомъ Нижній Шинтуй и долиною Хагай, береговая линія, благодаря ея направленію, близкому къ меридіональному, пересекаетъ собою границу между складкою, изученною нами по обѣ стороны мыса Уханъ, и другою, примыкающею къ ней съ сѣверо-запада, другими словами, здѣсь проходитъ такъ называемая синклинальная линія, южнѣе которой пласты наклонены къ с.-с.-з., а сѣвернѣе на ю.-ю.-в. Указаніе на такое положеніе слоевъ въ осевой части острова Ольхона мы встрѣтили уже выше, при описаніи экскурсіи Черскаго къ верховьямъ долины Идибѣ; впослѣдствіи мы увидимъ, что та-же складка обнажается и на юго-западномъ берегу острова, со стороны Воротъ, составляя прямое продолженіе синклинали, съ которою мы ознакомились на материковой сторонѣ этого узкаго пролива, въ обнаженіяхъ мыса Ихитѣ. Далѣе, между Хагаемъ и Шара-хапсагайскою бухточкою замѣчаются довольно значительные, но мѣстные изгибы слоевъ, такъ какъ они не переходятъ на противоположный берегъ острова и за ними продолжается опять ю.-ю.-в.-ый наклонъ пластовъ, который только въ Хобойской бухточкѣ переходитъ въ с.-с.-з.-ый, обличая здѣсь, повидимому, остатокъ осевой части складки, начавшейся съ промежутка между Шинтуемъ и Хагаемъ, — вопросъ, къ которому мы возвратимся еще впослѣдствіи, при

возстановленіи складокъ, пересѣкаемыхъ сѣверо-западнымъ берегомъ Малаго моря и его продолженіемъ; теперь-же перейдемъ къ описанію сѣверо-западнаго берега интересующаго насъ острова.

Б) Сѣверо-западный берегъ Ольхона и ближайшіе къ нему острова.

Обогнувъ оконечность мыса Хобой (Верхнее изголовье Ольхона), путешественникъ вступаетъ уже въ воды Малаго моря, омывающаго сѣверо-западный берегъ острова. Здѣсь мы имѣемъ передъ собою собственно сѣверо-восточный конецъ этого пролива, ограничиваемый съ одной стороны мысомъ Хобой, а съ противоположной, виднѣющимся отсюда на с.-з. (вѣрнѣе, почти з.-с.-з.) мысомъ Арулъ, около низовьевъ долины Замы (см. ниже). Разстояніе между этими мысами достигаетъ 15 верстъ, чѣмъ опредѣляется и ширина Малаго моря въ томъ мѣстѣ, гдѣ оно открывается къ Большому; что же касается знакомой намъ уже юго-западной оконечности, извѣстной подъ названіемъ залива Хушилаху, то она располагается отсюда, т. е. отъ мыса Хобой, въ 79 верстахъ, хотя длина Малаго моря, измѣряя по его средней линіи, не превосходитъ 74 верстъ. Видъ столь близкаго (15 верстъ) противоположнаго берега значительно оживляетъ пейзажъ, увеличивая живописность мѣстности, хотя, при взглядѣ съ Хобоя, большая часть Малаго моря недоступна еще зрѣнію потому, что берегъ Ольхона, на протяженіи первыхъ четырехъ верстъ, до мыса Саганъ-хушунъ, направляется почти на з.-ю.-з. (з.-ю.  $30^{\circ}$ ) и этимъ закрываетъ видъ на болѣе отдаленныя части пролива и Ольхона. Береговая линія обрисовываетъ здѣсь двѣ бухтовидныя выемки, изъ которыхъ меньшая, лежащая сейчасъ же за Хобоемъ, называется Мангашъ-утугъ, т. е. русская пристань (*«утугъ»* собственно *пастбище*). На-

званіе это, какъ равно и названіе знакомой намъ уже бухточки на юго-восточномъ берегу острова (Мангасу-нуго), относятся по всей вѣроятности къ весьма отдаленному времени, такъ какъ нынѣ эти пустынные мѣста, удобныя только для пристани малымъ лодкамъ, вовсе не посѣщаются русскими. Мангашу-утугъ окружена брустверовиднымъ, хотя и не высокимъ, скалистымъ склономъ, нерѣдко отвѣснымъ и омываемымъ непосредственно водою. На одномъ изъ такихъ утесовъ, отъ Хобоя на ю.-з. 37°, воспользовавшись тихимъ стояніемъ воды въ озерѣ, Черскій сдѣлалъ *засѣчку высоты стоянія воды въ Байкаль* (24-го іюля 1879 г.) въ видѣ черты, расположенной на 1,16 метра надъ поверхностью озера, считая по отвѣсному направленію. На востокъ отъ мѣста засѣчки, въ разстояніи около 4 сажени, на прибрежьи лежитъ плоская, но громадная глыба роговообманковаго гнейса, распадавшаяся на три части и съ трехъ сторонъ омывавшаяся тогда водою; къ западу отъ мѣста засѣчки, вблизи отъ береговой линіи, выдавался изъ подъ уровня Байкала большой (до 5' въ діаметрѣ) камень, со всѣхъ сторонъ окруженный водою. Мангашу-утугъ отдѣляется отъ слѣдующей за нею, болѣе обширной бухты, Саганъ-хушунской, небольшимъ, утесистымъ же мысомъ, стоящимъ въ связи съ описанною выше горою Хара-ундѣръ (792' надъ Байкаломъ). Саганъ-хушунская бухта имѣетъ видъ такого же скалистаго амфитеатра, какъ Мангашу: это весьма типическій и поучительный результатъ дѣйствія прибою на соотвѣтственно расщепсканія скалы подмываемаго берега острова. Въ особенности интереснымъ въ этомъ отношеніи является мысъ Саганъ-хушунъ, нѣсколько раздвоенный на оконечности; образующій его отрогъ представлялъ прежде пологій склонъ какъ къ соименной бухтѣ, такъ и къ Малому морю, съ весьма ровною поверхностью; въ настоящее же время мысъ этотъ обрѣзывается отвѣсными утесами и узкими вымоями, врѣзавшимися въ его массу на столько глубоко, что со сто-

роны бухты образовались пальцевидные (въ планѣ) выступы, на верху которыхъ сохранились соотвѣтственные части ровной поверхности прежнихъ склоновъ мыса, при чемъ, въ болѣе длинныхъ выступахъ, поверхность эта опускается до 14' надъ уровнемъ озера и только здѣсь обрѣзывается къ нему отвѣсною скалою, тогда какъ въ самыхъ глубокихъ частяхъ выемки, въ промежуткахъ между пальцевидными выступами, уцѣлѣвшая часть ровной поверхности возвышается на 70' и болѣе надъ Байкаломъ. Названіе мыса (*сагдн* означаетъ бѣлый *хушунъ*—мысъ) произошло отъ его бѣлизны, такъ какъ здѣсь въ первый разъ выступаетъ пластъ кристаллическаго известняка, тогда какъ склонъ берега отъ Хобоя, образуется роговообманковымъ гнейсомъ, мѣстами содержащимъ въ составѣ значительный процентъ зернышекъ известковаго шпата, а также не малую примѣсь вениссы. Пласты отличаются крутымъ наклономъ на ю.-ю.-в.

За Сагдн-хушунѣмъ берегъ поворачиваетъ болѣе къ ю.-з. и образуетъ длинную (около 20 верстъ) и сложную бухту, ограничиваемую съ юго-запада Будунскимъ мысомъ (см. ниже). Соотвѣтственнымъ числомъ мысовъ бухта эта подраздѣляется еще на слѣдующія части: Уланъ-иргѣнскую, до 4 верстъ длины; Уланъ-байсанскую, около 8-ми; Нюргднскую до 7-ми и Будунскую, около 1½ верстъ длины, считая по хордѣ этихъ бухтовидныхъ выемокъ. Высота крутаго и скалистаго склона, окружающаго большую часть этихъ бухтъ достигаетъ 70' и болѣе, и обнажаетъ перемежаемость многихъ известковыхъ пропластковъ съ знакомыми намъ уже полевошпатовыми породами. Эти послѣднія подвергаются здѣсь нерѣдко каолинизациі и вообще химическому разложенію въ такой значительной степени, что почти совершенно превращаются въ рыхлые продукты разрушенія (Уланъ-иргѣ, Уланъ-байсанъ) какъ бѣлаго, такъ и ярко-краснаго цвѣта (*улднз*—красный), отъ котораго произошли и названія двухъ первыхъ мысовъ. Преобладающій наклонъ пластовъ на ю.-ю.-в. На-



чиная съ окрестностей Уланъ-байсана и въ Нюргонской бухтѣ, къ береговому склону примыкаетъ слоистое песчаное отложеніе, достигающее мѣстами довольно значительной толщины, залегающае иногда на высотѣ 70' надъ современнымъ уровнемъ Байкала; не подлежитъ сомнѣнію, что мы имѣемъ здѣсь дѣло съ остатками того-же озернаго отложенія, съ которымъ мы встрѣчались уже неоднократно и на гораздо болѣе значительныхъ высотахъ (см. выше).

Около мыса Уланъ-байсанъ открывается долина, верховья которой лежатъ на сѣверо-западномъ склонѣ Ижимы; съ западнаго же склона послѣдняго направляется другая, Шыхыргун-елгай, устье которой располагается въ Нюргонской бухтѣ, на восточной сторонѣ соименнаго мыса, именуемаго бурятами Нюргонъ. Мысъ этотъ принадлежитъ къ болѣе рѣзко обособленнымъ и вдающимся болѣе въ озеро, нежели Уланъ-иргъ и Уланъ-байсанъ. Образующій его отрогъ полого и постепенно понижается къ узкой и усѣченной оконечности въ нѣсколько сажень высоты; за этою оконечностью лежитъ маленькая, но болѣе глубоко врѣзавшаяся въ берегъ, Будунская бухта. Долина, открывающаяся въ послѣднюю, беретъ начало вблизи отъ верховьевъ Уланъ-нурской, по которой Черскій восходилъ на гребень горъ юго-восточнаго берега острова (см. выше). Нѣсколько болѣе высокій, тоже усѣченный, но болѣе широкій Будунскій мысъ ограничиваетъ бухточку съ западной стороны. Строеніе обоихъ мысовъ такое же какъ и вышеупомянутыхъ, и нѣкоторыя части слагающихъ ихъ породъ подверглись такому же разрушенію; наклонъ пластовъ къ с.-с.-з.

Слѣдующая за тѣмъ бухта Харанса достигаетъ около 5 верстъ въ длину и врѣзывается почти на 1 версту въ побережье; съ юго-запада она ограничивается соименнымъ мысомъ, а другимъ, котораго Черскій называетъ Среднимъ, раздѣляется на двѣ, почти равныя части. Послѣдній располагается на ю.-з. 33° отъ Будунскаго, принадле-

жить къ типу террасовидныхъ и достигаетъ около 80 саженой длины, и около 40' высоты, причемъ оконечность его значительно расширяется, сравнительно съ перешейкомъ, связывающимъ его съ Ольхономъ. Небезъинтереснымъ является то обстоятельство, что перешеекъ этотъ, въ противоположность оконечности, состоитъ изъ породы, подвергшейся каолинизации и превращенію въ довольно рыхлый детритусъ, вслѣдствіе постоянного смыванія и осыпыванія котораго, перешеекъ имѣетъ нынѣ видъ гребня, сѣуженнаго до 3—4-хъ футовъ, хотя высота его до сихъ поръ еще ничѣмъ не отличается отъ высоты скалистой оконечности мыса. Очевидно, однако, что, при продолжающемся смываніи разрыхленнаго матеріала, въ перешейкѣ этомъ должна современемъ образоваться сѣдловина, отъ постепеннаго углубленія которой мысъ приметъ сначала острововидную наружность, а впоследствии можетъ превратиться и въ островъ, если тому не помѣшаетъ пониженіе уровня Байкала (см. ниже). Около этого мыса расположены два островка: одинъ почти въ одной верстѣ на с.-в. 10°, а другой къ западу, гораздо ближе. Первый извѣстенъ подъ названіемъ Я д о р ѣ. Длинною осью, достигающею около 60 саженой, онъ вытягивается на в.-ю.-в.; высота его не превосходитъ, повидимому, 35 футовъ, причемъ онъ террасовидно понижается въ направленіи длины (в.-ю.-в.), а нижній его уступъ (третій) продолжается еще и въ видѣ подводной гряды. Островъ состоитъ изъ бѣлаго, мелко-зернистаго гранита, нѣсколько порфириднаго отъ зеренъ темно-сѣраго кварца отъ средней до крупной величины; слюда почти совершенно исчезаетъ. Такая порода, въ связи съ гнейсомъ, попадаетъ нерѣдко среди пластовъ, перемежающихся съ известнякомъ; гранито-гнейсъ, залегающій на известнякѣ, образуетъ собою и оконечность только-что описаннаго мыса, способнаго, какъ мы уже говорили, превратиться современемъ въ островъ. Весьма возможно поэтому, что упомянутый процессъ разрушенія могъ облегчить и отдѣленіе

описываемых островков отъ Ольхона, хотя понятно, что явленіе это достигается, всего чаще, даже обыкновенно, силою одного лишь прибоа волнъ, дѣйствующаго на болѣе или менѣе растресканную породу, благодаря присущей ей отдѣльности. Другой, болѣе близкій островокъ называется Модотѣ (т. е. лѣсистый), отъ бурятскаго слова *модонз*, что означаетъ лѣсъ. Онъ состоитъ изъ крупнокристаллическаго известняка съ блестками графита, вытянуть вообще на сѣверо-востокъ, куда онъ и понижается; наибольшая высота его не превышаетъ 11 футовъ, а на поверхности его до сихъ поръ сохранилось еще нѣсколько древесныхъ стволовъ, стоящихъ на корняхъ, хотя и вполне уже засохшихъ. Оба острова, какъ и другіе, о которыхъ будетъ упомянуто ниже, обитаемы безчисленнымъ множествомъ баклановъ и чаекъ. Пометь этихъ птицъ, по свидѣтельству Обручева <sup>1)</sup>, толстымъ слоемъ покрываетъ скалы, а береговые обрывы отъ него выбѣлены какъ отъ извести. Слѣдующая часть бухты (за Среднимъ мысомъ) окружена склономъ, поросшимъ травой, изъ подъ которой замѣчаются мѣстами выходы породъ, подвергшихся знакомому намъ уже разрушенію въ глину и дресву; открывающаяся здѣсь сухая долина беретъ начало на склонѣ осеваго хребта Ольхона, въ промежуткѣ между долинами Бүдэ и Уланъ-нүрѣ. Мысъ, ограничивающій бухту съ юго-запада, носить названіе Харансá или Харансѣнъ-оёръ; онъ имѣетъ видъ довольно длинной оконечности отрога съ почти прямолинейнымъ и горизонтальнымъ контуромъ гребня; оконечность эта, возвышаясь до 40' надъ озеромъ, опускается къ нему отвѣсною скалою, въ которой слои полевошпатовыхъ породъ падаютъ на с.-с.-з. Къ западу отъ оконечности мыса, въ разстояніи не болѣе 40 сажень, располагается островъ Харансá, до 130 сажень длины и ширины и до 40' высоты, усѣченный со стороны Малага

---

<sup>1)</sup> Обручевъ, Горн. Журн. I. с. pag. 445.

моря также, какъ и описанный мысъ, отъ котораго онъ отдѣляется очень мелкимъ проливомъ. Островъ состоитъ изъ бѣлаго гранито-гнейса и роговообманковаго гнейса, пласты котораго падаютъ на с.-с.-з., и сообразно съ линіей простирания (в.-с.-в.), онъ располагается на юго-западномъ продолженіи пласта, входящаго въ составъ знакомаго намъ уже островка Ядоръ, видимаго отсюда на в.-с. 30°. До мыса Харанса доѣзжалъ въ 1855 г. и Раде, переплывшій отсюда на противоположный (материковый) берегъ Малаго моря. О проливѣ, отдѣляющемъ описанный нами островокъ отъ сонненнаго мыса, онъ говоритъ, что глубина его (2-го іюля) достигала 1½ аршинъ; въ бытность Черскаго (24 года спустя, т. е. 27 іюля 1879 г.) глубина была, повидимому, значительно меньшею, а проводникъ, Ольхонскій бурятъ, говорилъ, что веснами проливъ этотъ почти совершенно высыхаетъ, причемъ онъ сообщалъ еще, что мѣстные жители пришли къ убѣжденію, что уровень Байкала вообще понижается и старикамъ извѣстны, между прочимъ, даже камни, которые прежде совершенно омывались водою, тогда какъ въ настоящее время они покоятся уже на прибрежьи. Для подробной провѣрки и должной оцѣнки такихъ свѣдѣній, понятно, потребовалось бы не мало времени а также и розысканія лицъ, знакомыхъ съ мѣстомъ нахожденія этихъ камней; поэтому Черскій не могъ задаваться такимъ вопросомъ, въ особенности потому, что, какъ мы увидимъ ниже, на юго-восточномъ берегу Байкала онъ находилъ не мало достаточно наглядныхъ данныхъ, говорящихъ въ пользу высказываемаго олхонскими бурятами мнѣнія; что-же касается значительно болѣе высокаго уровня, занимавшагося водами Байкала въ доисторическое время, то въ этомъ мы имѣли случай убѣждаться неоднократно и при описаніи самого Ольхона, не говоря уже о явленіяхъ, съ которыми мы ознакомились въ остальной части описываемаго берега озера и о его юго-западныхъ окрестностяхъ.

Бухту, лежащую къ западу отъ мыса Харанса, Радде описываетъ какъ песчаную, въ которой крупно-зернистый песокъ не только покрываетъ побережье, но вмѣстѣ съ тѣмъ далеко вдается въ страну, гдѣ почва возвышается и принимаетъ затѣмъ луговой характеръ, искусственно поддерживаемый и усиливаемый бурятами, собирающими здѣсь сѣно. Радде находилъ тамъ въ изобиліи *Thalictrum simplex*, *Pedicularis*, *Poa*, *Gentiana* и *Primula*. Нѣсколько далѣе, внутри острова, располагается бурятскій улусъ Харансінъ (у Радде неправильно: Карансикъ), состоящій изъ 17 юртъ, въ числѣ которыхъ находится и домъ старшины, построенный по типу русскихъ избъ. Версты съ три сѣвернѣе находится и другой улусъ, Харюльдѣй съ 10-ю юртами. Въ первомъ изъ названныхъ улусовъ Радде нанялъ лошадей и проводниковъ для экскурсіи на противоположный берегъ Ольхона, совершенной имъ на слѣдующій день. Въ 4 часа утра они направились черезъ улусъ, поднимаясь затѣмъ версты съ двѣ по безлѣсной возвышенности. Вскорѣ появились отдѣльныя, но очень высокія сосны, сплотившіяся впослѣдствіи въ лѣсъ, къ которому подмѣшалась и лиственница. Пересѣкая этотъ лѣсъ, путешественники придерживались узкой, черной, мѣстами-же и глинистой бороздки, образовавшейся вслѣдствіе того, что буряты провозятъ по этому мѣсту бревна, волоча ихъ свободнымъ концомъ по землѣ. Вскорѣ, однако, исчезли всякіе слѣды дороги, а въ видѣ подлѣска появились береза, ольха и *Rhododendron dahuricum*, а изрѣдка и особенный видъ *Salix*. Здѣсь-же произрастали: *Vaccinium* *Vitis-idaea* и *Vacc. uliginosum*, *Rubus saxatilis* и *Ryola*, какъ равно и различные мхи. Постепенно поднимаясь, путешественники достигли наконецъ гребня первой цѣпи горъ, отроги котораго опускались къ глубокой и густо поросшей лѣсомъ котловинообразной впадинѣ. Съ этой высоты открывался великолѣпный видъ на западную часть Ольхона, Малое море и противоположный берегъ послѣдняго. Спускъ съ гребня велъ сначала по густому

березняку, послѣ чего путешественники придерживались оврага, посредствомъ котораго весеннія воды отводятся къ восточному берегу (т. е. юго-восточному) острова. Въ нижней части этой долинки Радде встрѣтилъ весьма мощную растительность. По ней, собирая какъ зоологическія (*Emberiza pithyorus*, *Lepturidae*), такъ и ботаническія коллекціи, Радде спустился къ юго-восточному берегу Ольхона, избѣжавъ, очевидно, перевала черезъ вторую, главную цѣпь горъ, пересекаемую здѣсь этою долиною, въ которой онъ не нашелъ никакого ключа. Насколько можно было видѣть съ мѣста наблюденія, берегъ этотъ образовывался вездѣ крутымъ склономъ высокихъ горъ, мѣстами поросшихъ лѣсомъ до самаго ихъ основанія, мѣстами же уступовидно обнаженныхъ и обрушенныхъ. На мѣстѣ отдыха онъ видѣлъ много тюленей, плававшихъ по Байкалу, показывая время отъ времени голову и спину; нѣкоторые изъ нихъ согрѣвались на солнцѣ, лежа на плоскихъ камняхъ около берега. Безпечность эта объясняется тѣмъ обстоятельствомъ, что берегъ этотъ необитаемъ и не посѣщается судами, плавающими по озеру. Черскому, однако, не удалось здѣсь видѣть ни одного тюленя; даже на протяженіи всей описанной части берега Байкала онъ только разъ видѣлъ это животное недалеко отъ устья Большой Бугульдейки. Тамъ, гдѣ берегъ сопровождался небольшою террасою, Радде видѣлъ растущими *Scabiosa*, *Statice* и *Astragalus*; ему удалось убить здѣсь даже забайкальское видоизмѣненіе куропатки (*Perdix cinerea* var. *rupestris*, *dahurica*). Въ 3½ часа пополудни онъ пустился въ обратный путь; въ 6 часовъ достигъ описаннаго выше гребня, а къ 8-ми былъ уже около своей лодки. Къ сожалѣнію, по описанному маршруту нельзя съ точностью опредѣлить мѣста юго-восточнаго берега острова, на которое вышелъ Радде, такъ какъ онъ не передаетъ названія приведшей его туда долины. Черскій считаетъ вѣроятнымъ, что путешественникъ этотъ достигъ Байкала гдѣ либо въ сѣверо-восточныхъ окрест-

ностахъ долинокъ Бүдэ, между ними и Уланъ-нүромъ, судя какъ по описаннымъ особенностямъ склона горъ, такъ и по времени, употребленному на экскурсію.

Отъ мыса Харансѣ берегъ Ольхона принимаетъ, въ общемъ, направленіе болѣе близкое къ западному, чѣмъ обуславливается и дугообразный изгибъ береговой линіи острова, съ вогнутостью, обращенною къ Малому морю. Лежащая за этимъ мысомъ плоская бухта ограничивается съ запада упоминавшимся уже выше Пещернымъ мысомъ и достигаетъ около 7 верстъ въ длину, причемъ небольшимъ мысовиднымъ выступомъ береговой линіи подраздѣляется еще на двѣ части, изъ которыхъ восточная, ближайшая къ Харансѣ носитъ названіе Булукъ, а западная Одонимъ. Первая изъ нихъ болѣе скалистая, съ долиною Булукъ, открывающеюся около соименнаго мыса, въ началѣ котораго наблюдаются гнейсы, съ паденіемъ на с.-з. подъ угломъ  $30^{\circ}$  <sup>1)</sup>, вторая же, т. е. Одонимъ, песчаная, съ такою же долиною, въ верхней части которой, по сообщенію бурятъ, протекаетъ постоянный ключъ того же имени. Верховья Одонимъ должны располагаться въ главномъ хребтѣ Ольхона, въ которомъ, въ этомъ направленіи, замѣчается плоская, но довольно глубокая сѣдловина. Песокъ, покрывающій склонъ бухты Одонимъ, какъ это видно со стороны мыса Булукъ, поднимается вглубь острова въ видѣ террасъ; на нисшей изъ нихъ aneroidъ показалъ 106, на средней 157, а на высшей 269' надъ уровнемъ Байкала. Терраса эта значительно превышаетъ собою горизонтъ, до котораго достигаютъ даже высшія точки всѣхъ мысовъ этого берега острова, не достигающихъ даже высоты нисшаго уступа; то же относится и къ Пещерному мысу, ограничивающему бухту Одонимъ съ юго-запада. Мысъ этотъ, благодаря низкому перешейку, отдѣляющему его отъ Ольхона, принадлежитъ къ

---

<sup>1)</sup> Обручевъ, Горн. Журн. 1. с. pag. 448.

острововидному типу, отличающагося отъ другихъ подобныхъ тѣмъ, что скалистая его оконечность снабжена двумя, рѣзко выдѣляющимися вершинами, изъ которыхъ сѣверная выше южной. Оконечность эта образуется кристаллическимъ известнякомъ съ блестками графита; перешеекъ покрытъ наносомъ и переходитъ въ луговое, травянистое побережье слѣдующей за тѣмъ бухты, тогда какъ остальная часть мыса обнажаетъ гранитовидную породу, перемежающуюся съ роговообманковымъ гнейсомъ (изобилующимъ зернышками пироксена-байкалита и известнякомъ). Острововидная часть мыса, достигающая всего лишь нѣсколько сажень ширины, прободается столь же короткою пещерою, входъ въ которую располагается на западной сторонѣ скалы, а узкій и трудно доступный выходъ на восточной. Дно ея покрывается вообще тонкимъ слоемъ наноса, который Черскій считаетъ происшедшимъ отъ дѣйствія періодическихъ водъ; въ немъ онъ находилъ кости зайца и изюбри, способъ сохраненія которыхъ указываетъ на сравнительно неотдаленное время ихъ погребенія (такъ называемаго современнаго періода). Въ известковой стѣнѣ пещеры, въ одномъ мѣстѣ, замѣчено гнѣздовидное образованіе или выклинивающійся прослойкъ, состоящій изъ такъ называемаго желѣзнаго оолита (желѣзный икряный камень). Пещеру эту, открывающуюся почти на половинѣ высоты утеса, мѣстные жители считаютъ однако неимоверно длинною; въ ней именно, по ихъ мнѣнію, обитаетъ упомянутое уже выше божество Угутѣ-нойнъ съ супругою Угутѣ-хатанъ, заставившее монголовъ переселиться за Байкалъ (см. выше). Повторяя ту-же церемонію, какъ и около Ижимя, проводникъ Черскаго покинулъ лодку еще въ бухтѣ Булукъ, чтобы обойти Пещерный мысъ какъ можно подальше и присоединился къ путешественнику только на слѣдующій день въ бухтѣ Хужиртуй (см. ниже). На перешейкѣ Пещернаго мыса Черскій видѣлъ теленка, пасшагося на луговой зелени побережья; это былъ бѣглець изъ Хужирскаго улуса, за которымъ даже гнались



его хозяева; преслѣдованіе упрямаго теленка прекратили однако, какъ только бѣглець вступилъ на священно-нейтральную почву окрестностей Пещернаго мыса, гдѣ и оставался нѣсколько сутокъ, пользуясь неограниченною свободою и сочною травою этой мѣстности. Разспрашивая о судьбѣ теленка, хозяева его выразили сожалѣніе, что имъ не удалось заранѣе попросить русскихъ гребцовъ Черскаго выгнать бѣглеца за предѣлы этой, недоступной для нихъ въ то время, мѣстности.

Только-что упомянутая Хужиртуйская бухта располагается сейчасъ же за Пещернымъ мысомъ; она достигаетъ немногимъ болѣе трехъ верстъ въ длину къ юго-западу, считая до мыса Хужиртуй, но на ю.-ю.-з. отъ Пещернаго мыса, въ бухтѣ этой находится мысовидный выступъ, которымъ она раздѣляется на двѣ части: сѣверо-восточную, скалистую и юго-западную, песчаную. Въ эту послѣднюю открываются двѣ долины, изъ которыхъ западная болѣе широкая, носитъ названіе Хужиртуй. Застигнутый сильнымъ волненіемъ (29 іюля), Черскій сдѣлалъ нѣсколько экскурсій какъ по высотамъ, окружающимъ эту долину, такъ и къ западу отъ нея на протяженіи около 8-ми верстъ до системы долинъ, впадающихъ въ бухту Елгай (см. ниже). Лѣто 1879 года вообще было очень бурное, а со второй половины іюля бури принимали уже какъ-бы осенній характеръ; въ окрестностяхъ Пещернаго мыса (28-го іюля) разразился сильный с.-з. вѣтеръ, смѣнившійся на слѣдующій день столь же жестокимъ с.-в.; 30-го іюля с.-в. сталъ переходить въ ю.-з., дувшій весь день 31-го, тогда какъ 1-го августа вторично наступилъ штормъ съ с.-з., самый сильный изъ господствующихъ на Байкалѣ вѣтровъ, извѣстный подъ мѣстнымъ названіемъ *горной погоды* (*хдйта-хальтинз* или *баруны-хдйта-хальтинз* у бурятъ, т. е. сѣверный или сѣверо-западный вѣтеръ).

Съ осмотрѣнныхъ здѣсь Черскимъ высотъ видно, во-пер-

ныхъ, что долина Хужиртуй беретъ начало на склонѣ главнаго хребта острова и верховья ея должны располагаться гдѣ либо въ дальнемъ разстояніи какъ отъ Барунъ-бүдэ, такъ и отъ Хатхѣ, съ которыми мы ознакомились уже выше (см. юго-восточный берегъ острова); въ нѣсколькихъ же верстахъ отъ устья она пересѣкаетъ собою продольную долину, слѣдующую съ в.-с.-в., со стороны окрестностей средней части долины Одѣнимъ. Во-вторыхъ, оказывается, что мѣстность къ западу отъ Хужиртуй является значительно расчлененною, такъ-что на протяженіи 8-ми верстъ Черскій видѣлъ четыре поперечныя долины, если не считать еще двѣ, очень короткія. Изъ нихъ ближайшая къ Хужиртуй, называется Сэргытѣ; она имѣетъ связь съ тою же продольною долиною, что и Хужиртуй, даже юго-западную, котловинообразную оконечность этой долины можно считать верховьемъ Сэргытѣ; между послѣднею и Хужиртуемъ, въ предѣлахъ ихъ низовьевъ, имѣется еще нѣсколько короткихъ, соединительныхъ ложбинъ. Устье Сэргытѣ располагается въ небольшой соименной бухтѣ, сосѣдней съ Хужиртуйскою. Слѣдующая долина болѣе короткая и безымянная; за нею слѣдуетъ долинка Хунгы и еще небольшой оврагъ, за которымъ располагается уже бухта Елгай (см. ниже). Отроги, отдѣляющіе эти долины, повышаются по направленію къ западу, а также и къ югу; ближайшія къ озеру ихъ вершины достигаютъ на лѣвомъ берегу Хужиртуя 126', западнѣе Сэргытѣ—168 и 210' и ближе къ Елгаю, за Хунгы,—378' надъ озеромъ, тогда какъ высшая изъ вершинъ между Хужиртуемъ и Сэргытѣ, около продольной долины, возвышается на 1045' надъ Байкаломъ. Наконецъ, съ осмотрѣнныхъ высотъ весьма хорошо видно, что, начиная съ Хужиртуя, высота сѣверо-западной части Ольхона увеличивается по направленію къ юго-западу, т. е. къ Воротамъ, почти такъ-же, какъ высота юго-восточной полосы острова возрастаетъ по мѣрѣ удаленія къ сѣверо-востоку, т. е. къ Ижимю; вмѣстѣ съ тѣмъ, къ западу отъ долины Одѣнимъ,

опять появляется и продольное расчленение горъ, вершины которыхъ приобрѣтають ломанные контуры и при безлѣсности ихъ еще болѣе напоминають альпійскія мѣстности. Въ строеніи осматрѣнной части горъ наблюдались всѣ тѣ же породы съ наклономъ пластовъ на с.-с.-з.; онѣ же образуютъ собою и крутой скалистый склонъ берега. Этотъ послѣдній, на протяженіи до Елгя, почти вездѣ оmyвается непосредственно водою, достигая сначала до 70', а далѣе, около Хунгъ и 140' высоты, а въ предѣлахъ устья названныхъ долинъ представляетъ плоскія бухтовидныя выемки, изъ которыхъ самая значительная—Сэргытъ. Слѣдующая за описанною частью берега бухта Елга ѣ, при небольшой ширинѣ, принадлежитъ къ бухтамъ, всего глубже врѣзаннымъ въ побережье этого берега Ольхона. Она имѣетъ видъ котловинообразнаго верховья альпійской долины, исчезающей подъ уровнемъ Малаго моря, причемъ вначалѣ она направляется почти съ запада на востокъ, а затѣмъ поворачивается къ сѣверу. Долина бухты окружена горами, съ болѣе или менѣе заостренными вершинами, и въ ней открываются еще до пяти второстепенныхъ долинокъ, изъ которыхъ, считая съ востока, первая носитъ названіе Тагá ѣ, вторая, занятая небольшимъ, но постояннымъ ключикомъ Хунхó ѣ, а третья Елга ѣ. При длинѣ всей долины бухты около 1½—2 версты, ширина ея немногимъ превышаетъ 300 сажень. Въ настоящее время не вся длина долины занята водою, западный конецъ бухты отдѣлился даже въ особое, совершенно замкнутое озеро, повидимому болѣе 200 сажень длины, очертаніе котораго напоминаетъ собою форму полусапожка съ носкомъ, обращеннымъ къ юго-востоку, а подошвою къ юго-западу. Озеро это отдѣляется отъ конца бухты полоскою наноснаго матеріала, поросшаго отчасти травой; самая узкая часть этой песчаной полосы, около юго-восточной оконечности озера, равняется, по измѣренію метрическою лентою, 67½ сажнямъ, тогда какъ длина ея съ юга на сѣверъ равна

290 саженьмъ (измѣряя шагами). Западный мысъ, вокругъ котораго бухта Елгай поворачиваетъ къ сѣверу, достигаетъ 230' наибольшей высоты и усѣченъ почти въ меридіональномъ направленіи, вслѣдствіе чего въ немъ различаются южная и сѣверная оконечности, къ которымъ отрогъ этотъ замѣтно понижается. Первая изъ названныхъ оконечностей представляетъ собою значительно суженный, острововидный мысъ до 7—8' высоты, обращенный къ бухтѣ, т. е. къ юго-востоку, тогда какъ второй, со стороны Малаго моря, гораздо болѣе высокій, принадлежитъ къ типу, переходному отъ террасовиднаго къ горообразному, съ круто усѣченною оконечностью, скалы которой значительно подмываются волнами. Наклонъ пластовъ преобладающихъ въ этомъ мысѣ полевошпатовыхъ породъ образуетъ здѣсь сипклинальный перегибъ, такъ какъ со стороны Малаго моря слои падаютъ на ю.-ю.-в., а южнѣе, т. е. со стороны западной части бухты и ея озера, на с.-с.-з.

Отъ Елгайской бухты берегъ Ольхона направляется нѣсколько на з.-с.-з., на протяженіи около 7 верстъ, до такъ называемаго Шибѣтскаго мыса (см. ниже), причемъ онъ не представляетъ здѣсь никакихъ долинъ, такъ какъ эта часть берега образуется уже продольнымъ отрогомъ. Изъ незначительной бухтовидной выемки, находящейся вблизи Шибѣтскаго мыса, Черскій посѣтилъ островъ Зумугдѣй (или Зомугдѣй), лежащій въ разстояніи около 3-хъ верстъ къ сѣверу отсюда. Скалистый и безлѣсный островъ этотъ вытягивается почти съ запада на востокъ (в.-ю.15°), достигаетъ съ версту въ длину и до 296' наибольшей высоты. Продольный гребень его возвышается всего болѣе почти на половинѣ длины острова, образуя почти крышевидную въ профилѣ вершину, отъ которой онъ понижается всего постепеннѣе къ западной оконечности, тогда какъ восточная является террасовидною. Склоны острова круто опускаются къ подмывающей ихъ водѣ; въ восточной его части замѣчаются двѣ долины, слѣдующія

на востокъ и сѣверо-востокъ въ видѣ уцѣлѣвшихъ отъ размыва верховьевъ древнихъ и исчезнувшихъ нынѣ ложбинъ, между тѣмъ какъ узкая долина, пересекающая западную оконечность, направляется съ юга на сѣверъ. Около той же оконечности, съ юго-западной стороны, находится бухтовидная выемка съ наноснымъ побережьемъ, съ западной стороны которой выдается гряда камней, въ видѣ дугообразнаго бора, соединеннаго съ прилежащею оконечностью острова. Въ строеніи Зумугоя участвуютъ только полевошпатовыя породы (гнейсъ, переходящій въ гранито-сіенитъ и діоритъ), съ паденіемъ пластовъ на ю.-ю.-в. По свидѣтельству Обручева Зумугой, какъ и Угунгой, представляютъ хорошія пастбища и сѣнокосы. Бураты, живущіе по близости, пользуются сѣнокосомъ и переправляютъ туда своихъ лошадей, которыя пасутся тамъ до замерзанія озера. Начинаясь волненіе съ с.-з. заставило Черскаго поспѣшить обратно къ Ольхону, гдѣ ему удалось пристать благополучно къ южному берегу Шибѣтской бухты. Экскурсія по высотамъ, окружающимъ эту бухту, показываетъ, что она располагается на юго-западномъ продолженіи долины, слѣдующей въ общемъ параллельно описанному уже берегу Малаго моря, со стороны окрестностей бухты Елгай, отъ которой верховья этой долины отдѣляются довольно низкимъ переваломъ. Шибѣтская бухта открывается и удлиняется поэтому къ юго-западу, являясь, такъ сказать, продольною бухтою; Шибѣтскій мысъ, достигая мѣстами болѣе 200' высоты, удлиняется въ томъ же направленіи, ограничивая бухту съ сѣверо-запада, причемъ, на его мысленномъ продолженіи, хотя и въ разстояніи болѣе 3-хъ верстъ къ юго-западу, располагается длинный островъ Угунгой, съ которымъ мы ознакомимся ниже. На песчаномъ побережьи, въ глубинѣ бухты, виднѣется бурятскій улусъ Шибѣтуй, около котораго, какъ узнать впоследствии Черскій, должна располагаться древняя Монгольская стѣна, такая-же, какъ на материковомъ Хоргоѣ

(см. выше) и на ольхонскомъ Харгоѣ, съ которымъ мы ознакомимся ниже; отъ этой стѣны (шибѣ) произошло и названіе какъ бухты, такъ и ея мыса.

Являясь непосредственнымъ продолженіемъ юго-восточнаго склона горъ Шибѣтской бухты, берегъ Ольхона направляется далѣе, образуя на протяженіи четырехъ верстъ три довольно глубокия, бухтовидныя выемки, расположенныя на устьяхъ столькихъ же поперечныхъ долинъ. Первая изъ нихъ, считая отъ Шибѣтской, называется Тѣдактѣ; она ограничивается съ запада весьма типическимъ острововиднымъ мысомъ того же имени, по очертанію совершенно схожимъ съ знакомымъ намъ уже Юбуханомъ въ Ольхонскихъ воротахъ. Слѣдующая за нимъ такая же бухточка именуется Доло-наргунъ, т. е. семисосенная (*доло*—семь, *наргунъ*—сосна), названная такъ отъ семи сосенъ, растущихъ въ долинѣ, гдѣ располагается и бурятскій улусъ того же имени (у Радде неправильно: Голомургунъ). Къ этой-же бухтѣ (28-го іюля) приставалъ и Радде, спасаясь отъ застигнувшаго его, сильнаго с.-з. вѣтра. По словамъ путешественника улусъ этотъ состоитъ изъ 20 юртъ, въ которыхъ обитало 100 человѣкъ; Черскій замѣчаетъ, что улусъ этотъ считается главнымъ на Ольхонѣ, и въ немъ сосредоточены бурятскія власти, подчиненныя, впрочемъ, описанной выше Думѣ, лежащей на материкѣ; съ этой точки зрѣнія объясняется и выраженіе Радде, согласно которому Доло-наргунъ имѣетъ 300 душъ жителей, изъ которыхъ въ немъ проживаетъ теперь только 100; остальные же живутъ разсѣянными по окрестностямъ, т. е. въ другихъ улусахъ острова. На скалистыхъ обрывахъ, возвышающихся отъ 80 до 100', Радде видѣлъ много чаекъ (*Larus cachinans*) и пару соколовъ (*Falco aesalon*); вечеромъ въ бухту приходило 15 бурятъ для рыболовства; первая тонь дала имъ впрочемъ только 150 штукъ небольшихъ омулей. Радде останавливался еще въ одномъ мѣстѣ, въ промежуткѣ между Доло-наргуномъ и бухтою Ха-

ранса, откуда имъ сдѣлано описанная выше экскурсія къ противоположному берегу Ольхона, но пунктъ этотъ не можетъ быть опредѣленнымъ съ точностью, такъ какъ въ дневникѣ Радде не приводится названія мѣстности, и, хотя, судя по означеннымъ разстояніямъ, онъ долженъ располагаться на половинѣ пути между названными крайними точками, слѣдовательно, почти съ точностью на меридіанѣ бухты Елгай, недоразумѣніе не исчезаетъ все-таки потому, что здѣсь не имѣется бухтъ, въ сѣверо-западномъ углу которыхъ располагались бы бурятскіе улусы. Во всякомъ случаѣ, Радде собиралъ здѣсь, на песчаномъ побережьи, представителей родовъ *Astragalus* и *Cerastium* а далѣе, на болѣе влажныхъ мѣстахъ цвѣла *Gentiana*; въ то время нѣкоторые представители древесной растительности достигали здѣсь до самаго берега, гдѣ Радде говоритъ о нѣсколькихъ одинокихъ, впрочемъ, березахъ; далѣе произрастали лиственница и сосна; съ тѣхъ поръ, должно быть, деревья эти успѣли уже уничтожиться, такъ какъ Черскій нигдѣ не упоминаетъ о нихъ на сѣверо-западномъ берегу острова. Улусъ этотъ окруженъ холмами, въ которыхъ наблюдается простираніе пластовъ на с.-в.  $5\frac{1}{2}$  h, а паденіе на ю.-в. подъ угломъ  $80-90^\circ$ . Эти цифры, полученные Обручевымъ <sup>1)</sup>, нѣсколько отличаются отъ цифръ, приводимыхъ Черскимъ, именно простираніе разнится на  $15^\circ$ .

Какъ въ Тодактѣ, называемой иногда Ходактѣ, такъ и въ Доло-наргунской долині, находится по одному, постоянному ключику того-же названія; вверхъ по послѣдней озерный песокъ поднимается высоко на склоны горъ. Вслѣдъ за террасовиднымъ мысомъ Доло-наргуна располагается еще непосѣщенная Черскимъ, небольшая бухточка Ахшхуръ, такой-же наружности; вообще объ этихъ трехъ бухтахъ, какъ равно и о Шибѣтской и Елгайской (см. выше), Черскій говоритъ, что онѣ производятъ на путешественника впе-

<sup>1)</sup> Обручевъ, Горн. Журн. I. с. pag. 448.

чатлѣніе котловинообразныхъ верховьевъ долинъ, прежнее протяженіе которыхъ покрыто нынѣ водами Малаго моря. Тодакѣ тѣ, Доло-наргунъ и Ахшхуръ, съ указанной точки зрѣнія, являются какъ бы лѣвыми притоками бывшаго здѣсь продолженія Шибѣтской продольной ложбины, выпадающими насупротивъ того мѣста, гдѣ эта, затопленная нынѣ долина потеряла даже значительную часть своего праваго берега, вслѣдствіе чего образовалась длинная брешь, отдѣляющая нынѣ оконечность Шибѣтскаго мыса отъ острова Угунгой, съ которымъ мысъ этотъ могъ соединяться въ прежнее время. — Восточный конецъ названнаго острова лежитъ почти на меридіанѣ Ахшхура; отсюда островъ вытягивается на з.-ю.-з., параллельно берегу Ольхона и въ разстояніи немногимъ болѣе одной версты. Длина его, измѣренная Черскимъ шагами, по средней линіи, нѣсколько менѣе трехъ верстъ, тогда какъ ширина, едва лишь достигаетъ  $\frac{1}{2}$  версты, къ тому же она измѣнчива, такъ какъ островъ представляетъ четыре расширения, разобщенныя соотвѣтственнымъ числомъ суженій, благодаря бухтовиднымъ выемкамъ и извилинамъ его береговой линіи. Ближайшій осмотръ острова показалъ, что его восточная оконечность, отвѣсная, даже настолько нависшая и обрушивающаяся, возвышается на 108' надъ озеромъ; отсюда, до высшаго пункта, на протяженіи 648 сажень, гребень направляется на з.-ю.-з., являясь почти террасовиднымъ вслѣдствіе незначительнаго колебанія въ высотѣ. Высшій пунктъ представляетъ собою довольно тупую вершину, достигающую 303' высоты; отъ нея, на протяженіи 441 сажени, средняя линія острова поворачиваетъ на з.-ю.  $30^{\circ}$  и представляетъ двѣ такія-же вершины: одну въ 238, а другую въ 273' высоты, около которой островъ достигаетъ самой значительной ширины; далѣе, на протяженіи 222 сажень, суживающаяся оконечность острова направляется почти прямо къ западу (з.-ю.  $7^{\circ}$ ) до слѣдующей вершины (216' надъ озеромъ), вслѣдъ за кото-



рою, совершенно узкая, юго-западная оконечность (90 сажень длины) поворачиваетъ на ю.-з.  $37^{\circ}$ , не превышая 150' надъ озеромъ. Поверхность острова покрыта весьма тонкимъ слоемъ наноса, поросшаго скудною травкою, и обрѣзывается къ Малому морю очень крутыми, по большей части утесистыми обрывами, въ особенности съ сѣверо-западной стороны, гдѣ склонъ этотъ совершенно отвѣсный и недоступный, такъ какъ онъ служитъ оплотомъ для самыхъ сильныхъ волненій отъ такъ называемой горной погоды, т. е. с.-з-го вѣтра. Весь островъ состоитъ изъ роговообманковаго гнейса, переходящаго мѣстами въ слюдяный; паденіе пластовъ на ю.-ю.-в., причемъ линія простиранія ихъ, продолженная на в.-с.-в., падаетъ какъ разъ на Шибѣтскій мысъ; только на сѣверо-западномъ берегу острова, на оконечности мыска въ той-же части, гдѣ располагается описанный выше высшій пунктъ, уцѣлѣла со стороны Малаго моря часть известковаго пласта. Всѣ эти подробности мы заимствовали изъ рукописныхъ замѣтокъ Черскаго, имѣя въ виду дать возможность произвести по нимъ впослѣдствіи оцѣнку размывающаго дѣйствія байкальскихъ волнъ на этотъ островъ, который, замѣтимъ здѣсь-же, изображенъ на геологической картѣ названнаго автора ошибочно; именно, въ обратномъ видѣ, вслѣдствіе чего юго-западный его конецъ на картѣ слѣдуетъ считать сѣверо-восточнымъ и обратно, а сѣверо-западный берегъ — юго-восточнымъ.

Въ замѣткахъ о томъ же островѣ Черскій касается также явленія, о которомъ до него не упоминалось въ литературѣ Байкала. Онъ описываетъ здѣсь видѣнный имъ *миражъ*, хорошо знакомый и мѣстнымъ жителямъ и извѣстный у русскихъ подъ именемъ *голумененія* (напр. говорятъ, что такое-то мѣсто *голуменится*). Явленіе это состоитъ въ томъ, что, вслѣдствіе извѣстныхъ условій состоянія различныхъ слоевъ воздуха и соотвѣтственнаго преломленія въ нихъ свѣтовыхъ лучей, предметы, видимые съ отдаленія, представляются или не на свой-

ственнымъ ихъ мѣстѣ, или-же въ искаженныхъ и нерѣдко крайне изуродованныхъ очертаніяхъ и размѣрахъ, что обыкновенно имѣетъ мѣсто послѣ полудня, ближе къ закату солнца. Неперечисляя всѣхъ случаевъ, видѣнныхъ имъ въ теченіи четырехъ лѣтняго плаванія (см. ниже), онъ указываетъ здѣсь напр. на совершенно грибовидную форму контуровъ, принатую однажды однимъ изъ острововъ Ушканьихъ (около Святого Носа) а также и Ольхономъ, при взглядѣ на нихъ съ юго-восточнаго берега озера; на появленіе цѣлаго ряда высокихъ и усѣченныхъ сверху, столбовидныхъ вершинъ на гребнѣ Святого Носа, въ томъ именно мѣстѣ его сѣверо-восточной части, гдѣ въ дѣйствительности нѣтъ даже никакихъ зазубринъ; на раздвоеніе линіи песчанаго берега Баргузинскаго залива на двѣ части, изъ которыхъ южная приподнялась кверху и расположилась подъ значительнымъ угломъ къ поверхности озера (при взглядѣ съ одной изъ вершинъ Святого Носа); наконецъ, на такое-же въ сущности явленіе, позволившее однажды видѣть часть берега, скрывающагося, при нормальныхъ условіяхъ, за высокимъ, гористымъ мысомъ, вслѣдствіе чего казалось, что вся долина и поверхность Байкала представляетъ здѣсь крутой наклонъ съ сѣверо-востока на юго-западъ (въ южныхъ окрестностяхъ устья р. Голоустной). Что-же касается миража, видѣннаго съ острова Угунгоя, то онъ состоялъ въ томъ, что сѣверо-восточная оконечность Ольхона явилась какъ бы въ видѣ трехъ острововъ, позади которыхъ обнаружился необычайно высокій и не видимый отсюда обыкновенно Святой Носъ. По поводу этого явленія Черскій допускаетъ еще, что здѣсь, по всей вѣроятности, имѣло мѣсто полное исчезновеніе названной части Ольхона, на мѣстѣ которой появились Ушканьи острова, лежащіе какъ разъ передъ Святымъ Носомъ.

Отъ мыска, лежащаго у подножья высшей вершины Угунгоя, Черскій направился на ю.-ю.-в., къ берегу Ольхона за Ахшхуро мъ, и достигъ его около небольшого скалистаго мыса,

извѣстнаго подъ названіемъ Шара-шулу́нь, (*шара* = роженъ: *шулу́нь* = камень). Мысъ этотъ — остатокъ скалистой гряды, до того пострадавшей отъ прибоа волнъ, что отъ нея остался нынѣ лишь рядъ разобщенныхъ трещинами, но высокихъ каменныхъ глыбъ, среди которыхъ, вблизи оконечности гряды, возвышается неправильно призматическій каменный шпиль съ совершенно острою вершиною, болѣе 10' высоты. Тамъ, гдѣ гранито-сіенито-гнейсъ этого мыса принимаетъ болѣе ясную слоистость, переходя въ роговообманковый гнейсъ, паденіе пластовъ оказывается ю.-ю.-в.

За Шара-шулуномъ слѣдуетъ незначительная бухточка, называемая Биша́хень Харгѣй, т. е. Малый Харгой (*биша́хень* = малый), ограниченная съ з.-ю.-з. сомненнымъ мысовиднымъ выступомъ скалистаго берега, который далѣе продолжается въ такомъ же видѣ съ версту на з.-ю. 30°, образуя сѣверо-западный склонъ отрога Большаго Харгойскаго мыса (Харгѣй-хушунъ). Мысъ этотъ, какъ и лежащая за нимъ къ ю.-в., бухта, по своимъ главнымъ особенностямъ, составляетъ повтореніе Шибѣтскаго, расположеннаго только нѣсколько южнѣе. Большая Харгойская бухта дѣйствительно принадлежитъ къ продольнымъ, какъ и Шибѣтская, достигаетъ съ версту въ длину, а благодаря нѣсколько меньшей ширинѣ, она еще болѣе уподобляется затопленной долиנѣ, сухія верховья которой лежатъ къ востоку и юго-востоку отъ нея въ видѣ вѣтвей, которыми расчленяются прибрежныя горы. Съ правой стороны, т. е. съ с.-з.-ѣ, затопленная долина эта ограничивается отрогомъ Харгойскаго мыса до 165' высоты, но съ округленными контурами верхней поверхности, между тѣмъ какъ съ лѣвой (ю.-ю.-в.-ѣ) стороны возвышаются довольно красивыя, остроконечныя вершины безлѣсныхъ, болѣе высокихъ горъ (890' надъ озеромъ), придающихъ пейзажу альпійскій характеръ; наконецъ, видъ на выходъ бухты, т. е. на з.-ю.-з. оживляется еще тѣмъ обстоятельствомъ, что въ нѣкоторомъ отдаленіи, уже къ за-

паду отъ линіи выхода бухты, видѣется небольшой островъ Хыбѣнъ. Съ этимъ послѣднимъ мы ознакомимся ниже, теперь же замѣтимъ только, что по особенностямъ видимаго отсюда его профиля островъ этотъ, расположенный на мысенномъ продолженіи Харгойскаго мыса, уподобляется оконечности какого нибудь острововиднаго мыса (въ родѣ Юбухана или Тодактэ), длинный перешеекъ котораго затопленъ водою—какъ бы юго-западнымъ продолженіемъ Харгойской бухты, вслѣдствіе чего Хыбѣнъ играетъ здѣсь ту-же роль относительно Харгойскаго мыса, какую островъ Зумугой относительно Шибэтскаго (см. выше).

Въ разстояніи около 200 саженой къ сѣверо-востоку отъ оконечности Харгойскаго мыса, гдѣ поверхность его понижается находящеюся здѣсь сѣдловиною до 134' надъ озеромъ, Черскій нашелъ такую же древнюю, очевидно крѣпостную стѣну, съ какою мы ознакомились уже на горѣ около материковаго Харгоя (см. выше). Здѣсь она точно также носить названіе монгольской стѣны (монголишибэ), но построена съ гораздо большимъ изяществомъ, какъ это мы увидимъ ниже, въ главѣ, посвященной древностямъ этого рода. Послѣ подробнаго осмотра этого сооруженія Черскій сдѣлалъ экскурсію къ высотамъ юго-восточнаго берега Харгойской бухты, начавъ восхожденіе на высшую, остроконечную вершину на лѣвомъ берегу верховьевъ долины Харгойской. На высотѣ 729' надъ озеромъ онъ достигъ террасовиднаго гребня, который, при взглядѣ на него съ уровни бухты, кажется сѣдловиною, отдѣляющею нисшую остроконечную вершину горы отъ высшей. Вся нисшая вершина оказалась только оконечностью этого гребня, превышающею лишь незначительно его почти горизонтальную поверхность; что же касается высшаго пункта, то онъ не превышаетъ 890' надъ Байкаломъ. Съ него открывается великолѣпный видъ на Малое море, на значительную часть юго-западной оконечности Ольхона и на материковыя горы. На

сѣверѣ, т. е. на томъ же меридіанѣ, видѣется окончность Шара-шулуна; западный конецъ острова Угунгоа на с.-з.  $30^{\circ}$ , окончность Харгойскаго мыса на з.-с.-з., а южный конецъ острова Хыбнѣ на западѣ; между тѣмъ, вдали, на юго-западѣ, видна вершина Танхына, а еще южнѣе (ю.-з.  $33^{\circ}$ ) Россамынѣ. Изъ болѣе близкихъ окрестностей этой вершины, которую Черскій называетъ Харгойскимъ пикомъ (въ отличіе отъ Харгойской горы на материкѣ), можно видѣть, что сухія верховья долины Харгойской бухты, располагаясь въ юго-востоку отъ пика, направляются около его подножья на сѣверо-западъ и дугообразно поворачиваются къ западу, къ тому мѣсту, гдѣ долина эта затопляется уже водою бухты; вмѣстѣ съ тѣмъ отрогъ горъ, образующій ея правый берегъ, начинаясь съ высотъ вблизи вѣтвей Доло-наргунской долины (см. выше), постепенно понижаясь къ сѣверо-западу, столь же плавно и дугообразно поворачивается къ западу, гдѣ переходитъ въ Харгойскій мысъ. Затѣмъ къ югу отъ пика и высотъ, слѣдующихъ отъ него къ юго-западной окончности острова, располагается пространная и глубокая котловинообразная долина, которая принадлежитъ уже системѣ Олхонскихъ воротъ. Она извѣстна подъ названіемъ Уланъ-хужиръ, отдѣляется на востокъ довольно низкимъ и отчасти пересѣченнымъ водораздѣломъ отъ системы Доло-наргуна, а къ юго-западу соединяется съ долиною бухты Загли, открывающейся уже въ Воротахъ (см. ниже). Нерѣшеннымъ остался вопросъ: въ какомъ отношеніи находится эта котловина къ болѣе сѣверной бухты Воротъ, именно къ Хоринъ-иргъ (см. ниже); видъ съ описываемыхъ высотъ заставляеть предполагать связь Уланъ-хужиры и съ этою бухтою, но можетъ быть, что онѣ отдѣляются другъ отъ друга какимъ-либо, хотя и не высокимъ переваломъ. Съ Харгойскаго пика Черскій направился вообще на з.-ю.-з., по гребню котловины, отдѣляющей его отъ сосѣдней вершины. Сѣдловина эта понижается до 668' надъ озеромъ, а ближайшія къ ней два высшихъ пункта

достигаютъ: первый 792, а слѣдующій 805' той же относительной высоты. На сѣверо-западномъ склонѣ этихъ двухъ вершинъ беретъ начало другая сухая долина, опускающаяся къ Харгойской бухтѣ, къ ея юго-восточному берегу, а сейчасъ же за нею располагается третья долина. Наконецъ слѣдующая вершина, достигающая 836' надъ озеромъ, представляетъ собою послѣдній изъ высшихъ пунктовъ этой гряды, такъ какъ за нимъ слѣдуетъ пониженіе мѣстности къ Воротамъ; изъ этой гряды отдѣляется и отрогъ, образующій остальную часть описываемаго берега Ольхона и вмѣстѣ съ тѣмъ и мысъ Хоринъ-иргй, который, совместно съ знакомымъ намъ уже материковымъ Уланъ-хадѣй, ограничиваютъ сѣверо-западный входъ въ Ворота (см. ниже). Съ высотъ окрестностей Харгойской бухты открывается точно также хорошій видъ на Малое море съ его островами и на горы противоположнаго его берега, т. е. на сѣверо-восточное продолженіе Приморскаго хребта. Съ особенностями этого послѣдняго мы ознакомимся въ своемъ мѣстѣ, теперь же замѣтимъ только, что главнѣйшіе острова Малаго моря, какъ-то: Зумугой, Угунгой, Хыбинъ, а затѣмъ Курминскіе острова (см. ниже) группируются между меридианами бухтъ: Харгойской и Шибѣтской, обстоятельство, указывающее на соотвѣтственное повышеніе дна Малаго моря въ этомъ мѣстѣ, откуда оно, очевидно, понижается затѣмъ какъ къ юго-западу, т. е. къ Воротамъ, такъ и къ сѣверо-востоку, къ чему мы возвратимся еще ниже, при общемъ обзорѣ Малаго моря и Ольхонскихъ Воротъ. Въ заключеніе указаннаго объ окрестностяхъ Харгойской бухты упомянемъ еще объ одномъ не безынтересномъ обычаѣ бурятъ свидѣтелемъ котораго былъ Черскій. Во время описанныхъ выше экскурсій, около одной изъ вершинъ Харгойскихъ горъ, онъ видѣлъ довольно высокія подмостки, укрѣпленные на четырехъ столбахъ, со стороны которыхъ распространялся невыносимый смрадъ падали; ближайшій осмотръ показалъ, что на подмосткахъ

лежалъ почти совершенно изгнившій уже трупъ лошади, отъ которой спускалась книзу веревка, служившая очевидно при поднятіи трупа на высоту подмостковъ. Распросы показали, что буриты хоронятъ такимъ образомъ лошадей, убитыхъ на томъ же мѣстѣ громомъ. Обычай этотъ, какъ видно изъ свѣдѣній, собранныхъ Потанинымъ <sup>1)</sup>, распространенъ также и у урянхайцевъ.

Юго-восточный берегъ Харгойской бухты, благодаря продолжному направленію послѣдней, переходитъ непосредственно въ продолженіе остальной части сѣверо-западнаго берега Ольхона, образуемаго здѣсь уже отрогомъ Хоринъ-иргй. Только небольшой широкоустьченый съ сѣвера мысовидный выступъ,—мысъ Тытырхѣй, можетъ служить границею между Харгойскою и слѣдующею за нимъ, небольшою Тытырхѣйскою бухтами. Съ этого мыса Черскій посѣтилъ упоминавшійся уже выше островъ Хыбинъ, который удаленъ здѣсь менѣе чѣмъ на версту отъ берега. Скалистый и безлѣсный островокъ этотъ, около 200 сажень въ обоихъ діаметрахъ, вытягивается на сѣверо-востокъ, а съ южной стороны, къ которой онъ довольно плавно понижается, снабженъ узкимъ мысовиднымъ удлинениемъ, играющимъ какъ бы роль остатка перешейка, соединявшаго его прежде съ Ольхономъ. Довольно плоская верхняя поверхность Хыбина, поросшая скудною травою, возвышается почти на 200' надъ озеромъ, къ которому она обрѣзывается съ остальныхъ трехъ сторонъ крутымъ и утесистымъ, перѣдко отвѣснымъ склономъ. Островъ состоитъ изъ тѣхъ же полевошпатовыхъ породъ, которыя развиты и вокругъ Харгойской бухты (роговообманковый гнейсъ съ видоизмѣненіями) съ точно такимъ-же наклономъ пластовъ на ю.-ю.-в., составляя какъ бы разобщенное размывомъ продолженіе Харгойскаго мыса, что же касается бѣлаго дѣлта

---

<sup>1)</sup> Потанинъ, Очерки сѣверо-западной Монголіи. Вып. IV. Сиб. 1883 г., стр. 37.

значительной части его утесовъ, располагающаго, при взглядѣ съ отдаленія, считать ихъ известковыми, то цвѣтъ этотъ зависитъ отъ помета баклановъ и чаекъ, гнѣздящихся здѣсь въ изобиліи также, какъ и на другихъ островахъ Малаго моря. Замѣчательно, что на юго-западной сторонѣ острова, какъ равно и на оконечности Тытырхэйскаго мыса, замѣчаются слѣды «монгольскихъ сооруженій», въ видѣ остатковъ стѣны около самаго края утесистаго склона (см. ниже), изъ чего видно, что Харгойская бухта была въ то время весьма важнымъ укрѣпленнымъ пунктомъ. Начинаясь ю.-з. вѣтеръ заставилъ поспѣшить къ Ольхону, берегъ котораго т. е. склонъ отрога Хоринъ-ирги направляется за Тытырхэйскою бухтою, сначала на з.-ю.-з., представляя здѣсь двѣ бухтовидныя выемки, а затѣмъ почти на ю.-ю.-з. (ю.-з. 30°), образуя третью и послѣднюю бухточку, такъ какъ отсюда слѣдуетъ уже конечная часть скалистаго и значительно подмываемаго мыса Хоринъ-ирги, съ оконечности котораго начинаются уже Ольхонскія ворота.

В) Юго-западная оконечность острова Ольхона, какъ сѣверо-восточный берегъ Ольхонскихъ воротъ.

Мысъ Хоринъ-ирги представляетъ собою длинный, узкій, понижающійся къ юго-западу отрогъ, гребень котораго принимаетъ въ профилѣ волнистое очертаніе, вслѣдствіе углубляющихся въ него нѣсколькихъ поперечныхъ сѣдловинъ, числомъ до четырехъ. Начиная почти съ 300' наибольшей высоты, мысъ этотъ понижается наконецъ до 10', причемъ его оконечность отдѣляется отвѣсною щелью до самаго уровня воды и по очертанію, если смотрѣть на нее съ юго-восточной стороны и съ нѣкотораго отдаленія (съ ю.-в.-го берега соименной бухты), весьма похожа на черепъ громаднаго хищнаго животнаго, средняго между типомъ собаки и медвѣдя. Неудачное сравненіе этой скалы съ головою лошади, на ко-



торую, впрочемъ она похожа при взглядѣ съ какой-либо другой мѣстности, объясняетъ, почему мысъ этотъ извѣстенъ у русскихъ жителей подъ именемъ Кобылья голова. Сейчасъ же за нимъ располагается узкая (менѣе версты) и длинная (болѣе четырехъ верстъ?) бухта Хоринъ-иргъ, вытянутая въ юго-западномъ направленіи, гдѣ она открывается къ Воротамъ, на встрѣчу (напротивъ) знакомой намъ уже Куркутской бухтѣ, лежащей на материковой сторонѣ Воротъ. Хоринъ-иргинская бухта отличается къ тому же извилистостью береговой линіи, въ особенности сѣверо-западной, гдѣ, соответственно упомянутымъ выше поперечнымъ сѣдловинамъ соименнаго отрога, располагаются четыре второстепенныя бухточки, разобщенныя мѣстами довольно длинными мысами. На юго-восточномъ берегу, въ свою очередь, находится нѣсколько бухтовидныхъ выемокъ, изъ которыхъ вторая, считая отъ сѣверо-восточной оконечности, носитъ названіе Итырхэй. Захваченная сильнымъ вѣтромъ (ю.-з.), лодка Черскаго (5-го августа) должна была искать убѣжища въ первой изъ упомянутыхъ четырехъ бухточекъ, на сѣверо-западномъ берегу Хоринъ-Иргинской бухты, откуда, затѣмъ перешла въ Итырхэй. Произведенный Черскимъ рядъ экскурсій по высотамъ, окружающимъ бухту, ознакомилъ его прежде всего съ мысомъ Хоринъ-иргъ, гдѣ, между прочимъ (см. выше), въ одной изъ его поперечныхъ ложбинъ, въ 50 саженьхъ къ сѣверу отъ конца второй второстепенной бухты (считая съ с.-в.), онъ нашелъ маленькое озерко, до 50 сажень въ діаметрѣ, отдѣленное отъ воды бухты полосой каменистой почвы до 10' высоты. Весь островъ, образующій мысъ Хоринъ-иргъ, состоитъ изъ роговообманковаго гнейса, падающаго на ю.-ю.-в.; въ одной изъ его бухточекъ уцѣлѣлъ песчаный слоистый наносъ, возвышающійся до 40' надъ водою. Затѣмъ экскурсіями изъ бухточки Итырхэй Черскій ознакомился какъ съ отрогомъ, отдѣляющимъ Хоринъ-иргинскую бухту отъ сосѣдней съ нею, такъ и съ особенностями этой

послѣдней, извѣстной подъ названіемъ Загли (см. ниже). Отрогъ этотъ, называемый Черскимъ Заглинскимъ, отличается большею шириною нежели Хоринъ-иргѣ, достигаетъ наибольшей высоты ближе къ промежутку между сѣверо-восточными оконечностями разобщаемыхъ имъ бухтъ, откуда, по направленію къ Воротамъ, онъ значительно понижается, опускаясь къ озеру широкоустьченною и почти отвѣсною оконечностью. Восхожденіе на высшій пунктъ показало во-первыхъ, что высота его равняется 1020', слѣдовательно гораздо значительнѣе Хоринъ-иргѣ. Къ югу отъ этой вершины располагается еще другая, достигающая только 779'; эта послѣдняя образуетъ собою склонъ прилежащей части долины бухты Загли, весьма хорошо изучаемый съ этихъ высотъ. Отсюда видно, что названная долина образуется тремя верховьями, изъ которыхъ правое беретъ начало въ сѣверо-восточномъ продолженіи Заглинскаго отрога, среднее въ описанной уже выше котловинѣ Уланъ-хужиръ, видѣнной съ высотъ Харгойской бухты, и лѣвое, южнѣе этой котловины, при чемъ оба послѣднія, по своему положенію, играютъ какъ бы роль лѣвыхъ вѣтвей праваго верховья, не взирая на то, что по размѣрамъ Уланъ-хужирская вѣтвь принадлежитъ къ самымъ значительнымъ. Такое преобладаніе праваго верховья усиливается еще тѣмъ обстоятельствомъ, что въ немъ начинается длинное, рѣкоподобное озеро, которое изгибается слегка S-образно вмѣстѣ съ занимаемою имъ долиною, направляется въ общемъ съ сѣвера на югъ и отчасти на юго-западъ, мимо низовьевъ въ остальныхъ двухъ вѣтвей, которыя поэтому и унодобляются лѣвымъ высохшимъ притокамъ. Весьма живописное озеро это называется Заглинскимъ; на половинѣ его длины, около западнаго берега, виднѣется узкій камышевый островокъ, вытянутый параллельно береговой линіи. Въ противоположность сѣверной, округленной оконечности озера, южная снабжена двумя бухточками, между которыми располагается короткій стокъ, связывающій его съ сѣверо-восточною

оконечностью соименной бухты. Стокъ этотъ направляется сначала прямолинейно, а затѣмъ дѣлаетъ крутую излучину вѣво, въ концѣ которой онъ довольно постепенно переходитъ въ конечность Заглинской бухты. Эта послѣдняя, благодаря своей небольшой ширинѣ, вначалѣ точно также живо напоминаетъ собою рѣчное русло, да и вообще её нельзя признавать иначе, какъ за продольную рѣчную долину, затопленную впослѣдствіи водами Байкала.

Западнѣе болѣе низкой изъ описанныхъ двухъ горныхъ вершинъ въ Заглинскую бухту открывается съ сѣверной стороны довольно широкая и вѣтвистая сухая долина Мыхэрта, устье которой преобразовано въ довольно глубоко врѣзанную, второстепенную бухточку того же имени. Въ этой долинѣ Черскій нашель особеннаго рода выкладку, сдѣланную изъ камней и приписываемую мѣстными жителями тѣмъ же монголамъ, которымъ принадлежатъ упомянутыя выше укрѣпленія. Еще западнѣе, тотъ же сѣверо-западный берегъ Заглинской бухты представляетъ еще одну бухтовидную выемку, послѣ чего онъ, какъ и весь юго-восточный, направляется уже почти прямолинейно къ своимъ конечнымъ мысамъ, изъ которыхъ сѣверо-западный извѣстенъ подъ именемъ Улятѣй, а юго-восточный — Зобри-хушунъ. Между ними открывается къ Ольхонскимъ воротамъ, насупротивъ описанной выше Базарной бухты на материкѣ, Заглинская бухта, которую, какъ и Хоринъ-иргинскую, слѣдовало бы вѣрнѣе называть заливами, вслѣдствіе чего и мысъ Улятѣй, вѣрнѣе вся оконечность Заглинскаго отрога, обращается на встрѣчу материковому мысу Иххтѣ, составляя какъ бы прерванное Воротами его продолженіе, что впрочемъ подтверждается и результатами произведенныхъ здѣсь Черскимъ геологическихъ изслѣдованій. Оказалось, что синклинальный изгибъ пластовъ, описанный нами на мысѣ Иххтѣ, обнаруживается въ такомъ же видѣ и на оконечности Заглинскаго отрога, слѣдовательно, на Ольхонской сторонѣ

Воротъ, гдѣ пласты являются только нѣсколько болѣе изогнутыми; со стороны Хоринъ-иргинской бухты паденіе пластовъ сохраняетъ прежнее ю.-ю.-в. направленіе, тогда какъ со стороны Загли наклонъ перешелъ уже въ с.-с.-з. Здѣсь-же наблюдается и пластъ кристаллическаго известняка, перешедшій сюда съ мыса Ихытѣ, хотя порода эта не можетъ вездѣ служить прочною опорою для оцѣнки такого рода вопросовъ, потому, что, какъ мы видѣли выше, пласты ея, именно въ окрестностяхъ Ольхонскихъ Воротъ, нерѣдко утоньчаются, а наконецъ и совершенно исчезаютъ (выклиниваются), по всей вѣроятности отъ выщелачиванія ихъ почвенною водою, при чемъ съ явленіемъ этимъ связаны были нерѣдко и изгибы пластовъ сосѣднихъ полевошпатowychъ породъ (см. выше). Упомянувъ, что около Заглинскаго озера находится и сомнительный бурятскій улусъ, перейдемъ къ описанію остальной части Ольхонскаго берега Воротъ.

Скалистая оконечность мыса Зобри-хушунъ, ограничивающаго Заглинскую бухту съ юго-востока, усѣчена въ меридіональномъ направленіи, представляя лишь небольшую но недоступную для лодокъ, бухтовидную выемку. Въ мысѣ, среди роговообманковаго гнейса, падающаго уже на с.-с.-з., наблюдается второй пластъ кристаллическаго известняка, перешедшій съ материковаго берега Воротъ. Сейчасъ же за мысомъ, въ разстояніи около версты отъ Загли, располагается такая же удлинненная, но меньшихъ размѣровъ бухта, называемая Перевозъ, или Ольхонскій Перевозъ, въ отличіе отъ материковаго, лежащаго между мысами Харгантѣ и Юбуханомъ (см. выше). Бухта эта есть мѣсто пристани постояннаго перевоза на Ольхонъ, совершаемаго въ большой лодкѣ съ палубою. Постоянство этой переправы нарушается однако какъ волненіями, такъ въ особенности сѣверо-западнымъ вѣтромъ, самымъ опаснымъ для переѣзжающихъ, такъ какъ имъ лодка или судно выносятся неизбежно въ открытую часть Байкала. Вѣтеръ этотъ, называемый обыкновенно «горною

погодою», извѣстенъ здѣсь также подъ вполне мѣстнымъ названіемъ «Сарма», происшедшимъ отъ того, что долина рѣки Сармы пересѣкаетъ Приморскій хребетъ какъ разъ на продолженіи средней линіи длины Ольхонскихъ воротъ, или вѣрнѣе, послѣднія располагаются какъ бы на юго-восточномъ продолженіи выхода Сармы изъ хребта. Черезъ долину этой рѣки (см. ниже) вѣтеръ пробивается съ особенною силою и мчится прямо въ Ворота; потому и говорятъ здѣсь обыкновенно: «Сарма дуетъ» причѣмъ, по замѣчанію Черскаго, наслушавшись различныхъ разсказовъ, въ которыхъ сама долина Сармы называется «сердитою», путешественникъ приходитъ къ убѣжденію, что фразу: «Сарма (т. е. долина) дуетъ» слѣдуетъ понимать въ буквальномъ ея смыслѣ. Извѣстны случаи, въ которыхъ суда, захваченныя этимъ вѣтромъ въ Воротахъ, переносились прямо на противоположную сторону Байкала; впрочемъ, большая часть судовъ, какъ равно и пароходы, идутъ вдоль Байкала, и не заходятъ ни въ Ворота, ни въ Малое море, если на то не имѣется специальныхъ мотивовъ. Перевозная бухта направляется почти на ю.-з. (з.-ю. 30°), располагаясь на прямомъ продолженіи сухой, довольно короткой долины, которая беретъ начало двумя верховьями на высотахъ юго-западнаго конца Ольхона, и затопленнымъ своимъ устьемъ открывается насупротивъ бухтовидной выемки между материковыми мысами: Харгантъ и Ухѣръ-гаргѣши. Изъ Перевозной бухты Черскій сдѣлалъ экскурсію на высоты, лежація южнѣе этой долины; они входятъ въ составъ отрога Имѣль-галдѣши, оконечность котораго, въ видѣ соименнаго мыса, ограничиваетъ Перевозную бухту съ южной стороны. Высшій пунктъ этого отрога удаляется почти на 1 версту отъ Воротъ, располагаясь въ промежуткѣ между верхнею частью Перевозной долины и другою, параллельною ей долиною Уншѣнскою, верховья которой мы уже видѣли однажды, такъ какъ они соединяются съ долиною Мангасу, на юго-восточномъ берегу Ольхона

(см. выше). Вершина, о которой идетъ рѣчь, оказалась самою высокою изъ горъ юго-западной оконечности острова и на ней anerоидъ показалъ 1182' надъ Байкаломъ. Ближе къ Воротамъ располагается другая вершина, достигающая только 1050' высоты; отъ нея начинается уже конечная часть мыса Имѣль-галдаши, нѣсколько понизившаяся къ проливу. На этой горѣ Черскій видѣлъ длинную, но сравнительно узкую плиту мѣстнаго гнейса, приблизительно около 7 футовъ длины, поставленную отвѣсно въ углубленіе скалы и укрѣпленную въ немъ въ видѣ маяка. Бурятъ, на сдѣланный ему вопросъ объ этомъ сооруженіи, отнесъ его къ временамъ «монгольскимъ», слѣдовательно ко времени сооруженія упоминавшихся выше укрѣпленій. Начавшаяся гроза и сильный вѣтеръ съ дождемъ (ю.-з.) заставили возвратиться въ палатку и ночевать въ Перевозной бухтѣ. Весь осмотрѣнный отрогъ состоитъ изъ видоизмѣненій роговообманковаго гнейса, переходящаго и въ полумассивное строеніе; пласты падаютъ на с.-с.-з.

Въ противоположность материковому берегу Воротъ, гдѣ, южнѣе описываемой широты, находится еще значительная, живообразная бухта Тугъ (см. выше), берегъ Ольхона, южнѣе самой выдающейся точки мыса Имѣль-галдаши, представляетъ лишь небольшіе изгибы въ видѣ двухъ незначительной величины бухточекъ, изъ которыхъ южная нѣсколько больше и соответствуетъ упомянутой уже выше, Уншунской долины. За нею слѣдуетъ уже знакомый намъ мысъ Уншунъ, съ котораго начинается юго-восточный берегъ Ольхона. Отсюда 7-го августа Черскій переплылъ обратно на материковый берегъ Воротъ, къ мысу Крестъ, окончивъ такимъ образомъ плаваніе вокругъ Ольхона, на которое онъ употребилъ 21 день. Въ тотъ же день онъ началъ изслѣдованіе материковаго берега Воротъ, который, для удобства изложенія, мы описали выше, ознакомившись совмѣстно и съ юго-западною оконечностью Малаго моря, извѣстную подъ

названіемъ залива Хушилху (см. выше); спустя 7 дней, т. е. 14-го августа, Черскій достигъ дельты р. Сармы, на которой мы и прервали описаніе берега Байкала, чтобы ознакомиться съ самымъ большимъ изъ его острововъ.

Г) Горныя породы, встречающіяся на островѣ Ольхонѣ, по изслѣдованіямъ Обручева.

Какъ уже упомянуто въ общемъ обзорѣ острова Ольхона, цѣль поѣздки Обручева была убѣдиться въ правдоподобности слуховъ о нахожденіи на этомъ островѣ драгоценныхъ минераловъ и полезныхъ ископаемыхъ. Поэтому въ своемъ отчетѣ путешественникъ главнымъ образомъ остановился на петрографіи и стратиграфіи, и мы находимъ въ немъ много интересныхъ фактовъ, касающихся именно этой области геологіи. Не излишне будетъ подробнѣе остановиться надъ результатами изслѣдованій Обручева <sup>1)</sup>, посвятивъ имъ отдѣльную главу.

По изслѣдованіямъ Черскаго оказывается (см. выше), что породы, развитыя на Ольхонѣ, относятся къ верхнему ярусу Лаврентьевской системы и состоятъ изъ кристаллическихъ известняковъ и доломитовъ (иногда графитовыхъ, углестыхъ, байкалитовыхъ и офитовыхъ), перемежающихся съ полевошпатowymi, роговообманковыми (гнейсъ, гранито-гнейсъ, гранитъ—перехождаящіе въ діоритовые сланцы, діоритъ и роговообманковые сланцы), такими же слюдистыми, а мѣстами байкалитовыми и хлоритовыми породами. Обручевъ считаетъ подобное опредѣленіе вѣрнымъ для породъ, развитыхъ на юго-западномъ берегу Байкала и по рч. Слюдянкѣ, по неточнымъ для породъ Ольхона. По его мнѣнію породы Ольхона слагаются изъ кристаллическихъ известняковъ, обыкновенно графитовыхъ, перемежающихся съ слюдистыми и ро-

<sup>1)</sup> Обручевъ, Горн. Журн. 1890 г. № 12, стр. 447—458.

говообманковыми гранитами и гнейсами, переходящими часто въ аплиты и рѣже въ гранито-сіениты и сіенитъ. Кромѣ того встрѣчаются еще кварцы, кварциты и кварцевый порфиръ. Разсмотрѣніе каждой изъ указанныхъ породъ Обручевъ посвящаетъ отдѣльный небольшой параграфъ, что и мы сдѣлаемъ при дальнѣйшемъ изложеніи.

1) *Кристаллическій известнякъ*. Ольхонскіе известняки всѣ кристаллическіе и представляютъ то крупнозернистую, то мелкозернистую разности. Кристаллы довольно правильно развитыхъ ромбоэдровъ первой разности достигаютъ величины 5—20 мм. Цвѣтъ известняковъ бѣлый, иногда сѣрый и желтоватый, а блескъ стеклянный. Обыкновенной примѣсью известняковъ являются чешуйки графита отъ микроскопической величины до 2—3 мм. Иногда чешуйки эти расположены бываютъ довольно правильными параллельными слоями, придавая породѣ сланцеватое строеніе. Количество графита иногда бываетъ столь значительнымъ, что известнякъ съ перваго взгляда напоминаетъ гранитъ, въ особенности, когда онъ желтоватаго цвѣта. Чешуйки графита имѣютъ форму шестиугольныхъ таблицъ, углы которыхъ округлены, и обладаютъ обыкновенно тонкослоистымъ сложеніемъ, иногда же и лучистолиноватымъ; въ этомъ послѣднемъ случаѣ чешуйки напоминаютъ молибденовый блескъ. Иногда къ графитовому известняку примѣшивается большое количество полевого шпата и магнетитъ. Въ этомъ случаѣ известнякъ составляетъ переходъ къ графитовому граниту. Порода эта менѣе устойчива и легко разрушается въ дресву. Наконецъ къ известняку примѣшивается значительное количество роговой обманки, хлорита кварца и полевого шпата. Эта порода уже служитъ переходомъ къ роговообманковому граниту и отнесена Обручевымъ къ сложнымъ породамъ.

Мѣста выступовъ известняковъ слѣдующія: 1) По дорогѣ изъ Хужира въ Дало-наргунъ—разрушенные гребни бѣлаго крупнокристаллическаго известняка. 2) Шаманскій мысъ—



мелко- и крупнозернистый графитовый и чистый известняк. 3) По берегу Малаго моря, между мысами Нюргэнэ и Уланъ-байсаномъ—графитовый известнякъ въ видѣ валуновъ. 4) Въ устьѣ Харгойской долины—графитовый и полевошпатово-магнетитовый известнякъ. 5) Восточный конецъ Ольхона—выходы бѣлаго чистаго и графитоваго известняка.

2) *Кварцъ* образуетъ нерѣдко тонкія жилы, пересѣкающія другія породы. Иногда онъ попадаетъ въ видѣ довольно большихъ валуновъ (до 1 куб. саж.) на склонахъ и вершинахъ холмовъ и вѣроятно тоже жильнаго происхожденія, такъ какъ до сихъ поръ нигдѣ не удавалось наблюдать его залеганія. Онъ обыкновенно бѣлаго цвѣта, иногда же окрашенъ въ желтый и красноватый цвѣта, болѣе или менѣе чистый, хотя, напр., въ зернистомъ кварцѣ, образующемъ тонкія жилки въ гранитѣ Доло-наргуна, встрѣчаются и блестки мусковита.

3) *Кварциты*. У мыса Уланъ-ирги между гранитомъ и гнейсомъ наблюдается пластъ темно-сѣраго, мелкозернистаго, графитово-слюдистаго кварцита, выдающійся въ данномъ мѣстѣ въ видѣ гребня надъ поверхностью холмовъ. Микроскопъ обнаружилъ въ немъ, кромѣ зеренъ кварца, непрозрачныя блестки и зернышки графита, слюду и полевой шпатъ (ортоклазъ). Тонкіе прослойки, переполненные слюдой, придаютъ всей породѣ сланцеватое сложеніе. На перешейкѣ, соединяющемъ Шаманскій мысъ съ островомъ, обнажается пластъ сѣро-желтаго, мелкозернистаго, желѣзистаго кварцита, въ которомъ иногда попадаются блестки графита. Въ видѣ гальки кварциты попадаютъ во многихъ мѣстахъ и заставляютъ думать, что эта порода играетъ не малую роль въ строеніи Ольхона.

4) *Аплиты*. Сюда относятся агрегаты бѣлаго, сѣраго или темно-дымчатаго кварца и одно и триклиномѣрнаго желтоватаго или красноватаго полеваго шпата (триклиномѣрная разность, обыкновенно каолинизированная); къ нимъ подмѣши-

вається небольшое количество магнетита, окисловъ желѣза, біотита и мусковита. Аплиты пользуются большимъ распространіемъ и найдены: 1) недалеко отъ берега Малаго моря, между мысами Уланъ-байсаномъ и Нюргонъ—грязно-желтый аплитъ съ дымчатымъ кварцемъ и мусковитомъ; 2) у мыса Уланъ-ирги—свѣтло-желтый аплитъ съ небольшимъ количествомъ кварца; 3) въ глубинѣ острова между мысами Уланъ-ирги и Хагай—среднезернистый свѣтло-желтый аплитъ съ дымчатымъ кварцемъ и біотитомъ, а на берегу Малаго моря у западнаго основанія мыса Бубунскаго—крупнозернистый, бѣлый съ желтыми пятнами аплитъ съ бѣлымъ кварцемъ, желтоватымъ полевымъ шпатомъ и магнетитомъ; 4) въ холмахъ, окружающихъ съ с.-в. улусъ Доло-наргунъ—розовато-бѣлый, крупнозернистый аплитъ, содержащій бѣлый кварцъ, розовые ортоклазъ, плагіоклазъ и магнетитъ.

Нѣкоторой сланцеватостью отличаются аплиты между мысами Хагай и Уланъ-ирги и въ холмахъ улуса Доло-наргунъ. Составъ ихъ совершенно тотъ же, что наблюдается во всѣхъ аплитахъ, только распредѣленіе недѣлимыхъ гнейсо-подобное; поэтому эту разность можно было бы назвать гнейсо-аплитомъ.

5) *Граниты*. Пласты этой породы повсемѣстно переслаиваются съ аплитами, гнейсами, кварцитами и известняками. Встрѣчается также и жильный гранитъ, какъ напр. въ Доло-наргунскомъ мысѣ. Тутъ жила въ 2 ф. толщиною проходитъ въ роговообманковомъ гранито-гнейсѣ. Состоятъ граниты преимущественно изъ кварца, полевого шпата и чешуекъ біотита. Кварцъ бываетъ различныхъ оттѣнковъ отъ бѣлаго до темно-дымчатаго; его зерна различной величины. Полевой шпатъ (ортоклазъ, рѣже плагіоклазъ) — бѣлаго, желтаго и красноватаго цвѣта. Къ указаннымъ составнымъ частямъ присоединяются иногда мусковитъ, роговая обманка, графитъ, гранатъ и хлоритъ; такъ какъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ біо-

титъ замѣняется роговой обманкой, то встрѣчаются тутъ же продукты разложенія послѣдней—хлоритъ и эпидотъ.

Какъ уже упомянуто, граниты встрѣчаются повсемѣстно и не только въ видѣ небольшихъ выходовъ, но нерѣдко занимаютъ сравнительно довольно большія площади. Такъ на-примѣръ мысъ Будукъ сложенъ изъ бѣлаго гранита, подвергшагося довольно сильной метаморфизаціи: слюды мало, ортоклазъ въ сильной степени окаолинизировался. Особенно любопытно, что біотитъ образуетъ въ данномъ гранитѣ длинныя и плоскіе столбики. Далѣе основаніе мыса Бубунъ сложено съ западной стороны изъ среднезернистаго, сѣро-желтаго гранита, который къ низу переходитъ въ аплитъ и т. д.

6) *Гнейсы и сіенито-гнейсы* пользуются еще большимъ распространеніемъ чѣмъ граниты. Минералы, составляющіе ихъ, слѣдующіе: ортоклазъ и плагіоклазъ бѣлаго, желтаго и красноватаго цвѣта; біотитъ и мусковитъ; роговая обманка и продукты ея разложенія; наконецъ, второстепенныя составныя части—графитъ и гранаты. Сложеніе обыкновенно мелкозернистое. Всѣ гнейсы и сіенито-гнейсы съ поверхности подверглись разрушенію, только въ береговыхъ скалахъ, постоянно обмываемыхъ водою, можно встрѣтить эти породы въ чистомъ видѣ.

Въ холмахъ окрестностей улуса Доло-наргуна обнаруживается бѣловато-сѣрый, слюдистый, зернисто-пластинчатый гнейсъ и черно-желтый слюдисто-роговообманковый. Тутъ же наблюдается зеленовато-черный біотитово-роговообманковый сіенито-гнейсъ, успѣвшій съ поверхности, на глубинѣ 0,5—1 сант., превратиться въ мягкую массу, сѣро-зеленый цвѣтъ которой зависитъ отъ перехода роговой обманки въ хлоритъ и эпидотъ. Въ другомъ мѣстѣ сіенито-гнейсъ богатъ прожилками, заключающими красно-черный гранитъ. Описание выше сіенито-гнейсы чередуются тутъ съ сѣро-желтымъ слюдистымъ гнейсомъ, содержащимъ небольшое количество роговой обманки. Кварцъ этого гнейса съ розово-желтымъ поле-

вымъ шпатовъ образуетъ иногда тонкіе прожилки. Какъ кварцъ, такъ и полевой шпатъ достигаютъ иногда величины 0,5—1 сант. и придаютъ въ этомъ случаѣ породѣ порфировидный характеръ. Далѣе гнейсы обнажаются по дорогѣ изъ Доло-наргуна въ Елгай, на перешейкѣ, соединяющемъ Шаманскій мысъ съ островомъ, въ основаніи мыса Булукъ, у мыса Бубунъ, на восточномъ концѣ Ольхона, при устьяхъ долинъ Хагай и Идибѣ въ Байкаль и т. д.

7) *Сіенитъ*. Относя всѣ породы, близкія къ сіенитамъ къ сіенито-гнейсамъ, Обручевъ разсматриваетъ подъ этимъ именемъ одну только породу, найденную имъ на берегу Малаго моря, къ востоку отъ мыса Нюргенэ, и то въ видѣ валуновъ. Она черно-зеленаго цвѣта, съ бѣлыми пятнами, мелко- и среднезернистая и состоитъ изъ свѣжей роговой обманки и сильно каолинизированнаго ортоклаза, между тѣмъ какъ кварца, біотита и плагиоклаза очень мало.

8) *Кварцевый порфиръ* найденъ Обручевымъ тоже только въ видѣ валуновъ на холмахъ окрестностей улуса Хужиръ и около мыса Бубунъ. По внѣшнему виду порода эта красновато-коричневаго цвѣта и представляетъ собой плотную массу, напоминающую роговикъ. Микроскопъ обнаруживаетъ тонкозернистую основную массу, строеніе которой нельзя ясно видѣть, вслѣдствіе присутствія большого количества водной окиси желѣза. Въ этой массѣ порфировидно вкраплены кристаллы кварца, ортоклаза, магнетита и роговой обманки. Нѣкоторые валуны пористы и ихъ пустоты заполнены желтой охрой и блестками мусковита.

Что касается *полезныхъ ископаемыхъ*, то ихъ Обручеву удалось обнаружить въ очень маломъ количествѣ. Во первыхъ слухи о нефтяныхъ источникахъ въ восточномъ концѣ Малаго моря ни на чемъ не основаны. Желѣзные руды не пользуются особеннымъ распространеніемъ. Въ гнейсѣ Доло-наргунскаго мыса Обручеву удалось найти плохую венису и бурый желѣзнякъ, образующій на графитовомъ известнякѣ

корку въ 0,5—1 дюйма толщиной. На поверхности холмовъ того же мыса попадаются гальки бураго и магнитнаго желѣзняка, но коренное ихъ мѣсторожденіе пока еще вовсе не извѣстно. Нахожденіе же небольшихъ залежей графита, о которыхъ было сообщено Обручеву, очень вѣроятно вслѣдствіе обилія его чешуекъ въ известнякахъ, кварцитахъ, гнейсахъ и гранитахъ. Что же касается мѣдной руды, образующей «жилу зеленовато-сѣрой песчано-слюдистой глины съ мѣдью и слѣдами серебра, толщиной въ 1—2,5 фута въ кварцевой ваккѣ», мѣсторожденіе которой описано у Георги<sup>1)</sup>, то Обручеву не удалось его видѣть, такъ какъ описаніе мѣстности у автора до того неопредѣленно, что по нему мѣсторожденія найти нельзя. Къ тому же добыча руды прекратилась 100 лѣтъ тому назадъ, и никто изъ мѣстнаго населенія не могъ Обручеву указать, гдѣ эта добыча производилась.

*Древнія наносныя образованія* состоятъ изъ красновато-желтаго, глинистаго песку, переходящаго иногда въ чистую глину. Песокъ содержитъ округлыя зерна кварца и разрушеннаго полеваго шпата, блестки біотита и мусковита. Образованія эти приурочены къ берегу Малаго моря и достигаютъ значительной мощности.

Перейдемъ теперь къ стратиграфіи породъ, слагающихъ островъ Ольхонъ, и сопоставимъ выводы Черскаго и Обручева. Отъ устья Б. Бугульдейки, по изслѣдованіямъ Черскаго, антиклинальная складка идетъ по берегу Байкала и переходитъ на Ольхонъ. Складка эта довольно полная и даетъ возможность различать въ ней сѣверо-западное и юго-восточное крылья. До мыса Уланъ-нуръ складка эта ничѣмъ не прерывается, но между Уланъ-нуромъ и мысомъ Уханъ на Ольхонѣ, вслѣдствіе дугообразно врѣзывающейся здѣсь части Байкала, складка сначала лишена своего юго-восточнаго крыла, далѣе

---

<sup>1)</sup> Georgi, Bemerk. auf einer Reise im Russ. Reiche Bd. I, стр. 57—58.

обнажаетъ свою ось (сѣвернѣе Уланъ-нура), а у Ольхонскихъ Воротъ и въ юго-западной части Ольхона утесы уже принадлежать сѣверо-западному ея крылу—это до устья рч. Идибэ, далѣе же до долины Будэ снова появляется ось складки и часть юго-восточнаго крыла. Отъ долины Будэ и до мыса Ижимэй берегъ Ольхона образованъ снова сѣверо-западнымъ крыломъ, а затѣмъ до долины Хагая складка вовсе исчезаетъ подъ уровень Байкала, совершенно также, какъ юго-западное продолженіе складки за устьемъ Бугульдейки прерывается долиной озера Байкала.

Отъ устья той же р. Бугульдейки идетъ и синкликальная складка, сопровождающая сѣверо-западный склонъ описанной выше антиклинали. Она пересѣкаетъ р. Ангу, Ольхонскія Ворота, образуетъ своими крыльями всю поверхность острова Ольхона и носитъ названіе *Ольхонской синклинали*. Сѣверо-западное крыло этой складки образуетъ юго-восточный склонъ *Приморской антиклинали*, образующей и Приморскій хребетъ. На сѣверо-восточномъ концѣ Ольхона наблюдается за Ольхонской синклиналью сперва сѣверо-западное, а потомъ юго-восточное паденіе пластовъ, дополняющее Ольхонскую синклиналь и образующее въ данномъ случаѣ еще одну *добавочную синклинальную складку*. Но такъ какъ продолженіе этой складки нигдѣ на материкѣ не наблюдается, то Черскій и рассматриваетъ ее какъ результатъ такихъ же мѣстныхъ изгибовъ слоевъ, какіе часто наблюдаются въ данной области.

Изслѣдованія Обручева подтвердили выводы Черскаго. Относительно расположенія и направленія Ольхонской синклинали оба путешественника сходятся въ своихъ мнѣніяхъ. Но между Ольхонской синклиналью и второстепенной синклинальной складкой расположена антиклиналь, гребень которой Обручевъ наблюдалъ въ скалахъ мыса Хагай. Эта складка идетъ къ мысу Уланъ-байсанъ, срывается подъ уровнемъ Малаго моря и снова обнаруживается въ оконечностяхъ мысовъ Нюргенэ, Бубукъ и Харанса.

Изученіе съ одной стороны петрографіи и стратиграфій Прибайкалья, съ другой острова Ольхона, приводитъ Обручева къ слѣдующимъ интереснымъ положеніямъ:

1) Образование складокъ въ пластахъ гранитовъ, гнейсовъ, кварцитовъ, кристаллическихъ сланцевъ и известняковъ, относится къ концу архейской эпохи, когда нынѣшнее Прибайкалье и площадь Байкальскаго озера составляла одинъ материкъ.

2) Сѣверо-западная окраина этого материка въ началѣ кембро-силурійской системы медленно опускалась. Воды, наступившія на сушу, размывали складки одну за другой, преобразовывали гористую мѣстность въ обширную плоскую равнину, которая оставалась подъ водою моря, которое продолжало наступать на ю.-в. Кристаллическія горныя породы, разрушаемыя водою, дали обильный матеріалъ для образованія мощныхъ отложений сѣровакковыхъ конгломерата, песчаника и сланца, сохранившихся въ Прибайкальѣ.

3) Въ началѣ девонской системы эта плоская равнина поднялась изъ подъ уровня моря въ видѣ «Abrasionsplatte». Поднятіе продолжалось. На с.-з. къ древнему матерiku присоединилась цѣлая полоса кембро-силурійскихъ осадковъ, которые, благодаря горообразовательнымъ процессамъ, образовали рядъ складокъ — нынѣшній Онотскій хребетъ и его сѣверо-западные предгорья. Складки эти образовались благодаря тангенціальному давленію, которое вѣроятно не передавалось на высокое плоскогорье, сложенное изъ размытыхъ складокъ архейской системы.

4) Въ послѣдующія геологическія эпохи материкъ этотъ, должно быть, не подвергался горообразовательнымъ процессамъ и не погружался совершенно подъ уровень моря, такъ что современной конфигураціей мѣстности мы обязаны размыву атмосферными водами и разрушенію атмосферными агентами. Такимъ образомъ вѣками размывались и уносились съ плоскогорья цѣлыя толщи, на мощность которыхъ указываютъ

ныѣ сохранившіяся вершины куполообразныхъ гольцовъ, и образовывались глубокія долины. Но и складки силурійскихъ породъ т. е. Опотскаго хребта подверглись сильному размыву.

5) Въ виду вышеизложеннаго Приморскій хребетъ и Ольхонскія горы относятся къ категоріи *Rumpfgebirge* или *Abrasionsgebirge*, а пересекающія ихъ долины къ долинамъ размыва (*Erosionsthäler*).

Вся изложенная выше геологія Прибайкалья и острова Ольхона на основаніи изслѣдованій Черскаго и Обручева самымъ яснымъ образомъ демонстрируется небольшой геологической картой, приложенной къ статьѣ Обручева. Тутъ приведено нѣсколько профилей, уясняющихъ поперечное строеніе о. Ольхона. Къ этой картѣ и профилямъ позволяемъ себѣ отнести интересующихся.

#### 4) Берегъ Байкала отъ р. Сармы до Заминскаго мыса или сѣверо-западный берегъ Малаго моря. Общее обозрѣніе Малаго моря и Ольхонскихъ воротъ.

Вмѣстѣ съ изученіемъ острова Ольхона мы ознакомились съ образуемымъ имъ юго-восточнымъ берегомъ Малаго моря, настоящее же изложеніе, которое мы посвящаемъ описанію, берега Байкала отъ долины р. Сармы до такъ называемаго Заминскаго мыса, дополнить наши свѣдѣнія объ этомъ проливѣ, такъ какъ оно относится къ его сѣверо-западному берегу. Горы этого берега обозрѣваются всего лучше съ Ольхона и его прибрежныхъ высотъ. Оттуда видно, что интересующій насъ берегъ Малаго моря образуется непосредственнымъ продолженіемъ Приморскаго хребта, сохраняющаго въ общемъ и всѣ особенности, которыми онъ отличался западнѣ Сармы, т. е. въ предѣлахъ юго-западной оконечности пролива. На всемъ этомъ протяженіи (около 60 верстъ) онъ является еще менѣе расчлененнымъ, и потому къ тяжелой и массивной архитектурѣ хребта присоединяется почти



полное отсутствіе вершинъ, если не считать таковыми три или четыре незначительныхъ бугорка, едва нарушающихъ почти прямолинейную линію контуровъ его видимаго гребня. Гребень къ тому же, видимо, понижается въ предѣлахъ окрестностей долины Зѡгдукъ (50 верстъ отъ Сармы), послѣ чего опять поднимается до прежней высоты. Кромѣ того наблюдаются также нѣкоторыя небезынтересныя особенности и въ склонѣ этой части хребта, обращенномъ къ Малому морю. Въмѣсто описываемой выше террасовидной верхней поверхности, обрѣзанной высокимъ крутымъ и утесистымъ склономъ и замѣчаемой еще въ промежуткѣ между долинами Сармы и Курмы (10 верстъ къ с.-в. отъ Сармы), далѣе на этомъ склонѣ можно видѣть уже цѣлый рядъ поперечныхъ къ хребту, но параллельныхъ между собою, террасовидныхъ отроговъ, понижающихся довольно постепенно къ сѣверо-востоку. Ближайшій къ озеру склонъ хребта образуется слалистыми и круто усѣченными оконечностями упомянутыхъ отроговъ, а по гребнямъ ихъ можно возстановить длинную, параллельную Малому морю, прибрежную террасу, отъ поперечнаго расчлененія которой короткими, но многочисленными долинами, образовались всѣ эти отроги. Такая высокая терраса уподобляется поэтому какъ террасѣ лѣваго берега долины р. Култучной, такъ и другимъ, съ которыми мы ознакомились на протяженіи описанной уже части берега Байкала, но главное ея отличіе состоитъ въ томъ, что она, вмѣстѣ съ образующими еѣ гребнями отроговъ, видимо и значительно понижается къ ближайшимъ окрестностямъ долины Замы, т. е. къ сѣверо-восточному концу Малаго моря, между тѣмъ, какъ къ юго-западу она достигаетъ своего высшаго гипсометрическаго уровня, приблизительно верстахъ въ 10—12 на востокъ отъ долины Курмы, гдѣ терраса эта повидимому теряется вовсе, замѣтимъ, вблизи меридіана, около котораго группируются главные острова Малаго моря. Такіе особенности описываемой террасы, при горизонтальномъ положеніи

другихъ, лежащихъ на такой же высотѣ, къ тому же въ небольшомъ отъ нея разстояніи (западнѣе Курмы и Сармы) не позволяетъ причислять наклонный уступъ этотъ къ озернымъ террасамъ и требуютъ для него другого объясненія. Объ этомъ вопросѣ будетъ сказано при общемъ обзорѣ Малаго моря и Ольхонскихъ воротъ, теперь же, замѣтивъ еще, что на описываемомъ протяженіи Приморскій хребетъ не имѣетъ уже предгорья и почти непосредственно омывается водою озера, перейдемъ къ частностямъ плаванія и изслѣдованій, произведенныхъ въ этомъ участкѣ.

А) Плаваніе вдоль сѣверо-западнаго берега Малаго моря и экскурси по нѣкоторымъ долинамъ хребта Приморскаго.

Дельта р. Сармы образуетъ собою длинную (до 5 верстъ въ основаніи) и довольно широкую (до 2 верстъ) низменную площадь, вдающуюся почти правильно полукружнымъ окончаніемъ въ Малое море, образуя этимъ Сарминскій мысъ. Площадь эта мѣстами болотистая и луговая, по большей части однако каменистая и поросшая лишь скудною травою, примыкаетъ своимъ основаніемъ непосредственно къ крутому склону Приморскаго хребта, пересѣкаемого глубокою долиною р. Сармы. Русло послѣдней, переполненное камнями, пролагается нѣсколько ближе къ юго-западной оконечности наносной площади, раздѣляется ближе къ устью на два рукава, изъ которыхъ правый опять раздваивается уже около самаго впаденія, но лѣвая вѣтвь его узкая и зарастаетъ травою. Выше этого раздвоенія въ правый рукавъ впадаетъ съ правой стороны знакомый намъ уже ключъ Талдъ, вблизи устья котораго сюда же изливается еще другой, узкій и маловодный рукавъ, отдѣлившійся отъ Сармы выше начала двухъ главныхъ вѣтвей. Въ небольшомъ разстояніи отъ оконечности дельты и въ общемъ параллельно ея полукружному очертанію распо-

лагается нѣсколько наносныхъ островковъ, изъ которыхъ одинъ узкій, но длинный, въ видѣ рифа, лежитъ на западномъ продолженіи такой же косы и порастаетъ не только травой, но и тальникомъ. Замѣтимъ здѣсь же, что на геологической картѣ Черскаго коса, о которой было сказано выше, означена по ошибкѣ въ видѣ другого длиннаго острова. За нею, вблизи расположеннаго тамъ бурятскаго улуса, лодка Черскаго была захвачена до того мгновеннымъ и сильнымъ штормомъ съ сѣверо-запада, что не взирая на очень близкое разстояніе отъ берега, путешественникамъ удалось пристать къ нему только съ величайшимъ трудомъ, причемъ необходимо было двумъ гребцамъ выскочить изъ лодки въ воду и взять её на бичеву. Въ одно мгновеніе взволновалось все Малое море; но напоръ вѣтра на ближайшую его половину былъ до того жестокимъ и обладалъ такою силою, что здѣсь, даже въ теченіи многихъ часовъ, не было возможности развиться правильному волненію, такъ какъ каждый изъ возникавшихъ гребней волнъ разбивался на множество крупно-чешуйчатыхъ площадокъ, изъ которыхъ вода поминутно захватывалась и поднималась кверху въ видѣ столбовъ бѣлаго тумана, — явленіе, которое можно было видѣть одновременно во многихъ мѣстахъ данной части поверхности пролива. Поставить палатку не было никакой возможности и потому путешественники воспользовались опрокинутою на берегу большою бурятскою лодкою и спасались подъ нею въ теченіи полуторыхъ сутокъ (15—16 августа). Огонь удалось кое-какъ поддержать лишь тогда, когда вокругъ него возвели изъ крупныхъ и плоскихъ камней настоящую стѣну, безъ которой поминутно налетавшими шквалами разбрасывались даже дрова; что же касается людей, собиравшихъ камни, то каждый изъ нихъ, коль скоро ему доводилось идти противъ вѣтра, долженъ былъ нагибаться впередъ такъ, какъ это дѣлаютъ только обремененные тяжкою ношею на спинѣ. Только послѣ такого шторма дѣлается понятнымъ, почему у Сарминскихъ и вообще прибрежныхъ

бурять всё лежащая на берегу лодки средних и малых размѣровъ привязаны веревками къ кольямъ, нарочно вбитымъ для этой цѣли, иначе ихъ нерѣдко опрокидываетъ въ воду и уноситъ въ Байкаль. Собранные сѣно, въ свою очередь, не оставляется ими въ копнахъ, а сваливается въ заготовленные для того срубы, въ видѣ избы безъ крыши, покрываясь сверху кускомъ сѣтки отъ стараго невода. Рассказываютъ даже, что бараны, пасущіеся около берега и захваченные подобнымъ штормомъ, попадаютъ иногда въ Байкаль.

Нанявъ лошадей и проводника въ ближайшемъ улусѣ, на слѣдующій день Черскій сдѣлалъ небольшую экскурсію вверхъ по долинѣ р. Сармы. Недоѣзжая мѣста выхода этой рѣки изъ Приморскаго хребта можно было видѣть, что Сарма, выше своего раздѣленія на два рукава, принимаетъ съ правой стороны еще одинъ притокъ, небольшой ключъ, называемый Хундылынъ-горхонъ. Между нимъ и описаннымъ выше Таломъ, на площади дельты возвышается острововидный бугоръ, вытянутый на сѣверо-востокъ и обнажающій роговообманковый гнейсъ съ паденіемъ пластовъ, измѣняющимся отъ ю.-в. до в.-ю.-в. Къ сѣверу отъ него, спустя еще съ версту наносной площади, достигается мѣсто выхода долины Сармы изъ хребта, весьма живописное, если смотрѣть на него еще съ дельты. Передъ самымъ выходомъ на площадь послѣдней, рѣка, какъ равно и правый берегъ ея глубокой долины, придерживаются меридіональнаго направленія, тогда какъ очень крутой и высокій лѣвый берегъ долины образуетъ значительный полукружный изгибъ съ выпуклостью къ востоку, обуславливая такимъ образомъ котловинообразное расширение, суженное около выхода на дельту понизившимся гребневиднымъ отрогомъ; а такъ какъ выше этого расширения долина Сармы поворачиваетъ къ сѣверо-западу (считая вверхъ по теченію), то все это нижнее расширение, благодаря такимъ условіямъ перспективы, имѣетъ видъ котловины, вполне замкнутой съ сѣвера. Далѣе, на мѣстѣ упомянутаго поворота, долина зна-

чительно суживается, но вскорѣ, когда рѣка принимаетъ опять меридіональное направленіе, долина вторично расширяется, продолжаясь въ такомъ видѣ около  $1\frac{1}{2}$  вер. Проѣхавъ не болѣе 4 верстъ отъ выхода рѣки изъ хребта и ознакомившись съ строеніемъ этой части его склона, Черскій возвратился къ дельтѣ чтобы осмотрѣть террасы между Сармою и Курмою, а также посѣтить одни изъ верховьевъ послѣдней. Строеніе хребта въ предѣлахъ посѣщенной части долины Сармы оказалось весьма сходнымъ съ описаннымъ выше по р. Ангѣ. Разрѣзъ начинается здѣсь съ байкальскаго (т. е. очковаго) гнейса, переходящаго въ хлоритовый и слюдяно-хлоритовый сланцы, причемъ, среди этихъ породъ, падающихъ на ю.-ю.-в., замѣчается и пропластокъ кристаллическаго известняка; сей-часъ же подъ ними залегаетъ пласть роговообманковаго гнейса, принимающаго далѣе массивное строеніе; далѣе обнажается кварцитъ въ почти отвѣсныхъ, мѣстами нѣсколько опрокинутыхъ пластахъ, и наконецъ гнейсъ, переходящій въ слюдяный сланецъ съ паденіемъ слоевъ на ю.-ю.-в. Замѣтимъ кстати, что отъ бывшаго во времена Георги мѣднаго рудника на Сармѣ нынѣ не осталось ни малѣйшаго слѣда. Изъ наносныхъ отложений здѣсь наблюдались только рѣчныя, состоящія изъ валуновъ и галекъ, такихъ же, какими выполняется и современное русло Сармы, но болѣе древнихъ, такъ какъ они образуютъ собою террасу, возвышающуюся до слишкомъ 25' надъ нынѣшнимъ дномъ долины. Въ числѣ галекъ, кромѣ упомянутыхъ выше кристаллическихъ породъ, обнаженныхъ въ склонахъ посѣщенной части долины, находится еще не малый процентъ обломочныхъ породъ, принесенныхъ очевидно съ болѣе отдаленныхъ частей долины. Въ галькахъ этихъ оказался: зелено-сѣрый метаморфическій песчаникъ, обильный блестками серебристой слюды и похожій отчасти на подчиненный толщѣ глинистыхъ сланцевъ Онотскаго хребта; въ другихъ же галькахъ подобный песчаникъ переходитъ однако въ конгломератъ, гальки котораго состоятъ не только изъ полевошпато-

выхъ породъ, но иногда и изъ глинистаго сланца, вслѣдствіе чего порода эта уподобляется уже юрскимъ конгломератамъ ближайшихъ окрестностей Байкала (Голоустная, система Бугульдейки и т. п.), гдѣ они принимаютъ зеленовато-сѣрый цвѣтъ. Рѣшеніе этого вопроса, какъ равно и опредѣленіе мѣста, откуда принесены эти гальки, дадутъ намъ будущія изслѣдованія теченія этой рѣки, о которой до сихъ поръ мы пользуемся еще весьма поверхностными свѣдѣніями. Изъ свѣдѣній, собранныхъ Чекановскимъ для его геогностической карты и маршрута Обручева съ р. Унгуры системы Манзурки въ долину Сармы, который изложенъ нами выше (стр. 315), слѣдуетъ заключить, что на протяженіи около 20 верстъ нижняго теченія Сарма придерживается въ общемъ меридіональнаго направленія, принимая съ правой стороны три притока: Глубокую и Успанъ (по Черскому Оспѣнъ), а выше ея Якшаль; верховья двухъ послѣднихъ располагаются на водораздѣлѣ между системами р.р. Анги и Манзурки, т. е. Лены), а съ лѣвой стороны Нуганъ (нѣсколько выше Якшала) съ правымъ притокомъ рч. Сухой. Что-же касается верхней половины теченія, то, по свѣдѣніямъ, доставленнымъ Черскимъ, она занимаетъ по всей вѣроятности продольную долину, такъ какъ верховья Сармы должны располагаться не въ далекомъ разстояніи отъ верховьевъ Замы (см. ниже). Въ такомъ случаѣ направленіе всей долины Сармы, длину которой считаютъ равною 70 верстамъ, напоминаетъ собою въ общемъ р.р. Ангу и Голоустную, средними теченіями которыхъ (съ с.-в. на ю.-з.) Приморскій хребетъ отдѣляется отъ Онотскаго, тогда какъ нижними первый изъ названныхъ хребтовъ пересекается болѣе или менѣе въ поперечномъ направленіи. При такомъ положеніи долины и указанномъ выше удаленіи ея отъ Байкала, не удивительно, что она должна захватывать собою и нѣкоторую часть палеозойскихъ сланцевъ и другихъ породъ, входящихъ въ составъ Онотскаго хребта, съ сѣверо-восточнымъ продолженіемъ ко-

торыхъ мы встрѣтимся еще при описаніи перевала съ долины рч. Онгурѣнь (около 75 верстъ на с.-в. отъ устья Сармы) въ систему р. Лены. Въ своемъ мѣстѣ мы опишемъ также выкладку изъ камней, приписываемую бурятами древнимъ монголамъ, которую Черскій видѣлъ около выхода Сармы на площадь дельты, причемъ выкладку эту не слѣдуетъ смѣшивать съ находящеюся тамъ же, каменною стѣною, такъ какъ послѣдняя сложена современными бурятами, чтобы не пропускать скотъ на сѣнокосныя мѣста по долинѣ р. Сармы. Осмотрѣвъ описанную часть долины, Черскій предпринявъ восхожденіе на склонъ Приморскаго хребта ближе къ сѣверо-восточной оконечности Сарминской дельты, чтобы опредѣлить высоту находящихся тамъ террасовидныхъ уступовъ. Сначала, въ незначительномъ возвышеніи около подножья хребта, онъ встрѣтилъ выходы роговообманковаго гнейса, пласты котораго падаютъ на ю.-в. Отсюда довольно крутой подъемъ привелъ путешественника къ первой террасовидной площади, возвышающейся на 218' надъ Байкаломъ. Поверхность уступа образуется головами кварцита, выступившаго изъ подъ упомянутаго выше гнейса. Съ конца этого уступа начинается самый крутой и длинный подъемъ, въ каменистой почвѣ котораго, мѣстами поросшей скудною травой, выступаютъ все полевошпатовыя породы, съ примѣсю роговообманковаго сланца, причемъ въ плохо обнаженныхъ и отчасти сдвинутыхъ выходахъ ихъ наклонъ пластовъ измѣняется отъ ю.-в.-го до в.-ю.-в.-го. Такъ продолжается до высоты 603' надъ озеромъ, гдѣ появляется третья терраса шириною до 150 сажени. Слѣдуя вверхъ по ея наклонной поверхности, достигаютъ болѣе высокаго, плохо развитаго уступа на высотѣ 813', а затѣмъ наблюдаются ясныя слѣды другого т. е. пятаго уступа, достигающаго 928' надъ Байкаломъ, слѣдовательно, той высоты, на которой, въ высокой террасѣ юго-западной оконечности Байкала, на которой находятся даже грядки валуновъ и галекъ. На по-

верхности трехъ послѣднихъ террасъ наблюдается осыпь слюдястаго кварцита, среди котораго изрѣдка попадаются куски слюдянаго сланца, а выше и байкальскаго гнейса. Наконецъ, слѣдующій подъемъ совершался вверхъ по сухой, овраговидной долинкѣ, которая привела путешественника къ краю высшей, пологой поверхности склона хребта, гдѣ ане-роидъ показалъ 1669' надъ Байкаломъ. Поверхность эта, поросшая хвойнымъ лѣсомъ, въ свою очередь уподобляется пологой террасовидной площади, но отношеніе ея къ высшимъ пунктамъ хребта затемняется лѣсною растительностью. Въ осыпи все тотъ же кварцитъ, выступы котораго, обнаженные въ долинкѣ, обнаружили наклонъ пластовъ, измѣняющійся отъ с.-с.-з. до ю.-ю.-в.-го. Ольхонскія ворота, вѣрнѣе мысъ Хоринъ-ирги, видѣнь былъ отсюда на ю.-в. 15.

Съ Сарминской дельты Черскій отправился верхомъ по берегу Байкала къ рѣкѣ Курмѣ, отстоящей въ 10 верстахъ къ сѣверо-востоку отъ устья Сармы, чтобы посѣтить одно изъ верховьевъ этой рѣки. За дельтою располагается пространная бухта Халэ, достигающая около 5 верстъ въ ширину и ограниченная съ сѣверо-востока первымъ изъ трехъ Курминскихъ мысовъ, названнымъ Хадыртуй (см. ниже). Наносный, а мѣстами и каменный берегъ сѣживается по мѣрѣ приближенія къ глубинѣ бухты, врѣзавшейся близко къ крутому склону Приморскаго хребта. Здѣсь тропа пересѣкаетъ ручеекъ, извѣстный подъ названіемъ Ныгдѣнь-горхонъ, а сейчасъ же далѣе и болотистый Халэ, отъ котораго бухта получила названіе. Оконечность бухты нѣсколько раздвоена, вѣрнѣе, представляетъ двойной полулунный изгибъ, вслѣдствіе находящагося за устьемъ Халэ мысовиднаго выступа. Известнякъ, выступавшій и на побережьи западнѣе Ныгдѣнь-горхона, видѣтся и въ склонѣ хребта, восточнѣе Халэ. Мысъ Хадыртуй, какъ ограничивающій бухту Халэ съ сѣверо-востока, является первымъ изъ трехъ, такъ называемыхъ Курминскихъ мысовъ, располагающихся рядомъ



па протяженіи около 4 верстѣ. Всѣ они отличаются небольшою высотой (25—40'), но длинны (болѣе версты) и узки, къ тому же въ общемъ принадлежать къ острововидному типу, такъ какъ скалистыя ихъ части отдѣляются отъ материка наносною полосою. Самыми длинными скалистыми частями отличаются именно: Хадыртуй и крайній сѣверо-восточный т. е. Саганъ-хушунъ, въ которомъ наблюдаются три главныя вершины: двѣ юго-восточныя, округленныя, и одна сѣверо-западная, усѣченная, напоминающая собою столовую гору малыхъ размѣровъ; въ составъ обоихъ мысовъ входитъ и пластъ известняка, пересекающій ихъ въ діагональномъ направленіи. Средній Курминскій мысъ, называемый Уэго, длиннѣе всѣхъ, уже и нѣсколько болѣе приближается къ меридіональному направленію (ю.-ю.-в.); онъ принадлежитъ къ весьма типическимъ острововиднымъ формамъ мысовъ, отличающаяся небольшою, бугровидною, скалистою оконечностью и длиннымъ, низменнымъ перешейкомъ, состоящимъ изъ прибойнаго матеріала. Между тѣмъ побережье, съ которымъ связаны эти мысы, изображаетъ собою террасовидную площадь отъ 25 до 60' высоты; въ немъ обнажается охристо-желтый глинистый песокъ съ галькою, въ видѣ озернаго отложенія, образовавшагося при болѣе высокомъ уровнѣ водъ Байкала. Названными мысами ограничиваются двѣ, глубоко врѣзавшіяся Курминскія бухты, западная и восточная, спеціальныя названія которыхъ не передаются въ имѣющейся литературѣ. Насупротивъ восточной изъ нихъ, въ разстояніи около версты отъ прилежащихъ мысовъ, располагаются три острова, размѣщаясь на одной линіи съ ю.-з. на с.-в. Два крайніе: Шарага-даганъ (ю.-з.-й) и Борого-даганъ (с.-в.-й) небольшихъ размѣровъ и повидимому менѣе 20' высоты, тогда какъ діаметръ средняго, извѣстнаго подъ названіемъ Борокчугунъ, достигаетъ повидимому около одной версты, а въ профилѣ онъ обнаруживаетъ нѣсколько довольно заостренныхъ вершинъ, изъ которыхъ высшая, лежащая почти на половинѣ

длины острова, достигаетъ повидимому не менѣе 200'. Съ дороги видно, что въ составъ этихъ скалистыхъ острововъ, кромѣ темныхъ, по всей вѣроятности полевошпатовыхъ породъ, входятъ еще и бѣлая, должно быть известнякъ. Околѣ основанія мыса Уэго располагается лѣтній бурятскій улусъ, называемый Курминскимъ, тогда какъ зимній улусъ построенъ около восточнаго мыса, т. е. Саганъ-хушунъ, за которымъ, на луговомъ, а отчасти и болотистомъ побережьи, находится устье рѣчки Курмы, протекающей здѣсь черезъ небольшое озеро, играющее роль прибрежной лагуны. Отсюда отърывается видъ на глубокую долину этой рѣчки, длина которой, какъ говорили буряты, не достигаетъ даже и 10 верстъ, врѣзавшись въ хребетъ въ юго-восточномъ направленіи. Кромѣ того здѣсь хорошо наблюдаются и особенности Приморскаго хребта въ промежуткѣ между правымъ берегомъ долины Курмы и Ныгденъ-горхономъ. На первомъ планѣ здѣсь весьма рѣзко обрисовывается длинный террасовидный уступъ, наклоняющійся почти подъ угломъ  $15^{\circ}$  къ долинѣ Курмы, гдѣ онъ, повидимому, не выше 30 футовъ. За нимъ уже высится крутой склонъ хребта, верхняя часть котораго, со стороны долины Курмы, имѣетъ видъ какъ бы горизонтальной, террасовидной площади. На этой послѣдней, къ западу, въ нѣкоторомъ отдаленіи отъ праваго берега названной долины, возвышается очень широкая и плоскоокругленная въ профилѣ, вершина, за которою далѣе располагаются еще двѣ незначительной величины. Надо замѣтить однако, что въ своихъ описаніяхъ Черскій предувѣдомляетъ, что употребляемые имъ выраженія: «округленныя, или куполообразныя вершины» слѣдуетъ понимать только въ смыслѣ особенностей очертанія одного изъ видимыхъ съ даннаго мѣста профилей этихъ вершинъ, а не какъ выраженіе дѣйствительной ихъ формы, такъ какъ извѣстно, что даже многія узкія, гребневидныя вершины могутъ казаться плоскоокругленными и куполовидными при взглядѣ на ихъ продольный разрѣзъ, тогда

какъ въ поперечномъ гребень такой покажется въ видѣ заостренного пика почти альпійскаго типа. Что же касается дѣйствительно куполообразныхъ возвышеній почвы и такихъ же вершинъ, то таковыя, коль скоро они достаточно строго констатированы, должны быть оговорены съ большею подробностью и опредѣленностью, имѣя въ виду возможность судить о способахъ происхожденія, связаннаго нерѣдко съ бывшимъ облѣднѣніемъ мѣстности. На этотъ склонъ Приморскаго хребта, западнѣ долины Курмы, ведетъ тропа, по которой Черскій направился для обозрѣнія праваго верховья этой рѣчки. Экскурсія эта показала что склонъ хребта снабженъ гораздо большимъ числомъ уступовъ, чѣмъ можно было предполагать при взглядѣ на него съ нѣкотораго отдаленія, что объясняется густотою порастающей его хвойной растительности. Съ прибрежной террасовидной площади, возвышающейся до 96' надъ уровнемъ озера, путешественникъ, въ сопровожденіи двухъ бурятъ, сталъ подниматься на склонъ хребта, гдѣ, на высотѣ 316', встрѣтили первый уступъ, а затѣмъ и второй, на которомъ anerонидъ показалъ 727' надъ Малымъ моремъ. На пути этомъ встрѣчались только осыпи слюдянаго сланца, переходящаго отчасти въ гнейсъ, отчасти же въ рогово-обманковый и даже хлоритовый сланцы. Встрѣченный далѣе третій уступъ является въ видѣ пространной террасы, достигающей 1111' высоты и видимо повышающейся къ юго-западу, гдѣ высота ея равняется 1581'. Тропа, изгибавшаяся зигзагомъ для облегченія подъема, поворачиваетъ наконецъ къ краю склона праваго берега долины Курмы и достигаетъ высшаго уступа, высота котораго измѣнялась отъ 1870 до 1967' надъ Байкаломъ. На немъ очевидно возвышаются описанныя выше вершины хребта, но видъ на нихъ затемнялся древесною растительностью, значительная часть которой состояла изъ кедровъ. Въ осыпяхъ встрѣчался только Байкальскій гнейсъ. Спусти 2 часа и 20 минутъ ѣзды, путешественники спустились въ продолговатое, довольно обширное,

во плоское углубленіе почвы, вытянутое съ запада на востокъ и лежащее на высотѣ 1509' надъ Байкаломъ. Дно углубленія покрыто было очень крупною розсыпью кварцита и гнейса, а съ сѣверо-западной стороны этой озеровидной долины обнажались слюдяный и слюдяно-хлоритовый сланцы съ наклономъ пластовъ на ю.-ю.-в. Въ одномъ мѣстѣ лежалъ еще остатокъ прошлогодняго снѣга. Въ этой котловинообразной долинѣ беретъ начало ручеекъ, считаеый бурятами правымъ верховьемъ Курмы, къ долинѣ которой онъ направляется на в.-ю.-в. Видимыя съ дороги высія части Приморскаго хребта ничѣмъ не измѣняютъ тому орографическому характеру, какой обнаруживается и при взглядѣ на часть его, видимую съ Байкала и Ольхона (см. выше). На обратномъ пути буряты иногда останавливались и, сотрясая кедровыя деревья ударомъ топора, сбивали съ нихъ шишки и отыскивали ихъ затѣмъ въ травѣ. Заключающіеся въ нихъ орѣхи оказались уже достаточно развитыми для того, чтобы употреблять ихъ въ пищу (18 августа ст. стила). Въ противоположность русскому населенію береговъ Байкала, обыкновенно мало знакомому съ подробностями подраздѣленій странъ свѣта или такъ называемой розы вѣтровъ (см. ниже), буряты, уже съ дѣтства, привыкаютъ различать: *хойта* или *хойша* т. е. сѣверъ, *урякша* т. е. югъ, *барунъ тэйше* (сокращенно: барунша), т. е. западъ, *зунъ-тэйше* — востокъ (сокращенно: зунше) и ориентируются ими даже въ юртѣ; въ специальныхъ же случаяхъ они указываютъ еще на *зунъ-хойта* (сѣверо-востокъ), *зунъ-урякша* (юго-востокъ), *барунъ-урякша* (юго-западъ) и *барунъ-хойта* (сѣверо-западъ). Во время упомянутыхъ выше поисковъ кедровыхъ шишекъ, Черскій имѣлъ случай убѣдиться, съ какою легкостью буряты различаютъ названныя румбы компаса: когда въ безуспѣшныхъ поискахъ одинъ изъ бурятъ стоялъ наклонившись къ травѣ и головою къ югу, ему крикнули вдругъ: *барунъ-хойта!* (сѣверо-западъ); — онъ сдѣлалъ быстрый поворотъ именно въ эту сторону и поднялъ лежавшую тамъ искомую

добычу <sup>1)</sup>. Впослѣдствіи отъ Онгурѣнскихъ бурятъ Черскій слышалъ, что около рѣки Курмы, гдѣ-то, на высокой горѣ, должна находится древняя «монгольская постройка», но рассказчикъ не видѣлъ ея лично и потому не могъ сообщить: стѣна-ли это или какое-либо другое сооруженіе.

Имѣя въ виду почти ежедневные, весьма сильные вѣтры и время года, въ которое штормы на Байкалѣ должны усиливаться и учащаться даже при нормальномъ теченіи атмосферическихъ условій, Черскій рѣшилъ отправить лодку съ работниками и собранными коллекціями обратно въ Иркутскъ, а самъ съ проводникомъ, бурятомъ изъ Сарминскаго улуса, направился берегомъ Малаго моря, а затѣмъ и Байкала до улуса Онгурѣнъ (см. ниже), такъ какъ оттуда, согласно программѣ изслѣдованій, онъ долженъ былъ перевалить черезъ Приморскій хребетъ и выйти на р. Лену, около того мѣста, гдѣ къ ней подходитъ такъ называемый якутскій трактъ, проложенный, какъ намъ уже извѣстно, почти вдоль юго-восточной границы плоской возвышенности. Разставшись такимъ образомъ съ своими спутниками около описанныхъ выше Курминскихъ мысовъ, Черскій продолжалъ изслѣдованіе берега озера къ сѣверо-востоку отъ устья р. Курмы.

Если обозрѣвать всю эту часть сѣверо-западнаго берега Малаго моря, отъ восточнаго Курминскаго мыса до ближайшаго изъ двухъ Заминскихъ мысовъ, т. е. на протяженіи 47 верстъ, считая по прямому направленію, то она образуетъ собою длинную, но плоскую бухтовидную выемку, врѣзавшуюся въ побережье на 4 версты, если измѣрять этотъ изгибъ съ выступомъ оконечности восточнаго Курминскаго мыса, Саганъ-хушунъ. Вся эта выемка подраздѣляется на восемь второстепенныхъ бухтъ, благодаря соотвѣтственному числу выдающихся здѣсь, довольно значительныхъ мысовъ.

---

<sup>1)</sup> На стр. 73-й XII т. № 4 и 5 Извѣстій Вост. Сиб. Отдѣла И. Р. Геогр. Общества, по ошибкѣ *барунъ* названъ востокомъ.

Такимъ образомъ въ 10 верстахъ за Курмою располагается мысъ Уланъ-хѣнъ; слишкомъ 5 верстъ далѣе—Ядыртуѣ или Ядыртѣ (э, въ этомъ случаѣ выговаривается какъ французское *em*); спусть съ 3 версты—Юнхѣкъ; верстъ съ 5 за нимъ Отѣ-хушѣнъ, легко узнаваемый по весьма удлиненной и заостренной оконечности въ противоположность другимъ, округленнымъ. Около 4 верстъ далѣе, слѣдуетъ мысъ Хужиръ, за которымъ верстахъ въ 3-хъ находится одинъ Безъимянный; въ 8 верстахъ отсюда располагается мысъ Зогдукъ, вѣрнѣе дельта соименной рѣчки (см. ниже) и наконецъ, въ 6 верстахъ далѣе первый Замѣнскій мысъ, скалистый и острововидный. Малое море опоясывается здѣсь вообще узкимъ, однообразнымъ побережьемъ, отчасти каменистымъ, отчасти съ луговымъ и даже степнымъ характеромъ; только въ предѣлахъ мысовъ полоса эта расширяется мѣстами до 1 версты и нѣсколько болѣе. На оконечности Ядыртуа находится озерко безъ истока и отдѣленное отъ Байкала узкою полоскою прибойнаго матеріала, за нимъ, въ бухтѣ Юнхѣкъ, виднѣются еще два озера. Не менѣе однообразенъ и крутой склонъ Приморскаго хребта (см. выше), мѣстами поросшій лѣсомъ до самаго подножья (Уланъ-хѣнъ), мѣстами же болѣе или менѣе скалистый. Многія сухія долинки изрѣзываютъ его въ особенности обильно въ промежуткѣ между Ядыртуемъ и Ото-хушѣномъ, мѣстами же, на протяженіи до 10 верстъ, склонъ этотъ вовсе не расчленяется и принимаетъ брустверовидную наружность. Самыми глубокими изъ долинь являются Уланъ-хѣнъ, Ото-хушѣнъ и Зогдукъ, занятые соименными рѣчками, изъ которыхъ послѣдняя самая значительная (см. ниже).

Произведенныя Черскимъ геологическія изслѣдованія на этомъ протяженіи обнаружили слѣдующее строеніе Приморскаго хребта. Вмѣстѣ съ устьемъ рч. Курмы исчезаетъ перемежаемость полевошпатовыхъ породъ съ кристаллическимъ известнякомъ, образующая, какъ мы видѣли въ

своемъ мѣстѣ, верхній ярусъ древнѣйшей кристаллической толщи; изъ подъ нея, въ промежуткѣ между Курмою и ближайшими окрестностями Ото-хушѹна, т. е. на протяженіи болѣе 20 верстъ, выступаютъ пласты тѣхъ, болѣе глубокихъ, кристаллическихъ породъ, которыя мы встрѣчали обыкновенно, пересѣкая центральную или осевую часть того же хребта, какъ напр. по Голоустной, Бугульдейкѣ, Ангѣ и т. п., а именно: слюдяный и хлоритовый сланцы, очковый гнейсъ, гранито-гнейсъ и роговообманковый гнейсъ, безъ пропластковъ известняка. Но, около Ото-хушѹна, склонъ хребта вдругъ бѣлѣетъ и въ немъ опять мы видимъ перемежающійся съ роговообманковымъ гнейсомъ и сланцемъ известнякъ. Породы эти занимаютъ собою всю остальную часть склона до Заминскихъ мысовъ, и только далѣе на сѣверо-востокъ, какъ мы увидимъ ниже, вторично выступаютъ породы нижняго яруса полевошпатовой толщи.

Въ тектоническомъ отношеніи не безынтересно во-первыхъ, что пласты всѣхъ этихъ породъ пересѣкаются долиною Байкала діагонально къ ихъ простиранію, и что простираніе это (в.-с.-в.) не совпадаетъ съ направлениемъ Приморскаго хребта, а въ свою очередь пересѣкаетъ его въ діагональномъ направленіи, изъ чего видно, что хребетъ этотъ, точно также какъ Тункинская цѣпь и Саянъ (см. выше), представляетъ собою только орографическую, а никакъ не тектоническую форму, и своимъ происхожденіемъ обязанъ только образованію прилежащихъ къ нему главныхъ долинъ: Байкальской съ одной стороны, а верхняго теченія р. Сармы съ другой. Во-вторыхъ, не взирая на то, что полоса кристаллическихъ породъ нижняго яруса, развитая между Курмою и Ото-хушѹномъ, опоясывается съ обѣихъ сторонъ породами верхняго яруса той же толщи, изслѣдованіе этой части склона хребта показало, что пласты какъ тѣхъ, такъ и другихъ породъ наклонены вполне согласно и довольно круто на ю.-ю.-в. и только въ двухъ мѣстахъ, между Курмою и Юнхукомъ, наблюдалось с.-с.-з-ое на-

деніе: въ одномъ, западнѣе мыса Уланъ-хынъ, паденіе это, быть можетъ, вполне мѣстное, зависящее отъ позднѣйшаго перемѣщенія обнаженныхъ тамъ головъ сланцевъ, но въ долину Юнхукъ оно имѣетъ уже другой характеръ и наблюдается на болѣе высокомъ уровнѣ, хотя скоро опять переходитъ въ ю.-ю.-в.-ое. Стратиграфическія условія эти Черскій объясняетъ тѣмъ обстоятельствомъ, что здѣсь мы имѣемъ дѣло не съ крыломъ одной какой либо складки пластовъ, а напротивъ, съ двумя опрокинутыми складками, а именно: одною антиклинальною, осевую часть которой (между Курмою и Отохушунуомъ) образуютъ породы нижняго яруса, а другою синклинальною, состоящею изъ перемежающихся съ известнякомъ роговообманковыхъ породъ т. е. изъ породъ верхняго яруса развитыхъ между Отохушунуомъ и Замою, вслѣдъ за которою, какъ мы увидимъ ниже, вторично выступаютъ породы нижняго яруса. Обѣ эти складки являются сжатыми съ боковъ и опрокинутыми на с.-с.-з., вслѣдствіе чего во-первыхъ, ближе къ уровню озера, въ нихъ наблюдается только одинъ ю.-ю.-в. наклонъ пластовъ, а во-вторыхъ, члены верхняго яруса являются ущемленными между слоями болѣе глубокихъ полевошпатowychъ породъ, а потому, наблюдая ихъ около Отохушуна, мы видимъ породы верхняго яруса залегающими подъ нижнимъ, между тѣмъ какъ около долины Замы они покрываютъ собою послѣдній.

Нѣкоторую часть описываемаго берега Малаго моря имѣлъ возможность осмотрѣть и Радде въ 1855 г. Какъ сказано было выше, крайнимъ сѣверо-восточнымъ пунктомъ наблюденій этого путешественника на островѣ Ольхонѣ была знакомая уже намъ бухта Харанса, лежащая почти на половинѣ длины сѣверо-западнаго берега острова; отсюда 5 іюля, въ 4 часа утра, онъ снялся съ якоря, чтобы переплыть на материковый берегъ Малаго моря, взявъ курсъ къ сѣверо-западу. Ширина пролива достигаетъ здѣсь нѣсколько болѣе 15 верстъ (по Радде 14 в.), которая онъ проплылъ въ теченіи  $7\frac{1}{2}$  часовъ.



Почти на самой средней линіи длины пролива, спустя 4 ч. плаванія (въ 8 ч. утра), Радде сдѣлалъ *промѣръ глубины Малаго моря* въ этомъ мѣстѣ; она оказалась равною  $88\frac{3}{4}$  аршинамъ, т. е. 63 метрамъ или 207 футамъ. Не взирая на застигшее ихъ въ концѣ сильное волненіе съ востока, путешественники въ  $11\frac{1}{2}$  часовъ утра пристали къ берегу, должно быть, около восточныхъ окрестностей мыса Хужыръ (см. выше), такъ какъ изъ дневника видно, что мѣсто пристани располагалось около 8 верстъ къ юго-западу отъ рч. Зогдукъ. Берегъ образовался изъ прибойной гальки, а въ разстояніи отъ  $\frac{1}{2}$  до 1 версты отъ воды поднимался склонъ хребта. Радде говорить здѣсь о цѣломъ рядѣ конусовидныхъ вершинъ, изъ которыхъ берутъ начало узкія долинки, по большей части высыхающія лѣтомъ; часть такихъ конусовъ совершенно обнажена, другая слегка поросла лѣсомъ <sup>1)</sup>. По замѣчанію Черскаго <sup>2)</sup>, подъ этими «конусами» слѣдуетъ понимать рядъ нерѣдко гребневидныхъ оконечностей упомянутыхъ выше короткихъ отроговъ, которые произошли отъ расчлененія значимаго намъ уже уступа поперечными и параллельными ложбинами, что же касается высшихъ частей Приморскаго хребта, то къ нимъ не можетъ относиться приведенное описаніе Радде, такъ какъ они характеризуются отсутствіемъ дифференцировки и потому о какихъ либо коническихъ вершинахъ здѣсь не можетъ быть и рѣчи. Во время экскурсіи, совершенной Радде вдоль одной изъ упомянутыхъ выше ложбинъ, убитъ альпійскій жаворонокъ (*Alauda alpestris*); далѣе, въ узкой горной долинѣ, онъ встрѣтилъ богатую растительность, произрастанію которой споспѣшествовало здѣсь достаточное орошеніе ключемъ, стремившимся по известковой почвѣ. Здѣсь цвѣли красивыя дельфиніи и акониты, какъ равно большецвѣтныя герани; нерѣдкими были круглолистая ива и бальзамическій

<sup>1)</sup> Radde, Reisebericht. I. c. pag. 268.

<sup>2)</sup> Черскій, Рукописныя замѣтки о Сибирѣ.

тополь. Собрана была также не малая энтомологическая коллекція: *Lусаепае*, *Argynnis* и перепончато-крылыхъ.

На слѣдующій день, утромъ, Радде достигъ улуса Зогдукъ, называемаго имъ неправильно Сурдукъ. Улусъ состоитъ изъ 12 юртъ, расположенныхъ вблизи устья соименной рѣчки, дельтою которой образуется и мысъ, носящій тоже названіе. Съ низовьями рѣчки Зогдукъ знакомить насъ маршрутъ Черскаго, такъ какъ верховая дорога въ Заму, проложенная сначала вверхъ по ея теченію, затѣмъ поворачиваетъ по лѣвой вѣтви долины къ сѣверо-востоку, чтобы перевалить черезъ отрогъ, отдѣляющій Зогдукъ отъ Заминской долины, такъ какъ оконечность его, со стороны Байкала, какъ говорили буряты, мѣстами омывается непосредственно водою и мѣшаетъ проѣзду по самому берегу. Долина Зогдука должна достигать не менѣе 10 верстъ длины при юго-восточномъ направленіи; она очень глубокая и въ той части, въ которой ее видѣлъ Черскій, отличается достаточною шириною и малымъ наклономъ дна. Склоны нижней части долины опускаются къ ней очень крутыми и высокими скалами, въ которыхъ обнажается перемежающійся съ полевошпатовыми породами известнякъ и доломитъ. Здѣсь же выступаетъ и доломитовая брекчія, образовавшаяся на мѣстѣ кореннаго ея нахожденія отъ растрескиванія доломитоваго пласта на вообще мелкіе кусочки, слѣпленные какъ доломитовымъ, такъ и известняковымъ цементомъ краснаго цвѣта; пласты падаютъ на ю.-ю.-в. Брекчія эта интересна въ томъ отношеніи, что похожая на нее встрѣчена Черскимъ и на противоположномъ берегу Байкала, почти съ точностью на продолженіи линіи простиранія этой породы (см. ниже, группа Ушканьихъ острововъ). Не взирая на указанный выше небольшой наклонъ дна и русла, достигающаго въ низовьяхъ не болѣе 2 саженой ширины, русло усѣяно здѣсь большими и хорошо округленными глыбами очковаго (байкальскаго) гнейса, достигающими иногда до 5 футовъ въ діаметръ и принесенными очевидно съ нѣкотораго отдаленія,

такъ какъ на протяженіи нижнихъ 2 верстъ теченія, порода эта не найдена здѣсь вовсе, хотя верховья рѣчки должны лежать уже въ предѣлахъ развитія породъ нижняго яруса. При отсутствіи какихъ либо данныхъ для того, чтобы допустить переносъ такихъ глыбъ не воднымъ путемъ, остается полагать, что глыбы эти перекатывались сюда постепенно и остались здѣсь еще съ тѣхъ поръ, какъ русло Зогдука отличалось значительнымъ паденіемъ, послѣ чего ослабленная сила размыва могла здѣсь углублять долину только выщелачиваніемъ и удаленіемъ удоборазрушимыхъ слоевъ верхняго яруса, не будучи въ состояніи передвигать накопившуюся массу большихъ валуновъ и глыбъ. При обсужденіи этого вопроса, какъ замѣчаетъ Черскій <sup>1)</sup>, необходимо имѣть въ виду и то обстоятельство, что во время зарожденія долины Зогдукъ, значительно разрушенныя нынѣ складки породъ могли быть въ болѣе цѣльномъ видѣ, а въ такомъ случаѣ, при описанномъ выше, опрокинутомъ ихъ состояніи, вершина складки, развитой между Курмою и Ото-хушуномъ, могла возвышаться надъ мѣстомъ, занятымъ нынѣ долиною интересующей насъ рѣчки. Вода Зогдука, въ такомъ случаѣ, прежде нежели углубится въ породы нижняго яруса, среди которыхъ проложено современное низовье рѣчки, должна была размыть опрокинутую на нихъ складку съ байкальскимъ гнейсомъ. На все сказанное можно смотрѣть однако не иначе, какъ на вопросы, рѣшеніе которыхъ представить въ будущемъ детальное изслѣдованіе интересующей насъ долины; что же касается означенной въ ея верховьяхъ полосы байкальскаго гнейса, то это сдѣлано Черскимъ только предположительно, основываясь на описанныхъ выше валунахъ этой породы; самъ же онъ, приблизительно въ 3 верстахъ выше устья Зогдука, перевалилъ черезъ сосѣдній отрогъ горъ въ долину рч. Замы.

---

<sup>1)</sup> Черскій, Рукописныя замѣтки о Сибири.

Переваль этотъ не превышаетъ 700' надъ Байкаломъ и отличается довольно плоскою поверхностью, поросшею смѣшаннымъ лѣсомъ, въ которомъ листья березы оказались уже совершенно сжатыми и опадающими (20-го августа). Въ осыпяхъ и отдѣльныхъ глыбахъ встрѣчались только роговообманковый гнейсъ, хлоритовый и слюдяной сланцы. Отложимъ описаніе долины рч. Замы до слѣдующаго параграфа нашего изложенія, такъ какъ долина эта выходитъ уже за предѣлы границъ Малаго моря, теперь-же приступимъ къ общему обозрѣнію послѣдняго въ связи съ окружающею его полосою горъ и Ольхонскими воротами, основываясь на изложенныхъ выше данныхъ.

Б) Общее обозрѣніе Малаго моря и Ольхонскихъ воротъ; вопросъ о происхожденіи этихъ частей Байкала.

Описанными выше склонами какъ материковой части горъ, такъ и острова Ольхона, обрисовывается площадь Малаго моря, представляющаго собою одну изъ самыхъ большихъ отдѣльныхъ частей озера Байкала. Наибольшая длина Малаго моря, считая по средней линіи, достигаетъ около 74 верстъ, вытягиваясь и постепенно расширяясь къ сѣверо-востоку, гдѣ оно открывается къ Байкалу въ роли юго-западной вѣтви сѣверо-восточной части озера (см. выше). Наибольшая ширина этого пролива, не превосходящая 17 верстъ, располагается въ сѣверо-западной его половинѣ (западнѣе мыса Зогдукъ), тогда какъ въ юго-западной трети длины ширина его не превышаетъ 10 верстъ, а самая оконечность, т. е. заливъ Хушилху, суживается уже до значенія затопленнаго низовья соименной долины. Въ предѣлахъ Малаго моря располагается 12 описанныхъ выше скалистыхъ острововъ, какъ-то (считая съ ю.-з. на с.-в.): Харгойскій, Тойнокъ, Хыбинъ, Угунгой, Шарага-даганъ, Борокчй-угунъ, Борого-даганъ, Зумугбй, Ядыртуй,

Харанса, Модотѣ и Ядорѣ, изъ которыхъ, за исключеніемъ трехъ послѣднихъ, всѣ принадлежать юго-западной половинѣ пролива. Половина всего числа острововъ, т. е. шесть (отъ Хыбина до Зумугоя включительно), въ томъ числѣ острова, всего болѣе удаленные отъ берега, группируются на границѣ юго-западной четверти длины Малаго моря, гдѣ ширина его ниспадаетъ мѣстами даже до 4 верстъ (въ предѣлахъ Курминскихъ мысовъ). Въ 9 верстахъ отъ юго-западной оконечности Малаго моря, насупротивъ выхода долины р. Сармы изъ Приморскаго хребта, гдѣ ширина пролива колеблется между  $3\frac{1}{2}$  и 4 верстами, располагаются Ольхонскія ворота (Амынь у бурятъ), посредствомъ которыхъ Малое море соединяется со среднею частью Байкала. Длина Воротъ имѣняется отъ 7 (по Ольхонскому берегу) до 8 верстъ (по материковому), тогда какъ ширина этого узкаго зунда достигаетъ отъ  $2\frac{1}{2}$  до менѣе 2 верстъ, если не обращать вниманія на его заливы и бухты. Направленіе Воротъ въ общемъ поперечное къ длинѣ какъ Малаго моря, такъ и бухтъ, открывающихся въ Ворота. Число большихъ, заливообразныхъ бухтъ, принадлежащихъ этому зунду, равняется пяти; изъ нихъ три, т. е.: Тутская, Базарная и Куркутская вѣзаны въ материковый берегъ, а Хоринъ-иргѣ и Зѣгли въ Ольхонской. Самыя сѣверныя бухты: Куркутская и Хоринъ-иргѣ, какъ равно и слѣдующія за ними къ югу, Базарная и Зѣгли, открываются къ Воротамъ парно, на встрѣчу другъ къ другу, въ родѣ діаметрально противоположныхъ притоковъ этой главной долины, что же касается Тутской бухты, то она не имѣетъ себѣ соотвѣтствующей на Ольхонской сторонѣ. — Свѣдѣнія наши о глубинѣ обзорѣваемыхъ частей озера Байкала до сихъ поръ, къ сожалѣнію, очень ограничены, не взирая на весь интересъ, представляемый ими для специальныхъ этюдовъ. Только благодаря единственному, но столь удачно выбранному мѣсту промѣра Радде, о которомъ вы говорили уже выше, мы знаемъ, что

глубина сѣверо-восточной половины Малаго моря достигаетъ 207', внѣ этого пункта остаются, разумѣется, одни лишь возможные здѣсь общія воззрѣнія на рельефъ дна этихъ частей, которыя мы заимствуемъ изъ отчетовъ Черскаго, какъ соображенія, бросающія нѣкоторую долю свѣта на орографическую роль Малаго моря и связанныхъ съ нимъ Ольхонскихъ воротъ.

Изъ всѣхъ подробностей, изложенныхъ въ предшествующихъ параграфахъ мы видимъ, что островъ Ольхонъ образуетъ собою безспорное, какъ орографическое, такъ и сгратиграфическое продолженіе горъ описанной нами «Прибрежной полосы», образующихъ между прочимъ и юго-восточный берегъ залива Хушилху, т. е. юго-западной оконечности Малаго моря, причемъ островъ этотъ обнаруживаетъ нѣкоторыя топографическія особенности, представляющія не малый интересъ для нашей цѣли. Сказанное относится главнымъ образомъ къ изрѣзывающимъ его долинамъ, которыя, за исключеніемъ нѣсколькихъ овраговъ, гдѣ размывъ продолжается современными, періодическими водами, принадлежать къ категоріи вымершихъ, а по своей древности никакъ не моложе сосѣднихъ материковыхъ долинъ и вмѣщаютъ въ себѣ тѣже послѣтретичные осадки Байкала (слоистый песокъ), болѣе или менѣе пострадавшіе отъ позднѣйшихъ размывовъ. Въ расположеніи этихъ долинъ для насъ всего важнѣе то обстоятельство, что въ западной трети длины Ольхона древнія долины отличаются юго-западнымъ направленіемъ, слѣдовательно, противоположнымъ долинамъ Хушилху и другимъ материковымъ долинамъ. Явленіе это начинается самымъ выразительнымъ образомъ съ знакомаго намъ уже, Шибѣтскаго мыса. Какъ извѣстно, мысъ этотъ, располагаясь въ точкѣ всего болѣе выдающейся здѣсь къ сѣверу и вытягиваясь всею своею длиною на юго-западъ, составляетъ правый берегъ Шибѣтской долины и ея затопленной нынѣ части, превращенной въ бухту того-же имени, откры-

тую въ ту же сторону (ю.-з.), вдоль берега Ольхона. Въ известномъ отдаленіи отъ оконечности этого мыса и на правомъ его продолженіи находится длинный и параллельный берегу Ольхона островъ Угунгой (см. выше), дополняя и продолжая правый берегъ затопленной и поврежденной такимъ образомъ Шибэтской долины. Такое-же значеніе имѣетъ и Харгойская бухта, лежащая на томъ берегу Ольхона, но въ 9 верстахъ западнѣе Шибэтской. Она является въ видѣ такой-же затопленной долины, параллельной Шибэтской, отъ которой уже на меридіанѣ острова Угунгой, она отдѣляется лишь узкимъ Харгойскимъ отрогомъ, образующимъ какъ правый берегъ соименной долины, такъ и мысъ той ея части, которая превращена нынѣ въ бухту; даже лежащій западнѣе островокъ Хыбинъ отличается почти такимъ же отношеніемъ къ Харгойскому мысу, какъ Угунгой къ Шибэтскому, хотя во всякомъ случаѣ, Харгойская долина, какъ болѣе короткая, могла составлять только лѣвую вѣтвь Шибэтской. Возстановляемая такимъ образомъ система Шибэтской долины направляется на встрѣчу долины Хушилху, превращенной въ низовьяхъ въ заливъ того же имени, т. е. юго-западную оконечность Малаго моря. Такое отношеніе названной пары долинъ вполне аналогично тѣмъ сходящимся продольнымъ долинамъ прибрежной полосы горъ, съ которыми мы ознакомились при подробномъ описаніи мѣстности (напр. Еланца и Уланъ-Бургасы), а нахожденіе многихъ острововъ какъ разъ на меридіанахъ Шибэтской и Харгойской бухтъ, подтверждая возможность наклона этихъ долинъ къ юго-западу, убѣждаетъ вмѣстѣ съ тѣмъ, что начиная съ этого мѣста и все дно Малаго моря наклоняется въ ту же сторону. На мѣстѣ встрѣчи этихъ затопленныхъ долинъ, такимъ образомъ, долженъ располагаться и нисшій пунктъ ихъ тальвеговъ (дна), обстоятельство, которое, въ свою очередь, заставляетъ уже предполагать, что мѣсто соединенія этихъ долинъ должно было имѣть исходъ въ какую

либо поперечную къ нимъ долину, ведущую къ еще болѣе нисшимъ гипсометрическимъ уровнямъ. И дѣйствительно, на существованіе такихъ нисшихъ пунктовъ южнѣе Шибѣтско-Хушилхинскаго указываетъ сходящееся направленіе столь же древнихъ долинъ къ Ольхонскимъ воротамъ, такъ какъ материковыя изъ нихъ, болѣе или менѣе параллельныя долины Хушилху (Куркутская, Базарная и Тутская) направляются къ сѣверо-востоку, а Ольхонскія, параллельныя Шибѣтской (Хоринъ-иргѣ и Загли), слѣдуютъ на юго-западъ, сходясь затопленными своими низовьями въ Воротахъ, какъ въ искомой поперечной долины. Наконецъ, нельзя не обратить вниманія на крайне интересное совпаденіе какъ положенія, такъ и направленія глубокой и многоводной долины р. Сармы съ системою восстанавливаемыхъ долинъ. Пересѣкая Приморскій хребетъ въ поперечномъ направленіи, долина эта выходитъ именно къ тому мѣсту Малаго моря, гдѣ можно предполагать пунктъ встрѣчи низовьевъ Шибѣтской и Хушилху, являясь къ нимъ поперечною долиною; дальнѣйшимъ же, мысленнымъ продолженіемъ Сармы къ юго-востоку оказываются Ольхонскія ворота, лежащія насупротивъ выхода Сармы изъ хребта.

Въ такомъ видѣ, наша затопленная и значительно поврежденная размывомъ, система долинъ пріобрѣтаетъ поразительное сходство съ системою знакомой уже намъ р. Анги (см. выше). Современная долина Сармы представляетъ собою эквивалентъ верхняго теченія Анги, протекающей сначала между Онотскимъ и Приморскимъ хребтами (къ ю.-з.), а затѣмъ пересѣкающей послѣдній изъ названныхъ хребтовъ (къ ю.-в.); долина Хушилху уподобляется Еланцѣ, Шибѣтская—Уланъ-Бургасу, причѣмъ онѣ и располагаются на продолженіи одной и той же линіи продольныхъ долинъ прибрежной полосы горъ, такъ какъ извѣстно, что верховья долины Хушилху почти сходятся съ долиною Уланъ-Бургаса; наконецъ Ольхонскія ворота изображаютъ собою полнѣйшій аналогъ нижняго отрѣзка Анги, только съ болѣе меридіональнымъ на-



правленіемъ. Въ пользу правдоподобности такого сопоставленія описанныхъ выше данныхъ говоритъ еще и полное согласіе его съ общимъ характеромъ рѣкъ, выходящихъ изъ Приморскаго хребта на Прибрежную полосу горъ, т. е. на почву, занятую перемежающимися съ известнякомъ полевошпатовыми породами. Всѣ такія рѣчки, включая въ нихъ даже и столь незначительныя, какъ знакомыя уже намъ Хулурюнъ-голъ (лѣв. притокъ Хушилху) и материковый Харгой (западнѣ Сармы), послѣ выхода изъ Приморскаго хребта, сейчасъ же принимаютъ въ себя большее или меньшее количество продольныхъ долинъ, сходящихся къ нимъ съ двухъ діаметрально противоположныхъ сторонъ и слѣдующихъ по простиранію пластовъ удобовыщелачиваемыхъ и удобо-разрушимыхъ породъ верхняго яруса кристаллической толщи. Насколько же типъ этотъ постояненъ въ интересующей насъ области, тому можетъ служить примѣромъ даже низовье р. Большой Бугульдейки, едва коснувшееся породъ Прибрежной полосы горъ. Послѣ выхода изъ Приморскаго хребта, съ лѣвой стороны въ нее сейчасъ же открывается знакомая намъ уже, широкая продольная долина, съ которой именно и начинается вся линія такихъ же долинъ (Бугульдейка, Еландъ, Уланъ-Бургасъ Хушилху), доведенная нами и до острова Ольхона (Шибѣтская); долинъ этой недостаетъ однако соотвѣтствующей, т. е. сходящейся съ нею вѣтви съ юго-западной стороны; но достаточно одного взгляда на карту низовьевъ Бугульдейки, чтобы убѣдиться въ томъ, что такая ассиметрія зависитъ здѣсь отъ бухты Хюрхюро, настолько врѣзавшейся въ побережье, что ею размыты и уничтожены почти всѣ члены перемежающихся съ известнякомъ породъ, въ которыхъ могла пролегать отсутствующая нынѣ правая продольная долина низовьевъ этой рѣки; въ незначительной полоскѣ породъ верхняго яруса, оставшейся западнѣ Бугульдейки, можно было бы даже видѣть удѣлѣвшую часть лѣваго берега устья этой недостающей долины, правый берегъ которой и вся

верхняя часть размыта точно также, какъ нынѣ уничтожается и значительно разрушена уже описанная нами часть праваго верховья Тункырско-Тутской долины, лежащая около горы Тапхынъ.

Таковъ образъ исчезновенія Прибрежной полосы горъ Байкала около устья Б. Бугульдейки, т. е. на юго-западномъ предѣлѣ полосы, гдѣ размывъ ея будучи болѣе совершеннымъ, обрѣзалъ и уничтожилъ ее, такъ сказать, вдругъ, вслѣдствіе чего, не прибѣгая къ геогностическому и стратиграфическому изслѣдованіямъ, географъ почти лишается здѣсь возможности убѣдиться въ прежнемъ распространеніи этой своеобразной полосы на западъ отъ дельты названной рѣки. Совершенно другой характеръ мы видѣли въ результатахъ того же процесса, прервавшаго Прибрежную полосу горъ съ сѣверо-восточной ея стороны. Неравномѣрность разрушенія образовала здѣсь ту поучительную комбинацію бухтъ, заливовъ, проливовъ и острововъ, съ которою мы ознакомились при подробномъ описаніи мѣстности. Слѣды прежней конфигураціи не успѣли еще здѣсь вполне маскироваться и на столько бросаются еще въ глаза наблюдателя, что орографъ, безъ помощи геолога, способенъ здѣсь дѣлать весьма правдоподобныя попытки къ воспроизведенію нѣкоторыхъ чертъ доисторическаго рельефа мѣстности. Пытливый, но поэтическій взглядъ мѣстнаго монгола выразился въ мифѣ о переходѣ Чингисъ-хана черезъ Байкаль по перешейку, связывавшему островъ Ольхонъ со Святымъ Носомъ;—мифъ этотъ, какъ мы увидимъ еще и ниже, перешелъ нынѣ въ геологическую теорію, впервые высказанную Меглицкимъ. Все сказанное выше еще болѣе оправдываетъ взглядъ на Прибрежную полосу горъ Байкала, какъ на самостоятельную орографическую форму, съ характеромъ отрѣзка нѣкогда гораздо болѣе обширной площади, превращенной впослѣдствіи въ самую глубокую часть байкальской долины, затопленной и значительно измѣненной ея водами; при первомъ знакомствѣ съ этою полосой, Черскій описалъ

ее подъ названіемъ Прибрежно-Ольхонской; въ послѣдствіи, какъ мы увидимъ ниже, онъ включилъ ее въ категорію такъ называемыхъ имъ внутрибайкальскихъ горъ. Во-вторыхъ, изложенныя выше данныя располагаютъ смотрѣть на Малое море и Ольхонскія ворота не какъ на результатъ какихъ либо трещинъ или проваловъ, а скорѣе, какъ на систему древнихъ долинъ, затопленную водами озера и измѣненную ихъ размывающимъ дѣйствіемъ. Возрѣніе это еще увеличиваетъ желаніе имѣть современнѣе подробную топографическую карту дна этихъ частей Байкала, для составленія которой потребуются, понятно, многочисленныя и цѣлесообразныя промѣры глубины.

---

**Примѣчаніе.** О древностяхъ извѣстныхъ въ районѣ Ольхонскаго вѣдомства.

Въ соотвѣтственныхъ мѣстахъ описанія Прибрежно-Ольхонской полосы горъ мы упоминали уже о находящихся тамъ древнихъ изображеніяхъ на скалахъ, такъ равно и о различныхъ сооруженіяхъ изъ каменныхъ плитъ («монгольскія постройки»). Имѣя въ виду не малый интересъ этихъ древнихъ памятниковъ, увеличенный еще находженіемъ могилъ съ костяками и лежащими при нихъ издѣліями, настоящее примѣчаніе мы посвящаемъ болѣе подробному ознакомленію съ ними по даннымъ, собраннымъ изслѣдованіями отчасти Агапитова, отчасти же и Черскаго.

Начнемъ съ рисунковъ на скалахъ, открытіе и описаніе которыхъ принадлежитъ Агапитову, какъ результатъ его поѣздки 1881 г. <sup>1)</sup> Начертанія эти, какъ было сказано уже выше, найдены имъ въ двухъ мѣстахъ: около\*15 верстъ западнѣе устья р. Анги, въ утесѣ, называемомъ Саганъ-за-ба (см. выше) и въ бухтѣ Ая, лежащей въ 2 верстахъ восточнѣе этой-же рѣки. Изображенія на Саганъ-за-ба вырѣзаны на бѣломъ кристаллическомъ извест-

---

<sup>1)</sup> Агапитовъ, Изв. В. Сиб. Отд. И. Р. Г. О. т. XII, № 4 и 5, стр. 1—23 съ таблицами рисунковъ.

някъ, и занимають часть скалистой стѣны въ  $3\frac{1}{4}$  сажень въ длину и до  $2\frac{1}{4}$  сажень въ высоту. Въ нихъ различаются: люди (около 30 фигуръ), млекопитающіе животныя (штукъ съ 17) и около 13 птицъ. Судя по степени сохраненія изображеній, слѣдуетъ полагать, что ими была занята вся указанная выше поверхность скалы и только вслѣдствіе выщелачиванія известняка, между ними образовались нынѣ пробѣлы, благодаря которымъ начертанія эти распадаются теперь на пять отдѣльныхъ группъ. Въ нѣкоторыхъ фигурахъ людей вырѣзанъ только контуръ, на другихъ же контурована только голова, а все тѣло, какъ и во всѣхъ остальныхъ фигурахъ, углублено по всей поверхности на 2 и даже на 4 линіи въ скалу. Размѣры изображеній измѣняются приблизительно отъ 1 до 50 сантиметровъ. Фигуры людей представляютъ нѣсколько типовъ. Изображенія меньшей величины представляютъ какъ стоящихъ, такъ и сидящихъ верхомъ, повидимому на лошади, хотя одно изъ этихъ животныхъ снабжено неудачно сдѣланными, слишкомъ длинными, ушами, похожими на рога, у другаго же длинная и прямолинейная шея слишкомъ тонкая и голова ничтожныхъ размѣровъ. Фигуры эти съ неестественно разставленными ногами и растопыренными руками, совершенно сходны по типу съ такими же на Аглагтинскихъ и Майдашинскихъ начертаніяхъ по р. Енисею. Фигуры втораго типа людей отличаются отъ предъидущихъ какъ большимъ числомъ (ихъ 23), такъ и размѣрами, превышающими ихъ отъ 3 до 5 разъ, и большею отчетливостью отдѣлки; наконецъ, самое расположеніе фигуръ въ верхней части всего начертанія отводитъ этому типу какъ бы привилегированное положеніе. Тѣло ихъ изображается въ видѣ треугольника, обращеннаго вершиною къ ногамъ, раздвинутымъ у колѣнъ, вслѣдствіе чего фигуры эти имѣютъ видъ присѣдающихъ или пляшущихъ; разнообразіе обнаруживается, главнымъ образомъ въ способѣ обозначенія головы и въ положеніи рукъ, такъ какъ первыя изображаются или однимъ только контуромъ, въ видѣ кружка, или же вырѣзаны по всей поверхности, а руки у нѣкоторыхъ опущены внизъ, у другихъ подняты вверхъ, какъ обѣ, такъ и по одной. У шести фигуръ на головѣ наблюдаются подобія рожковъ; Агапитовъ расположенъ считать это знакомъ нѣкоторой власти, что совпадаетъ отчасти и съ центральнымъ положеніемъ такихъ фигуръ въ группахъ; у локтеваго сгиба приподнятой лѣвой руки одной фигуры замѣчается кружокъ, въ которомъ дѣйствительно можно было бы предполагать, вмѣстѣ съ Агапитовымъ, бубенъ, въ родѣ шаманскаго, если бы

кружокъ этотъ располагался около кисти, но онъ напоминаетъ собою какъ бы обручъ, повисшій на сгибѣ руки, все предплечіе которой приподнято кверху. Не безынтересна и еще одна фигура, на груди которой замѣчается родъ перевязи или ремня отъ сумки, а въ опущенныхъ рукахъ орудіе, въ родѣ боеваго молота на длинномъ чернѣ, поддерживаемомъ обѣими руками въ горизонтальномъ положеніи. Въ той же группѣ имѣется еще два изображенія съ довольно странно раздвинутыми руками и ногами, при чемъ одна изъ нихъ представлена обращенною головою внизъ, что въ подобныхъ изображеніяхъ принимается обыкновенно за выраженіе смерти. Нѣкоторыя фигуры отличаются еще трехъ-угольною формою головы, а въ двухъ другихъ группахъ можно видѣть двѣ чело-вѣческія фигуры, стоящія на спинѣ крупныхъ животныхъ, чертанія которыхъ впрочемъ значительно повреждено, такъ-что отъ одного изъ нихъ уцѣлѣла только задняя половина туловища, у другаго же (должно быть лошади) не достаетъ головы.

По мнѣнію Агапитова это быть можетъ только случайное близкое расположеніе отдѣльныхъ фигуръ, безъ особенной, цѣлесообразной связи (см. ниже). Что же касается изображенныхъ здѣсь же животныхъ, то всѣ они располагаются, во-первыхъ, въ ниспей части начертанія. По числу преобладаютъ *птицы* (13), расположенныя въ одномъ мѣстѣ даже вереницею изъ 7 штукъ. начертанныхъ одна подъ другою съ параллельнымъ другъ другу направленіемъ изгибовъ средней линіи тѣла, при чемъ всѣ птицы, вообще, относятся къ одному типу, близкому къ лебедямъ. Затѣмъ слѣдуютъ достаточно отчетливо изображенные *олени* (7 штукъ), типъ которыхъ, по замѣчанію Черскаго <sup>1)</sup>, измѣняется между весьма рѣзко выраженными признаками *благородныхъ оленей* (напр. въ V-й группѣ у Агапитова, подъ самымъ большимъ изъ животныхъ) и менѣе граціозными *сыверными оленями*, при чемъ и самое большое животное названной группы напоминаетъ скорѣе *лося*, нежели *быка*, столь хорошо изображеннаго въ той же группѣ подъ благороднымъ оленемъ; кромѣ того здѣсь можно предполагать *лошадей*, затѣмъ, въ 3-й группѣ Агапитова, животное, по общей осанкѣ и загнутому кверху хвосту, уподобляющееся *собакѣ*, — животное внизу 1-й группѣ дѣйствительно напоминаетъ собою *медвѣдя*, на что обратилъ уже вниманіе и Агапитовъ, назо-

<sup>1)</sup> Черскій, Рукописныя замѣтки о Сибири.

нецъ, что касается изображенія внизу 5-й группы, впереди быка и оленя, то въ немъ, по замѣчанію Черскаго, нельзя не узнать переднюю половину тѣла *тюлена*, весьма удачно вышла въ немъ голова и передняя конечность, вмѣстѣ съ мѣшкообразнымъ началомъ туловища, очевидно не стертаго впоследствии, а не оконченнаго, такъ какъ на мѣстѣ, гдѣ слѣдовало бы видѣть его продолженіе, высѣчены рога стоящаго ниже оленя <sup>1)</sup>. Агапитовъ разсматриваетъ значеніе всѣхъ этихъ фигуръ какъ символическое и въ общемъ характерѣ всего начертанія видитъ сходство съ письмомъ, съ записью какого-то, очевидно, важнаго событія въ жизни народа, создавшаго этотъ интересный памятникъ. Что-же касается смысла этого начертанія, то, въ видѣ весьма осторожнаго предположенія, онъ полагаетъ, что помѣщенныхъ выше другихъ, къ тому-же и болѣе крупныхъ по размѣрамъ, людей, быть можетъ, слѣдуетъ считать побѣдителями, тогда какъ болѣе мелкій типъ, стоящій ниже, гдѣ помѣщаются также и животныя, представляетъ побѣжденныхъ и приносящихъ дань, добытую ими отчасти и охотою.

Изображенія на сѣверномъ берегу бухты Ая, хотя значительно бѣднѣе по числу фигуръ, служатъ хорошимъ дополненіемъ къ только-что описаннымъ. Начертанія находятся здѣсь уже не у основанія утеса, а на высотѣ болѣе 10 сажень и потому подниматься къ нимъ нужно по особой тропинкѣ. Человѣческихъ фигуръ здѣсь всего 8 или 9, изъ которыхъ три болѣешихъ размѣровъ, а остальные малыхъ. Типъ первыхъ отличается отъ Саганъ-забинскихъ во-первыхъ тѣмъ, что не только голова, но и туловище ихъ только контурованы, причемъ глаза означены точками, а носъ и ротъ линейками, между тѣмъ какъ всѣ эти органы вовсе не значатся на фигурахъ утеса Саганъ-заба; точно также линія шеи продолжается внизъ по срединѣ туловища до его конца и выдается еще на одной фигурѣ книзу въ видѣ полового члена. Въ видѣ реберъ поперегъ туловища проведены еще отъ 2 до 3-хъ линій, а на макушкѣ головы означено по одной отвѣсной коротенькой линіи, на верхушкѣ которой у одной фигуры означено что-то въ видѣ полулунны; какіе-то придатки наблюдаются также на плечахъ, которыя, вмѣстѣ съ плечевыми частями рукъ, изображаются въ видѣ одной, горизонтальной и прямой линіи такъ, что опущенными внизъ являются только пред-

<sup>1)</sup> Черскій, Рукописныя Замѣтки о Сибири.

плечія съ кистями, снабженными здѣсь даже пальцами, по три на каждой рукѣ. Фигуры меньшихъ размѣровъ отличаются здѣсь только еще болѣе искусственными позами, дугообразно изогнутыми ногами и руками; одна изъ нихъ какъ будто стрѣляетъ изъ лука, большая часть котораго однако исчезла. Изъ животныхъ здѣсь изображена такая-же лебединого типа птица, около нея весьма недурно выстѣченная рыба, кромѣ того, вальковатое, удлиненное животное съ конически заостренною мордою и короткими ногами, нѣсколько съ кротовидною осанкою, которое Агапитовъ сравниваетъ съ выдромъ или тюленемъ (послѣднее никакъ нельзя назвать удачнымъ), а съ лѣвой стороны олень изрядныхъ размѣровъ. Внизу замѣчается нѣсколько весьма оригинальныхъ, но большею частью не понятныхъ изображеній; одно, самое отчетливое, представляетъ собою весьма правильно контурованный четырехугольникъ съ совершенно прямыми углами, въ видѣ таблицеобразной досочки, на которой вырѣзаны контуры двухъ симметрическихъ цилиндриковъ съ шаровидными окончаніями; другое таблицеобразное же изображеніе, но съ округленными углами, отличается уже не полнымъ контуромъ и совершенно непонятнымъ начертаніемъ внутри рамки; что-же касается изображенія съ котораго начинается весь этотъ нижній рядъ начертаній, то, основываясь на знакомствѣ съ такимъ же древнимъ начертаніемъ на скалѣ около Балаганской степной думы (Иркутской губерніи), Черскій склоняется исключить его изъ группы необъяснимыхъ. И дѣйствительно, въ начертаніяхъ Балаганскихъ, изображающихъ воинственные подвиги увѣковѣчившаго ихъ народа, играютъ весьма видную роль *двугорбые верблюды* достаточно крупныхъ размѣровъ и слишкомъ отчетливо контурованные, чтобы дать какую либо тѣнь сомнѣнія относительно принадлежности этихъ животныхъ къ названному роду. На нихъ изображены и контурованные же люди, — воины, стрѣляющіе изъ весьма отчетливо сдѣланныхъ луковъ съ большими ромбическими наконечниками стрѣлъ; но замѣчательно и весьма важно для насъ въ настоящемъ случаѣ то обстоятельство, что балаганскіе воины и герои изображаются тамъ не обыкновенными наѣздниками, а настоящими вольтижорами, мчащимися и стрѣляющими стоя, какъ на верблюдахъ, такъ и на лошадяхъ: одинъ изъ нихъ умудряется даже стоять на одномъ изъ горбовъ верблюда. Возвращаясь къ интересующему насъ начертанію въ бухтѣ Ая, съ которымъ Черскій знакомъ только по рисунку, дѣланному съ фотографіи, онъ указываетъ, что вся передняя половина изображеннаго тамъ жи-

вотнаго представляет, можно сказать, весьма удовлетворительно вычерченного верблюда, судя по формѣ головы, длинѣ и характеристическому изгибу шеи и даже по отношенію послѣдней къ передней ногѣ; далѣе слѣдуетъ слишкомъ малый передній горбъ, къ тому-же черезъ-чуръ удаленный отъ шеи, такъ какъ и все туловище животнаго непропорціонально удлинено. Насколько уменьшеніе этого горба можетъ зависѣть отъ вывѣтриванія скалы, нельзя судить по одному лишь рисунку; выдающаяся надъ этимъ горбомъ, почти отвѣсная черта, если она не представляет собою остатка отъ поверхности, которую занималъ передній горбъ до его поврежденія (а въ такомъ случаѣ величина его была бы вполне соразмѣрною высотѣ задняго горба), быть можетъ изображает собою оружіе въ рукахъ повидимому человѣка, стоящаго сбоку верблюда, вслѣдствіе чего на рисунокѣ виднѣтся только нижняя часть этой фигуры, стоящей какъ бы на согнутыхъ колѣняхъ. Наконецъ, въ задней половинѣ, мы видимъ задній, слишкомъ высокій горбъ (если считать передній неповрежденнымъ), опускающійся почти отвѣсно къ обрѣзанной такимъ образомъ задней части туловища и къ задней конечности. Что-же касается фигуры, на первый взглядъ всего болѣе осложняющей все это изображеніе въ особенности вслѣдствіе его небольшого масштаба, сравнительно съ балаганскими вольтижерами, то она изображает собою одного изъ такихъ же эквилибристовъ, поддерживающагося руками за задній горбъ верблюда и приведшаго свое туловище почти въ горизонтальное положеніе; въ этой фигурѣ весьма хорошо различаются: голова, обращенная назадъ, туловище, обѣ руки и ноги, загнутыя кверху. Такимъ образомъ верблюдъ, разводимый, какъ извѣстно, монголами, знакомъ былъ и народу, оставившему интересующія насъ начертанія около Байкала, чему, во всякомъ случаѣ, имѣются уже неоспоримыя доказательства въ изображеніяхъ около Балаганской степной думы. Поучительность этихъ послѣднихъ, въ нашемъ случаѣ, состоитъ еще въ томъ, что въ человѣческихъ фигурахъ Саганъ-заба, изображенныхъ въ стоячемъ положеніи на спинѣ животныхъ, слѣдуетъ видѣть не какое либо случайное явленіе, а напротивъ, выраженіе ловкости и доблести этихъ героевъ-джигитовъ; да и самый способъ изображенія ихъ не можетъ оставить сомнѣнія въ этомъ, такъ какъ напр. въ III-й группѣ Саганъ-забинскихъ изображеній стопы стоящаго героя совершенно сливаются съ контуромъ спины поддерживающаго его животнаго, а въ группѣ IV-й, хотя онѣ (т. е. ступни



ногъ) и не достигли его на 1 миллиметръ, за то ваятелемъ сдѣлана поправка въ видѣ линіи, почти параллельной спинѣ лошади и сливающейся съ ея шеей.

Въ характерѣ рисунковъ бухты Ая Агапитовъ считаетъ возможнымъ видѣть меньше самобытности, подражаніе начертаніямъ Саганъ-заба и меньшую отчетливость въ выполненіи, причѣмъ все это, по его мнѣнію, свидѣтельствуетъ о болѣе новомъ ихъ происхожденіи,—обстоятельство, которое, впрочемъ, еще не легко доказать, въ особенности потому, что въ IV-й группѣ Саганъ-забинскихъ начертаній имѣется даже одна не вполне сохранившаяся фигура человѣка, туловище котораго контуровано по типу Ая. У мѣстныхъ бурятъ начертанія эти извѣстны подъ именемъ «зуракъ»; они приписываютъ ихъ бурхану, причѣмъ увѣряютъ, что процессъ рисованія продолжается еще и до сихъ поръ, такъ-что достаточно посидѣть около утеса съ часъ времени, чтобы увидѣть появленіе новыхъ начертаній. Въ основаніи такихъ наивныхъ взглядовъ лежитъ по всей вѣроятности какъ невозможность за разъ осмотрѣть всѣ фигуры вслѣдствіе соотвѣтственнаго положенія утеса относительно воды, такъ и неотчетливость изображеній гравированныхъ на бѣломъ известнякѣ и значительно пострадавшихъ отъ времени. Такимъ зуракамъ отдается и подобаемая имъ честь, какъ дѣлу рукъ бурхана, а потому проводники Агапитова, прежде чѣмъ приступить къ указанію этихъ изображеній, сочли необходимымъ совершить нѣкотораго рода обрядъ очищенія. Они собрали пучки одного изъ видовъ полыни (*Artemisia spec.*) и такъ называемой богородской травы (*Thymus Serpyllum*), зажгли огонь, бросили въ него траву и по очереди окуривали себѣ ноги взывавшимся изъ нея дымомъ. Кромѣ того, необходимо было умило-стивить бурхана, для чего потребовалась нарочно взятая для этой цѣли водка. Буряты усѣлись въ кружокъ, старшій и почетнѣйшій изъ нихъ наполнилъ деревянную чашку водкою, всталъ и, обратившись къ утесу со словами молитвы, три раза брызгалъ виномъ по направленію утеса. Затѣмъ собрали нѣсколько мѣдныхъ и одну серебряную монету и положили ихъ на столообразномъ и нѣсколько закрытомъ уступѣ скалы, гдѣ всѣхъ такихъ приношеній оказалось на 1 р. 50 коп. Когда, спустя двѣ недѣли, Агапитовъ посѣтилъ этотъ утесъ вторично, то въ кассѣ этой не было уже ни одной серебрянной монеты, а мѣди оказалось не болѣе 40 коп., при чемъ буряты поясняли, что брать такія деньги могутъ только

русскіе, проѣздомъ по Байкалу, тогда какъ ни одинъ изъ едино-вѣрцевъ не можетъ посягнуть на это жертвоприношеніе.

Не менѣе интереса представляютъ и *древнія сооруженія изъ камней*, расположенныя вблизи береговъ Малаго моря какъ на материкѣ, такъ и на островѣ Ольхонѣ. Впервые они были найдены Черскимъ въ 1879 г. и описаны имъ, впрочемъ, только въ общихъ чертахъ въ отчетахъ его за 1879 и 80 годы, при чемъ, на его геологической картѣ показаны восемь мѣстъ нахожденія этихъ сооруженій, какъ-то: около р.р. Харгоя, Сармы и Онгурѣна, на материкѣ, на мысѣ Имыль-галаши, въ бухтѣ Загли, на островкѣ Хыбинъ и на мысахъ: Харгойскомъ и Шибѣтскомъ на островѣ Ольхонѣ. Подробное описаніе этихъ древностей, которыя Черскій подраздѣляетъ на: *каменные стѣны, выкладки, маяки и жертвенники* до сихъ поръ не было имъ обнародовано и мы воспользуемся имъ въ настоящее время изъ его рукописныхъ замѣтокъ. Затѣмъ въ 1881 г. двѣ изъ каменныхъ стѣнъ, именно: Харгойская и Шибѣтская на Ольхонѣ были подробно описаны Агапитовымъ, ѣздившимъ съ специально археологическою цѣлью (см. сит. см. выше); вмѣстѣ съ тѣмъ Агапитовымъ открыты здѣсь еще такъ называемыя *«китайскія ступки»* (см. ниже) и *мошны* съ остатками какъ *скелетовъ*, такъ и *издѣлій*. Изложеніе наше мы начнемъ съ каменныхъ стѣнъ въ томъ видѣ, въ какомъ передаетъ о нихъ Агапитовъ, дополняя ихъ свѣдѣніями, заимствуемыми нами изъ записокъ Черскаго.

Описывая стѣны Харгойскую и Шибѣтскую, Агапитовъ говоритъ, что направленіе ихъ вездѣ поперечное относительно длины мыса, такъ-что стѣна замыкаетъ собою часть его со стороны материка (въ этомъ случаѣ, со стороны Ольхона) и укрѣпляла такимъ образомъ мысъ, защищенный съ другихъ сторонъ крутыми скалами, омываемыми водою. Стѣны направляются поперегъ мысовъ, отъ одной стороны до другой, не оставляя незащищеннымъ ни одной сажени пространства и даже опускаясь нѣсколько по склону мыса, чтобы не дать возможности неприятелю обойти эту преграду; поэтому длина стѣны находилась въ прямой зависимости отъ ширины даннаго мыса и достигаетъ на Шибѣтскомъ мысѣ 98 сажень, а на Харгойскомъ 83 (см. ниже), а такъ какъ мысы эти вытягиваются въ общемъ къ западу, то направленіе стѣны было отъ с. къ ю. или отъ с.-з. къ ю.-в. Высота стѣнъ не превосходитъ 3 метровъ (т. е. около 10 футовъ), но на значительномъ протяженіи онѣ разрушились и потому верхняя поверх-

ность ихъ представляетъ неправильную, волнистую линію, вмѣстѣ съ которою соотвѣтственно измѣняется и высота, ниспадающая до 2 и даже одного метра. Во всѣхъ случаяхъ кладка стѣны производилась безъ всякаго цемента изъ однихъ гнейсовыхъ плитъ длиною до  $\frac{3}{4}$  метра (даже до  $2\frac{1}{2}$  аршинъ по Черскому), укладывавшихся какъ дрова въ саженьхъ. Какъ спереди, такъ и сзади, стѣны имѣли еще добавочныя сооруженія въ видѣ пространства въ діаметрѣ отъ 2 до 5 и до 7 саженей, окруженныя дугою или съ трехъ сторонъ камнями, но ограды такія едва лишь поднимались надъ уровнемъ почвы. Подобныхъ добавленій Агапитовъ насчитываетъ въ Шибѣтской стѣнѣ четыре: два спереди, имѣющихъ четырехугольную форму и два сзади, полукружныя, причемъ ближе къ юго-восточной изъ переднихъ пристроекъ располагаются двѣ ямы, по одной съ каждой стороны стѣны, обложенныя камнями въ видѣ круга въ 1 сажень въ поперечникѣ. Въ Харгойской стѣнѣ Агапитовъ видѣлъ пять добавочныхъ сооруженій: три съ передней, т. е. восточной и два съ западной; крайнія сѣверныя самыя значительныя; передній изъ нихъ отличается одинаково высокою оградой, какъ и вся стѣна и двумя симметрично расположенными углубленіями, изъ которыхъ въ сѣверномъ поставлена вертикальная плита гнейса, а въ сѣверной задней пристройкѣ такая же, обложенная камнями яма, какъ и около Шибѣтской стѣны. Изъ болѣе существенныхъ дополненій къ приведенному Агапитовымъ описанію Харгойской стѣны, въ рукописныхъ замѣткахъ Черскаго находимъ, что каменные сооружения эти не ограничивались здѣсь только отдѣленіемъ мыса отъ Ольхона, пересѣкая нѣсколько сѣззившуюся часть Харгойскаго отрога въ поперечномъ направленіи, а напротивъ, продолжались еще и вдоль южнаго берега мыса, по направленію къ его оконечности. И дѣйствительно, сейчасъ же къ западу отъ южнаго конца описанной Агапитовымъ стѣны, можно видѣть, что такое же, но очень низкое сооруженіе сопровождаетъ склонъ мыса къ бухтѣ на протяженіи 44 саженей къ юго-западу; затѣмъ, спустя 48 саженей, замѣчается еще часть низкой стѣны слѣдующей къ западу; далѣе, спустя 120 саженей, гдѣ берегъ поворачиваетъ въ общемъ на з.-с.-з., направляясь къ оконечности мыса, наблюдаются еще два участка со стѣною, одинъ до 12 саженей въ длину, а спустя 6 саженей, другой, гдѣ уцѣлѣвшая часть вала имѣетъ всего лишь 7 саж. длины и до 2 аршинъ высоты, располагаясь на 3—4 сажени надъ уровнемъ озера. Вся эта часть разрушеннаго нѣмѣ

или же не вполне достроеннаго вала имѣла очевидно цѣлью между прочимъ и затруднить доступъ къ менѣе крутымъ частямъ склона, на самомъ краю котораго и устраивалась эта стѣна. Такимъ образомъ къ длинѣ главной стѣны на Харгойскомъ мысѣ (84 сажени) слѣдуетъ прибавить еще болѣе 63 сажени, такъ-что общая цифра длины этого сооруженія превосходитъ здѣсь 147 сажени. Кромѣ того изъ записокъ того же путешественника видно, что ширина главной стѣны измѣняется отъ 1 до 3 $\frac{1}{2}$  сажени, причемъ на внутренней ея сторонѣ мѣстами устроена возвышенная ступень для защищающагося гарнизона, а вдоль наружной замѣчаются слѣды неглубокаго впрочемъ рва. Въ одномъ мѣстѣ, на склонѣ къ бухтѣ, оставленъ незначительный проходъ въ видѣ воротъ, тогда какъ въ Шибѣтской стѣнѣ такихъ проходовъ два, изъ которыхъ сѣверо-западный уже (1 сажень), а юго-восточный до 5 сажени въ ширину.

На поверхности Харгойскаго мыса, внутри ограды, гдѣ помѣщается и высшій пунктъ (около 160' надъ озеромъ), Агапитовъ находилъ еще обложенныя камнями пространства отъ 6 до 9 сажени въ діаметрѣ («выкладки» у Черскаго), четырехугольнаго или круглago очертанія съ проходами и придаточными частями. Агапитовъ полагаетъ, что выкладки эти, едва лишь возвышающіяся надъ уровнемъ почвы, такъ какъ онѣ дѣланы только однимъ рядомъ камней, служили основаніемъ юргъ деревянныхъ или войлочныхъ (развѣ для послѣднихъ); на Харгоѣ ихъ было 10. На томъ же мысѣ, на сѣверной сторонѣ отъ расположенія предполагаемыхъ жилищъ, онъ нашелъ нѣсколько сдѣланныхъ въ камняхъ углубленій конической, цилиндрической или полушаровидной формы. Одно изъ нихъ, цилиндрическое, имѣло 23 сантиметра глубины и отъ 22 до 27 сант. въ діаметрѣ; другое 9 сант. въ поперечникѣ; третье, коническое, 43 сант. ширины и 18 сант. глубины, наконецъ четвертое изъ числа измѣренныхъ, 8 сант. глубины и 10 сант. въ діаметрѣ. Углубленія эти имѣютъ большое сходство съ употребляемыми нынѣ бурятами, деревянными ступками для толченія высушенныхъ хлѣбныхъ зеренъ. Буряты, какъ передаетъ Агапитовъ, называютъ эти углубленія «*китайскими ступками*», точно также, какъ они, въ разговорѣ съ нимъ, приписывали и всѣ упомянутыя выше постройки «*китайцамъ*», между тѣмъ какъ Черскому они называли ихъ «*монгольскими*» (монголіи шибѣ—монгольская стѣна), передавая даже и приведенное выше преданіе, согласно которому, монголы, заселявшіе прежде Оль-

хонѣ и прилежащія къ нему мѣстности, перенеслись мгновенно (во время сна) за Байкаль, оставивъ послѣ себя всѣ эти каменные сооруженія. Черскій считаетъ вѣроятнымъ, что въ этомъ случаѣ, буряты смѣшивали китайцевъ съ монголами; это подтверждается и тѣмъ обстоятельствомъ, что приписывая (въ разговорѣ съ Агапитовымъ) стѣны и ступки «китайцамъ», на вопросъ, кому принадлежать находящіяся тамъ же (т. е. вблизи Харгойской и Шибѣтской стѣнъ) могилы, — они отнесли ихъ монголамъ (харамонголамъ).

*Могилы* отличались неодинаковою наружностью. На Харгойскомъ мысѣ Агапитовъ описываетъ сооруженія, похожія на гробы; здѣсь двѣ длинныя плиты, поставленныя на ребра, покрывались сверху тремя или четырьмя другими меньшими плитами; образованная такимъ путемъ полость была открытою съ обѣихъ сторонъ, хотя тутъ же лежали камни, которыми полость эта могла въ свое время закрываться. Пробная раскопка дала здѣсь нѣсколько оставшихся неопредѣленными костей; въ числѣ ихъ находилась и нижняя челюсть барана. Внутри Шибѣтской стѣны, гдѣ слѣдовъ жилища не замѣчено, Агапитовъ точно также нашелъ могилу; она представляла здѣсь собою кругъ до 1 сажени въ діаметрѣ, обложенный камнями, почти не выдающимися надъ уровнемъ почвы, раскопка которой показала слѣдующее. Сначала, подъ растительнымъ слоемъ, по снятіи гнейсовыхъ плитъ, начали попадаться кусочки дерева, части деревянныхъ четырехгранныхъ, деревянныхъ планочекъ въ 25 миллиметр. ширины и 5 мил. толщины, а затѣмъ кусочки ткани съ золотыми нитками; далѣе найдены желѣзныя удила съ несимметричными звеньями, такъ какъ длина одного звена равнялась 98 мил., а другого 72; наконецъ, обнаружился костякъ, лежавшій на глубинѣ 1 аршина. Черепъ былъ обернутъ сохранившеюся еще шелковою тканью, а сверху прикрытъ деревянными планочками на крестъ, послѣ чего, съ трехъ свободныхъ сторонъ, обложенъ каменными плитками. Голова лежала на сѣдлѣ, обдѣланномъ желѣзомъ, можетъ быть посеребреннымъ. Направленіе скелета было съ с. на ю., головою къ сѣверу; голова лежала на затылкѣ, руки были вытянуты. Очевидно, что трупъ хоронился безъ гроба, обернутымъ въ шелковую ткань и прикрытый деревянными планочками. Изъ украшеній при немъ найдено: много бусъ, одна серебряная серьга, по формѣ сходная съ тунгусскою, изображенною въ сочиненіи Миддендорфа: «Коренные жители Сибири» стр. 717 русскаго изданія. Между найденными бусами оказались: 7 жел-

тыхъ, стеклянныхъ, непрозрачныхъ, отъ 15 до 19 мил. въ діаметрѣ, 3 красныя, кубическія изъ какой-то мастики, до 10 мил. въ діаметрѣ, 4 цилиндрическія бусы изъ той же массы до 8 мил. длины, 2 янтарныя до 11 мил. длины и другія, меньшихъ размѣровъ, стеклянныя, изъ которыхъ пять были надѣты еще на нитку. Тужъ же найдены: часть перстня, повидимому желѣзнаго, мѣдное колечко съ кусочкомъ кожи и мѣха, а также мѣдная или латунная подѣлка, принадлежавшая повидимому къ украшеніямъ сѣдла.

На материкѣ въ окрестностяхъ Ольхонской думы и еще ближе къ Воротамъ Агапитовъ находилъ множество могилъ, но другаго типа, нежели Шибѣтская, отчасти болѣе близкаго къ Харгойской. Могилы эти обозначались нѣсколькими плитами (отъ 4 до 5' длины), поставленными такимъ образомъ, что вершины ихъ сходятся, а основанія врыты въ землю; къ плитамъ этимъ приставлялись другія, меньшія, такъ-что въ общемъ получается почти замкнутый конусъ или многогранная пирамида съ полостью внутри. Дно такой полости замѣтно приподнято и тамъ, уже на поверхности, попадаются нижнія челюсти барана и черепки глиняныхъ горшковъ. Для примѣра приведемъ и здѣсь результаты раскопки такой могилы. На глубинѣ одного фута показались желѣзныя удила, еще болѣе несимметрическія, нежели Шибѣтскія, затѣмъ куски глинянаго горшка съ рисункомъ и кости животныхъ; далѣе вырыто стремя съ широкою овальною подножкой и кусочки сгнившаго дерева; наконецъ, на глубинѣ до 80 сантим. обнаружился скелетъ человѣка, лежащій головою къ западу, въ вытянутомъ положеніи, съ кистями рукъ, покоившимися на тазовыхъ костяхъ. Около правой руки найдена одна буса чернаго стекла; изъ оружія оказалось: три желѣзныхъ наконечника стрѣлъ (до 13 сантим. длины) со стержнемъ для вколачиванія въ дерево, части котораго еще сохранились при стрѣлѣ, и желѣзный ножъ съ такимъ же стержнемъ, длиною 188 мил. и шириною 20 мил., похожій на срисованный въ сочиненіи Ворсо подъ № 360; при немъ замѣтны слѣды деревянныхъ ноженъ. Длина всего скелета отъ высшей точки темени до праваго мыщелка голени (т. е. до начала стопы) равнялась 1,45 метра. Такихъ могилъ въ мѣстности, называемой Абазаевымъ утугомъ, въ 4 верстахъ отъ Ольхонской думы, Агапитовъ нашелъ болѣе 200; изъ нихъ онъ разрывалъ 15; но найденъ всего лишь одинъ скелетъ взрослого человѣка и одинъ ребенка, при которомъ, съ лѣвой стороны черепа находилось кольцо; головою онъ обращался не на западъ, какъ выше описан-

ный, а на востокъ. Высота конуса этихъ могилъ достигала 70 сант., а діаметръ ихъ отъ 1,3 до 2 метровъ. Въ расположеніи ихъ, повидимому, наблюдался нѣкоторый порядокъ, состоящій въ томъ, что вокругъ болѣе высокихъ конусовъ располагалось отъ 7 до 10 могилъ (должно быть болѣе низкихъ?). Второе мѣсто нахождения могилъ располагается около Куркутскаго улуса, въ 1—2 верстахъ отъ базара (т. е. около Базарной бухты); здѣсь, по замѣчанію Агапитова, плиты были сложены ящикою, съ наклонными четырьмя стѣнками, и кости не выдавались надъ поверхностью почвы, слѣдовательно, могилы эти, по своей формѣ еще болѣе приближались къ Харгойскимъ. Наконецъ, третьи изъ найденныхъ имъ могилъ на материкѣ, находятся уже въ системѣ р. Анги, по дорогѣ изъ дер. Еланцы къ д. Тыргень (см. выше), а четвертое кладбище на западъ той же деревни. Раскопокъ, кромѣ упомянутыхъ выше, болѣе не производилось, такъ какъ Агапитовъ встрѣтилъ въ этомъ отношеніи систематическое противудѣйствіе со стороны бурятъ: они не только сами не шли работать, но угрожали тѣмъ русскимъ, которыхъ онъ успѣвалъ находить, обѣщая не пускать ихъ въ юрту, или же подговаривали ихъ требовать непомѣрную заработную плату. По просьбѣ Агапитова нѣсколько раскопокъ могилъ около Тыргена произведено было проживающимъ тамъ по дѣламъ Коперницкимъ, но результаты этихъ работъ оказались очень бѣдными; самымъ интереснымъ явленіемъ слѣдуетъ однако считать то обстоятельство, что типъ могилъ, осмотрѣнныхъ Коперницкимъ, оказался отчасти схожимъ съ такъ называемыми маяками или могильниками Минусинскаго округа и Забайкальской области: въ этомъ случаѣ они представляютъ четырехугольное пространство, длиною отъ 2½ до 3 метровъ, обставленное вертикальными или наклонными каменными плитами; но на камняхъ не найдено никакихъ слѣдовъ обдѣлыванія, никакихъ изображеній.

Кромѣ всѣхъ этихъ находокъ, Агапитовъ упоминаетъ еще о двухъ стѣнахъ на материкѣ, которыя были неизвѣстны Черскому, но мѣсто нахождения ихъ означено имъ нѣсколько сбивчиво, именно: «къ сѣверу съ ½ версты отъ расположенія армарочныхъ балагановъ, противъ мыса Харгой на островѣ» <sup>1)</sup>, между тѣмъ мы знаемъ, что балаганы эти построены въ такъ называемой Базарной бухтѣ материковой стороны Ольхонскихъ воротъ, насу-

<sup>1)</sup> Агапитовъ, I. с. pag. 13.

противъ мыса Улятый и бухты Загли, тогда какъ Харгойскій мысъ лежитъ не въ Воротахъ, а на с.-з.-омъ берегу Ольхона, въ разстояніи болѣе 6 верстъ отъ Воротъ и болѣе 11 отъ Базарной бухты. О стѣнахъ этихъ сказано, впрочемъ, только то, что длина каждой изъ нихъ достигаетъ 60 сажень.

На основаніи всѣхъ собранныхъ данныхъ, Агапитовъ приходитъ къ заключенію, что какъ стѣны, такъ и найденныя могилы, принадлежать одному и тому же народу, правдоподобно монголамъ, къ чему склоняетъ его и разборъ наличныхъ историческихъ свѣдѣній о племенахъ, населявшихъ прежде эти мѣстности. Очевидно, что по древности народъ этотъ относится уже къ такъ называемому желѣзному періоду (въ противоположность каменному и бронзовому), обладалъ домашнимъ скотомъ, различными металлами, глиняною посудой, приготовляемою съ помощью гончарнаго круга, причемъ, судя по шелковой ткани и янтарнымъ бусамъ, народъ этотъ долженъ былъ имѣть сношенія съ китайцами. При погребеніи гроба не употреблялись; съ покойникомъ клали принадлежности конской сбруи, оружіе, украшенія и повидимому пища въ горшкахъ; что же касается лошади, принадлежавшей покойнику, то она, быть можетъ, сожигалась, такъ какъ кости этого животнаго не найдены вовсе; кости барана на верху могилы представляютъ очевидно остатокъ тризны. Неодинаковое положеніе тѣла относительно мередіана Агапитовъ объясняетъ своеобразными воззрѣніями монголовъ буддистовъ, у которыхъ положеніе головы покойника къ данной странѣ свѣта зависитъ отъ мѣсяца, въ какомъ послѣдовала смерть. Наконецъ, фактъ отсутствія скелетовъ во многихъ изъ раскопанныхъ могилъ, причемъ вмѣстѣ съ черепками глиняныхъ сосудовъ находились жженныя кости (принадлежали ли они человѣческому скелету?), склоняетъ Агапитова къ предположенію, что у интересующаго насъ племени, кромѣ обыкновеннаго погребенія, существовалъ еще и обрядъ сожиганія мертвыхъ; но обрядъ этотъ долженъ былъ совершаться гдѣ либо въ сторонѣ и потомъ уже пепелъ и сторѣвшія кости собирались въ погребальную урну и ставились въ могилу, въ которой, поэтому, угли находились лишь въ весьма ограниченномъ количествѣ.

Отсутствіе скелетовъ въ могилахъ буряты объясняютъ Агапитовъ тѣмъ, что кладбища эти принадлежатъ монголамъ, не выселившимся съ остальными за Байкаль и зато проклятымъ Далай-ламою и осужденнымъ лежать въ землѣ нѣсколько сотъ лѣтъ; въ



настоящее время срокъ наказанія уже истекаетъ и хара-монголы встаютъ и уходятъ во-свояси.

Изъ остальныхъ мѣстъ находженія этого рода древностей, въ подробномъ описаніи Ольхона и береговъ Малаго моря мы упоминали уже 1) о находженіи небольшой каменной стѣны на островѣ Хибинъ, насупротивъ оконечности Харгойскаго мыса на Ольхонѣ; 2) о такой же стѣнѣ около западнаго мыса Харгойской бухты; 3) о маякѣ, въ видѣ отвѣсно поставленной высокой, гнейсовой плиты на вершинѣ мыса Имыль-галдаши, на Ольхонской сторонѣ Воротъ; 4) о стѣнѣ, возведенной около вершины материковой Харгойской горы и 5) о полуэллиптической выкладкѣ изъ камней на лѣвомъ берегу выхода р. Сармы изъ Приморскаго хребта. Въ настоящее время намъ остается дополнить этотъ перечень еще слѣдующими находками Черскаго. 6) Въ знакомой намъ уже бухтѣ Загли (въ Ольхонскихъ воротахъ), около части ея, извѣстной подъ названіемъ Мыхэрта, находится выкладка изъ камней (въ одинъ рядъ), почти не превышающая уровень окружающей почвы, до 8 сажень въ діаметрѣ, въ видѣ четырехугольника, одна сторона котораго является дугообразною; 7) Въ заливѣ Хушилху, около оконечности западнаго мыса Харгойской бухты (на материкѣ), находится четырехугольная выкладка съ діаметрами въ 8 и 6 сажень; къ сѣверу отъ нея располагается вершина Харгойской горы съ описанною выше каменною стѣною. 8) Каменная стѣна, по типу Харгойской, найдена, наконецъ, Черскимъ и въ окрестностяхъ долины рч. Онгурѣнъ (болѣе 20 верстъ въ с.-в. отъ перваго Заминскаго мыса), съ которою мы ознакомимся въ слѣдующемъ параграфѣ. Стѣна эта располагается на узкомъ, параллельномъ Байкалу хребтикѣ, образующемъ собою мысъ Ядоръ, которымъ ограничивается устье Онгуренской долины съ лѣвой стороны; кромѣ того, хребтикъ этотъ слагаетъ собою лѣвый берегъ ближайшей къ озеру, лѣвой вѣтви Онгуренской долины, извѣстной подъ названіемъ Тонгужиръ. Ближайшій къ юго-западной оконечности высшій пунктъ этого хребтика (120' надъ озеромъ) окруженъ со стороны сѣверо-западнаго склона упомянутою стѣною, въ видѣ дуги до 52 сажень длины и 24 саж. въ радіусѣ; концы этой стѣны примыкаютъ къ юго-восточному скату хребтика, который, опускаясь почти отвѣсно къ Байкалу, самъ по себѣ служилъ уже неприступною преградою, не требовавшею искусственнаго укрѣпленія. Высота стѣны очень незначительная, такъ-что она имѣетъ

видъ какъ бы недостроенной, въ особенности потому, что здѣсь не видно камней, которые могли бы служить доказательствомъ обрушившагося состоянія ограды. Вдоль наружной стороны стѣны замѣтны явные слѣды рва, причемъ по длинѣ ограды находится четыре прохода, значительная ширина которыхъ (два до 7 сажень, одинъ въ 10 и одинъ въ 20 сажень), въ сравненіи съ общою длиною крѣпостнаго вала, говорятъ еще болѣе въ пользу неоконченнаго его сооруженія, какъ это мы видѣли и на вершинѣ Харгойской горы. Наконецъ, 9) Черскій описываетъ еще особенныя сооруженія изъ каменныхъ плитъ, найденныя имъ въ окрестностяхъ той же Онгурѣнской долины, именно, на гребнѣ отрога Сонголь-хада, образующаго правый берегъ Тонгужирской долины. Это были четырехгранныя сооруженія, сложенныя въ видѣ клѣтки или сруба съ полостью въ осевой части. Высота ихъ не превосходила 1  $\frac{1}{2}$  аршина. Ихъ найдено только три, изъ которыхъ лишь одинъ сохранился въ совершенной цѣлости. Сооруженія эти весьма похожи на устраиваемые современными бурятами и сойотами *жертвенники*, извѣстные подъ названіемъ *ханъ*, только послѣдніе, какъ это мы видѣли въ описаніи маршрута Черскаго въ системѣ р. Иркуты (озеро Ильчирь), складываются изъ малыхъ плитокъ и достигаютъ незначительныхъ размѣровъ (около  $\frac{1}{2}$  арш. высоты).

Описанныя находки въ окрестностяхъ Онгурѣнской долины, составляютъ крайній сѣверо-восточный предѣлъ извѣстнаго до сихъ поръ распространенія древнихъ каменныхъ сооружений около Байкала.

Къ нимъ присоединяются еще упомянутыя выше свѣдѣнія о нахожденіи какихъ то памятниковъ въ томъ же родѣ около р. Курмы, а также свѣдѣніе, почерпнутое Черскимъ у Онгуренскихъ бурятъ, о слѣдахъ дороги, проложенной предположительно тѣми же древними монголами черезъ одинъ изъ отроговъ горъ, на пути отъ Замы къ Онгурену (см. ниже), что требуетъ еще провѣрки и ближайшаго изслѣдованія. Не взирая на осмотръ всего указаннаго количества этихъ древнихъ сооружений, Черскому удалось найти около нихъ только одно орудіе. Это былъ родъ бруска, отысканный около Харгойской стѣны на островѣ Ольхонѣ. Брусокъ этотъ, сдѣланный повидимому изъ мелкозернистаго гнейса, имѣлъ 131 мил. длины, 66 мил. ширины и до 20 мил. толщины, съ округленными концами, причемъ одна изъ его длинныхъ поверхностей выпуклая и только оглаженная, съ незначительными

слѣдами шлифовки, между тѣмъ какъ другая (противуположная) плоская и хорошо отшлифована. Брусокъ этотъ найденъ имъ лежащимъ въ одной изъ полостей между камнями, изъ которыхъ сложена стѣна. Кромѣ того около самой стѣны имъ найдена очень дряблая и поросшая отчасти лишайникомъ, бедренная кость человека.

Вообще, по замѣчанію Черскаго, всѣ эти древніе памятники съ Харгойскою и Шибѣтскою стѣнами включительно, требуютъ еще подробнаго перензслѣдованія; въ особенности тщательному осмотру необходимо было бы подвергнуть береговыя сооруженія Харгойскаго мыса, обращая между прочимъ вниманіе и на вопросъ, не могли ли они пострадать отъ позднѣйшаго подмыванія береговыхъ утесовъ волнами Байкала. Соглашаясь въ общемъ съ выводами, къ которымъ пришелъ Агапитовъ относительно народа, оставившаго всѣ эти памятники, Черскій указываетъ лишь на то обстоятельство, что столь большое количество сооруженныхъ укрѣпленій никакъ не говоритъ въ пользу «мирнаго характера» и такихъ же наклонностей этого племени, приписываемыхъ ему Агапитовымъ на томъ основаніи, что въ изслѣдованныхъ могилахъ «не найдено другого оружія, кромѣ стрѣлъ» <sup>1)</sup>.

---

## 5) Прибрежныя горы Байкала отъ Замы до Онгурёна и описаніе маршрутовъ изъ Онгурёнской долины въ систему р. Лены и къ верховьямъ этой рѣки.

Ближайшій къ знакомой намъ уже рч. Зогдукъ, Заминскій мысъ, образуетъ, какъ сказано выше, сѣверо-восточную границу материковаго берега Малаго моря. Отъ этого мыса до устья рч. Онгурёнъ, считается не болѣе 20 верстъ, но такъ какъ въ настоящее изложеніе мы включаемъ еще описаніе нѣсколькихъ маршрутовъ, исходящихъ изъ Онгурёнской долины и пересѣкающихъ прибрежныя горы байкальской долины, поэтому, для удобства читателей главу эту

---

<sup>1)</sup> Черскій, l. cit. стр. 18.

мы подразделимъ на соответственное число параграфовъ, начиная съ описанія промежутка, разобщающаго двѣ названныя долины (Замъ и Онгурень).

А) Берегъ Байкала отъ долины Замы до рч. Онгурень и экскурсія къ вершинѣ горы Саганъ-хада.

Долина рч. Замы, до которой довелъ насъ описанный выше маршрутъ Черскаго, беретъ начало двумя верховьями на юго-восточномъ склонѣ одной изъ вершинъ хребта Приморскаго, извѣстной подъ названіемъ Саганъ-хада, т. е. бѣлая гора (3635' надъ Байкаломъ); съ вершиною этою мы ознакомимся ниже, при описаніи экскурсій Черскаго изъ Онгурена. Длина Заминской долины не превышаетъ 10 верстъ, причемъ она отличается юго-восточнымъ, нѣсколько изогнутымъ направленіемъ, а въ нижней половинѣ длины расширяется отъ 2 почти до 4 верстъ, вслѣдствіе чего эта часть ея имѣетъ видъ осушенной бухты Байкала. Дно долины отличается отчасти степнымъ, отчасти же луговымъ характеромъ, но выстилающая ее наносная почва не рѣдко весьма камениста. Въ нѣкоторомъ удаленіи какъ отъ склоновъ долины, такъ и отъ ея устья изъ подъ уровня наносной почвы выступаетъ островидный бугоръ, состоящій изъ роговообманковаго гнейса, слои котораго падаютъ на ю.-ю.-в.; вблизи него построены бурятскій улусъ. Изъ такихъ же, островидныхъ остатковъ мѣстныхъ кристаллическихъ породъ состоятъ и оба Заминскіе мыса, изъ которыхъ второй, т. е. сѣверо-восточный, носитъ названіе Арулъ. Разобщаясь довольно глубокою бухточкою, мысы эти лежатъ близко другъ къ другу и въ южной части ширины наноснаго устья долины, которая, съ лѣвой стороны, ограничивается самостоятельнымъ мысомъ Халтыгэй, составляющимъ оконечность отрога лѣваго берега Заминской долины. Рѣчка Замъ очень мало видна, къ тому же отводится еще мѣстными жителями для оро-

шенія сѣнокосныхъ мѣстъ; впрочемъ устье ея не было осматрѣно Черскимъ, такъ какъ, поспѣвая въ Онгурень, онъ пересѣкъ долину эту въ поперечномъ направленіи, гдѣ тропа поднимается на отрогъ лѣваго берега низовьевъ Замы. Отсюда видно, что около сѣвернаго склона мыса Арүль (см. выше) располагается небольшое лагуновидное озеро, вытянутое вдоль берега Байкала. Халтыгѣйскій отрогъ, черезъ который переваливаетъ Онгурѣнская дорога (тропа) отличается здѣсь незначительною шириною и состоитъ изъ гнейса, пласты котораго, очевидно, изогнуты или сдвинуты, такъ какъ простираніе ихъ измѣняется отъ с.-з-го и до с.-в-го, а наклонъ отъ отвѣснаго до с.-з-го. Спускъ съ него ведетъ къ низовьямъ небольшой, сухой долины, носящей тоже названіе (Хылыгѣйская); въ ней изъ подъ растительнаго слоя выдаются однѣ лишь плитки кремнистаго сланца и кварцита, залегающихъ очевидно подъ гнейсомъ, но въ выносахъ ближайшей къ устью лѣвой вѣтви долины наблюдаются валуны, гальки и глыбы хлоритоваго очковаго гнейса, тогда какъ въ склонѣ лѣваго берега обнажаются еще кварцитъ а также роговообманковый гнейсъ. Отрогъ, на который поднимается здѣсь дорога, гораздо шире Хылыгѣйскаго (до 7 верстъ), онъ въ общемъ террасовиднаго типа и достигаетъ 328' высоты. За нимъ слѣдуетъ долина Хулугунѣй, интересная въ томъ отношеніи, что ея устье раздѣляется на двѣ части расположенную тамъ уединенною, островидною горою, въ которой, какъ и въ ближайшей части описаннаго отрога, обнажается уже очковый гнейсъ, падающій на ю.-в. и ю.-ю.-в. Въ лѣвой части низовьевъ долины находится лагуновидное озерко, въ которое впадаетъ ключъ, берущій начало въ лѣвой вѣтви долины; около озера расположенъ и бурятскій улусъ. Отсюда остается только верстъ 6 до Онгурѣна, на пути къ которому необходимо пересѣчь еще одну сухую долину, известную подъ именемъ Хергѣлтэ. На этомъ протяженіи, въ составѣ горъ участвуютъ очковый гнейсъ, пере-

межающійся съ хлоритовымъ сланцемъ, который преобладаетъ ближе къ Онгурёну; наклонъ пластовъ ю.-ю.-в.-ый съ значительными изгибами на лѣвомъ берегу Хергалтэ. Особенности самаго берега Байкала между Замою и Онгурёномъ намъ извѣстны изъ описанія Радде, который въ противоположность Черскому, прослѣдовалъ здѣсь воднымъ путемъ. Какъ и слѣдовало ожидать изъ невозможности проложить верховую дорогу по самому берегу озера, послѣдній оказывается весьма дикимъ и скалистымъ, вслѣдствіе чего во многихъ мѣстахъ онъ не представляетъ даже пристани для лодки и только на послѣднихъ 8 верстахъ къ Онгурёну высокія скалы исчезаютъ. Въ ближайшихъ окрестностяхъ долины Замы Радде собиралъ фриганейдъ, убилъ *Emberiza aureola*, видѣлъ два вида плишекъ (*Motacilla alba* и *M. lugubris*), сокола (*Falco aesalon*) и *Milvus ater*. Незначительный сборъ насѣкомыхъ былъ обусловленъ туманною и холодною ( $+ 8,5^{\circ}$  Р.) погодою (7 іюля). Въ долину, которую, судя по описанію и разстоянію отъ Онгурёна, слѣдуетъ признать за Хулугунэ (см. выше), по болотистымъ лугамъ Радде собиралъ *Cyperaceae*, *Carices*, *Pedicularis* и *Triglochin*; здѣсь же имъ убиты: *Saxicola leucura* и *Emberiza pithyornus*. Что же касается направленія береговой линіи на описанномъ протяженіи Байкала, то, вслѣдъ за вторымъ Заминскимъ мысомъ (Арүль), она поворачиваетъ въ общемъ на с.-с.-в. и, образуя весьма мало извилинъ (Заминская бухта и Хылтыгэйская), направляется въ такомъ видѣ до ближайшихъ сѣверо-восточныхъ окрестностей устья Онгурёнской долины (долина Хардо, см. ниже). По замѣчанію Черскаго, эта часть берега озера образуетъ собою юго-западную половину большой бухтовидной вырѣзки (до 47 верстъ длины, считая по Хордѣ), сѣверо-восточный конецъ которой находится въ 28 верстахъ за Онгурёномъ, въ видѣ мыса, извѣстнаго подъ названіемъ Р ы т ы й (Хыръхушунъ, см. ниже); бухту эту, вѣзавшуюся болѣе чѣмъ на 7 верстъ въ прибрежье, онъ называетъ вообще Онгу-

рѣнскою, разсматривая остальные изгибы береговой линіи какъ второстепенныя вырѣзки (см. ниже).

Долина Онгурѣнъ, по описанію Черскаго, не превышаетъ 10 верстъ въ длину, но отличается сложностью развѣтвленій. Она состоитъ изъ двухъ главныхъ вѣтвей, сливающихся въ разстояніи около  $1\frac{1}{2}$  версты отъ Байкала въ одно общее и широкое низовье. Правая вѣтвь или собственно Онгурѣнъ отличается юго-восточнымъ направленіемъ и занята соименнымъ ключемъ, теряющимся въ болотахъ, недоходя около 2 верстъ до Байкала. Она принимаетъ въ себя съ правой стороны, считая сверху, сначала долину Дабани-угунъ, до 10 верстъ длины и съ сѣверо-восточнымъ направленіемъ, а ниже: Угутъ и небольшую Безъимянную долину, тогда какъ съ лѣвой стороны, нѣсколько ниже Дабани-угуна, впадаетъ одна лишь, довольно длинная и болотистая, почти меридіональная долина Гызыгн-нуръ съ двумя озерами ближе къ устью. Лѣвая вѣтвь Онгурѣна, несправедливо называемая Хурай-Онгурѣнъ (*хурай-сухой*), почти параллельна Гызыгн-нору, направляясь съ сѣвера къ югу; протекающій по ней ключъ достигаетъ Байкала черезъ посредство параллельнаго ему, лагуновиднаго озера; наконецъ, около самаго устья, открывается послѣдняя лѣвая и сухая долина, Тонгужиръ, верхняя часть которой параллельна Хурай-Онгурѣну тогда какъ нижняя поворачивается на ю.-ю.-з., параллельно Байкалу, отдѣляясь отъ него узкимъ, соименнымъ хребтикомъ, знакомымъ намъ уже по описанію находящагося на немъ древняго монгольскаго укрѣпленія. Вся эта система долинъ достигаетъ значительной ширины, что въ особенности относится къ Онгуренской долинѣ и общему низовью ихъ, гдѣ ширина равняется болѣе 2 верстъ. Глубоко врѣзанное дно долинъ отличается мѣстами болотистымъ и луговымъ характеромъ, мѣстами же степнымъ и солончаковымъ, какъ напр., нижняя часть Тонгужира, гдѣ находится и небольшое, соименное озерко; самое большое озеро, Иха-

нѹрѣ, находится на лѣвомъ берегу рч. Онгурѣнѣ, нѣсколько выше мѣста соединенія этой долины съ Хурай-Онгурѣномъ. Самыя высокія горы, (до 3500' надъ Байкаломъ), т. е. самый гребень Приморскаго хребта, тянется въ области верховьевъ Онгурѣна, сѣвернѣе долины Дабани-угунѣ, образуя слабо выдающіяся, тупыя, иногда и плоскія вершины, какъ напр., Ангасд-хада (*анасо*-лодка) западнѣе верховьевъ Онгурѣна, Хонгинтѣ и Хурай-Онгурѣнѣ-толгдѣ (*толгой*-голова, вершина) восточнѣе. Остальная же часть описываемой системы долинъ окружается болѣе низкими лѣсистыми отрогами этого хребта, изъ которыхъ Дабанѣ (до 430' надъ Байк.) отдѣляетъ собою Гызыгы-нурскую долину отъ Хурай-Онгурѣнской, а Сонголь-хада располагается между послѣднею и Тонгужирскою, достигая 1064' надъ Байкаломъ. Тонголь-хада представляетъ еще тотъ интересъ, что Черскій наблюдалъ на немъ слѣды нѣсколькихъ террасъ, очевидно озернаго происхожденія. Одну изъ нихъ путешественникъ этотъ встрѣтилъ на высотѣ около 86', другую на 309, третью на 374, четвертую на 503, а пятую на высотѣ до 946' надъ Байкаломъ. На этомъ именно отрогѣ находятся тѣ описанныя нами выше каменные сооруженія, которыя Черскій сравниваетъ съ видѣнными имъ жертвенниками у сойотовъ въ верховьяхъ Иркуты (см. часть I, озеро Ильчирь).

Съ правой стороны оконечность ближайшаго къ устью Онгурѣнской долины отрога называется Хара-хушунѣ (черный мысъ), тогда какъ правый, т. е. юго-западный мысъ, отличающійся отчасти горообразнымъ типомъ, съ двумя рѣзко выраженными вершинами, носитъ названіе Онгурѣнскаго мыса, въ противоположность сѣверо-восточному мысу, извѣстному подъ названіемъ Ядорѣ и принадлежащему къ Тонгужирскому хребту. Весь ландшафтъ долины отличается, однако, довольно мрачнымъ характеромъ, за исключеніемъ сѣверо-восточной части системы (Тонгужирь), болѣе открытой и живописной. Относительно геогностическаго



строения мѣстности Черскій передаетъ, что въ ней преобладаютъ видоизмѣненія хлоритоваго сланца, съ примѣсю кремнистаго и кварцитаваго, съ переходами въ зелено-каменную породу, которая, ближе въ оконечности отрога Дабанъ, принимаетъ сферическую отдѣльность и уподобляется изверженной породѣ. Въ Тонгужирскомъ хребтикѣ, кромѣ того, обнажаются сіенито-гранитъ, переходящій въ слоистое видоизмѣненіе, слюдяно-графитовый сланецъ и слюдяный сланецъ, весьма богатый листоватыми скопленіями змѣвика. Въ стратиграфическомъ отношеніи Черскій различаетъ здѣсь три отдѣльныя области, какъ-то: правый берегъ долины Онгурѣна, а также его верховья, т.-е. главный массивъ Приморскаго хребта, отличающіеся нормальнымъ простираниемъ (в.-с.-в.) и паденіемъ (ю.-ю.-в.) пластовъ; затѣмъ лѣвый берегъ той-же долины, отроги: Дабанъ и Сонголь-хада вмѣстѣ съ верхнею частью долины Тонгужиръ, гдѣ простирание пластовъ почти съ точностью меридіональное и, наконецъ, упомянутый выше Тонгужирскій хребтикъ, въ которомъ простирание пластовъ ломанное, отчасти нормальное, отчасти же меридіональное.

Радде простоялъ въ Онгурѣнской бухтѣ пять дней (8—12 іюля), вслѣдствіе неблагопріятной погоды; впрочемъ, названіе этой долины ему не было извѣстно и потому только упомянутый въ его дневникѣ буратскій улусъ Тонгужиръ («Тонкажиръ») позволяетъ приурочить его наблюденія къ интересующей насъ мѣстности. Улусъ этотъ, состоящій изъ 20 юртъ, помѣщается около версты отъ берега Байкала, въ сѣверо-восточномъ углу площади низовьевъ описанной системы долинъ, около устья соименной долины; другіе улусы лежатъ въ собственно Онгурѣнской долинѣ. Мѣстные бураты ѣздятъ для рыбнаго промысла къ сѣверо-восточной оконечности Байкала (Верхняя Ангара), такъ какъ въ этой бухтѣ омуль не ловится и попадаются только хариусы (*Salmo thymallus*) въ небольшомъ количествѣ. Здѣсь Радде досталъ эк-

землярь рыбы широколобки (*Cottus*); онъ въ первый разъ встрѣтился здѣсь также съ дикими гусями и гагарами (*Columbus*), убилъ сорокопута (*Lanius phoenicurus*), черного дятла (*Picus martius*) и *Emberiza aureola*, причемъ слышалъ и голосъ тетерева (*Tetrao urogallus*); встрѣчены также (*Saxicola oenanthe*, *S. leucura*, *Anthus Richardi* и одинъ видъ *Cypselus*. Въ долинѣ водился также и *Spermophilus Eversmannii*. Черскій, присутствуя здѣсь однажды при ловлѣ хариусовъ, былъ свидѣтелемъ, какъ онгуренскіе собаки ловили широколобокъ (*Cottus*): они бродили по мелкимъ частямъ бухты, тщательно всматриваясь въ камни и плоскія гальки, подъ которыми обыкновенно прячутся эти рыбы, при чемъ, нерѣдко, дѣлали удачныя попытки перевернуть такую гальку лапою; завидѣвъ рыбу, собака мгновенно погружала морду въ воду и, въ случаѣ успѣха, вытаскивала широколобку и съѣдала её тутъ-же. Въ числѣ тунгусовъ, живущихъ на противоположномъ склонѣ прибрежныхъ горъ (см. ниже), но выходящихъ нерѣдко въ Онгурень къ буратамъ, съ которыми они находятся въ дружественныхъ отношеніяхъ, Черскій видѣлъ старичка съ лицомъ, ужасно обезображеннымъ отъ ранъ, нанесенныхъ ему еще въ молодости медвѣдемъ, который водится здѣсь и вездѣ въ изобиліи. Вообще, по распросамъ, собраннымъ этимъ путешественникомъ, какъ равно и по его личнымъ наблюденіямъ, оказывается, что прибайкальскаго медвѣдя нельзя считать настолько опаснымъ животнымъ, какъ о томъ повѣствуютъ преувеличенные рассказы мѣстнаго русскаго населенія. Случаи ранъ или смерти отъ медвѣдя бывають, среднимъ числомъ, не болѣе одного раза въ теченіи 10, даже 15 лѣтъ для данной мѣстности, а такихъ, чтобы медвѣдь осмѣлился подойти ночью къ огню и нанести вредъ ночующимъ около костра, вовсе не бываетъ, въ противоположность мнѣнію русскихъ крестьянъ, полагающихъ даже, что животное это умѣетъ погасить непріятный для него огонь, обмачивая свою шерсть въ водѣ и заливая ею костеръ (!).

Между тѣмъ, по показанію тунгусовъ, бурятъ и вообще людей, часто охотившихся на медвѣдѣя, животное это обыкновенно уходитъ отъ человѣка и извѣстны многіе случаи, въ которыхъ даже раненый медвѣдь убѣгалъ не обнаруживая ни малѣйшаго желанія вступить въ борьбу съ охотникомъ, а въ 1880 г. въ окрестностяхъ того же Онгурена (на р. Чанчеръ, см. ниже) раненая медвѣдица бросила своихъ дѣтей, пойманныхъ затѣмъ тунгусами. Буряты обыкновенно называютъ медвѣдѣя *хара-гуроленъ* т. е. черный звѣрь; у тункинскихъ бурятъ (система р. Иркутъ) даже не знаютъ другого названія, между тѣмъ у онгурѣнскихъ и вообще ольхонскихъ бурятъ Черскій слышалъ еще три названія, къ тому же весьма интересныя, хотя, къ сожалѣнію, легенды, на существованіе которыхъ гдѣ либо ясно указываютъ два изъ этихъ названій, должно быть выполнѣ затерялись среди здѣшняго населенія. Такъ напр., названіе *Богалдъ* состоитъ изъ словъ *Бо*, т. е. шаманъ, и *галдъ* — сгорѣвшій; точно также другое названіе медвѣдѣя *Дактс-кумъ* означаетъ: человѣкъ (*кумъ*) въ дохѣ (*дактс*), т. е. въ шубѣ, сшитой шерстью вверхъ. Не взирая на то, знакомые Черскому буряты никогда не слышали о томъ, чтобы медвѣдь былъ когда либо шаманомъ или даже просто человѣкомъ, хотя онъ тѣмъ не менѣе, по ихъ мнѣнію, лежа напр. въ берлогѣ, слышитъ и понимаетъ все, что о немъ говорятъ люди и потому всѣ, ругающіе его, подвергаются нѣкоторому риску и шансамъ на мщеніе со стороны подслушившаго его животного. Медвѣдь, въ прежнее время, не имѣлъ самки, вслѣдствіе чего онъ поймалъ какую-то женщину и полизалъ ее, отчего она сдѣлалась косматою и превратилась въ медвѣдѣя,—миоъ, который склоняетъ къ предположенію, что и самъ медвѣдь-самецъ, долженъ былъ быть по понятіямъ туземцевъ нѣкогда человѣкомъ. Тунгусы рассказывали также, что и въ историческое время животное это однажды увлекло въ берлогу заблудившуюся тунгуску и прозимовало съ нею. Что же касается описаннаго академикомъ Георги обычая тунгусовъ обращаться

въ бѣгство медвѣдя нарочно для этой цѣли сочиненною пѣснью, то обычай этотъ, кажется, исчезъ въ настоящее время до того, по крайней мѣрѣ, что тунгусы, съ которыми говорилъ Черскій, ничего не знали объ этомъ.

Въ сопровожденіи одного изъ этихъ тунгусовъ, Черскій дѣлалъ экскурсію къ горѣ Саганъ-хада, описаніе которой мы включаемъ еще въ этотъ параграфъ, такъ какъ маршрутъ къ этой горѣ относится къ описанному нами промежутку между Онгуреномъ и Замою, въ <sup>т</sup>верховьяхъ которой и расположена названная гора. Изъ Тонгужирскаго улуса тропа ведетъ сначала вверхъ по долинѣ Онгурена, придерживаясь ея праваго берега. Дно долины повышается здѣсь къ сѣверу нѣсколькими (до 4-хъ) террасовидными уступами до высоты около 913' надъ Байкаломъ, откуда путешественники поднялись на отрогъ праваго берега низовья знакомаго намъ уже ключа Дабани-угуна (1052' н. Байк.) и спустились затѣмъ въ долину послѣдняго (912' н. Байк.), чтобы слѣдовать нѣкоторое время вверхъ по ней, т. е. на ю.-ю.-з. Мѣстность большею частью поросла хвойнымъ листовичнымъ лѣсомъ; въ самой долинѣ ключа мѣстами замѣтны были слѣды золотопоисковыхъ работъ, неувѣнчавшихся, впрочемъ, желаемымъ успѣхомъ; около русла мѣстами можно видѣть остатки льда, накопляющагося въ видѣ «наледей» толстымъ слоемъ, который сохраняется иногда до конца августа, слѣдовательно почти до новыхъ морозовъ (см. ниже, рч. Ледяная и Черемшанка). Въ разстояніи около 8 верстъ выше устья, гдѣ уровень долины Дабани-угуна достигаетъ уже 1044' н. Байк., путешественники поднялись на склонъ лѣваго берега долины, и на высотѣ 1660' н. Байк., достигли дороги, ведущей изъ Замы въ систему р. Лены (на р. Чанчеръ, см. ниже). Отсюда начинается уже подъемъ на высоты Приморскаго хребта, искомый, высшій пикъ котораго (Саганъ-хада) отстоитъ еще почти въ 7-ми верстахъ отъ мѣста пересѣченія тропой Заминской дороги. Высокій хвойный лѣсъ, преимущественно листович-

ный, достигает мѣстами особенной стройности, вслѣдствіе чего одна часть его, еще въ долинѣ покинутого Дабанигуна, носитъ названіе Ундѹръ-шингѹнъ, т. е. высокая лиственница. По мнѣнію Черскаго, названіе это, измѣненное по ошибкѣ въ Ундѹръ-судѹнъ, перенесено академикомъ Георги и на гору Саганъ-хада, которую именно, а не какую либо другую, онъ посѣтилъ во время экскурсіи изъ Онгурена, судя не только по указанному имъ положенію этого высшаго пункта относительно Онгурена, но и по приведенному разстоянію, а также по уступистому подъему на эту гору; между тѣмъ какъ самые тщательные разспросы Черскаго у мѣстныхъ жителей показали, что никакой горы, называемой «ундѹръ-судуномъ» у нихъ не имѣется.

Съ Заминской дороги тропа поднимается по довольно пологому склону на высоту 2100' надъ Байкаломъ, гдѣ оказался довольно плоскій, террасовидный отрогъ, по которому путешественники повернули къ югу, находясь уже на Ленско-Байкальскомъ водораздѣлѣ. Сѣверная часть этого отрога даетъ начало правой вѣтви рѣчки Немендѣй, которая принадлежитъ уже системѣ р. Лены и впадаетъ съ лѣвой стороны въ р. Чанчеръ (см. ниже), а не въ Еликту, какъ это показано по ошибкѣ на картѣ Черскаго (согласно первоначальному показанію бурята). Далѣе, съ высоты 2565' н. Байк., начинается подъемъ на болѣе высокую часть того же отрога, которой свойственны тоже меридіональное направленіе и достаточно плоская поверхность; съ запада и юго-запада она ограничивается долиною лѣвой вѣтви верховьевъ Немендѣя, а съ сѣверо-востока склонъ ведетъ къ долинѣ упомянутого уже выше ключа прѣваго верховья той же рѣчки. Далѣе къ югу отрогъ образуетъ еще одинъ уступъ, высотой въ 2802' надъ Байкаломъ, примыкающій уже къ основанію склона Саганъ-хада, который вытягивается почти подъ прямымъ угломъ къ отрогу, т. е. съ востока на западъ и повышается въ томъ же направленіи. На этомъ, т. е. сѣверномъ склонѣ рас-

полагается верховье лѣвой вѣтви Немендѣя, а высшій восточный пунктъ Саганъ-хада достигаетъ 2388' высоты. Отсюда видно, что верховье названной вѣтви Немендѣя окружалось прежде скалистою стѣною, превращавшею его въ котловину (по типу воронокъ), южная часть которой замыкалась массивомъ Саганъ-хада; въ послѣдствіи же, отъ растрескиванія и обваловъ разрушенныхъ такимъ образомъ скалъ, сѣверная и восточная стѣны этого амфитеатра (вѣрнѣе воронки) превратились въ довольно плоскія и понизившіяся поверхности отроговъ, измѣнивъ соотвѣтственно и весь прежній топографическій характеръ верховьевъ.

Восточная часть Саганъ-хада (2388' н. Байк.) въ свою очередь значительно пострадала отъ того же процесса разрушенія и имѣетъ видъ обширной и довольно плоской безлѣсной поверхности, покрытой осыпью возвышавшихся здѣсь нѣкогда скалъ. Къ западу названная площадь отдѣляется плоскою сѣдловиною отъ болѣе высокой части гребня, при чемъ сѣдловина эта, въ свою очередь, представляетъ собою начало дальнѣйшаго разрушенія и расчлененія главнаго гребня горы, такъ какъ въ ея образованіи принимаютъ участіе верховья: Немендѣя съ сѣверной, а Замы съ южной стороны, стремящихся къ соединенію другъ съ другомъ. Восхожденіе на западную, высшую часть гребня обнаруживаетъ существованіе еще двухъ уступовъ, именно на высотѣ 3410' и 3559' н. Байк. послѣ чего уже слѣдуетъ высшій пунктъ Саганъ-хада, на которомъ aneroidъ показалъ 3635' надъ Байкаломъ. Сѣверный склонъ этой части гребня принадлежитъ уже верховьямъ р. ч. Кургинъ, системы р. Еликты, которая впадаетъ съ лѣвой стороны въ Лену, въ разстояніи 70 верстъ къ сѣверо-западу отъ Саганъ-хада (см. ниже). Устье Онгурена лежитъ отсюда въ 21 верстѣ къ сѣверо-востоку (даже въ 18-ти, если считать по прямому направленію; верховья р. Сармы должны лежать къ з.-ю.-з., въ небольшомъ разстояніи. Нигдѣ не видать альпійскихъ вершинъ; хребты покрываются сплошнымъ

дѣвственнымъ лѣсомъ. Рѣка Еликта до сихъ поръ никакѣмъ еще не изслѣдована, не взирая на то, что на ней (въ верхнемъ теченіи) находится золотиносная розсыпь, разрабатывавшаяся уже нѣсколько разъ. По образцамъ породъ, доставленнымъ оттуда Чекановскому, можно судить, что тамъ развита уже толща сланцевъ, характерная для Онотскаго хребта, какъ это мы увидимъ и по рч. Чанчеръ (см. ниже), что же касается геогностическаго строенія горъ на протяженіи описаннаго маршрута Черскаго къ горѣ Саганъ-хадѣ, то здѣсь вездѣ встрѣчались древнѣйшія кристаллическія породы, въ настоящемъ случаѣ въ лицѣ хлоритоваго сланца и его видоизмѣненій (съ примѣсъю полевого шпата и слѣдами даже талька), принимающихъ массивное строеніе и наружность зелено-каменной породы. Только въ восточномъ отрогѣ лѣваго верховья Немецкаго можно было видѣть необрушившееся обнаженіе, въ которомъ пласты сохраняютъ нормальное простираніе (в.-с.-в.) и паденіе (ю.-ю.-в.), что равнымъ образомъ, можно видѣть и въ нѣкоторыхъ скалахъ праваго берега Онгуренской долины, гдѣ, впрочемъ, мѣстами встрѣчено и меридіональное простираніе.

Б) Маршруты Меглицкаго и Черскаго изъ Онгурена на р. Лену, до долины р. Манзурки.

Меглицкій въ 1852 г. <sup>1)</sup>, а Черскій въ 1879 г., окончили свои лѣтнія изслѣдованія Байкала въ одномъ и томъ же мѣстѣ, именно въ долинѣ Онгурена, откуда, какъ тотъ, такъ и другой совершили перевалъ черезъ Приморскій хребетъ, спустились въ долину р. Чанчеръ, впадающей въ Лену съ лѣвой стороны и, слѣдуя внизъ по Ленѣ, вышли въ долину отчасти уже знакомой намъ рч. Манзурки, чтобы возвратиться въ Иркутскъ по Якутскому тракту, проложенному, какъ сказано выше, уже по плоской возвышенности, примыкающей

---

<sup>1)</sup> Меглицкій, Горн. Журн. loco cit.

къ сѣверо-западному подножью хребта Онотскаго. Маршрутъ этотъ имѣетъ для насъ, такимъ образомъ не маловажное значеніе, такъ какъ, направляясь къ сѣверо-западу и пересѣкая собою всю ширину Прибайкальскихъ горъ, онъ достигаетъ прилегающей къ нимъ плоской возвышенности и потому даетъ полный поперечный разрѣзъ интересующей насъ части горной страны, подобно описаннымъ выше маршрутамъ: по р. Окѣ, по Иркуту, Ангарѣ, Голоустной, Бугульдейкѣ и т. п. Меглицкій считалъ р. Чанчеръ (Шаншеръ у бурятъ) однимъ изъ верховьевъ р. Лены, что впрочемъ ошибочно, какъ мы увидимъ въ своемъ мѣстѣ; онъ не знакомъ былъ также съ теченіемъ Чанчера около его источниковъ, какъ равно въ отчетѣ Меглицкаго мы не находимъ и названій притоковъ этой рѣки; поэтому при нижеслѣдующемъ описаніи мы будемъ придерживаться записокъ Черскаго, заимствуя необходимое и изъ отчета Меглицкаго.

Тропа ведетъ вверхъ по долинѣ Онгурёна (см. выше), верховья котораго отстоятъ въ 11—12 верстахъ отъ Байкала и состоятъ изъ двухъ вѣтвей: лѣвой, меридіональной и правой, слѣдующей съ с.-з. (з.-с. 30) на юго-востокъ. По этой послѣдней Черскій поднялся къ перевалу черезъ Приморскій хребетъ, къ которому ведетъ короткій, но довольно крутой и болотисто-каменистый подъемъ. Перевалъ, по измѣренію названнаго путешественника, достигаетъ здѣсь всего лишь 1645' надъ Байкаломъ и является почти совершенно плоскимъ, причемъ примыкающія къ нему склоны ближайшихъ высотъ, повидимому, не выше 2000' надъ озеромъ. Мѣстность отличается довольно мрачнымъ характеромъ, вездѣ порастаетъ бѣдной растительностью и хвойнымъ лѣсомъ, такъ что о составѣ почвы можно судить только по камнямъ, торчащимъ изъ подъ моховаго и вообще растительнаго покрова: вездѣ встрѣчался все тотъ же хлоритовый сланецъ, съ которымъ мы ознакомились при подробномъ описаніи Онгуренской долины. Сейчасъ же за переваломъ слѣдуетъ спускъ въ долину



р. Чанчеръ, лежащую здѣсь на высотѣ около 1540'. Во времена Меглицкаго, кажется, переваливали по другой, нынѣ заброшенной дорогѣ, по всей вѣроятности вверхъ по лѣвой вѣтви Онгурена. И дѣйствительно, судя по описанію этого геолога необходимо заключить, что онъ, во-первыхъ, на пути къ перевалу встрѣчался съ утесами (ихъ нѣтъ по лѣвой вѣтви) въ которыхъ пласты хлоритоваго сланца <sup>1)</sup> постоянно падали на ю.-в.; во-вторыхъ съ перевала, высота котораго опредѣляется имъ въ 1534' надъ Байкаломъ, т. е. на 111' ниже, нежели у Черскаго, склонъ ведетъ въ долину Чанчера къ западу, что въ свою очередь, свойственно только самой верхней части этой рѣчки, придерживающейся тамъ почти меридіональнаго направленія; наконецъ, съ такимъ воззрѣніемъ согласуется и свидѣтельство Меглицкаго о скалистости той части Чанчера, въ которую онъ спустился съ хребта, между тѣмъ какъ на меридіанѣ маршрута Черскаго склоны долины поросли травой и лѣсомъ, а о строеніи мѣстности можно было судить только по осыпямъ и отдѣльнымъ камнямъ. Черскій передаетъ, что источники Чанчера располагаются приблизительно въ 25 верстахъ къ сѣверу отъ устья Онгуренской долины (см. ниже); отсюда Чанчеръ въ скалистой долинѣ протекаетъ около 15 верстъ къ югу, а затѣмъ нѣсколько къ юго-западу (ю.-ю.-з.), приблизившись на 11 или 12 верстъ къ Байкалу, послѣ чего онъ поворачиваетъ дугообразно къ западу и наконецъ, къ сѣверо-западу,—направленіе, котораго онъ придерживается на протяженіи слишкомъ 25 верстъ, до устья въ Лену. Вся длина Чанчера достигаетъ около 55 верстъ; устье его располагается въ разстояніи болѣе 50 верстъ отъ устья Онгурена (считаютъ даже 60 верстъ), но правильной съемки теченія этой рѣчки до сихъ поръ еще не имѣется, такъ-что и ея изображенію на картѣ Черскаго можно придавать только наглядное значеніе. Ниже мѣста къ которому приводитъ тропа

<sup>1)</sup> У Меглицкаго здѣсь по ошибкѣ «глинистаго», что противорѣчитъ его картѣ, на которой означенъ хлоритовый сланецъ въ этомъ мѣстѣ.

съ Онгуренскаго перевала, Чанчеръ принимаетъ съ правой стороны рѣчки: Булюй, Алія, Ихѣ-елга и Олонтуксѹкъ, впадающія въ верхней половинѣ теченія, на протяженіи которой съ лѣвой стороны въ него изливаются, кромѣ Немендѣя: Зас'а, Еликта и Хапсагай-елга, тогда какъ съ той же стороны, но въ нижнюю часть Чанчера, впадаютъ: Мѣмха, Нырѣмня, Санхикшѣнъ, Тѣбликъ и Хунгудѣй; послѣдній около самаго устья Чанчера въ Лену. Благодаря всѣмъ этимъ притокамъ ширина Чанчера въ низовьяхъ достигаетъ мѣстами 10 сажень, тогда какъ въ верхнемъ теченіи она достигаетъ 2 — 3 сажень. За исключеніемъ двухъ или трехъ, небольшихъ впрочемъ сѹженій въ самой верхней части, долина Чанчера отличается достаточною шириною, достигающею мѣстами до  $\frac{1}{4}$  версты и болѣе, при чемъ какъ ея склоны, такъ и нерѣдко болотистое и тундренное дно порастаютъ хвойнымъ лѣсомъ. Тѣмъ не менѣе, наклонъ дна долины, судя по барометрическимъ наблюденіямъ Черскаго, превосходитъ 25' на 1 версту, такъ какъ высота ея около Онгуренскаго перевала равняется 1540', а на устьѣ въ Лену 718' надъ Байкаломъ. Значительною шириною отличаются и долины нѣкоторыхъ его притоковъ, какъ напримѣръ, Алиа, Ихѣ-елга, Мѣмха и др. Верхнюю (почти меридіональную и ю.-з-го направленія) часть теченія р. Чанчеръ Черскій разсматриваетъ какъ долину, отдѣляющую Приморскій хребетъ отъ Онотскаго. Къ сѣверо-востоку отъ нея, въ весьма близкомъ, хотя и въ неизвѣстномъ къ ней отношеніи, мы увидимъ еще длинный рядъ сообщающихся долинъ, играющихъ ту же орографическую роль относительно названныхъ двухъ хребтовъ; что же касается юго-западнаго продолженія линіи такихъ долинъ, столь хорошо развитой до р. Сармы, (см. выше), то въ этомъ отношеніи замѣчается значительный пробѣлъ въ нашихъ свѣдѣніяхъ, такъ какъ о направленіи долинъ въ системѣ верховьевъ р. Еликты (сѣвернѣе горы Саганъ-хада, см. выше) и объ отношеніи ихъ къ верховьямъ

Сармы съ одной, и лѣвыхъ притоковъ Чанчера съ другой стороны, мы еще ничего не знаемъ. Въ свою очередь, не достаточно еще осмотрѣвъ и Онотскій хребетъ на мѣстѣ пересѣченія его долиною Чанчера, слѣдовательно въ предѣлахъ сѣверо-западнаго направленія этой долины. Меглицкій не зналъ еще о существованіи двухъ хребтовъ на описываемомъ берегу Байкала, что же касается Черскаго, то проѣздъ его по этой долинѣ, какъ обратный путь къ Иркутску въ осеннее время былъ слишкомъ поспѣшнымъ, чтобы предпринимать еще боковыя экскурсіи и восхожденія на прилежащія высоты. Во всякомъ случаѣ съ долины виднѣлись только плоско-округленныя, лѣсистыя горы безъ слѣда какихъ либо заостренныхъ или болѣе выдающихся вершинъ, какъ это и свойственно Онотскому хребту на всемъ извѣстномъ его протяженіи. Съ этимъ согласуется и геогностическое строеніе мѣстности. вмѣстѣ съ вступленіемъ въ долину Чанчера путешественникъ встрѣчается съ знакомыми уже ему, Онотскими породами (глинистый и глинисто-сланцевый сланцы и метаморфическій песчаникъ темнаго зеленовато-сѣраго цвѣта), непокидающими его до самаго устья въ Лену. Въ верховьяхъ Чанчера (см. ниже) глинистый сланецъ обнажается уже въ утесахъ лѣваго берега долины, т. е. въ склонѣ Приморскаго хребта, при чемъ, въ противоположность круто поднятымъ членамъ архейской (полево-шпатовой) толщи, пласты сланца обнаруживаютъ тамъ лишь незначительный наклонъ ( $20^{\circ}$ ) на ю.-в. На линіи Онгуренскаго перевала сланцы эти можно видѣть только въ осыпи и въ руслѣ Чанчера, около котораго здѣсь построены пріисковыя помѣщенія, такъ какъ въ наносѣ рѣки добывали здѣсь недавно золото. Но нѣсколько ниже, въ склонѣ праваго берега долины можно видѣть: сначала осыпь сѣраго известняка, очевидно и здѣсь перемѣжающагося со сланцами, а сейчасъ же далѣе опять глинистый сланецъ, сначала почти горизонтально залегающій, а затѣмъ падающій на с.-з., съ наклономъ въ  $30-35^{\circ}$ . Ниже этого

мѣста и до самаго устья известнякъ уже не встрѣчался; ближе къ низовьямъ около Санхикшина наблюдалось ю.-ю.-в. паденіе сланца, при чемъ появлялись плитки такой же породы, но красноватаго цвѣта, который передавался и наносной почвѣ, покрывающей здѣсь склоны и дно долины. По поводу этого явленія Черскій ставитъ вопросъ для будущихъ изслѣдователей: не найдутся ли здѣсь, со временемъ, эквиваленты такъ называемаго имъ, красноцвѣтнаго яруса этой же толщи (но не девонской) породъ, которая столь хорошо развита по Иркуту ниже ущелья («Мотскій» красный песчаникъ) и найдена еще въ Онотскомъ хребтѣ около Устиновой пади, по линіи перевала Б. Бугульдейки въ систему р. Манзурки.

Проводники Черскаго, онгурѣнскіе буряты, останавливались въ нѣкоторыхъ мѣстахъ для молитвъ и жертвоприношеній, напр., около перевала на Чанчерь; при этомъ они выказывали нѣкоторые приемы, замѣтно отличные отъ употребляемыхъ тункинскими бурятами. Отъ нихъ, напр., Черскій впервые узналъ, что мѣстные дѣхъи могутъ быть угощаемы даже щепеткою курительнаго табаку, брошенною на воздухъ или далеко въ кусты, тогда какъ тункинецъ, въ такомъ случаѣ, приноситъ жертву табакомъ, закураннымъ уже въ трубкѣ, которую онъ поднимаетъ вверхъ, упрашивая божество покурить (татѣшъ-тѣ байнъ Хангай!, т. е. курите богатый властелинъ.). Нѣкоторые изъ онгурѣнскихъ бурятъ (какъ и одинъ изъ проводниковъ Черскаго) передъ актомъ бросанія табаку, совершающимся во многихъ мѣстахъ, прямо съ лошади, обращаютъ взоръ, напр., къ какому либо кусту и дѣлаютъ въ томъ направленіи нѣсколько частыхъ движеній головою, какъ бы кланаясь увидѣнному тамъ доброму знакомому, послѣ чего уже бросаютъ щепотку табаку въ ту же сторону.

Такъ какъ дорога изъ Онгурѣна на Лену доступна въ зимнее время для ѣзды на саняхъ и по ней поддерживается

сообщеніе между ленскимъ русскимъ населеніемъ и прибайкальскими бурятами, то нѣсколько ниже устья Ихъ-елга, на Чанчерѣ, построено небольшое зимовье для отдыха проезжающихъ; лѣтомъ зимовье это, какъ неимѣющее значенія въ теплое время года, остается пустымъ, такъ-что первымъ населеннымъ пунктомъ на этомъ пути является Тунгусское стойбище на устьѣ Чанчера, которое, во времена Мегицкаго, носило названіе Ленскаго десятка, а у бурятъ извѣстно подъ именемъ Аранга. Это зимній улусъ Чанчерскихъ тунгусовъ, которые въ лѣтнее время расходятся по различнымъ частямъ системы верховьевъ р. Лены для звѣринаго промысла, собиранія кедровыхъ орѣховъ и даже ягодъ, доставляемыхъ имъ въ русскія деревни на Ленѣ, главнымъ образомъ въ Бирюлку (см. ниже). Черскій былъ пораженъ сравнительною опрятностью и наружнымъ видомъ этого стойбища: всѣ постройки (около 7) сдѣланы по типу русскихъ избъ; при нихъ имѣются впрочемъ различныя, своеобразныя амбарчики и загородки для домашнего скота. Живущіе здѣсь тунгусы содержатъ оленей и лошадей, пекутъ весьма хорошій хлѣбъ, многіе изъ мужчинъ носятъ русскую одежду и вообще обнаруживаютъ гораздо лучшія экономическія условія, нежели ихъ Голоустенскіе соотечественники, о которыхъ мы говорили въ своемъ мѣстѣ, такъ-что только Зогинскіе изъ послѣднихъ (см. выше) могутъ соперничать съ Чанчерскими. У нихъ сохранилась еще память объ обычаѣ татуированія лица, имѣвшемъ мѣсто во времена путешествія акад. Георги (1772 г.), но исчезнувшимъ уже безвозвратно.

Вмѣстѣ съ устьемъ Чанчера путешественникъ вступаетъ въ долину р. Лены, которая, въ противоположность сѣверо-западному направленію названнаго притока, слѣдуетъ почти съ востока на западъ (з.-ю. 15°). Одинъ взглядъ на ширину русла Лены (до 30 и болѣе саж.) доказываетъ уже, что Чанчеръ можетъ считаться не однимъ изъ ея верховьевъ, а только

обыкновеннымъ притокомъ этой рѣки, а ширина долины, достигающая ниже Чанчера до 3 верстъ, уподобляетъ ее въ этомъ мѣстѣ значительному озеровидному бассейну. Дно долины отчасти луговое, отчасти болотистое, берега русла и склоны поростають лѣсомъ.

Въ малую воду Лену переѣзжаютъ въ бродъ около устья Чанчера, но въ бытность Черскаго, вслѣдствіе прибыли воды отъ дождей, можно было перейти на правый берегъ рѣки только въ 14 или 15 верстахъ ниже устья Чанчера. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ долины, гдѣ растительность бѣднѣе, даже поверхность почвы обнаруживала составъ изъ наноса съ галькою, матеріалъ для которой заимствованъ изъ той же толщи сланцевъ, какая обнажалась и по Чанчеру. Дождь и туманъ мѣшали осмотру развѣтывавшагося передъ путешественниками новаго пейзажа, и только верстъ съ 20 ниже устья Чанчера имъ показались высоты праваго берега, приблизившія здѣсь къ рѣкѣ. Но это была уже часть плоской возвышенности, въ которую врѣзывается здѣсь долина Лены. Въ склонѣ этомъ обнажается известнякъ («верхній известнякъ» онотской толщи породъ), хотя неясная слоистость его не позволяетъ здѣсь судить съ точностью о положеніи его пластовъ, наклоненныхъ кажется на ю.-в. По наблюденіямъ Меглицкаго, слѣдовавшаго здѣсь очевидно при болѣе благоприятныхъ условіяхъ для наблюденій, известнякъ этотъ начинается уже съ окрестностей «Ленскаго десятка», т. е. Тунгусскаго стойбища на устьѣ Чанчера. Онъ говоритъ, что тамъ «верхній ярусъ формациі (т. е. толщи описанныхъ выше сланцевъ) состоитъ изъ известняковъ», но, что еще интереснѣе, это сообщеніе, что известняки эти «изрѣдка перемежаются тамъ съ кирпично-краснымъ рухлякомъ». Меглицкій полагаетъ, что рухлякъ этотъ «кажется принадлежитъ уже девонской почвѣ», но указанный имъ же фактъ перемежаемости его съ известнякомъ, причисляемымъ къ силурійскому возрасту, противурѣчить такому воззрѣнію, на что съ полною

справедливостью указаль уже Чекановскій, не будучи лично знакомъ съ этою мѣстностью. Что же касается Черскаго, то онъ подозрѣваетъ въ этомъ явленіи новое указаніе на возможность существованія здѣсь красно-цвѣтнаго яруса, о которомъ мы говорили уже выше; ярусъ этотъ, залегая поверхъ сланцевъ и подъ известнякомъ, можетъ отчасти перемежаться съ болѣе глубокими слоями послѣдняго, какъ это замѣчается по Иркуту, а правдоподобно и въ верховьяхъ Манзурки. Съ этимъ согласуется и то обстоятельство, что ниже по р. Ленѣ, до самой долины рч. Бирюльки, обнажается одинъ лишь известнякъ, безъ всякихъ слѣдовъ красныхъ прослойковъ. На пути къ названной долині, не доѣзжая до нея верстъ съ 20, около долины Черемной, можно было видѣть наклонъ пластовъ той же породы какъ бы внизъ по теченію Лены (должно быть въ дѣйствительности с.-з.-й) а съ версту ниже, вполне отчетливое и крутое паденіе на ю.-ю.-в. (ю.-в. 37°). Нѣсколько далѣе путешественникъ вступаетъ уже въ область изслѣдованій Чекановскаго и его геогностической карты, Лена отличается и здѣсь все тѣмъ же, почти западнымъ направленіемъ и шириною долины до 2 и 3 верстъ, а около 6 верстъ выше Бирюлекъ, вмѣстѣ съ устьемъ р. Ели кты, верховья которой располагаются около знакомой намъ уже горы Сагднъ-хада, ширина Ленской долины увеличивается даже до 5 верстъ. Въ это расширеніе впадаютъ еще съ лѣвой стороны, рч. Жұя (болѣе 20 верстъ длины), а съ правой, съ 1½ версты ниже Жуи, Бирюлька (верстъ съ 18 длины). Какъ видно на картѣ Чекановскаго, Ели кта (или Эликта) состоитъ изъ двухъ вѣтвей: правой и лѣвой, соединяющихся въ одно низовье въ 6 верстахъ выше устья въ Лену. На Правой Ели ктѣ, около 8 верстъ выше слиянія ея съ Лѣвою, находится деревня Большая Шарельская, а въ Лѣвую Ели кту изливается небольшой лѣвый притокъ, называемый Шевыкднъ. Если не считать небольшой выселокъ (заимку) Хурунгуй, то населеніемъ

мѣста долины р. Лены начинаются именно съ устья Елихты, гдѣ на лѣвомъ берегу Лены располагается деревня Малая Шарельская, а на правомъ сначала Ключевская и Подкаменная, а затѣмъ Бирюлька, иначе Слобода, лежащая на лѣвомъ берегу устья соименной рѣчки, текущей съ с.-с.-в. Широкая долина этой послѣдней съ одной стороны и рч. Жуйи съ другой, имѣютъ важное геогностическое значеніе, какъ граничная черта, къ сѣверо-западу отъ которой начинаются уже осадки девонской системы въ видѣ красно-цвѣтныхъ песчаниковъ, рухляковъ и глинъ, мѣстами зеленыхъ оттѣнковъ, съ которыми мы встрѣчались уже въ нѣсколькихъ пунктахъ плоской возвышенности. По изслѣдованіямъ Чекановскаго, правый склонъ долины Бирюльки состоитъ уже изъ этихъ красныхъ пластовъ, развитыхъ далѣе внизъ по р. Ленѣ, между тѣмъ какъ лѣвый, не менѣе высокій склонъ долины образуется известнякомъ. Всего болѣе интереснымъ является то обстоятельство, что пласты известняка обнаруживаютъ здѣсь значительный наклонъ и изгибы въ противоположность девонскимъ породамъ, которыя лежатъ совершенно горизонтально, такъ-что границу между этими толщами можно считать вмѣстѣ съ тѣмъ и линіей ихъ несогласнаго здѣсь напластованія. Чекановскій <sup>1)</sup> старался впрочемъ разсматривать явленіе это какъ результатъ сдвига, но ему не удалось представить на то никакихъ достаточно вѣскихъ доказательствъ, къ тому же и самое возрѣніе это вызвано было тѣмъ обстоятельствомъ, что въ его время часть онотскихъ сланцевъ считалась еще принадлежащею измѣненнымъ продолженіямъ пластовъ юрской системы, т. е. возрасту, которому Чекановскій относилъ и девонскія красно-цвѣтныя породы. Но съ тѣхъ поръ, какъ описанными выше изслѣдованіями Черскаго выяснились отношенія юры къ онотскимъ породамъ (долины рр. Нижней, Кадильной, Голоустной и т. п.), а этихъ послѣднихъ къ полево-

---

<sup>1)</sup> Чекановскій, loco cit. стр. 219.



шпатовой толщѣ, и когда многочисленными разрѣзами Прибайкальскихъ горъ доказано отсутствіе въ нихъ девонскихъ осадковъ, примыкающихъ только къ ихъ сѣверо-западному подножью, — съ тѣхъ поръ единственнымъ выводомъ, не выходящимъ за предѣлы наличныхъ фактовъ, слѣдуетъ считать тотъ, согласно которому Онотскій хребетъ образовалъ собою юго-восточный берегъ девонскаго моря, не проникавшаго въ границы современной системы водъ Байкала.

Въ долину Бирюльки Чекановскій описываетъ еще напосное отложеніе толщиною болѣе  $3\frac{1}{2}$  сажень; нижній слой его состоитъ изъ красноватой глины и суглинка съ угловатыми кусками мѣстаго известняка, тогда какъ верхній ( $\frac{1}{2}$  саж. толщиною) состоитъ изъ «глины съ остатками *Succinea*, *Helix* и *Pupa*», можетъ быть настоящій лессъ, который, по замѣчанію Черскаго, встрѣчается въ нѣкоторыхъ частяхъ плоской возвышенности. Отъ дер. Бирюльки остается только 17 верстъ до поворота съ долины р. Лены, служивающей на этомъ пути до  $1\frac{1}{2}$  верстъ, въ долину р. Манзурки, вверхъ по которой направляется уже часть Якутскаго тракта, ведущая къ г. Иркутску. Съ нею мы ознакомимся въ своемъ мѣстѣ, теперь же возвратимся въ долину Онгурёна, чтобы отсюда продолжать описаніе маршрутовъ, знакомящихъ насъ съ сѣверо-восточнымъ продолженіемъ интересующихъ насъ горъ.

#### В) Экскурсія Черскаго изъ Онгурёна въ систему рч. Илги, впадающей въ Байкалъ.

Мы говорили уже о томъ, что описанный выше маршрутъ Черскаго изъ Онгурёна, черезъ Чанчеръ и Лену, въ долину р. Манзурки, совершенъ имъ осенью 1879 г., на обратномъ пути съ Байкала въ Иркутскъ. На слѣдующее лѣто ему предстояло окончить излѣдованіе сѣверо-западнаго берега Байкала на протяженіи отъ Онгурёна до сѣверо-восточной оконечности

озера и потому, 18 мая 1880 г. Черскій прибылъ сухимъ путемъ (черезъ Хоготь, Бугульдейку и т. д. по Ольхонской дорогѣ) опять въ Онгурёнъ, куда, на пароходѣ, доставили ему впослѣдствіи лодку съ работниками, для дальнѣйшаго плаванія по Байкалу. Нижеслѣдующія экскурсіи, какъ равно и описанная выше на вершину горы Саганъ-хада, совершены имъ въ ожиданіи парохода, нѣсколько опоздавашаго, по неависѣвшимъ отъ него причинамъ. Дорога къ долинѣ средняго теченія рч. Илги, устье которой располагается въ 18 верстахъ на с.-в. отъ Онгурёнской долины, считая по Байкалу, ведетъ сначала вверхъ по знакомой намъ уже нижней части долины Тонгужиръ, вдоль подножья соименнаго хребтика, на вершинѣ котораго располагается описанное выше древнее монгольское укрѣпленіе. Въ разстояніи около 3 верстъ отъ устья, на мѣстѣ соединенія верхней, почти меридіональной части этой долины, съ нижнею, слѣдующею юго-западному направлению, Тонгужирская долина представляетъ слѣдующую, небезынтересную особенность. Въ горномъ отрогѣ, образующемъ лѣвый берегъ долины и сливавшемся очевидно съ Тонгужирскимъ хребтикомъ, замѣчается глубокій перерывъ, до 30 сажень ширины, обращенный на в.-ю.-в. къ низовьямъ сосѣдней, самостоятельной долины, извѣстной подъ названіемъ Хардѣ. Ближайшій осмотръ показалъ, что въ плоское, террасовидное дно этого перерыва врѣзалась еще узкая неглубокая, правая вѣтвь долины Хардѣ въ видѣ короткой ложбины, проникшей своими верховьями и въ верхнюю часть Тонгужирской долины, такъ-что, еслибы послѣдняя не была сухою, то воды ея не могли бы достигать нормальнаго устья долины (въ Онгурёнъ), а должны были бы устремиться на юго-востокъ, въ долину Хардѣ, что и дѣйствительно имѣетъ мѣсто съ весенними водами Тонгужира. Все это представляетъ въ общемъ случай захвата одной долины другою, вполне похожій на описанный выше въ Тутской (Тункырско-Тутской) долинѣ, около Ольхонскихъ воротъ (см. выше). Черезъ опи-

санный перерывъ и по углубившейся въ немъ ложбинѣ тропа спускается изъ Тонгужирской долины въ Хардо, достигая послѣдней около версты выше ея устья въ Байкалѣ. Долина Хардо, удаленная всего лишь на 3—4 версты отъ устья Онгурѣнской, отличается меридіональнымъ направленіемъ и отчасти степнымъ, отчасти же луговымъ характеромъ, при значительной ширинѣ, въ особенности въ низовьяхъ, гдѣ, около Байкала, въ ней замѣчаются два озерка и бурятскій улусъ того же названія. Длина долины менѣе 10 верстъ, причемъ уже при взглядѣ съ низовьевъ, можно видѣть, что она беретъ начало въ какомъ то расширеніи, позади котораго тянется Приморскій хребетъ, пересѣченный долиною Илги. И дѣйствительно, въ разстояніи около 9 верстъ отъ Байкала, вслѣдъ за бурятскимъ улусомъ Хулыртѣ (254' надъ Байк.), передъ взоромъ путешественника открывается видъ на обширную и живописную площадь, относительно которой долина Хардо является отводящимъ, хотя и сухимъ каналомъ. По ея обширности и до нѣкоторой степени довольно сложной конфигураціи, болѣе точное понятіе объ этой площади можно составить лишь послѣ пересѣченія ея нѣсколькими маршрутами, что и сдѣлано Черскимъ, хотя къ сожалѣнію точной съемки и промѣровъ разстояній до сихъ поръ еще не имѣется. Все расширеніе, названное Черскимъ Илгинскимъ бассейномъ, имѣетъ очертаніе почти прямоугольнаго треугольника, обращеннаго вершиною на юго-востокъ, къ Байкалу, тогда какъ основаніе его примыкаетъ къ крутому склону хребта Приморскаго, причемъ длина этого основанія равняется повидимому около 15 верстамъ и даже болѣе, если имѣть въ виду долины, открывающіяся въ оба прилегающіе угла, а ширина площади, считая по высотѣ прямоугольника, достигаетъ около 10 верстъ. Приморскій хребетъ, направляясь къ сѣверо-востоку, отличается частью округленными, а иногда и какъ бы плоскими, но скалистыми вершинами, достигающими здѣсь, повидимому, не болѣе 3500' высоты надъ Байкаломъ.

На половинѣ видимой здѣсь его длины хребетъ пересѣкается глубокою, но узкою долиною рч. Илги, извѣстной у бурятъ подъ названіемъ Элигѣй; скалистый склонъ праваго берега этой долины снабженъ двумя небольшими но заостренными вершинками. Между тѣмъ двѣ остальные стороны площади, т. е. южная и восточная ограничены болѣе низкими и лѣсистыми отрогами хребта, достигающими и до самаго берега Байкала.

Описанная выше долина Хардѣ исходитъ изъ южной стороны площади, направляясь, какъ сказано выше, къ югу; не взирая на то, площадь эта снабжена еще и другимъ отводящимъ каналомъ, который можно считать даже главнымъ: онъ соединяетъ собою юго-восточный уголъ (т. е. вершину треугольника) ея съ озеромъ и отводитъ воду р. Илги въ Байкалъ, т. е. къ юго-востоку. Кромѣ того есть основанія предполагать нѣкоторую связь восточной стороны описываемой площади съ верховьями Кочериковской долины, впадающей въ Байкалъ въ 5 верстахъ къ сѣверо-востоку отъ Илги, хотя, быть можетъ, связь эта не на столько полная, какъ съ Хардо и съ Илгою, и нарушается какимъ либо водораздѣльнымъ возвышеніемъ. Ближе къ окружающимъ ее горамъ интересующая насъ площадь возвышается террасовидно отъ 495 до 738' надъ Байкаломъ, причемъ характеръ болѣе низкихъ террасъ и ширина указываетъ на то, что ихъ слѣдуетъ разсматривать какъ остатки прежняго, болѣе высокаго дна площади, въ которую врѣзались затѣмъ русла орошающихъ ее нынѣ и значительно перемѣщавшихся водъ, причемъ, какъ орографическій характеръ, такъ и особенности наноса, выполняющаго дно, позволяютъ допустить прежнюю бытность здѣсь озерныхъ водъ. На площади встрѣчаются также и острововидныя возвышенія почвы, изъ которыхъ, напр. такъ называемое Булагъ-й-толгъ-й (между выходами Хардѣ и Илги) состоитъ изъ коренной, полевошпатовой породы, входящей въ составъ ближайшихъ горъ. Главное орошеніе мѣстности

совершается водами р.ч. Илги. Верховья этой рѣчки, какъ мы увидимъ ниже, располагаются въ продольной долинѣ, отдѣляющей здѣсь Приморскій хребетъ отъ Онотскаго, въ 18 верстахъ на сѣверо-западъ отъ устья, считая по прямому направленію, гдѣ она беретъ начало изъ находящагося тамъ, небольшого озера. Отсюда, на протяженіи около 6 верстъ, Илга направляется къ юго-западу, послѣ чего круто поворачиваетъ на юго-востокъ въ узкую и короткую (до 2 верстъ) долину, пересѣкающую Приморскій хребетъ. По ней Илга выходитъ въ описанное расширеніе, и протекаетъ въ общемъ къ юго-востоку къ соотвѣтственному углу площади, ближе къ которому она принимаетъ съ правой стороны: ключъ Булугай, берущій начало изъ почвы равнины около упомянутого выше острововиднаго холма (Булугай-толгой), а затѣмъ другой, извѣстный подъ названіемъ Саганъ-горхонъ. На высотѣ 129' надъ Байкаломъ Илга вступаетъ въ долину, отводящую ее къ озеру. Стѣсненная съ обеихъ сторонъ склонами пересѣкаемыхъ здѣсь горъ, долина суживается сначала до 70 сажень, а въ одномъ мѣстѣ и до 20 сажень и расширяется нѣсколько ближе къ устью, расположенному на мысовидномъ выступѣ береговой линіи Байкала. Долина эта, совмѣщающая нижнее теченіе Илги (около 5 верстъ длины), отличается мрачнымъ, и болѣе дикимъ характеромъ, поросла хвойнымъ лѣсомъ, и потому уподобляется болѣе той части верхняго отрѣзка, которая пересѣкаетъ собою Приморскій хребетъ, тогда какъ средняя часть теченія рѣчки, т. е. въ предѣлахъ описаннаго расширенія, по большей части луговая, мѣстами даже съ березовыми рощами. Судя по направленію ложбинъ, означающихъ прежнее направленіе русла, р. Илга, послѣ выхода изъ хребта, должна была направляться къ югу, въ долину Хардѣ. Прежнее русло это настолько хорошо сохранилось, что жители улуса Хулыртѣ воспользовались имъ и отвели значительную часть воды въ свою сторону, гдѣ, послѣ орошенія принадлежащихъ имъ луговъ (такъ называе-

мыхъ Нарынѣ-хѣръ), вода скопится въ болотахъ и нѣсколькихъ озеркахъ недалеко отъ Булугай-толгой. Кромѣ Илги здѣсь протекаетъ еще самостоятельная рѣчка, текущая по одной изъ долинъ ю.-з. угла расширенія: это небольшая Хуртлѣ, берущая начало въ Приморскомъ хребтѣ, въ сѣверной изъ трехъ долинъ, открывающихся въ юго-западный уголъ расширенія; отсюда Хуртлѣ (иначе Хуртлѣ) поворачиваетъ къ востоку, почти вдоль южной стороны Илгинскаго бассейна и достигаетъ начала долины Хардѣ, гдѣ исчезаетъ около упомянутого выше улуса Хулырту. Наконецъ, въ 6 верстахъ къ сѣверо-востоку отъ мѣста выхода Илги изъ Приморскаго хребта, на склонѣ послѣдняго, беретъ начало еще одинъ ключъ — Сортѣдабѣнъ (см. ниже), изсякающій въ нѣсколькихъ верстахъ послѣ выхода изъ горъ на площадь средняго теченія Илги, не достигая послѣдней.

Изъ юго-западнаго угла описанной площади Черскій переваливалъ черезъ Приморскій хребетъ на верхнюю часть теченія знакомой намъ уже рч. Чанчеръ. На высотѣ 738' надъ Байкаломъ онъ достигъ выхода рч. Хуртлѣ изъ хребта, гдѣ долина ея направляется на ю.-ю.-з. Здѣсь же открывается еще другая (средняя) долина, извѣстная подъ именемъ Хурай-Хуртлѣ, т. е. сухая Хуртлѣ и слѣдующая съ того же хребта почти съ запада на востокъ; что же касается третьей долины съ неизвѣстнымъ названіемъ (права), то она беретъ начало вблизи верховьевъ Хурай-Онгурена (см. выше), направляется въ общемъ на с.-в. и опредѣляетъ собою юго-восточную границу хребта въ этомъ мѣстѣ. Мѣстность пріобрѣтаетъ здѣсь уже дикій характеръ и порастаетъ густымъ хвойнымъ лѣсомъ. Хуртлѣ имѣетъ видъ небольшого горнаго потока, мчащагося въ скалистомъ руслѣ. Подъемъ на Приморскій хребетъ совершенъ былъ вверхъ по долинѣ Хурай-Хуртлѣ и переваль достигнутъ на высотѣ 2368' надъ уровнемъ Байкала. Хребетъ оказался здѣсь не превышающимъ 3—4 версты въ ширину; верхняя его поверхность обильно

порасла здѣсь кедровымъ сланцемъ; она почти совершенно плоская (2368' надъ Байк.) и открытая одинаковымъ образомъ какъ къ ю.-в., такъ ю.-з. и западу, т. е. къ долину Чанчера, и только къ сѣверу и сѣверо-востоку на ней возвышаются округленныя вершины высшей части хребта, превосходящія по всей вѣроятности 3000' надъ озеромъ. Поверхность эта имѣетъ такимъ образомъ террасовидную наружность относительно сѣверныхъ горъ, но открытость ея въ сторону обоихъ склоновъ хребта придаетъ этой части его видъ узкаго отръзка плоскогорья. Крутой спускъ ведетъ отсюда въ долину Чанчера, дно которой, верстахъ въ 8—9 сѣвернѣе Онгуренскаго перевала, лежитъ на высотѣ 1865' надъ Байкаломъ. Второй перевалъ черезъ Приморскій хребетъ совершенъ Черскимъ по долину Сортѣ-да-бана, но маршрутъ этотъ, какъ ведущій къ верховьямъ р. Лены, слѣдовательно, выходящій за предѣлы системы водъ бассейна р. Илги, мы опишемъ въ слѣдующемъ параграфѣ. Одна изъ вершинъ хребта въ описываемой его части посѣщена была, какъ извѣстно, и академикомъ Георги; вершину эту онъ называетъ Алей. Изъ описанія нельзя однако опредѣлить съ точностью мѣстоположенія этого пункта, что же касается самого названія, то по распросамъ Черскаго, оно вовсе неизвѣстно нынѣ мѣстнымъ бурятамъ и можно даже полагать, что «Алей» у Георги произошло отъ искаженнаго Элигѣй, т. е. Илга; этимъ словомъ отвѣтилъ бурятъ и Черскому, когда путешественникъ этотъ, увидѣвъ часть хребта, пересѣкаемую долиною Илги, спросилъ его:—какія это горы?—Во всякомъ случаѣ, на вопросъ Георги: какимъ образомъ произошли громадныя обломки скалъ, лежащія не на склонахъ, а на самой вершинѣ посѣщенной имъ горы (Алей), можно отвѣтить нынѣ даже аргіогі, что глыбы эти образовались вслѣдствіе неравномѣрнаго растрескиванія и обрушенія бывшихъ тамъ прежде, болѣе высокихъ скалъ и вершинъ.

Наконецъ, что касается результатовъ произведенныхъ

Черскимъ геологическихъ изслѣдованій мѣстности, то они показали, что древнѣйшія кристаллическія породы (роговообманковый и хлоритово-роговообманковый гнейсы, такіе же сланцы, а около Хардо и грюнштейнъ съ шаровидною отдѣльностью) образуютъ собою только болѣе низкіе отроги, примыкающіе и къ Байкалу, тогда какъ Приморскій хребетъ въ предѣлахъ Илгинскаго бассейна состоитъ уже изъ известняка (или доломита), кварцита и глинистаго сланца, т. е. изъ толщи, свойственной обыкновенно Онотскому хребту.

Г) Маршрутъ Черскаго изъ долины Онгурена черезъ верховья рч. Илги, къ источникамъ р. Лены. Верхнее теченіе р. Лены.

Описанный уже выше экскурсіи въ системѣ рч. Илги выходятъ нѣсколько за меридіанъ долины Онгурена, до которой мы довели описаніе береговаго плаванія по Байкалу; что же касается поѣздки Черскаго къ источникамъ р. Лены, лежащимъ нѣсколько болѣе 40 верстъ на сѣверо-востокъ отъ устья Онгурена, считая по прямому направленію, то маршрутъ этотъ вводитъ насъ уже въ тѣ части прибрежныхъ горъ озера, съ юго-восточнымъ склономъ и подножьемъ которыхъ (т. е. береговою линіею Байкала) мы ознакомимся еще въ слѣдующемъ параграфѣ. Кромѣ подробнаго знакомства съ источниками столь громадной водной артеріи, какъ р. Лена, прежнія свѣдѣнія о которыхъ были весьма недостаточны, путь этотъ позволяетъ намъ видѣть еще и прилежащую часть Онотскаго хребта, который, какъ мы увидимъ ниже, выдѣляется здѣсь на столько же рѣзко, какъ въ области юго-западной и средней частяхъ Байкальской долины.

Еще къ вечеру 26 мая (1880 г.) явился въ Онгурѣн молодой Чанчерскій тунгусъ съ верховыми лошадьми, чтобы отвезти Черскаго къ мѣсту выхода р. Илги изъ Приморскаго хребта, гдѣ ихъ выжидали другіе тунгусы, собиравшіеся къ



источникамъ Лены. Тихую и ясную, но холодную ночь путешественникъ провелъ вблизи подножья хребта, на высотѣ 495' надъ Байкаломъ, въ обществѣ шести тунгусовъ. Всѣ они были въ полномъ вооруженіи; кромѣ винтовокъ и ножей имѣлись еще и копыя (рогатины), на случай упорной схватки съ медвѣдемъ. Короткая верхняя ихъ одежда и фуражки были русскаго покроя и только очень узкіе панталоны, сливающіяся съ длинною и мягкою кожанною обувью (*унты*) обличали въ костюмѣ ихъ тунгусское происхожденіе. Не взирая на то, что каждый изъ нихъ располагалъ какъ войлокомъ, такъ и сѣдломъ, никто не позаботился устроить себѣ постель и всѣ тунгусы уснули около костра на тѣхъ же мѣстахъ, на которыхъ они бесѣдовали послѣ вечерняго чая, приче́мъ подушкою для нѣкоторыхъ изъ нихъ служилъ стволъ лежащаго здѣсь сухого дерева, а для другихъ соотвѣтственно уложенная рука. На слѣдующее утро проектъ совмѣстной поѣздки измѣнился: оставивъ Черскому одного проводника, остальные тунгусы предпочли отправиться къ верховьямъ Чанчера.

Перейдя на лѣвый берегъ Илги, Черскій направился къ упомянутому выше ручью, Сортѣ-дабану, вверхъ по которому совершается переваль черезъ Приморскій хребетъ. Долина этого потока располагается приблизительно въ шести верстахъ къ сѣверо-востоку отъ выхода р. Илги, западнѣе одной изъ вершинъ хребта, называемой Кочериковскимъ гольцомъ. Начиная съ этой вершины Приморскій хребетъ измѣняетъ свою наружность въ томъ отношеніи, что здѣсь онъ впервые является болѣе расчлененнымъ и скалистымъ, вслѣдствіе чего мѣстами принимаетъ альпійскую наружность (см. также ниже). На высотѣ 658' надъ Байкаломъ тропа проходитъ по террасѣ подножья хребта, послѣ чего слѣдуетъ уже крутой подъемъ, большую часть котораго необходимо вести лошадей подъ узцы. Долина Сортѣ-дабана не отличается глубиною и потому склоны ея не представляютъ утесовъ, а болѣею частью покрыты лишь осыпью скалъ, которой завалено и русло. Изъ

высотѣ 2588' надъ озеромъ потокъ состоитъ уже изъ нѣсколькихъ сходящихся ручейковъ, а нѣсколько сотъ футовъ выше (2814' н. Байк.) начали встрѣчаться на пути довольно значительныя поляны нестаявшаго еще снѣга. Отсюда устье р. Илги виднѣлось на ю.-ю.-в.; хорошо можно было разглядѣть и полуостровъ Святой Носъ, какъ равно и другія горы противоположнаго берега Байкала. На этой высотѣ произрасталъ уже кедровый сланецъ, на которомъ уцѣлѣло еще не мало прошлогоднихъ шишекъ съ мелкими, но весьма вкусными орѣхами. Видъ на одну изъ ближайшихъ вершинъ хребта удивилъ путешественниковъ тѣмъ обстоятельствомъ, что на ней, казалось, весьма ясно обрисовывался крестъ, чернѣя на голубомъ фонѣ неба; но вдругъ плечо его замѣтно покосилось и какъ бы упало. Оказалось впослѣдствіи, что это былъ тунгусъ съ перерѣщенной на плечахъ винтовкой: стоя на вершинѣ перевала, онъ высматривалъ добычу и, услышавъ слабый шумъ въ сторонѣ приближавшихся путешественниковъ, онъ снялъ оружіе, придававшее ему видъ креста. Перевалъ и въ этомъ мѣстѣ оказался достаточно плоскимъ и узкимъ, какъ на пути съ Хуртлѣ на Чанчеръ, но высота его здѣсь нѣсколько болѣе значительная и достигаетъ 3040' надъ Байкаломъ <sup>1)</sup>. Что касается строенія долины Сортѣ-дабана, то ближе къ основанію хребта Черскій встрѣтилъ метаморфическій конгломератъ, переходящій въ тальковый сланецъ (см. отчетъ за 1880 г.) затѣмъ, на высотѣ 2588', обнажается известнякъ темно-сѣраго цвѣта, а на самомъ перевалѣ, какъ въ осыпи, такъ и въ небольшихъ выступахъ, встрѣчается глинистый и рухляковъ сланецъ, перемежающійся съ прослойками известняка почти чернаго цвѣта. Положеніе пластовъ возможно было опредѣлить только по этимъ сланцамъ, причемъ оказалось,

---

<sup>1)</sup> Высота эта, какъ равно и высота источниковъ р. Лены, на картѣ Черскаго нанесены ошибочно, какъ вычисленные не къ уровню Байкала, а къ высотѣ средняго теченія р. Илги, вслѣдствіе чего высоты эти на 495' меньше дѣйствительныхъ.

что слои падают здѣсь на ю.-в., съ наклономъ всего лишь въ  $20^{\circ}$ , слѣдовательно почти совершенно также, какъ и на Чанчерѣ. Съ перевала открылся видъ на довольно широкую (70—100 сажень) продольную долину, ограниченную съ сѣверо-запада хребтомъ почти вовсе нерасчлененнымъ и потому какъ бы съ плоскимъ гребнемъ, высота котораго даже превышаетъ противуположную часть параллельнаго ему, Приморскаго хребта. На днѣ этой долины (2700' н. Байк.), почти насупротивъ Сорто-дабанскаго перевала, берутъ начало двѣ рѣчки, слѣдующія діаметрально противуположному направленію, хотя верховья ихъ отдѣлены почти незамѣтнымъ для глаза водораздѣломъ. Одна изъ нихъ, знакомая намъ уже Илга, вытекаетъ изъ расположеннаго здѣсь, небольшого озера и направляется къ юго-западу, послѣ чего уже, нѣсколько верстъ спустя, она поворачиваетъ къ юго-востоку, пересѣкаетъ Приморскій хребетъ и выходитъ на описанную выше площадь ея средняго теченія. Другая, между тѣмъ, называемая Ванайскимъ ключикомъ, беретъ начало изъ болотъ сѣверо-восточныхъ окрестностей Илгинскаго озера и направляется къ сѣверо-востоку въ систему р. Лены (см. ниже). Не взирая на такія современныя гидрографическія особенности этой долины, которую Черскій называетъ Илгинско-Ванайскою, склоны ея направляются прямолинейно, отличаясь къ тому же почти вездѣ одинаковымъ наклономъ, вслѣдствіе чего нельзя сомнѣваться въ томъ, что образованіе ея и углубленіе обязано бывшему здѣсь прежде теченію одного потока, а не двухъ противуположныхъ, происхожденіе которыхъ слѣдуетъ отнести къ позднѣйшему времени. Кромѣ того, съ того же перевала видно, что нѣсколько ниже источниковъ Илги, сѣверо-западный хребетъ, считаемый Черскимъ продолженіемъ Оютскаго, пересѣкается въ поперечномъ направленіи глубокою долиною, находящеюся въ непосредственномъ сообщеніи съ дномъ Илгинско-Ванайской, какъ Хардъ съ Илгинскимъ бассейномъ (см. выше). Долина эта принадлежитъ однако системѣ р. Лены;

она занята верховьями небольшого ключика, впадающего въ р. Ванай (см. ниже) и извѣстна подъ названіемъ Пронькина падь (падъ-долина). Такимъ образомъ топографическія особенности Илгинско-Ванайской долины интересны и оригинальны въ томъ отношеніи, что, еслибы вообразить ее наполненной водою до уровня, нѣсколько превосходящаго поверхность Илгинскаго озера, то вода эта стекала бы по тремъ различнымъ направленіямъ: на ю.-в., къ Байкалу, а на с.-в. и с.-з., къ р. Ленѣ. Спустившись съ перевала въ Илгинско-Ванайскую долину, Черскій встрѣтилъ только-что прибывшее сюда семейство того тунгуса, который, стоя на вершинѣ перевала, былъ причиною описанной выше иллюзіи. Жена его и дѣти суетились надъ приготовленіемъ пищи, привязывали и развѣсывали оленей, доили ихъ и ухаживали за ними. Составилась общая трапеза, послѣ которой тунгусы, довольные предложенными имъ сухарями, сахаромъ и табакомъ, угощали путешественника оленьимъ молокомъ и кедровыми орѣхами. Они крайне огорчались тѣмъ, что вслѣдствіе продолжающихся холодовъ, до сихъ поръ не могли встрѣтить ни одного медвѣдя, тогда какъ при болѣе нормальныхъ климатическихъ условіяхъ, это время считается лучшимъ для медвѣжьего промысла, такъ какъ животное это выходитъ обыкновенно на безлѣсный солнечный склонъ горъ «моряны» (см. выше), гдѣ питается нѣкоторыми молодыми растеніями. Весенній ландшафтъ на этой высотѣ былъ еще крайне мрачнымъ: деревья еще не распустились, зелень травы едва пробивалась изъ подъ сѣраго фона засохшей прошлогодней растительности и почти безлѣсная эта часть долины, напоминала бы собою видъ сѣверной тундры, еслибы не окружающіе ее хребты, испещренные нестаявшими еще полянами снѣга.

Тропа къ верховьямъ Лены слѣдуетъ отсюда внизъ по Ванайскому ключику, долина котораго въ скоромъ времени начинаетъ довольно быстро понижаться къ сѣверо-востоку, а затѣмъ поворачиваетъ болѣе къ сѣверу, значительно суживается

причемъ такому направленію не повинуется однако высшая часть Приморскаго хребта, такъ какъ правому берегу долины сопутствуютъ только болѣе низкіе, лѣсистые и повидимому террасовидные отроги. Вся длина Ванайскаго ключика не превосходитъ 10 верстѣ, послѣ чего, на высотѣ 1.576' надъ Байкаломъ, онъ впадаетъ съ лѣвой стороны въ рч. Ванай.

Ванай представляетъ собою непосредственный лѣвнй притокъ р. Лены, слѣдующій почти западному направленію и впадающій значительно выше устья знакомаго намъ уже Чанчера (см. также ниже); въ него же впадаетъ и описанная выше Пронькина падь. Отъ устья Ванайскаго ключика до источниковъ Ваная считается около 15 верстѣ. Тропа поворачиваетъ вверхъ по лѣвому берегу рѣчки, протекающей здѣсь въ довольно широкой, лѣистой долинѣ, слѣдующей на з.-ю.-з. Около 4 верстѣ выше съ лѣвой стороны въ Ванай открывается долина рѣчки, называемой Арбунъ, что у тунгусовъ означаетъ вообще соединеніе двухъ рѣчекъ или долинь («стрѣлка» у русскихъ жителей)<sup>1)</sup>. Около двухъ верстѣ далѣе, вслѣдъ за террасою, возвышающеюся на правомъ берегу на слишкомъ 250', долина Ваная суживается до 30 саженой, вслѣдствіе подступившаго съ лѣвой стороны отрога хребта Приморскаго. Русло Ваная достигаетъ здѣсь все-таки отъ 2 до 5 саж. ширины и нѣсколько выше принимаетъ съ лѣвой стороны еще одинъ притокъ, извѣстный подъ именемъ Джалагѣнъ. Здѣсь долина опять значительно расширяется и обнаруживаетъ слѣды какъ болѣе древнихъ (1840 года), такъ и позднѣйшихъ золотопосконыхъ работъ, производившихся было также и по Ванайскому ключику; на сколько можно узнать отъ тунгусовъ, здѣсь находили весьма явные слѣды золота, процентное содержаніе котораго неоплачивало однако работы. Верстѣ съ 5 далѣе, слѣдуя черезъ едва проходимую чашу

---

<sup>1)</sup> На картѣ Черскаго Арбунъ по ошибкѣ показанъ съ правой стороны.

хвойнаго лѣса, въ которомъ путешественники долго блудили съ цѣлью отыскать тропу, они достигли мѣста соединенія двухъ верховьевъ Ваная на высотѣ 2.604' надъ Байкаломъ; изъ нихъ правая притекаетъ съ с.-с.-з., а лѣвая съ в.-с.-в. Тропа направилась вверхъ по послѣдней и вскорѣ встрѣтила суженіе этой долины до 15 саженой. Только правый берегъ рѣчки сопровождается здѣсь почти непосредственно высокими горами (Онотскій хребетъ), тогда какъ къ лѣвому примыкаетъ хорошо развитая терраса, достигающая болѣе 2.800' надъ Байкаломъ. Терраса эта образуетъ здѣсь подножье Приморскаго хребта, придерживающагося, какъ и прежде, сѣверо-восточнаго направленія; въ ней именно врѣзалось ущелье описываемаго лѣваго верховья Ваная, пересѣкая эту часть террасы почти въ поперечномъ направленіи и приближаясь къ мѣсту, гдѣ прежде терраса сливалась и съ подножьемъ Онотскаго хребта, изображая собою болѣе высокое дно древней долины, располагавшейся между обоими хребтами (см. ниже). Поднявшись на эту террасу, путешественникъ встрѣчаетъ полнѣйшее подтвержденіе такому воззрѣнію. Отсюда, во-первыхъ, видно, что терраса эта продолжается далеко назадъ, т. е. къ юго-западу, вдоль соответствующаго ей склона хребта Приморскаго и, еслибы прослѣдить её по всей длинѣ, что весьма интересно было бы провѣрить будущимъ изслѣдователямъ, то безъ сомнѣнія она привела бы къ тому мѣсту, гдѣ знакомый намъ уже Ванайскій ключикъ выходитъ изъ Илгинско-Ванайской долины. Во-вторыхъ, съ высоты той же террасы можно видѣть, что на ея сѣверо-восточномъ продолженіи располагается широкая и длинная продольная долина, лежащая между Приморскимъ и Онотскимъ хребтами и слѣдующая сѣверо-восточному направленію. Юго-западная часть этой долины, ближайшая къ сѣверо-восточному краю террасы, является широко углубленною: она занята верховьями Ваная, вступающаго затѣмъ въ описанное выше небольшое ущелье. Верховья эти состоятъ изъ двухъ

вѣтвей, изъ которыхъ лѣвая, въ видѣ короткаго, но очень быстрого горнаго потока, беретъ начало на прилежащемъ склону Приморскаго хребта, изъ образовавшагося тамъ воронкообразнаго расширенія верховьевъ, тогда какъ правая вѣтвь направляется съ сѣверо-востока съ болѣе высокой части дна упомянутой продольной долины, размывая выполняющій ее слоистый песчаный наносъ съ галькою и питаясь также ключиками со склона Онотскаго хребта. Подвигаясь вверхъ по теченію этой вѣтви, черезъ 3 версты, путешественникъ достигаетъ высшей части дна долины, на которой anerоидъ показалъ 3.461' надъ уровнемъ Байкала. Отсюда мѣстность обозрѣвается еще съ большимъ удобствомъ. Оказывается, что продольная долина наша тянется непрерывно къ сѣверо-востоку, не обнаруживая никакого суженія; въ ту же сторону начинаетъ наклоняться и ея пологое дно, причемъ изъ расположенныхъ вблизи болотъ и вочекъ беретъ начало небольшой ключикъ, направляющійся такимъ образомъ въ сторону діаметрально-противоположную правому верховью Ваная. Ключикъ этотъ составляетъ собою одинъ изъ источниковъ р. Лены. Къ нему присоединяется сейчасъ же съ правой стороны другой, нѣсколько болѣе многоводный, берущій начало съ ближайшаго склона Приморскаго хребта, послѣ чего оба они сливаются еще съ третьимъ, лѣвымъ, притекающимъ съ соответствующаго склона Онотскаго хребта. Образовавшаяся, такимъ образомъ, рѣка Лена (у бурятъ Зулхэ) не достигаетъ еще и сажени въ ширину. Слегка извиваясь по широкой и почти безлѣсной долинѣ, она протекаетъ въ такомъ видѣ еще верстъ съ 18 къ сѣверо-востоку, гдѣ, передъ входомъ рѣки въ суженіе долины, Черскій осматривалъ ее еще разъ, переваливъ черезъ хребетъ съ Байкала (см. ниже). Долина верховьевъ р. Лены, какъ и Игинско-Ванайская, имѣла еще весьма мрачную, какъ бы тундренную наружность, вслѣдствіе поздней весны на этихъ высотахъ (28-го мая). На склонахъ хребтовъ, а мѣстами и въ

самой долины, лежали еще много поляны снѣга. Оба хребта, казалось, достигаютъ здѣсь одинаковой высоты, но вовсе не представляютъ смѣлыхъ и живописныхъ очертаній, свойственныхъ болѣе расчлененнымъ, альпійскимъ цѣпямъ и потому плоско-волнистый контуръ ихъ гребня прерывается лишь изрѣдка слабо-выдающимися тупыми вершинами, какъ напр., въ верховьяхъ лѣвой вѣтви Ваная или около праваго источника Лены, гдѣ нѣсколько выдѣляется одна двуглавая вершина въ Приморскомъ хребтѣ, а около лѣваго верховья той же рѣки другая и въ Онотскомъ.

Такимъ образомъ Лена беретъ начало въ продольной долины, общей съ верховьями Ваная и почти въ такомъ же отношеніи къ послѣднему, собственно къ правому верховью Ваная, какъ рѣка Илга къ Ванайскому ключику, такъ какъ обѣ онѣ протекаютъ сначала въ діаметрально-противоположномъ направленіи. Долина эта располагается весьма близко къ Байкалу и почти параллельно ему, такъ-что ближайшее разстояніе отъ источниковъ Лены къ береговой линіи озера равняется 10 верстамъ (отъ устья долины Аютха, 42 версты къ с.-в. отъ Онгурена, см. ниже), а около упомянутого выше входа Лены въ суженіе разстояніе это уменьшается даже до 5 верстъ, считая по прямой линіи отъ озера. Тѣмъ не менѣе тунгусы считаютъ невозможнымъ переходъ на источники Лены прямо съ Байкала, вслѣдствіе скалистости юго-восточнаго склона Приморскаго хребта въ этомъ мѣстѣ, тогда какъ нѣсколько ниже по теченію (около 18 верстъ), Черскій спускался на Лену, переваливъ черезъ хребетъ пѣшкомъ съ береговой линіи Байкала (см. ниже). Основываясь на расположеніи и особенностяхъ описанной выше террасы, Черскій обращаетъ вниманіе будущихъ изслѣдователей на то обстоятельство, что долина верховьевъ р. Лены могла продолжаться прежде далеко къ юго-западу, повидимому до непосредственнаго соединенія съ Илгинско-Ванайскою, причемъ уровень дна ея былъ въ то



время гораздо выше, располагаясь на уровнѣ упомянутой террасы. Что же касается современныхъ топографическихъ и гидрографическихъ особенностей мѣстности, то онѣ могли образоваться позднѣйшимъ вторженіемъ отступавшихъ верховьевъ рѣкъ сѣверо-западнаго склона Опотскаго хребта. Изъ нихъ верховья Ваная захватили и углубили собою часть долины, ближайшую къ современнымъ источникамъ Лены, образовавъ и нынѣшній водораздѣлъ, который состоитъ только изъ наносныхъ отложеній, имѣющихъ характеръ прежнихъ озерныхъ осадковъ; между тѣмъ верховья Ванайскаго ключика и Пронькиной пади врѣзались и захватили ту часть интересующей насъ древней продольной долины, которая занята нынѣ верхнимъ теченіемъ Илги. Такихъ, нерѣдко встрѣчающихся въ природѣ явленій было бы вполне достаточно для воспроизведенія современныхъ особенностей мѣстности, и часть прежняго дна этой долины, въ промежуткѣ между Ванайскимъ ключикомъ и Ванасмъ, должна была бы преобразоваться въ ту террасовидную часть Приморскаго хребта, которая разобщаетъ нынѣ обѣ названныя рѣчки. Остается только вопросъ о сравнительной древности тѣхъ частей долинъ Илги и Лены, которыя выводятъ ихъ изъ реставрированной продольной долины, послѣ чего можно было бы судить о томъ, которой изъ названныхъ двухъ системъ водъ принадлежала эта долина прежде, чѣмъ потерпѣла описанныя преобразования.

Въ 18-ти верстахъ отъ источниковъ, послѣ входа въ упомянутое выше сѣуженіе долины, сѣверо-восточное направленіе р. Лены измѣняется почти въ сѣверное, причемъ, около 7 верстъ ниже, рѣка, удаляющаяся такимъ образомъ отъ Байкала, принимаетъ короткій (5—6 верстъ) притокъ съ востока, т. е. съ правой стороны, извѣстный подъ названіемъ Арбуна. Рѣчка эта, до изслѣдованій Черскаго, считалась крайнимъ верховьемъ Лены; до Арбуна только доходилъ очевидно въ 1857 г. Крыжину (см. ниже), по съемкѣ котораго на-

несена на карту Шварца эта долина, причемъ, съ лѣвой стороны указанъ имъ еще незначительный притокъ, соответствующій только-что описанной нами, сѣуженной части дѣйствительныхъ верховьевъ Лены. Отсюда Лена поворачиваетъ дугообразно къ сѣверо-западу, и сейчасъ же къ юго-западу, слѣдуя такимъ образомъ до знакомаго намъ уже устья р. Чанчеръ, до котораго, отъ впаденія Арбуна, считаютъ болѣе 70 верстъ. На этомъ протяженіи, по собраннымъ Черскимъ распроснымъ свѣдѣніямъ, въ Лену впадаютъ слѣдующіе притоки. Съ лѣвой стороны сейчасъ же ниже Арбуна изливаются: Баденджекитъ и Баремія, вслѣдъ за впаденіемъ которыхъ Лена проходитъ черезъ не длинное впрочемъ ущелье; далѣе въ ней изливаются Панкуча, Юкта, Каспѣ, Боорканъ и Ванай, до устья котораго считаютъ 30 верстъ. Изъ притоковъ Ваная, кромѣ знакомыхъ намъ изъ описанія маршрута Черскаго ниже устья Ванайскаго ключика впадаютъ съ лѣвой стороны: Прѣнькина падъ и Ханду, а съ правой Наралджай, Ванайканъ и Ункала. Ванайканъ считается самымъ длиннымъ притокомъ и беретъ начало на с.-з.-мъ склонѣ Оротскаго хребта, не далеко отъ источниковъ Лены и вблизи упомянутой выше рч. Панкучи. Что же касается правыхъ притоковъ р. Лены, то ниже Арбуна впадаетъ сначала короткій безъимянный ключикъ, верховья котораго располагаются вблизи источниковъ Талакакты, системы р. Киренги, послѣ чего ниже ущелья изливаются еще: Ковомія-юкта и Пурикандъ-юкта. На картѣ Шварца, на которой лѣвые притоки Лены, какъ никѣмъ не посѣщенные, означены безъ названія, изъ правыхъ показаны тоже только четыре: Коломія (очевидно Ковомія), двѣ Юкты и Безъимянный ключъ, не соответствующій, впрочемъ, упомянутому выше.

Ниже устьевъ Ваная и Чанчера не имѣется никакихъ свѣдѣній о притокахъ интересующей насъ части р. Лены, за исключеніемъ упомянутыхъ выше рѣчекъ: Еликты съ

лѣвой стороны и Бирюльки съ правой, ниже которой впадаетъ еще знакомая намъ уже отчасти Манзурка (24 версты отъ Бирюльки), а съ правой стороны, версть 10 ниже, рѣчка Ангá, вблизи устья которой, на правомъ берегу Лены, располагается село Кàчугъ, важное какъ мѣсто, съ котораго торговля суда начинаютъ плаваніе внизъ по рѣкѣ. Съ Ангою мы будемъ имѣть случай ознакомиться, такъ какъ вверхъ по ней слѣдуетъ маршрутъ упомянутого выше Крыжина, посѣтившаго часть верхняго теченія Лены и системы р. Киренги, теперь же, въ заключеніе сказаннаго о верховьяхъ Лены, присовокупимъ здѣсь краткія свѣдѣнія и о геогностическомъ строеніи мѣстности, пересѣченной описаннымъ выше маршрутомъ Черскаго. Вслѣдъ за Сартэ-дабанскимъ переваломъ, состоящимъ изъ описанныхъ выше пластовъ тальковой породы, известняка и глинистаго сланца, падающаго на ю.-в. съ наклономъ только въ 20°, въ долину общихъ верховьевъ Илги и Ванайскаго ключика встрѣчались только куски тѣхъ же породъ, примѣшанные къ наносу, а отчасти и въ видѣ россыпи. Известнякъ въ россыпи найденъ былъ и въ долину Ванайскаго ключика, а выше по рч. Ванай встрѣчались поочередно: глинистый сланецъ, кварцитъ, известнякъ и опять глинистый сланецъ съ крутымъ паденіемъ пластовъ на ю.-ю.-в., послѣ чего въ верховьяхъ Ваная наблюдалась россыпь тальковой породы, похожей на Сартэ-дабанскую <sup>1)</sup>, а въ долину верховьевъ р. Лены наблюдался только описанный выше наносъ, въ галькѣ котораго различались: глинистый сланецъ, сѣрая вака, известнякъ, хлоритовый сланецъ и нѣкоторые изъ полевошпатовыхъ породъ, принесенныхъ очевидно изъ Приморскаго хребта (см. ниже). День, назначенный для изслѣдованія склоновъ долины въ этомъ мѣстѣ, отнятъ былъ начавшимся сильнымъ ненастьемъ, а такъ какъ Черскій долженъ былъ поспѣшить въ Онгурентъ

<sup>1)</sup> Подробности см. въ отчетѣ Черскаго за 1880 г. loco cit., стр. 25—26.

для встрѣчи парохода, то онъ и довольствовался въ этомъ отношеніи только ознакомленіемъ съ строеніемъ юго-восточнаго склона Приморскаго хребта со стороны Байкала, къ которому мы и возвратимся въ нижеслѣдующемъ изложеніи.

## **6) Берегъ Байкала отъ устья р. Онгурена до мыса Котельникова (мысъ Горячихъ ключей).**

Длина берега Байкала между Онгурёномъ и Котельниковскимъ мысомъ достигаетъ 172 верстъ, считая по прямому направленію, причемъ на протяженіи первыхъ 45 верстъ, до мыса Шартла или Голлага, береговая линія озера слѣдуетъ въ общемъ почти на с.-в., тогда какъ за названнымъ мысомъ, а не начиная съ Заворотнаго (см. ниже), какъ полагали прежде (см. Георги), берегъ поворачиваетъ на с.-с.-в., слѣдуя такому направленію почти до самой сѣверо-восточной оконечности озера. Имѣя въ виду довольно значительное разстояніе между названными пунктами, а также количество относящагося къ этой мѣстности географическаго матеріала, изложеніе это мы подраздѣлимъ на двѣ части, изъ которыхъ въ первой опишемъ результаты изслѣдованій прибрежныхъ горъ отъ Онгурена до мыса Заворотнаго, а во второй — результаты изслѣдованій въ предѣлахъ остальнаго отрѣзка упомянутаго пространства.

### **А) Отъ устья Онгурена до Заворотнаго мыса и перевалъ съ мыса Покойниковъ на рѣку Лену.**

Промежутокъ между Онгурёномъ и такъ называемымъ Кочериковскимъ мысомъ (28 верстъ), дополняетъ собою ту значительную бухтовидную выемку береговой линіи, которая, какъ сказано выше, начинается вслѣдъ за знакомымъ намъ уже Заминскимъ мысомъ и которую Черскій на-

звалъ Онгуренскою бухтою. Описываемая часть ея осложняется здѣсь еще тремя второстепенными выемками, которыя разобщаются тупыми и округленными, мысовидными выступами, вслѣдствіе чего береговая линія отличается здѣсь волнистымъ изгибомъ. Такимъ образомъ, вслѣдъ за скалистымъ мысомъ Я д о р ъ, ограничивающимъ устье Онгуренской долины съ лѣвой стороны, путешественникъ вступаетъ въ бухту Хардѣ. Въ глубинѣ ея открывается устье знакомой намъ уже, соименной долины, вверхъ по которой слѣдуетъ дорога изъ Онгурена къ бассейну средняго теченія Илги. Благодаря меридіональному направленію долины Хардо и ея прямой связи съ названнымъ бассейномъ (см. выше), съ устья открывается красивая перспектива на Приморскій хребетъ и на выходъ изъ него долины Илги. По всей вѣроятности видъ этотъ, при незнакомствѣ съ расширеніемъ долины средняго теченія Илги, какъ равно и еще нѣкоторыя топографическія условія, о которыхъ будетъ сказано въ своемъ мѣстѣ, привели Радде къ ошибочному заключенію, что къ сѣверо-востоку отъ Онгурена берегъ озера сопровождается двумя параллельными горными цѣпами, изъ которыхъ ближайшая болѣе низкая и лѣсистая, а слѣдующая за нею высокая и скалистая; существованіе же Онотскаго хребта въ то время не было еще извѣстнымъ. Бухта Хардѣ представляетъ собою собственно самую глубокую часть всей Онгуренской бухты; съ сѣверо-востока её ограничиваетъ широко-округленный мысъ Утѹ-хапсагай въ видѣ оконечности скалистаго отрога до 600' высоты, нерѣдко непосредственно омываемаго водою. За нимъ слѣдуетъ окруженная тѣми же, болѣе низкими горами, Илгинская бухта, она снабжена лишь узкимъ наноснымъ (прибойнымъ) побережьемъ, на которомъ въ одномъ мѣстѣ построено рыбацье зимовье.

На сѣверо-восточномъ мысѣ бухты (18 верстъ отъ Онгурена), открывается долина нижняго теченія и устье знакомой намъ уже Илги (Элигѣй или Илгѣй у бурятъ), прорѣзи-

вающей здѣсь болѣе низкія горы, которыми ограничивается бассейнъ ея средняго теченія съ юго-востока (см. выше). Во времена Георги, слѣдовательно 108 лѣтъ до путешествія Черскаго, Илга была настолько многоводною и теченіе ея настолько быстрое, что оно обозначалось даже въ Байкалѣ въ нѣкоторомъ разстояніи отъ устья, и потому вблизи послѣдняго не могла проходить лодка; Илга впадала къ тому же двумя устьями. Между тѣмъ Черскій нашелъ эту рѣчку только съ однимъ устьемъ и очень маловодною, что, впрочемъ, зависѣло отъ разведенія ея (въ области средняго теченія), для орошенія сѣнокосовъ, о чемъ мы упоминали выше.

За Илгою слѣдуетъ почти столь же большая (до 10 верстъ въ хордѣ) Кочериковская бухта (Убугунъ у бурятъ, у Георги неправильно: Кочерига), только западная часть которой окружена горами съ узкимъ побережьемъ, тогда какъ сѣверо-восточная, низменная, удлиняется въ плоскій наносный мысъ (Кочериковскій, Убугунъ-хушунъ), довольно далеко вдающійся въ озеро. На эту наносную и болотистую низменность открываются съ сѣверо-запада двѣ долины: ближайшая, Кочериковская съ соименнымъ бурятскимъ улусомъ и рѣчкой; вторая за нею, долина рч. Хейрэмъ, устье которой располагается уже на сѣверо-восточной сторонѣ наноснаго мыса. Отрогъ, отдѣляющій обѣ долины, не достигаетъ Байкала и этимъ увеличиваетъ размѣры низменной наносной площади, но около береговой линіи наблюдается острововидный, довольно высокій холмъ, который является въ роли прежней оконечности этого отрога, отдѣлившейся впоследствии путемъ размыва. Въ противоположность ближайшимъ къ озеру болѣе низкимъ горамъ, образующимъ предгорье Приморскаго хребта, горы лѣваго берега Кочериковской долины представляютъ рядъ живописныхъ скалистыхъ вершинъ, напоминающихъ альпійскія мѣстности. Согласно замѣчанію Георги, долина эта должна соединяться «съ Илгою», по всей вѣроятности, съ расширеніемъ въ области средняго

теченія послѣдней, какъ это доказано Черскимъ для долины Хардѣ (см. выше). Что же касается верховьевъ Хейрѣма, то они, какъ передавали Черскому, должны располагаться вблизи источниковъ Арбуна и Джалагона, лѣвыхъ притоковъ Ваная (см. выше). Въ лѣсахъ около болотистой низменности низовьевъ этихъ долинъ Радде находилъ: *Linnaea*, *Aconitum*, *Delphinium*, *Vaccinium*, *Hieracium*, *Gramineae* и *Iris*; *Rhododendron dahuricum* былъ тоже въ цвѣтѣ. Отъ Кочериковскаго мыса до Шартлѣ, отъ котораго берегъ озера поворачиваетъ уже къ с.-с.-в. остается только 17 верстъ, на протяженіи которыхъ береговая линія образуетъ два изгиба; первый изъ нихъ, до 5 верстъ длины (въ хордѣ), представляетъ собою бухту Хырѣ-хушунъ или Рытой падѣ, названную такъ отъ ближайшаго мыса, тогда какъ слѣдующая бухта, около 12 верстъ длины, именуется Шартлѣ (отъ мыса) или же Аньотха, отъ впадающаго тамъ незначительнаго, впрочемъ, ключика. Въ противоположность гористому, крутому и террасовидному склону, окаймляющему обѣ названныя бухты, въ которыхъ встрѣчаются сухія долинки съ устьями на террасахъ отъ 2 до 3 саж. надъ Байкаломъ, какъ Хырѣ-хушунскій, такъ и мысъ Шартлѣ являются въ видѣ обширныхъ наносныхъ площадей, вдающихся въ озеро, причемъ Шартлѣ отличается замѣтно большею высотой и болѣе порастаетъ лѣсомъ, нежели Хырѣ-хушунъ, близъ оконечности котораго можно видѣть нѣсколько бальзамическихъ тополей. Ближайшая къ этому мысу часть горъ, пересѣченная соименною долиною (Хырѣ-хушунъ или Рытая падѣ), хотя и достигаетъ значительной высоты, но образуетъ собою соразмѣрно возвысившееся здѣсь предгорье Приморскаго хребта, съ округленными (въ профилѣ) вершинами и волнообразною линією контура тупыхъ гребней, изъ-за которыхъ виднѣется скалистый и изрытый бороздами, главный гребень хребта, принимающій ближе къ бухтѣ Шартлѣ болѣе зазубренное очертаніе. Черскій сдѣлалъ экскурсію вверхъ по долинѣ

Хыр-хушұна. Долина эта очень глубокая и достигает нѣсколько болѣе 10 верстъ въ длину, располагаясь почти съ точностью на меридіанѣ описанныхъ выше источниковъ р. Лены, до которыхъ, если считать по прямому направленію отъ Хыр-хушұнскаго мыса, будетъ не болѣе 13 верстъ. Наносная площадь названнаго мыса представляетъ два уступа, изъ которыхъ ниспій образуется, главнымъ образомъ, прибойнымъ озернымъ матеріаломъ (болѣе мелкая галька), съ примѣсью болѣе крупнаго матеріала, почерпнутаго изъ выносовъ рч. Хыр-хушунъ, высыхающей въ низовьяхъ. Второй, болѣе высокій уступъ (до 35' надъ озеромъ), состоитъ изъ подобнаго же наноса, но превращеннаго здѣсь мѣстами въ довольно рыхлый конгломератъ. На протяженіи первыхъ 6-ти или 7-ми верстъ долина направляется почти на ю.-ю.-в., достигая мѣстами до 50 саж. ширины. На высотѣ около 1090' надъ озеромъ направленіе измѣняется почти въ меридіональное, причемъ длина суживается до 20 саженой и окружена недоступными для восхожденія, крутыми утесами; на значительной высотѣ съ лѣвой стороны видѣлся здѣсь періодическій ключикъ, низвергающійся водопадомъ отвѣсно, съ высоты не менѣе 35', но не достигающій уровня дна долины. Версты съ 2 выше, на высотѣ около 1.600' ниже Байкала, дно долины представляетъ террасовидный уступъ, который въ прежнее время образовалъ, повидимому, дно бывшаго здѣсь небольшого котловинообразнаго расширенія. Въ уступъ этотъ врѣзалось нынѣ русло этого горнаго потока, заваленное здѣсь громадными глыбами оторванныхъ скалъ (до 2 саженой въ діаметрѣ). Пройдя всего 9 верстъ отъ Байкала, Черскій возвратился обратно къ лодкѣ, выжидавшей его около мыса.

Относительно геогностическаго строенія мѣстности, онъ замѣчаетъ, что лаврентьевскія породы нижняго яруса этой системы (хлоритовый сланецъ, гнейсъ и т. п.), развитыхъ по берегу Байкала отъ самаго Онгурена и падающія вездѣ на ю.-ю.-в., пересекаются и долиною Хыр-хушұна на



протяженіи всей длины ея посѣщенной части. Что же касается верховьевъ этого потока, то они врѣзываются очевидно уже въ толщу палеозойскихъ (онотскихъ) сланцевъ, изъ которыхъ состоитъ здѣсь высшая часть гребня Приморскаго хребта, о чемъ можно было судить уже по выносамъ верховьевъ Вана и Лены. И дѣйствительно, въ числѣ валуновъ, а въ верхнемъ теченіи Хырѣ-хушунъ и въ числѣ большихъ глыбъ, громождающихъ его русло, попадались глинистый и рухляковый сланцы, а также известнякъ <sup>1)</sup>. Тамъ же найденъ въ видѣ валуна до  $\frac{3}{4}$  арш. въ діаметрѣ магнитный желѣзнякъ, коренное мѣсторожденіе котораго до сихъ поръ неизвѣстно; кромѣ того въ руслѣ попадались изрѣдка гальки полевошпатово-плагіоклазоваго порфира, а также брекции о правдоподобной древности которыхъ будетъ сказано при описаніи долины Елохина, гдѣ порода эта является въ коренномъ мѣсторожденіи (см. ниже). Долина Хырѣ-хушунъ, какъ передаетъ Черскій, считается у мѣстныхъ бурятъ въ высшей степени страшнымъ и священнымъ мѣстомъ, такъ какъ въ ней, по ихъ мнѣнію, проживаютъ «очень сердитые» боги, посылающіе всѣ возможныя бѣдствія за малѣйшее несоблюденіе какой-либо изъ требуемыхъ ими формальностей; гнѣвъ ихъ проявляется, между прочимъ, и въ видѣ штормовъ (съ с.-з.), которыми, яко бы, цѣлыя стада овецъ и коровъ сносятся въ Байкалъ. Это два брата, холостяки, *Азрѣ* и *Алмѣ*, сыновья божества *Ухури*, и потому въ молитвахъ называемые ими: *Азрѣ*, *Алмѣ*, *Ухури хубунъ* (*хубунъ* = сыновья).

Изъ уваженія и страха, внушаемаго этими тенгріями (жителями небесъ или «жителями грома», какъ выражались Онгуренскіе буряты), долину Хырѣ-хушунъ буряты могутъ пересѣкать только на ея устьѣ, по дорогѣ, ведущей изъ Онгурена въ улусъ на мысѣ Покойниковъ (11 верстъ къ с.-в.

---

<sup>1)</sup> Петрографическія подробности, см. отчетъ Черскаго за 1880 г. loco cit., стр. 26—27.

отъ мыса Шартла, см. ниже); они пасутъ также свои стада на Хыръ-хушунскомъ мысѣ, о томъ однако, чтобы углубиться въ горы вверхъ по этой долині, они боятся даже подумать и никто изъ нихъ не пойдетъ туда даже для розысковъ сбѣжавшаго скота. Если же въ теченіи даннаго луннаго мѣсяца умереть кто либо изъ окрестныхъ бурятъ, въ такомъ случаѣ сообщеніе между Онгуреномъ и Покойниками прерывается абсолютно до слѣдующаго новолунія, такъ какъ въ то время нельзя оплывать Хыръ-хушунъ, если бы кто вздумалъ путешествовать въ лодкѣ, а обойти его горами, какъ это дѣлается на Ольхонѣ (см. выше), здѣсь нѣтъ никакой возможности. Женщины, даже въ обыкновенное время, не могутъ приближаться сухимъ путемъ: рѣчка Хейрэмъ со стороны Онгурена, а рч. Аниутха со стороны Покойниковъ, составляютъ границу, перешагнуть которую не смѣетъ ни одна бурятка, вслѣдствіе чего, имъ предоставляется одинъ лишь водный путь между названными долинами.

Такъ какъ бухта Шартла или Аниутха врѣзывается за Хыръ-хушунъ довольно значительно въ береговыя горы (въ общемъ почти на 2 версты), то поэтому она уничтожаетъ собою соотвѣтственную часть описаннаго высокаго предгорья, такъ-что самая глубокая часть бухты ограничивается уже непосредственно склономъ главнаго гребня Приморскаго хребта, а такъ какъ нѣкоторыя изъ ближайшихъ къ Хыръ-хушуну долинокъ принимаютъ въ своихъ верховьяхъ почти продольное къ хребту направленіе, то поэтому и здѣсь, т. е. въ ближайшихъ окрестностяхъ Хыръ-хушуна, Радде имѣлъ нѣкоторыя данныя для предполагавшагося имъ существованія двухъ «параллельныхъ хребтовъ», что, въ сущности, не вѣрно; къ тому же такой оптический обманъ имѣетъ мѣсто лишь на слишкомъ незначительномъ протяженіи. Приблизившійся гребень и склонъ Приморскаго хребта принимаетъ здѣсь еще болѣе зазубренное очертаніе; высшая часть склона дѣлается все болѣе скалистою и изрытою бороздами, а также воронко-

образными углубленіями верховьевъ долинокъ, позволяющихъ изучать съ достаточною наглядностью значеніе процесса размыва въ дѣлѣ преобразованія конфигураціи мѣстности. Нѣкоторыя воронки значительно углубились уже въ массу хребта, стремясь къ расчлененію его по альпійскому типу; здѣсь же можно видѣть верховья двухъ сосѣднихъ долинокъ, воронки которыхъ, уничтоживъ значительную часть разъединявшаго ихъ скалистаго гребня, почти совершенно соединились другъ съ другомъ, соотвѣтственно измѣнивъ прежнія топографическія особенности этой части склона. Выносы этихъ долинокъ скопились въ нижней части склона хребта въ видѣ такъ называемыхъ выносныхъ конусовъ (*cônes de dejection* у французовъ), перерѣзанныхъ позднѣйшимъ углубленіемъ русла и измѣненныхъ прежнимъ, болѣе высокимъ стояніемъ воды въ Байкалѣ, оставившимъ на нихъ мѣстами слѣды террасовидныхъ уступовъ. Тѣмъ не менѣе всѣ эти долинки совершенно сухія и размывъ ихъ поддерживается и продолжается только періодическими, а не ключевыми водами. Прибойное и вообще наносное побережье въ предѣлахъ этой бухты нѣсколько болѣе развито, нежели въ Хыр-хушунской. Ближе къ рч. Анютха, на небольшомъ мыскѣ, можно видѣть утесъ, основаніе котораго оглажено прибоемъ воды до высоты почти двухъ аршинъ надъ уровнемъ озера. Сейчасъ же за нимъ, вблизи берега, находится подводный, террасовидный утесъ, прорѣзанный подводною же глубокою и потому черняющеюся долинкою, не взирая на нерасчлененный въ этомъ мѣстѣ склонъ прибрежныхъ горъ. Въ строеніи хребта участвуютъ здѣсь только лаврентьевскія породы и потому онотскихъ сланцевъ не видно даже въ выносахъ долинокъ, берущихъ начало на самомъ гребнѣ горъ; только ближе къ Хыр-хушуну пласты падаютъ на с.-с.-з., а за Анютхою на ю.-ю.-в., образуя слѣдовательно небольшую складку. Количество галекъ порфира въ выносахъ упомянутыхъ долинокъ увеличивается, сравнительно съ долиною Рытой падьи. Такъ

как мысъ Шартлѣ выдается почти на столько же, какъ и Хырѣ-хушунѣ, то поэтому и въ его основаніи, вслѣдъ за низменною оконечностью, можно видѣть хотя и высокія, но лѣсистыя и округленныя горы, играющія роль какъ бы продолженія описаннаго выше предгорья, прерваннаго углубившеюся частью соименной бухты. Предгорье это пересѣкается и расчленяется вѣтвистою и глубокою долиною Шартлѣ, которая въ бытность Черскаго (11 іюня) оказалась сухою въ низовьяхъ, что, впрочемъ, слѣдуетъ приписать бывшему въ эту весну медленному таянію снѣговъ, такъ какъ Радде, проѣздомъ около этихъ мѣстъ, упоминаетъ о нѣсколькихъ, видѣнныхъ имъ, устьяхъ порывистыхъ горныхъ потоковъ, хотя въ его дневникѣ и не передаются ихъ названія. Широкая долина эта направляется въ низовьяхъ съ з.-с.-з. на в.-ю.-в., но сейчасъ же выше она представляетъ значительныя развѣтвленія, видимыя и съ оконечности мыса, причемъ второй (считая снизу) второстепенный отрогъ правой стороны долины, въ противоположность остальнымъ, отличается скалистымъ и мелкозазубреннымъ склономъ. Наносная площадь мыса столь же камениста, какъ и Хырѣ-хушунѣ; около основанія его южной стороны обнажается горизонтально-слоистое озерное отложеніе въ видѣ довольно рыхлаго конгломерата съ галькою средней величины (быть можетъ третичнаго возраста, см. ниже); здѣсь же располагаются двѣ террасы отъ 35 до 80' высоты. Въ наносѣ мыса, который образовался по всей вѣроятности путемъ размыва прежняго выноснаго конуса озерными водами, найдены только гальки лаврентьевскихъ породъ и порфира, безъ всякихъ слѣдовъ онотскихъ сланцевъ; нѣкоторыя изъ найденныхъ галекъ указываютъ на возможность происхожденія порфира изъ видоизмѣненій хлоритоваго сланца. Начиная съ мыса Шартлѣ, какъ сказано было выше, весь берегъ Байкала поворачиваетъ на с.-с.-в., а въ южной части начинающейся здѣсь большой (11 верстъ въ хордѣ) бухты Покойниковъ береговал

линія придерживается почти сѣвернаго направленія, вслѣдствіе чего ея пересѣкается и окончательно уничтожается уцѣлѣвшій около Шартла остатокъ высокаго предгорья. Это послѣднее склоняется въ бухтѣ Покойниковъ четырьмя высокими, въ общемъ террасовидными отрогами, довольно крутослѣченными со стороны бухты, остальная часть которой примыкаетъ уже непосредственно къ склону высшей части Приморскаго хребта. Восхожденіе на одинъ изъ упомянутыхъ террасовидныхъ отроговъ показало, что высота его достигаетъ 883' надъ Байкаломъ, слѣдовательно отроги эти весьма близки къ высокой террасѣ около юго-западной оконечности озера (928' н. Байк.), но здѣсь на ихъ поверхности не найдено никакихъ типичныхъ наносныхъ осадковъ, какъ это имѣло мѣсто около долины Култучной. Кромѣ того обнаруженъ еще болѣе низкій уступъ, всего лишь 102' надъ озеромъ. За этимъ отрогомъ (второй отъ основанія мыса Шартла) на небольшомъ наносномъ мыскѣ построены два рыбацкихъ зимовья. Наклонъ пластовъ хлоритоваго сланца и гнейса около Шартла переходитъ въ с.-с.-з., а далѣе опять въ ю.-ю.-в. Склонъ Приморскаго хребта расчлененъ многочисленными долинками на короткіе гребни, крутизна которыхъ не превосходитъ 40°; на нѣкоторыхъ изъ нихъ наблюдаются уединенныя башневидныя скалы, обваливающіяся и потому невысокія; громадныя глыбы, оторванныя отъ этихъ скалъ, лежатъ мѣстами и на берегу озера. Въ противоположность треугольному очертанію трехъ предшествовавшихъ мысовъ (Кочериковскій, Хырхушунъ и Шартла), мысъ Покойниковъ, кажущійся съ отдаленія такимъ же низменнымъ и заостреннымъ, представляетъ собою однако очень широкій (до 6 верстъ) почти четырехугольный и прямолинейно услѣченный съ ю.-в. выступъ береговой линіи, ограничивающій соименную бухту съ с.-с.-в. Длина его отъ основанія хребта до Байкала достигаетъ мѣстами около 2 верстъ, причемъ большая часть его, считая съ юго-запада, наносная и низменная, тогда какъ сѣверо-

восточный отръзокъ занять длинными, отроговидными возвышеніями, высоту болѣе 200' надъ Байкаломъ. Около южнаго угла мыса находится озеро менѣе 200' въ діаметрѣ, отдѣленное отъ берега Байкала узкою полоскою прибойнаго матеріала. Нѣсколько далѣе (около 2 верстѣ) находится еще другое, такое же озеро, отдѣленное отъ Байкала довольно широкимъ (въ 27 сажень.) и высокимъ (5 фут.) прибойнымъ валомъ, на которомъ растутъ уже лѣсъ. Между этими озерами, ближе къ первому изъ нихъ, располагается бурятскій улусъ Покойники, о которомъ упоминалось уже выше. Приморскій хребетъ въ предѣлахъ площади этого мыса дѣлается еще болѣе живописнымъ и скалистымъ; склонъ его пересѣкается здѣсь тремя главными, болѣе глубокими долинами, изъ которыхъ первая, считая съ юго-запада, называется Хундылынъ, вторая Покойницкая, а третья Солонсѣй-елгѣ или Солонцовая (*емѣ* означаетъ долину). Въ промежуткѣ между двумя первыми долинами гребень хребта отличается почти прямолинейнымъ и горизонтальнымъ контуромъ, хотя склонъ его изрытъ глубокими выемками и бороздами верховьевъ расположенныхъ здѣсь меньшихъ долинокъ. Изъ нихъ лѣвый притокъ Хундылына образовалъ даже одно довольно правильное, котловинообразное углубленіе. По бокамъ выхода Покойницкой долины располагаются затѣмъ двѣ заостренныя вершины, изъ которыхъ правая имѣетъ видъ трехгранной пирамиды, а къ сѣверо-востоку отъ Солонсѣй-елгѣ, хребетъ высится уже цѣлымъ рядомъ такихъ вершинъ и принимаетъ альпійскую наружность, подготовка къ которой началась уже съ восточныхъ окрестностей устья рч. Илги.

Въ то время какъ въ обрывахъ низменной части мыса (до 7' высоты) обнажается одинъ лишь озерный, глинисто-песчаный наносъ блѣднаго охристо-желтаго цвѣта, переполненный галькою (не болѣе  $1\frac{1}{2}$  четверти въ діаметрѣ) и покрытый вообще тонкимъ суглинистымъ слоемъ, ближе сѣверо-восточной, болѣе высокой части его, береговой яръ до

35' высоты, состоитъ изъ довольно рыхлаго конгломерата. Отложеніе это образуется неслоистымъ, или неясно слоистымъ глинистымъ пескомъ, переполненнымъ галькою и валунами, размѣры которыхъ достигаютъ иногда 4 футовъ въ діаметрѣ. По своему характеру образованіе это похоже на отложеніе горныхъ потоковъ, подвергшееся впослѣдствіи цементированію, или же на прибрежное отложеніе Байкала въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ онъ подмываетъ древніе конусы выносовъ альпійскихъ долинъ; въ общемъ же конгломератъ этотъ вполне тождественъ съ третичными образованіями, съ которыми мы ознакомимся ближе на противоположномъ берегу озера; здѣсь же можно наблюдать только то, что конгломератъ покрывается охристожелтымъ наносомъ, изъ котораго состоитъ низменная часть мыса Покойниковъ.

Судя по валунамъ и глыбамъ, выдающимся изъ подъ растительнаго покрова, конгломератъ этотъ слагаетъ или покрываетъ собою всю болѣе высокую часть мыса, возвышаясь ближе къ хребту до 208' надъ уровнемъ озера; въ отложеніе это врѣзались и низовья долины Солонсѣй-елгá (Солонцовая), которую Черскій избралъ для экскурсіи, съ цѣлью перевалить черезъ Приморскій хребетъ и спуститься въ долину р. Лены. Уже съ конгломератовыхъ высотъ лѣваго берега низовьевъ Солонцовой долины можно видѣть всю ея длину до перевала, такъ какъ глубокая борозда эта отличается почти прямолинейнымъ направленіемъ съ з.-с.-з. на в.-ю.-в. Вслѣдъ за поросшими лиственничнымъ лѣсомъ, террасовидными предгорьями конгломерата возвышается здѣсь столь же лѣсистый въ нижней части, крутой склонъ Приморскаго хребта, съ широкою и глубокою сѣдловиною въ верховьяхъ долины. На правомъ берегу послѣдней, вслѣдъ за болѣе низкою, но заостренною «сопкою», возвышается неуклюжая и округленная вершина съ уступистымъ, очень крутымъ склономъ къ долинѣ, за которымъ виднѣется другой столь же крутой, но мелко зазубренный склонъ горы.

Что же касается лѣваго склона долины, то онъ отходить отъ ряда скалистыхъ и заостренныхъ вершинъ, круто опускается почти къ половинѣ высоты и образуетъ тамъ весьма хорошо развитый, но небольшой, террасовидный уступъ, начиная съ котораго склонъ дѣлается въ общемъ менѣе крутымъ, въ особенности къ нижней своей части, гдѣ замѣчается еще другой уступъ, менѣе развитый. Благодаря такимъ особенностямъ лѣваго склона Солонцовой долины, она, не смотря на сравнительно небольшую ширину дна, очень широко раскрывается кверху. Всего болѣе пологими склонами отличается видимый отсюда, поперечный разрѣзъ перевала, плоское дно котораго достигаетъ значительной ширины и ограничено съ правой стороны крутымъ и округленнымъ, но не высокимъ уступомъ. Начиная съ берега Байкала путешественникъ прошелъ версты съ двѣ до мѣста, гдѣ долина выходитъ изъ хребта. Сухое и поросшее дно ея возвышается здѣсь террасовиднымъ уступомъ, лежащимъ уже на высотѣ около 850 надъ озеромъ. Нѣсколько далѣе появляется уже и ключикъ въ руслѣ и другой уступъ дна (1439' надъ Байкаломъ), а въ разстояніи болѣе 5 верстъ отъ озера, на высотѣ 2127', достигается площадка состоящая изъ розсыпи скалъ. Площадка эта образуетъ собою нѣчто въ родѣ плотины, преграждающей и возвышающей собою выходъ изъ находящаго здѣсь котловинообразнаго расширенія долины, дно котораго позади этой преграды углубляется на 20—30' и образуется такую же розсыпью, покрытою мѣстами появившимися здѣсь уже отдѣльными полянами снѣга (15 іюня).

Хотя описанная плотина и не пересѣкается никакимъ видимымъ русломъ, тѣмъ не менѣе подъ нею, на промежуткамъ между слагающею ее розсыпью, должна протекать вода, унося съ собою мелкіе и посильные ей продукты разрушенія (детритусъ). Вслѣдствіе такого выноса болѣе мелкихъ частей розсыпи, по мнѣнію Черскаго, произошло осѣданіе этой массы обломковъ позади преграды и образовалось углубленное дно



котловины, на которомъ замѣчается уже нѣсколько сухихъ, впрочемъ, руселъ, а въ промежуткахъ между ними остались бугры изъ неразмытой, болѣе крупной розсыпи. Понятно, что со временемъ начнется осѣданіе и нѣкоторой части крупной розсыпи, изъ которой состоитъ упомянутая выше преграда, и при болѣе успѣшномъ размывѣ она будетъ пересѣкаться русломъ потока, воды котораго нынѣ незначительны и протекаютъ еще слишкомъ глубоко, чтобы нарушить равновѣсіе этой массы обломковъ; впрочемъ съ процессомъ этимъ мы будемъ имѣть еще случай ознакомиться болѣе наглядно, при описаніи нѣкоторыхъ высшихъ пунктовъ (см. ниже, главнымъ образомъ юго-восточный берегъ Байкала). Отсюда до перевала остается еще версты три. Котловинообразное расширеніе, о которомъ идетъ рѣчь, играло нѣкогда, очевидно, роль воронкообразнаго верховья долины, отступившаго впослѣдствіи далѣе къ сѣверо-западу; поэтому подвигаясь далѣе вверхъ по долинѣ, на высотѣ 2717', путешественникъ встрѣчаетъ еще ясныя слѣды другого котловинообразнаго расширенія, діаметръ дна котораго не превышаетъ впрочемъ 30—40 саж. Дно его точно также покрыто горами обломковъ мѣстныхъ скалъ (розсыпь), причемъ здѣсь нѣкогда была и такая же плотина изъ розсыпи, нынѣ впрочемъ прерванная русломъ; остатокъ ея до 14' высоты, наблюдается еще весьма хорошо на правомъ берегу русла, гдѣ онъ примыкаетъ къ отвѣснымъ и весьма живописнымъ утесамъ правой стороны расширенія и переходитъ въ террасовидный уступъ, сопровождающій ихъ подножье. Уступъ этотъ, состоя изъ такой же розсыпи, указываетъ до какой высоты расширеніе выполнялось по бокамъ этимъ островернымъ и чисто мѣстнымъ детритусомъ; что же касается скалистыхъ выступовъ и такихъ же стѣнъ долины, то они, какъ и во всѣхъ другихъ посѣщенныхъ долинахъ, нигдѣ не носятъ ни малѣйшихъ слѣдовъ шлифованія ихъ льдомъ, какъ равно здѣсь не имѣется и признаковъ озерныхъ наносовъ. Далѣе, на высотѣ 2971', уже вблизи перевала, замѣчаются слѣды еще

третьяго, но очень плоскаго расширенія, на мѣстѣ задней стѣны котораго располагается пологій и широкій перевалъ, т. е. дно описанной выше сѣдловины, лежащее на высотѣ 3061' надъ Байкаломъ. Наблюденія надъ строеніемъ этого склона Приморскаго хребта обнаружили въ немъ однѣ лишь лаврентьевскія породы, какъ-то: хлоритовый, порфировидный гранито-гнейсъ, полевошпатово-кварцевый порфиръ, связанный переходами съ гранито-гнейсомъ, и хлоритовый сланецъ, пласты котораго падаютъ на ю.-ю.-в. Изъ этихъ породъ состояла вся розсыпь, а также галька въ руслѣ Солонсѣй-елга и въ наносѣ мыса Покойниковъ вообще; такія же въ общемъ породы наблюдались и въ составѣ хребта южнѣ названнаго мыса. Сейчасъ же за переваломъ породы эти смѣняются однако толщею онотскихъ сланцевъ. Съ высшей точки перевала (3061' надъ Байкаломъ) открывается весьма красивый и поучительный видъ. Оказалось, что сейчасъ же за гребнемъ Приморскаго хребта, слѣдовательно около 9 верстъ отъ Байкала, располагается широкая и живописная долина рѣки Лены, луговая зелень которой представляла рѣзкій контрастъ съ темносѣрымъ фономъ скалъ и розсыпей верховьевъ Солонцовой долины и гребня хребта. Долина направляется здѣсь почти съ юго-запада (ю.-з. 40°; въ 18 верстахъ отсюда, располагаются знакомые намъ уже источники рѣки) къ сѣверо-востоку (с.-в. 40°), сопровождаясь съ лѣвой стороны столь же рѣзко развитымъ здѣсь хребтомъ Онотскимъ, на тупыхъ и какъ бы округленныхъ вершинахъ котораго лежали еще небольшія поляны снѣга. Спускъ съ высшей точки перевала до русла р. Лены не болѣе 200 сажень длины. Уровень рѣки оказался здѣсь равнымъ 2913' надъ Байкаломъ, слѣдовательно на 548' ниже верховьевъ, на сколько можно довѣрять барометрическому способу измѣренія высотъ.

Ширина Лены достигала здѣсь уже 5 сажень; нѣсколько выше въ ней замѣчалось раздробленіе русла на протоки, причемъ въ долинѣ виднѣлись и небольшія озера, проис-

шедшія, быть можетъ, отъ засоренія и обособленія прежнихъ рукавовъ. Спускъ съ перевала приводитъ какъ разъ къ тому мѣсту долины, гдѣ она начинаетъ преграждаться террасовиднымъ возвышеніемъ почвы, достигающимъ, повидимому, не менѣе 20' высоты. Сѣуженное русло р. Лены врѣзывается въ это возвышеніе и пересѣкаетъ его, поворачивая все болѣе къ сѣверу. Съ высоты перевала можно видѣть, что въ нѣсколькихъ верстахъ далѣе въ Лену впадаетъ съ правой стороны притокъ, берущій начало въ Приморскомъ хребтѣ: это рѣчка Арбунъ, о которой мы говорили при общемъ обзорѣ системы верховьевъ р. Лены, отсюда же видно, что принявъ этотъ притокъ, долина Лены поворачивается къ с.-з., гдѣ она, какъ сказано выше, пересѣкаетъ Онотскій хребетъ.

Въ геогностическомъ отношеніи сѣверо-западный склонъ Приморскаго хребта рѣзко отличается отъ юго-восточнаго: сейчасъ же за переваломъ наблюдается уже осыпь сѣровато-бѣлаго и сѣраго кварцита и кварцитовиднаго песчаника, а въ томъ мѣстѣ, гдѣ Лена входитъ въ сѣуженіе долины, въ утесахъ около ея берега, обнажается слюдяно-глинистый сланецъ аспидно-сѣраго цвѣта съ зеленоватымъ оттѣнкомъ, пласты котораго падаютъ на ю.-ю.-в.; около этого же утеса въ осыпи попадаются плитки кварцита бураго цвѣта, съ которыми мѣстами перемежается глинистый сланецъ. Здѣсь же можно видѣть и наносное (повидимому озерное) отложеніе (до 14' толщины) съ гальками мѣстныхъ породъ, но къ сожалѣнію плохо обнаженное. Черскій обращаетъ вниманіе будущихъ изслѣдователей на необходимость болѣе подробнаго изученія долины верхняго теченія р. Лены отъ ея источниковъ до мѣста, гдѣ она пересѣкаетъ собою Онотскій хребетъ, поворачивая къ сѣверо-западу. Подробное знакомство съ ея топографическими особенностями, съ наноснымъ отложеніемъ этой долины и ея террасами, высота которыхъ должна бы опредѣляться съ возможною тщательностью, можетъ рѣшить многіе не безынтересные во-

просы объ исторіи развитія этой продольной долины и ея отношеніи какъ къ современному теченію Ваная, такъ и къ Илгинско-Ванайской долины, о чемъ упоминалось уже выше <sup>1)</sup>. Вмѣстѣ съ тѣмъ можно будетъ выяснитъ вопросъ о способѣ, а можетъ быть и относительномъ времени образованія сѣдловины описаннаго перевала и о той роли, которую она могла играть въ исторіи развитія Ленской долины, имѣя въ виду, что высота этого перевала располагается на 400' ниже наноснаго отложенія источниковъ р. Лены и потому, если бы допустить, что долина верховьевъ этой рѣки была заполнена озерною водою до высоты современнаго залеганія въ ней наносовъ съ галькою, то вода эта должна была бы переливаться черезъ Солонцовую долину въ Байкаль. Во всякомъ случаѣ, размывъ, образовавшій сѣдловину перевала долженъ былъ подготовляться и со стороны Ленской долины настолько, по крайней мѣрѣ, что залегающая тамъ толща онотскихъ сланцевъ, должна была уничтожиться прежде, чѣмъ размывъ со стороны верховьевъ Солонцовой долины успѣлъ разрушить всю массу лаврентьевскихъ породъ, бывшую на мѣстѣ этой сѣдловины, иначе въ выносахъ Солонцовой долины непремѣнно должны были бы находиться и гальки глинистаго сланца, которыхъ, однако, до сихъ поръ, не найдено ни малѣйшихъ слѣдовъ.

Возвышенность, ограничивающая устье Солонцовой долины съ лѣвой стороны, образуетъ собою сѣверо-восточный уголь мыса Покойниковъ, носящій, впрочемъ, самостоятельное названіе, именно: Саганъ-морянъ. Отъ него до Заворотнаго мыса остается еще 23 версты, считая по прямому направленію. На этомъ протяженіи береговая линія образуетъ еще три бухты, изъ которыхъ первая достигаетъ 9 верстъ въ длину (по хордѣ) и называется Большою Солонцовой (Хужиртэй или Ихэ-хужиръ), вторая, меньшая

---

<sup>1)</sup> См. также отчетъ Черскаго за 1880 г., loco cit.

(5 верстъ длины), извѣстна подѣ названіемъ Малой Солонцовой, а третья, до 8 верстъ длины, Заворотная. Всѣ эти бухты въ общемъ похожи на описанныя выше и разобщаются такими же треугольными наносными мысами (Хужиръ, у Радде неправильно «Коджоръ», Бага Хужиръ или Малый Солонцовый и Заворотный), изъ которыхъ и Малый Солонцовый значительно меньше другихъ. Только въ юго-западной части Большой Солонцовой бухты къ береговой линіи примыкаетъ почти непосредственно крутой и утесистый склонъ самой высокой сѣверо-восточной части площади мыса Покойниковъ, достигающій мѣстами 300' надъ уровнемъ озера и образующій террасовидное предгорье Приморскаго хребта, покрытое во многихъ мѣстахъ упомянутымъ выше конгломератомъ. Склонъ этотъ, омываясь мѣстами непосредственно водою, окружаетъ собою нѣсколько второстепенныхъ, небольшихъ, но довольно живописныхъ бухточекъ, какъ напр., Саганъ-морянъ, гдѣ открывается долина, сообщающаяся съ низовьемъ Солонсѣй-елга, а за нею, Хабаръ-угд. Эта послѣдняя, окруженная со всѣхъ сторонъ утесами, отличается очень дикою, но живописною наружностью, причемъ на высотѣ скалъ ея задней части (около 200') обрѣзывается устье сухой долины. Остальная часть Большой Солонцовой, какъ равно и другія двѣ бухты, отличаются довольно широкимъ и лѣсистымъ прибрежіемъ, достигающимъ, напр. въ Заворотной бухтѣ, болѣе версты въ ширину. Со стороны Байкала побережье это опускается яромъ отъ 7 до 30' высоты, окаймленнымъ новѣйшимъ прибойнымъ матеріаломъ и обнажающимъ слоистый глинисто-песчаный или песчаный наносъ съ галькою; въ одномъ лишь мѣстѣ, именно въ Большой Солонцовой бухтѣ, изъ подъ наноса этого выступаетъ небольшой участокъ конгломерата, какъ на Покойникахъ. Въ Малой Солонцовой бухтѣ Черскій видѣлъ весьма оригинальное явленіе: въ мѣстахъ, гдѣ наносный яръ подмывается прибоемъ волнъ, слой раститель-

наго покрова, какъ болѣе устойчивый, не разрушается, а на противъ сначала нависаетъ надъ водою, а затѣмъ, отъ собственной тяжести, загибается внизъ и покрываетъ собою склонъ обнаженнаго яра; въ явленіи этомъ участвуютъ и растущія на дерновомъ слоѣ деревья, часть которыхъ принимаетъ вмѣстѣ съ нимъ наклонное положеніе, а другая опрокидывается и падаетъ въ воду, причемъ процессъ такого загибанія растительнаго слоя наблюдается на протяженіи многихъ десятковъ саженой. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ валь, состоящій изъ новѣйшаго прибойнаго матеріала («карга» у мѣстныхъ жителей), обыкновенно изъ великолѣпно-обточенныхъ галекъ, достигаетъ 7 или 8 футовъ высоты и опускается къ озеру четырьмя террасовидными уступами, какъ напр., на юго-западной сторонѣ Б. Солонцоваго мыса. Позади этого вала мѣстами, какъ напр., на Маломъ Солонцовомъ мысѣ и въ Заворотной бухтѣ, располагаются лагуновидныя озера до 200 саженой длины, а около юго-западнаго основанія Заворотнаго мыса такая же параллельная берегу лагуна открыта къ Байкалу съ сѣверо-восточной стороны, вслѣдствіе чего получается «бухточка», круто поворачивающая къ юго-западу. Отъ этой именно лагуны вся бухта получила названіе Заворотной, распространенное и на ближайшій мысъ. Поросшій лиственницей, а мѣстами и кедромъ, наносъ прибрежья и мысовъ постепенно, а иногда и террасовидно, возвышается къ основанію склона хребта и переходитъ тамъ въ матеріалъ выносовъ горныхъ потоковъ, нагроможденный въ видѣ высокихъ и мощныхъ конусовъ, что въ особенности отчетливо наблюдается въ области основанія названныхъ мысовъ, а также въ Заворотной бухтѣ, гдѣ два изъ горныхъ потоковъ достигаютъ самого Байкала, тогда какъ другіе изсякаютъ въ низовьяхъ. Въ границахъ этой бухты, нѣсколько выше по ущелистому потоку, извѣстному еще со временъ Георги, подъ именемъ Бѣра (см. ниже), наносъ съ галькою и валунами указываетъ всего яснѣе на бывшую его

переработку озерными водами во время болѣе высокаго стоянія ихъ въ Байкалѣ: при восхожденіи, Черскій нашелъ здѣсь нѣсколько параллельныхъ озеру террасъ, врѣзанныхъ въ массы этого выноса, изъ которыхъ одна на высотѣ 731', другая 782', а послѣдняя и самая высокая, достигала 926' надъ современнымъ уровнемъ Байкала, слѣдовательно какъ и въ долинѣ р. Култучной. Поверхность этой террасы составляетъ вмѣстѣ съ тѣмъ и крайній вертикальный предѣлъ распространія этого наноса, который примыкаетъ здѣсь къ неприступному по крутизнѣ, скалистому склону хребта. Кромѣ названныхъ выше деревьевъ Радде, дѣлавшій экскурсіи по наносному побережью, находилъ тамъ еще: березу и ольху. Изъ кустарниковыхъ растений главную роль играетъ здѣсь даурскій рододендронъ. Радде собиралъ здѣсь также; *Polygonum amphibium*, *Vaccinium*, *Linnaea*, *Delphinium*, *Aconitum*, *Lycostomum* и *Dianthus versicolor*; въ Заворотной бухтѣ онъ нашелъ также весьма рѣдкій видъ *Spiraea*. Въ лѣсистомъ побережьи этой бухты Черскій встрѣчалъ неимоверное количество зайцевъ (*Lepus variabilis*); на обратномъ пути изъ экскурсіи, на протяженіи не болѣе 3-хъ верстъ, онъ насчиталъ ихъ около 15; его работники загнали здѣсь одного зайца въ Байкалъ, вслѣдствіе чего онъ пустился было плыть, но холодъ воды или усталость заставили его повернуть къ берегу, прямо въ руки обступившихъ его людей.

Приморскій хребетъ ежится здѣсь остроконечными альпійскими пиками, между которыми врѣзывается цѣлый рядъ воронкообразныхъ и котловинообразныхъ верховьевъ горныхъ потоковъ, причемъ, въ ложбинахъ, изрывающихся склоны гребня, лежало еще не мало снѣга, опускающагося до половины высоты хребта, высшія точки котораго, однако, не превосходятъ, повидимому, 4500' надъ Байкаломъ. Обстоятельство это зависитъ, слѣдовательно, не отъ высоты горъ, а отъ с.-с.-в. ихъ направленія, благодаря которому, во многія ложбины солнечные лучи не имѣютъ уже доступа,

начиналъ съ полдня, чего, при соотвѣтственныхъ климатическихъ условіяхъ озера, вполне достаточно мѣстами даже для сохраненія снѣга и около самаго уровня Байкала, какъ это мы увидимъ ниже. Около Малаго Солонцового мыса нѣкоторые изъ второстепенныхъ отроговъ, разобщающихъ долины, отличаются скалистыми и мелкозубренными гребнями, увеличивая этимъ живописный видъ этой части хребта. Поучительность описанной части Приморскаго хребта, между Онгуреномъ и Заворотнымъ мысомъ, состоитъ, главнымъ образомъ, въ томъ, что, отдѣляясь на всемъ этомъ протяженіи рѣзко выраженной продольною долиною отъ параллельнаго ему Онотскаго хребта и обнаруживая весьма постепенный переходъ отъ тяжелыхъ и нерасчлененныхъ формъ къ альпійскимъ, онъ значительно измѣняетъ существовавшее прежде воззрѣніе на орографическія особенности этой мѣстности, хотя воззрѣнія эти основывали, впрочемъ, не на личномъ знакомствѣ съ Байкаломъ, а на имѣвшихся въ то время литературныхъ данныхъ <sup>1)</sup>. Такимъ образомъ, считая островъ Ольхонъ отрѣзкомъ нѣкогда цѣльной альпійской цѣпи, пересѣкавшей долину Байкала въ діагональномъ направленіи черезъ Святой Носъ, и находившей себѣ продолженіе въ альпійской грядѣ праваго берега р. Баргузина (см. ниже), Кропоткинъ продолжалъ эту цѣпь на своей орографической картѣ къ юго-западу, до долины Ангары и принималъ её, такъ сказать, за исходную точку. Зная, затѣмъ, что прибрежныя горы сѣверо-восточной части Байкала принимаютъ мѣстами альпійскую наружность, мѣстами же отличаются тяжелыми и не расчлененными контурами, онъ предположилъ существованіе здѣсь нѣсколькихъ альпійскихъ цѣпей, параллельныхъ Ольхонской и пересѣкавшихъ современную долину Байкала въ діагональномъ направленіи. Одна изъ такихъ цѣпей, ближайшая съ сѣверо-запада къ Ольхон-

---

<sup>1)</sup> Кропоткинъ. Общій Очеркъ Орографіи Восточ. Сибири, съ картою. Зап. П. Р. Геогр. Общ., по Общей Географіи, Т. V, Сиб. 1875 г.



ской, означена на той же картѣ приблизительно между верховьями знакомой намъ уже байкальской р. Анги (въ противоположность ленской Ангѣ), откуда она направляется къ западнымъ и сѣверо-восточнымъ окрестностямъ мыса Покойниковъ, слѣдовательно и къ окрестностямъ Заворотнаго мыса, а другая, еще болѣе сѣверная, слѣдуетъ вверхъ по правому берегу рѣки Лены, приблизительно отъ окрестностей Манзурки и достигаетъ берега Байкала около мыса Елохинъ (32 версты на сѣверо-востокъ отъ Заворотнаго, см. ниже). Въ настоящее время, послѣ описанныхъ выше маршрутовъ отчасти Чекановскаго (по р. Ангѣ), а затѣмъ Черскаго, можно сказать съ полною увѣренностью, что предполагавшіяся діагональныя къ озеру цѣпи вовсе не существуютъ; сѣверо-западный берегъ Байкала, во всемъ описанномъ до сихъ поръ нами его протяженіи сопровождается, напротивъ, двумя, параллельными другъ другу хребтами, что же касается Ольхонской цѣпи, то какъ мы видѣли выше, она, въ свою очередь, не представляетъ связи съ береговыми хребтами, а напротивъ, обособляется въ самостоятельное орографическое цѣлое, т. е. Прибрежно-Ольхонскую полосу горъ, или такъ называемыя Внутри-байкальскія горы.

Неоправдавшаяся діагональность орографическихъ цѣпей оказалась, однако, вполне примѣнимою къ тектоническимъ условіямъ строенія описываемой части горъ, какъ это показали геогностическія наблюденія Черскаго. Не взирая на то, что начиная съ мыса Шартла, Приморскій хребетъ слѣдуетъ уже с.-с.-в.-му направленію, простираніе пластовъ слагающихъ его породъ ни въ чемъ не измѣняется отъ прежняго (в.-с.-в.), и потому пласты эти и образуемыя ими складки пересѣкаютъ какъ хребетъ, такъ и сѣверо-восточную часть долины Байкала, въ діагональномъ направленіи. Этимъ всего нагляднѣе доказывается здѣсь полнѣйшее отсутствіе какой-либо связи между прежними, т. е. тектоническими хребтами или складками и современными, т. е. оро-

графическими формами, происшедшими вследствие позднѣйшихъ преобразованій конфигураціи мѣстности. Такими преобразованиями первобытная геопластика успѣла измѣниться настолько, что линіи прежнихъ тектоническихъ долинъ располагаются нынѣ мѣстами на гребняхъ орографическихъ хребтовъ (напр. Ольхонъ) и обратно,—явленіе, съ которымъ мы ознакомимся ближе при общемъ обозрѣніи возстановляемыхъ складокъ и отношеніи ихъ къ современной конфигураціи интересующей насъ горной страны. Что же касается передаваемыхъ Черскимъ подробностей строенія Приморскаго хребта между мысами Покойниковъ и Заворотнымъ, то здѣсь мы ограничимся лишь описаніемъ небезынтереснаго перехода слоистыхъ лаврентьевскихъ породъ въ массивныя, главнымъ образомъ, въ порфиръ, что имѣетъ мѣсто въ юго-западной части Большой Солонцовой бухты, начиная съ устья долины Солонсѣй-елга, по которой Черскій переваливалъ на р. Лену (см. выше). Изслѣдованіе этой скалистой части береговаго склона, а также и вышихъ его частей показали, во-первыхъ, что хлоритовый и слюдяно-хлоритовый сланцы дѣлаются здѣсь гнейсовидными и порфировидными, отъ появляющагося въ нихъ громаднаго количества вкрапленнаго полеваго шпата, достигающаго отъ 2 до 15 мил. въ діаметрѣ. Вкрапленники эти состоятъ мѣстами изъ округленныхъ гальковидныхъ сростковъ, вследствие чего порода является переходящею въ очковый гнейсъ, мѣстами же (бухта Хабару нугò) полево́й шпатъ этотъ принимаетъ правильно развитую кристаллическую форму въ видѣ отдѣльныхъ индивидуумовъ или двойниковъ. Здѣсь же наблюдается перемежаемость этой слоистой породы, падающей въ общемъ на ю.-ю.-в., съ порфиромъ, вкрапленники котораго сохраняютъ совершенно тѣ же особенности, какъ и въ описанномъ сланцѣ, и потому являются какъ въ округленныхъ формахъ (очковыхъ), такъ и въ правильно-развитыхъ кристаллахъ, или уже въ видѣ зеренъ, тогда какъ основная масса является совершенно крипто-

кристаллическою и неслоистой. Тамъ же можно видѣть очень мелкозернистую, почти криптокристаллическую и массивную породу сѣровато-зеленаго цвѣта, весьма рѣзко отдѣляющуюся отъ покрывающаго её порфириовиднаго сланца и потому, какъ бы изверженную (въ видѣ пластовой жилы), но внизу (т. е. къ такъ называемому лежащему боку) порода эта представляетъ весьма ясный переходъ въ залегающій подъ нимъ хлоритовый и слюдяно-хлоритовый сланцы. Далѣе, начиная съ Большаго Солонцоваго мыса, хребетъ состоитъ уже изъ порфира, переходы котораго въ хлоритовый сланецъ Черскій наблюдалъ, какъ въ выносахъ находящихся тамъ долинъ, такъ и въ утесахъ на высшихъ частяхъ хребта въ бухтѣ Заворотной, откуда онъ сдѣлалъ экскурсію въ верховьямъ самаго длиннаго изъ горныхъ потоковъ бухты, берущаго начало около высшей точки хребта. Восхождение совершенно невверхъ по руслу, а по склону горъ праваго берега долины, чтобы осмотрѣть покрытыя осыпью плоскія и до нѣкоторой степени террасовидныя части высотъ, лежащихъ у основанія высшаго гребня. Поросшее вначалѣ смѣшаннымъ, а затѣмъ хвойнымъ лѣсомъ, наносное предгоріе (см. выше) сопровождало здѣсь путешественника до высоты 783' надъ Байкаломъ, а еще выше (1200' н. Байк.) встрѣченъ былъ террасовидный уступъ, откуда начался крутой подъемъ на хребетъ, поросшій мѣстами довольно обильно кедровымъ сланцемъ. Вѣтви этого кустарника, сравнительно съ ихъ незначительною толщиною, замѣчательно крѣпки и нерѣдко помогаютъ горцамъ какъ при спускѣ съ весьма крутыхъ склоновъ, такъ и при подъемѣ на нихъ, хотя само растеніе, если оно порастаетъ мѣстность сплошнымъ покровомъ, служить опять весьма трудно преодолимымъ препятствіемъ для путешественника. Не менѣе затрудненій представляли на этомъ пути и густые кусты даурскаго рододендрона, образующіе мѣстами едва проходимую чашу, но растеніе это господствуетъ гипсометрически ниже кедроваго сланца. На высотѣ около 2000' путе-

пешественникъ достигъ уже площади, покрытой розсыпью порфира, которая составлена изъ кусковъ весьма неравномѣрныхъ размѣровъ, измѣняющихся отъ величины дресвы до кусковъ въ 2—3 фут. въ діаметрѣ. На поверхности такой розсыпи, на правомъ берегу долинки, южнѣе высшаго гольца, можно видѣть мѣстами небольшія чашевидныя углубленія до 3 сажень въ поперечникѣ, которыми, такъ сказать, намѣчается направление ручейка, протекающаго еще на незначительной глубинѣ подъ розсыпью и не успѣвшаго еще образовать себѣ видимаго русла. На высотѣ 2392' къ такому же углубленію, происшедшему отъ осыданья подмываемой снизу розсыпи и вполнѣ замкнутому съ нижней стороны, сходятся уже ясно выраженные, но совершенно сухія ложбинки, на днѣ которыхъ, но еще глубоко подъ розсыпью, можно слышать глухое журчаніе скрытаго тамъ потока. Наконецъ, на высотѣ 3320', Черскій достигъ основанія скалистаго гребня Приморскаго хребта, въ который врѣзались верховья потока въ видѣ двухъ котловинообразныхъ расширеній до 60 саж. въ діаметрѣ. Правое изъ нихъ направляется съ запада на востокъ, а лѣвое, менѣе правильное и нѣсколько меньшихъ размѣровъ, съ с.-в. на ю.-з., отдѣляясь другъ отъ друга довольно пологимъ, мысовиднымъ отрогомъ. Стѣны этихъ котловинъ очень крутыя, скалистыя и изрыты ложбинками, обыкновенно расширяющимися кверху и покрытыми толстымъ слоемъ снѣга (20-го іюня), изъ подъ котораго низвергаются ручейки нерѣдко отвѣсными водопадами. Внизу, около каждой ложбинки, находится высокая, тупоконическая груда острореберной осыпи, т. е. обломковъ породы, сносимыхъ и падающихъ съ высшихъ частей скалъ; насколько же быстро такія осыпи могутъ иногда увеличиваться во время таянія снѣга, доказываетъ то обстоятельство, что въ теченіи не болѣе часа, пока-мѣстъ путешественникъ успѣлъ напиться чаю, въ правой котловинѣ произошли два обвала цѣлой груды обломковъ, упавшихъ съ шумомъ и трескомъ съ высоты одной изъ лѣвыхъ

ложбинокъ. Не взирая на немалое количество ручейковъ, низвергающихся съ ложбинокъ, которыя спускаются съ крутыхъ стѣнъ расширеній, вода этихъ ручейковъ, достигнувъ дна котловины, сейчасъ же исчезаетъ подъ массою залегающей здѣсь розсыпи и переходитъ въ систему скрытыхъ подъ нею потоковъ, которыми увлекаются и уносятся только посильные имъ болѣе мелкіе продукты разрушенія скалъ, насколько они могутъ быть пропускаемы черезъ промежутки между нагроможденными обломками, послѣ чего наступаетъ осѣданіе верхней части розсыпи по длинѣ подмывавшаго её потока и образованіе русловидной ложбины. Каждая изъ двухъ названныхъ котловинъ носитъ весьма явные слѣды бывшаго въ нихъ болѣе высокаго уровня розсыпи заполнявшей дно; слѣды эти являются не только въ видѣ террасовидныхъ остатковъ этого матеріала около стѣнъ расширеній, но также въ видѣ острововидныхъ бугровъ и возвышеній до 3—4 саж. высоты, расположенныхъ между углубившимися уже руслами, какъ напр., въ лѣвой котловинѣ. Высшій пунктъ, до котораго достигъ Черскій, это дно правой изъ названныхъ котловинъ, гдѣ aneroidъ показалъ 3362' надъ уровнемъ Байкала; видимыя отсюда высшія точки хребта превышаютъ это мѣсто, повидимому, не болѣе какъ около 1200', такъ-что общая высота хребта должна достигать здѣсь 4500' надъ озеромъ. Во время отдыха въ этой котловинѣ Черскій видѣлъ, какъ изъ подъ утеса задней (западной) стѣны вышли на спускавшуюся тамъ снѣжную поляну два молодыхъ медвѣдя, должно быть прошлогодняго помета. Очевидно, животные эти спасались здѣсь отъ зноянаго дня, но почувствовавъ впослѣдствіи охлаждающее дѣйствіе, столь близкаго отъ нихъ снѣга, сочли необходимымъ согрѣться моціономъ и начали рѣзвиться по снѣжному покрову, прибѣгая перѣдко къ весьма неуклюжему курцъ-галопу и неподозрѣвая столь близкаго присутствія отъ нихъ человѣка (около 100 саженой). Нѣсколько нарочно сдѣланныхъ ударовъ молотка о камень сразу обратили ихъ вниманіе на путешественниковъ,

а послѣдовавшій затѣмъ громкій крикъ проводника до того испугалъ ихъ, что они стали подниматься на гребень хребта по спускавшейся оттуда снѣжной полянѣ и въ скоромъ времени скрылись изъ виду. Замѣтивъ, что въ стѣнахъ той же котловины Черскій видѣлъ наклонъ пластовъ (быть можетъ отдѣльности?) на ю.-в., скажемъ здѣсь еще нѣсколько словъ о другомъ горномъ потокѣ, берущемъ начало восточнѣе высшей изъ вершинъ въ Заворотной бухтѣ. Судя по особенностямъ его долины, это по всей вѣроятности тотъ потокъ, о которомъ писалъ еще Георгіи, называя его тунгускимъ именемъ Бэра, но употребляется ли это названіе въ настоящее время, къ тому же точно ли оно передано названнымъ авторомъ, Черскій не могъ ни отъ кого узнать, такъ какъ не встрѣтилъ тунгусовъ, знакомыхъ съ этою мѣстностью. Въ области низовьевъ этого потока наносное предгорье хребта возвышается, какъ сказано выше, террасовидно, причемъ поверхность высшей изъ этихъ озерныхъ террасъ (928' надъ современнымъ уровнемъ Байкала), примыкаетъ здѣсь къ чрезвычайно крутому и скалистому склону хребта, недоступному для восхожденія. Склонъ этотъ пересѣкается узкимъ ущельемъ, по которому стремится названный горный потокъ, врѣзываясь по выходѣ на предгорье въ еще болѣе узкую щелевидную долину. Потокъ низвергается здѣсь двумя водопадами, изъ которыхъ первый вполне доступенъ для осмотра, а второй, нисшій, только отчасти, такъ какъ потокъ входитъ здѣсь въ очень узкую (7—10') и глубокую щель въ порфирѣ, дно которой не видно съ береговаго уступа. Сильный дождь, продолжавшійся съ небольшими перерывами почти цѣлыя сутки не позволилъ продолжать экскурсію, а на слѣдующій день Черскій отправился въ дальнѣйшее плаваніе.

Б) Отъ Заворотнаго мыса до мыса Котельниковскаго.

Въ противоположность цѣлому ряду довольно значительныхъ бухтъ, сопровождавшихъ путешественника на пути отъ

Онгурѣна до Заворотной бухты, къ сѣверо-востоку отъ Заворотнаго мыса, на протяженіи около 32 верстъ, т. е. до мыса Елѳхинъ, берегъ Байкала является гораздо менѣ извилистымъ и образуетъ собственно одну длинную и сравнительно плоскую бухту, которая, благодаря незначительнымъ мысовиднымъ выступамъ береговой линіи, подраздѣляется на соответствующее число маленькихъ, второстепенныхъ бухточекъ. Такъ напр., около 7 верстъ за Заворотнымъ мысомъ располагается мысъ Кедровый 1-й (Хоштѣ), съ соименнымъ горнымъ потокомъ; 3 версты далѣе 2-й Кедровый, а за нимъ, въ такомъ же разстояніи, 3-й Кедровый съ устьями рѣчекъ того же имени; еще далѣе (болѣе 3 версты) располагается мысъ Борѣ-толгѣй съ ключемъ Артамоновымъ (Артѣма у бурятъ), спустя 8 верстъ мысъ Ледяной (Неднѣй или Леднѣй у бурятъ), скалистый и непосредственно омываемый водою, въ отличіе отъ всѣхъ названныхъ выше наносныхъ, а наконецъ, въ 7 верстахъ за Ледянымъ, мысъ Елѳхинъ, ограничивающій всю эту длинную бухту съ сѣверо-востока. По опредѣленію астронома Шварца мысъ этотъ располагается подъ  $54^{\circ}32'$  сѣв. широты и  $126^{\circ}12'$  вост. долготы, слѣдовательно на  $54'$  сѣвернѣе Онгурѣна. Наносное побережье сравнительно уже, въ особенности къ сѣверо-востоку отъ Артамоновой, гдѣ, напр. около Ледяной рѣчки, оно совершенно исчезаетъ. Утесъ, омываемый непосредственно водою, находится также и въ бухточкѣ между 1-мъ и 2-мъ Кедровымъ мысами; на этомъ утесѣ, на высотѣ одного метра надъ уровнемъ Байкала Черскій сдѣлалъ *заспѣчку*, чтобы дать возможность будущимъ изслѣдователямъ провѣрить *высоту стоянія воды въ озерѣ* (26-го іюня 1880 г.); на той же скалѣ, какъ и на многихъ другихъ прибрежныхъ утесахъ, о чемъ будетъ сказано въ своемъ мѣстѣ можно видѣть линію высшаго изъ современныхъ періодическихъ колебаній поверхности озера, означенную, какъ обы-

кновенно, присохшими къ скалѣ нитевидными водорослями; высота этой линіи надъ водою оказалась равною 0,523 миллиметрамъ. Составъ наноснаго побережья такой же, какъ и въ предшествовавшихъ бухтахъ (послѣтретичный наносъ); новѣйшій прибойный матеріалъ (галька), окаймляя болѣе высокіе (2—4 саж.) яры древнѣйшаго наноса, образуетъ мѣстами цѣлый рядъ параллельныхъ другъ другу грядъ; изъ такихъ грядъ, расположенныхъ концентрически и постепенно приростававшихъ другъ къ другу, состоитъ 3-й Кедровый мысъ, поросшій уже лѣсомъ, причемъ на устроенной такимъ образомъ его поверхности замѣчаются два озерка (прежнія лагуны): южное меньшее и сѣверное—большее и съ раздвоенною сѣвѣрною оконечностью. Побережье и здѣсь порастаетъ отчасти смѣшаннымъ, но преимущественно хвойнымъ лѣсомъ, къ которому, начиная съ Заворотнаго мыса, подмѣшивается значительный процентъ кедровника, давшаго названіе и упомянутому выше мысамъ (*хошѣ*, по-бурятски кедръ; *хошмѣ* означаетъ кедровый). Радде находилъ здѣсь еще: *Alnus*, *Betula*, *Sorbus*, *Empetrum*, *Populus*, *tremula*, *Polemonium*, *Orobus*, *Valeriana*, *Lilium martagon* и т. п.

Приморскій хребетъ на этомъ протяженіи поворачиваетъ еще болѣе къ сѣверу (с.-в.15°), сохраняя альпійскую наружность своего высшаго, скалистаго гребня, хотя въ предѣлахъ Кедровыхъ мысовъ и до Артамоновой рѣчки онъ снабженъ лѣсистымъ и болѣе пологимъ склономъ, играющимъ роль какъ бы предгорья относительно отступившихъ скалистыхъ вершинъ; въ сторону нѣкоторыхъ изъ этихъ мысовъ вытягиваются и болѣе пологіе лѣсистые отроги, какъ напр., къ 3-му Кедровому и Баро-толгю, гдѣ оконечность отрога является въ видѣ двухъ округленныхъ вершинокъ. Ближе къ рч. Ледяной скалистый и болѣе крутой склонъ опускается почти непосредственно къ озеру рядомъ утесистыхъ гребней, перѣдко съ мелко зазубренными очертаніями отъ выдающихся на склонѣ уединенныхъ, башневидныхъ утесовъ. Многіе изъ



потоковъ, мчащихся по расчленивающимъ хребетъ долинкамъ, низвергаются мѣстами въ видѣ водопадовъ и каскадовъ, замѣтныхъ даже съ берега озера. Ближе къ Ледяному мысу утесы видѣются и подъ уровнемъ Байкала, образуя мѣстами террасовидныя площади отвѣсно опускающіяся къ чернящей глубинѣ дна.

Кромѣ изслѣдованія ближайшихъ къ озеру частей склона и выносовъ горныхъ потоковъ, Черскій углублялся еще и по долинамъ нѣкоторыхъ изъ этихъ рѣчекъ, съ цѣлью ближайшаго ознакомленія съ строеніемъ и особенностями этой части хребта. Небезъинтереснымъ оказалось напр. восхождение на хребетъ вверхъ по лѣвому берегу долины 1-го Кедроваго потока, начатое съ его устья, гдѣ онъ врѣзывается отъ 30 до 40' въ толщу своего прежняго наноса и низвергается къ озеру каскадомъ съ высоты не менѣе 17 футовъ. На высотѣ около 500' надъ озеромъ къ долинѣ подступилъ крутой и недоступный, скалистый склонъ хребта, обнажающій порфиръ, пластоватая отдѣльность котораго падаетъ мѣстами видимо къ востоку. Таже порода образуетъ утесы, примыкающіе непосредственно къ правому берегу русла, вслѣдствіе чего здѣсь происходитъ весьма живописное суженіе долины. Далѣе, на высотѣ 800' надъ Байкаломъ и въ разстояніи болѣе версты отъ устья, утесы праваго берега долины смѣняются отложеніемъ наноса, возвышающагося на 40 и болѣе футовъ надъ русломъ, лѣвый берегъ котораго сравнительно очень низкій. Наносомъ этимъ, состоящимъ изъ суглинистаго песка, переполненнаго галькою и валунами, а изрѣдка и неокругленными глыбами мѣстныхъ породъ (до 7 футовъ въ діаметрѣ), выполнялось, очевидно, нѣкогда все небольшое расширеніе долины, но отъ послѣдовавшаго затѣмъ углубленія и перемѣщенія русла прежніе осадки его были размыты на лѣвомъ берегу долины, уцѣлѣвъ отчасти только съ правой стороны.

Вскорѣ утесы опять подступаютъ къ правому берегу

лины, стѣсная её живописно-зазубренными гребнями (1035' надъ Байк.), а далѣе, въ разстояніи 2 верстъ отъ устья, на высотѣ 1170' надъ озеромъ, потокъ низвергается водопадомъ на протяженіи около 10 саж. въ длину и съ высоты до 35 футовъ, причемъ струя его воды встрѣчаетъ на пути три скалистые ступени, падая поочередно на каждую изъ нихъ. Отсюда начинается менѣе крутой подъемъ по направленію къ воронкообразному расширенію верховьевъ, по безлѣсной почвѣ, покрытой осыпью скалъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, если взглянуть въ сторону Байкала, открывается весьма красивый и оригинальный видъ на озеро сквозь пройденное суженіе: крутизна склона ниже водопада не позволяетъ видѣть отсюда ни малѣйшаго клочка нижней части долины, ни ея устья и потому кажется, что склонъ хребта долженъ падать какъ бы отвѣсно къ озеру, между тѣмъ сквозь весьма живописное суженіе отъ подступающихъ здѣсь зазубренныхъ и башневидныхъ скалъ, мерцаетъ соотвѣтственная часть поверхности Байкала, ограниченная вдали достаточно хорошо виднымъ отсюда поясомъ горъ противоположнаго берега озера.

На высотѣ 1660' начинается болѣе близкая котловинообразная воронка лѣваго верховья Кедроваго потока со слѣдами суживавшей её книзу, утесистой стѣны, нынѣ почти совершенно разрушенной, т. е. распавшейся и превратившейся въ груды осыпи. Пройдя мимо этого верховья, Черскій достигъ котловины праваго источника, которая въ свою очередь суживалась утесистою стѣною, хотя нынѣ остались отъ нея только уединенные, башневидные утесы на лѣвомъ берегу потока, — до того процессъ разрушенія скалъ дѣйствовалъ здѣсь успѣшно. Дно этой котловины располагается на высотѣ 2274' надъ Байкаломъ и въ разстояніи около  $4\frac{1}{2}$  верстъ отъ устья этого потока. Особенности котловины въ общемъ такія же, какъ и описанныхъ выше; въ геогностическомъ отношеніи она представляетъ тотъ интересъ, что частью своей задней стѣны она захватила уже толщу Онотскихъ

сланцевъ, приблизившихся здѣсь къ Байкалу болѣе, нежели въ области того же хребта между Покойниками и Заворотнымъ мысомъ: въ осыпи здѣсь найденъ глинистый сланецъ темно-фіолетово-краснаго цвѣта, какъ на Хыр-хушунѣ, но не вскипающій отъ кислоты и съ кварцевыми жилами. Въ остальной же части долины потока развиты порфиръ, переходящій въ верховьяхъ въ желѣзистый порфировидный гранитъ, а въ одномъ мѣстѣ и діоритъ, точно также порфировидный, но отношеніе его къ другимъ породамъ нельзя было опредѣлить. Небезъинтересны также свѣдѣнія, передаваемыя Черскимъ о рѣчкѣ Ледяной, извѣстной еще со временъ путешествія Георги. Этотъ послѣдній считалъ долину Ледяной недоступнымъ и узкимъ *ущельемъ* до 15 верстъ длины, по которому низвергается соименный потокъ непрерывнымъ рядомъ водопадовъ; важнѣйшею особенностью долины является то обстоятельство, что въ низовьяхъ ея русла и на окружающихъ ее скалахъ лежалъ (4 іюля 1772 г.) толстый слой льда, не тающій, по словамъ тунгусовъ, въ продолженіи цѣлаго лѣта. По замѣчанію Черскаго, посѣтившаго долину рч. Ледяной 30-го іюня 1880 г. къ ней вовсе непримѣнно названіе «узкаго и непроходимаго ущелья». Это довольно широкая (отъ 30 до 40 сажень) долина, открывающаяся среди скалистыхъ склоновъ горъ, дѣйствительно омываемыхъ непосредственно водою Байкала, но къ ея устью можно удобно пристать лодкѣ, а Черскій заходилъ въ нее, для экскурсіи, даже и съ ближайшей въ востокъ бухты, гдѣ стояла его палатка. Переходъ этотъ сдѣланъ былъ, разумѣется, по очень крутому и густо поросшему склону горъ лѣваго берега долины, высоко надъ поверхностью Байкала, но склонъ этотъ все-таки оказался вполнѣ доступнымъ для пѣшехода и опаснымъ только для цѣлости его одежды, какъ и любая экскурсія по долинамъ большей части здѣшнихъ горныхъ потоковъ. Устье долины Ледяной раздѣлено на двѣ части (рукава) продольнымъ, острововиднымъ возвышеніемъ сіенито-гранита, покрытаго валунами и глыбами.

порфира (плагіоклазово-кварцевый, съ темною, аспидно-сѣрою, почти синевато-черною основною массою). По лѣвому изъ этихъ двухъ рукавовъ русла протекаетъ вода потова, а въ правомъ залегаетъ ледъ въ видѣ покрова до 35 сажень въ длину и до 10 саж. въ ширину, при толщинѣ, превосходящей аршинъ. Слоистый ледъ этотъ замерзаетъ въ теченіе зимы и ранней весны по закону образованія такъ называемыхъ наледей или нависей, а такъ какъ вслѣдствіе высоты и направленія крутыхъ склоновъ горъ этой части берега Байкала многіе отрѣзки долинъ не освѣщаются солнцемъ уже начиная съ 12 часовъ дня, а съ верховьевъ ихъ образуется ежедневное теченіе холоднаго воздуха, то ледъ такой, достигающій къ веснѣ нѣсколькихъ сажень толщины, дѣйствительно не можетъ иногда вполне растаять въ теченіе столь короткаго лѣта въ такихъ долинахъ.

Ниже мы увидимъ, что въ низовьяхъ южнаго изъ двухъ потоковъ, изливающихъ въ области мыса Елохинъ, а также и Большой Черемшанки (9 верстъ къ сѣверо-востоку отъ Елохина), Черскій нашель (5-го и 9-го іюля) по меньшей мѣрѣ въ шесть разъ болѣе льда, но ледъ этотъ, въ противуположность вполне открытому устью рч. Ледяной, закрывается тамъ со стороны озера пространствомъ, поросшимъ лѣсомъ, иначе рѣчки эти съ успѣхомъ могли бы оспаривать у Ледяной ея названіе; что же касается холода, распространяемаго этими скопленіями льда, то у Черскаго находимъ, что на устьѣ Черемшанки (9-го іюля), не смотря на ясный день, онъ нашель своихъ работниковъ, одѣтыхъ въ шубы уже въ 3 часа пополудни. Но возвратимся къ рч. Ледяной. Ширина ея русла въ низовьяхъ измѣняется отъ  $2\frac{1}{2}$  до  $3\frac{1}{2}$  сажень при направленіи почти на ю.-ю.-в. (ю.-в.  $15^\circ$ ); вода мчитъ по большимъ округленнымъ глыбамъ, загромождающимъ русло, и подмываетъ лѣвый скалистый берегъ низовья, но на всемъ посѣщенномъ протяженіи долины (болѣе 4-хъ верстъ) не найдено ни одного водопада, которыми, очевидно, назывались обыкно-

венные каскады и быстрины горного потока. Нѣсколько выше долина измѣняетъ направленіе въ восточное и принимаетъ правый притокъ; оба склона ея покрыты осыпью порфира и сравнительно положе, а далѣе, въ террасѣ праваго берега, таже порода выступаетъ и въ утесѣ, а долина принимаетъ юго-восточное направленіе. На высотѣ около 1300' надъ озеромъ и въ разстояніи около 4 верстѣ отъ устья, Ледяная принимаетъ лѣвый притокъ съ с.-с.-в., а сама вытекаетъ съ з.-ю.-з. Наклонъ дна долины здѣсь очень крутой; вверхъ по нему Черскій прошелъ еще около 1 версты, гдѣ, на высотѣ 1670' надъ Байкаломъ, Ледяная составляется изъ двухъ вѣтвей или верховьевъ; лѣвое изъ нихъ очень маловодное, притекаетъ съ ю.-з., а правое съ с.-з. Ширина долины не превосходитъ здѣсь 10 саж., при пологихъ, хотя и высокихъ склонахъ. Отсюда видно, что гора, отдѣляющая оба верховья, отличается широкою и округленною вершиною, а на склонѣ праваго берега праваго верховья находится множество уединенныхъ, башневидныхъ утесовъ, возвышающихся изъ подъ покрывающаго этотъ склонъ слоя осыпи: это мѣнѣе растресканныя части той же породы и потому противостоящіи процессу разрушенія, округлившему вершины и притупившему гребни отроговъ. Вдали, въ разстояніи около 2 верстѣ отъ сліянія описываемыхъ верховьевъ, виднѣется высшая часть гребня хребта, скалистая и съ тупозазубренными очертаніями, въ видѣ какъ бы отвѣсной стѣны, поперечной къ направленію долины. Это очевидно задняя стѣна котловинообразнаго расширенія верховьевъ, судя по которой, длину всего теченія Ледяной Черскій считаетъ не болѣе, какъ 7 или 8 верстѣ, а не 15, какъ предполагали прежде, основываясь на томъ, что тунгусы опредѣляли длину рѣчки въ 4 часа ѣзды на оленяхъ; но по такимъ горнымъ долинамъ, по замѣчанію Черскаго, ѣзда на оленѣ даетъ обыкновенно тѣже результаты, что и ходьба пѣшкомъ, а иногда еще и худшіе, такъ какъ олени всего чаще приходится вести въ рукахъ,

загрудняясь иногда въ выборѣ мѣста для направленія пути. Поэтому разстоянія, опредѣлявшіяся тунгусами, напр. въ два дня хода, проходились Черскимъ иногда въ одинъ день (см. ниже).

По обнаженіямъ этихъ двухъ рѣчекъ (Кедровая и Ледяная), какъ равно и по изслѣдованію скалистыхъ частей склона на всемъ протяженіи отъ Заворотнаго мыса до Елохина, оказалось, что въ строеніи Приморскаго хребта участвуютъ здѣсь кристаллическія породы, именно: порфиръ, переходящій отчасти въ хлоритовый, гнейсовидный сланецъ, отчасти же, повидимому, въ гранито-сіенитъ, который и господствуетъ къ сѣверо-востоку отъ устья 3-го Кедроваго потока, что же касается онотскихъ сланцевъ, то они сначала нѣсколько приближаются къ Байкалу, такъ-что верховья 1-го Кедроваго потока, какъ мы видѣли выше, достигли до мѣста прикосновенія ихъ съ кристаллическими породами, послѣ чего они опять до нѣкоторой степени удаляются отъ озера на столько по крайней мѣрѣ, что ни одна изъ долинъ, съ Ледяною включительно, не врѣзывается въ эту толщу, но далѣе, какъ мы увидимъ ниже, начиная съ долинъ Елохинскаго мыса сланцы эти мгновенно подступаютъ къ Байкальской долинѣ и въ нѣкоторыхъ мѣстахъ распространяются даже на область, занятую нынѣ водою озера (см. ниже).

Отъ мыса Елохинъ до Котельниковскаго, т. е. на протяженіи 56 верстъ по прямому направленію, берегъ Байкала опять представляетъ цѣлый рядъ довольно пространныхъ (отъ 6 до 12 верстъ длины) и болѣе или менѣе полулунныхъ бухтъ, ограниченныхъ треугольными наносными мысами. Такимъ образомъ, вслѣдъ за мысомъ Елохиномъ, располагается Черемшанская бухта, раздѣленная небольшимъ мысомъ Малой Черемшанки на двѣ части; далѣе за мысомъ Большой Черемшанки лежитъ бухта Хибелень, ограниченная соименнымъ мысомъ; за нимъ бухта Малой Косы, превышающая, впрочемъ, своими размѣрами слѣдующую за

нею бухту Большой Косы. За мысом того же имени (Больш. Косы) слѣдуетъ бухта Мужинай (иначе Мужинѣй или Мужнѣй, даже Муднѣй, на картѣ Шварца ошибочно «Модина»), ограниченная съ сѣверо-востока соименнымъ мысомъ, который, по своей ширинѣ (около 7 верстѣ) напоминаетъ знакомый намъ уже мысъ Покойниковъ, только юго-восточная, широкая его оконечность является болѣе извилистою и представляетъ двѣ бухтовидныя выемки (Малая Мужинайская и Болсодѣйская бухты, иначе Коврижка), разобщенныя острововидно возвышающеюся, низкою горою, извѣстною подъ названіемъ мыса Коврижка или Болсодѣй. Наконецъ, послѣдняя и самая обширная бухта Бургунду или Хюрхюрб (до 12 верстѣ длины, въ хордѣ), примыкаетъ уже къ Котельниковскому мысу (см. ниже).

Между Елохиномъ и мысомъ Малой Косы, т. е. на протяженіи первыхъ 26 верстѣ, побережье, за исключеніемъ упомянутыхъ выше мысовъ и устьевъ нѣкоторыхъ долинокъ, отличается скалистымъ характеромъ и утесами, иногда непосредственно омываемыми водою, тогда какъ за Малою Косою оно образуется сплошною полосою какъ современнаго, такъ и болѣе древняго наноса (отъ  $\frac{1}{4}$  до 1 версты ширины), изъ подъ котораго мѣстами (Б. Черемшанка, Мужинай) выступаетъ еще конгломератъ, по всей вѣроятности третичный (см. ниже), образуя яры болѣе 40 футовъ высоты, иногда съ башневидными выступами на склонахъ. Количество ключей и потоковъ увеличивается, причемъ къ сѣверо-востоку увеличивается и ихъ длина. На Елохинѣ изливаются въ озеро два соименныхъ ключа; за ними и вслѣдъ за Безъимяннымъ ключемъ слѣдуютъ рѣчки: Малая, Средняя и Большая Черемшанки (9 верстѣ отъ Елохина), далѣе два Безъимянныхъ, а затѣмъ Хибелень, Малая и Большая Коса, Мужинай и Коврижка или Болсодѣй. Мужинай изливается въ Байкалъ черезъ посредство довольно большого лагуновиднаго озера (Мужинайское озеро),

снабженнаго короткимъ истокомъ; такихъ озеръ на Мужинайскомъ мысѣ находится еще три: по одному по обѣ стороны мыса Коврижки и третье около сѣверо-восточнаго основанія мыса, со стороны бухты Бургундѹ, причемъ озера эти значительно уменьшаются по направленію къ послѣднему изъ названныхъ; кромѣ того небольшое озерко располагается около сѣверной части основанія мыса Большой Косы. На Мужинайскомъ мысѣ Черскій встрѣтилъ первый населенный пунктъ къ сѣверо-востоку отъ Покойниковъ: это постоянное мѣстожителство одного бѣднаго семейства тунгуса, содержащаго здѣсь и нѣсколько оленей. Животныя эти, преслѣдуемыя комарами и мошками болотистой юго-западной части названнаго мыса, прибѣжали къ берегу Байкала какъ только завидѣли дымъ, поднявшійся изъ костра, разведеннаго работниками Черскаго; постоявъ около огня и поѣвъ нѣсколько соли, которою ихъ угостили пріѣзжіе, олени отправились обратно къ горамъ, причемъ, для сокращенія пути, они пустились вплавъ черезъ Мужинайское озеро и совершили эту переправу съ ловкостью и искусствомъ, достойнымъ удивленія.

Приморскій хребетъ на описанномъ протяженіи сохраняетъ ту же расчлененность; между Елохиномъ и Малою Косою свалистый гребень его нѣсколько отступаетъ отъ берега, ближе къ которому возвышаются болѣе округленные вершины горъ, мѣстами съ болѣе пологими склонами (Черемшанки, Хибелень и Малая Коса); но сейчасъ же за мысомъ Малой Косы высшіе пункты подступаютъ къ Байкалу и хребетъ является въ видѣ альпійской цѣпи, въ особенности живописной въ окрестностяхъ Мужинайскаго мыса, гдѣ онъ пересѣкается глубокими долинами: Мужиная, а затѣмъ Коврижки. Съ лѣваго берега послѣдней начинается гора Бургундѹ, извѣстная еще со временъ Георги. Путешественникъ этотъ сравнивалъ ея вершину съ свинымъ хребтомъ, вслѣдствіе цѣлаго ряда узкихъ скалъ, торчащихъ на ней какъ щетины; весьма возможно, что истекшаго съ тѣхъ поръ сто-



лѣтія было достаточно для того, чтобы скалы эти разрушились, такъ какъ Черскій видитъ возможность сравнивать нынѣ вершину эту развѣ только съ крышею. Со стороны Байкала склонъ Бургунду пересѣкается одиннадцатью сухими ложбинками; мелкая зазубренность контура виднѣется только въ верховьяхъ одной изъ этихъ долинокъ; въ профиль, напр. при взглядѣ съ мыса Большой Косы, на почти горизонтальной и крышевидной вершинѣ этой возвышается небольшой, какъ бы пирамидальный зубецъ; высота Бургунду не должна превосходить впрочемъ 4000—4500' надъ уровнемъ Байкала. Будущимъ изслѣдователямъ необходимо однако обратить особенное вниманіе на нижеслѣдующую топографическую особенность описываемой части Приморскаго хребта. Черскій <sup>1)</sup> передаетъ, во-первыхъ, что при взглядѣ съ сосѣднихъ, юго-западныхъ, высотъ на профиль горъ по лѣвому берегу низовьевъ долины Малой Черемшанки, оказывается, что, вслѣдъ за ближайшею къ Байкалу, почти горизонтально усѣченною и слабо-зазубренною вершиною, располагается нѣсколько болѣе низкая поверхность хребта, кажущаяся въ профиль совершенно плоскою и горизонтальною, въ родѣ широкой террасы или дна очень высокой и продольной къ озеру долины, сѣверо-западный берегъ которой не могъ быть наблюдаемъ, по причинѣ скопившихся тамъ въ то время облаковъ. Затѣмъ, осмотръ горъ около низовьевъ Большой Черемшанки, напр. при взглядѣ на нихъ съ юго-западной стороны соименнаго мыса, обнаруживаетъ въ свою очередь существованіе высокой, въ разрѣзѣ плоской и горизонтальной поверхности позади ближайшихъ къ Байкалу горъ. Точно также красивый видъ вверхъ по глубокой и скалистой долинѣ рч. Коврижки (Болсодѣй) убѣждаетъ, что позади горы Бургунду поверхность хребта сразу понижается, обнаруживая почти горизонтальный и прямолинейный контуръ и опускаясь къ лѣвому берегу до-

---

<sup>1)</sup> Черскій, Рукописныя замѣтки о Сибири.

лины Коврижки рядомъ почти отвѣсныхъ утесовъ; вдали за этою понизившеюся частью хребта, виднѣются опять болѣе высокія горы, но и здѣсь собравшіяся облака мѣшали разсмотрѣть ихъ надлежащимъ образомъ. Наконецъ Черскій обращаетъ вниманіе будущихъ путешественниковъ и на особенности верхней поверхности хребта въ верховьяхъ праваго притока нижняго теченія рч. Мужинай, вся долина котораго, почти продольная къ хребту, весьма хорошо наблюдается при взглядѣ съ устья рч. Коврижки: верховья эти въ видѣ довольно пространной котловины, врѣзались въ часть хребта со столь же плоскою и горизонтальною поверхностью, какъ и упомянутая выше, не взирая на альпійскую наружность болѣе высокаго гребня, отдѣляющаго эту плоскую поверхность отъ Байкала. Черскій не могъ предпринимать восхожденіе на эти плоскія высоты, такъ какъ припадки біенія сердца, появившіеся у него еще въ окрестностяхъ Кедровыхъ потоковъ, стали значительно усиливаться по мѣрѣ приближенія къ сѣверо-восточной оконечности озера; поэтому объ орографическомъ значеніи этой плоской поверхности онъ не рѣшился высказать что либо опредѣленное. Во всякомъ случаѣ геогностическое изслѣдованіе всей этой части Приморскаго хребта показало, что описанное явленіе, которое Черскій полагаетъ возможнымъ поставить въ параллель съ плоскими поверхностями того же хребта на знакомыхъ намъ перевалахъ на р. Чанчеръ (до 2368' надъ Байкаломъ), не стоитъ въ зависимости ни отъ строенія мѣстности, ни отъ тектоническихъ условій, т. е. положенія пластовъ, развитыхъ тамъ породъ. Въ подтвержденіе сказанному, путешественникъ этотъ передаетъ, во-первыхъ, что, хотя въ окрестностяхъ Черемшанокъ (и Чанчера), плоская часть хребта образуется на выходахъ толщи онотскихъ сланцевъ, гдѣ слагающихся къ сѣверо-западному склону лаврентьевскихъ породъ, образующихъ болѣе высокую часть хребта со стороны Байкала, на Мужинай и Коврижкѣ (около Бургундѣ) таже плоская поверхность образо-

валясь на лаврентьевскихъ гнейсахъ; а во-вторыхъ, что въ то время, когда онотскіе сланцы на плоскихъ высотахъ около верховьевъ Чанчера отличаются ничтожнымъ наклономъ слоевъ, въ долині М. Черемшанки пласты эти круто падаютъ къ сѣверо-западу точно также какъ по р. Коврижкѣ; уголъ паденія гнейсовъ достигаетъ 50—60°. Вообще геогностическое строеніе описываемой части Приморскаго хребта представляетъ высочайшій интересъ въ научномъ отношеніи, обнаруживая данныя для сужденія о физико-географическихъ условіяхъ мѣстности въ древнѣйшіе періоды исторіи ея развитія. Отсылая читателей, желающихъ ознакомиться какъ съ петрографическими, такъ и стратиграфическими подробностями, къ отчету Черскаго за 1880 г. (loc. cit.), гдѣ условія эти изложены съ вполне достаточными деталями, мы ограничимся здѣсь лишь общимъ очеркомъ добытыхъ результатовъ. Онотская толща сланцевъ (глинистые сланцы, известнякъ, кварцитъ, песчаникъ и брекчія съ конгломератомъ), отдѣленная отъ берега озера лаврентьевскими породами еще начиная съ окрестностей устья р. Голоустной, опять подступаетъ къ Байкалу въ промежуткѣ между мысомъ Елохинъ и Малою Косою, т. е. на протяженіи 26—28 верстъ. Въ первой части названнаго отрѣзка береговой линіи, до мыса Хибелень (18 верстъ отъ Елохина), толща эта во многихъ мѣстахъ отдѣляется еще отъ озера небольшими и уединенными выходами древнѣйшихъ (лаврентьевскихъ) породъ, хотя имѣются доказательства тому, что онотскіе сланцы переходили и на байкальскій склонъ этихъ островидныхъ остатковъ полевошпатовыхъ породъ и потому, напр., наносный слой даже низменнаго мыса Малой Черемшанки залегаетъ на головахъ выступающаго здѣсь онотскаго кварцита, пласты котораго скрываются далѣе подъ уровнемъ Байкала. Что же касается промежутка между Хибеленомъ и Малою Косою, то сланцы эти слагаютъ здѣсь собою весь Приморскій хребетъ и распространялись также далѣе къ юго-востоку на нѣкоторую часть мѣстности, занятую нынѣ доли-

ною Байкала, такъ какъ ими образуется и видимая часть дна озера въ этомъ мѣстѣ. Такое отношеніе онотскихъ сланцевъ къ долинамъ современнаго Байкала вполне аналогично тому, что мы видѣли уже въ юго-западной части озера, именно, въ промежуткѣ между долиною Варначей и устьемъ р. Голоустной. Какъ здѣсь, такъ и тамъ, въ непрерывной до тѣхъ поръ полосѣ лаврентьевскихъ породъ существовали углубленія, въ родѣ широкихъ долинъ, въ которыя, съ сѣверо-запада, проникали воды, отложившія онотскіе сланцы и выполнившія ими эти долины, которыя, о чемъ будетъ сказано въ своемъ мѣстѣ, должны были имѣть видъ заливовъ, распространявшихся на нѣкоторую часть мѣстности, занятой нынѣ долиною Байкала. Различіе состоитъ лишь въ томъ, что Голоустенскій перерывъ полосы лаврентьевскихъ породъ шире Елохинскаго и, кромѣ названныхъ сланцевъ, содержитъ еще юрскіе осадки, отсутствующіе въ Елохинскомъ перерывѣ. Къ сказанному можно прибавить еще, что здѣсь сравнительно болѣе развиты обломочныя породы съ характеромъ береговыхъ отложеній, какъ напр. аркозы, конгломераты и даже брекчіи, а вторыхъ, что здѣсь имѣли мѣсто изверженія діабазы. Къ сѣверо-востоку отъ Малой Косы лаврентьевскія породы (хлоритовый сланецъ, хлоритовый гнейсъ, роговообманковый гнейсъ, тальковохлоритовый гнейсъ, сіенитъ и т. п.), вполне вытѣсняя собою толщу онотскихъ сланцевъ, интересны еще и въ томъ отношеніи, что въ противоположность господствовавшему до сихъ поръ в.-с.-в.-му простиранію, пласты ихъ обнаруживаютъ здѣсь весьма правильное простираніе на с.-с.-з., слѣдовательно подъ прямымъ угломъ къ нормальному, наданъ вездѣ на в.-с.-в.

На этомъ протяженіи Черскій дѣлалъ экскурсіи къ верховьямъ рѣчекъ Хибелень и Малой Косы, долины которыхъ въ общемъ не отличаются отъ описанныхъ выше горныхъ потоковъ. Источники Хибелена лежатъ на высотѣ 1249, а Малой Косы 1370' надъ уровнемъ Байкала. Особенный

интересъ послѣдняго изъ названныхъ потоковъ состоитъ въ томъ, что въ нижней части котловинообразныхъ верховьевъ можно видѣть, какъ потокъ этотъ вырывается вдругъ изъ подъ осыпи, подъ которою онъ скрывался, въ видѣ струи около 4 футовъ ширины, выносящей уже и мелкую гальку, которую онъ успѣлъ образовать, протекая подъ грудю острореберныхъ обломковъ скалъ (сравни описаніе котловинъ бухты Заворотной и Кедровыхъ потоковъ).

Котельниковскій мысъ, ограничивающій описываемую часть побережья Байкала съ сѣверо-востока, принадлежитъ къ выступамъ береговой линіи, всего болѣе вдающимся въ озеро и интересенъ по находящемуся на немъ горячему ключу; въ тому же въ конфигураціи его впервые начинается проявляться особенность, свойственная Приморскому хребту на сѣверо-востокъ отъ этого мыса, профиль котораго наблюдается всего лучше съ южной стороны, т. е. съ бухты Бургунду. Отсюда видно, что отъ крутаго склона хребта отдѣляется длинный (до 3 верстъ) и лѣсистый, неправильно террасовидный, горный отрогъ, который, возвышаясь по видимому отъ 400 до 300' надъ озеромъ, образуетъ собою высокую часть Котельниковскаго мыса и опускается крутымъ и утесистымъ склономъ къ югу, т. е. къ бухтѣ Бургунду. Между тѣмъ къ восточному концу отрога примыкаетъ низменная, наносная часть мыса, образующая его оконечность, которая въ свою очередь достигаетъ около 2 верстъ длины. Кромѣ долинокъ, нѣсколько расчленяющихъ высокую часть мыса около ея основанія, долина рѣчки Хюрхюрд (неправильно «Куркира» у Георги), низвергающейся шумнымъ каскадомъ въ Байкалъ, пересѣкаетъ ее и ближе оконечности, вслѣдствіе чего послѣдняя, при взглядѣ на мысъ съ южной стороны, является нѣсколько обособленною, по типу горообразныхъ отроговъ и мысовъ. Большая часть южнаго склона этого отрѣзка Котельниковскаго мыса опускается крутыми утесами, почти непосредственно омываемыми

воду; въ нихъ обнажаются различныя видоизмѣненія гнейса (роговообманковый, слюдянороговообманковый, желѣзистый, есть даже пироксеновый), который ближе къ наносной части мыса принимаетъ порфировидное строеніе отъ кристалловъ полевого шпата, достигающихъ иногда 30 миллим. въ діаметръ. Простираніе пластовъ и здѣсь еще с.-с.-з., съ паденіемъ на в.-с.-в. Сильная гроза и начавшійся юго-западный вѣтеръ заставили Черскаго скорѣе обогнуть эту часть мыса, чтобы пристать къ болѣе безопасной, наносной его оконечности, гдѣ предполагался къ тому-же осмотръ находящагося тамъ термальнаго источника. Оконечность эта оказалась усѣченною въ направленіи вообще съ юга на сѣверъ и достигаетъ болѣе двухъ (около 3-хъ) верстъ ширины; она, какъ и большая часть наносныхъ площадей около Байкала, состоитъ изъ болѣе древняго отложенія, возвышающагося ближе къ береговой линіи до 10' надъ озеромъ и болѣе или менѣе поросшаго лѣсомъ, въ особенности густымъ ближе къ горамъ, а затѣмъ изъ окаймляющаго его новѣйшаго прибойнаго матеріала, который образуетъ собою и болѣе низменные площади мыса, вдающіяся вглубь между размытыми частями болѣе древняго отложенія. Горячій ключъ располагается въ полутора верстахъ къ сѣверу отъ южнаго угла оконечности и въ 21-й сажени къ западу отъ береговой линіи, вглубь наносной площади мыса. Радде нашелъ его по видѣвшемуся съ отдаленія столбу выдѣляемыхъ источникомъ паровъ, но такъ какъ явленіе это связано съ извѣстнымъ состояніемъ атмосферы и напр. въ бытность Черскаго такихъ паровъ вовсе не замѣчалось, а существовавшія до тѣхъ поръ описанія мѣстоположенія источника отличались сбивчивостью, то поэтому мы заимствуемъ у Черскаго <sup>1)</sup> нѣкоторыя, необнародованныя имъ подробности по этому вопросу.

Наносная оконечность Котельниковскаго мыса усѣчена не

---

<sup>1)</sup> Черскій, Рукописныя замѣтки о Сибири.

прямолинейно, а напротивъ представляетъ нѣсколько плоскихъ и небольшихъ бухтовидныхъ выемокъ. Если не считать одну изъ нихъ, врѣзавшуюся въ самый южный уголъ оконечности мыса, то первую бухточку можно легко отличить по находящемуся въ самой глубокой ея части, лагуновидному озеру (Котельниковское озеро), отдѣленному отъ Байкала только новѣйшимъ прибойнымъ валомъ въ нѣсколько сажень ширины. Въ слѣдующей за нею, второй бухтовидной выемкѣ наносный берегъ сначала возвышается до 10' надъ Байкаломъ и на высотѣ его построено маленькое рыбацье зимовье, въ родѣ бурятской юрты, посѣщаемое по временамъ бурятами; въ немъ пріютилась и экспедиція Черскаго, спасаясь отъ застигшаго его волненія и грозы. Далѣе въ той-же бухточкѣ берегъ опять понижается и дѣлается безлѣснымъ, а ближе къ сѣверной ея оконечности находится искомый ключъ съ ясно выраженнымъ, хотя и небольшимъ русломъ, отводящимъ его къ Байкалу. Главный термальный источникъ располагается не болѣе какъ въ 30 саженьяхъ на западъ-сѣверо-западъ отъ устья русла, считая по прямому направленію и около 37 сажень, считая вверхъ по колѣнчато-изогнутому руслу, въ которое, съ правой стороны, впадаютъ еще два холодныхъ ключа съ юго-запада, въ разстояніи 6-ти (нижній) и 16-ти (верхній холодный ключъ) отъ устья въ Байкалъ. Около самаго устья общаго русла, съ лѣвой стороны, на берегу озера открывается еще одинъ, второстепенный термальный ключъ, а въ 10 саженьяхъ сѣвернѣе, на томъ же берегу, находится еще другой такой же. Вся низменная площадь, на которой открываются эти источники, образуется галькою вообще крупныхъ размѣровъ (гнейсы, сіенито-гранитъ, порфиръ, роговообманковый сланецъ) на пространствѣ до нѣсколькихъ десятковъ сажень въ сторону, покрыто лишь очень скудною растительностью, въ особенности ближе къ мѣсту выхода ключей и около русла, гдѣ можно видѣть одни лишь мелкія и рѣдкія травянистыя растенія, и только въ разстояніи 30 — 40' произрастаютъ

*Anthriscus*, *Isatis*, *Galeopsis* и другія. Температуру главнаго источника въ 8 часовъ вечера (21 іюля) Радде нашелъ равною  $55,5^{\circ}$  Р., а на слѣдующій день утромъ  $55,3^{\circ}$  Р. Что-же касается температуры упомянутыхъ выше двухъ второстепенныхъ, то она значительно ниже и измѣнчива отъ примѣси воды изъ холодныхъ ключей. Вода главнаго источника, являющагося самымъ горячимъ изъ всѣхъ извѣстныхъ на берегу Байкала (см. ниже юго-восточный берегъ озера) издаетъ весьма замѣтный запахъ сѣрнистаго водорода и покрываетъ серебряную монету черною плѣнкою сѣрнистаго соединенія; кусокъ свѣжей и сырой рыбы, брошенный Черскимъ въ источникъ, побѣлѣлъ уже спустя 3 минуты, а послѣ 10 минутъ мясо ея свободно отдѣлялось отъ кости и не теряло бѣлаго цвѣта даже послѣ охлажденія, въ противоположность опытамъ Георги, который, впрочемъ, опредѣлялъ температуру этого ключа не ниже дѣйствительной ( $160^{\circ}$  Фаренгейта). Окружающая мѣстность отличается болотистымъ характеромъ и на разстояніи до 20 и болѣе сажени отъ источника до того нагрѣта, что снѣгъ таетъ здѣсь даже зимою и нѣкоторая прилежащая часть Байкала вовсе не замерзаетъ; охлаждаются только верхнія гальки, а слой, лежащій непосредственно подъ ними, всегда теплый. Главный источникъ обведенъ разрушающимся уже впрочемъ срубомъ; вблизи отъ него стоитъ столь-же вѣтхій крестъ, а въ нѣкоторомъ отдаленіи, островъ бывшей здѣсь нѣкогда тунгусской юрты. Галька около самаго источника покрыта осадкомъ бѣлой соли, которая, какъ и вода ключа, до сихъ поръ никѣмъ еще не подвергнута подробному химическому анализу.

На этомъ мысѣ изливается въ Байкалъ и соименная, т. е. Котельниковская рѣчка, устье которой, расположенное на южной сторонѣ наносной части мыса, оказалось совершенно сухимъ, не смотря на то, что въ предѣлахъ гористой части мыса рѣчка издавала шумъ, слышанный Черскимъ даже около горячаго ключа ( $1\frac{1}{2}$  версты). Длину



этого мощнаго горнаго потока Георги, со словъ тунгусовъ, опредѣляетъ въ 4 дня ѣзды, что, по мнѣнію Черскаго, никакъ не слѣдуетъ считать равнозначущимъ 120 верстамъ, а скорѣе 30 или 40, а Радде считалъ долину эту повидимому не длиннѣе 12 верстъ. Во всякомъ случаѣ никто еще не проникалъ вглубь этой долины и не доходилъ до ея верховьевъ.

## 7) Берегъ Байкала отъ Котельниковскаго мыса до сѣверо-восточной оконечности озера.

Отъ Котельниковскаго мыса до такъ называемаго Душ-качанскаго устья р. Верхней Ангары, т. е. до сѣверо-восточной оконечности Байкала, остается всего лишь 83 версты, если считать по прямому направленію къ с.-с.-в., но такъ какъ береговая линія представляетъ здѣсь мѣстами довольно значительные изгибы, то длину ея необходимо считать не менѣе 100 верстъ. На протяженіи первыхъ 35 верстъ отъ Котельниковскаго мыса береговая линія озера отличается вообще слабымъ развитіемъ. Не считая первой, довольно значительной, Горячинской бухты (до 8 верстъ въ хордѣ), ограниченной Толстымъ мысомъ, берегъ, на протяженіи слѣдующихъ 10 верстъ, черезъ долину Гѹ-елга, немногимъ уклоняется отъ прямой линіи и только далѣе слѣдуетъ рядъ небольшихъ бухточекъ: Буркѣнъ, Кивилѣй, Бѣрла, Горемыкинская и наконецъ Жаржантъ, ограниченная острововиднымъ мысомъ Лѹдарь (у бурятъ Нѹдарь). За этимъ послѣднимъ береговая линія значительно выгибается къ сѣверо-западу, образуя большую и сложную бухту, которую, въ общемъ, можно было-бы назвать Слюдяною; длина хорды этого изгиба, отъ мыса Лударь до мыса Курлы, лежащаго къ сѣверо-востоку отъ перваго, равняется 35 верстамъ, тогда какъ въ прибрежье бухта эта врѣзывается на 9 верстъ съ лишнимъ. Въ предѣлахъ этого изгиба находится цѣлый

рядъ какъ малыхъ, такъ обширныхъ и глубоко врѣзавшихся, весьма живописныхъ бухтъ, что въ особенности относится къ первымъ тремъ небольшимъ бухточкамъ, а именно: Лударь съ мысомъ Красный яръ, Балтаханова съ мысомъ Богучанскимъ или Зорѣкъ-шулунъ, и Богучанская съ ограничивающимъ её Тонкимъ мысомъ или Нарынъ-хушунъ. Далѣе слѣдуютъ уже болѣе обширныя и болѣе открытыя бухты: Слюдяная (до 6 верстъ), Уногочанъ (4½ верстъ), Чаньгда (10 верстъ въ хордѣ), Кѣтики (10 верстъ), а наконецъ незначительная бухточка Шиваканъ около самаго мыса Кѣрлы. Отъ этого послѣдняго остается всего лишь 12 верстъ до Душкчанскаго устья р. Верхней Ангары, на протяженіи которыхъ берегъ образуетъ въ сущности только одну плоскую бухту, слегка раздвоенную небольшимъ мысовиднымъ выступомъ за долиною Чины.

Уже изъ описанія Георги мы знаемъ, что къ сѣверу отъ Бургунду, т. е. основанія Котельниковскаго мыса, высокій снѣжный хребетъ направляется болѣе къ сѣверо-западу и постепенно удаляется отъ Байкала, обстоятельство, усматриваемое также и изъ дневника Радде. Наконецъ, у Черскаго мы находимъ, что Приморскій хребетъ, начиная съ бухты Бургунду и основанія Котельниковскаго мыса, дѣлаетъ значительный и болѣе или менѣе дугообразный отворотъ отъ береговой линіи озера, удаляясь отъ нея на разстояніе повидимому около 15 верстъ, послѣ чего опять приближается непосредственно къ долинѣ Байкала только въ ближайшихъ окрестностяхъ сѣверо-восточной оконечности озера и въ предѣлахъ дельты Верхней Ангары. Высшій гребень хребта на всемъ этомъ протяженіи сохраняетъ болѣе или менѣе ясно выраженный альпійскій характеръ и только въ сѣверо-восточной части изгиба ему свойственны болѣе тупыя и какъ бы округленныя вершины. Что-же касается промежутка между отступившимъ хребтомъ и берегомъ Байкала, то весь онъ занятъ цѣлымъ ря-

домъ второстепенныхъ отроговъ, въ общемъ понижающихся къ озеру и повидимому не превышающихъ 800—1000' надъ уровнемъ Байкала. При взглядѣ на мѣстность съ нѣкотораго отдаленія, напр. съ парохода, идущаго въ разстояніи около 10 верстъ отъ берега, отроги эти сливаются въ предгорье съ почти горизонтальнымъ и болѣе или менѣе прямолинейнымъ верхнимъ контуромъ, такъ-что путешественникъ видитъ передъ собою какъ бы обширную и длинную террасу, вѣрнѣе высокую террасовидную площадь, съ одной стороны омываемую Байкаломъ, а съ другой (къ сѣверо-западу) примыкающую къ крутому склону соотвѣтственно отступившаго, высшаго гребня Приморскаго хребта. Въ разстояніи около 22 верстъ къ с.-с.-в. отъ мыса Котельниковскаго, въ промежуткѣ между долинами Бурянь и Кивилей, довольно однообразная высота этой площади нарушается сравнительно уединенною и потому какъ бы острововидною горою Кивилей, заостренная вершина которой, достигающая повидимому около 1500—1800' высоты, виднѣется даже съ бухты Бургунду, изъ-за горъ, слагающихъ высшую часть Котельниковскаго мыса; болѣе высокою нежели общій уровень предгорья, съ заостренною же вершиною и до нѣкоторой степени уединенною, кажется также гора на правомъ берегу устья р. Слюдяной, но она все-таки гораздо ниже Кивилея. При взглядѣ на ту-же террасовидную площадь съ нѣкоторыхъ, болѣе близкихъ къ берегу пунктовъ, можно видѣть мѣстами какъ бы поперечное къ образующимъ её отрогамъ, слѣдовательно, параллельное къ озеру, ея расчлененіе, что зависитъ отчасти отъ притоковъ нересѣкающихъ её рѣчекъ (см. ниже), отчасти-же и отъ законовъ перспективы, благодаря которымъ видимыя отсюда высшія части этой площади столь-же рѣзко отдѣляются отъ выдающагося изъ за нихъ гребня Приморскаго хребта, какъ и отъ болѣе низкихъ и болѣе расчлененныхъ оконечностей тѣхъ-же отроговъ около самаго Байкала. Соображеніями этими объясняется, почему Радде говорить о существованіи здѣсь трехъ, парал-

лельныхъ Байкалу горныхъ цѣпей, постепенно повышающихся по направленію къ сѣверо-западу: по замѣчанію Черскаго, отъ котораго мы заимствуемъ это описаніе<sup>1)</sup>, при взглядѣ на сѣверъ, напр. съ нѣкотораго разстоянія отъ Горемыкинской бухты, цѣлый рядъ болѣе низкихъ и длинныхъ мысовъ (Красный Яръ, Богучанскій и Тонкій) сливается дѣйствительно какъ бы въ предполагавшуюся нисшую цѣпь горъ; за нею возвышается болѣе высокая часть площади въ роли средней цѣпи, а вдали, на горизонтѣ, обрисовывается еще покрытый мѣстами снѣгомъ, высшій гребень Приморскаго хребта. Оконечности всѣхъ этихъ отроговъ подступаютъ къ береговой линіи озера, обуславливая все разнообразіе прибрежнаго ландшафта. Такъ напр. между Котельниковскимъ мысомъ и бухтою Горемыки отчасти скалистый, отчасти-же поросшій, крутой склонъ этихъ горъ омывается почти непосредственно водою, пріобрѣтая вообще узкую к а р г у и вообще наносныя площадки только около устья пересѣкающихъ этотъ склонъ, небольшихъ долинокъ, изъ которыхъ: Г у - е л г а съ соименнымъ ключемъ Б у р к а н т (у Георги «Борка») и К и в и л е й (у Георги «Ковали»), являются самыми значительными. Такимъ, почти непосредственно омываемымъ водою, является массивной и тяжелой структуры Толстый мысъ (у бурятъ Х а н д а т ь), ограничивающій Горячинскую бухту съ сѣвера и принадлежащій къ типу обыкновенныхъ горныхъ мысовъ. Обширная (до 7 верстъ со стороны озера), низменная и наносная площадь прерываетъ собою такой высокій берегъ въ предѣлахъ бухтъ Горемыкинской и Жаржантъ. Площадь эта соотвѣтствуетъ общимъ низовьямъ долинъ рѣкъ: Г о р е м ы к и или Т а л о й, притекающей почти съ запада и Р е л и, съ сѣверо-запада, хотя устья ихъ, снабженные рукавами, удалены другъ отъ друга почти на 1 версту, причемъ дельта р. Рель отдѣляетъ собою Горемыкинскую бухту отъ бухты Жаржантъ. На этой площади, по рѣчкѣ

<sup>1)</sup> Черскій, Рукописныя замѣтки о Сибири.

Талой, въ разстояніи около 1 версты отъ берега озера, находится небольшое русское поселеніе, называемое Горемыки, а на лѣвомъ берегу р. Рель, другое, именуемое Жаржанта; въ обоихъ, во времена Радде, проживали только 4 семейства, въ количествѣ 30 душъ. Кромѣ рыбнаго промысла жители занимаются здѣсь хлѣбопашествомъ и огородничествомъ; въ хорошій урожай рожь даетъ имъ отъ 7 до 9 зеренъ съ одного колоса. Осенью и зимою они не опускаютъ изъ виду и звѣриный промыселъ, главнымъ образомъ бѣличій, а отчасти и соболиный. Рожь созрѣваетъ здѣсь и жнется обыкновенно къ 15 августу, а яровой хлѣбъ къ 1-му сентября. Въ половинѣ августа выкапывается и картофель; капусты воздѣлываютъ немного, а лукъ вовсе не садятъ, хотя этимъ не доказывается еще, чтобы онъ не могъ здѣсь произрастать. Кромѣ русскихъ здѣсь-же проживаютъ и буряты, лѣтнія юрты которыхъ находятся также въ упомянутой выше долинѣ Бурканъ и въ другой, ближайшей съ сѣвера къ Гу-елга, названіе которой осталось неизвѣстнымъ. Рѣчка Рель достигаетъ по словамъ мѣстныхъ жителей около 35 верстъ длины; вверхъ по ней, какъ мы увидимъ ниже, прошелъ въ 1857 г. Усольцевъ, одинъ изъ членовъ Сибирской экспедиціи, математическій отдѣлъ которой состоялъ подъ начальствомъ астронома Шварца. Есть основанія полагать, что Георги описывалъ эту рѣчку, называя ея Горемыкинскою; съ этимъ согласуются упоминаемые имъ три рукава устья и маленькое озерко (собственное расширеніе) около праваго рукава, а также и многоводность этой рѣчки, среднее устье которой, благодаря быстротѣ, образуетъ на Байкалѣ длинный слѣдъ, постепенно слабѣющій и исчезающій въ послѣдствіи; между тѣмъ названіе «малый ручей Иреле» относилось у Георги, по всей вѣроятности, къ Горемыкѣ.

Деревня «Горемыки при Байкалѣ», по опредѣленію Шварца, лежитъ подъ 55°21' сѣв. шир. и 126°51' вост. долготы, только, къ сожалѣнію, изъ приведеннаго названія нельзя еще заключить съ увѣренностью, относится ли это опредѣ-

леніе къ Жаржантскому поселенію или къ собственно Горемыкинскому, такъ какъ оба они извѣстны обыкновенно подъ общимъ именемъ Горемыкъ; ближе къ озеру, между тѣмъ, какъ сказано выше, располагается Жаржантъ, а не Горемыки. Небезынтересною въ орографическомъ отношеніи является часть побережья между лѣвымъ берегомъ р. Рель и Слюдяною бухтою. Произведенныя здѣсь экскурсіи убѣдили Черскаго въ томъ, что низкіе (отъ 100 до 500') отроги, вытянутые здѣсь почти съ запада на востокъ и образующіе своими оконечностями упомянутый выше рядъ мысовъ (Красный Яръ, Богучанскій, Тонкій и находящійся между двумя послѣдними, Средній мысъ), не соединяются съ остальною частью горъ прибрежной площади, а напротивъ, отдѣляются отъ нихъ такими же наносными низменностями, какими они окружены и съ боковъ, вслѣдствіе чего, отроги эти, не взирая на длину ихъ, достигающую иногда 3-хъ верстъ и болѣе, являются все-таки уединенными, т. е. острововидными, что равнымъ образомъ относится еще и къ другимъ двумъ горамъ, болѣе удаленнымъ отъ Байкала. Основываясь на составѣ этихъ отроговъ изъ тѣхъ-же кристаллическихъ породъ, какъ и ближайшая къ нимъ часть горъ, а также на характерѣ долинъ, отдѣлившихъ ихъ отъ описанной высокой террасовидной площади, Черскій полагаетъ, что въ образованіи такихъ обособленныхъ отроговъ, вѣрнѣе, въ процессѣ обособленія ихъ, должны были участвовать не проточныя, а озерныя воды, разрушая прибоемъ волнъ прежнюю связь этихъ отроговъ точно также, какъ это имѣетъ мѣсто въ процессѣ образованія острововъ изъ удлинненныхъ мысовъ (см. выше описаніе острова Ольхона). Древній озерный наносъ, образующій всю болѣе низменную площадь, на которой возвышаются нынѣ эти уединенныя горы, можетъ служить лишь подтвержденіемъ такому воззрѣнію, между тѣмъ какъ знакомая намъ уже значительная высота, до которой долженъ былъ достигать уровень Байкала въ болѣе отдаленное (послѣтретичное) время,

дѣлаетъ весьма вѣроятнымъ даже предположеніе, что и вся высокая террасовидная площадь этой мѣстности могла въ то время заливаться водою, вплоть до отступившаго здѣсь вышшаго гребня Приморскаго хребта, причемъ, разумѣется, гора Кивилей должна была играть роль острова. Результатомъ неравномѣрнаго размыва прежняго продолженія одного изъ описанныхъ мысовъ, является очевидно и глинистый островъ Богучанъ, извѣстный отчасти еще со временъ Георги. Островъ этотъ, посѣщенный Черскимъ 25-го іюля 1880 г., располагается въ 2 верстахъ къ востоку отъ самой глубокой части соименной бухты, какъ бы на прямомъ (восточномъ) продолженіи упомянутаго выше Средняго мыса. При незначительной длинѣ (менѣе версты) и высотѣ, достигающей 153' надъ Байкаломъ, онъ вытягивается и возвышается съ запада на востокъ, гдѣ вмѣстѣ съ тѣмъ и расширяется, оканчиваясь крутымъ, почти усѣченнымъ, слегка округленнымъ склономъ, тогда какъ заостренная и низменная западная оконечность его пѣскольно загибается къ сѣверо-западу. Слѣдуя вдоль по безлѣсной средней линіи острова, можно видѣть, что, по направленію къ восточной оконечности, онъ возвышается тремя, достаточно рѣзко развитыми, террасовидными уступами, изъ которыхъ первый располагается на высотѣ 44, второй 96 — 117, а третій, т. е. высшій пунктъ на высотѣ 153' надъ озеромъ. Георги восхищался красотою этого острова, называя его прелестнѣйшимъ изъ уголковъ Байкала, хотя онъ незнакомъ былъ лично съ другими островами, именно съ лежащими около юго-восточнаго берега озера. Эти послѣдніе между тѣмъ, по замѣчанію Черскаго, значительно превосходятъ въ этомъ отношеніи Богучанскій, болѣе красивою частью котораго является только очень крутой и скалистый восточный склонъ, утесистые уступы котораго живописно украшены кустами и смѣшанною древесною растительностью; вообще же на островѣ преобладаетъ лиственница. Ландшафтъ этотъ, въ бытность Черскаго, украшался еще четырьмя домашними козами, оставленными здѣсь,

для безопасности, однимъ изъ бурятъ окрестностей Горемыкъ.

Остальная часть побережья озера отличается развитіемъ довольно значительныхъ низменныхъ, наносныхъ площадей, образующихъ мысъ р. Слюдяной (у Радде Гурубиха) и еще болѣе обширный мысъ Котиковъ (у Радде Ботиганъ), съ устьемъ довольно длинной и многоводной рч. Тѣи. Далѣе отъ рч. Чины узкое наносное побережье начинается постепенно расширяться черезъ устья рр. Тѣшки и Молокѣна, начиная съ котораго низменный берегъ поворачиваетъ уже къ юго-востоку, къ Душкчанскому устью Верхней Ангары.

О геогностическомъ строеніи описанной части побережья Черскій сообщаетъ, что между Котельниковскимъ мысомъ и Слюдяною бухтою развиты, главнымъ образомъ гнейсъ, гранито-гнейсъ, сіенито-гранитъ и слюдяно-хлоритовый сланецъ, переходящій въ гнейсъ (Гу-елга, Бурканъ); между тѣмъ, начиная съ Слюдяной бухты и отчасти съ Тонкаго мыса и острова Богучанъ, развиты роговообманковые, плагіоклазовые гнейсы, переходящіе въ діоритовые сланцы и даже діоритъ, наконецъ, между устьемъ рч. Чины и оконечностью Байкала опять появляется гранито-гнейсъ, переходящій въ гранитъ. Въ стратиграфическомъ отношеніи особенный интересъ представляетъ то обстоятельство, что вслѣдъ за описаннымъ выше, с.-с.-з.-мъ простираніемъ пластовъ, наблюдавшимся въ промежуткѣ между Малою Косою и Котельниковскимъ мысомъ, сейчасъ же за послѣднимъ, т. е. въ Горачинской бухтѣ, Черскимъ встрѣчена небольшая область неправильнаго простиранія гнейса, измѣнявшагося отъ с.-с.-з., черезъ с. и с.-в. до в.-с.-в. (паденіе вездѣ въ сторону Байкала, т. е. в.-с.-в., в., ю.-в. и ю.-ю.-в.), какъ будто мѣстность эта соотвѣтствовала изгибу и переходу отъ прежняго с.-с.-з.-го простиранія къ нормальному, в.-с.-в.-му. Такое предположеніе вполне подтверждается остальною частью прибрежныхъ горъ, въ которой, начиная съ Гу-елга и до оконеч-



ности озера, вездѣ опредѣлялось одно лишь в.-с.-в. простирание пластовъ съ паденіемъ, сначала на с.-с.-в. (Гу-елга, Бурканъ), а далѣе на ю.-ю.-в. По образцамъ породъ, доставленнымъ Черскому съ системы рч. Тыи (Котики), гдѣ по рч. Кавынахъ, впадающей въ Нерундиканъ (лѣв. притокъ Тыи), разрабатывается небольшой золотой приискъ, оказалось, что тамъ, гдѣ либо, долженъ выступать и кристаллическій доломитъ, свойственный, какъ извѣстно, только верхнему ярусъ здѣшней лаврентьевской толщѣ породъ. Осмотръ добытыхъ оттуда образцовъ золота убѣждаетъ Черскаго въ томъ, что металлъ этотъ находится тамъ отчасти въ кварцѣ, отчасти въ хлоритовомъ сланцѣ, а также и въ колчеданѣ, превратившемся уже въ бурый желѣзнякъ.

#### 8) Свѣдѣнія о сѣверо-западномъ склонѣ Прибайкальскихъ горъ въ промежуткѣ между верхнимъ теченіемъ р. Лены и сѣверо-восточною оконечностью Байкала. Система р. Киренги.

Изъ предшествовавшаго описанія горъ сѣверо-западнаго берега долины Байкала мы видѣли, что къ юго-западу отъ верховьевъ рѣки Лены, онѣ многократно пересѣкались маршрутами ученыхъ путешественниковъ, благодаря которымъ о характерѣ этихъ горъ мы могли составить довольно точное понятіе. Между тѣмъ состояніе нашихъ свѣдѣній о сѣверо-восточномъ продолженіи описанныхъ хребтовъ, слѣдуетъ считать еще неудовлетворительнымъ въ этомъ отношеніи. Въ противоположность переданнымъ выше, достаточно подробнымъ изслѣдованіямъ юго-восточнаго склона Приморскаго хребта на интересующемъ насъ протяженіи, мы вовсе незнакомы, во-первыхъ, съ сѣверо-западнымъ его склономъ, а во-вторыхъ, до сихъ поръ еще неизвѣстно, сопровождается ли хребетъ этотъ здѣсь другимъ, Онотскимъ, или же послѣдній исчезаетъ къ востоку отъ меридіана соединенія верховьевъ

Лены съ рч. Арбунъ, и, еслибы не маршруты Крыжина и Усольцева по системѣ р. Киренги (1857 г.), мы не имѣли бы даже точнаго понятія объ общей ширинѣ этой полосы горъ. Такимъ образомъ, для пополненія переданныхъ выше свѣдѣній въ этомъ отношеніи, мы воспользуемся описаніемъ маршрутовъ названныхъ членовъ Сибирской экспедиціи 1855—58 гг. <sup>1)</sup>, какъ равно и съемками ихъ, нанесенными на извѣстную карту астронома Шварца, причемъ не оставимъ безъ вниманія и упоминавшіяся нами, рукописныя замѣтки Черскаго, въ которыхъ тѣ-же данныя разсматриваются въ связи съ описаннымъ выше юго-восточнымъ склономъ Приморскаго хребта <sup>2)</sup>).

Преслѣдуя въ нашемъ изложеніи намѣченный Риттеромъ планъ, мы должны были бы въ настоящей главѣ разсмотрѣть теченіе р. Киренги только до выхода ея въ предѣлы плоской возвышенности, какъ мы это дѣлали съ Ангарой и Леной, посвятивъ слѣдующую часть дополненій разсмотрѣнію плоской возвышенности, но въ виду немногочисленныхъ свѣдѣній о р. Киренгѣ, чтобы сохранить цѣлость описанія, мы нѣсколько отступимъ отъ плана и опишемъ здѣсь все теченіе Киренги.

И такъ мы знаемъ теперь, что сѣверо-западный склонъ Прибайкальскихъ горъ, на интересующемъ насъ протяженіи, орошается системою какъ верховьевъ, такъ затѣмъ правыхъ притоковъ р. Киренги, извѣстнаго праваго притока р. Лены, причемъ таже Киренга орошаетъ собою и сѣверо-западное подножье этихъ горъ, отдѣляя ихъ, какъ мы увидимъ ниже, отъ плоской возвышенности. Киренга беретъ начало надалеко

---

<sup>1)</sup> Труды Сибирской Экспедиціи И. Р. Географич. Общества. Математич. отдѣлъ. СПб. 1864 г.

<sup>2)</sup> Въ самое послѣднее время желѣзнодорожныя развѣдки между Ангарой и Байкаломъ, произведенныя подъ руководствомъ полковника Волошинова, коснулись долины р. Киренги, однако полный отчетъ развѣдочной партіи еще не опубликовать, предварительный же отчетъ (Изв. В. Сиб. Отд. И. Р. Г. О. т. XX № 5) представляетъ очень мало новыхъ свѣдѣній относительно интересующей насъ рѣки.

отъ верховьевъ р. Лены и вблизи Байкала. Она составляется изъ двухъ рѣчекъ, почти одинаковой длины: Тѡнгода и собственно р. Киренги. Рч. Тѡнгода, около 65 верстъ длины, въ лицѣ своего лѣваго верховья, извѣстнаго подѣ названіемъ Талакакты (на картѣ Шварца: Талакактай), беретъ начало всего лишь въ нѣсколькихъ верстахъ къ сѣверо-востоку отъ мѣста, гдѣ знакомая намъ уже, самая верхняя (параллельная Байкалу) часть теченія р. Лены поворачиваетъ къ сѣверо-западу, принявъ съ правой стороны рч. Арбунъ и еще одинъ, безымянный притокъ. Слѣдуя вверхъ по этому послѣднему, по увѣренію тунгуса, сопровождавшаго Черскаго къ источникамъ Лены, можно перейти прямо къ верховьямъ Талакакты, вслѣдствіе чего можно полагать, что нѣкоторая часть этой рѣчки протекаетъ на с.-в.-мъ продолженіи той же продольной долины, въ которой беретъ начало р. Лена. Отсюда Тѡнгода придерживается с.-с.-з.-го направленія по указанной выше своей длинѣ, до сліянія съ правою вѣтвью, т. е. съ собственно Киренгою. Эта послѣдняя беретъ начало около 25 верстъ къ сѣверо-востоку отъ Талакакты, верстахъ въ 10—12 отъ Байкала, въ промежуткѣ между верховьями знакомыхъ намъ уже байкальскихъ рѣчекъ: Кедровой (1-й 2-й) и Ледяной. Источники ея, на картѣ Шварца, изображаются въ видѣ двухъ незначительныхъ вѣтвей, между которыми располагается озеро. Обстоятельство это, по замѣчанію Черскаго, необходимо имѣть въ виду будущимъ изслѣдователямъ, какъ стоящее въ связи съ вопросомъ о возможномъ здѣсь продолженіи долины, отдѣляющей Приморскій хребетъ отъ Онотскаго. Отсюда Киренга направляется въ общемъ къ сѣверо-западу до мѣста впаденія въ нее Тонгоды, на пути къ которой означены еще два небольшихъ лѣвыхъ притока, съ озеркомъ въ верховьяхъ нижняго изъ нихъ.

Послѣ сліянія съ Тонгодой, Киренга протекаетъ верстъ 28—30 въ западномъ направленіи, къ повороту на сѣверо-востокъ, и на пути этомъ она принимаетъ съ лѣвой сто-

роны небольшія рѣчки: Тюкаланъ съ правымъ притокомъ, называемымъ Ковылей (можетъ быть Ковылѣй?), затѣмъ Берей, а наконецъ, на мѣстѣ упомянутого выше поворота въ нее впадаетъ значительная рѣчка Шона. Шона достигаетъ болѣе 90 верстъ длины; она беретъ начало въ 40 верстахъ къ с.-в.-ку отъ р. Лены, вблизи верховьевъ рч. Малой (Ленской) Анги, праваго притока Большой (Ленской) Анги, впадающей въ рѣку Лену съ правой стороны, около с. Качугъ ( $53^{\circ}57'25''$  сѣв. ш. и  $123^{\circ}31'56''$  вост. долг. по Шварцу), ниже знакомой намъ рч. Бирюльки, куда спустились въ свое время Меглицкій и Черскій, переваливъ съ Онгурена на Чанчеръ и Лену. Образуюсь изъ двухъ верховьевъ: Шевыканъ (лѣваго) и Тончихи (праваго), Шона направляется на с.-с.-в., къ своему устью, въ 20 верстахъ выше котораго въ нее впадаетъ правый притокъ (безъ названія на картѣ), берущій начало въ промежуткѣ между Тонгодою и верхнимъ теченіемъ р. Лены. Отъ устья Шоны, извилистое теченіе р. Киренги придерживается въ общемъ с.-с.-в.-го направленія, на протяженіи болѣе 220 верстъ, считая по прямой линіи, причемъ она не совсѣмъ параллельна Байкалу настолько, что ближайшее разстояніе отъ озера около устья Шоны равняется около 90 верстамъ, а около устья рч. Домукты (см. ниже) на с.-з. отъ устья Душкчанскаго рукава Верхней Ангарты, около 116 верстамъ. Этими цифрами опредѣляется вмѣстѣ съ тѣмъ довольно приблизительно и соотвѣтственно возрастающая къ с.-в., ширина интересующей насъ горной полосы, которая далѣе расширяется еще болѣе, такъ какъ долина Киренги поворачиваетъ въ своихъ низовьяхъ въ общемъ къ с.-с.-з., къ устью въ р. Лену, гдѣ постороненъ городъ Киренскъ ( $57^{\circ}46'36''$  сѣв. шир. и  $125^{\circ}46'54''$  вост. долготы по опредѣленію Шварца). Крыжинецъ, описывавшій и снявшій теченіе р. Киренги, отправился въ путешествіе изъ упомянутого выше села Качуга на Ленѣ, слѣдуя сначала къ востоку, черезъ долину рч. Анги,

и такимъ образомъ достигъ «самыхъ крайнихъ верховьевъ р. Лены, вытекающей вмѣстѣ съ Киренгою изъ Байкальскихъ горъ» <sup>1)</sup>. При описаніи источниковъ Лены (см. выше маршрутъ Черскаго), мы видѣли, однако, что крайнимъ пунктомъ, достигнутымъ Крыжинымъ, слѣдуетъ считать, однако, не настоящее верховье Лены, а мѣсто ея соединенія съ Арбуномъ, не далеко отъ истоковъ Тонгоды, т. е. Талаюкты. Къ крайнему сожалѣнію часть маршрута Крыжина, пролегающая именно по этимъ гористымъ мѣстамъ, не сопровождается описаніемъ ихъ: кромѣ приведенной выше выписки, тамъ сказано только, что вершины «Байкальскихъ горъ» онъ нашелъ свободными отъ снѣга, но въ ущельяхъ лежали еще большія снѣжныя массы, а во-вторыхъ, что, начиная съ верховьевъ Киренги, Крыжинъ повернулъ къ сѣверо-западу и прошелъ въ нѣкоторомъ отдаленіи отъ долины Киренги до устья описанной выше рч. Шоны, гдѣ располагается уже соименная деревня, первый заселенный пунктъ по этой рѣкѣ (т. е. Киренгѣ). Отсюда долина Киренги населена уже какъ русскими, такъ и инородцами и сообщеніе между деревнями производится уже водою. Кромѣ того имѣется еще и другой путь внизъ по рѣкѣ, горами между Киренгою и почти параллельной здѣсь Леною, но дорога эта, какъ говорятъ, въ высшей степени затруднительна, а такъ какъ съ цѣлью этого путешествія было сообразнѣе посѣтить обитаемые мѣста, лежащія здѣсь единственно по берегамъ Киренги, то Крыжинъ избралъ водный путь, и въ небольшой лодкѣ направился внизъ по теченію рѣки до ея устья въ р. Лену. На протяженіи около 18 верстъ отъ Шоны до рч. Мурунь, берега Киренги оказались низкими и болотистыми: изрѣдка къ рѣкѣ подступаютъ высокіе мысы (оконечности горныхъ отроговъ?), поросшіе травою. На всѣхъ такихъ мысахъ находятся тунгусскія юрты, хозяева которыхъ въ это время кочевали въ

---

<sup>1)</sup> Крыжинъ, Труды Сибирск. Экспедиціи loco cit. стр. 44.

горахъ, гдѣ они охотятся цѣлое лѣто и только осенью возвращаются сюда для рыбной ловли. Упомянутая выше рч. Мѹринъ впадаетъ въ Киренгу съ правой стороны и достигаетъ повидимому около 50 верстъ длины; на ея устьѣ находится Тунгусское стойбище Мѹринъ, съ помѣщеніями, построенными по образцу русскихъ избъ. Отсюда до устья рч. Ханды, на протяженіи около 18 верстъ, горы подходятъ къ Киренгѣ ближе; онѣ покрыты хвойнымъ лѣсомъ, а на мѣстахъ, свободныхъ отъ древесной растительности, находятся великолѣпные сѣнокосы; на пути этомъ, съ правой стороны, впадаетъ маленькая рѣчка Талдѣй. Ханда представляетъ собою одинъ изъ значительнѣйшихъ лѣвыхъ притоковъ Киренги и достигаетъ болѣе 100 верстъ длины. Главная особенность Ханды состоитъ въ томъ, что она протекаетъ въ направленіи (съ с. на ю.), противоположномъ главной своей рѣкѣ и почти параллельно ей, вслѣдствіе чего верховья Ханды располагаются въ разстояніи около 30 верстъ отъ Киренги на широтѣ болѣе сѣверной нежели верховья Верхней Ангары, тогда какъ устье лежитъ приблизительно на одной широтѣ съ знакомымъ термальнымъ ключемъ около Котельниковскаго мыса на Байкалѣ. Ханда беретъ начало изъ озера, лежащаго на болотистой плоской возвышенности, отдѣляющей Киренгу отъ р. Лены и въ верхней своей части протекаетъ еще черезъ цѣлый рядъ другихъ озеръ, изъ которыхъ нижнее, въ разстояніи около 25 верстъ отъ верховьевъ, самое большое. Тунгусы, живущіе по берегамъ верхняго озера, ловятъ въ немъ много (до 500 пуд. ежегодно) рыбы, которая, при замерзаніи Ханды, скопляется въ этомъ водовмѣстилищѣ. Уловъ этотъ сбывается пріѣзжающимъ сюда купцамъ и доставляется даже до г. Киренска. Около устья Ханды, на лѣвомъ берегу Киренги расположена тунгусская деревенька у подошвы горы. Здѣсь въ первый разъ Крыжинъ встрѣтилъ поля, засѣянные хлѣбомъ, хотя и въ небольшомъ количествѣ, такъ-что собираемая съ нихъ жатва

не въ состояніи удовлетворить потребностей даже столь скуднаго здѣсь населенія. На протяженіи слѣдующихъ 20 верстъ извилистое теченіе Киренги направляется въ общемъ на в.-с.-в., причемъ съ правой стороны въ нее впадаютъ рѣчки: Чука, Бугой и третья, съ неизвѣстнымъ названіемъ, а съ лѣвой стороны незначительный ключъ Гилекъ; между хвойнымъ лѣсомъ, покрывающимъ береговья горы, часто встрѣчается лиственница. Сейчасъ же ниже Гилека, на лѣвомъ берегу Киренги, находится довольно значительная деревня Карамъ; здѣсь земледѣліе достигаетъ уже обширныхъ размѣровъ, какъ равно и скотоводство, такъ-что нѣкоторые изъ богатыхъ крестьянъ содержатъ до ста штукъ рогатаго скота. Карамъ важенъ также и какъ мѣсто торговли: когда собственныя жатвы оказываются недостаточными для покрытія потребностей тунгусовъ въ зерновомъ хлѣбѣ, то зимою привозятся сюда большіе запасы хлѣба изъ села Ангинскаго, лежащаго недалеко отъ Качуга на Ленѣ, гдѣ хлѣбопашество развито еще въ большихъ размѣрахъ и хлѣбъ служить главнымъ предметомъ обмѣна на пушнину киренскихъ тунгусовъ. Весною, при высокой водѣ, изъ Карамы можно сплавлять уже внизъ по Киренгѣ и небольшія барки. Деревня эта заселена уже съ 1787 года. Ниже Карамы Киренга поворачиваетъ сначала нѣсколько къ сѣверо-востоку, а затѣмъ, образуя мѣстами довольно значительныя излучины, слѣдуетъ въ общемъ на с.-с.-в., къ устью значительнаго праваго притока, извѣстнаго подъ именемъ Ульканъ (около 100 верстъ ниже Карамы). На этомъ протяженіи съ правой стороны, т. е. съ Прибайкальскихъ горъ въ нее впадаютъ рѣчки: Чука, Бугой, Чурвагинья, Маректа Нуга, двѣ Гариньи и Улянъ, тогда какъ съ лѣвой стороны, то есть съ водораздѣла между Киренгою и описанною выше Хандою, изливаются: Гилекъ, Якчаканъ, Тулуктумуръ, Кункиджа, Тюкаланъ, Водниканъ, Логной, Гарчиканъ, Гирвичъ, Чензорка и Берея. Около устья Тюкалана, на

лѣвомъ берегу Киренги, около 40 верстъ ниже Карамы, находится небольшая деревня Тюкаланъ, а болѣе 30 верстъ далѣе по рѣкѣ, ниже устья Гирвича, другая, называемая Монѣкъ («Мунокъ» на картѣ Шварца); въ нихъ жилища русскихъ поселенцевъ перемѣшаны съ тунгусскими юртами. Что же касается упомянутой выше р. Ульканъ, то она представляетъ собою довольно значительную систему долинъ, собирающихъ воду со всего сѣверо-западнаго склона Прибайкальскихъ горъ, начиная приблизительно съ широтъ, промежуточныхъ между Мужинаемъ и Котельниковымъ мысомъ на Байкалѣ до широтъ, значительно превосходящихъ (т. е. болѣе сѣверныхъ) мѣстоположеніе сѣверо-восточной оконечности озера. Собственно Ульканъ образуется изъ двухъ верховьевъ, изъ которыхъ лѣвое беретъ начало недалеко отъ верховьевъ Байкальскаго Мужиная, а правое вблизи верховьевъ рѣчки Котельниковской. Послѣ соединенія ихъ Ульканъ направляется въ общемъ на с.-с.-з. и, спустя около 55 верстъ, принимаетъ съ правой стороны рѣчку Рель (около 45 верстъ длины), верховья которой являются почти смежными съ источниками байкальской рч. Рель, впадающей въ Горемыкинскую бухту. Внизъ по этой рѣкѣ, въ томъ же 1857 г., спускался Усольцевъ на Ульканъ, переваливъ съ Горемыкинской деревни на Байкалѣ, и вышелъ на Карамъ. Но къ сожалѣнію объ этомъ маршрутѣ упоминается лишь въ самыхъ общихъ чертахъ въ приведенномъ трудѣ Шварца, и потому изъ него нельзя заимствовать никакихъ географическихъ данныхъ. Ниже устья Рели Ульканъ направляется почти къ сѣверу на протяженіи около 25 верстъ, гдѣ принимаетъ съ правой стороны большой притокъ (до 80 верстъ длины), означенный на картѣ Шварца безъ названія и направляющійся съ в.-с.-в. на з.-ю.-з. Наконецъ, ниже его устья, Ульканъ поворачиваетъ къ сѣверо-западу и протекаетъ такъ 20 верстъ до устья въ Киренгу, въ разстояніи около 100 верстъ отъ верховьевъ. По обоимъ сторонамъ устья



Улькана расположена русская деревня Верхне-Ульканская, составляющая сѣверную границу постоянного жительства тунгусовъ по р. Киренгѣ. Послѣ соединенія съ Ульканомъ, Киренга становится настолько широкою и глубокою, что внизъ по ней могутъ плавать уже суда болѣе значительныхъ размѣровъ. На протяженіи слѣдующихъ 80 верстъ до устья рч. Домукты (прав. притокъ), Киренга, протекая въ общемъ почти меридіонально, дѣлаетъ вмѣстѣ съ тѣмъ значительный изгибъ къ западу. На этомъ пути въ нее впадаютъ многіе, хотя и незначительные притоки, какъ-то: Юкта, Горбилѣкъ, Окунайка, Окунева, Хозарка и самая большая Домукта—съ правой стороны, а Балдакинъ, Окукикта (съ лѣвыми притоками Чичикуй и Немака), Мостовая, Уркуканъ, Чедо и Бреачанъ съ лѣвой стороны, причемъ слѣдуетъ замѣтить, что верховья первыхъ двухъ лѣвыхъ притоковъ берутъ начало недалеко отъ источниковъ знакомой намъ уже р. Ханды (см. выше). Около 24 верстъ ниже устья Улькана, на лѣв. берегу Киренги находится деревня Новоселье, лежащая почти на одной широтѣ съ верховьями Ханды и въ 36 верстахъ отъ нихъ, а около 20 верстъ ниже деревня Ключевская, откуда Крыжинъ дѣлалъ экскурсію къ Хандѣ. Далѣе находятся еще деревни: Хазарская, Осиновый лугъ и Качауровская, лежащая уже ниже устья рч. Домукты.

Отсюда Киренга, сначала почти меридіональная, принимаетъ съ правой стороны рч. Миню и поворачиваетъ затѣмъ къ сѣверо-востоку, къ устью другаго довольно значительнаго праваго притока, извѣстнаго подъ названіемъ Черепанихи (съ правымъ притокомъ рч. Дорожной), тогда какъ съ лѣвой стороны въ нее впадаютъ только маленькія рѣчки: Юкта, Черная и Нижняя, отличающіяся очень мутною водою, въ противоположность названнымъ правымъ притокамъ, вытекающимъ изъ высокихъ горъ, которыя служатъ водораздѣломъ между системою Ки-

ренги и рч. Чаи, впадающей въ Лену ниже города Киренска. Кромѣ Качауровской, здѣсь встрѣчены еще деревни: Ермѣкъ, Короткая, Старовѣровская и Шарборщина, лежащая около устья Черепанихи. Крыжинъ сдѣлалъ здѣсь попытку углубиться въ упомянутыя горы и достигнуть верховьевъ рч. Чаи, но въ это время года онъ не нашелъ ни одного проводника, такъ какъ Ангарскіе тунгусы, которые одни только знаютъ туда дорогу, выходятъ на Киренгу только одинъ разъ въ годъ. Поэтому Крыжинъ отправился туда безъ проводника, придерживаясь узкой тунгусской тропы. Онъ слѣдовалъ вверхъ по рч. Черепанихѣ, и ея правому притоку — рч. Дорожной. Рѣчка эта, какъ видно изъ карты Шварца, достигаетъ около 80 верстъ длины, съ верховьями, лежащими къ в.-ю.-в.-ку отъ устья. Крыжинъ дошелъ по ней до такъ называемыхъ гольцовъ, т. е. вершинъ, выходящихъ за вертикальные предѣлы распространенія древесной растительности, и потому голыхъ, но пройти черезъ эти гольцы онъ не отважился, такъ какъ тропа исчезла на каменистой почвѣ. Онъ возвратился поэтому въ Мартыновское, — большое село, лежащее нѣсколько ниже устья Черепанихи, и оттуда совершилъ другую экскурсію, къ западу, чтобы достигнуть теченія р. Лены. Для этой цѣли онъ направился черезъ рч. Ичикту, лѣвый притокъ Киренги, на рч. Макарову, впадающую въ Лену съ правой стороны. Обѣ названныя рѣчки берутъ начало изъ болотъ на «низкомъ водораздѣльномъ хребтѣ» между Леною и Киренгою, который, собственно, представляетъ собою не хребетъ, а отрѣзокъ плоской возвышенности, по которой протекаетъ и Лена. Водораздѣлъ этотъ порастаетъ высокоствольнымъ хвойнымъ лѣсомъ, въ особенности стройнымъ при Макаровой, гдѣ почва болѣе сухая. Долина Макаровой часто посѣщается жителями береговъ Лены, благодаря находящимся по ней прекраснымъ сѣнокоснымъ лугамъ. Оставивъ далѣе эту долину, Крыжинъ перешелъ въ другую, узкую, на подобіе ущелья,

и, слѣдуя внизъ по ней, достигъ берега р. Лены въ промежуткѣ между деревнями: Краснояровскою и Потановскою. По той-же дорогѣ онъ возвратился и назадъ въ село Мартыновское на Киренгѣ.

Отъ Мартыновскаго до своего устья р. Киренга протекаетъ сначала на сѣверъ, поворачиваетъ къ сѣверо-западу, а затѣмъ, во второй половинѣ этого отрѣзка, придерживается с.-с.-в-го направленія. Восемь верстъ ниже с. Мартыновскаго въ Киренгу впадаетъ съ правой стороны рч. Домукта, а еще ниже Китима, Моголь, Оськина и Н. Черепаниха; всѣ эти рѣчки берутъ начало въ горахъ, образующихъ водораздѣлъ между Киренгою и Чаею и мало-по-малу придаютъ руслу Киренги ширину, достигающую цѣлой версты.

Правые притоки р. Киренги текутъ въ широкихъ болотистыхъ долинахъ, пересѣченныхъ множествомъ ключей. Ихъ широкія долины однако-же сразу суживаются, лишь только путешественникъ вступаетъ въ область ихъ верхняго теченія, если таковое прорѣзаетъ Приморскій хребетъ. При устьяхъ Китимы и Моголи находятся соименныя деревни, а далѣе внизъ по рѣкѣ, до самаго устья, построены еще: Сюпуновская, Осиповская, Рыкова, Глухова, Подолгиха, Юксѣева, Мезенцова, Солдатова и Безрукова. Впрочемъ, всѣ деревни, расположенныя по Киренгѣ, можно назвать незначительными, сравнительно съ другими восточно-сибирскими, въ которыхъ, какъ мы видѣли въ своемъ мѣстѣ, числится нерѣдко отъ 200 до 500 дворовъ, при 2-хъ-тысячномъ населеніи, между тѣмъ какъ, по сообщенію Крыжина, все населеніе береговъ Киренги не превосходитъ 600 душъ мужского пола. Относительно климатическихъ условій долины р. Киренги у Крыжина находимъ свѣдѣнія, согласно которымъ необходимо допустить, что климатъ здѣсь значительно болѣе суровый, нежели на столь близкой отъ нея и параллельной ей р. Ленѣ, чему очевидно способствуетъ не только весьма вѣроятное, болѣе высокое по-

ложение интересующей нас долины, но и близость высоких горъ, рано покрывающихся снѣгомъ. И дѣйствительно, по увѣренію мѣстныхъ жителей, осенніе дожди въ долинѣ Лены падаютъ на поляхъ Киренги уже въ видѣ снѣга, а холодная утренняя роса оказывается здѣсь уже инеемъ; такимъ образомъ и снѣгъ устанавливается въ долинѣ Киренги раньше нежели на р. Ленѣ, хотя послѣдняя покрывается льдомъ раньше Киренги, что зависитъ отъ меньшей быстроты р. Лены. Не взирая на всѣ эти, повидимому, неблагоприятныя условія урожаи хлѣба на Киренгѣ бываетъ иногда самъ-восемь, довольно часто самъ-семь и среднимъ числомъ самъ-пять, что все-таки можно считать хорошимъ и достаточно прибыльнымъ. Разведеніе овощей производится здѣсь всюду и щедро вознаграждаетъ трудъ. Всего болѣе опаснымъ для дѣшняго земледѣлія считаютъ не столько ранніе ночные морозы и холодные туманы, сколько весеннія половодія, опустошающія деревни ниже устья Улькана. Иногда наводненія эти достигаютъ столь значительныхъ размѣровъ, что разрушаютъ жилища и уничтожаютъ сѣнокосы, составляющіе значительную часть богатства мѣстныхъ жителей.

Наконецъ, что касается геогностическаго строенія мѣстности въ области орошаемой водами Киренги, то въ этомъ отношеніи мы можемъ руководствоваться только нижеслѣдующими соображеніями и данными, заимствованными изъ замѣтокъ Черскаго<sup>1)</sup>, такъ какъ до сихъ поръ ни одинъ изъ путешествовавшихъ геологовъ не посѣтилъ этой долины. Мы говорили уже въ своемъ мѣстѣ, что въ области такихъ байкальскихъ рѣчекъ, какъ Кедровыя, Елохинъ, Черемшанки и Косы, полоса лаврентьевскихъ породъ успѣла съюзиться на столько, что верховья этихъ горныхъ потоковъ врѣзаются уже въ толщу онотскихъ сланцевъ, примыкающую къ полевошпатовымъ породамъ съ сѣверо-западной стороны, а въ промежуткѣ между

---

<sup>1)</sup> Черскій, Рукописныя замѣтки о Сибирѣ.

Елохиномъ и Косою, сланцы эти примыкають уже непосредственно къ Байкалу, опускаясь даже подъ современный его уровень. Породы эти, хотя затѣмъ и отступаютъ отъ Байкала на столько, что въ промежуткѣ между Малою Косою и сѣверо-восточною оконечностью озера даже въ выносахъ довольно длинныхъ рѣчекъ не попадаетъ уже галька такихъ сланцевъ, тѣмъ не менѣе, какъ мы увидимъ ниже, при описаніи долины Верхней Ангарты и Кичеры, онѣ опять подступаютъ на столько, что выше устья Душкчанскаго рукава Верхней Ангарты породы эти слагаютъ собою нѣкоторую часть Приморскаго хребта. Изъ сказаннаго очевидно, что какъ верховья Киренги, такъ и нѣкоторая часть ея теченія, по крайней мѣрѣ до соединенія съ Тонгодою, должны пролагаться по всей вѣроятности въ области развитія Онотскихъ сланцевъ. Тоже правдоподобно относится и къ нѣкоторой части р. Ульканъ, въ особенности потому, что и верховье его большого праваго притока, если оно означено на картѣ съ достаточною точностью, можетъ захватывать область тѣхъ-же сланцевъ и обломочныхъ породъ, на пути приближенія ихъ къ Душкчану, т. е. къ дельтѣ Верхней Ангарты и Кичеры. Наконецъ, что тѣ-же породы не чужды и нижнему теченію Киренги, можетъ служить нѣкоторымъ указаніемъ тотъ фактъ, что въ числѣ выносимыхъ ею галекъ кристаллическихъ породъ (сіенитовые порфиры <sup>1)</sup> и другія), Черскій находилъ около города Киренска на р. Ленѣ и гальки метаморфизированнаго гороховаго камня, свойственнаго известковымъ пластамъ онотскихъ породъ (напр. мысъ Елохинъ) <sup>2)</sup>. Сюда же относятся сообщаемыя Эйхвальдомъ <sup>3)</sup> свѣдѣнія о присутствіи въ долинѣ Киренги каменноугольныхъ осадковъ

<sup>1)</sup> Обручевъ, Зап. В.-Сиб. Отд. И. Р. Геогр. Общ., по Общей Геогр. Т. II, вып. 1, стр. 105.

<sup>2)</sup> Черскій, Изв. В.-Сиб. Отд. И. Р. Геогр. Общ., Т. XVI, № 1—2, стр. 252.

<sup>3)</sup> Эйхвальдъ, Geognost.-Palaeontolog. Bemerk. über die Halbinsel Mangischlak und die Aleutischen Inseln. St. Petersburg. 1861 г. стр. 97—98.

съ залежами каменнаго угля. Совершенно неизвѣстно, откуда названный ученый заимствовалъ эти свѣдѣнія, такъ какъ ни у одного изъ бывшихъ тамъ путешественниковъ мы не находимъ подобныхъ указаній. Также не основательны, какъ мы увидимъ впослѣдствіи, указанія того-же Эйхвальда на залежаніе пластовъ каменнаго угля по обоимъ берегамъ Лены ниже г. Киренска. Наконецъ изслѣдованіе теченія р. Лены, которая протекаетъ по плоской возвышенности почти параллельно Киренгѣ, но въ разстояніи отъ 100 до 120 верстъ на з.-с.-з. отъ нея, убѣждаетъ, что и на этомъ протяженіи описываемыхъ горъ, онотскіе сланцы скрываются подъ красноцвѣтными песчаниками и глинами девонской системы. И дѣйствительно по всей длинѣ р. Лены, отъ знакомой намъ уже Бирюльки до города Киренска, т. е. до устья р. Киренги, обнажаются именно названные песчаники, изъ подъ которыхъ, мѣстами, выступаетъ известнякъ, тотъ самый, который и въ другихъ поперечныхъ сѣченіяхъ Прибайкальскихъ горъ слагалъ собою сѣверо-западный склонъ первой складки Онотскаго хребта, скрываясь затѣмъ точно также подъ краснымъ девонскимъ песчаникомъ, появляющимся только на плоской возвышенности. Этимъ, къ сожалѣнію краткимъ, описаніемъ р. Киренги мы должны ограничиться, отложивъ до слѣдующей части нашихъ дополненій разсмотрѣніе водораздѣла между Киренгой и Леной, по скольку онъ извѣстенъ.

---

**Примѣчаніе.** О количествѣ золота, добываемаго на пріискахъ по сѣверо-западному берегу Байкала.

Въ предъидущемъ изложеніи мы имѣли случай въ нѣсколькихъ мѣстахъ указывать на золотые пріиски по рч. *Малымъ Котамъ*, *Большой Спнной* и *Кавынаху*, указавъ на условія находженія этого металла; въ настоящемъ же примѣчаніи мы ставимъ себѣ цѣль ознакомить читателя съ цифровыми данными, касающимися упо-

мянутыхъ приисковъ, поскольку они извѣстны стали благодаря издаваемымъ «Сборникамъ статистическихъ свѣдѣнй о горнозаводской промышленности Россіи».

Для этой цѣли мы помещаемъ здѣсь нижеслѣдующую таблицу:

		<i>Кавынахъ.</i>			<i>Малые Коты <sup>1)</sup>.</i>		
Александр. Николаевскій приискъ.		Промыто песку.	Содерж. золота въ 100 пуд.	Добыто платино- ваго золота.	Промыто песку.	Содерж. золота въ 100 пуд.	Добыто платино- ваго золота.
{	1883	78.000	51 д.	4 ф. 37 з.	1883*	?	1 ф. 30 з. 61
	1884	59.500	33 д.	2 ф. 12 з.	1884	65.000	26 1/2 д. 1 ф. 86 з. 24
	1885	74.000	93 д.	7 ф. 48 з. 82 д.	1885*	51.000	1 з. 10 1/4 д. 6 ф. 88 з.
	1886	18.000	94 3/4 д.	18 ф. 50 з.			
	1887	180.600	1 з. 18 д.	22 ф. 34 з. 48 д.	1887	10.800	16 3/4 д. 19 з.
	1888	361.700	1 з. 4 3/4 д.	39 ф. 48 з.	1888*	196.600	31 д. 5 ф. 46 з. 21
	1889	520.000	1 з. 74 д.	2 п. 15 ф. 74 з.			
	1890	693.000	91 д.	1 п. 29 ф.			
	1891	819.300	1 з. 38 д.	2 п. 35 ф. 21 з.	1891	{ 530.635 580.000	38 д. 22 ф. 84 з. 36 59 д. 5 ф. 14 з. 92
					<i>Большая Сынная.</i>		

Золотосныя россыпи извѣстны кромѣ того еще по рѣкамъ *Верхней, Средней и Малой Еликтамъ* и ихъ притокамъ, по рч. *Большому Ваню* и *Чанчеръ*. Однако-же добывалось золото лишь по Средней Еликтѣ, справа впадающей въ собственно Еликту, гдѣ въ 1856—1858 гг. добыто 2 п. 35 ф. золота. Прииски эти нынѣ заброшены. Наконецъ въ самое послѣднее время заявленъ приискъ въ верховьяхъ рч. *Замы*, впадающей въ Байкалъ противъ острова *Ольхона* <sup>2)</sup>.

<sup>1)</sup> Обозначенные звѣздочкой года относятся къ добычѣ на Меркурьевскомъ приискѣ, остальные же года относятся Елизаветинскому прииску.

<sup>2)</sup> Обручевъ, Мат. по изслѣд. хоз. быта сельск. нас. Иркутск. губ. Т. II, вып. I, 1890 г., стр. 61.

## А.

**Абазасовъ**, утуть. 503.  
**Абрамиха**, рч. 24.  
**Абужьева**, падь. 153.  
**Ада**, рч. 281, 287, 291.  
**Адей**, вершина. 536.  
**Алила**, рч. 523.  
**Алтанъ-харъ**, рч. 280, 284.  
**Амынъ**, см. Ольхонскія ворота.  
**Анга**, р.  
 1) притокъ Байкала. 24, 147, 303—304, 311, 332, 334, 341.  
 2) притокъ Лены, 548.  
**Ангадово**, зимовье, 278.  
**Ангара**, р.  
 1) Верхняя. 23.  
 2) Нижняя. 22, 126—143.  
**Ангарская**, бухта. 120, 149.  
**Ангасолжа**, рч. 24, 71, 105.  
 > Большая рч., 74, 105.  
**Ангасольская**, бухта. 104, 105.  
**Ангасольскій**, мысъ. 31, 79, 104.  
**Ангасо-хада**, горн. верш. 513.  
**Ангинская**, бухта. 302, 354.  
**Ангинскій**, голецъ. 318, 319.  
**Ангинскій**, мысъ. 31, 301, 302, 354.  
**Анососкій**, мысъ. 32.  
**Анюхта**, бухта, см. Шартла.  
**Аранга**, стойбище, см. Ленскій десятокъ.  
**Арбунъ**, рч. 542, 546, 564.  
**Аргойтъ**:  
 1) бухта. 368.  
 2) долина. 357, 363, 369.  
**Аргойтъ-амынъ**, см. Аргойтъ.  
**Аргойтъ-зунъ-жуго**, рч. 370.  
**Аргойтъ-хадай**, верш. 369.  
**Аренга**, рч. 304, 311.  
**Артамоновъ**, ключъ. 576.  
**Артома**, ключъ, см. Артамоновъ кл.  
**Арулъ**, мысъ. 31, 423, 509.  
**Архирейовая**, сопка. 275, 309, 342.  
**Архирой**, рч. 271, 275.  
**Аса**, р. 304.  
**Асагольская**:  
 1) бухта. 234.  
 2) долина. 235.  
**Ахта**, р. см. Анга.  
**Ахшуръ**, бухта. 440, 441.  
**Ая**, бухта. 492, 495.  
**Аянъ**, рч. 317.  
**Аяя**, мысъ. 32.

## В.

**Вабушка**, дол. 123, 124.  
**Вабушка**, мысъ, 233, 248.  
**Вабушкина** губа, 123.  
**Вата-хужиръ**, мысъ. 566.  
**Ваденджекитъ**, рч. 547.  
**Васндай**, рч. 149.  
**Вазарная**, бухта. 376, 377, 486.  
**Вайкаль**. 19—59. 112. 116. 247.  
**Вайкальская**, долина. 30.  
**Вакланъ**, бухта. 233. 240, 241, 243.  
**Вакланій**, мысъ. 32, 243.  
**Вакланій камень**, утесъ. 242, 244.  
**Вакланій**, островъ, 241.  
**Вакланъ**, утесъ. 120.  
**Валаганская**, степн. дума. 496.  
**Валдакинъ**, рч. 610.  
**Валтаханова**, бухта. 595.  
**Ванная**, рч. 131, 150, 197.  
**Варанчукъ**:  
 1) губа. 121, 123.  
 2) мысъ. 125.  
 3) рѣчка. 121, 123.  
**Варгузинъ**, р. 23.  
**Варгузинскій**, заливъ. 22.  
**Варгузинскій**, хребетъ. 29.  
**Варемъ**, рч. 547.  
**Вартанова**, рч. 131.  
**Варунъ-Вудъ**, рч. 415, 419, 420.  
**Вахина**, рч. 284.  
**Везрукова**, дер. 612.  
**Везимьянная**, рч.  
 1) притокъ Байкала. 24. 370.  
 2) притокъ Олхи. 70, 94.  
 3) притокъ Онгурёна. 512.  
 4) притокъ Унгуръ. 319.  
**Везимьяннъ**, ключъ.  
 1) притокъ Байкала. 584.  
 2) притокъ Лены. 547.  
**Везимьяннъ**, мысъ. 32, 479.  
**Верезникъ**, мѣстность. 347.  
**Верезовъ**, ключъ. 118.  
**Верезовъ**, мысъ. 31, 78, 79, 118.  
**Верезовъ**, хребетъ. 279.  
**Берей**, рч. 605, 608.  
**Верла**, бухта. 594.  
**Верхинъ**, см. М. Крестовская дол.  
**Вильгитуй**, рч. 284.  
**Вильгитуйская**, сопка. 286.  
**Вильчиръ**, рч. 312, 317.  
**Виражанъ**, мысъ. 32.



Вирей, р. 24.  
 Вирюльма:  
     1) рч. 529, 548.  
     2) дер. 529.  
 Вишахенъ-харгой, бухта. 444.  
 Вогучанъ, островъ. 600.  
 Вогучанская, бухта. 595.  
 Вогучанский, мысъ. 595.  
 Войца, дол. 282.  
 Воло-жерга, рч. 284, 285.  
 Волотная, рч. 318.  
 Володей, мысъ см. Коврижка.  
 Володейская, бухта. 584.  
 Вольшая, рч.:  
     1) притокъ Н. Ангарты. 131, 193.  
     2) притокъ Байкала. 24.  
 Вольшая Ангасолка, р. 74. 105.  
 Вольшая Вугульдейка, рч. 146, 203, 282.  
 Вольшая Варначъ, рч. 156.  
 Вольшая Вересовка:  
     1) рч. 74.  
     2) гора. 74.  
 Вольшая Глубокая, рч. 73.  
 Вольшая Кадильная, рч. 167.  
 Вольшая Боса:  
     1) бухта. 581.  
     2) рѣка. 584.  
 Вольшая Крестовка, рч. 326.  
 Вольшая Курета, рч. 341.  
 Вольшая Оха, рч. 77.  
 Вольшая Рудоплавная, рч. 214.  
 Вольшая Солонцовая бухта, 565, 566.  
 Вольшая Стнная, рч. 156, 160, 615.  
 Вольшая Харгойская, бухта. 444.  
 Вольшая Черемшанка, рч. 151, 584, 586.  
 Вольшая Шарельская, дер. 528.  
 Вольша-Баранчужская, бухта. 123.  
 Вольша-Крестовский, мысъ. 300.  
 Вольша-Разводниное, с. 127, 143.  
 Вольшіе Камни, дол. 175.  
 Вольшіе Коты, р. 155, 159.  
 Вольшія пещеры, мѣстн. 155.  
 Вольшой Баранчужъ, рч. 121.  
 Вольшой Ванай рч. 616.  
 Вольшой Кадильный, мысъ. 170, 171, 175.  
 Вольшой Моелтуй, рч. 192.  
 Вольшой Роговикъ, рч. 235.  
 Вольшой Соръ, лагуна. 33.  
 Вольшой Харгойский, мысъ. 389.  
 Вольшой Чивыржуй, заливъ. 24.  
 Вольшой Шаражелгай, рч. 107.  
 Воорканъ, рч. 547.  
 Вориктуй, рч. 5, 10.  
 Ворка, ключъ см. Бурканъ.  
 Ворого-даганъ, островъ. 474, 485.  
 Воро-елгай, бухта. 297.  
 Воро-елгайская, дол. 326.

Воро-елгайский, мысъ. 295, 298.  
 Ворончи-угунъ, островъ. 474, 485.  
 Воро-толгой, мысъ. 576.  
 Вормо-тала, р. 304.  
 Вотиганъ, мысъ см. Котиковъ мысъ.  
 Времананъ, рч. 610.  
 Вугай, рч. 608.  
 Вугульдейка, р. 24, 146, 203, 259—291, 327, 343.  
 Вугульдейский, мысъ. 31, 260, 261.  
 Вудунская, бухта. 425, 426.  
 Вудунский, мысъ. 426.  
 Вудъ, бухта. 414.  
     > долина. 419.  
 Вулагай, ключъ. 534.  
 Вулагай-томои, холмъ. 533.  
 Вулужъ:  
     1) котловина. 328.  
     2) мысъ. выступъ. 432.  
     3) рѣч., прит. Анги. 311.  
     4) рѣч. на Ольховѣ. 432.  
 Вулкой, рч. 523.  
 Вурашиникъ:  
     1) бухта. 364.  
     2) долина. 361.  
 Вургунда, бухта. 581.  
     > гора. 585.  
 Вурдугусъ, рч. 131.  
 Вурканъ, бухта. 594.  
     > ключъ. 597.  
 Вурла-хапсагай, утесъ. 377.  
 Выстрая, р. 8, 11, 15.  
 Вѣлета, рч. 283.  
 Вѣловерцева, падь. 175, 177.  
 Вѣлый Калтуотъ, возвыш. 77.  
 Вѣлый Камень, отрогъ. 138.  
     > утесъ. 345.  
 Вѣра, горн. потокъ. 567.

## В.

Вадунанъ, мысъ. 32.  
 Ванай, рч. 27, 542, 547, 616.  
 Ванайканъ, рч. 547.  
 Ванайский ключикъ, рч. 27, 540, 541.  
 Варначъ, см. Каторжанская бухта.  
 Варначъ, рч. 156.  
 Введенская, станція. 72.  
 Вересовна рч. 74.  
 Верхне-Туныпрои, улусъ. 379.  
     > - Ульяновская, дер. 610.  
     > - Шинтуйская, бухта. 420.  
 Верхнее Изголовье, см. мысъ Хобой.  
 Верхние Хомуты, рч. 232, 239.  
 Верхний Карлужъ, мѣстн. 204.  
     > Качергачъ рч. 202.  
     > Соръ, лагуна. 33.  
     > Шинтуй, мысъ. 422.

Верхняя Уладова, рч. 128.  
 , Черемховая, р. 226.  
 Винокуренная, падь. 75.  
 Боднианъ, рч. 608.  
 Волчья голова, долина. 82.  
 Ворожейкина, гора. 369.  
 Ворота:  
 1) гора. 74.  
 2) мысь. 254.  
 3) утесъ. 236.  
 Выдренная, рч. 24.

## Г.

Гарилля, рч. 608.  
 Гарчианъ, рч. 608.  
 Гилемъ, рч. 608.  
 Гирвичъ, рч. 608.  
 Гладкий убуръ, склоны. 106  
 Глубокая:  
 1) прит. Байкала. 155.  
 2) прит. Олки. 70, 73.  
 3) прит. Сармы. 324, 471.  
 4) прит. Ушаковки. 212, 213.  
 Глубоковская, станция. 87.  
 Глухова, дер. 612.  
 Глухой Соръ, лагуна. 33.  
 Голо-нургунъ улусъ, см. Доло-нургунъ.  
 Голоустенская, бухта. 175, 178.  
 Голоустная, дер. 184.  
 Голоустная, р. 24, 145, 185, 202, 205,  
 208, 220, 223, 255.  
 Голоустный, мысь. 31, 183.  
 Голый, мысь. 31, 292, 293, 294, 549,  
 552, 557.  
 Гоморьянъ, рч. 284, 286, 344.  
 Гоморьянская:  
 1) гряда. 342.  
 2) сопка. 286.  
 Гончураева, падь. 70, 94.  
 Горбиданъ, рч. 610.  
 Горемыка:  
 1) дер. 598.  
 2) рѣчка. 25, 597.  
 Горемыкинская, бухта. 594.  
 Горемыкинскій, мысь см. Лударь.  
 Горячинская, бухта. 594.  
 Гремячій, мысь. 32.  
 Гробиха, дол. 136.  
 Грудниина, дер. 143.  
 Грязнуха, рч. 131, 214.  
 Гу-елга, дол. 594, 597, 598.  
 Гурубиха, р. см. Слюдяная.  
 Гызыгы-нуръ дол. 512.  
 Гырыль, долина. 412.

## Д.

Дабататуй, оз. 337.  
 Дабанъ, отрогъ Приморскаго хребта.  
 513, 514.  
 Дабанъ-угунъ, ключъ. 512, 517.  
 Дабать, рч. 71, 99.  
 Давши, рч. 24.  
 Дальная, падь. 211, 218.  
 Дашинаевская, дорожка. 77.  
 Два брата, утесъ. 155.  
 Джалагинъ, рч. 542.  
 Джоголы, см. Зогинское тулгусск. стой-  
 бище.  
 Долгая, падь:  
 1) системы рч. Курмы. 82.  
 2) , рч. Качергата. 192.  
 Долгая степь, расш. долины Бутул-  
 дейки, 285, 347.  
 Долгая степь, село. 286.  
 Доло-мотъ, улусъ. 328.  
 Доло-нургунъ:  
 1) бухта. 439.  
 2) ключъ. 397.  
 3) улусъ. 439.  
 Доло-нургунская, дол. 440, 441.  
 Доло-нургунскій, улусъ. 439.  
 Домунта, рч. 605, 610, 612.  
 Дорожная, рч. 610, 611.  
 Духовская, рч. 24.  
 Дыроватая, дол. 237.  
 Дыроватый, утесъ. 382.

## Е.

Егоркина, падь. 204.  
 Еланца, дер. 330.  
 Еланца, рѣчка. 148, 306, 328, 329.  
 Елгай:  
 1) бухта на Ольхонѣ. 396, 436.  
 2) долина. 436.  
 3) озеро. 397.  
 4) рѣчка. 397.  
 Елкета, р. 518, 520, 523, 528, 547, 616.  
 Еловка:  
 1) притокъ Байкала. 237.  
 2) притокъ Н. Ангара. 131.  
 Еловый, хребетъ. 73, 91.  
 Елохина, рч. 25.  
 Елохинъ, мысь. 31, 554, 583, 584.  
 Ермакъ, дер. 611.  
 Ершова, дер. 143.

## Ж.

Жаржантъ:  
 1) бухта. 594.  
 (2) поселеніе. 598.

Жедо-шибе-бусы, долина. 410, 412.  
Жилище, рч. 155.

### 3.

Заангинон, горы. 301.  
Забайкальский, хреб. 29.  
Забри-хушунь, мысь, 452, 453.  
Заворотная, бухта. 566, 567, 572.  
Заворотный, мысь. 31, 566, 567.  
Заглинская, бухта. 451, 452, 486, 499, 506.

Заглинский:

- 1) отрогъ. 451. 452.
- 2) улусъ. 453.

Заглинное, озеро. 397, 451.  
Замна Молодого, поселение. 143.  
Залевна, ключъ. 123.  
Зама, рч. 423, 471, 485.

Заминский:

- 1) мысь. 479, 508, 509.
- 2) улусъ. 509.

Заса, рч. 523.  
Заханъ-Сарминская, дол. 391.  
Заханъ-Сарминский, мысь. 390, 392.  
Зиринтуй, см. Чиринтуй.  
Злыгостиха, рч. 214.  
Зигъевна, дол. 204.

Зогдунъ:

- 1) мысь. 479.
- 2) рѣчка. 25, 466, 479.
- 3) улусъ. 483.

Зогн, см. Зогинское тунгусск. стойбище.  
Зогинское, тунгусское стойбище. 222.  
Зонгунъ, рч. 317.  
Зонгутъ, рч. 220, 222, 223, 278.  
Зоронъ-шулунъ, мысь см. 'Вогучанскій мысь.

Зулха, см. Лена.

Зумугой, островъ. 395, 437, 447, 485.

### И.

Ивановна, рч. 114.  
Ивановская, губа. 114.  
Ивановский, мысь. 32, 114.  
Иджбэ, рч. 395, 397, 398, 411, 412, 413, 422.  
Ижмэй, гора. 417, 418, 419.  
Ижмэйский, мысь. 394, 414, 416, 420.  
Илга, рч. прит. Байк. 25, 206, 207, 230, 531, 533, 534, 540, 550.  
Илгинская, бухта. 550.  
Илгинский, бассейнъ. 532.  
Илгинско-Ванайская, дол. 540.

Илгэй, см. Илга.

Ильчи Иркутский, рч. 4.  
> Булутчинъ. 5.

Ильчинская гривна, возвыш. 6, 15.  
Ильчинская щель. 3.

Ильчино-Булутская, дол. 2, 6, 15, 16.

Имыль-галдаши:

- 1) мысь. 455, 499, 506.
- 2) отрогъ. 454.

Иркутский Ильчи, рч. 4.

Иркутско-Байкальский, треугольникъ. 68—69.

Итырхэй:

- 1) падь на материкъ. 325.
- 2) падь на Ольхонъ. 450.

Ихэ-елга, рч. 523, 526.

Ихэ-нуръ, озеро. 512.

Ихэ-хужиръ, см. Хужиртэй.

Ичинта, рч. 611.

### I.

Ихкыте, мысь. 380.

Ихкыте, отрогъ. 377, 380.

### К.

Кабаній, мысь. 32.

Кабанья, р. 24.

Кавардай, падь. 212.

Кавынахъ, рч. 602, 615, 616.

Кадильная:

- 1) станція. 160, 167.
- 2) рч. 167.

Кадильный, мысь. 167, 170, 171, 175.

Казанцова, рч. см. Талая.

Кайская, гора. 72, 91.

Каменистый, рч. прит. Унгурн. 318.

Каменная, рч. 278.

Каменная, дол.

- 1) прит. Байкала. 139, 150, 197.

- 2) прит. М. Охн. 88.

Камень, утесъ. 87.

Карамъ, дер. 608.

Караула, сторож. постъ Лиственгъ. тамож. заставы. 125, 135.

Кареты, розсыпь. 77.

Карлукъ, мѣстность. 204.

Каромонъ, рч. 131.

Каспа, рч. 547.

Каторжанна, рч. 90, 120.

Каторжанская, бухта. 120.

Каторжанский Камень, утесъ. 91.

Качаровская, дер. 610.

- Качергаты**, р. 202.  
**Качугъ**, село. 548, 605.  
**Каштанъ**, рч. 214.  
**Кая**, рч. 82, 98.  
**Кедровки**, мысь. 32.  
**Кедровый**, мысь.  
 1-ий. 576, 578.  
 2-ой. 576.  
 3-ий. 576.  
**Кедуса**, р. 271, 272, 276.  
**Кедусинский**, хреб. 271, 276.  
**Кивилей**:  
 1) бухта. 594.  
 2) гора. 596.  
 3) ключ. 597.  
**Кика**, рч. 24.  
**Киренга**, р. 547, 602—615.  
**Киренскъ**, городъ. 605, 615.  
**Китима**, рч. 612.  
**Ключи**, мѣстность. 187.  
**Ключевская**, дер.:  
 1) на Ленѣ. 529.  
 2) на Киренгѣ. 610.  
**Кобыльа голова**, мысь. 450.  
**Ковали**, ключъ, см. Кивилей, ключъ.  
**Ковомія**, см. Коломія, рч.  
**Ковомія-юкта**, р. 547.  
**Коврижка**:  
 1) бухта, см. Болсодѣйская бухта.  
 2) мысь. 25, 584.  
 3) рѣчка. 584, 586.  
**Ковылей**, рч. 605.  
**Коджоръ**, мысь, см. Хужиръ, мысь.  
**Коломія**, рч. 547.  
**Коломольная**, губа. 245.  
**Коломольный**, мысь. 31, 110, 111, 240, 246, 247.  
**Короткая**, дер. 611.  
**Косой бродъ**, мѣстность. 215.  
**Косостепное**, село. 284.  
**Котельниковская**, рч. 25, 593.  
**Котельниковскіе**, горячіе ключи. 591.  
**Котельниковскій**, мысь. 32, 590.  
**Котельниковское**, озеро. 592.  
**Котиви**:  
 1) бухта. 595.  
 2) мысь. 32, 601.  
 3) рѣка. 25, 601, 2. 60  
**Коты**, бухта. 155.  
**Котъ**, ключъ. 271.  
**Кочерига**, см. Кочериковская бухта.  
**Кочериковская**:  
 1) бухта. 551.  
 2) долина. 551.  
**Кочериковскій**:  
 1) годецъ. 538.  
 2) мысь. 31, 551.  
**Кочнева**, дол. 96.  
**Красноярская**, дер. на р. Киренгѣ. 612.  
**Красный камень**, утесъ. 90, 91.  
**Красный яръ**, мысь. 595.  
**Крестовая**, дол. 297, 299.  
**Крестовка**, дол. 151, 214, 215.  
 » **Большая**, рч. 326.  
**Крестовскій**:  
 1) мысь. 31, 299, 357, 369, 373, 374.  
 2) улусть. 299, 326.  
**Крестъ**:  
 1) долина. 179, 183.  
 2) мысь, см. Крестовскій.  
**Кривая Ланка**, рч. 137.  
 » **падь**. 75, 82, 98.  
**Круглая**, дол. 73.  
**Кругло-Глубоковская**, станція. 73.  
**Крутая**, губа. 106, 107, 153.  
**Крутой губы**, мысь. 79.  
**Крыжановская**, дер. 143.  
**Куда**, р. 148.  
**Кудалда**, рч. 46.  
**Куданца**, р. 149, 278, 289.  
**Кузмихинское**, с. 143.  
**Кузутъ**, рч. 221.  
**Кузюртъ**, рч. 70, 75, 76, 96.  
**Кулукъ**, село. 21, 64—68.  
**Кулукскій**, отрогъ. 75.  
**Култучная**:  
 1) гора. 61, 74, 86.  
 2) рч. 5, 8, 23, 24, 60, 108.  
**Култучный Ильчи**, ключъ. 5.  
**Кунгинъ**, рч. 221.  
**Кункиджа**, рч. 608.  
**Кунтинская**, дер. 328.  
**Курбуликъ**, см. Чивыркуйскій заливъ.  
**Курга**, рч.:  
 1) прит. Бугульдейки. 283, 285.  
 2) прит. Еякты, сист. Лены. 519.  
 3) прит. Н. Ангарты, см. Тальца.  
**Кургуликъ**, см. Чивыркуйскій заливъ.  
**Куретка**, рч. 306.  
**Куретская**:  
 1) дер. 306, 341, 343.  
 2) сопка. 309, 342.  
**Куретскій**, массивъ. 343.  
**Курнутская**:  
 1) бухта. 377, 381, 486.  
 2) долина. 378.  
**Курнутскій**:  
 1) мысь. 380.  
 2) улусть. 504.  
**Курла**, мысь. 32, 595.  
**Курма**, рч.:  
 1) прит. Н. Ангарты. 70, 82, 98, 131.  
 2) прит. Байкала. 25, 475, 476, 507.  
**Курминскіе**:  
 1) мысы. 31, 473.  
 2) острова. 447.  
**Курминскій**, улусть. 475.  
**Курминскія**, бухты. 474.  
**Куртуновка**, дер. 266.  
**Куртунъ**, рч. 146, 203, 223, 263, 265, 276.

Курья, протока р. Голоустной. 207.  
Кучегуринская, падь. 75.  
Кучулгинская, бухта, см. Хушилку.  
Кучулгинский, залив, см. Хушилку.  
Куада, рч. 217, 218, 219.

## Л.

Лабзиха, см. Шантанга.  
Ланка, рч. 71, 131.  
Ленинов, ключ. 70.  
Ледная, р. 25, 580.  
Ледяной, мыс. 576.  
Лена, р. 519, 526, 529, 541—549, 563, 612.  
Ленокский десютовъ, тунгусск. стойбище, 526.  
Лесневича, заица. 143.  
Листовничное, село. 22, 150.  
Листовничный, мыс. 32.  
Лихановский, мыс, см. Мантурихинъ.  
Логной, рч. 608.  
Лосева, заица. 143.  
Лударь, бухта. 595.  
Лударь, мыс. 32, 594.  
Лужовичная, гора. 217.

## М.

Макарова, рч. 611.  
Мамсимиха, рч. 24.  
Максимовский, ключ. 211.  
Малая Ангасолка, р. 74, 105.  
» Вугульдейка, р. 293, 327.  
» Варнаца, рч. 156.  
» Вересовка, рч. 74.  
» Глубокая, рч. прит. Байкала. 74.  
» Еликта, рч. 616.  
» Кадильная, дол. 171.  
» Коса, бухта. 583.  
» Коса, рч. 584, 589.  
» Крестовская, бухта. 301, 302.  
» Крестовская, долина. 301.  
» Крутая, губа. 107.  
» Курета, рч. 340.  
» Куркутская, рч. 377.  
» Манзурка, рч. 281, 287.  
» Мужинская, бухта. 584.  
» Ола, рч. 70, 88.  
» Разводная, рч. 143.  
» Рудоплавная, рч. 214.  
» Свинная, рч. 156.  
» Черемшанка, рч. 151, 583, 584.  
» Шарельская, дер. 529.  
Малиновое, озеро. 76.  
Малое море. 22, 373, 383, 423, 447, 485—492.

Малые Боты, р. 155, 160, 616.  
Малый Баранчук, дол. 123, 125.  
» Бориктуй, р. 10.  
» Кадильный, мыс. 171.  
» Крестовский, мыс. 301.  
» Моелтуй, рч. 191.  
» Роговикъ, дол. 236.  
» Солонцовый мыс, см. Бага-хужиръ.  
» Харгойский, мыс. 389.  
» Чивыркуй, р. 24.  
» Шаражелгой, рч. 107.  
Малые пещеры, см. Крутая губа.  
Мангасу, долина. 410.  
Мангасу-нуго, бухта. 409.  
Мангаша-утугъ, бухта. 423, 424.  
Манзурка, р. 145, 149, 530, 548.  
» Малая рч. 281, 287.  
Мантуриканъ см. Мантуриха.  
Мантуриха, рч. 24.  
Мантурихинъ, мыс. 32.  
Маректа, рч. 608.  
Марикта, рч. 317.  
Маритуй, мыс. 79.  
Мартиновское, село. 611, 612.  
Медвѣжій, руч., прит. Унгуръ, 317.  
Медвѣжья:  
1) губа. 120.  
2) рч., прит. Олки. 70.  
3) падь, прит. Вавной. 137, 138, 155.  
4) рч. прит. Соловцовой. 155.  
Меледиха, дер., см. Милудиха.  
» рч. 214.  
Мезенцова, дер. 612.  
Милудиха, дер. 216.  
Мимха, рч. 523.  
Миню, рч. 610.  
Михалева, дер. 143.  
Мишиха, рч. 24.  
Мишинский, мыс. 32.  
Модотъ, остров. 395, 428, 486.  
Моголь, рч. 612.  
Могойтъ:  
1) горн. отрогъ. 231.  
2) рѣчка, верховье Харика. 283.  
Моелтуй Большой, рч. 192.  
» Малый рч. 191.  
Молодого, заица. 128.  
Моложона, рч. 601.  
Мольна, рч.:  
1) притокъ Анги. 306.  
2) притокъ Хогота. 265.  
3) притокъ Мурина, сист. Байкаль. 279.  
Молета, рч. 70, 95, 96.  
Монгасу, мыс. 412.  
Монокъ, дер. 609.  
Моритуй, рч. 112.  
Моритуйская:  
1) бухта. 112, 296.  
2) долина. 296, 328.  
Морская, грива. 166.

**Морская Колесьяма**, рч. 221, 225.  
**Мортуйонанъ**, бухта и долина, см. Моритуйская.

**Морянная**, ключъ. 123.  
**Морянный**, мысъ. 123.  
**Морякъ**, гора. 209, 211.  
**Мостки**, котловина. 69, 92.  
**Мостовая**, рч.:

- 1) прит. Ушаковки. 214.
- 2) прит. Киренги. 610.

**Мотская**:

- 1) гряда. 74.
- 2) возвышенность. 73.
- 3) станція. 73.

**Мохован**, рч. 193.

**Музинный**:

- 1) бухта. 584.
- 2) мысъ. 585.
- 3) рѣка. 584.

**Музинайское**, озеро. 584.

**Мулананъ**, см. Коврижка.

**Муриновскій**, мысъ. 32.

**Муринъ**, рч.:

- 1) прит. Байкала. 24, 278, 280.
- 2) прит. Куды. 149.
- 3) прит. Киренги. 607.

**Мухоръ-Ада**, рч. 282.

**Мухоръ-Вулукъ**, дол. 328.

**Мухоръ-елгай**, дол. 167.

**Мухоръ-елгайская**, губа. 166.

**Мыдланка**, рч. 61, 81, 102.

**Мысовая**, падь. 153.

**Мысовская**, рч. 24.

**Мысовскій**, мысъ. 32.

**Мыхерта**, дол. 452, 506.

**Мяочинъ**, рч. 231.

## Н.

**Нарлджай**, рч. 547.

**Нарынъ-Кунты**, дол. 328.

**Нарынъ-хушунъ**, см. Тонкій мысъ.

**Нарынъ-хыръ**, луга. 535.

**Немака**, рч. 610.

**Немендэй**, рч. 518, 523.

**Нерундыванъ**, р. 602.

**Несогласная**, дол. 163.

**Нижние Хомуты**, рч. 237, 238.

**Нижний Качергатъ**, р. 145, 185, 189, 190.

**Нижний Соръ**, заливъ. 33.

» Шинтуй, мысъ. 420, 422.

**Нижняя**:

- 1) губа. 161.
- 2) рѣка. 610.
- 3) падь. 164.

**Нижняя Ангара**. 126—143.

» Тибельти р. 17.

» Черемховая, прит. Голоустной. 226.

**Нивольское**, село. 128, 134, 143.

**Нивулиха**, рч. 131.

**Новая Кадильная**, дол. 171.

**Новоселье**, дер. 610.

**Новояменная**, см. Пивовариха дер.

**Норинъ-Морякъ**, гора. 272.

**Норинъ-Морянское** сѣуженіе, дол. Бугульдейки. 272.

**Нуга**, рч. 608.

**Нуганъ**, рч. 321, 471.

**Нуганскій**, голецъ. 321.

**Ныгденъ-горхонъ**, рч. 473, 475.

**Нурайскій**, улустъ. 327, 328.

**Ныримня**, рч. 523.

**Нюдаръ**, мысъ см. Лударъ.

**Нюргене**, мысъ. 398, 426.

**Нюргонская**, бухта. 425, 426.

## О.

**Огултъ**, рч. 284.

**Одонимъ**:

- 1) бухта. 432.
- 2) дол. 397, 432.

**Озерно**, дол. 179, 180.

**Ожаралыкъ**, см. Ванная рч.

**Ожорликъ**, рч. 209, 217.

**Ожуникта**, рч. 610.

**Ожунайка**, рч. 610.

**Ожунева**, рч. 610.

**Ола**, рч. 71, 99.

**Олзонтой**, рч. 380.

**Олонъ-тужоуъ**, рч. 523.

**Олга**:

- 1) дер. 70, 75, 97.
- 2) рѣчка. 69, 77, 82, 91, 93, 96, 98.

**Олхинская**, дер. см. Олга дер.

**Олхиновскій**, отрогъ. 77.

**Ольоновская**, станція. 276.

**Ольонъ**, островъ. 21, 393—465.

**Ольонская**, стенная дума. 336, 363, 380.

**Ольонскій**, Уланъ-нуръ, дол. 395, 415.

» Харгой, заливъ. 396.

**Ольонскія** ворота, проливъ. 22, 373, 409, 486, 492.

**Омогачанъ**, мысъ. 32.

**Онгуренъ**, рч. 25, 499, 506, 512, 514, 521.

**Онгуренская**, бухта. 511—512.

» Колесьяма, рч. 220.

**Онгуренскій**, мысъ. 513.

**Онотоскій**, хребетъ. 26, 144, 198, 272, 272, 286, 311, 342—355, 563.

**Оргоконъ**, мысъ. 32.

**Орогченская**, падь. 212.

**Орогчонъ**, гора. 213.

**Осиновая**, гора. 73, 90.

Осиновская, дер. 612.  
Осиновый лугъ, дер. 610.  
Оспонъ, рч. см. Успанъ. 471.  
Острая сопка, вершина. 195.  
Оськина, рч. 612.  
Ото-хушунъ:  
1) мысь. 479.  
2) рѣчка. 479.  
Отъ, рч. 257, 258.  
Очерной, дол. 207.

## П.

Пайсова, заника. 128.  
Панжуча, рч. 547.  
Потроновская, дер. 143.  
Патронная, станція. 127.  
Пашки, см. Пашкова дер.  
Пашкова, дер. 143.  
Перевозъ, бухта. 375, 453, 454.  
Переемная, рч. 24.  
Песчаная, бухта. 248, 252.  
Песчаный, мысь. 31, 253.  
Пещерный, мысь. 418, 492.  
Пивовариха, дер. 216.  
Плакунъ, отрогъ. 288.  
Плишкина, падь. 214.  
Поворотъ:  
1) рѣчка. 280.  
2) хребетъ. 279.  
Подкаменная:  
1) гора. 73.  
2) деревня. 529.  
3) долина. 88, 99.  
Подолгха, дер. 612.  
Покойники:  
1) бухта. 557.  
2) мысь. 31, 554, 558.  
3) улусъ. 559.  
Помойницкая, дол. 559.  
Поливаниха, рч. 214.  
Половинная:  
1) бухта. 113.  
2) рѣчка. 24, 69, 71, 76, 91, 95, 100, 113.  
Половинное, возвышеніе. 77.  
Половинный, мысь. 31, 79, 113.  
Понголье, мысь. 32.  
Пономарева, рч. 114.  
Поперечный злобокъ, мѣстп. 73.  
Потаповская, дер. 612.  
Похабинокая, гряда. 60.  
Похабиха, рч. 60.  
Правая Цеюрта, рч. 279.  
Приванъ-юкта, р. 547.  
Приморскій, хребетъ. 26, 144, 166, 272,  
309, 330, 332, 340, 342—355, 373, 384, 392,  
465, 472, 479, 513, 521, 532, 535, 537,  
555, 559, 560, 563, 568, 577, 583, 585,  
596.

Пронькина, падь. 27, 541, 547.  
Прямая Ланка, дол. 136.  
Пшеничная, падь. 214.  
Пыжовна, рч. 118.

## Р.

Разсоха, кичъ. 70.  
Распопиха, рч. 131, 196.  
Рель, рч. 25, 597, 598, 609.  
Роговикъ Большой, рч. 235.  
» Малый, рч. 236.  
Роговиковская, бухта. 235.  
Роговиковскій, мысь. 237.  
Россе:  
1) гора. 361.  
2) рѣчка. 366.  
Россе-амынъ:  
1) бухта. 361.  
2) долина. 365.  
3) гора. 365.  
Рудоплазная, Большая рч., 214.  
Рыкова, дер. 612.  
Рытая, падь см. Хыръ-хушунъ, дол.  
Рытный, мысь см. Хыръ-хушунъ, мысь.  
Рытый, мысь. 511.  
Рѣчка, см. Большая, рч.

## С.

Саганъ-булунъ, рч. 378, 380.  
Саганъ-горхонъ, рч. 534.  
Саганъ-заба:  
1) дол. 46, 299.  
2) утесъ. 300, 492.  
Саганъ-моранъ:  
1) бухта. 566.  
2) мысь. 565.  
Саганъ-турунъ, улусъ. 270, 274.  
Саганъ-хада, вершина. 509, 517, 518,  
519, 520.  
Саганъ-хушунъ:  
1) бухта. 424.  
2) мысь. 423, 424, 474.  
Санхилшинъ, рч. 523, 525.  
Саргутскій, отрогъ. 285.  
Сарма, рч. 25. 321, 373, 385, 391, 392,  
454, 467, 469, 489, 490, 499, 506.  
Сарминская, бухта. 386, 391.  
Сарминскій:  
1) голецъ, 309, 319.  
2) мысь. 31, 390, 467.  
3) улусъ, 325, 468.  
Сартъ-дабанъ, дол. 535, 536, 538.  
Сартъ-дабанскій, перевалъ. 548.

**Сахтырь**, бухта. 388.  
**Саянъ**, хребетъ. 3.  
**Свѣтленьіе камушки**, гора. 209, 217.  
**Святой носъ**, полуостровъ. 21, 32.  
**Селенга**, р. 23.  
**Синетуй**, рч. 264.  
**Синіе Солонцы**, мѣстн. 179.  
**Синюшка**, утесъ. 62.  
**Сиротинская**, дол. 150, 197.  
**Скатуи**, рч. 225.  
**Слобода**, дер., см. Бирюлька.  
**Слюдяная**:

- 1) бухта. 594, 595.
- 2) рч. прит. Байк. (с.-в. оконечн. оз.) 601.

**Слюдянка**, рч. прит. Байк. (ю.-в. оконечн.) 24.

**Смоленскій**, ключикъ. 70, 76, 95.

**Смоленское**:

- 1) возвышеніе. 77.
- 2) село. 70.

**Смолиха**, см. Томпуда.

**Смоляная**, долина. 103.

**Смородинная**, дол. 82.

**Снѣжная**, р. 24.

**Снѣжинскій**, мысъ. 32.

**Соболевъ отстой**, мысъ. 31, 153, 155, 161.

**Согзонъ**, рч. 24.

**Солдатовъ**, дер. 612.

**Солзонъ**, см. Согзонъ.

**Солонсѣй-елга**, рч. 559, 560, 563, 565.

**Солонкина**, см. Солонинка.

**Солонцовая**:

- 1) Большая, бухта. 565.
- 2) бухта. 155.
- 3) Малая, бухта. 566.
- 4) рч. 155.
- 5) рч., впадающая между мысами Онгу-ренъ и Заворотнымъ, см. Солонсѣй-елга.

**Солонцовый**, мысъ:

- 1) Большой. 31, 567.
- 2) Малый. 567.

**Солонинка**, ключъ. 214.

**Сонголъ-хада**, отрогъ. 507, 513, 514.

**Сопка**, гора. 74.

**Сортъ**, лагуна. 24.

**Сосновая**, дол. 103, 135, 136.

**Сосновка**, рч. 24.

**Среднее**, озерко. 75.

**Средній**, мысъ. 426, 428.

**Среднія**, бухты. 155.

**Средняя Ола**, р. 70.

**Старая Круглая**, дол. 89.

**Старовѣровская**, д. 611.

**Столбовый**, мысъ. 31, 108, 109.

**Столбы**, см. Столбовый мысъ.

**Стрекаловская**, дол. 186.

**Сурдужъ**, улусть, см. Согдукъ.

**Сухая**, рч. 24, 214, 215.

» рч. прит. Нугана сист. Сарым. 471.

**Сухая**, падь. 95.

» Цекюрта, рч. 278, 279.

**Сухой**, мысъ. 32.

**Сыргутскій**, отрогъ. 347.

**Сытый**, мысъ. 153, 154.

**Сѣнная**, Большая, рч. 156, 160.

» губа. 112.

**Сѣннушки**, см. В. Сѣнная рч.

**Сѣргыта**, дол. 435.

**Сюпуновская**, дер. 612.

## Т.

**Тагай**, дол. 436.

**Тала**, р. 597, 607.

**Талаканкта**, р. 547, 604.

**Таланка**, рч. 24.

**Таларъ**, бухта. 33.

**Талая**, рч. 60.

**Тало**, ключъ, 391, 467, 469.

**Тальская**, грива. 60.

**Тальца**, рч. 60, 131.

**Тальцинская**, фабрика. 128.

**Тальцинское**, с. 143.

**Тамож.** застава у села Лиственничнаго. 138.

**Танхынъ**, возвыш. 369, 379.

**Танхынъ-барунъ-уго**, рч. 370, 379.

**Танхынская**, дол. 379.

**Танхынскій**, улусть. 379.

**Танхыны-барунъ-жуго**, рч., см. Танхынъ-барунъ-уго.

**Танхыны-зунъ-жуго**, рч. 370.

**Танхыны-нухунъ**, рч. 370.

**Тарбаганъ**, дол. 103.

**Тарбѣва**, дер. 209.

**Тарбѣвское** расширеніе дол. Голоустной. 208.

**Таржиранская**, дол. 335, 336.

**Таржиранскія**, озера. 307, 308.

**Тарпуликъ**, рч. 24.

**Таширка**, см. Ширигли.

**Тибельтинско-Выстринское**, служебіе. 17.

**Тигунчиха**, р. 9.

**Тимошкина**, падь. 75.

**Титова**, дол. 143.

**Тодавѣ**, долина. 439, 440, 441.

**Тойнокъ**, островъ. 392, 485.

**Толбузиха**, рч. 24.

**Толстыи**, мысъ. 31, 32, 79, 119, 594, 597.

**Томпуда**, рч. 24.

**Тонгода**, рч. 604.

**Тонгужиръ**:

- 1) долина. 506, 512, 514, 529.
- 2) улусть. 514.

**Тонгужирскій**, хребетъ. 513, 531.

**Тонкій**, мысъ. 32, 595.

**Тончиха**, р. 605.



Торица, кичъ. 205.  
 Торская, котловина. 17.  
 Тошма, р. 601.  
 Три камеша, утесъ. 77, 91.  
 Туаларагда, мысъ. 32.  
 Тулунтумуръ, рч. 608.  
 Тункинская, дорога. 8.  
 > рч. 70.  
 Тункиношю, альпы. 3.  
 Тункыр-алымъ, см. Тункырская бухта.  
 Тункыровая, бухта. 369, 370.  
 Тункырокий, улусъ. 371.  
 Тункырово-Тутская, дол. 370, 372, 378.  
 Тункыръ, рч. 369, 370, 371.  
 Турали, мысъ. 32.  
 Турна, рч. 24.  
 Турунга, рч. 146, 272, 281.  
 Тутъ, см. Тутская бухта.  
 Тутская, бухта. 374, 455, 486.  
 Тутский, мысъ. 374.  
 > улусъ. 370, 371.  
 Тыблнхъ, рч. 523.  
 Тыргентъ, деревня. 328, 504.  
 Тытырхей, мысъ. 448.  
 Тытырхейская, бухта. 449.  
 Тышигенъ, дол. 397, 398, 412.  
 Тылъ:  
 1) см. В. Бугульдейка.  
 2) см. Котки, прит. Байкала.  
 Тѣльная, кичъ. 123.  
 Тюваланъ:  
 1) деревня. 609.  
 2) рч. 605, 608.

## У.

Убугунъ-хушунъ, мысъ. 551.  
 Угловая, рч. 187, 188.  
 Угунгой, островъ. 395, 438, 441, 447, 485, 488.  
 Угута, дол. 512.  
 Уладовы, рѣчки. 128, 131.  
 Уланъ-байсанъ, мысъ. 398, 426.  
 Уланъ-байсановая, бухта. 425, 426.  
 Уланъ-Бургасъ, рч. 148, 307, 332, 384.  
 Уланъ-Бургаский, голецъ. 309.  
 Уланъ-иргинская, бухта. 425.  
 Уланъ-нуръ, рч. 360, 361, 415, 416, 419.  
 Уланъ-нурская, бухта. 359, 414.  
 Уланъ-нурский, мысъ. 31, 357, 364, 409.  
 > улусъ. 362.  
 Уланъ-хадай, мысъ. 31, 373, 382.  
 Уланъ-хадай-хушунъ, мысъ. 381.  
 Уланъ-хужиръ, дол. 446.  
 Уланъ-хынъ:  
 1) мысъ. 479.  
 2) рѣчка. 479.  
 Улунтуй, дол. 175, 177.

Улунтуйская, бухта. 175.  
 Улунтуйско-Голоустенская, бухта. 175.  
 Ульяновъ, рч. 608, 609.  
 Улянъ, рч. 608.  
 Улятѣй, мысъ. 452.  
 Умбуръ, падь. 345.  
 Унгуръ, рч. 289, 312.  
 Унгуренский, улусъ. 290.  
 Унгуринская, станція. 287, 315.  
 Унгурханъ, рч. 312, 317.  
 Ундуръ-судунъ, см. Ундуръ-шингунъ.  
 Ундуръ-шингунъ, дол. 518.  
 Ундынъ-дабанъ, дол. 192.  
 Ункала, рч. 547.  
 Уногочанъ, бухта. 595.  
 Уншунъ, мысъ. 409, 410, 412, 455.  
 Уншунская, дол. 455.  
 Урбиканъ:  
 1) мысъ. 32.  
 2) рѣчка. 24.  
 Ургунтѣй, дол. 412.  
 Уршунъ, рч. 610.  
 Уруленинъ, рч. 209.  
 Успанъ, р. 319, 320, 471.  
 Устинова, падь. 287.  
 Устьяновская, дол. 135.  
 Утулинь, рч. 24.  
 Утулинский, мысъ. 32.  
 Уту-хапсагай, мысъ. 31, 550.  
 Уханъ, мысъ. 394, 409, 412, 413, 414, 419.  
 Ухани-барунъ-мургунъ, дол. 412.  
 Ухани-зунъ-мургунъ, дол. 414, 415.  
 Ухановая, бухта. 414.  
 Ухыльте, улусъ. 270, 273.  
 Ухыръ-гаргаши, мысъ. 875.  
 Ушановка, р. 131, 212, 213, 214.  
 Ушаній, мысъ. 175, 176.  
 Ушанья, дол. 175.  
 Уэго, мысъ. 475.

## Ф.

Фонталка, рч. 70, 94.  
 Фролика, рч. 24.

## Х.

Хабару-нуго, долина. 566.  
 Хагай:  
 1) дол. 421, 422.  
 2) мысъ. 898.  
 Хагайская, бухта. 420.  
 Хадыртуй, мысъ. 473.

**Хазарская**, деревня, 610.

**Халыны:**

1) ключъ 397, 410.

2) мысъ, 412.

**Халтыгэй**, мысъ. 509.

**Халтыгэйский**, отрогъ. 510.

**Хале:**

1) бухта 473.

2) рч. 473.

**Хаманъ-Битъ**, мысъ. 32.

**Хаманъ-вогъ**, мысъ. 46.

**Хамаръ-дабанский**, хребетъ. 3, 29.

**Хамертуй**, см. Еловка.

**Ханда**, рч. 607.

**Хандагъ**, мысъ см. Толстый мысъ.

**Хандиновская**, тунгусская деревня. 607.

**Ханду**, падь. 547.

**Ханчинъ**, рч. 70, 95.

**Хансагай-алга**, рч. 523.

**Хара-амынъ:**

1) бухта. 410.

2) дол. 410.

**Хара-байсанъ**, утесъ. 194.

**Хара-булузъ**, дол. 335, 363, 380, 384.

**Харабу-нуго**, бухта. 571.

**Хара-жерга**, р. 146, 272, 284, 343.

**Харай-Онгурёнъ** - толгой, вершина. 513.

**Хара-Муринъ**, рч. см. Муринъ сист. Байк.

**Харанса:**

1) бухта. 426.

2) ключъ. 397.

3) мысъ. 398, 428, 432.

4) островъ. 395, 428, 486.

**Харансинъ**, улусъ. 430.

**Хараносынъ-оёръ**, мысъ см. Харанса.

**Хара-нуръ**, озеро. 332, 337.

**Харатъ**, рч. 263, 276.

**Хара-тыргинъ**, улусъ. 270, 274.

**Хара-ундыръ**, гока. 395, 421, 424.

**Харахаика**, дол. 187.

**Хара-хушунъ**, отрогъ. 513.

**Харбагура**, рч. 148, 305, 343.

**Харбатуй**, рч. 106.

**Харганта**, мысъ. 375.

**Харгинъ**, рч. 225, 227, 250.

**Харгиновская**, бухта. 233, 250, 256.

**Харгитуй**, рч. 305, 318.

**Харгой**, рч. 385, 387, 389, 490, 499.

**Харгойская**, бухта:

1) материковая. 386, 389.

2) Олховская. 396, 444, 488, 506.

**Харгойская**, гора. 387, 506.

» древняя стѣна. 499.

**Харгойский:**

1) голецъ. 303, 309, 310, 319, 388.

2) мысъ. 24, 389, 444, 445, 499.

3) островъ. 485.

4) мысъ. 446.

**Хардо:**

1) бухта. 550.

2) долина. 531.

**Хардоский**, улусъ. 532.

**Харинъ**, рч. 281, 283.

**Харюльдей**, улусъ. 430.

**Хатай**, мысъ. 31, 294.

**Хатха:**

1) бухта. 414.

2) дол. 415.

3) мысъ. 419.

**Хашингора**, рч. см. Крестовка.

**Хейрэмъ**, рч. 551, 552.

**Хейсо-Кукюртеков**, возвыш. 77.

**Хергалта**, дол. 510.

**Хез**, рч. 71, 75, 82.

**Хибелень:**

1) бухта. 583.

2) мысъ. 31.

3) рч. 589.

**Хобой**, мысъ. 394, 420, 422, 423.

**Хобойская**, бухта. 420, 421.

**Хоготъ**, рч. 146, 223, 264.

**Хоготская**, станція. 289.

**Ходактэ**, ключъ. 397.

**Ховарва**, рч. 610.

**Холотей**, рч. 284.

**Хомутовская**, бухта. 233.

**Хомутовский**, мысъ. 31, 233, 239.

**Хонгинты**, вершина. 513.

**Хоринъ-ирги:**

1) бухта. 446, 450, 486.

2) мысъ. 373, 447, 449, 450.

3) отрогъ. 448, 449.

**Хотъ**, см. Котъ.

**Хоштэ**, мысъ см. Кедровый 1-ый.

**Хон**, см. М. Бугульдейка.

**Худыгунейская**, дол. 335, 362.

**Худылынъ**, дол. 559.

**Худанова**, дер. 216.

**Хужиръ:**

1) долина. 398.

2) мысъ. 479, 482, 566.

**Хужиртуй:**

1) бухта 434.

2) долина. 434, 435.

3) мысъ. 434.

**Хужиртэ**, см. Солонцовый мысъ.

**Хужиртэй**, бухта. 565.

**Хулугунэй**, дол. 510, 511.

**Хулугунейский**, улусъ. 510.

**Хулурюнъ-голь**, рч. 384, 385, 490.

**Хулырту**, улусъ. 534.

**Хунгудай**, рч. 523.

**Хунгы**, дол. 435.

**Хундылынъ горхонъ**, ключъ. 496.

**Хунхитэ**, бухта. 374.

**Хунхой**, дол. 436.

**Хурай-Ада**, рч. 287.

**Хурай-Онгурёнъ**, рч. 512.

**Хурай-Харгинъ**, ключъ. 254.

**Хурай-Халвынъ:**

1) дол. 410, 535.

2) мыс. 412.

**Хуртла, рч.** 585.

**Хуртхуу, дол.** 234.

**Хурунгуй, мыс.** 528.

**Хухусолъ, улусъ.** 270, 274.

**Хушилу:**

1) залигъ. 355, 383, 384, 386, 423, 456.

2) рч. 378, 380, 385, 488.

**Хыбинъ, островъ.** 395, 445, 447, 448, 485, 499.

**Хытыгэй, мыс.** 412.

**Хытыгэйская, дол.** 510.

**Хыр-Хуцуу:**

1) бухта. 552.

2) дол. 418, 552, 553, 554.

3) мыс. 31, 511, 552, 553.

**Хысэ, дол.** 328.

**Хюрхюро, бухта:**

1) см. Харгинская бухта.

2) см. Бургунда бухта.

**Хюрхюро, мыс.** 256.

**Хюрхюро, рч.** 257.

## Ц.

**Цаганъ-заба, см.** Саганъ-заба.

**Царь-дѣвица, см.** Титова дер.

**Цемюрта, р.** 276, 278.

## Ч.

**Чангада, бухта.** 595.

**Чанчеръ, рч.** 518, 521, 523, 535, 536.

**Чая, рч.** 611.

**Чаячій, утесъ.** 161, 162, 163.

**Чаячъ, долинка.** 161, 162.

**Чеда, рч.** 610.

**Чензорна, рч.** 608.

**Черемна, дол.** 528.

**Черемховая, дол.** 82.

**Черемшанка, рч.**

1) прит. Большой 195.

2) прит. Байкала. 24, 584, 586.

3) прит. Голоустной. 187.

**Черемшанская, бухта.** 583.

**Черемшанскій, мыс.** 31.

1) Большой. 583.

2) Малый. 583.

**Черепаниха, рч.** 611.

1) Верхняя. 610.

2) Нижняя. 612.

**Черная, рч.:**

1) прит. Ангара. 128, 131.

2) прит. Байкала. 155.

3) прит. Киренги. 610.

**Черный Камень, утесъ.** 140.

**Черный мыс.** 32, 155, 157.

**Чжырвуу, рч.** 24.

**Чжырмукой, залигъ.** 23.

Соръ, лагуна. 33.

**Чина, рч.** 601.

**Чиринтуй, рч.** 107.

**Читванъ, рч.** 188.

**Чичинуй, рч.** 610.

**Чума, рч.** 608.

**Чурагинъ, рч.** 608.

**Чухинна, падь.** 212.

## Ш.

**Шабартуй, р.** 62, 110.

**Шалотый, дол.** 329.

**Шалотый, улусъ.** 329.

**Шаманна:**

1) гора. 3, 209.

2) рч. 264, 267.

**Шаманскій камень, утесъ.** 46.

**Шаманскій, мыс.** 32, 128, 129.

отрогъ. 3, 16.

**Шаманское, озеро.** 267.

**Шампурина, залигъ.** 128, 138.

**Шангагна, рч.** 24.

**Шаншеръ, р. см.** Чангеръ.

**Шарагаборщина, дер.** 611.

**Шара-даганъ, островъ.** 474, 485.

**Шаражехгай, рч.** 107.

**Шара-хапсагайская, бухта.** 420, 421.

**Шара-шунунъ, мыс.** 444.

**Шарельская, Большая дер.** 528.

**Шартла:**

1) бухта. 552, 555.

2) долина. 557.

3) мыс см. Голый мыс.

**Шавата, мыс.** 301.

**Шевыманъ:**

1) прит. Бикты. 528.

2) прит. Шоны. 605.

**Шелоргуръ, дол.** 166, 192.

**Шелотый, падь.** 203.

**Шибетская:**

1) бухта. 438, 441.

2) дол. 488.

3) древняя стѣна. 499.

**Шибетскій, мыс.** 438, 441, 499.

**Шибетуй, улусъ.** 438.

**Шиваманъ, бухта.** 595.

**Шидейская:**

1) бухта. 386, 390.

2) дол. 390.

**Шидейскій:**

1) мыс, 890.

2) улусъ. 386.

**Шиникта**, рч. 71, 76, 82, 98.

**Шиниктинское**, возвыш. 77.

**Ширитли**, рч. 24.

**Широкая**:

1) падь. 286.

2) рч. 70.

**Шихелова**, рч. 155.

**Шона**, рч. 605, 606.

**Шудинъ-Ножонъ**, мысь. 82.

**Шумиха**, рч. 116, 241.

**Шумихинская**, бухта. 114, 118.

**Шумихинский**, мысь. 79, 114.

**Шыхыргуни-елгай**, дол. 426.

## Щ.

**Щель**, дол. 123, 124.

**Щужина**, деревня. 127, 143.

## Э.

**Эдвй**, долина. 412.

**Эвсала**, рч. 264.

**Элигей**:

1) мысь. 31.

2) рч. см. Илга прит. Лени.

**Этапъ**, мѣстность. 71, 76, 95.

## Ю.

**Юбуханъ**, мысь. 376.

**Юкофева**, дер. 612.

**Юкта**, рч. 547, 610.

**Юнхукъ**:

1) бухта. 479.

2) мысь. 479.

## Я.

**Ядоръ**:

1) мысь. 506, 513, 550.

2) островъ. 395, 427, 486.

**Ядыртуй**, мысь. 479.

**Ядыртъ**, см. Ядыртуй.

**Явчаканъ**, рч. 608.

**Явшалъ**, рч. 317, 319, 471.

**Явшалъскій**, голецъ. 319.

**Ялгай**, ключъ. 397.

## ЗАМѢЧЕННЫЯ ОПЕЧАТКИ.

---

Страница:	Строка:	Напечатано:	Читать:
20	5 сверху.	1651'	1561'
23	5 »	Чивыркуйскій	Чивыркуйской
24	9 »	Дысовская	Мысовская
—	5 снизу.	Ангосалки	Ангасолки
25	2 сверху.	Сорма	Сарма
27	16 снизу.	Пранькина	Пронькина
28	7 »	Тунки	Турки
36	12 »	Выдринной	Выдренной
70	12 сверху.	Рассоха	Разсоха
81	10 »	спадающей	впадающей
88	3 снизу.	особенностяхъ мѣстности	особенностяхъ мѣст- ности,
124	2 »	Изв. З.-Сиб.	Изв. В.-Сиб.
139	6 сверху.	ангары	Ангары
311	3 »	строеніямъ	строеніемъ
347	5 »	долинъ	долины
592	13 снизу.	16-ти	16-ти саж.
616	8 »	Золотосныя	Золотоносныя

---















